

46114

LOUIS VIDAL

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES

1940

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
PARIS


~~4677~~
LOUIS VIDAL P. 11247

DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITES
PHARMACEUTIQUES



1940

OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
11, Rue Quentin-Bauchart, PARIS (VIII^e)



DICTIONNAIRE
DE SPÉCIALITÉS
PHARMACEUTIQUES



OFFICE DE VULGARISATION
PHARMACEUTIQUE
11, Rue Quentin-Bauchart, PARIS (VIII)

Cet ouvrage est distribué par les soins de :

OFFICE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

===== **SIÈGE SOCIAL :** =====

11, rue Quentin-Bauchart, Paris (VIII^e).

Téléph. : Élysées 90-91.

AGENCE DE LYON :

8, rue des Marronniers.

Tél. : Franklin 39-83.

AGENCE DE MARSEILLE :

15, rue La Fayette.

Tél. : National 12-65.

AGENCE DE BORDEAUX :

1, rue Albert-de-Mun.

== Tél. : 76-20. ==

AGENCE DE LILLE :

5, rue Gauthier-de-Châtillon.

== Tél. : 212-48. ==



OFFICE BELGE DE VULGARISATION PHARMACEUTIQUE

47-51-55-57, rue François-Bossaerts, Bruxelles.

===== Tél. : 15-79-05. =====

Première Partie



DICTIONNAIRE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES

Le Dictionnaire de Spécialités Pharmaceutiques doit son excellente réputation au soin apporté à sa rédaction. Sa composition est cependant si complexe qu'une erreur a pu s'y glisser. Il va sans dire que nous déclinons toute responsabilité pour les conséquences qui pourraient en résulter.

**" A 313 "****Usage externe.**

Solution huileuse de vitamine A et de ses produits de désintégration.

Indications. — Traitement des plaies atones, suppuration chronique, escarres, brûlures étendues, fistules, détermine un bourgeonnement très actif des tissus et provoque la cicatrisation.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de un cc.

Utilisation. — *Plaies atones, escarres, brûlures.* Répandre sur le tissu à traiter le contenu d'une ou plusieurs ampoules, recouvrir de gaze stérile et laisser en place 4 jours. *Fistules, Foyers d'ostéomyélites.* Injecter la solution dans le trajet fistuleux ou dans le foyer. Répéter les injections tous les 2 jours.

" A 313 "**Injectable.**

Solution huileuse de vitamine A pour injections intramusculaires.

Indications. — Traitement des infections généralisées. Septicémies, Pneumonies, Fièvres typhoïdes. Ostéomyélites aiguës.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 0 cc. 5.

Utilisation. — Injections intramusculaires, une ampoule tous les 2 jours chez l'enfant, une ampoule tous les jours chez l'adulte.

Labor. pharmaceutiques CHABRE Frères
TOULON

A « 313 »**A ingérer.**

Solution huileuse de vitamine A à 5 %, en capsules à ingérer.

Indications. — Tous les États infectieux, notamment les Fièvres typhoïdes. Les Fièvres puerpérales. Les Hyperthyroïdies. Les Recto-colites. Les Infections locales. Les Syndromes anémiques et neuro-anémiques. Les Héméralopies.

Présentation. — Boîtes de 20 capsules de 15 cgr. contenant chacune 7 mm. 5 de vitamine A.

Posologie :

Dans les affections aiguës : une capsule matin et soir au début du repas.

Dans les affections chroniques : une capsule avant le repas du soir.

Laboratoire pharmaceutique

CHABRE Frères

TOULON

ABSURIC

Le meilleur solvant de l'acide urique.
Le plus puissant antiseptique urinaire.

Composition. — Citro-lactate de lithine.
Pipérazine, urotropine, sulfosalicylate de quinoléine.

Indications. — Affections des reins et de la vessie (néphrites, pyélo-néphrites, cystites, urétrites, etc.). Goutte, arthritisme, gravelle, rhumatismes, artériosclérose, dysenterie amibienne.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau sucrée.

Le flacon : 16 fr. 65.

Laboratoire de l'ABSURIC

17, rue de Provence — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 76-18.)

ACATAR

(a privatif, contre le catarrhe).

Médication balsamique par excellence.

Composition. — Pilules glutinisées à base de Baume de Tolu, Baume d'Abiès, Cinnamo-benzoate de soude, Goudrons de pinus et Juniperus (Harlem), Argent colloïdal.

Indications thérapeutiques. — Véritable balsamique très doux n'irritant pas les reins, médication antiseptique et anti-infectieuse, modifiant les sécrétions, applicable dans tous les écoulements aigus ou chroniques, toutes manifestations catarrhales irritatives ou douloureuses des voies urinaires, bronchiques, biliaires, intestinales (cystites, cystalgies, pollakiurie, toutes affections prostatiques, uréthrites, néphrites, toutes pyélo-néphrites, tuberculoses rénale ou intestinale, etc...).

Mode d'emploi. — Dose moyenne : 9 pilules par jour en 3 fois. (60 pilules par flacon.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-5.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

ACÉCOLINE

Chlorure d'acétylcholine en solution anhydre et stable, directement injectable par voie intramusculaire.

Boîtes de 3 et de 8 ampoules dosées à 2, 5, 10 ou 20 cgr.

Propriétés. — L'Acécoline dilate les artères de la périphérie, résout les spasmes vasculaires et régularise la circulation périphérique. Elle renforce, en outre, puissamment le tonus des muscles lisses et rééquilibre le système neuro-végétatif.

L'Acécoline est parfaitement tolérée, elle n'a pas de contre-indication.

Indications et posologie :

- 1° *Affections artérielles périphériques* : Artérites chroniques, syndrome de Raynaud : 20 à 60 cgr. par jour ;
- 2° *Affections veineuses périphériques* : Ulcères variqueux, 10 cgr. par jour ; Phlébites, 10 à 40 cgr. par jour ;
- 3° *Affections vasculaires générales* : Hypertension artérielle, angine de poitrine : 10 à 20 cgr. par jour.
- 4° *Affections neurologiques* : Ramollissement cérébral, 20 à 40 cgr. par jour ; troubles de la ponction lombaire, 20 cgr. ; sciatique, 20 cgr. par jour ;
- 5° *Indications ophtalmologiques et oto-rhino-laryngologiques* : Spasmes de l'artère centrale de la rétine, 20 à 40 cgr. par jour ; Glaucome, 20 cgr. par jour. Vertiges labyrinthiques, Bourdonnements d'oreilles, Ozène, 10 à 20 cgr. par jour ;
- 6° *Indications gastro-entérologiques* : Hypochlorhydrie, Hyperchlorhydrie, 20 à 40 cgr. par jour. Atonie vésiculaire, 10 à 20 cgr. par jour ;
- 7° *Indications phthisiologiques* : Sueurs profuses des tuberculeux, 2 à 4 cgr. par jour.

L'Acécoline ne doit pas être prescrite en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de leurs effets vasculaires.

Boîtes de 3 amp. à 10 cgr. : 12 fr. ; 8 amp. : 30 fr.
Boîtes de 3 amp. à 20 cgr. : 15 fr. ; 8 amp. : 40 fr.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

(Tél. Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

ACÉCOLINE-PAPAVÉRINE

Composition :

	Pour 1 ampoule de 2 cc. :	
Chlorure d'acétylcholine (Acécoline : marque déposée).....	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénylglycolate de papavérine.....	0 gr. 05	0 gr. 05

Boîtes de 3 et de 8 ampoules pour chacune de ces deux formules.

Bien préciser, en Acécoline, le dosage prescrit (10 ou 20 cgr.).

Propriétés. — L'Acécoline dilate les artères par voie nerveuse en excitant le parasymphatique.

Le phénylglycolate de papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel. Il en provoque le relâchement et s'oppose ainsi à toutes les excitations spasmodiques réflexes.

De l'association de ces deux actions, nerveuse et musculaire, résulte une artério-dilatation maximum, propriété essentielle de l'Acécoline-Papavérine.

Il en résulte, en outre, un renforcement et une prolongation du pouvoir hypotenseur de l'Acécoline.

Indications médicales

- 1° *Artérites des membres, claudication intermittente* : 1 à 3 ampoules à 20 cgr. par jour ;
- 2° *Spasmes des artères rétiniennes*, 1 à 3 ampoules à 20 cgr. quotidiennement ;
- 3° *Migraines ophtalmiques* : 1 ampoule à 10 ou 20 cgr. ;
- 4° *Hypertension artérielle, migraines rebelles* : 1 à 2 ampoules à 10 cgr.
- 5° *Ramollissement, épilepsie* : 1 à 3 ampoules à 20 cgr. dans les accidents graves. Dans l'état de mal épileptique, injection intraveineuse d'une ampoule à 10 cgr. ;
- 6° *Angine de poitrine* : 1 ou 2 ampoules à 10 cgr. par jour.

Indications chirurgicales.

- 1° *Gangrènes par artérites* : 1 à 4 ampoules à 20 cgr. par jour ;
- 2° *Emboles artérielles* : 1 à 4 ampoules à 20 cgr. par 24 heures.

L'Acécoline-Papavérine ne doit pas être prescrite en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Boîtes de 3 ampoules à 10 cgr. : 13 fr. ; à 20 cgr. : 16 fr.

Boîtes de 8 ampoules à 10 cgr. : 32 fr. ; à 20 cgr. : 42 fr.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS.

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevreton 90, Paris.)

ACÉCOLINE-SPARTÉINE

Vaso-dilatateur et Toni-cardiaque.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Spartéine (Sulfate) 0 gr. 05

Hypertension avec insuffisance cardiaque. Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

ACÉCOLINE-CAMPHRE

Vaso-dilatateur et Eupnéique.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Camphre 0 gr. 20

Dyspnée des hypertendus. Asthénie des hypertendus.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

ACÉCOLINE-YOHIMBINE

Hypotenseur et Sympathicolytique.

Acécoline (Chl. d'Acétylcholine) 0 gr. 10

Yohimbine 0 gr. 01

Hémorragies cérébrales et méningées. Hypertensions paroxystiques.

Contre-indications. — Ramollissement cérébral et spasmes des artères rétinienne.

Posologie. — 1 ampoule matin et soir, 2 ampoules dans les cas d'urgence.

Boîtes de 3 ampoules : 12 fr. 50 ; de 8 ampoules : 31 francs.

Les associations thérapeutiques de l'Acécoline ne doivent pas être prescrites en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de leurs effets vasculaires.

ACÉCOLEX

Pâte trophique à l'Acécoline.

Traitement des Ulcères variqueux, des Plaies atones et des Dermatoses

Chlorure d'Acétylcholine ; fenchone ; oxydes de zinc, de titane, etc.)

Cicatrisation rapide et sédation des douleurs.

Le tube de 35 gr. : 17 francs ; de 105 gr. : 37 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

ACEPILINE

Composition. — Acétone très pur, Alcool, Pilocarpine, Essences aromatiques stimulantes déterpénées.

Indications. — Alopecies post-fébriles, Alopecies séborrhéiques.

Posologie. — Chaque matin, peigner au démêloir et à la brosse dure, puis friction à l'Acepiline avec une brosse à dents demi-dure, raie par raie pendant 10 minutes pour la femme, ou durant 5 minutes sur toute la tête pour l'homme. Quand les cheveux morts cesseront de tomber, continuer par périodes d'une semaine de temps en temps.

Le flacon 250 cc.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

ACÉRYL

Composition. — Extrait fluide concentré sucré et aromatisé, contenant les principes actifs du trèfle d'eau, du pissenlit, du maïs, de l'épine-vinette, de la benoite, associés aux principes aromatiques de la verveine, de l'angélique et de l'écorce d'orange amère.

Propriétés et indications. — Médication apéritive et stimulante du foie et de l'estomac. — Spécifique de l'anorexie. — Uniquement à base de plantes. — Aucun produit chimique. — Aucun produit toxique.

Posologie et mode d'emploi. — Aucune contre-indication. Une cuillerée à café dans un 1/2 verre d'eau trois fois par jour, un quart d'heure avant chaque repas.
Enfants : demi-dose.

Prix : 20 francs le flacon de 125 cc. représentant 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

J. BLANCHARD

PONT-DE-VAUX (Ain).

(Tél. : 86.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 1195-1.

ACÉSINE GUILLAUMIN

Composition. — Pommade à base d'extrait de capsules surrénales de chlorétone et de stovaine.

Propriétés. — Agent analgésique et vasoconstricteur de grande efficacité, dont les propriétés peuvent être utilement mises à profit, en particulier dans le cas d'hémorroïdes externes ou internes.

Indications. — Hémorroïdes, fissures et prurit de l'anus, démangeaisons de la même région, engelures, gerçures.

Mode d'emploi. — L'Acésine se présente en tubes d'étain. On applique gros comme un pois de la pommade sur les hémorroïdes externes ; quand les hémorroïdes sont internes, visser, sur le tube, la canule qui l'accompagne et introduire la pommade dans le rectum. Renouveler les applications 3 ou 4 fois par jour.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS. (Tél. : Littré 26-92)

ACÉTAMONE

Préparation à base d'acétate d'ammoniaque stabilisé chimiquement pur.

Composition. — Présenté dans une solution de pH optimum assurant une conservation indéfinie.

Une cuillerée à soupe = 1 gr. d'acétate d'ammoniaque stabilisé.

Propriétés. — Stimulant diffusible le plus énergique et le plus inoffensif, diaphorétique, tonique, anti-infectieux.

Indications. — Toutes les *maladies fébriles*. — *Maladies infectieuses* : grippe, rougeole, rubéole, varicelle, oreillons, scarlatine, etc. — *Les affections aiguës de l'appareil respiratoire* : angine, trachéite, bronchite, congestion pulmonaire, broncho-pneumonie, pneumonie. — *Les affections cardiaques* : myocardites, collapsus.

Présentation et prix. — Flacon de 150 cc. : prix 16 fr. 80.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 3 à 8 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 3 à 8 cuill. à dessert par jour suivant l'âge.

Nourrissons : 1 à 3 cuillerées à café par jour à prendre pur ou dans un liquide tiède.

Laboratoires du Dr LAURENT-GÉRARD

Docteur ès Sciences.

Ancien chef de laboratoire à la Faculté de médecine de Paris
40, rue de Bellechasse, Paris (VII^e). (Tél. : Inv. 78-44.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 111-10.

ACÉTO-STÉRANDRYL

Acétate de Testostérone.

Composition. — Éther-sel de l'hormone testiculaire cristallisée, obtenue synthétiquement.

Forme. — L'Acéto-Stérandryl est une solution huileuse d'acétate de testostérone.

Boîte de 1 ampoule de 1 cc. 40 mgr.

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 40 mgr.

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 10 mgr.

Indications :

Titrage à 10 mgr. : Thérapeutique féminine : Mastopathies, Hyperménorrhées, Métrorragies des fibromes.

Titrage à 40 mgr. : Prostatisme : Rétention complète, aiguë ou chronique.

Posologie. — On variera la posologie suivant les cas à traiter en se basant sur les directives puisées dans la littérature de l'Acéto-Stérandryl.

(Voir Stérandryl et Ecto-Stérandryl.)

Prix au public :

Boîte de 1 ampoule de 1 cc. à 40 mgr. : 56 fr. 10.

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 mgr. : 255 francs.

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 10 mgr. : 66 fr. 30.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

ACÉTUMINE MERCIER

Spécifique de toutes les affections cutanées.

Composition. — Complexe de sulfate d'alumine d'acide acétique, d'acide citrique.

Propriétés. — Combinaison aisément dissociable, dans laquelle les propriétés respectives de chacun des composants demeurent entières. Antiseptique cicatrisant, non toxique, non caustique, d'odeur agréable, solution incolore, pommade non grasse ne tachant pas.

Indications. — Plaies, brûlures, contusions, boutons, crevasses, eczéma, ulcères, prurits, maux de gorge, enrouement, gingivites, hémorragies, vaginites, métrites.

Présentation. — Solution, pommade, pastilles, gargarisme sec, ovules.

Prix : flacon, 8 fr. 25 ; tube, 8 fr. ; pastilles, 5 fr. 50 ; ovules, 17 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1051-2.

Laboratoires MERCIER

41, route de Turin — NICE

ACÉTYLARSAN

4 oxy — 3 acétylamino — phényl — 1 arsinate de diéthylamine.

Solution aqueuse neutre et stérile, non irritante, injectable dans le muscle ou le tissu cellulaire sous-cutané. Bien tolérée. Toxicité réduite.

Indications. — Arsénothérapie de la Syphilis et de certaines protozooses par les voies sous-cutanée ou intramusculaire.

Présentations et posologie. — *Acétylarsan pour adultes* : solution à 23,6 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 05 d'Arsenic. Ampoules de 3 cm³. (Boîtes de 10.)

Acétylarsan infantile : solution à 9,4 p. 100, 1 cm³. = 0 gr. 02 d'Arsenic. Ampoules de 2 cm³. (Boîtes de 10.)

Injectations hebdomadaires ou bi-hebdomadaires (consulter la Notice spéciale).

Prix de vente :

A. Pour adultes : 35 francs.

A. Infantile : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ACIDOFECO

Culture pure de *Lactobacillus-Acidophilus* en Sérum de lait OFCO. Bacilles vivants consommés frais.

Chaque flacon contient un milliard de ferments lactiques vivants (*Lactobacillus-acidophilus*) spécialement adaptés à l'intestin, cultivés à 37° en Lactosérum de Lait OFCO, provenant d'étables soumises au Contrôle officiel (décret du 15 novembre 1927) exempt de toxine tuberculeuse.

Indications. — Colibacillooses, Intoxications d'origine intestinale, Troubles hépatiques, Migraines, Dermatoses.

Posologie :

Adultes : 1 flacon par jour, à jeun, dilué dans son volume d'eau, lait, vin, bière, etc.

Enfants : 1/4 ou 1/2 flacon par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par biberon. Cure thérapeutique : plusieurs semaines consécutives. Cure d'entretien : 1 ou 2 semaines par mois.

Prix :

Cure de 7 flacons pour adultes : 26 fr. 50.

Cure de 3 flacons pour enfants : 14 fr. 30.

Produit non stocké, à commander au fur et à mesure des prescriptions à :

M. GUILBAUD, Pharmacien,

25, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1833.

ACOBELLA

Le médicament sédatif de la Toux.

Forme. — Comprimés très assimilables, très actifs et ne provoquant pas de dyspepsie. Présenté en boîte de 20 comprimés.

Formule. — Bromoforme, 0,02 ; Codéine, 0,01 ; Extrait de racines d'Aconit, 0,0025 ; Extrait de Belladone, 0,0025 ; Extrait de Jusquiame, 0,0025 ; Extrait de Drosera, 0,003 ; Extrait de Grindelia, 0,002 ; Extrait de Lobelia 0,01 ; Benzoate de soude, 0,01 ; Poudre de Dower, 0,06 pour 1 comprimé.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par 24 heures à avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Indications. — Traitement de toutes les toux rebelles et fréquentes, des laryngites, trachéites, trachéo-bronchites aiguës, de la coqueluche et de la bacillose pulmonaire.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 403-1.

Laboratoire **HOCQUETTE**

191, faubourg Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

ACOLITOL

Topique intestinal.

Composition. — Charbon organique pur, charbon activé, carbonate de calcium amorphe, salicylate de bismuth, peroxyde de magnésium, belladone pulvérisée titrée (0,01 par dose).

Présentation. — Granulé fondant et poudre.

Propriétés. — Topique intestinal de choix, neutralisant, fixateur et sédatif. Entrave les processus inflammatoires. Ramène à la normale le chimisme de l'intestin, en régularise le péristaltisme. Empêche les fermentations anormales. Adsorbe les toxines microbiennes endogènes ou exogènes. Modifie la flore protéolytique.

Indications. — Colites, gastro-entérites, entéro-colites, fermentations, intoxications et auto-intoxications, infections intestinales, dysenterie, entérite des tuberculeux, colibacillose.

Posologie. — Une cuillerée à entremets croquée ou délayée dans un demi-verre d'eau le matin à jeun, et une 1/2 heure avant les repas de midi et du soir.

(Voir Rect'Acolitol, pansement recto-sigmoïdien).

Prix : 18 fr. 75.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Élysées 17-46.)

ACONITINE HOUDÉ

Granules titrés à 1/10^e de milligramme.

Propriétés thérapeutiques. — Action analgésique, puis anesthésique, *élective*, sur les noyaux sensitifs bulbo-spinaux (Nerfs de la face, *trijumeau*).

Indications. — Médication *spécifique* des *névralgies faciales graves ou rebelles*. Très efficace dans certaines *sciatiques*.

Présentation. — Granules titrés à 1/10^e de milligramme de Nitrate d'aconitine (alcaloïde de l'*Aconitum Napellus*).

Posologie. — Produit très actif à petite dose. Débuter par un granule (dépistage des intolérances). Augmenter jusqu'à 5 granules, par doses réfractées. Limite maxima : 10 granules (1 milligramme). Contre-indications : Insuffisance cardiaque ou rénale.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e). (Tél. : Nord 40-58.)

ACOQTOL-MIALHE

Gouttes à base de Chloro-Bromo-Méthane.

Deux formes : sucrées ou glycinées (diabétiques).

Spécifique de la Coqueluche, des toux spasmodiques et Coqueluchoïdes. Calme la toux des bronchites chroniques.

Aucune toxicité, goût agréable, guérison rapide.

Dès les premiers jours, la toux est modifiée, le malade n'éprouve plus ni suffocation, ni vomissement, il retrouve l'appétit et le sommeil.

Doses. — Les gouttes seront toujours prises dans un demi-verre d'eau :

De 6 mois à 2 ans : XV gouttes 2 à 3 fois par jour.

De 2 ans à 5 ans : XV gouttes 3 à 8 fois par jour.

De 5 ans à 15 ans : XXV gouttes 4 à 8 fois par jour.

Adultes : L gouttes 4 à 8 fois par jour.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

L. N. C. M. n° 417.

Prix : 15 fr. 90.

Conservation indéfinie.

N. B. — *Acoqtol* existe aussi sous forme sirop, demander échantillons et littératures aux laboratoires Mialhe.

Laboratoires MIALHE,
8, rue Favart — PARIS (II^e).
(Tél. : Richelieu 35-10.)

ACTIPHOS

Solution acide stable et équilibrée de phosphates alcalins alcalino-terreux et métalliques.

(Ca, Na, Mg, Li, Mr et Fe.)

Propriétés. — Régulateur du pH humoral, et plus particulièrement du pH sanguin et urinaire. Acidifiant sans toucher à la réserve alcaline. Reminéralisateur et récalcifiant. Anti-colibacillaire. Tonique puissant : musculaire, nerveux et cérébral.

Indications. — Alcalose, Déséquilibre acido-basique, Coli-bacillose, Déminéralisations, Dépressions physiques, cérébrales, nerveuses, Insuffisances hépatique, pancréatique et rénale, Rhumatismes.

Pas de contre-indications.

N'a aucune action irritative sur les voies digestives.

Présentations. — Ampoules de 3 cc.

Prix : { Boîte de 14 ampoules : 24 francs.
Boîte de 30 ampoules : 45 francs.

Posologie et mode d'administration. — Se prend au cours des repas, par petites gorgées, mélangé à un verre d'eau coupée de vin ou sucrée à volonté.

Adultes : de 2 à 4 ampoules par jour.

Enfants : de 1 à 2 ampoules par jour suivant l'âge.

Spécialités Roger BELLON.

J. GAUTIER, pharmacien

Laboratoire du GAMBÉOL — 42, rue Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

ADÉNOSEPTYL

Solution pour instillations et pulvérisations nasales.

Formule :

Argent colloïdal.....	0,30
Protéinate d'argent.....	0,30
Vitellinate d'argent.....	0,30
Solut. Adréaline au 1/1 000°....	1
Essence de Niaouli.....	0,016
Eucalyptol.....	0,016
Camphre.....	0,02
Excip. Glycéro-Hydro-Alcool.....	98,05

Indications. — Toutes les Affections du nez et de la gorge, Sinusites, Adénoïdites, Laryngo-trachéites, Etat grippal, etc.

Déterge la muqueuse sans l'irriter.

Mode d'emploi. — En *instillations*, à l'aide du compte-gouttes spécial ou en *pulvérisations*.

Prix au public : 16 fr. 50.

Enregistré au Laborat. Nat. de Contr. sous le N° 884-3.

E. DUFOUR, Pharmacien.

AMPLEFUIS (Rhône). (Tél. : 55.)

ADIPO-FUGELINE

DU

DOCTEUR L. DELALBRE

EX-ADIPOLYSINE

privée de son élément thyroïdien

PRÉPARATION

CHOLAGOGUE ET OPOTHÉRAPIQUE
non toxique

RÉGULATRICE DE LA NUTRITION

par modification physiologique de l'assimilation

PARTICULIÈREMENT EFFICACE CONTRE L'OBÉSITÉ

SANS RÉGIME

SANS DANGER

Une seule formule pour les deux sexes

sans corps thyroïde ni glandes génitales.

PRÉSENTÉE sous forme de DRAGÉES

— COMPOSITION —

1° Poudres salines :

Phosphate de soude	0 gr. 04
Sulfate de soude.....	0 gr. 05
Sulfate de magnésium.....	0 gr. 06
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 05
Citrate monosodique	0 gr. 06
Bromure de calcium.....	0 gr. 05
Hyposulfite de magnésium.....	0 gr. 02

2° Poudres d'organes :

Poudre d'estomac	0 gr. 02
— de duodénum.....	0 gr. 01
— d'intestin.....	0 gr. 02
— de foie.....	0 gr. 05
— de pancréas.....	0 gr. 04
— de rate.....	0 gr. 03
— de surrénale.....	0 gr. 002
— d'hypophyse.....	0 gr. 001

Pour 1 dragée.

Excipient spécialement étudié. — Enrobage soluble dans l'eau.

— EFFETS PHYSIOLOGIQUES —

Les effets physiologiques de l'*Adipo-Fugeline* dépendent essentiellement des instants où s'effectuent les décharges biliaires après l'absorption de quantités données de ce produit médicinal cholagogue par rapport aux heures du début ou de la fin des repas.

— PROPRIÉTÉS THÉRAPEUTIQUES —

Selon les moments de son administration.

L'ADIPO-FUGELINE

FAIT MAIGRIR LES OBÈSES

Accélère les DIGESTIONS LENTES

Guérit la CONSTIPATION

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES DE L'ADIPO-FUGELINE
Obésité sous toutes ses formes

Digestions lentes

Constipation opiniâtre

Aérophagie — Insuffisance du Foie — Entérite

Débilité minérale magnésienne et sodique

Carence soufrée

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI ET DOSES DE L'ADIPO-FUGELINE —

Les dragées s'avalent avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES :

OBÉSITÉ : 3 dragées à la fois $1/2$ heure exactement avant le début de chacun des 2 principaux repas.

DIGESTIONS LENTES : 3 dragées à la fois au milieu de chacun des 2 principaux repas.

CONSTIPATION : 3 dragées à la fois le matin à jeun et 3 également le soir au coucher, le plus loin possible de la fin du dernier repas.

Ces doses répétées tous les jours pendant plusieurs mois consécutifs,

et même plusieurs années avec intervalles de repos.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS : $2/3$ des doses ci-dessus.

ENFANTS : $1/3$ des doses ci-dessus.

PRIX AU PUBLIC : 27 fr. 55 LE FLACON de 60 dragées.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS.

2, rue Claude-Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11.)

ADOVERNE « ROCHE »

Glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Action thérapeutique. — Cardiotonique, diurétique, eupnéique, neuro-sédative. Complète, remplace ou continue l'action de la digitale.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances cardiaques et rénales. — Asthénies cardiaques, dyspnée, arythmies, œdème pulmonaire, œdèmes périphériques, hydropisies, etc.

Avantages. — Etalonnage physiologique. — Activité optima toujours identique. — Toute l'action utile de la plante elle-même. — Pas d'accumulation. — Pas d'accoutumance. — Pas de toxicité aux doses thérapeutiques. — Emploi facile. — Tolérance remarquable.

Posologie. — XL gouttes ou 4 granules ou un suppositoire = 1 cm³ d'une solution à 5 p. 1.000 des glucosides cardiotoniques de l'*Adonis vernalis*.

Modes d'emploi. — Par voie buccale : XX à XL gouttes ou 2 à 4 granules, 1 à 2 fois par jour et plus dans un peu de tisane ou de liquide.

Par voie rectale : 1 suppositoire une à trois fois par jour

Adoverne « Roche »

Gouttes (flacon de 15 cm³).

Granules (flacon de 60).

Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-2 (*gouttes*), 504-3 (*granules*), 504-64 (*suppositoires*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ADRÉNALINE CARRION

Adrénaline *naturelle*, extraite des glandes surrénales.

Formes :

Solution au millième en ampoules, pour injections, et en flacon pour l'administration *per os* et l'usage externe.

Indications :

Adynamie, hypotension, Maladie d'Addison, Vomissements incoercibles de la grossesse, Ostéomalacie, Rachitisme, Phénomènes de choc. Crise nitritoïde, Hémorragies, Applications locales.

Présentation et prix :

Le flacon de 10 cc. : 11 fr. 70.

La boîte de 6 amp. de 1 cc. : 11 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. n° 514-I et 2.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ADRÉNALINE CHOAY

Chlorhydrate d'Adrénaline physiologique.

Nature. — Principe hypertenseur, vasoconstricteur et cardiotonique extrait des capsules surrénales (*Adrénaline naturelle*).

Indications :

Applications locales : Hémostase, Anesthésie locale (fixation de l'anesthésique).

Injections hypodermiques :

Hypotension. Etat de shock. Crises nitritoïdes. Asthme essentiel.

Par la bouche : Peu active. Préférer l'opothérapie surrénale totale.

Formes pharmaceutiques :

Flacons de 15 cc. de solution au 1/1000°.

(Vingt gouttes représentent 1 cc. de solution, soit un mgr. de chlorhydrate d'adrénaline.)

Ampoules de solution au 1/1000° (1/cc. = 1 mgr.).

Ampoules de solution au 1/2000° (1/cc. = 1/2 mgr.).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

ADRÉNALINE CLIN

Adrénaline lévogyre chimiquement pure,
exempte de toute adrénaline racémique.

Pouvoir rotatoire : $-53^{\circ},3$.

Propriétés. — Agent vaso-constricteur et hémostatique, ayant une action cardiotonique, antidépressive et antitoxique. Analgésique léger et antichoc.

Excitateur du système nerveux sympathique.

Indications. — Anesthésie locale, hémorragies ; phénomènes de collapsus, de choc ; syncope chloroformique ; infections générales avec adynamie ; asthme ; vomissements incoercibles de la grossesse ; intoxications aiguës ; asthénie ; crises nitritoïdes ; certaines algies ; ostéomalacie ; rachitisme ; maladie d'Addison ; certaines affections oculaires, etc...

Formes. — 1^o *Solution aqueuse* (Chlorhydrate d'Adrénaline) au 1/1000. — Flacon de 5, 10, 30 cc. (20 gouttes = 0 gr. 001).

2^o *Ampoules injectables* (Solution aqueuse) dosées à 1/10, 1/4, 1 milligramme par cc.

3^o *Ampoules compte-gouttes* de 10 cc. pour Collyres (Solution aqueuse à 1 0/00). Instillations nasales (Solution huileuse en ampoules compte-gouttes de 25 cc.).

4^o *Granulés* au 1/4, 1/2, 1 milligramme. — Flacons de 50 granulés.

5^o *Suppositoires* au 1/2 milligr.

Formes associées (cocaïne, etc...) en ampoules.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ADRÉNALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux, donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Vaso-constricteur, hémostatique, stimulant circulatoire, coexcitant du sympathique, fixateur du calcium.

Indications. — Rachistisme, coqueluche, tuberculose, dyspepsies atoniques, hyposthénies, asthme, hémoptysie, etc.

Formes. — Solution au millième, flacons de 5 et 10 grammes.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

ADRÉNALINE MIALHE

ADRÉNINE

Soluté au millième de Chlorhydrate d'Adrénaline cristallisée. Véritable principe actif, extrait des Capsules surrénales.

XX gouttes = un milligramme = 1 cm³.

Anesthésie locale, Hémorragie, Phénomènes de Choc et de Collapsus cardiaque, Syncope chloroformique, Asthme, Vomissements incoercibles de la grossesse, Intoxications aiguës, Asthénie, Crises nitritoïdes, Maladies d'Addison, etc.

Dose forte :

Per os : C gouttes à doses fractionnées par 24 heures (toutes les heures X gouttes).

Conservation cinq années.

Un flacon mal bouché s'évapore rapidement.

Flacon de 20 cc. Prix : 21 fr. 20.

Ampoules au 1/10^e de milligr. et au millième.

L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart, PARIS (2^e). (Tél. : Richelieu 35-10.)

ADRÉNARGOL

Composition :

Adrénaline physiologique associée aux sels d'Argent : protéinate d'Argent et vitellinate d'Argent, en solution aqueuse, isotonique et stérile.

Avantages :

Bactéricide stable et énergique. Action rapide. Tolérance parfaite.

Présentation :

Ampoule nasale scellée très pratique à l'emploi. Olive compte-gouttes stérilisable.

Indications :

Infections du Rhino-Pharynx (Sinusites, Coryzas, Angines, etc.) ; Antisepsie des Voies respiratoires, de l'Œil, de l'Oreille ; prophylaxie des maladies contagieuses (Grippe, Coqueluche, Rougeole, etc.).

Posologie :

Rhinologie : IV à V gouttes dans chaque narine, matin et soir, plus souvent si nécessaire.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade, 2 à 3 fois par jour.

Oculistique : introduire 2 fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Durée du traitement : 15 à 25 jours.

Les Laboratoires du LUGOCALCION
OULLINS (Rhône).

ADRÉNOCALCINE

Recalcifiant par excellence.

Formes. — Poudre. — Cachets. — Granulé.

Composition. — Association de glycérophosphates, hypophosphites, phosphates, fluorure de chaux et magnésie.

Posologie. — 3 doses par jour.

Prix : Cachets : 14 fr. 75. Poudre : 12 fr. Granulé : 12 fr.

Laboratoire ADAM
Docteur en pharmacie
GRANVILLE (Manche).

ADRÉNOÏDES BÉRAL

Comprimés pour l'administration efficace de l'adrénaline par voie buccale.

Composition. — Chaque Adrénoïde contient 1/4 de milligramme d'adrénaline stabilisée, ce qui correspond à V gouttes de la solution d'adrénaline au millième.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline *per os*, avec cet avantage que l'absorption des Adrénoïdes par la muqueuse buccale met l'adrénaline à l'abri des altérations causées par le suc gastrique et évite sa destruction au niveau du foie.

« Depuis 1904, j'emploie systématiquement l'adrénaline et ai presque exclusivement recours à l'administration par voie buccale. Les résultats obtenus ne me permettent pas de douter de son efficacité. Netter. » (*Bulletin Société Biologie*, mai 1922.)

Mode d'emploi. — Laisser fondre les Adrénoïdes dans la bouche. « Ce serait perdre l'avantage de l'absorption par la muqueuse buccale que de les avaler. »

Posologie. — Un Adrénoïde toutes les 2, 3 ou 4 heures, soit de 6 à 12 par jour.

Tous états de dépression organique et circulatoire.

Formuler : Adrénoïdes Béral. Une boîte : 14 f ancs.

Laboratoire BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS

ADRÉNOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — *Huile adrénaline* au millième, avec addition de chlorétone, orthoforme et essences antiseptiques. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur, sédatif, antiseptique des voies respiratoires.

Avantages. — Tandis que l'adrénaline en solution aqueuse a une action *passagère*, l'adrénaline en solution *huileuse* étant absorbée plus lentement, sa *durée d'action* est considérablement *augmentée*, le pouvoir vaso-constricteur étant aussi élevé.

Indications thérapeutiques. — Sinusites, Hémorragies nasales, Catarrhe nasal, Troubles respiratoires et Coryza de l'enfance, Adénoïdites aiguës.

L'Adrénoléine ne présente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En instillations (III à V gouttes dans chaque narine), 2 à 3 fois par jour, et en pulvérisations nasales avec un appareil à huile non métallique (type Vaast grand modèle), *avant* les inhalations.

Prescription. — Un flacon *Adrénoléine Falvy*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

ADRÉPATINE

Composition. — Association pluriglandulaire : Foie, Surrénale, Thyroïde, Hypophyse, Prostate. — Extraits végétaux : Marron d'Inde frais stabilisé, Cupressus, Hamamélis. — Excipient antiseptique et calmant.

Propriétés et indications. — L'ADRÉPATINE est une préparation pharmaceutique qui :

- 1° Par les extraits polyglandulaires englobés ;
- 2° Par les propriétés hypertensives de certains de ses composants ;
- 3° Par son action vaso-constrictive locale ;
- 4° Par son excipient à la fois anesthésique et antiseptique, est destinée à combattre non seulement l'expression anatomique et les complications de l'affection primitive, mais encore à remédier aux troubles organiques et fonctionnels qui président à la formation des hémorroïdes. Son emploi est tout spécialement indiqué dans le traitement des hémorroïdes internes et externes, des Rectites, Prostatites, du prurit anal et des fistules.

Formes. — Suppositoires et pommade.

Posologie et mode d'emploi. — de 1 à 3 suppositoires (ou applications de pommade) par 24 heures. Le tube de pommade est muni d'une canule rectale.

Durée moyenne des unités de vente : 12 à 15 jours.

Prix de vente	{ Boîte de 15 suppositoires.....	14 fr. 25
au public	{ Tube de pommade avec canule rectale ...	14 fr. 25

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). — (Trocadéro : 62-24.)

ADRÉPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 centicubes pour injections sous-cutanées.

Composition. — 1/4 milligramme d'Adrénaline et 2 centigrammes d'Ephédrine Béral par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'adrénaline sous-cutanée, mais avec cette différence avantageuse qu'à dose égale elle est moins toxique, plus maniable et surtout d'une durée d'action beaucoup plus prolongée. De plus, cette action n'est pas suivie de la réaction hypotensive adrénalinique. Elle présente donc tous les avantages de l'adrénaline sans ses Inconvénients.

Indications. — Toutes celles de l'adrénaline sous-cutanée, notamment : *Accès d'asthme déclenchés, États de choc avec défaillance circulatoire périphérique et collapsus* (chocs thérapeutiques, sériques, anaphylactiques, opératoires, etc.), *États hémogéniques, Purpuras, Anémies, Hémoptysies, Urticaire* (effet immédiat), etc.

Posologie. — De 1 à 4 centicubes sous-cutanés. Chez sujet neuf, débiter par 1 centicube. Comme pour l'adrénaline, éviter la voie musculaire qui pourrait exposer à injecter dans un petit vaisseau.

Formuler : Adréphédrine : Une boîte. 16 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

AÉINE

Médication type des troubles vago-sympathiques et particulièrement de l'émotivité et du tr:c.

Forme. — Petits comprimés jaunes de 0 gr. 25, non solubles

Composition. — Complexe de cortico-surrénale (2 cgr) associé à la Malonylurée (15 mgr.), Ephédrine (5 mgr) et Peptone polyvalente.

Coefficient de toxicité nul, élimination en 1 h. 1/2 au lieu de 7 à 8 heures. Aucune contre-indication.

Indications. — Toutes affections ou symptômes sous la dépendance du déséquilibre vago-sympathique et endocrinien (instabilité vagale). C'est le terrain neuro-végétatif qui conditionne la maladie que le Dr Bayard a décrite sous le nom d'AËISME (Anxiété, Émotivité Irritabilité et Insomnies). C'est le médicament de l'anxiété pré-opératoire, de l'asthme, névrose des voies respiratoires, des troubles psychiques de la menstruation et de la ménopause. (C. Litt. avec préface du Prof. Laignel Lavastine et communications aux Sociétés Savantes. — Thérapeutique et Pathol. comparée.)

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour, 2 avant chaque repas ou en se couchant, 2 à 3 comprimés chez les enfants

Prix : 13 fr. 55 le tube (pour 8 jours de traitement).

Laboratoire de l'AÉINE

6, place Clichy — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 65-18.)

AÉROCID

Conception entièrement nouvelle.

Traitement opothérapique de l'aérophagie et de ses conséquences.

Basé sur l'action de la parathyroïde dans le métabolisme du calcium, dont le rôle antispasmodique a été mis en évidence par de nombreux auteurs.

Formule :

Parathyroïde.....	0,001
Hypophyse.....	0,0035
Poudre Pancréas.....	0,02
Surrénine.....	0,02
Hépatine.....	0,30

Indications. — Aérophagie, Asthme, Emphysème, Fausse angine de poitrine, Insomnie.

Dose et mode d'emploi. — Un cachet ou deux comprimés au lever et au coucher, avec un verre d'eau.

Présentation :

Boîte de 20 cachets.....	20 fr. 80
Etui de 40 comprimés.....	20 fr. 80

Pour obtenir la guérison suivre le traitement 50 jours.

La Boîte-cure : 93 fr. 60.

Laboratoire de l'AÉROCID

G. SCHMIT, pharmacien

20, rue de Péetrograd, PARIS (8^e).

AÉROCOLYL

du Docteur Moity

Granulé Fondant.

Introduction dans la thérapeutique courante de trois corps nouveaux :

1^o **GEL DE SILICE** en association synergique avec le **charbon suractivé** (aires d'absorption mutuellement augmentées de 50 p.100).

2^o **LE SILICATE DE CALCIUM ACTIVE.** — 5 gr. absorbent 268 cc. de gaz de fermentation.

3^o **LA FORMINE ARGENTIQUE** (combinaison d'argent et d'hexaméthylène-tétramine), antiseptique puissant non toxique.

Formule. — Gel de Silice, 5 (aire d'absorption $4,5 \times 106$ cc.).

Charbon activé, 15 (aire d'absorption $6,3 \times 106$ cc.).

Silicate de Ca activé, 7,50 (5 gr. absorbent 268 cc.) de CO₂.

Formine argentique titrant 13 p.100 d'argent, 2.

Poudre de belladone, 0,15 pour 100 gr.

Indications. — Aérocolie, Aérophagie, Colites diverses, états infectieux du tube digestif, diarrhées, colibacillose, auto-intoxications, dermatoses.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café aux trois repas

Prix : 17 fr. 60 la boîte contenant 125 grammes de granulé
Diffusion strictement médicale.

Laboratoire M. de RIVE

J.-O. MOITY, Docteur en Médecine et en Pharmacie

Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

199, Bd Bineau — NEUILLY (Seine).

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert, PARIS (20^e).

AÉROPHAGYL

Combinaison complexe constituée par l'association à une faible dose d'uroformine, du citrate de sodium et des ions Br, sédatif; et Ca, antispasmodique.

Indications. — Spécifique de l'Aérophagie, dans toutes ses manifestations : digestives : éructations, ballonnements, aérocolie; respiratoires : dyspnées, faux asthme; circulatoires : tachycardie, palpitations, faux angor. Insomnies d'origine digestive. Gastrites nerveuses. Médication bromurée calcique dissimulée (0,25 CaBr par comprimé).

Posologie. — 1 à 2 comprimés délayés dans un demi-verre d'eau au milieu des repas. En cas de crise, 2 comprimés *à la fois*.

Enfants : Demi-dose.

Présentation et Prix. — Boîte de 45 comprimés, pour 2 semaines de traitement : 17 fr. 55.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X°).

(Tél. : Nord 76-85)

ÆSCULASE

Composition. — Alcoolature de marrons d'Inde stabilisée, extraits d'hamamélis et de capsicum.

Propriétés thérapeutiques. — Action vasoconstrictive énergique et constante sur le système veineux périphérique. Action régulatrice de la circulation, puissant analgésique, antihémorroïdaire.

Indications. — Tous les troubles circulatoires, Puberté, Ménopause, Hémorroïdes.

Mode d'emploi :

Troubles de la circulation : XV gouttes avant les deux repas. Hémorroïdes : pour éviter les crises
X gouttes avant les deux repas.

Dans les crises aiguës : XX à L gouttes 2 fois par jour.

Prix : 12 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.

(Tél. : 308.)

ÆTHONE

*Antispasmodique, sédatif de la Coqueluche
et de la Toux.*

Doses. — 1° Pour les enfants, administrer :

5 à 6 fois par jour	{	de 1 mois à 1 an : I goutte par mois d'âge.
		de 1 à 2 ans : XII à XX gouttes.
		de 2 à 5 ans : XX à XXV gouttes.
		de 5 à 10 ans : XXV à XXX gouttes.
		de 10 à 15 ans : XXX à XXXV gouttes, et plus s'il est nécessaire.

2° Pour les adultes, administrer : 5 à 6 fois par jour : L à LX gouttes dans une quantité suffisante d'eau sucrée, de sirop de tolu additionné d'eau, ou dans une infusion de Guimauve sucrée avec du miel. L'Æthone doit être administrée 1/2 heure avant ou 2 heures après le repas.

Prix au public : 13 francs le flacon.

Laboratoire de l'ÆTHONE

35, rue Boissonnade — PARIS.
(Tél. : Danton 92-10.)

AGARASE

(Comprimés.)

Régulateur et rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales. Laxatif des femmes, des hépatiques, des gros mangeurs, des coloniaux.

Composition. — Extrait de bile purifiée, Peptones de levure (Vitamine B), Extraits intestinaux (Duodénum), Agar-Agar, Ferments lactiques, etc.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes. Constipation des neuro-arthritiques, de la grossesse, des sédentaires. Colites et entérites diverses, Maux de tête, Migraines d'origine intestinale, Maladies cutanées de même origine.

Affections hépato-biliaires, Congestions hépatiques des coloniaux et des gros mangeurs, Ictères, Cirrhoses, Cholécystites, Angiocholites, Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés au repas du soir. A avaler avec un peu d'eau sans croquer.

Prix : 12 fr. 80.

G. RÉAUBOURG et Cie,
Docteur en Pharmacie,
115, rue de Paris,
BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

AGAROL

Traitement rationnel de la constipation.

Composition :

Émulsion parfaitement homogène et stable d'huile de paraffine, *spécialement traitée*, remarquablement pure et de haute viscosité, Agar-Agar, Phénolphthaléine *chimiquement pure*.

Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Très indiqué chez les constipés par atonie intestinale, les malades obligés de garder le lit, les femmes enceintes et les vieillards.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion, ne cause ni nausées ni coliques. Absence complète de suintement. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

De goût agréable naturel, l'Agarol est miscible à tous liquides : lait, eau, sucrée ou non, infusions, potages.

Adultes : Commencer par deux cuillerées à café, le soir, au moment du coucher, et augmenter jusqu'à une cuillerée à soupe (soit quatre cuillerées à café) ou plus ; si c'est nécessaire, répéter la dose le matin en se levant.

Enfants : De une à deux cuillerées à café ou plus, suivant l'âge et selon l'avis du médecin.

Prix : 15 francs le flacon P. M. ;
24 francs le flacon G. M.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

(Tél. : 11-21-41.)

AGOBYL

Formes. — Granulés. Cachets. Dragées.

Composition. — Peptone, Sulfate de magnésie, Camomille.

Posologie :

Granulés : Le matin à jeun, 1 à 2 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau.

Cachets : 2 à 4 cachets le matin à jeun, dans un peu d'eau tiède.

Dragées : 6 à 10 dragées par jour avant les repas.

Indications. — Toutes affections hépatiques, drainage des voies biliaires.

Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.

AGOCALCIUM

Neuro-sédatif de l'enfant.

Composition. — Sirop de framboise composé contenant par cuillerée à café :

Gluconate de calcium	0 gr. 10
Lévulinate de calcium.....	0 gr. 03
Gluconate de magnésium..	0 gr. 05
Chlorure de calcium.....	0 gr. 10
Bromure de calcium.....	0 gr. 10

Indications. — Etats spasmophiles, Convulsions, Décalcification, Rachitisme, Caries dentaires, Fractures, Thérapeutique préopératoire, Hémostatique.

Posologie. — De 2 à 4 cuillerées à café par jour, selon l'âge, et selon avis médical.

Prix : Le flacon : 18 francs.

Enreg. au L. N. C. M. sous le N° 1781-1.

Laboratoires de l'AGOCALCIUM
299, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).
(Tél. Mén. 82-89.)

AGOCHOLINE

Stimulant hépato-biliaire.

Forme.

Granulé soluble aromatisé à la menthe ou sans arôme.

Composition.

Sulfate de Magnésie desséché.

Peptone sèche purifiée.

Propriétés thérapeutiques.

Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires.

Réalise le drainage des voies biliaires *per os* et le rend facile en clientèle.

Indications :

Congestion du foie et de la vésicule biliaire.

Lithiase biliaire.

Ictère et Cholémie.

Cholécystites chroniques.

Certains troubles digestifs.	{	Gastropathies réflexes, Inappétence, Nausées, Constipation.	}	d'origine hépato-biliaire.
Certains troubles généraux.	{	Céphalées, Migraines, Asthénie, Vertiges, Urticaire et Prurit, Certaines dermatoses.		

Contre-Indications (Temporaires).

Cholécystites aiguës.

Diarrhées aiguës.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau chaude.

Enfants : A partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café, suivant l'âge.

N. B. — Il est bon de commencer par les doses faibles et de les augmenter progressivement, suivant la tolérance du malade.

Prix : 19 fr. 75

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie.

Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux.

Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e)

(Tél. : Diderot 28-96.)

AGOMENSINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN HYDROSOLUBLE.

Action physiologique. — Congestionnante de la muqueuse utérine, stimulante de l'ovaire, aide au déclenchement du flux menstruel et favorise l'apparition ou le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Indications :

- I. — Aménorrhée, flux menstruel trop peu abondant, règles trop espacées. Malaises qui précèdent ou qui accompagnent la menstruation.
- II. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec la Sistomensine).
- III. — Douleurs viscérales et malaises généraux liés à un flux peu abondant.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comprimés par 24 heures.

Formuler. — Flacon de 20 comprimés.

— de 40 —

— de 100 —

Boîte de 4 ampoules.

(Voir OVOCYCLINE.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

AGORÉNAL

Indications. — Toutes insuffisances rénales : augmentation sensible de la diurèse, élimination de l'acide urique. Dyspnées. Hypertension, etc.

Aucune contre-indication.

Composition. — Extrait de rein.

Forme. — Ampoules buvables.

Prix : 26 francs la boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, dans de l'eau sucrée, avant le repas.

L. GUÉRET, pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

AGOREXINE

Gentiane, Condurango, Colombo, Simarouba, Camomille romaine, Badiane, muqueuse gastrique.

Toutes les Inappétences.

Posologie. — Flacon contenant 1 000 gouttes, 1/4 d'heure avant les deux principaux repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée :

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : A partir de 1 an : 1 à 2 gouttes par année d'âge.

Prix : 15 francs.

Laboratoires de l'AGOREXINE

37, avenue de la République — PARIS (XI^e)

AGOZYMASE MESSIS

Granulé de saveur aromatique.

Composition. — Sulfate de soude anhydre, Sulfate de Magnésie desséché, Chlorure de magnésium, Peptone purifiée, Extrait de boldo.

Indications :

- 1^o *Maladies des voies biliaires* : Congestion du foie, Cirrhose, Atonie et Stase vésiculaires, Cholécystite.
- 2^o *Maladies gastro-intestinales* : Dyspepsie, Atonie gastrique, Flatulence, Constipation.
- 3^o *Maladies cutanées* : Prurits généralisés et localisés. Urticaires, Eczémas, Prurigos, etc.
- 4^o *Action dérivative intestinale* : Dans l'Hypertension artérielle, les Néphrites chroniques, les Migraines, les Céphalées.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé au réveil dans une infusion chaude ou dans eau de Vichy pendant 10 jours.

A renouveler après 5 jours de repos.

Prix : 17 fr. 70.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue République — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : 16.)

AIGUE D'OR

Analga du D^r Redier.

Composition:

Diméthyle amido-antipyrine.....	0,25	} pour un verre à liqueur.
Salicylate de pyramidon.....	0,25	
Héroïne.....	0,001	
Plantes sédatives	Q. S.	

Propriétés. — Action thérapeutique du Diméthyle amido-antipyrine et du Salicylate de Pyramidon *considérablement renforcée* par la dose minime d'Héroïne. L'action tonique de l'alcool corrige l'action déprimante des calmants.

Indications. — Névralgies, Migraines, *Dysménorrhées*, *Tranchées utérines*, Douleurs dentaires, Coliques néphrétiques, *Gripes*.

Posologie. — 1 verre à liqueur renouvelé, si nécessaire. 1/2 heure après
Efficacité plus grande dans une tasse d'infusion.

Enfants: 1/2 ou 1/4 de dose, selon âge.

Sans contre-indication.

Présentation. — Liqueur agréable.

Le flacon de 6 doses : 16 francs.

Laboratoire de L'AIGUE D'OR

53 bis, boulevard de la Liberté — LILLE (Nord)

(Tél. : 5-45.)

AIROGLYCE

Composition. — Préparation bismuthée (oxyiodogallate de bismuth spécialement porphyrisée).

Mode d'action. — Réalise le pansement et l'antiseptisme de la muqueuse urétrale.

Indications. — Blennorrhagie aiguë. Blennorrhagie chronique, en association avec dilatation, massages, etc.

Mode d'emploi. — Après avoir uriné, agiter le flacon et injecter, à l'aide d'une seringue urétrale, 5 cc. de liquide, conserver l'injection 2 minutes, puis progressivement jusqu'à 5 minutes. Eviter d'uriner autant que possible après l'injection.

Injection 28 francs.

Ovules : Agent thérapeutique de choix dans le traitement des métrites, vaginites, ulcérations du col, etc.

Suppositaires : Prostatites. Hémorroïdes.

Prix : Ovules : 19 francs. — Supposit. : 16 francs.

Laboratoires **PIALOUX**

55, rue de Chabrol — PARIS (X^e). Tél. : Prov. 10-51

AKÉSOL MUZI

Spécifique de la douleur. Antithermique.

**Rhumatisme. Sciatique. Règles douloureuses
Migraines. Grippe.**

Cachets de valériamidoquinine caféinée :

Phénacétine	0,20
Pyramidon.....	0,10
Sulfate de quinine (essai physiolo- gique)	0,15
Caféine (essai physiologique).....	0,05
Valérianate de zinc.....	0,05
Poudre de cannelle.....	0,05
Bicarbonate de soude.....	0,20
pour 1 cachet.	

2 à 3 cachets par jour au moment des repas dans
1/2 verre d'eau, ou mieux une infusion chaude.
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1750-3.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.)

ALBU-COLI

Adopté par le Ministère de la Marine.

A base d'extrait de feuilles de **BIGUIGNAN**
(*Psiloxylon Mauritianum* D. Th.) (1)

Antiseptique, Diurétique, Décongestif.

Granulé de saveur agréable.

La boîte de 20 doses : 24 fr. 50.

Comprimés.

La boîte de 60 dragées : 23 fr. 50.

Apozème de **Biguignan**.

10 jours de traitement : 19 fr. 25.

Principales indications :

Albuminuries, Colibacillose, Bactériuries, Lithiase rénale, Pyélo-Néphrites, Mal de Bright, Cystites, Prostatites, Urétrites, Hypertrophie de la prostate, Affections gonococciques, Manifestations de l'Arthritisme et de l'Artério-Sclérose.

Absence de toxicité : Tolérance absolue, goût agréable.

Posologie :

Granulé : 2 cuillerées à café trois fois par jour en dilution dans un demi-verre d'eau (entre les repas).

Comprimés : 1 à 2 comprimés à chacun des trois repas.

Apozème : 1 cuillerée à dessert de plante pure dans 1 litre d'eau bouillante. Réduire au 1/2 litre. Prendre en trois fois 3/4 d'heure avant les repas.

Cette posologie peut être doublée selon avis du médecin (en particulier dans la *Colibacillose*).

Laboratoires ALBU-COLI

E. LEMONNIER, Pharmacien.

84, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).
(Tél.: Jasmin 58-67).

(1) H. Leclerc, *Presse Médicale*, 15 mai 1937; *Revue de Phytothérapie*, juillet 1937, février 1939.

ALBURÉNOL

Spécifique des maladies des Voies urinaires.

Composition. — A base d'extrait de kawa-kawa, de Barbiflore, de Stigmates de maïs, de Douce-amère et de Saponaire.

Indications. — Albuminurie sous toutes ses formes, Œdèmes, Néphrite, Pyélonéphrite, Urémie, Mal de Bright, Cystite, Colibacillose, Prostatite, Lithiase, Albuminurie gravidique.
Ne contient pas de produits chimiques.

Aucune contre-indication.

Liqueur agréable à absorber.

Le flacon de 250 gr. : 17 fr. 80.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

ALCACHOL

Granulé effervescent.

Composition :

Extrait d'Artichaut	5 gr.
Sulfate de Soude.....	8 gr.
Citrate de Soude	6 gr.
Phosphate de Soude.....	7 gr.
Bicarbonate de Soude	10 gr.
Granulé effervescent. Q. S. p ..	100 gr.

Indications. — Insuffisance hépatique, Cholécystite, Ictère catarrhal, Intoxication alimentaire, Urticaire, Gastralgie, Hyperchlorydrie, Entérite.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café avant les deux principaux repas, ou deux cuillerées à café le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau. Ces doses sont variables et peuvent être modifiées par le Médecin traitant.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires COMBEFREYROUX

134, avenue Parmentier.

(Tél. : Ober. 51-10.)

ALCACYL WANDER

Composition. — Acétylsalicylate de calcium 0,50, alucol 0,4 pour un comprimé.

Sans action sur l'estomac, le cœur et les reins.

Forme. — Comprimés.

Indications. — Analgésique, antithermique, anti-infectieux, sudorifique.

Est utilisé dans : rhumatismes, névralgies, migraines, sciaticques, lumbagos, courbatures, gripes, maux de tête, de gorge et de dents.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés désagregés dans un peu d'eau sucrée, avaler ensuite un demi-verre d'eau pour activer l'effet.

A répéter si nécessaire 3 à 4 fois dans les 24 heures.

Enfants : 1/4 ou 1/2 comprimé, suivant l'âge, 3 à 4 fois par jour.

P. BASTIEN, pharmacien
CHAMPIGNY-SUR-MARNE.
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

ALCALINOSE

Composition. — Citrate, Phosphate, Sulfate de sodium desséchés et chimiquement purs, Bicarbonate de sodium saturé.

Action. — L'ALCALINOSE fait diminuer le taux de l'acidité gastrique sans le faire disparaître ; régularise les sécrétions digestives ; excite la motricité de l'estomac et diminue la durée de transit gastrique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées mesure avant les repas dans 1/2 verre d'eau, ou 2 à 3 cuillerées mesure le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau.

Traitement pour 15 jours.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques et maladies de Reichmann, Ulcères digestifs, Sténoses pyloriques, Suites de gastro-entérostomie et de pylorectomie, Aérophagie et Dilatation gastrique, Gastropathies nerveuses, Entérites et Colites chroniques, Acidose.

Prix : Poudre 8 fr. 50 Granulé 10 fr. 50 (10 jours).

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

ALCALISALYL

Association de salicylate et de bicarbonate de soude.

Granulé effervescent.

Composition. — Chaque mesure dissoute représente :

Salicylate de soude.....	1 gramme
Bicarbonate de soude.....	1 —

Comprimés glutinisés.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Salicylate de soude.....	0 gr. 40
Bicarbonate de soude.....	0 gr. 15

Avantages. — Antiacidosique grâce au bicarbonate et bien toléré par l'estomac.

Mode d'emploi. — Une mesure dissoute dans un demi-verre d'eau sucrée de 3 à 10 fois et plus par jour. Ou de 5 à 20 comprimés par jour.

Prix : La boîte de granulé — 31 mesures : 22 francs. L'étui de 30 comprimés : 20 francs.

Ampoules pour injection I. V.

Composition. — Solution contenant 1 gramme de salicylate de soude dans 10 cc. de sérum glucosé à 10 p. 100.

Avantages. — Avec cette solution, dont le pH constant est très voisin du pH sanguin, la sclérose de l'endovéine ne se produit pratiquement pas.

Indications. — Maladie de Bouillaud, Rhumatismes infectieux et chroniques. Encéphalites et séquelles. Chorée, Sclérose en plaques, etc.

Prix }	La boîte de 3 ampoules de 10 cc.....	11 fr. 50
	— 6 ampoules de 10 cc.....	19 fr. 50
	— 3 ampoules de 20 cc.....	14 fr. 50
	— 6 ampoules de 20 cc.....	25 fr.

Laboratoires GATEL-LÉGER

35 et 37, rue Joinville — LAVAL (Mayenne).

ALDINE

(Contre toutes algies.)

Calmant efficace de la douleur, effet immédiat. Stimulant du système nerveux dans les états dépressifs.

Présentation. — Sous forme rationnelle d'un élixir agréable à prendre, sans pouvoir offensif sur l'estomac, l'ALDINE est une ingénieuse composition fondée sur les sédatifs les plus fidèlement victorieux de l'élément douleur associés à un stimulant général.

Indications. — Gripes, migraines, toutes névralgies, règles douloureuses, etc...

Posologie. — Médicament destiné aux adultes.

Une cuillerée à soupe pure ou dans un peu d'eau.

Par jour : de 2 à 4 cuillerées.

Prix : 12 fr. 50 le flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le numéro 339-6.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 12-63.

ALEPSAL (Comprimés)

Calmant non déprimant.

Grâce à l'association Phényléthylmalonylurée, belladone et caféine, l'ALEPSAL (0,10) supprime les crises convulsives et les équivalents, fait disparaître les troubles du caractère sans exercer aucune action défavorable ni sur l'intelligence ni sur la mémoire. — Toujours bien supporté et sans accoutumance.

3 Dosages : 1^o Comprimés à 10 ctg. de Phényléthylmalonylurée.
2^o Comprimés à 5 ctg. de Phényléthylmalonylurée.
3^o Comprimés à 1 ctg. 1/2 ou doses fractionnées.

Indications. — (Comp. à 0,10): Epilepsie, Insomnies rebelles. — (Petits dosages): Etats anxieux, Troubles neuro-cardiaques, Angine de poitrine, Troubles nerveux chez les enfants, Coqueluche.

Posologie. — Epilepsie, Adultes: Débuter par 2 ou 3 comprimés par jour (dosage à 0,10). Se rappeler que les doses initiales doivent être continuées très longtemps sans changements ni interruptions, et qu'en cas de diminution dans les doses on devra procéder très lentement et par paliers successifs. Doses maxima des comprimés à 1 cgr. 1/2. Enfants: 6 mois: 2 comp. — 1 an: 3 comp. par 24 h.; — 5 à 6 ans: 7 comprimés; — Espacer les doses.

Bibliographie. — Communication à la Société Médico-Psychologique de Paris (1921). Thèse Dr Labarthe (1926). — Dr Rodiet, Médecin-chef des Asiles (Traitement de l'Epilepsie 1927). Professeur de Pathologie G. Ferrua de Turin. Précis Clinique de l'Epilepsie (1931).

Prix: 9 fr. 55 et 8 fr. 50.

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché, à NEUILLY (SEINE). (Tel. Mai. 17-77.)

ALEXIME

(Anolennement Alexine.)

Composition. — Formule et procédé du Laboratoire Joulie. Acide phosphorique libre associé au phosphate de fer et de manganèse.

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, combat l'hypoacidité humorale, contribue à la reminéralisation.

Indications. — Anémie, asthénie, chlorose, neurasthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescence, prébacillose, phosphaturie, prétuberculose, déminéralisation, hypo-acidité, arthritisme, fatigues physiques ou nerveuses, rachitisme, etc.

Présentation. — Granulé rose de goût agréable.

Posologie. — Adultes et enfants de plus de 5 ans: 1 ou 2 cuillerées à café avant ou après les deux principaux repas dans un 1/2 verre d'eau sucrée ou non. Enfants de 2 à 5 ans: 1/2 cuillerée à café à chaque repas.

Prix: le flacon, 16 fr. 55.

Laboratoires de l'ALEXIME

Ch. PLAZENET, Pharmacien,

8, rue Riblette — PARIS (XX^e).

(Tél.: Roquette 36-36 et 36-37.)

ALGANE

Cytoplasma de Laminaria Flexicaulis déminéralisé par un procédé spécial qui respecte les principes de cette Algue. C'est l'origine de la partie active de l'huile de foie de morue.

Composition. — L'Algane agit :

- 1° Par son iode lié à la matière organique (2 mgr. par gr.).
- 2° Par ses traces catalytiques d'éléments minéraux (As, Mn, Mg, Fe, etc.)
- 3° Par ses graisses, ses protéines et hydrates de carbone qu'en font un puissant suraliment.
- 4° Et surtout par sa haute teneur en vitamines naturelles A et D (sous forme d'algostérine, pigments carotinoïdes, fucoxanthiques et chlorophylliens).

Action. — Celle de l'huile de foie de morue, mais singulièrement exaltée et plus complète, en raison de sa plus grande richesse en vitamines A. Résultats plus constants, le produit étant soumis à un contrôle biologique.

Les deux plus remarquables actions de l'Algane consistent :

- 1° En une augmentation rapide de poids ;
- 2° En l'accroissement du pouvoir anti-infectieux de l'organisme.

Présentation

- 1° Cachets dosés à 1 gr. 25
- 2° Granulés fondants renfermant 0 gr. 50 de poudre par cuillerée à café

Posologie. — Chaque cachet correspond à 125 unités de vitamines D et 150 unités de vitamines A. Un cachet représente la quantité de vitamines D d'une cuillerée à soupe d'une bonne huile de foie de morue et la quantité de vitamines A de 3 cuillerées à soupe.

Adultes : 4 cachets par jour au minimum (2 au début de chaque repas).

Enfants : jusqu'à 15 ans, 1 à 2 cachets par jour ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés. Ces doses peuvent être augmentées sans inconvénient.

Administration du granulé. — Le granulé peut être absorbé directement comme une friandise : on le croque, puis on l'avale en s'aidant d'une gorgée d'un liquide quelconque. On peut également le dissoudre au préalable dans une petite quantité d'eau ou de lait.

Nota. — L'Algane en granulé possède un goût difficilement perceptible. Chez les sujets constipés, le mucilage contenu dans le produit provoque un effet laxatif qui ne peut être que bienfaisant.

Prix de la boîte (cachets ou granulés) : 16 fr 65.

Durée moyenne de la boîte : 10 jours

N° d'autorisation au L. N. C. : cachets, 994-1 ; granulés, 994-2.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

Tél. : Pereire 14-08.)

ALGÉON

Comprimés anti-rhumatismaux. Antalgiques.

Composition. — Chaque comprimé renferme 0 gr. 25 de Phénylsemicarbazide et d'Acide acétylsalicylique et 0 gr. 05 d'Amide acétique du para-amino-phénol.

Propriétés. — Efficacité remarquable contre les syndrômes douloureux de toutes sortes, et notamment contre les algies rhumatismales. Soulagement appréciable et rapide.

Indications. — Rhumatismes, Sciatique, Douleurs musculaires ou articulaires, Goutte.

Névralgies intercostales, lombaires, oculaires, auriculaires, cervicales, faciales, maxillaires, etc...

Courbature fébrile, Grippe, Migraines rebelles, et chaque fois qu'il faut calmer un phénomène douloureux sans recourir aux héroïques.

Mode d'emploi. — De 2 à 6 comprimés par 24 heures. Puis diminuer.

Prix : 19 fr. 10 (taxe d'armement comprise).

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoire ÉON
à DINAN (Côtes-du-Nord).

ALGIPAN MIDY

Boîte de 6 ampoules pour injections intradermiques.

Composition :

Bichlorhydrate d'Histamine..... 0 gr. 000125

Monochlorhydrate d'Histidine 0 gr. 040

Pour une ampoule de 1 cc. en équilibre ionique stabilisé.

**ASOCIATION ANTIALGIQUE RÉVULSIVE
NEUROTROPE**

Dose et mode d'emploi. — Infiltration intradermique dans la zone de projection cutanée de la douleur, une séance tous les jours ou tous les 2 jours.

Indications. — Névralgies, Myalgies, Arthralgies, Algies viscérales, Douleurs de l'angine de poitrine, Crises solaires, Coliques hépatiques, Coliques néphrétiques, Douleurs d'origine ulcéreuse, Spasmes douloureux des artérites, Maladie de Raynaud, Etats anaphylactiques (asthme, urticaire, œdème de Quincke, rhume des foies).

Chaque boîte contient une aiguille spéciale pour injection intradermique.

Prix : 26 fr. 10. **Durée du traitement : 8 à 15 jours.**

Laboratoires MIDY
67, avenue de Wagram, — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

ALGOOCRATINE

(Phenylamidoxanthine.)

Présentation. — Cachets de 0 gr. 75 (assimilation rapide).

Suppositoires : même dosage que les cachets.

Produit de prescription médicale.

Ne contient aucun hypnotique.

Indications thérapeutiques. — Migraines, névralgies, sciaticques, grippe, algies cancéreuses. En général, toute douleur d'origine nerveuse. Recommandée particulièrement dans les *régles douloureuses*.

Aucune action hypnotique. Pas d'accoutumance. Elimination extrêmement rapide sans fatigue des reins. Tolérée parfaitement par l'estomac.

Posologie. — Un cachet dès l'apparition des douleurs, un second une heure après si nécessaire. Trois cachets par 24 heures.

Suppositoires : Même posologie que les cachets.

Prix : Le tube : 8 fr. 75 ; la boîte de 25 cachets : 23 fr. 25 ; suppositoires : 13 fr. 75.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 17-46.)

ALGOÏL DU D^r GUIRAUD

Liniment Histaminé.

(Excipient spécial.)

Indications. — Toutes *manifestations douloureuses articulaires, musculaires ou nerveuses. Cellulite.*

Favorise la résolution rapide des *fluxions* et *œdèmes*, notamment dans les *rhumatismes*.

Action thérapeutique. — *L'excipient spécial d'Algoïl, solvant les lipides, permet de faire pénétrer rapidement dans le derme des substances telles que l'histamine, dont les propriétés antalgiques ou vaso-actives réalisent loco dolenti une thérapeutique des plus active de l'influx douloureux.*

Composition. — Histamine, trichlorométhane, ester amylosalicylique, terpènes, capsicine, hydrocarbures oléo-schisteux.

Mode d'emploi. — Étendre Algoïl sur la région douloureuse, faire une légère friction et recouvrir d'un panserment ouaté.

Prix : 16 fr. 40.

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PERIGUEUX.

(Tél. : 4-43.)

ALGONAL

Traitement des affections rhumatismales,
Arthrite, Goutte, Poly-arthrite.

En capsules kératinisées à base de iodure de lithium, Essence de Salicylate de Méthyle pur et désodorisé, Colchicine et Urotropine.

Mode d'emploi :

3 capsules le matin avant le petit déjeuner et 2 le soir avant le dîner.

Prix : 20 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 10-23.)

ALGOPHAGINE

Capsules glutinisées contenant 1/10 de milligramme de colchicine dans l'essence de Gaulthéria pure associée à: iodure de lithium et formine.

Indications :

Médication intensive pour le traitement raisonné des Affections rhumatismales de toute nature. Névralgie faciale.

Posologie :

Trois capsules le matin avant le premier déjeuner et deux le soir avant le dîner, accompagnées d'un verre d'eau bicarbonatée (Vals, Vichy), ou hypominéralisée (Vittel, Evian).

Prix : 22 francs.

Compléter le traitement avec le *Baume Algopha*.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

ALIBOURINE B. E. A.

Forme :

Pommade en tube de 50 grammes environ.

Composition :

Sulfates de zinc et de cuivre chimiquement purs, Camphre, Oxyde de zinc, Essence de Niaouli, Extrait d'Hamamélis et de Millepertuis, Lano-vaseline.

Indications :

Eczémas suintants, *Impétigo*, Teigne, Plaies, Ulcères variqueux, Érysipèle, Brûlures, Engelures.

Laboratoires B. E. A.

Ch. BEHA, Pharmacien de 1^{re} classe —
BELFORT.

ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY

à base de Farines d'Avoine sélectionnées.

Préparation journalière. Pas de stock. Livraisons et expéditions immédiates, directement ou par pharmaciens, herboristes et maisons de produits de régime.

Obtenus exclusivement de produits frais convenablement dosés d'après leur composition exacte et de manière à assurer l'équilibre digestif-nutritif indispensable aux malades, débiles ou délicats des voies digestives.

SUPRAVÈNA. *Vanillé* : Parfait aliment du 1^{er} âge. Antidiarrhéique sans blocage, notamment des Nourrissons à partir du 3^e mois. Augmente rapidement la tolérance de l'organisme dyspeptique pour le lait. En usage dans les Hôpitaux.

ALIMAVÈNA. *Au Cacao spécial* : Admirablement toléré par nombreux hépatiques. Ne constipe pas. Aliment de l'enfance. Le plus parfait des petits déjeuners des Enfants, Vieillards, Convalescents, Nourrices, Amaigris, Nerveux, etc. En usage dans les Hôpitaux.

BOVAVÈNA. *Carné* : Exquis potage à la Poudre de Viande, apéritif, digestif, tonique. En usage dans les Hôpitaux.

Littérature et échantillons :

ALIMENTS ÉQUILIBRÉS JOLY
BOURG-LA-REINE (Seine).

ALIMENT TINARDON

Nutrition. — Recalcification. — Reminéralisation.

Médication calcico-magnésienne, dont la présentation agréable, en bouillies ou entremets, en facilite l'administration aux sujets affaiblis et atteints d'inappétence.

Composition :

Carbonate de chaux .	0,33	Lactose	1,50.
Phosphate de chaux.	0 20	Arrow-Root	3,80.
Glycéroph. de chaux.	0,06	Sucra	14,60.
Magnésie	0,05	Cacao vanillé	11,60.
Eléments complets céréalo-légumineux.	1,50		

Pour 2 mesures.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 2 mesures par jour.

Adultes : 2, 3 ou 4 mesures par jour.

Indications. — Dégénérescence infantile, Scrofule.
Convalescence chez l'enfant et l'adulte.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX°).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

ALLAUROL LUMIÈRE

Dentifrice scientifique, à base d'or, en combinaison sulfo-organique.

Traitement hygiénique, préventif et curatif des Maladies de la Bouche et des Dents.

L'AllauroL Lumière contient un sel d'or nouveau : Le Thio-propa-nol sulfonate doublé d'or et de calcium.

Ce sel d'or est un antiseptique tout particulièrement actif à l'égard des microbes spirillaires, grands responsables des affections de la bouche et des dents.

— L'AllauroL Lumière présente une totale innocuité.

— Il n'est ni caustique, ni toxique, ni irritant.

— L'AllauroL Lumière est capable, non seulement d'exercer l'hygiène indispensable, mais aussi de prévenir et de guérir les affections bucco-dentaires, au premier rang desquelles il faut citer : les caries dentaires et les paradentoses (Pyorrhée alvéolo-dentaire).

L'AllauroL Lumière est le dentifrice de choix pour l'hygiène préventive de la bouche chez les personnes bien portantes. Mais il s'impose chez l'arthritique, victime désignée des troubles paradentosiques, et chez les nombreuses personnes qui présentent des états inflammatoires ou des suppurations — aiguës ou chroniques — au niveau des alvéoles dentaires.

Mode d'emploi :

1° **Brossage** comme avec tout dentifrice (chez les sujets aux dents parfaitement saines). Brossage auquel il faut ajouter :

2° **Massage** des gencives avec le doigt imprégné d'AllauroL Lumière chez les personnes qui ont une tendance à la carie dentaire ou à toutes affections des gencives).

Chez les personnes atteintes d'infection, l'usage de l'AllauroL Lumière doit être complété par celui de la Dento-chry-sine Lumière, médication active de la Pyorrhée alvéolo-dentaire.

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON

ALLERGANTYL MILUC

Modificateur du terrain humoral

SOLUTION INTERNE. — Rate. Bardane.

Indications thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre nor, mal du système endocrino-sympathique : Furunculose-Eczémas (adultes et nourrissons), Allergies cutanées, etc.

Furunculose. — *Fortes doses indispensables* : 3 cuillerées à soupe par jour et plus, suivant les cas.

Dermatoses. — *Doses faibles, mais prolongées.* 2 cuillerées à dessert par jour (20 jours par mois).

Demi-dose pour enfants.

2 demi-cuillerées à café pour nourrissons de 4 mois.

Chaque cuillerée dans 1/2 verre d'eau, 1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 22 fr. 50.

POMMADE. — Noyer, Consoude, Allantoïne.

Cicatrisant : Plaies, Brûlures.

Pour la *Furunculose* et les *Dermatoses*, le traitement par la pommade est à utiliser quelques jours après le début de la cure interne et tout en continuant l'*Allergantyl Solution*.

Prix : 12 fr. 20

Laboratoires MILUC, L. Ragoucy, Pharmacien
2, r. Joseph-Bara — PARIS (VI^e). (Tél. : Odéon 02-53.)

ALLERGINE

Extrait bacillaire
obtenu par la méthode de Jousset.

Composition. — Extrait bacillaire (permettant une vaccinothérapie d'une grande efficacité dans les indications favorables).

Indications. — Presque toutes les *tuberculoses*, quelles que soient leurs localisations et leurs formes cliniques, aiguës ou chroniques, pourvu qu'elles soient reconnues et traitées de bonne heure. Les *tuberculoses aiguës initiales* guérissent de façon remarquable quand elles sont soignées dès le début de leur évolution. Dans les *tuberculoses chroniques*, ne prescrire l'Allergine que si la cuti-réaction est franchement positive.

En outre, la vaccinothérapie par l'Allergine est le complément indispensable de la sérothérapie antibacillaire, pour consolider les résultats de cette dernière.

Contre-indications. — Ancienneté des lésions (et surtout mauvais état général, cachexie, température irrégulière, anarchique ; fièvre hectique. Maladie d'Addison).

La granulie aiguë et la méningite tuberculeuse ne doivent pas être considérées comme des indications de l'Allergine.

Posologie. — L'Allergine est présentée en deux concentrations : *solution normale*, en ampoules de verre jaune contenant 1 milligramme par cc. ; ampoules d'un 1/2 cc. dans la boîte n° 1 et d'un cc. dans la boîte n° 2 ; *solution concentrée*, en ampoules de verre bleu contenant 5 milligrammes par cc. : ampoules de 1 cc. dans la boîte n° 3 et de 5 cc. dans la boîte n° 4.

Le traitement doit être longtemps poursuivi : injections hypodermiques à doses progressives ; progression basée sur les réactions fébriles qui vont en s'atténuant. Doses très faibles au début : 1/20 à 1/10 de cc. de la solution normale, de plus en plus élevées dans la suite. L'espacement des injections, de quatre à cinq jours tout d'abord, est rapidement d'une semaine et atteint 10, 15, 20 jours et plus lorsqu'on utilise la solution concentrée, qui doit être injectée assez profondément. En cas de rechute fébrile au cours du traitement, prescrire la sérothérapie antibacillaire (Sérum de Jousset) et reprendre la vaccinothérapie par l'Allergine dix jours après la dernière injection de sérum ou les accidents sériques.

Demander la notice détaillée.

Dépôtaires généraux :
Laboratoires d'Analyses BRÉANT

11, rue de Clichy — PARIS.
(Tél. : Trinité 23-84.)

ALLIOCAR ou ALLIOCARDIA

Composition. — Allium sativum, Cratægus, Camphora, Eucalyptol, Spartéine.

Propriétés thérapeutiques. — *Cardiotonique. Régularise la tension artérielle.* Calme les palpitations, l'angoisse, la dyspnée nerveuse, l'asthme. Action antiseptique sur les sécrétions pulmonaires.

Indications. — *Tous états pathologiques associant cœur et poumon :* Hypertension, Sclérose rénale, Bronchites fétides, Coqueluche, Asthme.

Non toxique, sans odeur, pas d'accoutumance, pas de contre-indication.

Présentation. — Pilules glutinisées : 6 à 10 par jour prises par trois ou quatre avant les repas ou dans leur intervalle.

Enfants au-dessous de 5 ans : demi-dose.

Étui de 80 Pilules.

Laboratoire BERGER,
14, rue des Pyramides — PARIS.

ALLIODOSE

Forme. — Gouttes.

Composition. — Urotropine, iode peptonisé, extrait d'ail (en association synergique).

Indications. — Toutes affections dues à des troubles de l'élimination des déchets organiques constituant les états arthritiques et des troubles de l'hypertension artérielle : artérosclérose, hypertension des arthritiques, goutte, rhumatismes chroniques, lithiases, obésité, migraines, asthme et emphysème pulmonaires, tuberculose osseuse et ganglionnaire.

Posologie. — *Adultes :* XXX à L gouttes au début des deux repas principaux dans une gorgée d'eau.

Enfants : X à XXX gouttes.

Prix : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER
Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

ALLISATINE

Composition. — Tous les principes actifs de l'*Allium Sativum* fixés sur du charbon activé et présentés en dragées, *inodores*, insipides.

Propriétés. — Stimulant des fonctions gastriques, puissant antidiarrhéique. Hypotenseur. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 4 dragées d'Allisatine, trois fois par jour, à la fin des repas.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

ALLIUM COIRRE

(Marque Stasima)

Composition. — Préparation stabilisée, contenant tous les principes de l'ail cru.

Deux formes : Alcoolature et Pilules (une pilule correspond à environ X gouttes d'alcoolature).

Action. — Au point de vue *circulatoire* :

Abaisse la tension artérielle en augmentant l'indice oscillométrique; l'allium est de plus cardiotonique (XXX gouttes en 2 fois).

Dans l'*Hypertension* : 2 jours de traitements, 2 jours de repos et ainsi de suite pendant 15 jours.

Au point de vue *antiseptique* :

Antiseptique pulmonaire (alcoolature), 50 gouttes P. J. en 2 fois. Antiseptique intestinal (pilules), 4 à 8 pilules P. J. en 2 fois.

Au point de vue *général* :

Reconstituant général et antisccléreux, 4 à 8 P. J. en 2 fois.

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard Montparnasse — PARIS.

(Tél. : Ségur 02-79.)

ALLOCAÏNE LUMIÈRE

Anesthésie locale, régionale et rachidienne.

Constitution. — (Chlorhydrate de paramino-benzoyl-diéthyl-a-nino-éthanol).

Les solutions allocaïne-adrénaline sont d'une conservation parfaite et rigoureusement inaltérable. Elles présentent des garanties exceptionnelles d'efficacité et d'asepsie.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique équivalent à celui de la cocaïne. Toxicité 7 fois moindre. Durée de l'anesthésie nettement supérieure. Nullement irritante pour les tissus, son administration laisse intacte les centres bulbaires. Aucune modification de la nutrition générale et des tissus.

L'anesthésie rachidienne obtenue est caractérisée par l'intégrité qu'elle laisse aux centres nerveux supérieurs (excitabilité réflexe cérébrale ; fonctions intellectuelles).

Indications. — Les mêmes que pour la cocaïne. L'Allocaïne Lumière est mise dans le commerce sous la forme d'ampoules prêtes à l'emploi aux titrages suivants :

Solution A à 1/2 p. 100, pour anesthésie locale 1 a. 25 cc.

Solution AA à 1 p. 100, pour anesthésie locale 3 a. 10 cc.

Solution B à 2 p. 100, pour anesthésie régionale 6 a. 2 cc.

Solution BB à 2 p. 100, pour art dentaire 100 a. à 1 cc.

Solution C. à 5 p. 100, pour rachianesthésie 6 a. à 3 cc.

Solution J. à 10 p. 100, pour badigeonnage usage externe et divers 5 a. à 2 cc.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLOCHRYSSINE LUMIÈRE

L'or en combinaison sulfo-organique
par la voie intramusculaire.

Adoptée par l'Assistance publique, inscrite au tarif
de l'A. G.

L'Allochrysine Lumière (thiopropanol sulfonate double d'or et de sodium) est un composé dans lequel le métal est lié directement au soufre et dont la deuxième valence est occupée par un radical organique.

30 p. 100 d'or métallique.

Cette préparation (solution aqueuse), injectée sous la peau ou dans les muscles, s'absorbe facilement. Sa parfaite innocuité facilite un emploi large de la chrysothérapie.

Pas de contre-indications formelles ; cependant agir avec prudence dans les insuffisances hépatiques profondes, les lésions rénales, les lésions intestinales. Dans les cas très rares de troubles anaphylactoides, la substitution au solvant spécial d'une ampoule d'**Emgé Lumière** en évite le retour.

Indications :

Tuberculose (pulmonaire et externe), **Rhumatisme** chronique infectieux, **Syndromes infectieux divers**.

Formuler :

Une boîte d'**Allochrysine Lumière**, contenant deux ampoules pour une préparation extemporanée de la solution :

Une ampoule de 2 cc. d'**Allochrysine Lumière**,
Une ampoule de 8 cc. de sérum artificiel.

Il existe trois dosages : 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 20.
Bien spécifier le dosage désiré.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Débuter, pour tâter la susceptibilité du malade, par une ampoule de 0 gr. 05 ; continuer par injections de 0 gr. 10, puis 0 gr. 20. Une à deux injections par semaine jusqu'à dose totale, moyenne de 3 à 5 grammes.

Rhumatisme. — Débuter, pour tâter la susceptibilité, par 0 gr. 05, une injection tous les cinq jours ; continuer par une injection tous les 5 jours à 0 gr. 10, jusqu'à imprégnation moyenne de 3 gr. Employer, dans quelques cas, la dose de 0 gr. 20, à raison de une par semaine.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

ALLONAL « ROCHE »

ANALGÉSIQUE RENFORCÉ

Action thérapeutique. — L'Allonal Roche est l'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine; il représente les propriétés calmantes bien connues de la diméthylamino-antipyrine augmentées des propriétés sédatives et hypnotiques de l'acide isopropylallylbarbiturique.

Indications thérapeutiques. — Douleurs, abcès, névralgies empêchant le sommeil; insomnies légères ou tenaces associées à des phénomènes douloureux ou infectieux ou causées par le surmenage, la fatigue, la neurasthénie; agitation, excitation, délires, etc.

Avantages. — L'Allonal Roche ne contient ni opium, ni morphine, ni scopolamine, ni hyoscine, ni aucune substance du tableau B. Il peut être utilisé avec succès dans un grand nombre de cas où l'opium et la morphine sont indiqués. Il n'est pas toxique aux doses thérapeutiques qui peuvent être d'ailleurs largement dépassées; il ne donne pas lieu à des phénomènes d'accoutumance et il est toujours bien supporté; il calme la douleur, apaise l'excitation, donne un sommeil calme, physiologique, suivi d'un réveil normal; il n'a aucune action nocive ni sur le cœur, ni sur les reins, ni sur les poumons.

Comprimés.

Chaque flacon contient 12 comprimés. Chaque compr. = 0 g. 16 d'isopropylallylbarbiturate de diméthylamino-antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 comprimés par 24 h. et plus selon les cas. Avaler les comprimés sans les croquer, avec un peu d'eau ou de tisane, $\frac{1}{2}$ h. av. ou 2 h. après les prises d'aliments.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-5.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

ALLOPHA-QUINA

Le cachet analgésique rationnel.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 223-3.

Allophanate de benzyle	10 cgr.
Diméthylaminoantipyrine	30 —
Poudre de quinquina	10 —

Mécanisme d'action. — L'Allophanate (éther cristallisé, pur et stable) donne, par hydrolyse « in vivo », de l'alcool de benzyle dont les propriétés antispasmodiques sont bien connues et, par dédoublement, de l'urée naissante capable d'entretenir la perméabilité rénale pendant qu'agit, cette fois, sans brutalité, la diméthylaminoantipyrine.

Toutes les algies. — Articulaires, musculaires, nerveuses : 1 à 3 cachets par jour.

Fièvre-Grippe.

3 cachets à répartir dans les 24 heures.

Boîte de 12 cachets : Prix : 12 francs.

Laboratoire du Jécol

3, rue Watteau — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-36.)

ALOÏNE HOUDÉ

Granules titrés à 4 centigrammes.

Aloïne Houdé

Glucoside cristallisé de l'aloès des Barbades.

Indications :

Dyspepsies atoniques ou hypotoniques.

Constipation droite ou gauche.

Syndrome entéro-hépatique, *leïasthénie*.

Doses et mode d'emploi :

Comme stomachique :

1 granule par jour.

Comme laxatif :

1 à 2 granules le soir au repas.

Comme purgatif :

3 à 4 granules le soir en se couchant.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.

Pâte poreuse, stable, non grasse.

Ne présente pas les inconvénients des pommades à base de corps gras ou de vaseline souvent mal tolérés.

Ne tache pas le linge.

S'enlève facilement.

Répond à une classique formule de l'Hôpital Saint-Louis.

Indications. — Érythèmes fessiers des nourrissons, érythèmes intertrigo, rougeurs. Eczémas aigus et subaigus, eczémas suintants, coups de soleil, engelures, prévention des escarres, eczématisation des plaies, prurit, etc. Dermites irritables, dermites artificielles, eczémas des blanchisseuses et des laveuses, etc.

Mode d'emploi. — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Il existe également une poudre d'*Aloplastine*.

ALOPLASTINE ICHTHYOLÉE

Pâte à l'eau renfermant 5 p. 100 d'Ichthyol.

Présente les avantages de l'*Aloplastine* simple (absence de vaseline et de corps gras, pâte poreuse, facile à enlever), à laquelle s'ajoute l'action réductrice et kératoplastique de l'Ichthyol.

Indications. — Toutes celles de l'Ichthyol : Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermo-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures, Ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Étendre en couche mince sur la peau. Recouvrir ou non de gaze.

S'enlève à l'eau bouillie ou à l'huile d'amandes douces ou de paraffine.

Laboratoires Biologiques de l'ILE-DE-FRANCE

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e)

ALOYSINE

Pilules à base de suc d'ail.

Sans saveur, sans odeur, ne communiquant à l'haleine aucune odeur alliagée.

Indications. — Entérites, Hypertension artérielle, Tuberculose, Bronchites chroniques, Catarrhes, Gangrène pulmonaire, Urticaire.

Posologie. — 6 à 8 pilules par jour (dans le traitement de l'hypertension, interrompre 48 heures tous les 2 jours).

Prix de vente : 12 francs la boîte.

Laboratoire GOUZÈNE

139, rue de Paris — PANTIN (Seine).

(Tél. : Botzaris 00-97.)

ALSODINE

Poudre composée de sels alcalins et de lactose.

En faisant dissoudre 1 cuillerée à café de cette poudre dans une tasse à thé d'infusion tiède non sucrée, ce qui représente 125 centimètres cubes de liquide, on obtient une solution de degré cryoscopique $\Delta = 0,38$.

Prescrire cette dose après le repas de midi et du soir, ou au moment des crises douloureuses, chaque fois que les troubles observés pourront être rapportés à une évacuation incomplète ou retardée de l'estomac.

Dyspepsie, hyperchlorhydrie, affections du pylore, atonie, aérophagie, vomissements de la grossesse.

Prix : 10 fr. 40.

Dépôt O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS

ALUCOL WANDER

(Hydrate d'alumine colloïdal simple-belladoné.)

Réducteur d'HCl.

Nouvelle thérapeutique gastro-intestinale : l'Alucol, corps chimiquement défini, obtenu par procédé spécial, fixe HCl sans neutraliser ; il l'adsorbe et favorise :

- 1° La protection de la muqueuse stomacale par formation d'un mucilage colloïdal isolant en présence d'un excès de suc gastrique.
- 2° La fixation et l'entraînement par le mucilage ainsi formé des éléments fermentescibles et des entéro-toxines.

Formes. — Paquets, comprimés, granulés, cachets belladonés.

Paquets dosés à 3 gr. pour pansements gastriques et traitement des états aigus. Comprimés de 0^{gr},50. Cachets belladonés (0^{gr},50 Alucol et teinture de Belladone V gouttes).

Doses. — Alucol simple : 2 à 6 gr. par jour une heure avant ou deux heures après les repas et davantage sur avis du médecin.

Alucol belladoné : 1 à 2 cachets à distance des repas, en cas de crises aiguës avec spasmes.

P. BASTIEN, pharmacien

CHAMPIGNY (Seine). — (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

ALUNOZAL

Salicylate aluminique basique.

Associe aux effets antiseptiques de l'acide salicylique l'action astringente et absorbante de l'alumine à l'état gélatineux.

Tolérance parfaite.

Indications :

Diarrhées aiguës et chroniques de toute nature, Diarrhée des nourrissons.

Posologie :

Adultes : 2 à 10 comprimés ou 2 à 6 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café de granulés par 24 heures.

Prix de vente .

Comprimés..... 5 fr. 30

Granulés 14 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPEOIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ALZINE

Composition. — Dionine, Lobélie, Belladone, Polygala, Iodure de Sodium, 0,15 par pilule.

Forme. — Pilules enrobées au gluten F1-de 40.

Indications. — Asthme, Emphysème, Spasmes bronchiques, Catarrhe.

Doses. — Cas aigus : 4 à 6 pilules par jour. Après la crise : 2 à 3 pilules par jour.

Dose préventive. — 1 à 2 pilules par jour pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Flacon : 40 pilules. — Prix : 20 fr.

Compte chèques postaux, Lyon n° 134-34.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

AMBOCURINE

Granulé.

Composition :

Carbonate de Bismuth.....	10 gr.
Bromure de potassium.....	7 gr.
Carbonate de chaux.....	13 gr.
Magnésie lourde.....	5 gr.
Extrait de Belladone.....	0, 06
Salicylate d'ésérine.....	0, 0015
Sucre pr.....	100 gr.

Indications. — *Toutes gastralgies sans exception, qu'elles soient conditionnées par une vago ou une sympathicotomie.*

Aérophagie. Vomissements de la grossesse.

Doses :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

Enfants au-dessus de 15 ans : 1 cuillerée à café midi et soir, dans un peu d'eau avant de manger.

Prix : 18 fr. 85.

Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II°).

AMIBIASINE

Extrait de Garcinia composé.

Fournisseur des Ministères des Colonies et de la Guerre.
Non toxique. Sans contre-indication.

Présentation :

Liquide. — Solution brune stabilisée, de saveur amère, en flacon de 60 cc. (12 cuillerées à café titrées à 0 gr. 10 de principes actifs par cuillerée).

Comprimés. — Comprimés dragéifiés à 0 gr. 05 de principes actifs, en étui de 2 tubes : 40 comprimés.

Suppositoires. (Voir à *Suppositoire Amibiasine*.)

Propriétés. — Désinfectant et antiparasitaire puissant, antidiarrhéique énergique sans action constipante, calmant des douleurs abdominales et du ténésme sans opiacés. Cicatrise la muqueuse intestinale et rétablit l'intégrité fonctionnelle du foie.

Indications. — Toutes parasitoses intestinales : Amibe, *Lamblia*, *Trichomonas*, *Schistosomum* *Mansoni*, *Ankylostomes*, Dysenteries et diarrhées de toutes natures et origines, aiguës et chroniques. Diarrhée symptomatique des tuberculeux, des appendicites chroniques, des typhoïdes, Hémorragies intestinales, *Melæna*, Entérites chroniques, muco-membraneuses, entérocolites, Fermentations intestinales, fétidité des selles, Colibacillose, eczéma.

Diarrhées infantiles (Voir *BIOENTÉRISE*).

Posologie. — En faisant prendre l'AMIBIASINE dans de l'eau sucrée ou, mieux, du café noir sucré, on lui enlève toute amertume. Les comprimés doivent être avalés avec un peu d'eau sans être croqués.

Formes aiguës : 6 à 9 cuillerées à café ou 8 à 12 comprimés par jour.

Formes chroniques : 3 à 6 cuillerées à café ou 4 à 8 comprimés par jour.

Administer le médicament à ces doses et dès amendement des symptômes ramener les doses à 3 cuillerées à café ou 4 comprimés par jour, pendant une huitaine de jours.

Cure d'entretien : 2 cuillerées ou 4 comprimés par jour, 10 jours par mois pendant 1 à 3 mois.

Régime habituel des entéritiques en rotant de s'abstenir du lait, des œufs, du bouillon de légumes. **Boissons :** thé léger, eau sucrée ou eau rouge.

Diarrhée infantile. — Formuler AMIBIASINE BB : 1 à 3 cuillerées à café par jour jusqu'à disparition de la diarrhée.

Prix du flacon :

Solution : 17 francs. — **Comprimés :** 12 fr. 75.

(Taxe d'armement comprise.)

Laboratoire de l'AMIBIASINE
69, rue de Wattignies — PARIS.

AMIDAL

Amidon paraffiné. — Ferments lactiques.

Forme. — Poudre, comprimés, cachets, dragées.

Indications. — Fermentations intestinales, constipation, entérite muco-membraneuse, selles fétides, diarrhées, dysenterie, entérites symptomatiques des maladies aiguës, choléra infantile, entérite tuberculeuse, putréfactions intestinales, artériosclérose, appendicite chronique.

Mode d'emploi. — Deux à 4 cuillerées à café ou 6 à 8 comprimés, cachets ou dragées par jour.

Prix au public :

La boîte de Poudre : 15 fr. 30.

(Boîte aluminium).

La boîte, Comprimés, Cachets : 21 fr. 40.

Le flacon de Dragées : 19 fr. 90

Le tube de Comprimés : 10 fr 20.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

AMIDO-SEPTINE

CACHETS

Composition. — Para-amino-phényl-sulfamide et catalase compensatrice ; l'Amido-Septine emprunte à la Sulfamide ses remarquables propriétés bactéricides tout en neutralisant sa toxicité.

Mode d'action. — Bactéricide puissant administrable *per os*, agissant par voie sanguine et détruisant l'agent pathogène au lieu même de l'infection.

Atoxique, sans danger pour le malade grâce à son activateur d'oxydo-réductions intracellulaires.

Préparation qui permet une large utilisation des propriétés bactéricides de la Sulfamide.

Indications. — Préventive et curative, l'« Amido-Septine » paraît être la « *Therapia Sterilisans Magna* » de tous les états infectieux, et en particulier des infections à : Streptocoques, Méningocoques, Pneumocoques, Gonocoques, Colibacilles, Méliocoques.

Infections polymicrobiennes des plus bénignes (grippe) aux plus graves (septicémies).

Activité spécialement nette en Urologie.

Posologie. — Selon la nature de la maladie, son évolution et l'état du malade.

Adultes : 6 à 12 cachets par 24 heures.

Enfants : 2 à 8 cachets par 24 heures.

A forte dose (10 à 12 cachets par 24 heures), traiter 4 à 5 jours, laisser reposer 3 jours, puis reprendre si nécessaire.

Prix : Boîte de 40 cachets, 28 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1337-3.

Laboratoire de Pharmacologie appliquée.

Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-R.). — (Tél. 29).

AMIFLORINE

Gouttes.

Présentation. — En flacon-compte-gouttes (20 fr. 40.).

Principes actifs. — Extrait de marrons d'Inde, d'Hamamélis virginica, de Gui, de Viburnum, d'Hydrastis canadensis.

Indications. — Troubles de la circulation. maladies des vaisseaux, varices, phlébites accidents de retour d'âge.

Mode d'emploi. — XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, 3 fois par jour.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-16.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AMINASE

Chlorure de magnésium stabilisé et *dissimulé*
en vue du traitement du **Cancer** en clientèle.

Composition. — Chaque comprimé contient 0 gr. 60 de Chlorure de magnésium *pur* et sec.

Propriétés. — Tonique général et nervin, régulateur des fonctions digestive et hépatique, prophylaxie et traitement du *Cancer* ainsi que de toutes lésions type néoplasique.

Indications :

1° *Principale* : Néoplasmes.

2° *Secondaires* : Déficience de l'état général : Asthénie, Neurasthénie, Surmenage, Déséquilibre vago-sympathique, Dermatoses diverses, Hypertrophie de la prostate, Troubles digestifs et hépatiques, Constipation, Colibacillose, Alcalose.

Présentation. — Un tube de 30 comprimés.

Posologie et mode d'emploi. — Un comprimé dissout dans un demi-verre d'eau ou dans le potage, au commencement des deux principaux repas. Cette dose peut être doublée si l'état pathologique réclame une action rapide.

N. B. — Ni sur l'étiquette du tube délivré au public, ni dans le prospectus, ni dans la formule exigée par le fisc, ne paraissent les mots : Cancer, Néoplasme, Tumeur, Chlorure de magnésium, susceptibles d'inquiéter le malade et son entourage.

Prix : 13 fr. 10 le tube de 30 comprimés. Taxe d'armement comprise.

Laboratoires du **SAPOLINOL**

38-40, cours Richard-Vitton — LYON.

AMINOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldibutylaminopropanol, adrénaline, essence de niaouli, camphre, baume du Pérou, borate de soude, vaseline, huile de vaseline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, vaso-constrictive et décongestive.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires supérieures : Coryza, Sinusite, Laryngite, Pharyngite, Rhino-pharyngite, et toutes infections et inflammations du carrefour rhino-pharyngien.

Présentation et prix. — Un tube : 14 francs.

Deux dosages : *Adultes et Enfants.*

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes et enfants :* matin, midi et soir, placer gros comme un pois d'AMINOLÉINE à l'entrée de l'orifice narinaire et aspirer fortement en obturant l'autre narine. Pratiquer la même opération sur l'autre côté.

**Laboratoires de Thérapéutique
Oto-rhino-laryngologique**

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

AMINOPHYLLINE BOUDIER

(Théophylline-éthylène-diaminé)

Propriétés : Antalgique cardiaque, toni-cardiaque, tonique du cœur périphérique, diurétique direct, diurétique cardio-rénal, diurétique tissulaire, eupnéique.

Indications :

- A. *Médicament du spasme vasculaire* et particulièrement des spasmes coronariens (angine de poitrine, infarctus myocardique, claudication intermittente).
- B. *Médicament cardiotonique* (insuffisance ventriculaire gauche, myocardites chroniques, arythmies).
- C. *Médicament diurétique* (oliguries infectieuses ou toxiques, néphrites hydrogigènes, cirrhoses, ascites, œdèmes).
- D. *Médicament eupnéique* (asthme vrai, dyspnée et asthme cardiaques, Chéyne-Stokes, accidents de la narcose, comas toxiques).

Posologie :

Comprimés : 4 à 8 par jour (duré préventive des crises angineuses).

Suppositoires : 1 ou 2 par jour, en cas d'intolérance gastrique (cirrhose, hématomélie, hypertension portale).

Ampoules intramusculaires : action rapide et sans danger : 1 à 2 par jour.

Ampoules intravéineuses : à injecter lentement (3 minutes), 1 à 2 par jour. Traitement d'urgence réservé aux cas graves (infarctus du myocarde, crises aiguës d'angor, œdème aigu du poumon, oliguries graves, comas toxiques).

Laboratoires J. BOUDIER. 37, rue de Bourgogne, PARIS (7^e).

AMINOPHYLLINE CARÉNA

(Théophylline-éthylène-diamine synthétique française.)

Démonstration expérimentale. — La ligature d'une artère coronaire chez le chien provoque, sur l'électrocardiogramme, l'onde en dôme caractéristique de l'obstruction coronarienne. La théophylline éthylène-diamine amène le retour du tracé à la normale.

(Communication Société française de cardiologie, 23 mai 1937.)

Henri Morel, Thèse de Toulouse, 1938.

Indications cliniques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).

Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).

Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

Présentations :

Caréna comprimés	dosés à 0 gr. 10.	} Voir CARÉNA.
gouttes	— 0 gr. 005.	
suppositoires	— 0 gr. 40.	
ampoules intramusculaires	(2 cc. = 0 gr. 50).	} Voir Caréna injectable.
ampoules intraveineuses	(10 cc. = 0 gr. 25).	

Associations :

Ouabaïne : voir Caréna-Ouabaïne.

Papavérine : voir Sédo-Caréna.

Trinitrine : voir Trinitrine-Caréna.

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Inv. 43-60.)

AMIPHÉDRINE

Cachets et Huile Inhalante.

Indications thérapeutiques. — Traitement synergique de l'asthme essentiel. Emphysème. Rhume des foins. Rhinites. Grippe.

Cachets. — Chl. éphédrine, véronal, dionine, thiocol, aspirine, cola.

Traitement d'attaque : 3 cachets par jour avant les repas.

Période d'état : 1 cachet matin et soir.

Prix : La boîte de 8 cachets : 10 fr. 40.

Huile inhalante. — Éphédrine, chlorétone, camphre, menthol, huile végétale.

3 à 4 gouttes en instillations nasales, ou de préférence en pulvérisations.

Prix : Le flacon compte-gouttes : 16 francs.

Laboratoires de L'AMIPHÉDRINE

6, place Jean-Jaurès — MONTROUGE.

(Tél. : Alésia 18-85.)

AMIPHÈNE CARRON

Dioxyphène iodo-sulfonate de potasse.

Le plus puissant antiseptique intestinal.

Ne fatigue pas l'estomac. Combat les fermentations et les putréfactions intestinales. Parfaitement toléré chez l'homme même à hautes doses. Action très rapide. Pas d'iodisme.

Indications. — Toutes les diarrhées, aiguës ou chroniques, quelle qu'en soit l'étiologie. Entérites muco-membraneuses. Diarrhées des pays chauds, suites de dysenterie.

Présentation. — Cachets dosés à 25 mgr. : 2 à 8 cachets par jour, au début des repas (alcaliniser l'intestin en cas d'acidité).

Communication à l'Académie de médecine (1929) et aux Sociétés de gastro-entérologie (1929) et de pathologie exotique (1929 et 1931).

Cachets : 22 fr. 45.

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

AMPHOMUTH

Bismuth métallique colloïdal en extrême dispersion huileuse amicroscopique.

Ampoules de 2 cc., dosées à 0 gr. 040 de bismuth métal par cent. cube. Antisyphilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien.

Ses avantages sont : assimilation facile, toxicité faible, absence de douleur, grande activité.

Posologie et mode d'emploi. — L'AMPHOMUTH est habituellement administré par séries de 12 injections musculaires fessières de 2 cc., deux fois par semaine, avec un repos de trois semaines avant la série suivante. Mais le médecin est seul juge des doses, de la durée de traitement et de l'intervalle à laisser entre chaque série.

Adultes: environ 2 centimètres cubes d'AMPHOMUTH.

Enfants: jusqu'à 3 mois : 1/10 à 2/10 de centimètre cube.

De 3 mois à 1 an : 2/10 à 4/10 de centimètre cube.

De 1 an à 8 ans : 4/10 de centimètre cube à 1 centimètre cube.

De 8 ans à 16 ans : 1 centimètre cube à 2 centimètres cubes.

En boîte de 12 ampoules injectables de 2 cc.

LABORATOIRES RONCHÈSE DE THÉRAPEUTIQUE

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à Paris, 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOPROPHYL T. A. B. RONCHÈSE

à ingérer.

Vaccin antitypho-paratyphique *Préventif*.

Composition. — Suspension de corps microbiens de bacilles typhiques et paratyphiques A. et B. avec addition des lysats correspondants.

Indications. — *L'Amphoprophyl T. A. B.* à ingérer est un agent *préventif* des affections à bacilles d'Eberth et à bacilles paratyphiques A. ou B.

Posologie. — *Adultes et adolescents* : Pendant 6 jours consécutifs, avaler le matin à jeun (au moins une heure avant le petit déjeuner) une pilule de bile et, un quart d'heure après, absorber le contenu d'une ampoule de vaccin dilué dans un peu d'eau.

Enfants : demi-dose.

Innocuité absolue ; Aucune réaction ; Peut être appliqué à tous les âges.

Cette vaccination doit être renouvelée chaque année.

En boîte de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

AMPHOSTABYL

du docteur MOITY

Médication stabilisatrice et équilibrante des dystonies vago-sympathiques et méta-sympathiques.

Tonicardiaque, Sédatif, Régulateur des systèmes neuro-végétatifs et autonomes périphériques

Formules. — Ess. marjolaine, 0,066. — Ext. de ballote, 0,01. — Ext. anémone, 0,01. — Ext. passiflore, 0,02. — Ext. crataegus, 0,04. — Ext. de boldo, 0,01. — Ext. valériane, 0,05. — Peptones polyvalentes, 0,03. — Ext. de jusquiame, 0,01. — Phényl-éthyl-urimido-propane-diméthyl-aminophényl-diméthyl-pyrazolone, 0,05

Par comprimés.

Doses. — 3 à 6 comprimés par jour par prises séparées.

Diffusion. — Strictement médicale.

1^o *Troubles cardiaques* : tachycardie, palpitations, érétisme, angine de poitrine, spasmes vasculaires, hypertension artérielle.

2^o *Troubles digestifs* d'origine nerveuse : dyspepsies nerveuses, spasmes digestifs.

3^o *Troubles respiratoires* : asthme, dyspnée, coryza spasmodique.

4^o *Troubles nerveux* : nervosisme ; états anxieux, névralgies, migraines, insomnies, psychasthénie, émotivité, surmenage nerveux, mal de mer.

5^o *Troubles endocriniens* : hyperthyroïdie, Basedow, dysménorrhée, règles douloureuses, ménopause, tétanie.

Prix : 40 comprimés, 18 francs.

Laboratoire du Dr J.-O. MOITY

Ex-interne des hôpitaux de Paris

Docteur en médecine, Docteur en Pharmacie

199, boulevard Bineau. — NEUILLY-PARIS

AMPHOSYNTHYL

Polonovski et Nitzberg.

Association de Salicylate de Génésérine et de Génatropine.

Formes. — Granules au 1/2 mgr. de Génésérine et 1/4 de mgr. de Génatropine. Gouttes : 1 cc. = XXX gouttes, soit : 1 mgr. de Génésérine et 1/2 mgr. de Génatropine. Elixir : 1 mgr. de Génésérine et 1/4 de mgr. de Génatropine par cuillerée à café.

Indications. — Aérophagie, Troubles dyspeptiques complexes, Troubles dyspeptiques des vésiculaires, Mal de Mer, Troubles complexes du rythme cardiaque.

Mode d'emploi. — Deux Granules, XXX Gouttes ou une cuillerée à café d'Elixir trois fois par jour.

Prix au public :

Le flacon Granules ou Gouttes : 25 fr. 25 ; le flacon Elixir : 30 fr. 60.

Chaque flacon correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

AMPHO-TABLETTES RONCHÈSE

Comprimés à base d'Ampho-Vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Chaque comprimé de 0 gr. 30 contient le résidu sec de son poids de bouillon-vaccin à base de : *pneumocoques*, *pneumobacilles de Friedländer*, *streptocoques*, *micrococcus catarrhalis*, *coccobacilles de Pfeiffer*, *entérocoques*, *staphylocoques* et 40 millions de chacun de ces germes stérilisés et stabilisés par le brome qui est ensuite neutralisé.

Indications. — Véritable gargarisme sec aux antiviruses. Immunisant et curatif. — *Traitement des angines, irritations de la gorge, toutes les infections buccales : gingivo-stomatites, pyorrhée alvéolaire, accidents de dents de sagesse, etc...* — Leur rôle prophylactique en période de grippe est des plus importants.

Doses. Mode d'emploi. — La dose moyenne est de 10 à 15 comprimés par jour, à sucer lentement.

Pour les enfants en bas âge, broyer le comprimé dans une cuiller à café et faire sucer la poudre obtenue d'un goût agréable.

En flacon de 70 comprimés.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchès.

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en Pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turbigo 72-34.

AMPHOTONYL

Sédatif spécifique du système vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonyl-urée (<i>gardénal</i>)...	0,02
Extrait de belladone	0,002
Para-acetphénétidine (<i>phénacétine</i>)	0,10
Extrait fluide d'aubépine	0,05
<i>pour un comprimé.</i>	

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Indications thérapeutiques. — Analgésique. Sédatif général. *S'emploie dans tous les états anxieux, névrosiques.* Spasmes douloureux, Palpitations, Insomnies, Dyspepsies nerveuses, Asthme, Troubles endocriniens, névralgies, etc.

Action très efficace. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 comprimés ou plus par jour, entre les repas.

Prix: Le tube de 40 comprimés: 20 fr.

Échantillons, littérature :

Laboratoires INGE

14, rue Maublan, PARIS (XV°). (Tél. Vaugirard 88-90.)

AMPOULES ANTI-H

(H = symbole de l'acidité).

Médication stomacale.

Présentation. — 14 ampoules buvables.

Composition. — Suspension colloïdale de silicate d'alumine et de sodium.

Action. — Action non pas chimique, par neutralisation, mais physique par formation en présence de l'acidité stomacale d'une bouillie gélatineuse à la fois *fixatrice d'acide* (hyperchlorhydrie), *modératrice* (hypermotricité et spasme du pylore) et *protectrice* (pansement physiologique de l'ulcère).

Indications. — Traitement héroïque et d'une innocuité absolue des gastralgies, dyspepsies, hyperchlorhydrie, hypermotricité et spasme du pylore, ulcères, aérophagie.

Mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau après les 2 repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 22 francs.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS. (Tél. : Gobelins 90-00.)

AMPOULES AUTO-INJECTABLES ACRON

Pour injections hypodermiques.

Présentation et composition. — *Solutés* (ampoules de 300, 100 et 50 cc.

Sérum physiologique, Glucosé, Gélatiné, Physiologique Camphré et Glucosé Camphré.

Spécialités :

Cardi Acron : traitement d'urgence du collaptus cardiaque (camphre soluble spartéiné et caféiné)

Ampoules de 1 cc.

Dyn Acron : reconstituant énergétique (glycéro-phosphate de soude, Cacodylate de soude, Métavanadate de soude).

Ampoules de 1 cc.

Pulm Acron : spécifique broncho-pulmonaire (solution balsamique huileuse à base de quinine et de camphre et huiles essentielles).

Ampoules de 2 cc.

En petites ampoules 1 cc. : tous médicaments d'urgence : camphre, spartéine, strychnine, morphine, éther, cacodylate de soude, caféine, ergotine.

Mode d'emploi. — Injection Hypodermique :

Casser le bec de l'ampoule, pointe en bas, à travers le caoutchouc, et le gaz sous pression fait sortir le liquide (pour les grosses ampoules, on régularise le débit à volonté au moyen d'une vis).

Pour injection intraveineuse, appareillage avec aiguille démontable.

Avantages : Asepsie absolue, rapidité d'exécution.

Remarques : Le tout est stérilisé en fin de fabrication, d'où stérilisation parfaite. Tout est prêt pour l'injection, pas besoin de seringue.

Laboratoires de TECHNIQUE THÉRAPEUTIQUE

M. COUDERT, Pharmacien

37, rue de la Hâte-Coq — AUBERVILLIERS (Seine).

AMPOULES AUTO-INSTILLABLES NADER

Instillations endo-nasales.

Centro-réflexothérapie.

Sollicitations des réactions bulbaires.

Aucune contre-indication.

Asphyxie des nouveau-nés.

Laboratoires NADER

6, rue de l'École — VERSAILLES

(Seine-et-Oise).

AMPOULES BOISSY

pour inhalations.

AMPOULES BOISSY DE NITRITE D'AMYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 218-12.

Indications. — *Angines de poitrine, Hémoptysies, Syncopes, Crises gastriques du Tabès, Mal de mer, Migraines, etc.*

AMPOULES BOISSY D'IODURE D'ÉTHYLE.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 218-13

Indications. — *Asthme, Emphysème, Coqueluche, Dyspnées de toute nature.*

Mode d'emploi. — Chaque ampoule est renfermée dans un étui en papier absorbant, qu'il ne faut pas retirer. Briser les deux pointes de l'ampoule en pliant l'étui vers les deux bouts et respirer le liquide qui s'évapore, en plaçant l'étui dans le creux de la main. Durée d'utilisation : suivant fréquence des crises.

Prix : 16 francs la boîte de 12 ampoules.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

AMPOULES FERRUGINEUSES FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude	0 gr. 10
Cacodylate de Strychnine	1/2 milligr.
Cacodylate de fer.....	0 gr. 01
Eau distillée	1 cc.

Indications. — Anémies, Chlorose.

Forme. — En ampoules de 1 cc. (boîte de 12 ampoules).

Posologie. — Une ampoule tous les jours dans le tissu musculaire.

Prix : boîte de 12 ampoules : 19 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-8.

Laboratoire FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

AMPOULES NÉVROSTHÉNIQUES FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude..... 0 gr. 10
Sacodylate de Strychnine..... 1/2 mill.
pour 1 cc. d'eau distillée.

Indications. — Dynamogénique puissant.
Asthénie, Neurasthénie.

Forme. — En ampoules de 1 cc. (boîte de 12 ampoules).

Posologie. — 1 ampoule tous les jours.

Prix : boîte de 12 ampoules : 19 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-7.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

AMPOULES REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicylique injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu.
Toutes les algies rhumatismales. Sciatique. Lumbago.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées ou intramusculaires *loco dolenti*. Le Reipar porte l'acide salicylique là même où il doit agir.

Pour la voie intraveineuse : Intra-Reipar (*Voir ce mot*).

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 18 fr. 35.

Prix spéciaux pour pharmaciens, cabinets médicaux, hôpitaux et cliniques.

Échantillons et littérature sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER
RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

AMPOULES SCLÉROSANTES FRAISSE

Formule :

Chlorhydrate de Quinine.....	0 gr. 40
Uréthane	0 gr. 20
Eau distillée.....	3 cc.

Indication. — Pour la sclérose des varices.

Prix : Boîte de 6 ampoules : 20 fr. 40.

AMPOULES SCLÉRO - HÉMORROIDIQUES FRAISSE

Formule :

Chlorhydrate de Quinine et Urée.....	0 gr. 25
Eau distillée	5 cc.

Indication. — Pour la sclérose des hémorroïdes.

Prix : Boîte de 6 ampoules : 20 fr. 40.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils.

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

AMPOULES « VIGOR »

Composition :

Cinnamate de Benzyle.....	0,050
Cholestérine	0,125
Camphre	0,150
Lécithine	0,050
Vitamines D.....	500 Unités Internationales.
Huile d'Olive stérilisée, Q. S...	pour une ampoule de 5 cc.

Propriétés. — Puissant reconstituant, non toxique, à effet durable renforcé par la présence des Vitamines D. en solution huileuse.

Son emploi nouveau en injections intramusculaires contrôlé par de multiples essais en clientèle et en milieu hospitalier se révèle avec cette voie directe comme présentant le maximum d'efficacité.

Indications. — Convalescence de maladies infectieuses ; Convalescence à la suite d'interventions chirurgicales ; Anémies sans origine bien déterminée ; Pré-tuberculeux ; Tuberculoses en évolutions (même fébriles) ; Lymphatismes ; Tous les états asthéniques.

Contre-indication. — Aucune.

Posologie et Mode d'emploi. — Une ampoule tous les 2 jours dans les cas moyens. — Une ampoule tous les jours dans les cas où un résultat rapide est recherché.

Important. — A employer uniquement par la voie intramusculaire.

Nota. — Boîtes de 10 ampoules pour un traitement de 20 jours.

Prix au public : 29 fr. 15.

Laboratoires VIGOR

26, Chaussée de la Madeleine. — NANTES (Loire-Inférieure).

(Tél : 149-78.)

AMYBDINE

Composition. — A base d'acide 7-iodo-8-oxyquino-
léine-5-sulfonique solubilisé par addition d'une
proportion titrée de bicarbonate de sodium, ainsi
solubilisé cet acide contient 27 p. 100 d'iode
environ.

Indications. — Traitement spécifique des dysen-
teries amibiennes et bacillaires.

Traitement de certaines maladies infectieuses des
voies urinaires et biliaires.

Forme :

1° Pilules dosées à 0 gr. 25 (bicarbonate de soude
compris).

En flacon de 25 et 50 pilules.

2° Poudre solubilisée.

En flacon de 10 gr., 25 gr., 50 gr.

Laboratoire de l'AMYBDINE

E. RUEYRES, Pharmacien

44, avenue Pasteur — COURBEVOIE-PARIS

(Seine).

(Tél. : Défense 02-02.)

AMYLODIASTASE THÉPÉNIER

Phosphates, Diastases et Vitamines de croissance
des Céréales germées.

Formes. — Comprimés et Sirop.

Indications thérapeutiques. — Entérite et Dys-
pepsie (salivaire et pancréatique), Tuberculose,
Rachitisme, Palpitations (d'origine digestive).
Maladies par carence, digestion des féculents.

Mode d'emploi — Deux comprimés ou deux
cuill. à soupe de sirop 3 fois par jour après les
repas. Préparation des bouillies : Délayer un ou
deux comprimés écrasés d'amylodiastase ou une
cuillerée à soupe de sirop dans une bouillie ne dé-
passant pas 60°.

Prix : le flacon sirop 18 fr. 70 ;

La boîte de comprimés : 14 fr. 70

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPÉNIER**

10, rue Clapeyron — PARIS.

(Tél. : Europe 58-97.) — C. 150.854.

ANACLASINE INFANTILE

États digestifs et cutanés. — Anaphylaxie

Composition. — Hyposulfite de soude et de magnésium associés à des polypeptides spécifiques.

Indications :

Troubles digestifs : Etat saburral, inappétence, nausées, déficience hépatique, intoxication alimentaire, troubles de l'assimilation.

Dermatoses : Urticaire, eczéma, prurit, œdème de Quincke, éruptions.

Phénomènes neuro-endocriniens et diathésiques : Migraines, Insomnies, Vaso-dilatation et Vaso-constriction périphériques, Accidents sériques.

Posologie. — *Granulé :* Jusqu'à 3 ans : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Au delà de 3 ans : 2 à 6 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, de lait ou à croquer.

Prix . 19 fr. 05.

Laboratoires A. RANSON

Docteur en pharmacie

96, rue Orfila — PARIS (XX^e Arr^{ts}).

(Tél. : Ménilmontant 62-81, 62-82).

ANACLASINE RANSON

Antianaphylaxie, Cytophylaxie.

L'Anaclasine Ranson (ἀνὰ — contre, κλῆσις — choc) est une préparation anti-anaphylactique, polyvalente et cytophylactique.

Forme. — Comprimés et Granulé.

Action. — Elle évite le choc anaphylactique, désensibilise l'organisme, stimule la fonction cellulaire, améliore l'état hépato-biliaire, rétablit l'équilibre sympathique, régularise la tension.

Composition. — L'Anaclasine comprend, d'une part, de l'hyposulfite de magnésium et des composés du Magnésium associés à l'Hyposulfite de soude, et, d'autre part, de multiples Polypeptides spécifiques (20 peptones différentes).

Indications. — Anaphylaxie alimentaire, états hépatiques, intolérance digestive, intoxication alimentaire, migraines, insomnies, vertiges, eczéma, urticaire, maladie de Quincke, asthme, dyspnée, rhume des foies, coryzas spasmodiques, tachycardies, arythmies, arthritisme, tumeurs bénignes.

Doses journalières. — *Adultes :* 3 à 5 comprimés par jour, 1/2 heure avant les repas ou 4 à 6 cuillerées à café de granulé.

Enfants, au dessus de 10 ans : de 1 à 3 comprimés par jour ou 1 à 2 cuillerées à café de granulé.

Anaclasine infantile (Voir ci-contre la notice).

Durée du traitement : minimum 15 jours.

Prix : Granulé : 19 fr. 60. — Comprimés : 17 fr. 45.

Laboratoires de L'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

ANALGÉNINE OBERLIN

Deux formes : A. solution, B. cachets

A. Solution.

Une cuillerée à soupe contient :

Pyramidon.....	0 gr. 30
Antipyrine	0 gr. 30
Bromhydrate de quinine	0 gr. 10
Caféine	0 gr. 05

Solution agréablement aromatisée au café. A diluer dans une tasse à café pleine d'eau chaude et très sucrée. Il est important de sucrer largement.

B. Cachets.

Même formule, mais phénacétine au lieu de pyramidon.

Indications. — Migraines, Névralgies, Sciatique, Paludisme.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

ANALGÉSOL

Présentation. — Pommade pour l'usage externe.

Composition. — Menthol, Salicylate de Gaïacol, Excipient.

Indications. — *Curatif* : Névralgies intercostales, Névralgies faciales, Névrites, Rhumatismes, Sciatiques.

Préventif : Angine, Otite, Oreillons.

Posologie. — *Névralgies intercostales* : 3 applications à 1/2 heure d'intervalle, en onction locale, continuer 3 applications par jour pendant 4 à 5 jours.

Névralgies : Faciales dentaires, etc..., 2 à 3 applications à 1/4 d'heure d'intervalle.

Névrites, Rhumatisme, Sciatique, Lumbago, 3 applications par jour pendant 5 à 6 jours.

Préventif : une application matin et soir sur les régions Parotidiennes et Sous-Maxillaires.

Contre-Indications. — Ne jamais appliquer sur les muqueuses.

Prix 12 fr. 75.

Littérature et échantillons:

Laboratoires **MARCEL LOGE, IS**

Docteur en Pharmacie.

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suff. 03-38)

ANALPYRINE

Antinévralgique.

Composition. — Chlorhydrate d'amyléine, salipyrine, pyramidon, en milieu alcalin caféiné.

Indications. — Névrites, névralgies, sciatiques, céphalées de la grippe ou des pyrexies, rhumatisme articulaire, arthrites douloureuses.

Algies du cancer, du tabes. Coliques hépatiques et néphrétiques (traitement symptomatique seulement).

Présentation. — En flacons de 45 cc.

Posologie. — Doit être prise à la dose de XXX gouttes, dans un peu d'eau, de préférence loin des repas. Cette dose peut être renouvelée sans inconvénient jusqu'à 10 à 12 fois par 24 heures, selon l'intensité de la douleur et la réceptivité du malade.

S'abstenir chez les albuminuriques.

Le flacon, prix au public : 20 francs.

Laboratoires de l'ANALPYRINE

M. BERTRAND, Pharmacien

NOMEXY (Vosges).

ANAPEPTONE VASSAL

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés de *peptones polyvalentes* de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de gélatine, de végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-anaphylactique par excellence. Traitement rationnel des migraines, asthme, urticaires, troubles intestinaux.

Doses moyennes. — 1 ou 2 comprimés 1 heure avant les repas principaux.

La boîte de 50 comprimés suffit à une cure :
20 fr. 80.

Échantillons gratuits.

Laboratoire LÉON DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

ANAPYOL

Pommade antiseptique cicatrisante.

(Formule expérimentée à l'hôpital Saint Louis.)

Composition :

Oxyde jaune de Hg.....	5 gr.
Acide salicylique.....	2 gr.
Ichthyol	3 gr.
Oxyde de zinc	15 gr.
Lano-vaseline	75 gr.
Essences antiseptiques et aromatiques.	Q. S.

Indications :

Topique d'une efficacité reconnue dans toutes les lésions suppurées et infectées de la peau, **Anapyol** est d'un emploi courant dans la clientèle où il peut être prescrit pour les affections suivantes : eczémas chroniques et eczémas aigus *infectés*, ulcères variqueux et ulcération de toutes natures, pyodermites, impétigos, gourme, acné, séborrhée, dartres, blépharites.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoires FABIOL

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85.)

ANAQUINTINE LESCÈNE

Composition. — Aldéhydes benzylocinnamiques, Thymol, Eucalyptol.

Forme. — Liquide rosé pour usage externe, entièrement miscible à l'eau (inhalations froides, compresses, gargarismes).

Indications. — Rhumes, Sinusites, Grippe, Toux spasmodiques, Coqueluche. Prophylaxie des contagions, Angines.

Mode d'emploi. — *Pure* : pulvérisations ou aspersions dans les pièces, sur vêtements, draps, linge, *mouchoirs*. (Toux, Rhumes, Grippe, etc.)
Inhalations froides sur mouchoir et dans les mains.

Diluée (Toux, grippe, coqueluche) : *compresses* sur la gorge et la poitrine. Diluer dans 4 parties d'eau chaude. Recouvrir de coton cardé ou d'une étoffe de laine. Laisser en place toute la nuit. *Gargarisme* : angines, adénoïdites, 1/2 cuillerée à café d'Anaquintine, plus une cuillerée à café de Borate de Soude dans un verre d'eau chaude.

Anaquintine gouttes nasales.

(Voir RHINAQUINTINE.)

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19.

et LIVAROT (Calvados)

ANATENSYL

Gouttes.

Indications. — Hypertension et ses conséquences, Artériosclérose, Spasmes vasculaires, etc.

Formule. — Nitrite de soude 0 gr. 05, Trinitrine (sol. 1 p. 100), 1/2 goutte, Bromure de sodium 0 gr. 25, Sulfate de spartéine 0 gr. 01, Urothéine 0 gr. 15, Extrait de gui 0 gr. 02, Extrait de genêt 0 gr. 01 pour XXV gouttes (unité de prise).

Doses et emploi. — XXV gouttes 2, 3 ou 4 fois par jour, aux repas, dans un peu d'eau.

Introduction dans la formule d'Urothéine, CHNaNO , CHOLi , excellent diurétique.

A utiliser simultanément avec *Uro-lithium* : pendant 8 ou 10 jours *Anatensyl*, puis usage plus ou moins prolongé d'*Uro-lithium*.

Prix : 19 fr. 80 le flacon de 24 cc.

N° d'enregistrement au L. N. C. M. n° 1676-26.

Laboratoire G. CALMELS
AUTERIVE (Haute-Garonne).

ANAUURAL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, phényl-méthyl-malonylurée, borotartrate de calcium.

Indications. — Épilepsie essentielle, épilepsie jacksonienne, Prurits.

Doses. — 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 22 francs (20 jours de traitement).

Laboratoires BARTHELEMY

1, place Forbin
AIX-EN-PROVENCE
(Tél. : 1-70.)

ANAXÉRYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 363-25.

Forme. — Pommade (tube).

Composition. — Dioxyanthranolsulfonate de sodium, Thioélaïdinosulfonate de sodium, Huile de Bouleau, Résorcine, Baume du Pérou.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiparasitaire, Antipsoriasique.

Indications. — Toutes dermatoses sèches ou squameuses, Psoriasis, Parakératoses, Affections parasitaires, Mycoses, etc...

Mode d'emploi. — Appliquer l'ANAXÉRYL en massant légèrement. Enlever l'excès de pommade avec un tampon d'ouate. Éviter le contact de l'Anaxéryl avec les muqueuses.

Le tube de 40 grammes : 14 fr. 30 (en France).

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

ANDOTESTRONE

L'Hormone mâle est préparée sous 2 formes :

Andotestrone propionate : Propionate de Testolérone.

Andotestrone acétate : Acétate de Testostérone.

Indications : 1^o *Andotestrone propionate* est surtout indiqué chez l'homme.

Chez le jeune garçon : infantilisme génital, cryptorchidie, syndrome adiposo-génital.

Chez l'homme âgé : asthénie génitale, Prostatisme, hypertrophie de la prostate.

2^o *Andotestrone acétate* : *Chez l'homme* : Adénome prostatique.

Chez la femme : Mastopathies prémenstruelles, Métrorragies, Troubles dus à l'hyperfolliculémie.

Présentations :

1^o *Andotestrone acétate.*

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 10 mgr. 66 fr. 30

— 1 — 1 cc. — 40 mgr. 56 fr. 10

— 5 — 1 cc. — 40 mgr. 255 francs

2^o *Andotestrone propionate.*

Boîte de 4 ampoules de 1 cc. dosées à 5 mgr. 40 fr. 80

— 5 — 1 cc. — 10 mgr. 66 fr. 30

— 2 — 1 cc. — 25 mgr. 66 fr. 30

Posologie : Injections intramusculaires.

Posologie variable à fixer par le médecin. A titre d'indication

Hypertrophie prostatique. Andotestrone propionate : 10 injections à 40 mgr. à raison de 2 injections par semaine.

Chez la femme : Les mastopathies nécessitent des cures de 200 à 250 mgr. d'Andotestrone-acétate (injections tous les deux jours).

Laboratoire pour la diffusion des produits synthétiques

Léonce GODEAU, pharmacien

73, rue Dutot — PARIS (XV^e)

ANDROCALCION

Forme H

Composition. — Calcium, Magnésium, Phosphore, associés à la Théobromine, à l'Iodaseptine et à l'Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Ménopause masculine, *Préventif* des troubles de la Cinquantaine, *Traitement* de ses accidents.

Troubles endocriniens, nervosité chez la femme non mariée.

Propriétés. — Agit à la fois sur le système nerveux sympathique, sur l'état général, sur la tension artérielle, sur les fonctions cardiaques. Par son extrait orchitique, apporte à l'organisme le stimulant qui lui manque.

Doses. — Trois à quatre dragées à prendre trois fois par jour (soit 12 par 24 heures) douze jours par mois.

Forme E

Composition. — Lactate de Calcium, Glycérophosphate de Magnésium, Iodaseptine, hormone gonadotrope. Extrait orchitique.

Indications. — Accidents de la Puberté masculine : troubles de croissance et de développement chez l'adolescent.

Présentation et Doses. — Dragées à avaler sans croquer. Prendre 3 à 4 dragées trois fois par jour, 12 jours par mois.

Prix : 25 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

ANDRO-GOUTTES

Opothérapie orchitique renforcée.

Fractions lipo-soluble et hydro-soluble de la glande.

Glande interstitielle + glande spermatogénétique.

1 cc. = 50 gr. de testicule frais de taureau.

Indications. — Chez l'enfant : Troubles du développement génital ; Chez l'adulte : Asthénie sexuelle, Sénilité précoce, Adiposité (par diminution du métabolisme), Surmenage ; Chez le vieillard : Adénome de la prostate.

Chez la femme : Troubles de la puberté et ménopause, Carence sexuelle, Troubles nerveux.

Posologie. — XV à XX gouttes par jour en deux prises dans un peu d'eau, à jeun. (On peut augmenter ces doses sans inconvénient.)

Opothérapie complémentaire chez la femme : aux mêmes doses dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : Alésia 04-39.)

ANDROSTINE

CIBA

EXTRAIT ORCHITIQUE HYDROSOLUBLE.

Action physiologique. — *Chez la femme*: Équilibre de la sécrétion ovarienne et du système nerveux. (Peut se formuler en association avec Agomensine ou Sistomensine suivant le cas.) *Chez l'homme*: Activa-trice de la spermatogénèse. — *Dans les deux sexes*: Active le métabolisme basal, la combustion des graisses et des sucres.

Indications. — *Chez la femme*: Troubles de la ménopause et de la puberté. Anxiété génitale, érotomanie, onanisme. Troubles liés à la continence. Aménorrhée rebelle. *Chez l'homme*: Asthénie post-infectieuse, Infantilisme, impuissance. *Dans les deux sexes*: Obésité, engelures, acrocyanose, diabète.

Comprimés. Ampoules.

Doses. — 3 à 9 comp. par jour, 1 amp. tous les 2 jours.

Formuler. — Flacon de 40 comprimés.

Boîte de 4 ampoules.

(Voir PERANDRONE.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél.: Moucey 43-26.)

ANDROVAR

(Gouttes.)

Traitement de choix des troubles ovariens.

Composition : { Orchitine (*discrète*).
Gouttes à base { Thyroïde (*dose réduite*).
d'extraits { Hypophyse (*lobe antérieur*).

Indications. — Tous les troubles de la fonction ova-rienne: *Puberté*, Aménorrhée, Dysménorrhée, Ner-vousisme, *Carence sexuelle* (célibataires et veuves de fait et de « principe »), Ménopause, Obésité.

Présentation :

Gouttes: Flacon compte-gouttes de 20 cc. = soit 600 gouttes environ. Prix: 25 francs.

Demi-flacon compte-gouttes de 10 cc. = soit 300 gouttes environ. Prix: 15 francs.

Posologie :

XXX à LX gouttes *pro die* en deux ou trois fois, loin des repas si possible (sinon, faire absorber avant le repas, dans un peu d'eau).

Laboratoires ANDROVAR

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél.: Entrepôt 13-97.)

ANDROVULES

(Ovules.)

Traitement de choix des affections gynécologiques liées ou non à une insuffisance ovarienne. (Opothérapie complémentaire par voie naturelle.) Antiseptique, Décongestif.

Composition. — Orchitine (absolument discrète), Sulfate neutre d'oxyquinoléine, Glycérine solidifiée.

Indications. — D'une part, toutes les affections gynécologiques (métrites, salpingites, annexites, etc.) et, d'autre part, tous les troubles de la fonction ovarienne (aménorrhée, dysménorrhée, nervosisme, carence sexuelle, etc.). (*Voir également Androvar.*)

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher (faire garnir la malade).

Le traitement de 20 jours par mois pour les cas rebelles sera très utilement complété par l'Androvar.

Les Androvules ne tachent pas.

Laboratoires ANDROVAR

139, rue Jean-Jaurès — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ANÉGRINE

Composition :

Acide quinquéfolique carbonique, associé à l'Arbutine, à la phénolactine et au cascara,

Action :

Élimination rapide de l'acide urique. — Augmentation du pouvoir de sécrétion et d'excrétion du rein, — Excitation de la fonction cholagogue du foie.

Indications :

Goutte. — Rhumatisme articulaire aigu et chronique. — Sciatique. — Lumbago, etc.

Mode d'emploi :

Cas aigus, 6 à 8 comprimés ou cachets par jour, en 2 ou 3 fois, dans un peu d'eau, pendant 3 ou 4 jours, diminuer progressivement les doses jusqu'à 4 comprimés ou cachets par jour. — Cas chroniques : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour, pendant 8 à 15 jours. Cesser 8 jours et reprendre.

Prendre les comprimés ou cachets au commencement des repas avec les premiers aliments.

Prix : Comprimés et Cachets : 20 fr. 40

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : + Alésia 22-46.)

ANEXOL

Principe actif. — Sel sod. acid. sulfam. toluène monochl. (chloramine T.)

Antiseptique chloré, parfumé, non irritant.

Principe de la javellisation, sans ses inconvénients.

Doses. — Pour 1 litre d'eau chaude :

Stérilisation de l'eau : 1 comprimé.

Gargarismes : 1 à 2 comprimés.

Urologie et gynécologie : 2 à 4 comprimés.

Pansement des plaies : 4 à 6 comprimés.

Prix :

17 fr. 10 la double-boîte de 80 comprimés.

11 fr. la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

ANGÉIOL

(Gouttes.)

Composition. — Extraits sélectionnés de : Citronnelle, Fleurs d'orangers, Tilleul, Uva-Ursi, Prêle, Genêt.

Doses. — XV gouttes une à trois fois par jour, loin des repas, 20 jours par mois, arrêt 10 jours, et reprise à la même cadence. En cas de réapparition des troubles et des malaises pendant la période de repos reprendre immédiatement le traitement, et le continuer par la suite.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nervin, absolument atoxique, remplace avantageusement les malonylurés, barbituriques. Faible hypotenseur.

Applications. — Déséquilibre vago-sympathique, états anxieux, émotivité, éréthismenerveux même d'origine toxique, éthylysme. Pléthoriques, spasmes vasculaires, troubles labyrinthiques, algies précordiales.

Prix : Le flacon, 24 francs.

Demandez échantillons à **Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques**, 10, rue Pont-aux-Chèvres, à Fontenay-le-Comte (Vendée). Dépôt : O. C. P., 43, rue des Francs-Bourgeois, à Paris, et Établissements Darrasse Frères, 13, rue Pavée, à Paris.

Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques

10, rue Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE (Vendée).

ANGIHORMOL

du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition:

Pancréas (Extrait total)	}	0,05
Ovarine		
Orchitine		
Hypophysine (glande totale).....		
Prostatine.....	}	à 0,02
Placentine		
Parathyroïdine.....		0.001

Propriétés. — L'*Angihormol*, grâce aux propriétés énergiques des glandes endocrines, agit tout particulièrement sur les veines et sur les varices en stimulant les contractions du muscle veineux, atone.

Indications. — Porteurs d'Ulcères Jambiers des deux sexes. Varices, hémorroïdes, périphlébites (déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux).

Remarques. — L'emploi de l'*Angihormol* doit être suspendu pendant la période de menstruation.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas.

Demander les brochures des docteurs P. et R. BOURGGRAFF.

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

ANGIOLYMPHE

Extrait végétal d'Orchidées (*Orchis mascula*).

Profond modificateur du terrain, dont il exalte les réactions de défense.
AUCUNEMENT TOXIQUE. Ne provoque aucune réaction générale ou de foyer.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose. Etats déficients.

Dans les formes pulmonaires :

E JPHORIE manifeste. BAISSÉ de la température. DIMINUTION et DISPARITION de la Dyspnée, de la Toux, de l'Expectoration, des Sueurs et autres symptômes.

AUGMENTATION de l'Appétit, du Poids, des Forces. AMÉLIORATION rapide de l'état général.

AMELIORATION des signes stéthoscopiques. DIMINUTION et DÉGÉNÉRESCENCE des Bacilles de Koch.

Dans les formes ganglionnaires osseuses, etc. AMÉLIORATION rapide de tous les symptômes.

Posologie. — 2 à 5 cc. en une injection intramusculaire quotidienne par séries de 8 à 12. Repos d'une dizaine de jours et reprise.

Compresses dans les manifestations chirurgicales (fistules etc.).

Prix : 30 francs la boîte de 6 ampoules.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE

MORO Pharmacien de 1^{re} classe

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine)

(Tél. : Défense 12-11.)

ANGIONEVROL

Médication sédative

Traitement phytothérapeutique des syndromes sympathiques et parasymphathiques.

Composition : 100 grammes contiennent :

Extrait fluide de Valériane.....	12 gr. 00
Extrait fluide de Passiflora incarnat.....	12 gr. 00
Extrait fluide de Crataegus oxyacantha.....	6 gr. 00
Extrait fluide de Belladone racine.....	0 gr. 30
Extrait fluide de Quinquina Succirubra.....	1 gr. 20
Bromo-Borotartrate de Magnésium.....	3 gr. 00
Solution hydro-alcoolique sucrée.....	65 gr. 50

Indications : Troubles de déséquilibre neuro-végétatif. (Émotivité, Insomnies, Hyperexcitabilité, Irritabilité, Angoisse). États névropathiques, vaso-moteurs et cardiaques par sympathicotonie, troubles circulatoires de la Vagotonie et de la Neurotonie. États spasmodiques en pathologie digestive. Inquiétude sexuelle, Anémie, Débilité, Surmenage, Constipation.

Posologie : De deux à trois cuillerées à soupe par jour avant le repas. Contre l'insomnie, de une à deux cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Solution sirupeuse stable de goût très agréable, non toxique et sans risques d'intolérances.

Prix : Le flacon, 22 francs.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1814-1.

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — Paris. (Tél. : Dor. 56-38.)

ANGIOSÉDINE

Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif du système nerveux.

Formule. — Ext. mou de passiflore, de crataegus, de jusquiame, phényléthylmalonylurée, nitrite de soude, extrait de muguet, de gui, d'hamamélis, marron d'Inde, d'hydrastis, hypophyse et silicate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés de 0,50.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 614-1.

Pharmacie LACOR

81, rue de la Roquette — PARIS.

ANGIOXYL

Composition. — Extrait pancréatique désinsuliné.

Propriétés. — Action trophique vasculaire, vago-tonisante et hypotensive.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension artérielle, Artérites de toute nature, Ulcères trophiques, Troubles de la ménopause, Troubles vasculaires de la vieillesse, Sclérose artérielle.

Formes. — Boîte de 10 ampoules de 2 cc.
Sirop, flacon de 150 cc.

Posologie. — *Ampoules* : Série de 10 à 20 jours à raison d'une à 2 ampoules par jour en injection intramusculaire. — *Sirop* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Prix : *Ampoules*, 27 fr. 55 — *Sirop*, 21 fr. 40

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

ANGORAL

Antispasmodique complet.

Régulateur du système Neuro-Végétatif.

Indications principales. — Tachycardies, palpitations, extrasystoles, angoisses cardiaques, angine de poitrine, asthme, insomnies, mal de mer.

Déséquilibres du système vago-sympathique cardiaque, notamment ceux de la ménopause et de la maladie de Basedow.

Troubles précurseurs de l'hypertension artérielle et de l'insuffisance cardiaque.

Forme. — Comprimés dragéifiés non glutinisés.

Composition. — Un comprimé contient :

Extr. stabilisé de fleurs de *Cratægus*.. 0 gr. 03

Extr. stabilisé de *Valériane*..... 0 gr. 03

Extr. stabilisé de *Passiflore*..... 0 gr. 01

Sulf. de spartéine (du genêt) 0 gr. 015

Phényléthylmalonylurée 0 gr. 018

Posologie. — *Dose moyenne* : 1 ou 2 comprimés au début des deux principaux repas jusqu'à sédation des phénomènes pathologiques.

Suspendre quelques jours et reprendre la médication s'il est besoin.

Mal de mer. — Aux trois repas précédant l'embarquement, prendre deux comprimés d'Angoral et continuer ainsi pendant les premiers jours de la traversée à absorber deux comprimés d'Angoral à chacun des deux principaux repas. Le traitement devra être continué le temps qu'il sera nécessaire pour s'amariner.

Par la suite, ne plus prendre qu'un comprimé à chaque repas et cesser la médication.

Prix : 17 fr. 50 le tube (8 à 15 jours de trait.).

**Non soumis à la Réglementation
des substances vénéneuses.**

Laboratoires CHAMBON

Place Francheville — PERIGUEUX.

(Tél. 4-43.)

ANGUSTURL PORCHER

Gouttes.

A base d'écorce d'Angusture (*Galipea Cusparia*) en association synergique avec Gentiane, Centaurée, Écorce de Cascarille (*Croton Elutheria*).

Amer aromatique d'action gastrique triple :

Provoque l'afflux du « Suc d'appétit » réflexe.

Détermine une intense sécrétion chlorhydrique suivie de leucopédèse.

Exalte la motricité gastrique.

**Médicament type de l'inappétence
sous toutes ses formes.**

Mode d'emploi. — 10 minutes avant chaque repas, dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : de 5 à 8 ans : VI à X gouttes;
de 9 à 12 ans : de XII à XV gouttes.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 69-03.)

ANIODOL EXTERNE

Le plus puissant antiseptique externe, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformalglycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Formes. — Solution normale, dose pour 20 litres ; solution concentrée, dose pour 30 litres ; comprimés, boîte de 30 doubles comprimés pour 60 litres ; poudre ; savons ; ovules, boîte de 6 ovules ; vaseline.

Indications. — Obstétrique, gynécologie, chirurgie générale, maladies vénériennes et des voies urinaires, dermatoses, cancer, ophtalmologie, rhinologie.

Mode d'emploi et doses. — Normale : 1 cuillerée à soupe pour 1 litre d'eau. Concentrée : XXX gouttes ou 1 division pour 1 litre. Comprimés (injections vaginales) 1/2 comprimé pour 1 litre d'eau. Poudre (remplace les poudres dérivées de l'iode et du phénol). Savon : asepsie et désinfection des mains et des plaies. Ovules (gynécologie) : un ovule le soir. Vaseline : plaies, accouchements, rhinologie.

Poudre : — L. N. C. 804-8.

Comprimés : — L. N. C. 804-9.

Solution externe : L. N. C. 804-4 et 5.

Prix : 9 fr. 35.

Ovules : 14 francs.

L. N. C. 804-7.

Savon : 2 fr. 75.

L. N. C. 804-10.

Vaseline : 2 fr. 85.

L. N. C. 804-6.

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes — NANTERRE (Seine). — (Tél. : Longchamp 07-26.)

ANIODOL INTERNE

Le plus puissant antiseptique interne, diffère de tous les antiseptiques par son absence de toxicité et de causticité.

*Combinaison de triformal glycérine
et d'oxyméthylène sulfocarbimide.*

Forme. — Gouttes, flacon de 50 cc.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, diarrhée verte des nourrissons, entérites, dysenterie amibienne, gripes, catarrhe des voies aériennes, tuberculose, fièvres infectieuses, fièvre typhoïde.

Mode d'emploi et doses :

Nourrissons : III à V gouttes à chaque tétée.

Enfants : XX à L gouttes.

Adultes : XXX à CC gouttes.

Par jour, dans une tasse de lait ou de tisane, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas.

Prix : 16 fr. 65.

Enr. au L. N. C. sous le N° 804-3.

Laboratoires de l'ANIODOL

3 à 9, rue des Alouettes. — NANTERRE (Seine).

Envoi gratuit d'échantillons à MM. les Docteurs.
(Téléphone : Longchamp 07-26.)

ANKYLOSYL

Composition. — L'*Ankylosyl* est une préparation à base d'iodure de Strontium additionnée de produits qui évitent l'iodisme : l'hyposulfite de sodium et des extraits de levure sélectionnés.

L'*Ankylosyl* est présenté en pilules glutinisées.

Indications. — Rhumatisme chronique, Raideurs et Ankyloses rhumatismales, Rhumatisme vertébral.

L'*Ankylosyl* chasse le calcium.

Mode d'emploi. Doses. — La dose moyenne est variable selon les maladies et l'intensité du processus pathologique.

Chaque pilule contient 0 gr. 20 d'Iodure de Strontium.

La majorité des auteurs ont obtenu des améliorations remarquables en donnant de 2 à 10 pilules d'*Ankylosyl* par jour. C'est la dose efficace ordinaire.

Présentation. — Flacon de 40 pilules.

Flacon de 120 pilules pour les traitements prolongés.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro 590-28.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél.: Archives 44-59.)

ANOÏDE

Traitement des hémorroïdes, rectites, prostatites.

Suppositoires, Pommade.

Formule simple. — Carbonate de bismuth, Oxychlorure de bismuth, Oxyde de zinc, Silicate de magnésie (associés à un excipient spécial de consistance adhésive).

Formule composée. — Même composition que formule simple mais en plus : Adrénaline huileuse, Stovaine basique, Menthol.

Administration. — *Crises aiguës* : Suppositoires Anoïde, formule simple. *Cas habituels* : Suppositoires Anoïde, formule composée Pommade Anoïde.

La caractéristique des suppositoires Anoïde est de réaliser un véritable pansement isolant qui entoure l'hémorroïde d'une enveloppe souple et adhésive dont la viscosité empêche tout frottement irritant contre les tissus voisins.

Mode d'emploi. — *Suppositoires* : Un le soir en se couchant. *Crises aiguës* : Un matin et soir.

	Prix : 18 fr. 20)	} Traitement pour 10 jours.
<i>Pommade</i> : Application locale, matin et soir	Prix : 16 fr. 10)	

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie, Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Laborde 12-35.)

ANOREXYL

Composition :

Condurango, Badlane, Colombo, associés à une Vitamine B et à la Génésérine.

Propriétés thérapeutiques :

Provoque l'appétit, stimulant gastrique, régularise les fonctions de l'estomac, calme les troubles du système nerveux sympathique et du plexus solaire.

Indications :

Toutes les inappétences, insuffisances gastriques, Gastropathies douloureuses, Troubles nerveux des fonctions digestives. Pas de contre-indications.

Doses :

Chez l'adulte : XXX à L gouttes, un quart d'heure avant le repas dans un peu d'eau.

Chez l'enfant : au delà d'un an, XII à XV gouttes deux fois par jour un quart d'heure avant le repas, dans un peu d'eau.

Le flacon : 17 fr. 05.

Laboratoire ARMORIL

7 rue de l'Armorique — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 53-70.)

ANTALGYL

du Docteur Moity

Trois présentations :

1° **Antalgyl Cachets.** — Spécifique radical de toute douleur, apaisant neuro-végétatif. Innocuité absolue pour la muqueuse stomacale et l'épi helum rénal. Euphorie rapide.

Formule. — Ether diéthylique de l'urimidopropane (1,3), en combinaison avec la diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone (1,23), 0 gr. 40 par cachet. (Excipient inerte magnésie hydratée Q. S.).

Indications. — Migraines, névralgies, rhumatismes, lumbagos, sciatiques, menstrualgies, coliques hépatiques et néphrétiques, algies post-opératoires. Un cachet d'Antalgyl épargne souvent une piqûre de morphine. Pas d'accoutumance, pas de contre-indications.

Dose. — 1 à 4 cachets par jour. — Prix : 13 fr. 75 la boîte de 12 cachets.

2° **Antalgyl Baume.** — Au salicylate de Méthyle dissimulé et à odeur agréable. Révulsif.

Indications. — Rhumatisme, points de côté, sciatiques, névrites, névralgies, rhume négligé, pleurites, lumbagos, gouttes, torticolis, entorse, foulures.

Formule. — Acide salicylique, 2 gr. Camphre du Japon, 5 gr. Salicylate de méthyle, 10 gr. Ess. de citronnelle, 5 gr. Ess. lavande spicata, 2 gr. Méthane trichloré, 5 gr. Oxyde d'éthyle, 5 gr. Teinture térébenthinée de capsicum, 40 gr. p. 100 cc.

Mode d'emploi. — Frictions légères 3 à 4 fois par jour. Ne pas employer en compresses.

Prix : 14 francs le Flacon de 90 gr. environ.

3° **Antalgyl suppositoire.** — Enfants et nourrissons. 1 à 4 par jour selon l'âge.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire M. DE RIVE

J.-O. MOITY, Docteur en médecine, Dr. en Phlé. Ex. I. H. P.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS.

ANTASTHÈNE CARRION

Composition. — Association de glycérophosphates α et β à un extrait cérébral et spinal.

Formes. — Comprimés, Ampoules de 2 cc.

Indications. — Reconstituant du système nerveux ; particulièrement indiqué dans l'asthénie et tous les états dépressifs quelle qu'en soit l'origine.

Posologie et mode d'emploi :

Enfants : 1 injection tous les 2 jours. 2 comprimés par jour aux repas.

Adultes : 1 injection par jour. 4 comprimés par jour aux repas.

Présentation et prix. — Boîtes de 12 ampoules ou de 50 comprimés : la boîte, 23 fr. 35.

Enregistré au L. N. C. n° 514-3 et 4.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

ANTÉLOBINE

Composition. — Hormone gonadotrope du lobe antérieur de l'hypophyse, physiologiquement titrée. *Pour injections sous-cutanées profondes ou intramusculaires.*

Propriétés thérapeutiques. — Excitant de l'ovaire et du testicule, agit par leur intermédiaire sur l'ensemble du tractus génital.

Indications et posologie. — 1° Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien : aménorrhée, hypoménorrhée, retards de la formation. Prescrire, alors, 1 ampoule quotidienne de 100 unités, 6 jours par mois, de préférence dans la première moitié de la période intermenstruelle ; 2° dans les méno-métrorragies, injecter 100 unités quotidiennes dans la semaine précédant la date présumée des règles ; une fois les règles déclenchées, injecter 250 à 500 unités par jour ; 3° Cryptorchidie, infantilisme masculin, impuissance : pratiquer des séries de 15 à 20 injections de 100 unités, séparées par des périodes de repos de 8 à 10 jours ; 4° Alopécie séborrhéique : 2 à 3 injections de 500 unités par semaine.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. à 100 unités-rat, prix : 58 fr. 35. Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. à 500 unités-rat, prix : 58 fr. 35.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée
Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

ANTÉPARSINE GRÉMY

Composition. — Extrait antéhypophysaire mixte (gonadostimulines).

Titrage biologique. — 1 unité lapin ou 100 unités physiologiques par ampoule.

Indications. — Insuffisance endocrinienne de la puberté. Ectopies testiculaires. Hypofonctionnement ovarien et troubles ménopausiques. Hyperfolliculinémie. Stérilité. Déficiences glandulaires masculines, impuissance, séborrhée, alopécie. Sénilité précoce.

Forme. — Ampoule injectable, par voie sous-cutanée.

Prix. Boîte de 3 ampoules..... 23 fr. 45
— de 5 ampoules..... 35 fr. 65

Enregistré L. N. C., n° 608-70.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 48-43.)

ANTEPSAL INTERNE

Antiseptique intestinal sans égal.

Composition. — Combinaison d'aldéhyde formique et d'hexaméthylène tétramine dans une solution de Mixiod (sel d'oxyquinoléine).

Indications. — Toutes infections et intoxications du tube digestif, Diarrhées, Entérites, Infections des voies urinaires, Fièvres infectieuses, Grippe, Colibacillose et toutes maladies contagieuses.

Forme. — *Gouttes*. Facilité de prescription aux enfants et nourrissons.

Posologie :

Nourrissons..... 20 à 60 gouttes.

Enfants..... 30 à 100 —

Adultes..... 60 à 200 —

par jour dans un liquide quelconque, par doses fractionnées.

Prix : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1703-2.

Laboratoires A. CLANCHE

VARS (Charente). (Tél. : 11.)

ANTHÉMA

Sérum sérique antihémorragique des D^{rs} Dufour et Le Hello.

Médication fondée sur les propriétés coagulantes du sérum d'animaux en état d'anaphylaxie.

Indications. — Hémorragies et États hémorragipares. Hémoptysies. Hémostase préopératoire.

Présentation. — Boîtes de 1 ampoule de 10 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire du contenu d'une ampoule de 10 cm³, à renouveler au besoin après quelques heures.

Prix de vente :

L'ampoule..... 29 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e),

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHIOMALINE

(Antimonio-thiomalate de lithium).

Composé organique titrant 16 % d'antimoine, contenant du soufre dans sa molécule.

Indications. — Lymphogranulomatose inguinale subaiguë (maladie de Nicolas et Favre), Rétrécissement du rectum, Leishmanioses, Kala-Azar, Bouton d'Orient, Bilharzioses vésicale, intestinale, hépatique.

Présentations. — Boîtes de 10 ampoules de 1, 2 et 3 cm³ d'une solution à 6 % de sel. Boîte de 5 ampoules de 4 cm³.

Posologie. — Injections intramusculaires parfaitement tolérées. Séries de 12 à 20 injections (2 ou 3 par semaine).

Adulte : débiter à 0 gr. 03 de sel en augmentant chaque fois de 0 gr. 03 jusqu'à 0 gr. 18 ou 0 gr. 24.

Enfant : Selon l'âge et le poids, réduire les doses de 2 à 5 fois.

Prix de vente :

La boîte d'amp. de 1 cm³. ; 17 fr. 50 ; 2 cm³. : 23 fr. 50 ; 3 cm³. : 29 fr. ; 4 cm³. : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ANTHRASEPTOL

Granulé urotropine, charbon, citrate de soude et magnésie.

Propriétés. — Absorbant, Antiseptique intestinal, biliaire, urinaire, Cholagogue, draine la vésicule. Laxatif léger.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Colite, Appendicite chronique, Cholécystite, Infections des voies urinaires et biliaires, Migraines, Colibacillose, Syndrome entéro-rénal, Angiocholite, Lithiase.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café une heure après le repas, midi et soir.

Prix : 16 fr. 50.

Durée : 10 à 12 jours.

Pharmacie BAUDE

SAINT-AUBERT (Nord).

(Tél. : 16.)

ANTHRAXIVORE

Suc de bardane, extrait de la racine fraîche au moment le plus favorable et stabilisé par procédé spécial (préservation des vitamines).

Indications thérapeutiques. — Furunculose, furunculose des diabétiques, anthrax, phlegmons, abcès, panaris, acnés, eczémas, psoriasis, plaies purulentes, ulcères variqueux, et toutes staphylococcies.

Furunculose. — Traitement d'attaque : 6 cuillerées à soupe par jour ; deux matin, midi et soir immédiatement avant les repas, pendant quatre à six jours. Ensuite, pendant une semaine, une cuillerée à soupe, trois fois par jour.

Dermatose. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir avant les repas, prolonger le traitement suivant la gravité des cas.

Enfants : par demi-cuillerées à soupe.

Nourrissons : par cuillerées à café.

L'*anthraxivore* se prend dilué dans un peu d'eau.

La composition uniquement végétale de l'*anthraxivore* le rend d'une innocuité absolue.

Prix : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1959-3.
Echantillons sur demande.

Laboratoires PICOT,
14, rue du Temple, CALAIS



ANTIALGOS CHRISTIAENS

Spécifique de la Goutte et du Rhumatisme.

Colchicine en solution iodosalicylée donnant à l'analyse élémentaire :

Acide salicylique	3 gr. 50
Colchicine.....	0 gr. 005
Iode	1 gr.

Excipient. Q. S. pour 100 cc.

Dose et mode d'emploi. — Accès : Par 24 heures, 6 cuill. à soupe pleines (100 gr. environ), puis à doses décroissantes. — *Forme chronique* : Une à trois cuill. à soupe, suivant les cas.

Indications thérapeutiques. — Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Lumbago, Sciatique, Névralgie rhumatismale, etc.

Expérimenté à l'Institut Physiologique de Nancy et reconnu sans action secondaire sur le cœur, le rein, le foie et l'estomac. *Calme l'accès en 24 heures.*

Le 1/2 flacon 28 fr. 85

Enregistré au L. N. C. n° 1395-1.

LABORATOIRES DE LA PHARMACIE
DE LA PLACE ROYALE

4, rue Colbert — REIMS (Tél. : Reims 48-34.)
Compte-Postal Paris 182-33. R. C. Reims 14101

ANTI-ASTHÉNIE LAURIAT (Ex-Lauriatol)

Propriétés. — Reconstituant général, accroît le dynamisme des cellules nerveuses, accélère les échanges nutritifs.

Indications. — Dépressions nerveuses, surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, anémie, chlorose, insuffisance de la nutrition, convalescences, pré tuberculose, tuberculose, croissance.

Composition. — Pour un comprimé :

Nucléinate de Manganèse	0, 025
Extrait sec de Noix vomique.....	0, 0025
Salicine cristallisée.....	0, 05
Quassia amara	0, 05
Condurango	0, 05
Glycérophosphate de magnésie.....	0, 05
Phosphate tricalcique	0, 20
Excipient (Talc, Gomme).....	0, 20

Forme et Avantages. — Comprimés dragéifiés inaltérables, pratiques à emporter, aucune saveur désagréable.
Conservation indéfinie.

Posologie :

Adultes : 4 comprimés par jour, soit 2 comprimés 1/2 heure avant chaque repas.

Enfants : au-dessus de 8 ans : 1/2 dose. Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 16 francs la boîte de 60 comprimés.

Laboratoires LAURIAT.

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

ANTI-ASTHME BENGALAIS

Poudre fumigatoire à base de
solanées nitrées, digitale et menthol.

Rétablit l'eupnée. Facilite l'expectoration.

Calme la toux.

Mode d'emploi. — Faire brûler la valeur d'une demi-cuiller à café sur une soucoupe et aspirer doucement la fumée de préférence par les narines.

Indications. — Crises d'Asthme, Emphysème, Oppressions des bronchites chroniques, Catarrhes, Coryza spasmodique, etc.

Cigarettes Schulzé-Bengalais
aux mêmes principes.

Prix de l'étui (poudre) : 12 fr. 80.

La boîte de cigarettes : 6 fr. 40.

L. N. C. n° 474-1 et 2.

Laboratoire FAGARD
LONS-LE-SAUNIER (Jura).

ANTI-ASTHME DEHAUSSY

A chaque variété d'asthme, son traitement approprié.

Médication de fond :

Hypophyse, Surrénale, Euphorbe, Lobélie, Belladone.

Médication complémentaire :

particulière à chaque variété d'asthme.

Anti-Asthme A Iodurée. Asthme sec. Emphysème.

Anti-Asthme B. Balsamiques, expectorants : asthme vieilli avec bronchite chronique et emphysème.

Anti-Asthme C. Iodure-caféine : asthme vieilli avec retentissement cardiaque, dyspnées paroxystiques des vieux scléreux pulmonaires.

Anti-Asthme E. Éphédrine naturelle à donner de demi-heure en demi-heure dès le début de la crise.

L'Anti-Asthme E prévient et juggle la crise.

Posologie : Adultes :

Comprimés : 2 à 3 par 24 heures.

Sirop : 2 à 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants 10 ans : demi-dose.

Prix { Sirop.
Comprimés. } 18 fr. 80

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ANTI-DIABÈTE H

Antidiabétique nouveau sans produits chimiques et sans produits toxiques. Puissant régulateur glycémique. Supprime la glycosurie.

Composition. — A base de *Myrtille*, de *Fabiana* et de *Galéga*.

Indications. — Diabète et toutes ses manifestations et complications : Gangrène, Ulcères, Phlegmons, Asthénie génitale diabétique, Incontinence urinaire, Furonculose, Acné.

Diabète infantile, Diabète des vieillards, Diabète réfractaire à l'insuline, Grossesse diabétique.

Peut s'associer à la médication insulienne.

Aucune contre-indication. Sans intolérance.

Dispense de régime après 6 semaines de traitement.

Présentation. — Une boîte de 20 cm. × 10 cm. pour un traitement de 8 à 15 jours.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Prix : 17 fr. 80.

Traitement très facile à suivre.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

ANTIDIABÉTIQUE MONAVON

A base de kola et sans sucre.

Indications thérapeutiques. — Dans le traitement du diabète, la Kola agit comme un adjuvant qui s'attaque à certains symptômes et qui développe la résistance de l'organisme :

Elle diminue la glycosurie ;

Comme aliment d'épargne, elle agit sur les tissus musculaires en diminuant l'urée, elle agit sur les éléments nerveux en diminuant les phosphates ;

Elle est tonique, reconstituante et lutte contre l'amalgrissement causé par l'excès de désassimilation.

Composition et Mode d'emploi :

Elisir contenant { 0 gr. 30 extrait de kola par verre à
liqueur.
0 gr. 021 saccharine par verre à li-
queur.

1 à 2 verres à **liqueur** après chaque repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Prix public : 20 fr. 75.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmacien

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

ANTIDIABÉTIQUE REQUIS

Extrait concentré glyciné, inaltérable, de Vitamines B et de Diastases végétales.

Composition. — Feuilles de Noyer, Feuilles de Géranium Robert, Myrtille des Vosges, Boldo, Artichaut, Gui, Combretum R, Noix vomique, Arrhéнал.

Propriétés. — Polyurie, Polydipsie, Polyphagie, Acétonurie, Acétonémie, Hyperglycémie, Vertiges, Troubles de la vue, Plaies et dermatoses d'origine diabétique, etc.

Dans les diabètes graves : Auxiliaire précieux de l'insuline à laquelle il convient de l'associer à la dose de 6 cuillerées à café par jour.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour aux repas soit pur, soit additionné d'eau fraîche aromatisée au citron, à l'orange, à la menthe, etc.

Enfants : 1 cuillerée et demie à café au-dessous de 10 ans diluée dans 3 cuillerées à soupe d'eau fraîche ou de lait, à prendre en 3 fois avant les repas du matin, de midi et du soir.

Durée des flacons de vente, à la dose normale de 3 cuillerées à café : 16 à 17 jours.

Prix au public : 32 francs du 1^{er} Mars 1938.

Laboratoire des Antidiabétiques REQUIS

163, boul. de la Croix-Rousse — LYON. (B 87-18.)

ANTI-FLOCULINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRÉPARATION CHIMIOTHÉRAPIQUE
non toxique

DISSOLVANTE DES FLOCULATS

HUMORAUX OU TISSULAIRES

grâce aux propriétés anti-choc de ses 2 éléments solubles
ET

STIMULANTE DE LA CIRCULATION

la faveur de l'action toni-cardiaque de son camphre soluble
pour

TRAITEMENT DES CHOC ANAPHYLACTIQUES

curatif et préventif

PAR

DÉSSENSIBILISATION DE L'ORGANISME

DANS LES MULTIPLES MALADIES D'INTOLÉRANCE

caractérisées par les troubles les plus divers
traduisant des états pathologiques souvent alarmants,
particulièrement des fonctions de la vie organo-végétative.

PRÉSENTÉE sous forme d'AMPOULES INJECTABLES

— COMPOSITION —

Hyposulfite de magnésium pur.....	0 gr. 10
Camphosulfonate de pipérazine.....	0 gr. 01
pour 1 c.c.	

En solution aqueuse..... à pH = 6,7 à 6,9

délivrée en AMPOULES de 5 cc. à 2 pointes.

Chaque ampoule de 5 cc. contient 5 fois les doses ci-dessus.

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

L'Anti-Floculine permet de combattre efficacement tous les syndromes d'intolérance et troubles d'origine sympathique, par stabilisation des humeurs chez les sujets reconnus sensibles à certains agents alimentaires, médicamenteux, microbiens, chimiques, végétaux, etc.

L'Anti-Floculine donne des résultats cliniques très favorables, quelquefois tout à fait inattendus, par exemple dans l'Urticaire, l'Eczéma, les Névralgies, le Coryza, l'Asthme, la Colibacillose, les Dyspepsies, l'Entérite, la Neurasthénie, les Palpitations, etc.

AUCUNE CONTRE-INDICATION

— MODE D'EMPLOI ET DOSES —

L'injection, toujours indolore, se fait dans les muscles (fesse ou cuisse).
Jamais la moindre réaction; toutefois mieux vaut l'injection lente.

DOSES MOYENNES POUR 48 HEURES

ADULTES :

Une injection d'une ampoule de 5 cc. tous les 2 jours (pratiquement trois injections de 5 cc. par semaine) jusqu'à concurrence de 24 injections de 5 cc. au minimum en 2 mois.

Pour la durée du traitement (2, 4 ou 6 mois consécutifs) et pour doses supérieures (5 ou 10 centile. par jour), se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS
4 cc.

ENFANTS
1 à 2 cc.

NOURRISSONS
1/2 à 1 cc.

PRIX AU PUBLIC : 27 fr. 55 LA BOITE de 8 AMPOULES

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPECIALISÉS.

2, rue Claude-Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11.)

ANTIGÉNINES

Vaccins par voie buccale.

500 milliards de microbes par ampoule de 10 centimètres cubes de bouillon-lysate.

Boîte de 6 ampoules de 10 centimètres cubes.

Prix : 26 francs.

Antigénine C. E.

Colibacilles-Entérocoques : Entérite, Appendicite, Syndrome entéro-rénal, Diarrhée infantile.

Antigénine C.

Colibacilles polyvalents : Colibacillose, Pyélonéphrites gravidiques.

Antigénine S.

Staphylocoques polyvalents : Anthrax, Furunculose. Staphylococcies.

Antigénine E. P. S.

Entéro-Pneumo Streptocoques : Grippe et ses complications, Fièvres puerpérales, Angines.

Antigénine T. A. B.

Bacilles typhiques, Para A. et Para B. : Fièvres typhoïde et paratyphoïde.

Posologie. — Donner le contenu d'un flacon-ampoule dans de l'eau sucrée ou dans une infusion aromatisée au gré du malade, matin et soir bien à jeun, une demi-heure au moins avant toute alimentation.

Aux nouveau-nés et enfants : Donner de un demi à un flacon-ampoule, suivant l'âge.

Vaccins par voie hypodermique.

Même série que les Antigénines, vaccins par voie buccale.

Boîte de 6 ampoules Prix : 26 francs.

Faire une injection hypodermique, tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant le cas, en commençant par 1/2 centimètre cube, augmenter de 1/2 centimètre cube chaque jour, jusqu'à 2 centimètres cubes.

Bouillon-Antigénine pour pansements.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 26 francs.

Rhino-Antigénine pour instillation nasale ou otique.

Boîte de 4 ampoules. Prix : 15 fr. 60.

Ovules-Antigénines : métrites et toutes leucorrhées.

Boîte de 6 ovules. Prix : 18 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

1, place Lucien-Herr — PARIS (V^e).

(Anciennement 43, rue Tournefort.)

(Tél. : Gobelins 26-21.)

ANTIGRIPPINE MIDY

Cachets

Poudres d'Aconit, de Belladone, de Gelsemium et de Dower, phénacétine et pyramidon, caféine, codéine (1 centigr. par cachet). Ni quinine, ni antipyrine.

Doses et mode d'emploi. — GRIPPE, aux premiers frissons, prescrire de préférence : 1 cachet vers 17 heures ; 1 cachet vers 21 heures ; 1 cachet le lendemain matin : 1 cachet le lendemain soir, si besoin est, dans une boisson chaude (alcoolisée) ou tisane (verveine ou menthe).

Pour les adultes seulement.

Propriétés thérapeutiques. — Antithermique, Analgésique.

Indications. — État grippal et fébrile, Courbature, Maux de tête, Névralgies, Influenza et complications.

Boîte de 6 cachets. Prix : 8 francs.

Durée du traitement : 3 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

ANTIOMBÉ

Composition. — Mélange d'Extraits Gmet de Fucus, Gui, Hamamélis, Frêne Gmet.

Propriétés. — Fluidifiant sanguin, décongestif, vaso-constricteur, anti-rhumatismal, hypotenseur.

Indications. — Cinquantaine, Ménopause, Troubles de la circulation, Bourdonnements, Vertiges, Céphalée, Arthritisme, Complément de cure d'amaigrissement.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau trois fois par jour. En cure d'amaigrissement, donner progressivement 3, 6, 8, 6, 3 cuillerées à café par jour (pendant cinq semaines).

Prix : Flacon de 210 cc. : 26 fr. 50.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,

27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 43-10.)

ANTIPHI

Puissant reconstituant et hématopoïétique.

Composition. — As organique, Phosphore nucléinique, glycérophosphate, aliments d'épargne.

Indications. — Convalescences, Asthénie, Enfants chétifs, Anémie, Dépressions, Surmenage, Prétuberculeux et tuberculeux apyrétiques.

Formes et Posologie :

Elixir au goût délicieux : après les repas, dans un petit verre à liqueur.

Solution (sans sucre) : au milieu du repas.

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants { 8 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
 { 4 à 8 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Ampoules injectables indolores 2 cc.

Mêmes principes + 0,04 Histidine (Chl) 1 par jour.

Prix : Elixir et solution : 16 fr. 50.

Boîte de 10 ampoules : 30 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 2025.

Laboratoires ANTIPHI

RION-DES-LANDES

ANTIPHLOGISTINE

Composition. — Glycérine, kaolin, petite proportion d'iode, d'acides borique et salicylique, huiles essentielles (menthe, gaulthéria. Eucalyptus).

Propriétés. — Chaleur constante pendant 12 à 24 heures. Cataplasme idéal. Action osmotique et exosmotique de la glycérine agissant à travers la peau sur les liquides organiques chargés de microorganismes qu'elle attire et engloutit.

Indications. — Toutes affections nécessitant l'action d'une chaleur constante ou une lutte contre l'infection interne ou externe : Pneumonies, Pleurésies, Bronchites, Rhumatismes, Gouttes, Phlegmons, Furoncles, Orchites, Mastites, Conjonctivites, Plaies infectées, Gynécologie, etc.

Particularités. — Pâte molle, se délivre en boîtes fer-blanc embouties. Se chauffe au bain-marie, s'applique directement sur la peau ; on recouvre d'ouate. Action manifeste et soins rendus faciles.

Formats et Prix	{	0, 150 grammes :	10 fr. 15
		I, 300 —	19 fr. 25
		II, 450 —	28 fr. 75
		III, 900 —	47 fr. 85
		IV, 2 kg. 300	93 fr. 60
Antiphlogistine gynécologique :			29 fr. 85
Boîte gazez préparées.....			11 fr. 45

Laboratoires de l'ANTIPHLOGISTINE
B. TILLIER, Pharmacien.

11, rue Collange — LEVALLOIS (Seine.) — (Tél. : Péreire 06-77.)
N° 57 du Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

ANTIPHMYIQUE VADAM

Ampoule injectable de 1 cc. 5.

Composition. — Cholestérine, eucalyptol, essence de Niaouli, gaïacol, cinnamate de benzyle, iode, huile, Q. S. pour 1 cc. 5.

Présentation :

Formule C-3 : directement injectable.

Formule C-10 : injectable après avoir laissé l'ampoule pendant 1 minute dans l'eau bien chaude, pour dissoudre la cholestérine en sursaturation.

Boîte de 12 ampoules. Prix : 22 francs.

Indication. — Chimiothérapie anti-infectieuse pulmonaire, suppurations bronchiques, toux, grippe, tuberculose.

Posologie. — 1 injection intra-musculaire ou sous-cutanée tous les jours.

Laboratoires DIDRY

JANVILLE (Eure-et-Loir).

ANTIPIOL

Vaccin filtrat antipyogène polyvalent.

Immunisation locale suivant la méthode de Besredka.

Quatre formes :

- 1° Pommade pour pansements non adhérents.
- 2° Ampoules de 10 cc. pour compresses.
- 3° Ampoules de 1 cc. pour oto-rhino et oculistique.
- 4° Ovules pour gynécologie.

Indications. — Furoncles, Phlegmons, Abscesses, Plaies infectées, Plaies variqueuses, Ostéomyélites, Gercures des seins, Crevasses et toutes blessures ou maladies de la peau, Affections gynécologiques.

Prix :

Pommade, amp. de 10 cc. et amp. de 1 cc. 14 fr. 35
Ovules..... 21 fr. 50

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

ANTIRRHOÏDE

Huile indienne : *Balaninum*, *Lentiscum*.

Myagrium, *Laurinum*, *Spirea*, etc.

Indications. — Traitement des hémorroïdes.

Mode d'emploi. — On nettoie à l'eau tiède les parties à soigner et on sèche avec du coton hydrophile ou un linge fin, puis on imbibe largement avec l'huile ANTIRRHOÏDE la pulpe de l'index et l'on promène ce doigt ainsi mouillé sur les ampoules et bourrelets extérieurs d'abord, puis à l'intérieur du rectum, en exerçant un léger massage, lentement. L'opération doit durer de cinq à six minutes.

Les applications doivent être faites sans oubli, avant et après chaque garde-robe.

Pour les hémorroïdes internes, employer les SUPPOSITOES ANTIRRHOÏDES qui, plongés dans l'huile antirrhoïde, doivent être introduits lentement, le malade couché sur le côté et les jambes repliées.

Le grand flacon : 27 francs. — Le demi-flacon : 15 fr. 50.

La boîte de suppositoës : 12 fr. 50.

Laboratoires BELIÈRES

10, rue Drouot — PARIS (IX°).

ANTISCIATIQUE P. CHAMBON

Indications. — Traitement étiologique du *Rhumatisme chronique* de la *Sciaticque*, du *Lumbago* et des différentes manifestations de l'*Arthritisme*. Aucune contre-indication.

Composition. — Association de métaux ionisés catalyseurs d'oxydation (manganèse, magnésium, calcium, nickel, fer et excipient lactosé).

Forme. — Paquets de poudre soluble dans l'eau.

Mode d'emploi très important. — Sept petits paquets par jour d'heure en heure, ou de demi-heure en demi-heure, sans discontinuer, malgré les repas ; chaque paquet dissous dans une cuillerée à soupe d'eau.

Boîte ordinaire (5 jours de traitement)..... 15 fr. 90

Triple boîte (12 jours de traitement)..... 37 fr. 15

Boîte cure (21 jours de traitement)..... 55 fr.

La triple boîte et la boîte-cure renferment de gros paquets, spécialement dosés pour le flacon gradué contenu aussi dans ces boîtes : le malade fera dissoudre un paquet dans le flacon plein d'eau et absorbera toutes les heures pendant 7 heures, ou toutes les demi-heures pendant 3 heures et demie, une cuillerée à soupe de cette solution.

Laboratoires CHAMBON

place Francheville — PERIGUEUX
(Tél. : 4-43.)

ANTISEPTIC LADIV

Puissant analgésiant, Décongestif, Kératinisant.

Formes : Solution concentrée, Pommade, Ovules, Suppositoires, Bougies, Crayons.

Formules :

Solution concentrée : Sel marin : 12 gr., Sol. Chlorure de Zinc à 1,31 : 23 gr., Formol : 1 gr., Acide Chlorhydrique pur : 70 centigrammes, Glycérine : 3 gr., Eau, Q. S. P. 100 grammes.

Pommade : Solution concentrée : 4 %, Vaseline-Lanoline : 96 %.

Suppositoires, Bougies, Crayons : Solution concentrée : 2 %, Beurre de cacao : 98 %.

Propriétés thérapeutiques : Gynécologie, Maladies Vénériennes, Dermatoses, Hémorroïdaires, Prostatite, Rhinologie, Stomatologie.

ÉTATS UTÉRO-OVARIENS (Nouvelle thérapeutique interne, voir Communication à l'Académie de Médecine du Professeur H. VIGNES, séance du 21 mars 1939, sur l'action du Zinc sur les états Utéro-ovariens.)

Posologie : *Gynécologie :* Solution concentrée : 2 %. Eau : 98 % (une cuillerée à soupe par litre d'eau) à 37°, en injections vaginales. Le soir un Ovule Ladiv. (Solution concentrée 2% sans formol.)

Dermatose : Pommade Ladiv, appliquée en frictions.

Hémorroïdes, Prostatites : Pommade dans le Sphincter, le soir après évacuation, un suppositoire Ladiv à conserver.

Bougies uréthrales, Crayons utérins : Demander littérature.

Prix :

Antiseptique Ladiv : Grand flacon : 21 francs. — Pommade Ladiv : 15 fr. 75.

— Ovules, Crayons Ladiv : 21 francs. — Suppositoires Ladiv : 31 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1914-1.

Laboratoires LADIV

Pharmacie des Archives. — A. VIDAL, Pharmacien,

36, rue des Archives — PARIS (IV^e). — (Tél. : ARC. 95-66.)

Chèques Postaux : Paris 2229-29.

ANTISEPTOMA

Spécifique des affections gastro-intestinales, complétant le pouvoir absorbant du *Charbon activé*, par l'adjonction de *Salicylate d'Urotropine* et de *Benzonaphthol*.

Forme. — Granulé sucré et anisé.

Indications. — Fermentations intestinales, dilatation d'estomac, aérophagie, ptose abdominale, pyrosis, Etats préulcéreux, insuffisance biliaire, cholécystite, colibacillose, intoxications.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café après le repas.

Prix : 14 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1403-1.

L. ROBERT, Pharmacien.

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 70.)

ANTI-URIQUE

de Contrexéville.

Citrate sodique de Pipérazine..	4 p.	100
Héxaméthylène-tétramine	1	—
Benzoate de soude	5	—

Indications. — Lithiase, Gravelle, Goutte, Obésité, Artériosclérose, Rhumatisme déformant et chronique.

Forme. — Granulés.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à dessert par 24 heures dans un verre d'eau immédiatement avant les repas.

Prix : 15 fr. 30 (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

ANTIVIRUS

Bouillons-Vaccins filtrés, pour pansements spécifiques antimicrobiens.

Antivirus colibacillaire. — Antivirus staphylococcique. — Antivirus streptococcique. — Antivirus mixte (strepto-staphylococcique).

Antivirus polyvalent (pneumo-strepto-staphylo).

En boîtes de 3 ampoules 10 cc. Prix : 12 fr. 75.

— de 12 — 4 cc. — : 21 fr. 20.

— de 6 — 4 cc. — : 10 fr. 60.

Antivirus puerpéral (streptococcique).

En boîtes de 2 ampoules 50 cc. Prix : 21 fr. 20.

Antivirus gonococcique (Gonolyt).

En boîtes de 6 ampoules 10 cc. : 25 fr. 25.

Antivirus typhique.	{	1 boîte de 1 ampoule rectale de
		125 cc. : 21 fr. 20.
		1 boîte de 2 ampoules buccales de
		50 cc. : 21 fr. 20.

Atoxicité absolue.

Conservation indéfinie en ampoules scellées.

Antivirus mixte en pommade (Arapal) :

10 fr. 60 et 5 fr. 30,


H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Produits de « La BIOTHÉRAPIE »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaug. 11-23.)

ANURIQUE DUPLEX

Composition :



Indications. — Incontinence d'urine infantile, Chorée, Sommeils agités et Tics nerveux de l'enfance.

Mode d'emploi :

De 3 à 4 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 4 à 5 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 5 à 7 ans : 4 cuillerées à café par jour.

De 7 à 9 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

De 9 à 15 ans : 2 à 3 cuillerées à bouche par jour.

(Au début des 3 repas et au coucher.)

81 à 85 p. 100 de guérisons dans l'Incontinence d'Urine infantile.

Prix : 30 fr. 60.

Durée d'une unité: environ 8 jours.

Laboratoires DREYER-DUFER

NOGENT-SUR-MARNE (Seine).

(Tél. : Tremblay 0-17.)

Échantillon sur demande.

ANUSOL

Composition. — Suppositoires et pommade anti-hémorroïdaires à l'iodorésorcinosulfonate de bismuth.

Indications. — Traitement rationnel, efficace et sans danger des hémorroïdes, rectites, fissures, érosions et états inflammatoires de la muqueuse anale, prostatites, congestion de la prostate. L'Anusol calme les douleurs, arrête le saignement, décongestionne et cicatrise.

Mode d'emploi. — Cas aigus : un suppositoire matin et soir ; applications de pommade sur les muqueuses anales externes.

Traitement d'entretien : un suppositoire tous les soirs, puis tous les deux soirs à garder pendant la nuit.

Prix : 18 fr. 80 la boîte de suppositoires.

18 fr. 80 le tube de pommade.

Enregistres au L. N. C. M. sous les N° 150-5 et 150-6.
Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85 - 16-86.)

En Belgique : **LABORATOIRES SUBSTANTIA**

53, rue du Poignon — BRUXELLES.

ANXIOL (comprimés)

Forme pharmaceutique et composition :

Ephédrine naturelle (chlorh.).	0,01	Extrait d'Euphorbia.....	0,02
Hypophyse.	0,02	— de Cratægus ..	0,02
Belladone stabilisée	0,01	— de Scille	0,005
Phényléthylmalonylurée			0,01

pour 1 comprimé. (Flacon de 30 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Synergie médicamenteuse permettant de rétablir l'*Equilibre humoral* par une action simultanée, légèrement *Excitante* sur le *Sympathique* et *Inhibitrice* sur le *Pneumogastrique*. L'association éphédrine-hypophyse a l'avantage d'une action *rapide* et *durable* par la voie *buccale*.

Indications thérapeutiques. — *Asthme bronchique*, *Emphysème*, *Dyspnées asthmatiformes*, *Rhume des foins*, *Vertiges*, *Migraine*, *Hypotension* avec état dépressif. *Spasmes viscéraux*, *Dysménorrhée*, *Petit mal* des rayons X. *Allergies diverses*.

Mode d'emploi. — 4 à 8 compr. par jour chez l'adulte ; 1 à 2 compr. par jour chez l'enfant au-dessus de 5 ans ; 1 à 4 compr. par jour chez l'adolescent. Chez l'asthmatique, 2 compr. à jeun le matin, 2 le soir et 2 en cas de menace de crise. Débuter par des doses faibles chez les individus à tension un peu élevée.

Prescription (strictement médicale). — 1 étui comprimés *Anxiol Falvy*.
Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Par.s.
40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

APAROXAL

Traitement de choix de l'Épilepsie,
adopté par les asiles.

Phényléthylbarbiturate d'hyoscyamine.

Boîtes de 20 cachets, en 3 dosages :

Aparoxal formule E, pour enfants, à 0 gr. 05 ;

Aparoxal formule A, pour adultes, à 0 gr. 10 ;

Aparoxal formule M, dose massive, à 0 gr. 17.

Indications. — Toutes les épilepsies.

Posologie. — Régulièrement et sans interruption, 3 à 4 cachets par jour, bien répartis dans la journée. Réduire la quantité d'eau et de sel alimentaires. Six mois après la dernière crise, commencer une diminution de 5 cgr. par semestre.

Documentation et littérature au

Laboratoire de l'APAROXAL

7, allée du Midi — COURBEVOIE (Seine).

APHOSAL

Spécifique de l'insomnie
chez les cardiaques, les dyspeptiques, les surmenés.

Composition. — Chloralose chimiquement pur, préparé d'après les travaux des professeurs Ch.-Richet et Hanriot.

Présentation. — Tube de 12 cachets de 20 centigr.

Propriétés thérapeutiques. — Procure un sommeil réparateur, sans cauchemar, avec réveil agréable. Non toxique ; sans action sur le rein ni l'estomac. Tonique du cœur.

Posologie. — Un cachet dans un verre d'eau ou d'infusion avant le coucher.

Enregistré au L. N. C. n° 134-1

Prix : 10 fr. 50.

Laboratoire de l'APHOSAL

48 bis, avenue Mozart — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 13-81.)

APIOLINE de CHAPOTEAUT

Composition. — L'Apioline est le principe actif des graines de l'*Apium petroselinum*. Sa préparation rationnelle ainsi que sa pureté en font un produit efficace et *sans danger*.

Propriétés. — Emménagogue, régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée, aménorrhée, troubles de la puberté et de la ménopause.

Présentation. — Capsules dosées à 20 cgr. d'Apioline.

Posologie. — 2 à 3 capsules par jour à prendre au moment des repas, 4 à 5 jours avant l'apparition des règles. Continuer cette dose pendant la durée de l'écoulement mensuel.

Effectuer une cure de consolidation le mois suivant et le troisième mois si nécessaire.

Prix : 17 fr. 40 le tube de 20 capsules.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, Successeurs

8, rue Vivienne — PARIS (II^e).

(Tél. : Gut. 27-03.)

APIOL TANIT

Composition. — Capsules d'Apiol jaune pur dosées à 0 gr. 25.

Indications thérapeutiques. — Emploi habituel de l'Apiol. Règles douloureuses et irrégulières.

Mode d'emploi. — Pendant les quatre jours qui précèdent les règles, prendre matin, midi et soir, une capsule d'Apiol Tanit dans une infusion chaude de *Tisane Tanit*. Cette dose peut être doublée si nécessaire.

Prix : 15 francs.

ROUANET, Pharmacien
ANTIBES (Alpes-Maritimes).

Approvisionnement pharmaceutique O. C. P.
et Grossistes.

APIVÈNE

Composition. — *Solution injectable* de venin d'abeilles désalbuminée et titrée.

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc. titrées à 1,5 US et 1 ampoule titrée à 0,15 US (ampoule jaune).

Propriétés thérapeutiques. — Action antalgique due à une « neurotoxine ». Action antirhumatismale.

Indications. — Sciatiques, radiculites, névralgies, névrites rebelles, zonas, etc. Rhumatismes chroniques ou déformants, lumbagos.

Mode d'emploi. — Pratiquer l'injection en totalité de l'ampoule jaune (ampoule à 0,15 US). Puls tous les 3 jours pratiquer une injection intramusculaire ou sous-cutanée (autant que possible *in loco dolenti*) en commençant par 1/4 et augmentant la dose par 1/4 jusqu'à 1 cc.

Il faut en général 6 injections pour une sciatique et 12 pour les rhumatismes chroniques.

Apivène Onguent. — (Association des salicyliques et de l'Apivène.) Traitement des Algies et des Rhumatismes par voie externe.

Prix : 15 fr. 30 le tube de 35 grammes.

Préparé par les LABORATOIRES PORSIN
39, rue Claude-Bernard — PARIS (V*). Tél. : Gob. 80-34.

APPETYL

Gouttes apéritives à base d'extraits fluides stabilisés de : Gentiane, Simarouba, Condurango, Colombo et Camomille. Extrait délipoldé de muqueuse gastrique. Saveur agréable (framboise).

Donne de l'appétit. — Aide la digestion.
Favorise l'assimilation des médicaments.

Ne contient ni AS ni P.

Posologie :

Flacon contenant 1.000 gouttes. 1/4 d'heure avant les repas sur un morceau de sucre ou dans de l'eau sucrée.

Adultes : XX à XXX gouttes.

Enfants : à partir de 1 an : I à 2 gouttes par année d'âge.

Aucune contre-indication.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires de l'APPETYL

37, avenue de la République — PARIS (XI^e).

APSOPHOL

Composition. — Agents nervins, antispasmodiques et sédatifs, à l'exclusion des iodures et de tout alcaloïde stupéfiant.

Indications. — Spécifique contre les bourdonnements d'oreilles, sifflements, battements et tous bruits subjectifs d'oreilles, avec ou sans vertiges.

Mode d'emploi. — Uniquement chez l'adulte. XXX gouttes matin et soir dans un peu d'eau ou de tisane 1/4 d'heure avant les repas. Après 8 jours de traitement, prendre XL gouttes matin et soir. Cure de 15 jours environ.

Echantillon sur demande.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire de l'EDISTOL.

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
40, rue des Carmes — ORLEANS (Loiret).

AQUINTOL-MIALHE

Sirop à base de Chloro-Bromo-Fluor.

Spécifique de la Coqueluche. Des Toux spasmodiques et coqueluchoïdes. Calme la toux des Bronchites chroniques. Aucune toxicité, goût agréable, guérison rapide.

Dès les premiers jours, la toux est modifiée, le malade n'éprouve plus ni suffocation, ni vomissement et il retrouve l'appétit et le sommeil.

Doses :

Au-dessus de 6 mois : 2 à 4 cuillerées à café.

Moins de 5 ans : 3 à 8 cuillerées à café.

Moins de 15 ans : 4 à 8 cuillerées à dessert.

Adultes : 5 à 8 cuillerées à soupe.

Deux flacons sont en général nécessaires pour éviter la rechute.

L. N. C. M. n° 417.

Conservation indéfinie.

N. B. — Pour la commodité du traitement, cette médication peut être prise sous forme de gouttes. Voir *Acoqtol*.

Prix : 21 fr. 20.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (II^e).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

ARAPAL

Bouillon-Vaccin en pâte molle, non grasse, contenant 75 p. 100 d'Antivirus Strepto-Staphylococcique Mixte de *La Biothérapie*.

Son excipient non gras évite toute macération et cloisonnement des exsudats.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Pyodermites, Plaies infectées, Brûlures, etc.

Présentation. — En tubes.

Grand modèle : 10 fr. 60.

Petit modèle : 5 fr. 30.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

ARCICA

Composition. — Ampoules buvables renfermant par dose cinq cgr. de méthylarsinate de sodium associé à tous les principes actifs, tanniques et toniques, de la coca, cola, cannelle et du condurango.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant dans toutes les asthénies, Stimulant de l'organisme.

Indications. — Nutrition défailante ou déficiente, Suites postopératoires, suites d'accouchement, Convalescence, Surmenage, Anémie, Rachitisme tardif, Neurasthénie, Lymphatisme, Diabète.

Nota bene. — L'Arcica est un médicament concentré que le malade peut prendre pur ou additionné, à son goût, de vin liquoreux ou d'eau sucrée.

Dose journalière. — Le contenu d'une ampoule avant le repas de midi. Chez les personnes très anémiées, ou chez les enfants (au-dessus de 12 ans seulement), une demi-ampoule.

Prix : 23 fr. 30 la boîte de 10 ampoules.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18)

Préparateur des SUPPOGLANDINES

ARG-EPH (GOUTTES)

Gouttes nasales.

Composition :

Argyrol de Barnes	3 gr. 33	} pour 100 grammes.
Chlorhydrate d'éphédrine naturelle .	0 gr. 25	

Présentation. — Solution. En flacon de 10 grammes.

Indications. — Coryza aigu et chronique. Sinusite, Catarrhe du rhino-pharynx, Rhume des Foins, Céphalées d'origine nasale, Surdité par catarrhe du rhino-pharynx. Congestion des trompes d'Eustache et dans tous les cas où une désinfection nasale s'impose.

Posologie. — *En gouttes.*

Comme préventif. *Adultes :* IV gouttes. *Enfants :* II gouttes dans chaque narine, matin et soir.

Comme curatif. *Adultes :* IV gouttes. *Enfants :* II gouttes dans chaque narine, 4 fois par jour.

En pulvérisations. — 4 fois par jour avec pulvérisateur de modèle ordinaire.

Autres indications. — Toutes affections oculaires : Conjonctivites, Blépharites, Kératites, etc., 1 goutte dans chaque œil 2 à 4 fois par jour,

Prix : 15 fr. 90.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 783-3.

R. CUNIASSE, Pharmacien,

6, place des Ternes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 39-93.)

ARGOCARBINE

Cachets contenant :

Charbon activé 0 gr. 35
Argent Métal fixé 0 gr. 00875

Pouvoir (Oligodynamique) bactéricide de l'Argent métal insoluble dynamisé par ionisation du liquide véhiculant le support avec lequel il est en contact par une surface immense.

**Fièvres intestinales, Colibacilloses,
Fermentations.**

Dose. — 3 cachets par jour. Aucune toxicité.
Boîte de 30 cachets : 18 fr. 75.

Laboratoire AXOS

A. BOUNIOL, Pharmacien,

3, rue Sarrette — PARIS (XIV^e).

ARGYBIL

Composition. — Complexe d'Argyrol de Barnes (Vitellinate d'argent) et de bile.

Présentation. — Liquide.

Indications. — Traitement de l'ozène, infections aiguës ou chroniques des fosses nasales et du rhino-pharynx. Donne d'excellents résultats en association avec le vaccin local.

Mode d'emploi. — Par le médecin traitant : Badigeonnages. Pour le malade : prescrire en pulvérisations : 2 à 3 coups de poire dans chaque narine, 2 ou 3 fois par jour.
Prix : 15 fr. (Traitement pour 1 mois.).

LANCOSME, 71, Av. Victor-Emmanuel III.

PARIS (VIII^e). (Tél. : Élysées 17-46.)

ARGYCUPROL

Association stable d'argent colloïdal 10 p. 100
et de cuivre colloïdal 0,1 p. 100.

Activité remarquable. Tolérance parfaite.

Forme — Boîte de 6 ampoules injections.

Mode d'action :

L'Argent : Spécifique du Gonocoque.

Le Cuivre : attaque les microbes associés que n'atteint pas l'argent.

Avantages. — Action polyvalente. Aucune causticité. Ne provoque pas de rétrécissement en raison de son action kératolytique sur l'Épithélium de la muqueuse.

Indications :

Chez l'homme : Blennorrhagie aiguë (traitement abortif). Guérison très rapide. Blennorrhagie chronique et ses complications. (Instillations uréthrales, grands lavages.)

Chez la femme : Blennorrhagie aiguë ou chronique. Affections gynécologiques (gonococciques ou simples) : Métrites, vulvo-vaginites, salpingites, etc... (Injections-Tampons.) Ophtalmologie. Dermatologie.

Prix : 21 fr. 20 la boîte de 6 ampoules-injections.

Laboratoire de l'ANGIOLYMPHE

4 bis, rue Hébert — COURBEVOIE.

MORO, Pharmacien de 1^{re} classe.

15, avenue de la Défense — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Défense 12-11.)

ARGYRESCINE MARS (dite VEINOMARS)

Tire son nom de l'Argyrescine, l'alcaloïde le plus actif
du marron d'Inde.

Composition. — Extrait physiologique de Marron d'Inde, extrait d'hamamélis, de noix vomique, etc...

Indications. — Toutes affections ayant pour origine une mauvaise circulation et l'inflammation des veines.

Mode d'emploi. — Dose normale, X gouttes deux fois par jour aux repas. Dans le cas de crise aiguë d'hémorroïde, donner XV gouttes toutes les dix minutes jusqu'à cessation de la douleur, puis continuer à la dose normale. Chez la femme enceinte, X gouttes deux fois par jour en cas de varices, hémorroïdes, lourdeurs des jambes.

Résultat. — Disparition en quelques heures de tous ces troubles.

Contre-indications. — Néant.

Remarque. — Dans tous les cas, faire prendre l'ARGYRESCINE MARS en gouttes, la pommade ne servant qu'à hâter la guérison des ulcères et des hémorroïdes, si elle est employée en même temps.

La pommade n'est employée seule que pour les engelures.

Échantillons sur demande.

Prix. Gouttes ou pommade : 18 francs.

Le flacon contient 600 gouttes environ;

Enr. au L. N. C. sous Nos 1649-1 et 1649-2.

Laboratoire MARS — GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22

Et chez tous les grossistes.

ARGYRINE

Principe actif du Marron d'Inde.

Forme. Composition :

Granules : Argyrine, cinq milligrammes; **Pommade Suppositoires :** Argyrine associée au benjoin et au Borate de soude. Ni belladone. Ni adrénaline.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et vaso-constricteur rapidement efficace dans les douleurs et hémorragies hémorroïdaires.

Apporte un soulagement et une amélioration durables dans les troubles circulatoires.

Mode d'emploi. — Granules : 1 à 2 avant chacun des 3 principaux repas.

Suppositoires : 1 le soir au coucher.

Pommade : en onction, le soir de préférence.

Prix :

Granules 15 fr. 50
Suppositoires et Pommade .. 14 fr. 50

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 32-88.)

ARGYROPHÉDRINE

Gouttes nasales.

Composition. — Argylol de Barnes, Chlorhydrate d'Ephédrine naturelle, en solution isotonique stabilisée par procédé spécial.

Présentation. — 3 dosages. Ephédrine. Argylol.

Solution faible..... 1/2 p. 100 1 p. 100.

— normale 1 — 1 —

— forte 3 — 1 —

Indications. — Rhinites aiguës, rhinites chroniques, asthme, rhume des foins et tous les cas nécessitant une désinfection nasale parfaite.

Posologie. — En pulvérisations, cinq fois au moins par jour, avec tout pulvérisateur ou vaporisateur ordinaire.

En gouttes, le contenu d'un demi-compte-gouttes dans chaque narine, 5 fois par jour.

Prix : 17 fr. 40.

Laboratoire de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 17-37.)

ARGYSEPTINE

Granulé.

Affections gastro-intestinales et biliaires.

Indications. — Infection gastro-intestinale ; toutes intoxications ; Diarrhées ; Flatulences ; Intoxication alimentaire ; Affections gastriques ; Dyspepsies ; Dilatation d'Estomac ; Aérophagie ; Infection biliaire ; Lithiase biliaire ; Hépatisme ; Cholécystite ; Eczémas ; Prurits.

Formule :

Argent colloïdal	0,30
Charbon activé	5
Charbon animal	5
Urotropine	1,50
Extrait de belladone	0,025
Soufre colloïdal	1
Magnésie calcinée	2
pour 100 gr. granulé.	

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café au moment des repas. A croquer ou à délayer dans un peu d'eau ou d'infusion.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX

ARHÉMAPECTINE GALLIER

Hémostatique « per os » et injectable.

Admis dans les hôpitaux de Paris. Adopté par les Services de Santé de la Guerre et de la Marine.

Solution isotonique, stérile, non toxique, non anaphylactisante, de *Pectine* associée à son coferment minéral (calcium).

La *Pectine*, agent hémostatique vrai, augmente le pouvoir coagulant du sang, sans provoquer de modification de la tension, sans action sur les fibres musculaires (H. Violle et L. de Saint-Rat, *C. R. Ac. Méd.*, 4 nov. 1924).

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 4 ampoules de 20 cc. Prix ... 25 fr.

Boîte de 2 ampoules de 20 cc. — ... 15 fr.

Indications. — Toutes hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Métrorragies, etc., Hémorragies post-opératoires, etc., et à *titre préventif* : Chirurgie générale et spéciale, oto-rhino-laryngologie, odontologie, obstétrique, etc.

Posologie. — *Chirurgie* : 1 à 4 ampoules, dans un peu d'eau sucrée ou aromatisée, durant les 10 heures qui précèdent l'opération, et, après l'opération, 1 à 3 ampoules en 2 heures.

Médecine : dans les hémorragies faibles, 1 à 4 ampoules en 24 heures à 2 heures d'intervalle ; dans les hémorragies prononcées, 1, 2 ou 3 ampoules à 20 minutes d'intervalle et une 4^e ampoule 1 heure après l'ingestion de la précédente.

Dans les cas d'urgence : en injections intramusculaires ou intraveineuses, à raison de 5 cc.

S'emploie aussi par voie rectale.

Petite chirurgie, stomatologie : en application locale.

Ne présente aucune contre-indication.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, pl. du Présid^t-Mithouard, PARIS (VII^e).

(Tél. : Suffren 46-57.)

ARHÉOL

$C^{15}H^{14}O$

Principe actif de l'essence de Santal.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et analgésique puissant dans toutes les affections gonococciques des voies urinaires. Produit chimiquement pur, n'occasionnant aucune des douleurs provoquées par l'essence de Santal. Aucune toxicité.

Indications. — Blennorrhagie et blennorrhée, cystite, urétrites, pyélites, pyélo-néphrites.

Forme. — 1° 40 capsules à 0 gr. 18 — 10 à 12 par jour en trois fois.

Le flacon : 20 fr. 50.

2° : Flacon de 40 capsules de 0 gr. 50 pour la cure à haute dose associée aux lavages : 12 capsules par jour en trois fois et trois heures avant ou après les repas.

Le flacon : 40 fr. 50.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 24-52.)

ARHINE LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène digalacol tannin. Composé chimiquement défini, ni toxique, ni caustique.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur et désodorisant.

Indications. — Réalise la véritable thérapeutique causale de l'Ozène, en fait disparaître la fétidité et les croûtes, tonifie la muqueuse. Excellent agent curatif du *coryza*, des *rhinites* et *rhinopharyngites*.

Mode d'emploi. — On l'utilise soit en *insufflations*, soit en prises : matin et soir dans l'ozène, après lavage à l'eau bouillie ou boriquée tiède ; 2 ou 3 fois par jour et le soir au coucher dans les *coryzas*, *rhinites*, *maux de gorge*.

Prix : 20 fr. 65.

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

ARISTARGOL

Association 9 parties Ichtyol, 1 Argent colloïdal, Antiseptique, Décongest., cicatrisant. Résolutif. Non caustique.

Ovules à 1 % (Pansem. vag.).

Poudre à 1 % Alcaline (Inject. gynécologie, toilette, yeux, O. R. L.).

Pommades :

Aristargol à 10 % : Dermatologie-Gynécologie.

Aristargol Stovaïne : Antihémorroïdale (1 % de stovaïne).

Prix de vente au public : 16 fr. 40.

Enregistré an L. N. C. M. n° 33-4, 5, 6, 7.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer, — SAINT-MANDÉ
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

ARISTOPLASTIC

Aristoplast élastique.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 510-15.

Composition. — Pansement instantané, antiseptique, élastique. Agents antiseptiques : Biiodure de mercure, Sulfonaphtalène Azonaphtol disulfonate de Sodium.

Avantages. — Facilite la formation du tissu cicatriciel. En effet, grâce à un procédé couvert par des brevets que la Maison Vigier a pris en France et à l'étranger, ce pansement instantané combine l'indépendance absolue de la compresse médicamenteuse recouvrant la plaie, au maximum d'élasticité du tissu élastique qui supporte la compresse. L'aération de la peau saine, au voisinage de la plaie, se fait librement. Antiseptique de puissance extrême, sans contre-indication.

Indications. — Pansements au voisinage des articulations.

Présentations :

Boîte métallique 6 pansements. Coffret : 3 bandes de 1 m. Boîte contenant des bandes de 0,25, 0,50 et 1 mètre ; en largeur de 4 et 7 centimètres.

**Anciens Etablissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie**

9, r. de la Gare — LEVALLOIS-PERRET (Per. 57-41.)

ARKÉBIOS

Composition. — Soluté concentré, stabilisé, d'ACIDE PHOSPHORIQUE et de phosphates de : Calcium, Magnésium, Potassium et Sodium.

Cette préparation correspond au tiers de son poids d'Acide Phosphorique total en un mélange équilibré de 1/5 à l'état libre et 4/5 sous forme de combinaisons monométalliques.

Ne contient ni Fer, ni Manganèse, qui sont de puissants antifixateurs du Calcium.

Indications. — Puissant régénérateur polyvalent des forces vitales, Reminéralisant, Recalcifiant, Toutes dépressions morales et physiques, Asthénies, Anémies nerveuse, somatique, musculaire. Surmenages, Nervosisme, Spasmes nerveux, Convalescence, Rachitisme, Etats prénéoplasiques, Colibacillose, Aérophagie.

Présentation. — Gouttes, en un flacon de 40 centicubes.

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas ; ou bien LXXX gouttes en une fois, le matin à jeun. Ces doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Enfants : II gouttes par année d'âge, dans un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Flacon de 40 cc; Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e).

(Tél : Suffren 46-57.)

ARMANITE

Manganite d'Argent $\text{Ag}^2\text{O}^2\text{MnO}^3$.

Bactéricide non toxique kératoplastique.

Armanite colloïdal. Solution fluide 1 p. 100. Flacon de 100 gr.

Abortif et curatif des Urétrites gonococciques.

Armanite. Suspension aqueuse 0,5 et 1 p. 100. Flacon de 100 gr.

Gynécologie, Chirurgie, Dermatologie.

Armanite Ovules-Suppositoires. Boîte de 10.

Métrites, Cervicites, Rectites.

Armanite Pommade. Tube de 25 gr.

Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies atones.

Armanite Poudre.

Chirurgie. Pulvérisation vaginale, utérine et rectale.

Armanite Injections préparées.

Tubes à canule de 4 cc. Boîte de 5 tubes.

Armanite Prophylaxie.

Tubes à canule de 2 cc. Boîte de 3 tubes.

Laboratoires de l'ARMANITE

J.-C. PERROTIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

3, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e). Tél. : Did. 00-53.

ARQUERITOL LESURE

1° Huile injectable d'amalgame d'argent
à 40 p. 100 de mercure.

Mode d'emploi. — Identique à celui de l'huile grise : une injection intramusculaire par semaine, correspondant à 8 ou 9 centigrammes Hg.

Indications. — Toutes manifestations syphilitiques.

Avantages. — Injection non douloureuse, tolérance parfaite grâce à l'action de l'argent, et à son effet favorable sur l'assimilation du mercure.

Adopté par l'Assistance publique.

Flacon de 5 gr. pour une série de 6 à 8 piqûres :
26 francs.

Se fait aussi au titre de 16 p. 100

2° Suppositoires d'Arquéritol.

Pharmacie VIGIER-LESURE

70, rue du Bac — PARIS. Tél. : Littré 99-74.

ARRHÉNAL ADRIAN

Méthylarsinate de soude chimiquement pur.

Présentation. — a. Gouttes.

b. Ampoules à 5, 10 et 20 centigr. c.) Granules à 1, 2 et 5 centigr.

d. Comprimés à 25 milligrammes.

Indications thérapeutiques. — Préparation permettant la thérapeutique arsenicale intensive par voie buccale. Tuberculose, asthme, bronchite chronique, Maladies consomptives, chlorose, scrofule, anémie, maladies de la peau, fièvres paludéennes.

Posologie. — Gouttes dosées à 2 milligr., 12 à 30 par jour, Ampoules, 1 à 2 par jour. Granules, 1 à 3 par jour. Comprimés, 1 à 3 par jour.

Gouttes et ampoules..... 21 fr. 30

Granulés et comprimés..... 17 fr. 05

Enregistré au L. N. C. M. n° 523-30, 31, 32.

ARISTÉNAL

Présentation. — Comprimés dragéifiés sans saveur ni odeur désagréables, dosés à 10 centigr. de carbonate neutre de quinine et à 1 centigr. d'arrhénal Adrian.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhume de cerveau, de la grippe et de l'asthme des foins. Antiseptique général interne, décongestion des voies respiratoires. Stimulant des défenses organiques.

Posologie. — Adultes : 6 dragées par jour.

Enfants : 3 dragées par jour.

Le tube 14 fr. 90

Société française des produits pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN & C^{ie}.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ARSAMINOL

Composition. — Solution stérilisée, à la concentration de 26, 13 p. 100 de « 3-acétylamino-4-oxyphénylarsinate de diéthylaminoéthanol » titrée à 0 gr. 05 d'arsenic par centimètre cube

Propriétés. — Produit arsenical pentavalent, injectable par voie sous-cutanée ou intramusculaire, à des doses réellement tréponémicides. Grâce à la technique de sa préparation, qui permet d'obtenir un corps à l'état de pureté parfaite, débarrassé de tous les isomères toxiques et grâce à la présence d'un groupement amino-alcool, qui favorise la très large tolérance de l'organisme pour le produit, l'Arsaminol n'a aucun des inconvénients des arsénobenzènes ou des autres arsenicaux pentavalents.

Injections indolores

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, spirochètoses, amibiases, trypanosomiasés, paludisme.

Posologie. — Consulter notices spéciales.

Formes. — Ampoules de 3 cc. (0 gr. 15 d'As.) et de 5 cc. (0 gr. 25 d'As.).

Pour les Enfants : *Arsaminol infantile*, solution dosée à 13,06 p. 100 en ampoules de 1 cc. 5 (1 cc. correspond à 0 gr. 025 d'arsenic).

Laboratoires CLIN-COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ARSÉNIODE BURIAT

Forme Gouttes. — Solution inaltérable de tri-iodure d'arsenic méthylarsinée à 1 p. 100.

Indications. — Tuberculoses torpides à manifestations lymphatiques, chlorose symptomatique de tuberculose, anémies, convalescences (fixation d'oxygène).

Emphysème pulmonaire et manifestations du syndrome asthmatique-arthritique.

L'Arséniode donne toujours de l'appétit.

Mode d'emploi. — Doses moyennes.

Enfants : II gouttes par 24 h. et par année d'âge.

Adultes : X à XX gouttes, 2 fois par jour.

Durée moyenne : enfants 15 à 20 jours.

Laboratoire BURIAT

37, rue Spontini — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23.)

ARSÉNOMYL

Nouvel arsénobenzol.

Très puissant tréponémicide en solution aqueuse stable
préparée d'avance ou en poudre.

Indolore en injection intramusculaire.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre de Malte,
Fièvre récurrente, Pian, Maladie du Sommeil.

Formes. — Ampoules pour injections intramusculaires
de solution d'*Arsénomyl* aqueuses glucosées préparées
d'avance et indolores.

Poudre.

Posologie. — *Adultes* : débiter à 0 gr. 30. Augmenter
progressivement les doses à 0 gr. 50, 0 gr. 70, 0 gr. 90,
1 gr. 05, suivant les malades.

Chez l'enfant les doses sont de 0 gr. 005, 0 gr. 01, 0 gr. 02,
0 gr. 03, 0 gr. 05, 0 gr. 10, 0 gr. 15, 0 gr. 20.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34: 2 lignes groupées.)

ARSÉNOS-SOLVANT

Adopté par les hôpitaux.

Sérum glucosé avec addition de Gafacol et de
Chloroforme acétone pour injections hypoder-
miques et intramusculaires de Sulfarsénol.

— Indolores —

Présentation. — Boîtes de 1, 6, 12 ampoules.

Boîte de 1 ampoule : 1 fr. 65.

Boîte de 6 ampoules : 8 fr. 15.

Boîte de 12 ampoules : 15 fr. 20.

Voir *Sulfarsénol*.

Mode d'emploi. — Utiliser :

1 ampoule jusqu'à 30 cg.

2 ampoules de 30 à 60 cg.

3 ampoules au delà de 60 cg.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

CH. DESGREZ, Docteur en Pharmacie

19-21, rue Van-Loo. — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ARSHÉMO-FER-B

Forme. — Cachets (boîte de 30 cachets). Traitement de 15 jours. Prix : 18 francs.

Propriétés thérapeutiques et Indications. — Puissant régénérateur du sang, Traitement rationnel et complet des diverses anémies, Chloro-anémies, états cachectiques survenant après les fièvres intermittentes. Maladie de Basedow, faiblesse physique et intellectuelle, Grossesses.

Formule. — Chaque cachet contient :

Hémoglobine.....	0,05
Nux vomica.....	0,02
Méthylarsinate de Sodium	0,02
Oxalate ferreux.....	0,15
GlucO-phosphate de Calcium	0,15
MgO lourde	0,15

Arshémo-Fer-B =

globules rouges + hémoglobine ++ coagulabilité +++

Posologie. — *Enfants* au-dessus de 12 ans : 1 cachet par jour avant les repas.

Adultes : 2 à 3 cachets par jour avant les repas.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 1379-1.

H. BENOIT

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris

POLIGNY (Jura) — (Tél. : 84.)

ARTÉRIOCRINOL

Chimiothérapie et opothérapie associées.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, Hypotenseur, Vaso-dilatateur et régulateur tensionnel, Antisclérosant.

Indications. — *A titre préventif* : tout sujet présentant, soit une tension ascendante, soit de la sclérose artérielle débutante, soit des spasmes viscéraux ou périphériques.

A titre curatif : chez tout malade présentant des manifestations rattachées aux trois mécanismes déjà cités ou à leur réunion. *A titre indicatif* : artérite des membres, Angine de poitrine, Manifestations nerveuses ou sensorielles, Phénomènes rénaux, digestifs, respiratoires, des hypertendus, etc.

Composition. — Trinitrine, caféine, silicate de soude, phényléthylmalonylurée, extraits de gui, hépatique et musculaire.

Forme. — Dragées à noyau mou.

Posologie. — 4 dragées par 24 heures espacées, en dehors des repas, à croquer.

Prix : 16 fr. 30.

Laboratoires DEMASLES

VIENNE (Isère). (Tél. : 160).

ARTÉRIOLEX OU MINÉRALOGÈNE

Spécifique de l'Artério-Sclérose.
Silicate de Soude titré soluble, assimilable.

Poudre : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Comprimés : 4 à 8.

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café.

Dissoudre avant d'absorber.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

ARTÉRION VINCARDI HYPOTENSEUR

Principes actifs. — Complexes stabilisés extraits du *Viscum album*, de l'*Allium*, du *Fucus vesiculosus*, du *Citrus limonum*.

Forme. — 74 comprimés lenticulaires glutinisés.
Innocuité absolue, tolérance parfaite. Pas de contre-indication.

Indications. — Hypotenseur, sclérolysant, diminue la viscosité du sang. — **Action élective** au niveau des capillaires, qu'il dégrasse et assouplit. — Artério-sclérose. — Hypertension, scléronéphroses, présclérose.

Doses. — 5 à 6 capsules par jour aux principaux repas.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire VINCARDI

Ph. VIGUIER, Pharmacien

14, avenue G.-Clemenceau. — NICE (Alpes-Maritimes).

Chèques postaux : Marseille 105-38.

R. C. Nice 9046.

ARTÉRIO-PHAN

Dragées : de 2 à 4 par jour.

Traitement préventif de l'artério-sclérose et des tumeurs.

Formule :

Chlorophyllate de soude.	0,002	Silicate de soude.	0,10
Extrait de cynara	0,10	Thyroïde	0,001
Chlorure de magnésium.	0,10	Parathyroïde . . .	0,0005

Indications :

- 1° *A titre préventif* : Déséquilibre circulatoire vers la quarantaine chez les sujets à hérédité chargée (ascendance congestive ou cancéreuse), traitement post-opératoire après ablation des tumeurs, insuffisance hépatique et rénale, tendance à l'excès de cholestérine et d'urée dans le sang, obésité, essoufflement pléthorique, perte de l'activité intellectuelle et physique.
- 2° *A titre curatif* : Artériosclérose confirmée, athérome, aortite, néphrite scléreuse, thrombose, hémiplegie, essoufflement et défaillance du cœur chez les scléreux, spasmes des vaisseaux, varices, phlébites.

Prix : 20 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1606-8.

Laboratoires A. MOURÉ

5 bis, boulevard des Italiens (Passage des Princes) —
PARIS (II^e). (Tél. : Rich. 82-56.)

ARTÉRIO-VEININE

Composition. — *Cratægus, passiflora, gui, marron d'Inde, hamamélis* (Extraits stabilisés), iode peptonisé.

Indications. — Troubles de la ménopause, artério-sclérose, troubles nerveux, états congestifs quels qu'ils soient.

Forme. — Gouttes (Conservation indéfinie).

Doses. — De XX à LX gouttes avant chaque repas.

Prix : 16 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1197-1.

Laboratoires J. KRIEGER

121, avenue de Saint-Ouen-PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 22-32.)

ARTHRILAX

Poudre granulée sodique effervescente.

Deux cuillerées à café = 10 gr. de poudre contiennent :

Sulfate de soude	1 gr. 40
Phosphate de soude	0 gr. 60
Citrate de soude	1 gr.
Bicarbonate de soude	0 gr. 60
Sucre effervescent	Q. S.

Dose moyenne. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café dans un verre d'eau chaude le matin à jeun, ou bien fractionner en plusieurs doses avant ou après les repas.

Indications. — *Arthritisme* et ses douleurs, *Congestions hépatiques*, Goutte, Obésité, Migraines, Hypertension artérielle, *Eczémas* et *Affections de la peau*, Constipation chronique, Infections gastro-intestinales, Gastro-entérites aiguës ou subaiguës, Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites.

En résumé, toutes les indications de la formule de Bourget.

Prix : 22 francs.

Durée du flacon : 2 à 3 semaines.

A. LYONS, Pharmacien

30, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Odé. 73-42.)

ARTHRILYSE

Granulé effervescent.

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Pipérazine, Urotropine, Salicylate de lithine, Phosphate de soude, Citrate de soude, Boldine.

Propriétés. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'acide urique. Cholagogue. Eupeptique. Antivisieux. Décongestif.

Indications. — Arthritisme. Diathèse urique. Rhumatismes. Goutte aiguë et chronique. Gravelle et Lithiase rénale. Coliques néphrétiques. Artériosclérose. Troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires. Auto-intoxication. Dyspepsies. Hyperviscosité sanguine.

Posologie. — Traitement d'attaque : de 3 à 5 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau. Traitement d'entretien : de 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 22 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

9, impasse Thoréton — PARIS (XV^e).

ARTOBYL

Forme. — Dragées.

Composition :

Boldine.....	0,001
Extrait spécial superconcentré de feuilles d'artichaut obtenu par procédé professeur Quirin et Dagonnot.....	0,20
Cascara pulvérisé.....	0,05
Pour une dragée.	

Indications. — Lithiase biliaire, Insuffisances hépatique et biliaire, Cholémie, Constipation chronique.

Doses. — 1 à 3 dragées (dose normale : 2 dragées) à la fin de chacun des deux repas.

Prix : 19 fr. 25 la boîte pour une durée de 30 jours environ.

Durée moyenne de traitement : 3 mois.

Laboratoires DAGONNOT
CANNES

ARTROCOLCHINE « C »

Goutte, Rhumatisme, Arthritisme.

Composition :

Acide Acétyltriméthylcolchicinique.....	0,0027
Résine de Gaïac.....	0,33
Hexaméthylènetétramine.....	0,65
Iodure de Potassium.....	2
Excipient.....	Q.S. pour 100 grammes.

Propriétés. — Analgésique par la Colchicine ; Antiseptique urinaire par l'Hexaméthylènetétramine, diurétique et diaphorétique par la Résine de Gaïac ; Modificateur de la nutrition par l'Iodure de Potassium.

Indications. — Spécifique de la goutte aiguë ou chronique, du rhumatisme, de la sciatique, des névralgies, des névrites et des myalgies d'origine goutteuse et rhumatismale.

Avantages. — L'ensemble de l'association à base de Colchicine donne une action synergique très nette sans toxicité appréciable et sans les dangers de la Colchicine. Il n'y a donc à craindre, en principe, ni diarrhées ni vomissements.

Posologie, Forme et Mode d'emploi :

Sirop à prendre *loin des repas* à la dose de une cuillerée à bouche une ou deux fois par jour dans un demi-verre d'eau.

Se conformer aux indications du médecin.

Produits POLYPHARMA

Concess^{no}, L. BRUN, pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XIII^e).

ARVENSYL

Formule :

Phytothérapie associée aux alcalins (Formules dépuratives de BROCC).

Une cuillerée à bouche dans un verre d'eau correspond à une infusion de Bardane, Pensée sauvage, Séné lavé à l'alcool, Saponaire, Cassis, Gentiane, et à un verre de la Solution de Bourget.

Indications. — Traitement interne des Dermatoses, Hépatisme, Manifestations cutanées de l'Arthritisme.

Par cuillerées à café, ou cuillerées à bouche suivant le cas, dans un verre d'eau avant les repas ou le matin à jeun.

Prix : 18 fr. 90.

Laboratoires GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

ASCÉINE

Acide acétyl-salicyllique. Para-acétyl-phénétidine
Caféine

ANALGÉSIQUE, SÉDATIF, ANTIRHUMATISMAL.

Par l'association synergique de ses composants, l'Ascéine réalise une médication efficace et inoffensive dont l'action principale et immédiate se traduit par l'atténuation ou la disparition de l'élément douleur et des clochers thermiques.

Indications. — Toutes les algies : Névralgies, sciatique, migraine, etc..., Grippe, Arthrites aiguës et toutes manifestations fébriles ou rhumatismales.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour ;
Enfants : 1/2 à 2 comprimés.

Formuler. — Tube de 20 comprimés.

Laboratoires O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ASCIATINE

Diméthylamino-phényl-diméthyl-pyrazolone-butylchloral.

Antinévralgique, analgésique et hypnotique.

Action élective dans le domaine du trijumeau.

Indications. — Douleurs dues aux diverses affections dentaires, douleurs consécutives aux interventions dentaires, névralgies à localisations diverses et particulièrement les névralgies faciales. Lumbago, dysménorrhée, insomnies.

Présentation et posologie. — Comprimés à 0 g. 25, 1 à 3 comprimés par dose, 4 à 5 comprimés par 24 heures.

Prix de vente : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lesachet de 2 comprimés : 1 fr. 50} \\ \text{La boîte de 12 comprimés : 6 fr. 50} \\ \text{— 24 — 11 fr. 50} \end{array} \right.$

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

ASCOLÉINE RIVIER

L'ASCOLÉINE est à base de lipoïde hépatique phosphoré et iodé. Elle renferme les vitamines A et C, la vitamine D à l'état naturel, toutes les vitastérines des cellules hépatiques.

Indications. — Inappétence, anémie, convalescences, bronchite, pré tuberculose.

Deux formes. — *Solution huileuse* : Une cuillerée à café 1/4 d'heure avant chaque repas.

Prix : 20 fr. 40.

Granulés : De quelques grains à une cuillerée à café avant chaque repas suivant l'âge et depuis un an.

Prix : 20 fr. 40.

Toutes pharmacies, ou à défaut chez :

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. : + Alésia 22-46.)

ASEPTONE

L'antiseptique idéal en gynécologie.

Formule. — Menthol, trioxyméthylène, essence thym, sulfate de cuivre, acide borique, alun (deux formes), poudre et comprimés.

Indications. — Antisepsie des organes génito-urinaires de la femme, métrites, vaginites, salpingites, flueurs blanches, ulcérations du col de la matrice, toilette intime.

Avantages. — Odeur agréable, solubilité parfaite, ne tachant pas le linge, ni toxique, ni caustique, décongestive, microbicide, laissant après l'emploi une agréable sensation de fraîcheur et calmant immédiatement les démangeaisons.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie chaude en injections et lavages, matin et soir.
Comprimés : 1 comprimé pour 2 litres, même emploi.

Prescrire : Une Aseptone, poudre ou comprimés.

Prix au public : 12 fr. 50.
Revient à 0 fr. 35 par injection.
Littérature et échantillons.

Laboratoires MOULIN

50, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Longchamp 00-51.)

ASEPTOPHÉDRINE

Phytothérapie oto-rhino-laryngopathie.

Solution huileuse, décongestionnante, antiseptique, cicatrisante.

Pour le traitement de toutes les affections du nez, du rhino-pharynx et de toutes les inflammations congestives de l'oreille moyenne et de l'oreille externe.

Composition :

Phénylméthylaminopropanolo.....	0 gr. 50
α-Butyloxyconimate de diéthyléthylène diamide...	0 gr. 05
Carbamate d'Ethyle.....	1 gr. 00
Essence de menthe déterpinée.....	0 gr. 20
Essence d'Eucalyptus déterpinée.....	0 gr. 20
Camphre de Bergamote.....	1 gr. 00
Excipient huileux aromatisé, q. s. pour.....	100 gr.

Mode d'emploi. — De IV à V gouttes en instillations dans chacune des fosses nasales ou par pulvérisations nasale et laryngée.

De V à X gouttes en instillations dans l'oreille malade.

A renouveler plusieurs fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1814-5.

Prix : le flacon, 17 fr. 25.

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie, PARIS.
(Tél. : Dor : 56-38.)

ASEPTORHINE

Huile aromatique, balsamique et antiseptique à base d'éphédrine, d'adrénaline, d'anesthésine et d'huiles essentielles.

Indications. — Désinfection habituelle des fosses nasales, coryza, ozène, rhinites, polypes, ulcérations, protection contre les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — En gouttes ou, mieux, en pulvérisations, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 15 fr. (pour 20 jours de traitement).

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

AS. I. P.

Arsenic. Iode. Phosphore.

Médication sthénique et cardio-vasculaire.

Indications. — Asthénie de la cinquantaine : hypotendus, hypertendus, après régime.

Composition :

Iodure de potassium.....	8 %
Extrait mou de Scille	2,5 %
Extrait mou de feuilles d'artichaut,	2 %
Arséniate de soude	0,2 %
Glycérophosphates (Na et Mg)	25 %

Avantages. — Stimulant, diurétique, cardio-vasculaire.

Posologie. — 30 à 50 gouttes à chaque repas dans la boisson habituelle ou dans du lait (soit 0 gr. 15 d'iode par jour).

Présentation. — Flacon de 50 cc. avec compte-gouttes pour 15 à 20 jours de traitement.

Enregistré au L. N. C. M. 1170-61

Prix : 19 fr. 40.

Laboratoire de L'OLIPHÉDROL

25, bd Edgar-Quinet — COLOMBES

(Tél. : Cha. 27-86.)

ASMOCRINE

(Dragées)

Composition. — Médication oposérothérapique à base de sérums activés de jeunes taureaux et d'organes frais de jeunes animaux.

Propriétés. — Désensibilisation, libération des émonctoires, brassage endocrinien.

Indications. — Asthme, Coryza, Rhume des foins.

Présentation et posologie. — Flacon de 70 comprimés à prendre à raison de 7 comprimés par jour pendant dix jours, au moins une heure avant chaque repas.

Prix : 24 fr.

Forme infantile : PEDIASMA (granulés).

Laboratoire biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

ASTHMASÉDINE

Respiratoire, Décongestif, Cardio-tonique, Diurétique.

Composition. — Pour 1 cuillerée à café:

Chl. d'Ephédrine	0,015	Iodure de potassium.....	0,20
Phényléthylmalonylurée..	0,015	Teinture de belladone	0,25
Caféine	0,10	Teinture de lobélie	0,50
Benzoate de soude	0,10	Excipient spécial	Q. S.

Traitement de la Crise d'Asthme et du Terrain Asthmatique. **Asthme.**

Emphysème. Dyspnées. Troubles Cardio-Vasculaires:

Doses moyennes : Pour éviter les crises d'asthme : Prendre entre les accès une cuillerée à café au début des 2 repas, pendant 2 jours. Puis 2 matin et soir au début des repas pendant 10 jours. Cesser 4 ou 5 jours et refaire une cure semblable.

Pendant les crises : 2 cuillerées à café au début des 3 repas, soit 6 par jour dans un peu d'eau sucrée.

En cas de crise subite et seulement en dehors des périodes de traitement : 1 cuillerée à café toutes les heures pendant 4 heures.

Demi-dose pour les Enfants à partir de 10 ans.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires HENRI SCHÉHADÉ

Pharmacien de la Faculté de Paris.

9, impasse Thoréton — PARIS (XV°).

ASTHMÉDRINE

Composition :

<i>Liquide :</i>		<i>Comprimés :</i>	
Ephédrine Cht ^e	0,10	Ephédrine Cht ^e	0,005
Caféine	0,75	Caféine.....	0,04
Iodure de sodium	3	Peptone iodée à 10 p 100.	0,10
Eau laurier-cerise.....	10	Extrait belladone	0,005
Sirop morphine.....	20	Extrait datura.....	0,015
Ether sulfurique	0,50	Extrait <i>Euphorbia piluli-</i>	
Chloroforme	0,50	fera	0,01
Teint. <i>Euphorbia piluli-</i>			
fera.....	1		
Teint. belladone.....	1,30		
Teint. datura.....	1,50		
Véhic. pour 100 grammes.		Par comprimé.	

Indications. — **Asthme**, Emphysème, Oppressions, Toux rebelles, Intoxications par les gaz et toutes dyspnées.

Posologie. — *Liquide* : 1 cuillerée à dessert au lever ; 1 au coucher. Diluer dans un peu d'eau ; prendre ensuite lait ou tisane.

Enfants (10 ans) et *vieillards* : 1/2 doses.

Le flacon (pour 10 jours de traitement) : 23 fr. 85.

Comprimés : 2 comprimés le matin et 2 le soir.

Enfants (10 ans) et *vieillards* : 1/2 doses.

Le tube (pour 15 jours de traitement) : 20 fr. 40.

Taxe Arm. comprise.

Laboratoires ETIENNE

19, avenue Secrétan — PARIS. (Tél. : Nord 89-34.)

ASTHMO-ACTINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-Cardiaque.
Le plus fort **Elixir antiasthmatique** connu.

Composition. — **Synergie totale** : Respiratoire, circulatoire et sympathique.

Une cuillerée à soupe contient : iodure de caféine 0,50, teinture de lobélie 0,50 ; Ext. thébaïque 5 milligr. Ext. belladone 1 milligr. Ars. de soude 1 milligr. Ext. grindélia 0,10, et...

... **Nouveauté.** — Ext. *Actæa* 0,05. Ext. nat. surrénale au 1/1000 0 gr. 07 dans sirop antiasthmatique stimulant diffusible pour 15 cc.

Indications. — **Asthmes divers. Emphysème. Dyspnée des gazés, Catarrheux, Intoxiqués, etc...**

Action rapide curative et préventive.

Posologie. — **Adultes** : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour loin des repas dans un peu d'eau ou de lait.

Enfants : à partir de 6 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Le flacon 210 cc. : 18 fr.

Pour un traitement de 8 à 15 jours.

Laboratoires G. BERTHON, Pharmacien, 9
DORNES (Nièvre) — (Tél. : 25.)

ASTHMO-HÉPATINE LEBROT

*Synthèse antichoc, désensibilisatrice et antifloculante.
Renforceur hépato-cardio-rénal.*

Indications. — Asthme vrai et syndrome asthmatique, Rhume des foins, Dyspnées, Emphysème, Gazés de guerre, toutes Insuffisances respiratoires.

Propriétés. — Active la ventilation pulmonaire, supprime le spasme des muscles inspireurs et bronchiques. Renforce le rôle antitoxique et protéopexique du foie. Augmente la perméabilité rénale et la diurèse. Décuple le pouvoir solubilisant du sang vis-à-vis des toxines. Facilite le travail du cœur. Diminue l'instabilité du système neuro-glandulaire et corrige le déséquilibre vago-sympathique. Calme la crise, améliore le terrain.

Formule. — Opothérapie hépatique associée à Iodéthyl-urotropine, Ipéca, Théobromine caféino-éphédrinée, Strophantine, Papavérine.

Mode d'emploi. — Crise : 1 à 3 comprimés à la fois. Préventif : 1 comprimé matin et soir, par périodes, suivies de repos.

Boîte de 40 comprimés : **Prix** : 20 fr. 40.

Laboratoire de Contrôle N° 2008-1.

Les Laboratoires BIO-BOURGOGNE

J. LEBROT, pharmacien,

24, avenue Albert-I^{er} — DIJON. (Tél. : 21-06.)

ASTHMOLYSIN

(Nom déposé.)

Contre l'asthme bronchique et le rhume des foins.

Composition. — Solution stérile du principe actif de la surrénale préparé selon la méthode du Dr Weiss.

Propriétés. — Ne contient aucun narcotique. Aucun effet secondaire nuisible. Injections indolores. Effet rapide et puissant.

Indications. — Asthme bronchique, Rhume des foins, Angine de poitrine, Collapsus cardiaque et vasculaire, Pneumonies.

Présentation. — Boîtes de 5 et de 10 ampoules de 1 cc. 1 cc. contient 8/10 de mmgr. de produit actif.

Posologie. — Au-dessous de 3 ans : 1/4 d'ampoule.
De 3 à 8 ans : 1/2 ampoule.
De 8 à 15 ans : 3/4 d'ampoule.

Injections sous-cutanées ou à la rigueur intramusculaires.
Jamais d'injections intraveineuses.

Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

ASTHMOSINE

Eupnéique, Antispasmodique, Toni-cardiaque, Diurétique.

Composition. — Heureuse association de substances non toxiques, à action synergique, absolument inoffensives.

Un cachet contient :

Acide valérianique	0,007	Caféine	0,043
Théobromine (essai physio- logique)	0,36	Acide acétylsalicylique ...	0,24
		Valériane pulvérisée	0,10

(Procédé spécial de préparation).

Indications. — Médication héroïque contre l'Asthme dit essentiel ou asthme nerveux. Soulage immédiatement les crises aiguës. Efficace aussi dans les cas d'emphysème aigu ou chronique dans les bronchites, dans la dyspnée brightique ou cardiaque. Bons résultats chez les gazés.

Action rapide, curative et préventive.

Posologie. — *Crise aiguë.* Dès le début de la crise un cachet dans une infusion de tilleul, camomille ou feuilles d'oranger. Si nécessaire un deuxième cachet deux heures après et au besoin, exceptionnellement, un troisième 4 heures après le second.

Etat chronique. — Un cachet le soir dans une infusion.

Pour les enfants, leur donner, une seule fois par 24 heures, un des cachets spécialement préparés à leur usage. S'il n'est pas possible de le leur faire absorber, il conviendrait de mettre le contenu dans de la confiture ou de la crème et de faire suivre d'une boisson chaude.

La boîte de 12 cachets. *Adultes:* 12 fr. 75. *Enfants:* 8 fr. 50.

Laboratoires L. TATTEVIN, Docteur en Pharmacie,
3, rue Emile-Burgault — VANNES.

ATALANTE

Pâte cicatrisante.

Non grasse, soluble à l'eau, ne tachant pas le linge.

Formule. — Allantoïne, 0 gr. 295; Résorcine, 0 gr. 200;
Excipient non gras, Q. S. p. 100.

Mode d'action. — L'allantoïne est un constituant normal des noyaux cellulaires. Les travaux de M. Robinson en Amérique ont montré le grand pouvoir cicatrisant de l'Allantoïne dans les plaies post-opératoires, les brûlures, les ulcères variqueux, les furoncles et les anthrax.

L'Allantoïne agit en favorisant les granulations du tissu sain et en éliminant les éléments infectés.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcères variqueux, Dermatoses, Erythèmes des nouveau-nés, Crevasses du sein, Furoncles, Anthrax, Escarres.

Mode d'emploi. — Sur les ulcères, les brûlures et les plaies, appliquer la pâte en couches épaisses.

Prix : 12 fr. 25.

Laboratoires BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).
(Tél. Anjou 61-61.)

ATENS

Hypotenseur.

Composition. — Pour une pilule :

Tétranitrate d'Erythrol	0,003
Diméthylxanthine (Théobromine).....	0,128
Phosphate de Calcium.....	0,022
Extrait de Viscum Album.....	0,060
Phényléthylmalonylurée	0,010
Extrait de Belladone	0,0025

Propriétés. — Régulateur du travail du cœur. Hypotenseur. Vaso-dilatateur, diurétique.

Indications. — Association médicamenteuse à doses faibles, qui constitue un traitement complet, actif et sans danger, de l'Hypertension et de ses dérivés.

Forme et mode d'emploi. — Pilules rouges à prendre accompagnées d'un verre d'eau au milieu des repas.

Posologie. — 2 à 3 pilules par jour.

Se conformer toujours aux indications du médecin.

Prix de la boîte de 25 pilules : 19 fr. 50.

N. B. — Le traitement par l'ATENS peut être heureusement complété par l'emploi du NESAL, sédatif nervin par excellence.

Produits POLYPHARMA

Concess^{re} L. BRUN, Pharmacien, 92, rue Bobillot, PARIS (XIII^e).

ATOCRAZINE

du Professeur Carrière

Association médicamenteuse parfaitement tolérée à base de **Crésophanyl**, de **Pipérazine**, d'Acide quinique.

Traitement prolongé de la **Diathèse arthritique**. 2 cachets par jour en traitement intermittent, 10 à 20 jours par mois.

Produits STENE

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

ATOMINE

Composition. — Acide phénylcinchoninique, Phosphate de soude.

Indications. — Solvant urato-oxalique en milieu alcalin grâce au phosphate de soude associé ; très bien toléré.

Rhumatismes aigus ou chroniques, Sciatiques, Goutte, Lumbago, Algies, sédatif rapide de la douleur.

Doses. — Cas aigus : 3 à 6 cachets par jour pendant 5 jours ; cesser 5 jours et reprendre. *Cas chroniques ou atténués* : 2 cachets par jour pendant 5 jours, cesser 5 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 18 fr.

Absorber avec tisane sucrée.

Compte chèques postaux LYON, n° 134-34.

Laboratoires L. Boize et G. Alliot,
9, avenue Jean-Jaurès — LYON.
(Tél. : Parmentier 31.29.)

ATOQUINOL

Phénylcinchoninate d'allyle.

CIBA

SPÉCIFIQUE ANTIGOUTTEUX.

Solvant de l'acide urique, favorise puissamment son élimination par voie rénale.

Indications. — Diathèse urique en général : Goutte, rhumatisme goutteux, dermatoses d'origine arthritique, algies, migraines et toutes manifestations uricémiques.

Doses. — États aigus : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé par 24 heures.

États chroniques : 1 cachet ou cuillerée à café de granulé, 8 ou 10 jours par mois.

Formuler. — Boîte de 20 cachets.

Flacon de granulé.

(Voir SANOQUINOL.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

ATOSPIRINE

Association d'Acide acétylsalicylique, d'acide phénylcinchoninique, de caféine, constituant le type parfait de la *Synergie médicamenteuse renforcatrice*.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1134-5.

Indications. — Diathèse arthritique, Goutte, toutes Algies, Etats grippaux et leurs complications.

Présentation. — Boîte de 20 cachets de 0,50 centigr. ou de 20 comprimés de 0 cgr. 50.

Posologie. — 2 à 4 cachets ou comprimés par jour.

Prix : 16 fr. 75,

Laboratoire A. LUCIEN

19, rue du Bac — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 55-03.)

ATOSULFASE

Cachets.

Formule. — Hyposulfite de soude pur et anhydre, 2 parties ; Acide phényl-2-quinoléine carbonique-4, 1 partie ; Acétyl para-aminosalol, 1 partie. Pour un cachet de 0 gr. 80.

Indications thérapeutiques :

Troubles hépatiques et leurs conséquences : nausées, vertiges, migraines, etc.

Troubles de la crase sanguine et leurs manifestations cutanées : urticaire, eczéma.

États urémiques et infectieux : goutte, rhumatismes, sciatique, zona.

Posologie. — 2 à 3 cachets par jour, 1/2 heure avant les repas, suivis d'un 1/2 verre d'eau.

Prix de la boîte de 30 cachets : 22 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1689-15.

Laboratoires du D^r J. LEFÈVRE

Docteur en médecine, Pharmacien,

Ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Paris.

200, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 01-09.)

ATOUXIN

Solution balsamique sirupeuse composée de :

Gaïacolsulfonate de potasse, Benzoate de soude, Salicylate de soude, Chlorhydrate d'Éphédrine et d'Éthylmorphine, Teinture de racine d'Aconit, de Drosera, de Lobélia, Extrait fluide de Désessartz, des glandes surrénales, de poumons et de ganglions lymphatiques.

Expectorante, analgésique, antitoxique, pour le traitement de toutes les affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques.

A action décongestive, résolutive et antiseptique des états inflammatoires de l'appareil respiratoire.

L'ATOUXIN est une solution stable, de goût très agréable, non toxique, sans risques d'intolérance.

L'ATOUXIN réalise : la sédation de la toux, la modification des sécrétions bronchiques, l'antiseptie des voies respiratoires, la défense de l'organisme débilite.

Dans toutes affections broncho-pulmonaires : Rhumes, Catarrhes, Asthme, Emphysème, Laryngites, Pharyngites, Bronchites aiguës et chroniques,

Infections grippales, pleurésies, pneumonies spécifiques et aspécifiques.

Posologie : Adultes : de 2 à 4 cuill. à soupe par jour. } A prendre
Enfants : de 2 à 4 cuill. à café par jour. } loin des repas.

Prix : Le flacon : 22 francs. — Enreg. au L. N. C. M. n° 1814-6

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS. (Tél. : Dorian 56-38.)

ATROBYL

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Formule. — Extrait de Belladone, Séné, Bile, Cascara, Bourdaine, Aloïne, Phénol-phtaléine, Excipient spécial.

Propriétés. — Laxatif très doux et absolument efficace, stimulant des sécrétions hépatiques.

Indications. — Toutes constipations, Intoxications intestinales, Insuffisances hépatiques.

Posologie. — 1 à 2 comprimés le soir au coucher.

Prix : 15 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1177-2.

Laboratoires SAUDEMONT

GRENAY (Pas-de-Calais).

ATURAL

Supprime l'intolérance pour le lait.

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

Composition. — Poudre à base d'un principe anti-présurant absolument inoffensif, dépourvu de goût, extrait du sérum de cheval.

Action. — Empêche la coagulation du lait dans l'estomac et en assure la digestion intégrale. Facilite aussi la digestion des aliments en permettant les contractions et l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Intolérance lactée chez l'enfant et chez l'adulte avec ses conséquences : Diarrhée verte, Vomissements, Gastro-entérite des nourrissons, Troubles digestifs chez l'adulte après les repas.

Mode d'emploi. — Une mesure pour 100 gr. de lait. Dans l'alimentation ordinaire, 2 mesures dans un peu d'eau après les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique
10, rue de Strasbourg — PARIS (X°).
(Tél. : Nord 46-14.)

AUBELIODE

Gouttes.

Combinaison stabilisée et équilibrée de:

Peptone iodée.....	50 cc.
Hamamélis <i>Dausse</i>	25 —
Aubépine <i>Dausse</i>	12 —
Passiflore <i>Dausse</i> , etc.	Q. S. P. 100 —

En un flacon normal de 45 cc. = 1.500 gouttes.

Prix : 21 fr. 25 (pour 15 jours de traitement).

Taxe d'armement comprise.

Il existe un double flacon de 90 cc. = 3.000 gouttes.

Prix : 38 fr. 50 (économie : 6 francs).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-1.

Indications :

Vaisseaux : Ménopause, Dysménorrhée, Artériosclérose, Hypertension, Phlébites, Varices, Hémorroïdes, Pléthore, Cyanose, Asthme, Emphysème, Bronchites, Bourdonnements d'oreilles.

Nutrition : Arthritisme, Goutte, Rhumatisme chronique, Lymphatisme, Obésité.

Système nerveux : Éréthisme cardiaque, Anxiété, Insomnies.

Posologie. — 50 gouttes d'Aubéliode = 25 gouttes peptone iodée, 12 gouttes Hamamélis *Dausse*, 6 gouttes Aubépine *Dausse*, 6 gouttes Passiflore *Dausse*.

Doses. — 100 à 160 gouttes par jour, en 2 fois, aux repas.

Action. — Active circulation et diminue viscosité et tension. Accélère nutrition, échanges, hématoèse. Équilibre système nerveux et vago-sympathique.

Composants et propriétés :

Iode (Peptone) : Fluidifiant, Vaso-dilatateur, Hypotenseur, Oxydant, Antiseptique, Stimulant.

Hamamélis : Décongestionnant, Hémostatique, Tonique et Trophique veineux.

Aubépine, Passiflore : Sédatifs, Antispasmodiques, Cardiotoniques et Hypotenseurs.

Littératures et échantillons à la disposition de
MM. les Docteurs.

Laboratoires OPOS

Pharmacien HOMPS,

Bureaux : 33, rue Rempart-Matabiau — TOULOUSE.
(Tél. : 253-97.)

Usine : 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY.
(Tél. : 3-10.)

AUDIGÉNINE

Forme. — Comprimés.

Composition. — Di-iodo-antipyrine (2,5 %) et Bromures alcalins (92,5 %).

Indications. — Traitement médical interne de la Sclérose de l'oreille moyenne et du tympan. Surdit . Vertiges. Bourdonnements.

Mode d'emploi. — 2 comprim s au milieu de chaque repas.

(Le traitement doit  tre interrompu 10 jours chaque mois.)

Litt rature et  chantillons :

Laboratoires DEFRESNE
19, rue Jacob — PARIS (VI ).

AURIXEMA (Dermocz ma)

Pommade anti-ecz mateuse semi-fluide.

Composition :

Para aminobenzoate de butyle normal (Paraforme).....	0 gr. 25
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifi�e.....	1 gr.
Sulfate de cuivre.....	0 gr. 50
Protochlorure de Mercure par voie humide.....	3 gr
Sulfate de zinc.....	1 gr.
Oxyde de zinc.....	10 gr.
M�tadioxyph�nol.....	1 gr.
Camphre.....	1 gr.

Pour 100 grammes.

Propri t s. — Analg sique, antiseptique, k ratoplastique.

Indications. — Traitement des ecz mas et imp tigos de l'oreille, des narines et en g n ral de toutes l sions ecz mateuses ou imp tigineuses infect es.

Pr sentation. — Tube avec long embout sp cial.

Prix : 12 fr. 80.

Enregistr  au Laboratoire National de Contr le des M dicaments sous le n  598-22.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX ).

AXOPECTINE

Sirop pectoral.

Chlorhydrate d'éphédrine	0 gr. 025
— d'éthylmorphine	0 gr. 05
Teinture de racines d'aconit	0 gr. 50
— de feuilles de belladone.....	0 gr. 50
Sulfogaïacolate de potasse	2 gr.
Eau distillée de laurier-cerise	2 gr. 50
Pectine fraîche de pommes	50 gr.
Excipient édulcoré parfumé au rhum des Antilles et alcoolature de citrons Q. S. P.	100 gr.

Toutes affections broncho-pulmonaires.

Utilisation comme béchique de la Pectine de suc frais de pommes d'un goût agréable.

Doses. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : Au-dessus de 7 ans, 4 à 8 cuillerées à café.

Flacon de 200 cc. : 15 francs.

Laboratoire AXOS

A. BOUNIOL, Pharmacien,

3, rue Sarrette — PARIS (XIV^e).

AXYOL

du Docteur P. Bourgraff.

Composition. — Iodo-amido-féculose dépourvu de toute trace d'iode libre.

Propriétés. — Grâce à ses propriétés biologiques, l'*Axyol* active l'apparition des bourgeons charnus et aseptise les plaies.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères des jambes, plaies infectées, fistules.

Mode d'emploi. — Se rapporter aux différents opuscules publiés par le Laboratoire du Praticien.

Présentation. — Poudre noire, en flacon,

Prix : 23 fr. 90.

L'*Axyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

AZAMA**(Gouttes)**

Présentation. — En flacon compte-gouttes (17 fr. 85).

Principes actifs. — Teinture de Lobélie, Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Asthme, Rhume des foins, Hoquet, Mal de mer.

Mode d'emploi — XX gouttes de la solution dans un peu d'eau sucrée, quatre fois par jour et au moment des accès.
Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-17.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

AZIGOL THÉVENOT

Crises convulsives. États nerveux.

Composition. — Tartrate Borico-Calcique, Phényl-éthylmalonylurée. Extrait de Gelsénium et de Piscidia.

Forme. — Dragées.

Indications. — Toutes crises nerveuses, Épilepsie, Convulsions. Tous états nerveux : Asthme, Prurit, Eczémas, Urticaire, Hyperexcitabilité, Asthme infantile.

A l'action suspensive des crises par le Phényléthylmalonylurée s'ajoute l'action du borotartrate de chaux, modificateur du tissu nerveux et celle des extraits végétaux qui diminuent la sensibilité périphérique et de certains organes, origine des réflexes déclenchant les crises.

Dose. — 2 à 6 comprimés par jour. On peut continuer le traitement par le Borocalcyl.

Enfants : 1/2 à 1 comprimé par jour.

Prix du flacon de 40 dragées : 21 francs.

Laboratoires THÉVENOT — DIJON.

AZOTYL

Composition. — Extraits spléniques et biliaires, cholestérine, goménol, camphre, irradiés aux rayons ultra-violet.

Forme. — Ampoules et pilules.

Propriétés thérapeutiques. — États de dénutrition et de carence. Anémies. Infections broncho-pulmonaires.

Doses et mode d'emploi :

A. *Ampoules.* — Injections sous-cutanées et mieux intramusculaires (tous les jours ou tous les 2 jours).

B. *Pilules glutinisées.* — 6 par jour aux repas et dans l'intervalle des piqûres.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

AZUFROL

Soufre colloïdal.

Description. — 1° *Capsules* glutinisées contenant 0 gr. 10 de soufre colloïdal sec, en flacons de 60 capsules ; 2° *Pommade* à 1/15 avec, comme excipients, vaseline et lanoline, en tubes d'étain de 45 grammes (usage externe).

Action thérapeutique. — Permet l'absorption du soufre colloïdal sous forme agréable, en évitant l'altération du colloïde par le milieu acide de l'estomac. à des doses exactes et de conservation indéfinie.

Indications. — 1° *Capsules* : 4 à 12 par jour contre le rhumatisme chronique, les arthrites, l'acné, la séborrhée, la bronchite chronique, le saturnisme. Pour le traitement intensif, y adjoindre les injections de Sulfurion (voir plus loin).

2° *Pommade* : Toutes affections cutanées justiciables du soufre.

Prix : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.
(Tél. : Carnot 18-75.)

AZYM

S'oppose à la lenteur des digestions.

Présentation. — Poudre.

Composition. — Bicarbonate, Phosphate, Sulfate de Soude, Hydrate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate de Bismuth.

Posologie. — 1 cuillerée à café après le repas : 1 nouvelle cuillerée à café au cours de la digestion si l'on se sent incommodé. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café.

Indications. — **Hyper et Hypochlorhydrie.** Affections gastro-intestinales de l'enfance. Intoxications alimentaires. Dermatoses d'origine gastrique. Vomissements.

Prix : 16 francs.

La boîte contient 30 cuillerées à café environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-2.

Laboratoire PARET

28, rue Guibal — MARSEILLE.

BABEURRE DARDELET

pour Nourrissons ou Adultes.

Le Babeurre Dardelet. — Médicament héroïque de la diarrhée verte et entérite. D'un goût agréable, il est non seulement employé pour les Nourrissons, mais aussi pour les Adultes.

La Soupe de Babeurre est du Babeurre additionné de 2 p. 100 d'Arrow-Root.

Ce qui fait la supériorité de ces deux produits est leur homogénéité absolue. Ni dépôts, ni grumeaux. On peut les donner à la tétine.

Conservation sous le vide.

Se fait en 1/4 de litre. Prix : 3 francs départ usine.

Maison ouverte tous les jours, même le Dimanche.

(Voir rubrique *Laits DARDELET*.)

Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET

Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne).

(Tél. : 4.)

La Maison est à la disposition des Docteurs désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

BABEURRE GUIGOZ

(Soupe de Babeurre en poudre.)

Grandes facilités de préparation par simple adjonction d'eau bouillie froide.

Stabilité et homogénéité parfaites (pas de grumeaux).

Conservation facile.

Substantielle, quoique extrêmement digestible en raison de l'adjonction de dextrines ; peut être administrée même à des prématurés et constituer le régime exclusif du nourrisson pendant un temps prolongé.

Peu acide. Facilement acceptée.

Grande valeur thérapeutique en raison de son acidité naissante et non seulement préexistante comme dans les babeures liquides.

Indications. — Gastro-entérites, diarrhées infantiles, eczémas. Réalimentation.

Dose. — De 60 à 200 gr. de poudre par jour pour 400 à 1 300 gr. d'eau suivant l'âge du nourrisson, soit environ 1 cuillerée à soupe pour 45 à 50 grammes d'eau.

Voir : { Lait en poudre GUIGOZ.
Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.
Lait Déchloruré GUIGOZ.
RAVIX (Lait GUIGOZ irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

BABEURRE NESTLÉ EN POUDRE ÉLÉDON

Babeurre 1/2 gras, en poudre, préparé par Nestlé, destiné à la diététique des nourrissons, enfants et adultes atteints de troubles digestifs et à l'alimentation mixte. Pureté absolue, composition constante, conservation parfaite, bonne valeur nutritive.

Deux formules :

Simple : sans sucre ni farine.

Complet : avec sucre (5 p. 100) et farine (2 p. 100) (maltose-dextrine et crème de maïs).

Indications. — Diarrhées banales ou graves de l'enfant ou de l'adulte. Dermatoses du nourrisson. Alimentation des intolérants au lait, des prématurés et des enfants menacés par les troubles digestifs (colonies).

Prix : la boîte de 250 gr. : 14 francs.

En estagnons de 2 kg. pour les cliniques et œuvres hospitalières ; nous consulter.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

BABEURRE NUTRICIA

Composition. — Lait écrémé ensemencé de ferments lactiques sucré au saccharose.

Présentation. — Variétés : babeurre au froment sucré et non sucré, babeurre au riz sucré et non sucré, en boîtes hermétiquement fermées assurant une conservation du produit pratiquement indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Aliment de remplacement dans toutes les gastro-entérites de l'enfance. Le Babeurre simple ne peut être utilisé qu'un jour ou deux. Le Babeurre Nutricia, par son froment ou son riz, est un aliment complet dont l'emploi peut être prolongé.

Gastro-entérites avec vomissements : Babeurre froment.
Gastro-entérites avec diarrhée : Babeurre au riz.

Mode d'emploi. — Se conformer exactement aux indications formulées sur les boîtes.

Léon CLAEYS

1, boulevard Saint-Martin — PARIS (III^e).
Tél. : Turbigo 92-60.

BABEURRES « LA FAYE »

Laits acidifiés dégraissés ou non.

Pour enfants et adultes.

Préparés avec du lait frais à la ferme de « La Faye », à Marlihes (Loire).

Les Babeurres La Faye sont le résultat d'une fermentation lactique spéciale sur du lait très frais privé de sa matière grasse et non un résidu de la fabrication de beurre, d'où leur goût agréable.

Ils sont *liquides* afin de conserver toutes leurs propriétés (lactosérum, caséine modifiée). D'une conservation parfaite, d'une digestibilité incomparable, ils sont constants, sûrs et efficaces et ne demandent aucune manipulation. Ils sont présentés sous trois formes :

Babeurre léger (étiquette bleue) pur, sans farine, 498 calories au litre, acidité 3 grammes, 35 grs. de sucre au litre. Indiqué pour les prématurés, débiles, vomisseurs et pour les hépatiques.

Babeurre (Soupe) (étiquette blanche). Mélange de farines 3 % 764 calories, acidité 7 grammes, 75 grs. de sucre au litre. Aussi nourrissant que le lait. *Le plus employé* à cause de son pouvoir calorique et thérapeutique et de sa grande facilité d'assimilation. Indiqué dans tous les troubles digestifs même légers, intoxications, dermatoses, intolérance lactée, et aussi comme complément du sein et pour éviter les troubles du sevrage.

Babeurre gras (étiquette rouge). Même composition que le Babeurre (soupe) ordinaire avec 35 grammes de matières grasses, 1 072 calories, 75 gr. de sucre au litre. Suralimentation des convalescents (particulièrement après typhoïde, colibacillose), prétuberculeux, enfants aux intestins délicats, anorexiques, hypotrophiques. Bien supérieur au yoghourt.

Posologie. — Ces trois babeurres, présentés en boîtes de 430 grammes et 200 grammes, s'emploient *de la même façon que le lait naturel* en tenant compte de leurs indications particulières. En cas de troubles graves, multiplier au début le nombre des repas en diminuant les doses.

En vente dans toutes les Pharmacies

Fournisseurs des Hôpitaux et des Municipalités de Lyon et de Saint-Étienne depuis 25 ans.

Échantillons et documentation sur demande adressée :

Ferme de LA FAYE
MARLHES (Loire).

BABEURES MOLARD

employés dans les Hôpitaux.

Babeurre, farine et sucre.

Présentés sous trois formes :

1° Babeurre léger : liquide, vendu en boîtes de 500 gr., 6 fr. conservation parfaite, acidité 4 gr., farine 0,5 p. 100, sucré — 500 calories par litre.

Indications. — Vomissements, troubles digestifs graves, alimentation des prématurés.

2° Babeurre normal : liquide, vendu en boîtes de 1 kg. et 500 gr., acidité 5 gr., farine 2 p. 100, sucré, 750 calories par litre.

Indications. — Gastro-entérites, eczémas, intolérance lactée, débilité congénitale, athrepsie, troubles du sevrage ; 9 fr. la boîte de 1 litre.

3° Babeurre en poudre : soupe (*même composition et mêmes indications que le Babeurre normal*). Se prépare par simple addition d'eau et ébullition. Revient à 6 fr. 50 le litre.

Doses. — Mêmes doses que le lait.

Durée de l'alimentation au Babeurre : de 1 à 10 mois.

Echantillons sur demande.

Laits MOLARD

25, Cours Lafayette — LYON (VI°).

Tél. : L 20-71.

BACKERINE

ACTIVÉE

Ferments du Docteur de BACKER et sels de magnésie. Modifiant l'organisme par développement des agents de fermentation.

Formes. — Ampoules injectables de 1 cc., ampoules *Buvables* de 5 cc., cachets, dragées.

Indication. — Traitement de toutes les hyperplasies (tumeurs, néoplasmes, fibromes, épithéliomas, carcinomes, sarcomes, etc.).

Mode d'emploi. — Injecter une ampoule SOUS LA PEAU, tous les quatre à six jours, ou prescrire une à deux *ampoules Buvables* tous les deux jours. On prescrira en même temps l'usage des dragées ou des cachets de ferments et de sels magnésiens, qui augmentent l'efficacité des injections. Prendre avant les repas quatre cachets ou huit dragées par jour en moyenne, plus dans les cas d'urgence.

La boîte de 8 ampoules : 28 fr. 05.

La boîte de cachets ou de dragées : 18 fr. 35.

La boîte de 12 *ampoules Buvables* : 22 fr. 45.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°). (Tél. : Archives 41-65.)

BACTÉ-INTESTI-PHAGE BACTÉ-COLI-PHAGE (1)

Composition. — *Bacté-Intesti-Phage*: Mélange de Bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des voies intestinales (Entérocoques, Coli, Staphylocoques, Streptocoques, etc.).

Bacté-Coli-Phage: Mélange de Bactériophage adaptés à de nombreuses variétés de bacilles Coli ou Paracoli.

Propriétés. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe qui détruit et dissout les bactéries, qui se régénère au cours de la lyse, dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages. — Action puissante et rapide, Innocuité absolue, pas de contre-indication.

Indications. — *Bacté-Intesti-Phage*: Entérites, Colites, Diarrhées infantiles. *Bacté-Coli-Phage*: Colibacilluries, Pyérites, Pyélonéphrites, Cystites, Métrites, Prostatites, etc.

Forme. — *Bacté-Intesti-Phage*: ampoule de 2 cc. *Bacté-Coli-Phage*: ampoule de 2 cc. et 10 cc.

Posologie. — Ingestion buccale : une ampoule matin et soir dans 20 cc. d'eau alcaline (voir notice explicative).

En outre, pour le *Bacté-Coli-Phage*: instillations vésicales (voir notice explicative).

Prix. — 10 ampoules de 2 cc. : 32 fr. 65 ; 5 ampoules de 10 cc. (B. Coli) : 65 fr. 30, Enreg. au L. N. C. ; *Bacté-Intesti* n° 507-4, *Bacté-Coli* n° 507-5.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparés par le Laboratoire du Bactériophage.

BACTÉ-PYO-PHAGE BACTÉ-STAPHY-PHAGE (1)

Composition. — *Bacté-PYO-Phage*: Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes des infections purulentes (Staphylocoques, Streptocoques, Coli, etc.). *Bacté-STAPHY-Phage*: Mélange de bactériophages adaptés aux diverses variétés de staphylocoques (*Aureus-Citreus-Albus*).

Indications. — Furoncles, Anthrax, Panaris, Phlegmons, Ostéites, Plaies infectées, Infections urinaires à staphylocoques.

Avantages. — Action puissante et rapide. Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

Forme. — Ampoules de 2 cc., 5 cc., 10 cc.

Posologie. — A. Injection *in situ* (méthode Raiga) dans le foyer même de l'infection ou dans la région enflammée pouvant passer rapidement à l'état aigu. B. En pansements locaux. C. En ingestions buccales.

Prix : 4 ampoules 2 cc. : 19 fr. 60 ; 10 ampoules 2 cc. : 32. fr 65.

5 — 5 cc. : 38 fr. 05 ; 5 — 10 cc. : 65 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. *Bacté-Phyo* n° 507-3. *Bacté-Staphy* n° 507-2.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparés par le Laboratoire du Bactériophage

BACTÉRAMIDE

Forme. — Comprimés.

Composition. — Dosés à 0 gr. 50 de para-amino-phényl-sulfamide purissime et à 0 gr. 12 de bicarbonate de soude par comprimé.

Propriétés pharmacodynamiques. — Chimiothérapie des affections provoquées ou aggravées par les streptocoques, pneumocoques, gonocoques, méningocoques et colibacilles.

Mode d'emploi. — Selon les indications particulières de l'affection.

Prix : En étui de 20 comprimés : 18 fr. 35.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 62-30.)

BACTÉ-RHINO-PHAGE (1)

Composition. — Mélange de bactériophages polyvalents adaptés aux microbes du rhino-pharynx. (Staphylocoques, Streptocoques, Pneumocoques, Entérocoques, etc.).

Propriétés. — Le Bactériophage de d'Hérelle est un principe :

Qui détruit et dissout les bactéries ;

Qui se régénère au cours de la lyse ;

Dont l'action lytique se transmet indéfiniment.

Avantages. — Action puissante et rapide, Innocuité absolue. Pas de contre-indication.

Indications. — Grippe, Coryza, Rhino-Pharyngites, Otites, Sinusites.

Forme. — Boîtes de 4 et 10 ampoules de 2 cc.

Posologie. — A. En instillations, au moyen de la poire caoutchouc comprise dans la boîte.

B. En pulvérisations au moyen du pulvérisateur spécial : Pulvolyseur Ercé.

Une ou plusieurs ampoules, suivant la gravité des cas, plusieurs fois par jour.

Prix : 4 ampoules 2 cc. : 19 fr. 60 ; 10 ampoules 2 cc. : 32 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. n° 507-6.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, av. de Villars — PARIS (VII^e). — (Tél. : Inv. 20-60.)

(1) Préparé par le Laboratoire du Bactériophage.

BACTÉ-RICYL

Antiseptique physique
agissant par sa Tensio-Négativité.

Puissant bactéricide. Non toxique. Non irritant.
(Odeur et goût agréables. — Ne tache pas le linge.)

Composition. — Solution stable, concentrée de ricinoléate de triéthanolamine à 30 p. 100.

Indications. — Désinfection de la cavité bucco-pharyngienne. Angines. Amygdalites, Stomatites. Gingivites. Prévention des maladies infectieuses à point de départ pharyngé : Gripes, Fièvres éruptives, Maladies épidémiques. Soins gynécologiques et obstétricaux : Leucorrhées-Vaginites (blennorragiques ou autres). Ulcérations de toute nature, etc.

Mode d'emploi.

Gargarismes, lavages buccaux, pulvérisations :
1 mesure de la pipette jaugée pour un grand verre d'eau.

Lavages gynécologiques et chirurgicaux :
1 à 3 mesures de la pipette jaugée pour 1 litre d'eau.

Prix : 12 francs.

Laboratoires A. WELCKER et C^{ie}
22, rue de l'Est — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-39.)

BACTURYL

Comprimés.

Formule :

Hexaméthylène-tétramine.	0,15
Acide Benzoïque	0,15
Salol.	0,20
Bleu Méthylène	0,015

Pour 1 comprimé dragéifié.
50 comprimés. Prix : 19 francs.

Indications :

Pyuries, Bactériuries, Colibacilloses, Pyérites et Pyélo-néphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites.

Dose moyenne :

2 comprimés avant chacun des 3 repas.

Laboratoire de la **SULFO-THIORINE**
J. DEDIEU, Pharmacien.

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.
(Tél. : 820-04.)

BAIN BAGNOR RADIOACTIF

Le seul approuvé et autorisé par l'établissement thermal de

Bagnoles-de-l'Orne.

Synthèse des éléments minéraux du complexe salin de Bagnoles-de-l'Orne, suractivé par le bromure de radium. Prépare et prolonge la cure de Bagnoles-de-l'Orne.

Indications thérapeutiques. — Troubles circulatoires de toutes natures. Phlébites, varices, stase veineuse. Rhumatismes chroniques, névralgies et toutes affections douloureuses.

Forme. — En paquet pour bain de 200 litres. Faire dissoudre au moment de l'emploi.

Posologie. — Cure intensive : 3 bains par semaine pendant 6 semaines.

Cure d'entretien : 1 bain par semaine. Repos couché après le bain.

Prix du bain : 10 francs.

Les 10 bains : 95 francs.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

BAIN CARBOGAZEUX WOLO

Forme. — Poudres dont les dissolutions successives dans l'eau du bain sursaturent cette eau d'acide carbonique.

Indications. — Maladies des organes circulatoires (Cœur, Hypertension, Artério-sclérose), Maladies dites d'échanges internes (Goutte, Rhumatismes), du Système nerveux (Névralgie, Neurasthénie, Surmenage cérébral, etc.).

Mode d'emploi. — Verser successivement les sachets 1 et 2 dans le bain en brassant l'eau. Se plonger dans l'eau en laissant agir le dégagement gazeux. La température sera de 30 à 35 degrés, sauf indications spéciales du médecin. Durée du bain : 15 à 20 minutes.

Le traitement est de 10 à 15 bains, selon l'avis du médecin.

Prix : 13 fr. 25.

Laboratoires FISCH et C^{ie} (S. à r. l.)

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin)

Agence à PARIS : 104, faubourg Poissonnière (X^e).

(Tél. : Trudaine 92-52.)

BAIN CARRÉ

Bain marin complet.

Composition. — Bain iodo-bromo-chloruré, renfermant intacts tous les sels marins naturels.

Indications. — *Adultes* : nervosisme, asthénie, surmenage, convalescences, rhumatismes, arthritisme.

Enfants : Débilité, lymphatisme, troubles de la croissance, rachitisme.

Gynécologie : Traitement des affections gynécologiques, irrigations vaginales hygiéniques.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 boîte par bain.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de boîte suivant la capacité de la baignoire.

Bains toniques et stimulants : 28° à 34°, 15 minutes.

Bains sédatifs : 34° à 39°, 25 à 40 minutes.

Injectons vaginales : une cuillerée à soupe par litre d'eau chaude.

Prix : 7 fr. 80.

LANCOSME 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VII^e)
(Tél. : Élysées 17-46.)

BAIN DE BOUCHE A LA DUNA-CAÏNE A. D.

Bain de bouche anesthésique, ne s'emploie jamais pur, mais dilué.

Indications. — *Stomatologie* : douleurs post-opératoires, stomatites, ulcérations gingivales, prises d'empreintes, pointes de feu, galvano-cautérisations.

O.-R.-L. : Angines, processus phlegmasiques, abcès de l'amygdale, ulcérations diverses, dysphagie d'origine cancéreuse ou tuberculeuse.

Mode d'emploi. — En gargarismes, en bain de bouche, en tamponnement local.

Préparation à diluer dans un quart, un demi ou un litre d'eau bouillie suivant la concentration voulue. (Voir Notice détaillée.)

Présentation. — Flacon de 40 cc. avec mesure graduée permettant la préparation d'une petite quantité de solution au moment du besoin.

Prix : 18 fr. 35.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e)

BAIN FLÉVAR

Minéral, Synthétique, Radifère.

Traitement à domicile des : Phlébites, Varices, Hémorroïdes et des Troubles de la Circulation veineuse,

Le « FLÉVAR » se présente sous la forme d'une poudre qui, par ses analogies chimiques avec les eaux les plus réputées des Sources thermales azotées et chloro-sulfatées calciques et par ses propriétés radio-actives contrôlables, donne à l'eau du bain, pris chez soi, les mêmes propriétés thérapeutiques.

LE BAIN FLÉVAR produit 250 millimicrocuries d'émanation du Radium (Radon) par bain de 200 litres d'eau.

Il ne se recommande d'aucune station, — Il convient à toutes.

Prix de la boîte pour un bain : 11 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 535-4.

Fabrication et dépôt général ;

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

BAIN SALVIA

(Un traitement « aux Eaux » chez soi.)

Composition. — Silicate de magnésie hydraté, bicarbonate de sodium, perborate de sodium, nitrate d'uranium,

Présentation. — Poudre en étui, chaque étui pour un bain.

Indications. — Stases veineuses (Varices, phlébites), arthritisme, rhumatismes et dépression générale. Soins gynécologiques.

Posologie. — Un bain à la température d'environ 37°, pendant 20 minutes, traitement de 21 jours. En gynécologie : 1 cuiller à soupe par litre d'eau.

Prix de la cure de 21 bains Salvia au public : 183 fr. 75 ;
au Corps Médical, 120 francs.

Les personnes qui ne peuvent se rendre à une station thermale peuvent faire leur saison chez elles par une série de 21 « Bains Salvia » pendant 21 jours consécutifs.

Cette série peut être encore ordonnée de temps à autre, entre deux cures « aux eaux ».

Pilules Salvia : Traitement interne des stases veineuses, varices hémorroïdes, ménopause, puberté, par l'extrait mou de Teskra. Une pilule avant les 2 principaux repas.

L'étui de 30 pilules : 16 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV°). — (Tél. : Suffren 31-75.)

BALDISEDAN

Thérapeutique Génito-Urinaire

Pilules. Suppositoires. Ovules.

Composition. — Acide camphorique, hexaméthylène-tétramine, térébenthine de Venise, extrait mou d'uva-ursi, salol, benzo-naphtol.

Indications. — Colibacilluries, Cystites, Prostatites, Néphrites, Pyélo-néphrites, Métrites, Salpingites.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et sédatif génito-urinaire. Aseptise et clarifie les urines par modification du pH urinaire.

Posologie :

Pilules : 3 à 4 avant chaque repas.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Ovules : 1 le soir au coucher.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 21-1.

Prix : 17 fr. 40.

Laboratoires Robert COLAS

Docteur en Pharmacie,

133, rue Lecourbe — PARIS.

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

BALLOTYL

Agent le plus efficace de la Phytothérapie Antispasmodique. Sédatif du Grand Sympathique.

Composition. — Balloté stabilisée contenant entre autres constituants de la *Choline*, antispasmodique vasculaire et puissant hypotenseur.

Formes pharmaceutiques. — Liquide ; Dragées ; Suppositoires.

Indications. — Insomnie, Vertiges, Tous états névropathiques, sympathicotoniques ou vagotoniques.

Posologie : 4 prises de XXX à LX gouttes ou 4 dragées par jour (avant les 3 repas et le soir au coucher) ; 1 suppositoire le soir au coucher.

Laboratoire de Phytothérapie de Paris

M. GUILLON, pharmacien

113, boulevard Voltaire — PARIS (XI°).

Tél. : Roquette 70-76.

BALMIGA

Tablettes fumigatoires.

Forme pharmaceutique. — Tablettes comprimées effervescentes.

Composition. — Baume du Pérou, Huile de pin sylvestre, Essence d'eucalyptus, Essence de thym, Essence de menthe, Menthol.

Action. — Antisepsie des voies respiratoires par inhalation.

Indications. — Grippe, Bronchite, Extinction de voix, Coryza, Rhinite, Sinusite, Laryngo-trachéites.

Mode d'emploi. — Mettre successivement deux ou trois tablettes *Balmiga* dans un verre d'eau bouillante et prendre deux ou trois fumigations par jour.

Prix : 7 fr 10.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Usine : 15, rue des Champs — ASNIERES.

Dépôt : 127, Bd Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 22-01.)

BALNERADOL

Bain radioactif en comprimés.

Principes actifs. — Bromure de Radium, Oxygène naissant, Extrait d'Hamamélis.

Effets thérapeutiques et indications. — Action régulatrice des fonctions circulatoires (Varices, Phlébites, Age critique, Artériosclérose). Stimulation générale de l'organisme (Etats anémiques, Convalescences). Vitalisation des cellules cutanées, Action sédative puissante (Algies, Rhumatismes chroniques, Etats neurasthéniques et dépressifs).

Doses. — Grand bain, 8 comprimés. Bain local, 1 à 2 comprimés (teneur en radium-élément : 33,5 millimicrocuries par comprimé).

Présentation et prix. — Comprimés de 4 gr. parfumés à l'essence de pin.

La boîte de 16 comprimés..... 14 fr. 80

La boîte de 40 comprimés..... 30 fr. 60

Etablissements LABORADIUM

25, rue Friant — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Van. 25-07.)

BALSAFORMINE

(Dragées de)

Formule :

Anhydrométhylène citrate d'hexa-
méthylène-tétramine pure ... 0 gr. 25
Térébenthine de Venise purifiée.... 0 gr. 15

Par dragée.

Mode d'action. — Agit comme antiseptique et calmant des organes génito-urinaires et désinfectant général. Inutile acidifier l'organisme.

Indications. — Infections du tractus génito-urinaire et des voies biliaires. Pyérites et Pyélonéphrites, Colibacillose urinaire, Bactériurie, Cystites et Catarrhes vésicaux, Urétrites, Prostatites, Vésiculites, Lithiase et Calculose urinaire, Coliques hépatiques et néphrétiques, Gripes.

Prix : le flacon de 50 dragées : 21 francs (10 jours de traitement).

Spécialités Roger BELLON.

J. GAUTIER, Pharmacien.

Laboratoires du GAMBÉOL, 42, r. Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

BALSAMOL LESCÈNE

Combinaison à base de Drosera, Scille, Chlorocinnamates, Benzoates, Aldéhyde benzylique.

Formes. — Sirop, Comprimés.

Caractéristiques. — Produit non toxique. Chez les enfants, il peut être administré à partir de 5 à 6 mois.

Antiseptique des voies respiratoires. Expectorant, Diurétique, Toni-Cardiaque.

Indications. — TOUX, COQUELUCHE, BRONCHITES, GRIPPE, toux émetisante des tuberculeux, asthme, toux des vieillards, Insomnies.

Doses. — Enfants de plus de 6 mois : 3 à 10 cuillerées à café par jour suivant l'âge, ou 3 à 10 comprimés.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour ou 6 à 15 comprimés par jour. Insomnies : adultes et enfants, 1 cuillerée à soupe le soir au coucher ou pendant la nuit.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

BALSAMORHINOL

Définition. — Huile balsamique, antiseptique, décongestionnante, cicatrisante ; d'odeur agréable ; non irritante.

A base : 1^o d'essences végétales (en particulier d'essences de zestes de fruits) dont l'action est bien établie contre les divers microbes qui hantent habituellement les muqueuses des voies aériennes supérieures, et dont la vertu cicatrisante a été éprouvée ; 2^o de principes décongestionnants, calmants, qui soulagent d'emblée. (Ces principes actifs sont ceux-là mêmes qui entrent dans la composition de nos comprimés *Inhalantyl*.)

Indications. — Le Balsamorhinol vise avant tout la désinfection efficace du nez et du rhino-pharynx. Des travaux récents ont montré l'importance capitale de ce dernier comme porte d'entrée d'infections non seulement régionales mais aussi broncho-pulmonaires, méningées, sanguines. Pratiquement, et en bref, les indications sont les suivantes : *Coryzas* aigus et chroniques ; *rhinites* torpides ou spasmodiques ; *rhume des foins* (*hay fever*) avec ou sans *asthme* ; *sinusites* ; *rhino-pharyngites* ; *laryngites* ; *trachéites* ; *bronchites* ; *infections grippales* ; *toutes infections à point de départ rhinopharyngé*.

Présentation. — Flacon avec bouchon compte-gouttes très pratique.

Mode d'emploi :

De 2 à 4 fois par jour. Soit en *instillations*, à la dose de III à IV gouttes dans chacune des fosses nasales ; soit en *pulvérisations* (3 ou 4 jets du pulvérisateur à l'entrée des narines, pendant qu'on inspire largement) ; soit (de préférence) à la fois en instillations et en pulvérisations.

Prix : Flacon de 20 cc., 15 fr. 85

Laboratoire FIDES

R. VOUZELLAUD, Docteur en Pharmacie

14, rue de la Comète — PARIS

(Tél. : Invalides 64-13.)

BALSAQUINTINE LESCÈNE

Nouvelle combinaison terpine-bromoformique suractivée avec camphre, gâicolate de pilocarpine, de strychnine et d'atropine en milieu d'essences balsamiques.

Présentation. — Ampoules injectables indolores de 1 cc. et 2 cc. Sirop. Suppositoires.

Contrôle de tolérance. — Séries d'injections au cobaye.

Propriétés. — Sédatif. Désinfectant pulmonaire. Diurétique. Tonocardiaque. Anti-infectieux. Antithermique. Fluidifie les sécrétions. Préviend les complications des maladies contagieuses.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques, Bronchites, Grippe, Coqueluche, Asthme, Laryngites, Maladies infectieuses. Faux croup.

Mode d'emploi. — INJECTIONS : *Enfants* en dessous de 2 ans : 1 cc. tous les 2 jours ; de 2 à 8 ans : 1 cc. par jour ; au-dessus de 8 ans : 2 cc. par jour. *Adultes* : 2 cc. 1 ou 2 fois par jour. Injections intratrachéales, 2 cc. en une fois.

SIROP : *Enfants* : 1 à 5 cuillerées à dessert par jour dans de l'eau.

Adultes : 1 à 5 cuillerées à soupe par jour dans de l'eau ou de la tisane.

SUPPOSITOIRES : *Enfants* : 1 à 2 par jour.

Adultes : 1 à 4 par jour.

Laboratoires LESCÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS. (Tél. Vaugirard 08-19.)
et LIVAROT (Calvados).

BALSOFORME

Mélange de Schleich additionné de Gomenol
Prevot.

(Formule du Dr Siauve-Evausy.)

Le Balsoforme associe les propriétés du mélange de Schleich à l'action balsamique du Gomenol.

Indications. — Anesthésie générale, Prévention des complications pulmonaires post-anesthésiques.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules compte-gouttes de 60 grammes. S'administre à l'aide de l'appareil d'Ombrédanne. Une ampoule suffit pour une anesthésie de plus d'une heure.

Prix de vente :

L'ampoule..... 10 fr. 60

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94)

BALSOFUMINE

Présentation. — Inhalation balsamique liquide. 3 formes:
Balsofumine simple ou mentholée à 1 p. 100 ou 4 p. 100.

Composition. — Acide oxybenzoïque, benjoin et baume du Pérou désempyreumatisés, essence de thym déterpénée, eucalyptus, essence de lavande déterpénée, alcool à 80 degrés.

Balsofumine mentholée.

Additions de 1 p. 100 ou 4 p. 100 de menthol.

Indications. — Lénitif, décongestionnant et calmant pour rhinites, laryngites, sinusites, rhumes et trachéo-bronchites.

Balsofumine mentholée
à action spéciale en sinusites.

Posologie. — 1 cuillerée à café par inhalation, 2 à 6 inhalations par jour.

Prix : 18 fr. 70 le flacon, pour 20 jours de traitement.
Balsofumine Mentholée à 4 % : 20 fr. 80.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les n^{os} 1790-2, 1790-3, 1790-4.

Laboratoire de CHIMIOTHÉRAPIE
22, rue de Turbigo. — PARIS (II^e).
(Tél. : Central 95-18.)

BALSORHINE

(Ancien Balsorhinol)

La BALSORHINE Huile, Capsules et Pommade remplace le Balsorhinol.

Huile balsamique, éphédrinée à 0,50 p. 100.

Composition. — Essence d'Eucalyptus, terpinol, essence de pin sylvestre, essence de lavande, essence de badiane, éphédrine base, huile végétale.

Présentation

1^o Flacons munis de compte-gouttes.

2^o Capsules gélatinées.

Posologie. — Instillations ou pulvérisations.

Prix : 15 fr. 60 le flacon-compte-gouttes pour 20 jours de traitement ;
12 fr. 50 la boîte de capsules pour 8 jours de traitement ;
Pommade : 6 fr. 25.

Laboratoire de CHIMIOTHÉRAPIE
22, rue de Turbigo — PARIS.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 1790-5, 1790-6, 1790-7.

BANDE DU PRATICIEN

Présentation. — Bande élastique, marquée à ses deux extrémités, à double enrobage assurant le coefficient optimum de contention.

Longueur..... 3 mètres.
Largeur..... 0^m,08

Prix : 47 fr. 85

Indications. — Ulcères variqueux et plaies atones. Varices. Œdèmes de fractures. Œdèmes post-phlébitiques. Séquelles de phlébites.

Nota. — Sur demande spéciale, les Laboratoires du Praticien peuvent fournir des bandes d'une longueur supérieure à la longueur standard de 3 mètres.

Pour les malades hypersensibles, prescrire de préférence la

LASTO-BANDE DU PRATICIEN

modèle plus souple et plus mince.

Longueur..... 3 mètres.
Largeur..... 0^m,08

Prix : 55 fr. 10

La *Bande du Praticien* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,

HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)

« BANDE GILTEX »

Bande élastique pour le traitement ambulatoire des ulcères variqueux, grosses varices, suites de phlébites, œdèmes, etc.

La bande Giltex, longue de 3 m., large de 8 cm., est garantie tissée avec des gommés de latex inattaquables au lavage.

Elle est présentée dans une coquette boîte de carton, entourée de cellophane et livrée avec deux agrafes de fixation supprimant l'épingle anglaise qui détériore le tissu élastique.

Prix : 49 francs.

« GILTEX LÉGÈRE »

Bande en 7 cm. et 10 cm. pour les petites varices et petites articulations.

« BAS A VARICES GILTEX »

Invisible sous les bas de dames. *Jarret, jarret montant, cuisse.* Tailles : 1, 2, 3.

Dépôt général : O. C. P.

Production BOURVIS-ORTHOPÉDIE

28, cours Gambetta — LYON (Rhône).

(Tél. : Parmentier 33-61.)

BANDE MÉRINOS « BÉBÉ »

Bande Rationnelle du premier âge.

Extensible, chaude, lavable.

Composition. — Fils crêpe (sans caoutchouc) et laines mérinos, 1^{er} choix.

Indications. — Pour soutenir les organes fragiles du bébé jusqu'à 18 mois.

Maintient sans comprimer.

Entretient la chaleur autour du ventre.

Poreuse : Laisse respirer l'épiderme.

Présentation et prix au public :

Bande n° 1 (9 cm.) jusqu'à 6 mois..... 9 fr.

Bande n° 2 (14 cm.) de 6 à 18 mois 13 fr.

Fabricants :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

BANDE « PRESTO »

Bande plâtrée brevetée à prise rapide.

Constitution. — Bande de tarlatane sur laquelle le plâtre est fixé par un fourreau hydrophile.

Indications. — Confection facile et rapide d'appareils immobilisateurs plâtrés particulièrement légers.

Mode d'emploi. — Immerger verticalement la bande dans l'eau pendant 30 secondes environ. La dérouler en commençant par l'indicateur de départ qui peut sans inconvénient rester dans l'appareil.

Prix de vente en pharmacie : La bande de 2 mètres :

5 % _m	7 % _m	10 % _m	12 % _m	15 % _m	20 % _m
4 fr.	5 fr.	6 fr. 50	7 fr. 50	10 fr.	12 fr. 50

Laboratoires des Pansements RUBY

M. PACCARD, Docteur en pharmacie

VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

BARBIFLORINE

(Hépaflorine liquide suractivée.)

Priorité. — La barbiflore (orthosiphon stamineus) et le phyllanthus javanais ont été introduits dans la pharmacopée courante par « Angla », respectivement en 1934 et en 1937.

Composition. — Solution hydro-glycérinée de Barbiflore, Cynara scolymus et Phyllanthus javanais. Goût agréable.

Propriétés. — Puissant diurétique végétal atoxique. Hépatotonique de choix. Uréopoiétique et protéolytique. Sclérolysant. *Spécifique naturel de l'instabilité humorale.*

Indications. — Oliguries, Cirrhoses, Ictère, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérinémie, Athérome, Œdèmes et Ascite, Lithiases urinaire et biliaire, Insuffisance hépatique ou hépatorenale, Infiltration calcaire, Hypertension, Suites d'infections, Prophylaxie post-opératoire, etc.

Posologie. — 3 cuillerées à café et plus par jour, aux repas ou dans une infusion chaude.

Flacon de 125 cc.

Bibliographie et échantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique. »

BARCAN

Proliférations cellulaires. Artériosclérose.

Composition et présentation :

Granules de saccharate de baryum.

1 granule correspond à II gouttes de la solution à 1/10 000 de saccharate de baryum.

Action :

- 1° Tend à rendre à la cellule néoplasique le métabolisme d'une cellule normale ;
- 2° Provoque l'élimination du calcium, en même temps qu'il augmente le débit urinaire.

Indications :

Artériosclérose, Traitement préventif et curatif des proliférations cellulaires.

Posologie :

Artériosclérose : 2 à 5 granules par jour, le matin à jeun, 2 ou 3 fois par semaine.

Néoplasies bénignes et malignes :

a. Préventivement : 2 ou 3 fois par semaine, 2 à 5 granules le matin à jeun dans un peu d'eau. Compléter le traitement par 4 divisions de *Chocochaux*, une semaine sur deux (cf. Chocochaux).

b. Adjuvant des traitements néoplasiques habituels. Tous les 2 jours, 1 à 5 granules le matin à jeun.

Adjonction de Chocochaux comme ci-dessus.

Prix. — Flacon de 100 granules : 25 francs.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux et des Ministères des Colonies et de la Marine.

79, rue de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

BARDANE STABILISÉE

(Extrait de racine.)

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médication abortive de la Furonculose, Spécifique de la furunculose vraie, mais sans action sur la Folliculite ou sur les autres inflammations superficielles.

Formes spécialisées. — Pilules et Dragées DAUSSE de Bardane stabilisée, dosées à 0 gr. 20 d'extrait mou par pilule ou dragée. 3 pilules matin, midi et soir, soit 9 pilules par jour, pendant 4 ou 5 jours.

EXTRAIT FLUIDE DE BARDANE DAUSSE

Prendre 4 à 6 cuillerées à café par jour, en nature ou dans un peu de tisane dépurative.

Élixir Dépuratif Dausse préparé avec l'extrait fluide.
2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

BARYTOL

Examen radiologique du tube digestif.

Sulfate de baryum poudre, chimiquement pur, inaltérable, d'une innocuité absolue, très opaque. Préparation facile, rapide et de goût agréable.

Mode d'emploi. — Verser dans un grand bol contenant 200 à 250 gr. d'eau froide ou chaude, agiter constamment jusqu'à émulsion complète. Le lait de baryum ainsi préparé reste homogène et assure des contrastes remarquables.

Posologie :

Estomac : *Barytol PM* (200 gr.) : 13 francs.

Transit : *Barytol GM* (400 gr.) : 21 francs.

Conditions médicales et vente en vrac hôpitaux, cliniques.

Émulsionneur. Prix médical : 20 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e).

(Tél. : V. 93-88. Ch. Px : Lyon 96-04.)

BARYX COLLOIDAL

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif. Poudre colloïdale dosée à 84 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1143-2.

Avantages. — Facile à diluer. Donne une émulsion très stable. Sans aucune adjonction alimentaire. Conservation parfaite. Examens des contours, Etude du relief des muqueuses. Lavements barytés.

Posologie :

Estomac 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 fois.

Région cæco-appen-

dicaire 150 gr. dans 225 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit 300 gr. dans 450 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Lavement baryté 5 à 600 gr. dans 1 litre 1/2 d'eau.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans la quantité d'eau indiquée en agitant rapidement avec une cuiller jusqu'à complet mélange.

Présentation. — Boîte de 150 grammes. Prix : 12 fr. 75.

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél. : n° 71)

R. C. Rambouillet 5-184. — Compte Chèques postaux : Paris 1857-27.

Commandes pour Paris : Trudaine 55-77.

BASEDOWINE

Indications. — Maladie de Basedow fruste et constituée. Nervosisme féminin. Instabilité thyroïdo-ovarienne. TROUBLES DE LA MÉNOPAUSE et RÉGLES DOULOUREUSES.

Composition. — Extrait thyroïdien, Ovarine et Hormone Ovariennne lipoïdique cétosoluble, un dérivé bromé en très faible dose.

Particularités. — Médication parfaitement inoffensive.

Traitement d'essai de toutes les déficiences et irrégularités du système sympathico-endocrinien chez la femme.

Posologie. — 1 à 4 comprimés le soir au coucher 5 fois par semaine. (A continuer sans danger.)

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoires R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e).

(Tél. : Suffren 46-57.)

BASMYL

Composition par dragée :

Castoréum	0,025
Bromure de Codéine	0,01
Dionine	0,005
Extraits d'Aconit	0,004
De Belladone.....	0,004
D'Ipéca.....	0,005
D'Erisimum et de Grindelia	0,05
Thiocol	0,10

Forme. — *Comprimés dragéifiés.*

Indications. — Toux spasmodiques, Affections pulmonaires, Emphysème, Spécifique du spasme dans toutes les affections trachéo-bronchiques.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour, à distance des repas.
Prix : 14 fr. 50 la boîte de 20 dragées. Durée de la boîte : 6 jours environ.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1206-1.

A. BOUCHAND, Pharmacien
à MELLE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 46.)

BAUME ADOL

Composition. — Préparation à base de : Acide salicylique, Salicylate d'Amyle, *Gaïacol*, Menthol, Chloroforme.

Action thérapeutique. — Analgésique puissant anti-rhumatismal. Suppression de l'odeur désagréable du salicylate de méthyle. *Décongestionnant antifièvre.* Action précieuse dans les affections bronchiques et pulmonaires (*Gaïacol*).

Indications. — Rhumatismes aigus ou chroniques, goutte, lumbago, *torticolis*, zona, sciatique, névralgies, migraines, coliques hépatiques et néphrétiques, orchites, etc...

Mode d'emploi. — Faire une friction légère et une onction et recouvrir d'ouate et de tissu imperméable. Une à deux applications par jour.

Prix : 11 fr. 15.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.
78, Cours de la Liberté — LYON.
(Tél. : Moncey 13-37.)

BAUME AROMA

Spécifique des rhumatismes et des douleurs en gé.éral.

Composition et forme. — Baume à base d'essence de plantes aromatiques et des constituants du liniment de Rosen.

Essences aromatiques	6	Salicylate d'amyle	4
Beurre de muscade	2	Acidesalicylique	3
Vaseline.....	60		

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique et résolutif puissant. Révulsif pulmonaire. Odeur agréable.

Indications thérapeutiques. — Rhumatisme aigu et chronique, goutte, lumbago, torticolis, efforts et toutes douleurs musculaires, courbatures, névrites, sciatiques crurale et brachiale, pleurésie sèche, points de côté, foulures, varices.

Mode d'emploi. — Frictionner doucement et longtemps avec le baume pour en faciliter la pénétration, recouvrir avec une feuille de coton ordinaire que l'on maintiendra par une bande ou une ceinture, suivant qu'il s'agit d'un membre ou du thorax et des reins.

Faire cette friction suivie du pansement une à deux fois par jour.

Prix : 11 fr. 20 (pour 10 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

BAUME du Dr BAISSADE

adopté par les hôpitaux de Paris (Saint-Louis) et de province ; par les Ministères des Colonies et de la Marine.

Composition. — Association de camphre, soufre, goudron, huile de chaulmoogra, de consistance semi-fluide, d'odeur agréable.

Action. — Antiprurigineux et analgésique, supprime immédiatement les démangeaisons et la douleur. Antiseptique puissant, calme et arrête l'élément inflammatoire des lésions cutanées.

Aucune causticité ; peut être appliqué sur les Eczémas les plus aigus et les plus récents, aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Indications. — Eczémas suintants, secs aigus, chroniques. Tous les prurits, avec ou sans lésion cutanée. Lichen, Psoriasis, Acné, Folliculites, Furunculose, Impétigo, Séborrhée de la barbe et du cuir chevelu, Sycosis, Gerçures des seins, Papules et Pustules des fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En onctions douces (Dermites aiguës), ou énergiques (Dermites chroniques) sur les parties malades, à la main nue ou à l'aide d'un tampon de coton. Recouvrir d'une compresse de gaze.

Un pansement par jour, le soir de préférence.

Ne pas laver la région traitée avant complète guérison ; se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge.

Prix au public : 12 francs et 18 francs.

Laboratoire du Baume du Dr BAISSADE

Saint-Loup — MARSEILLE.

BAUME D_{es} B_é B_{és}

Composition :

Para-amino-benzoate-d'éthyle	5 gr. 00
Chlorhydrate amidobenzoldiéthyl ami- noéthanol	0 gr. 25

Pour 100 grammes.

Forme. — Pommade en tube.

Indications. — Spécifique des douleurs de la première dentition.

Mode d'emploi. — Mettre avec le doigt la grosseur d'un pois sur les gencives.

Prix du tube : 9 fr. 90.

Enregistré au L. N. sous le n° 1890-1.

Toutes pharmacies et

Laboratoires MOSNIER, Pharmacien,

Ancien Interne des Hôpitaux,

52, rue de la Folie-Regnault — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 16-94.)

BAUME BENGUÉ

Composition. — Menthol, Salicylate de méthyle, Lanoline et **Topique Bengué**, Baume sans odeur au Salicylate de Glycol.

Propriétés et Indications. — *Analgesique externe* : Rhumatismes aigus ou chroniques, Goutte, Névralgies diverses : faciales, intercostales (points de côté), lombaires (lumbago), ovariennes, sciatiques. Douleurs de l'ataxie locomotrice, Hyperesthésies diverses, Coliques de plomb, Coliques néphrétiques, Péritonite, Gastralgie, Torticollis, Zona.

Forme. — Pommade en étui d'étain.

Posologie. — Onctions douces et persistantes deux fois par jour; enveloppements d'ouate, serviette ou flanelle.

Prix : 9 fr. 55. — L. N. C. M., n° 516-4.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trin. 85-60.)

BAUME BERTHELOT

Analgésique puissant d'odeur agréable.

Non irritant.

Permet l'application des U. V.

Formule. — Ext. Belladone, Essences de Lavande, Thym et Romarin, Salicylate de Benzyle, Acide salicylique, Menthol, Camphre, Chloral, Chloroforme, Excipient parfumé.

Indications. — Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Lumbagos, Entorses, Foulures, Maux de Rein, Névralgies, Points de côté, Toutes douleurs.

En massages deux fois par jour.

Laboratoires BERTHELOT

J. BERTHELOT, Pharmacien,

Saint-Ouen-l'Aumône (S.-et-O.).

BAUME CRÊSA

du Professeur Carrière

A base de Crésotate de Glycol.

Préparation d'odeur agréable, opiacée et belladonnée.

Traitement local externe des douleurs.

Rhumatisme, Goutte, Sciatique, Lumbago, etc...

Produits STÈNE

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BAUME DELACOUR

Gerçures et Crevasses des Seins

Gerçures en général.

Baume benzo-tannique.

Mode d'emploi. — Laver la crevasse avec de l'eau bouillie et un tampon d'ouate, appliquer le baume et recouvrir les mamelons avec les bouts de sein en métal afin d'éviter le frottement du linge.

Prix du flacon avec deux bouts de sein
8 fr. 40

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

BAUME DURET

Créé et adopté à l'hôpital Saint-Louis
(Dermatothérapie).

Composition. — Combinaison de soufre, goudron de Norvège, camphre, huile de cade, résorcine, borate de soude, gaïacol, dans un mélange d'acétone, huile de ricin, lanoline.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestif et cicatrisant. Ni toxique, ni irritant.

Indications. — Eczéma, Lichen, Psoriasis, Acné, Prurigo, Dartres, Parakératoses, Prurit, etc...

Mode d'emploi. — Onction deux fois par jour recouvrir ensuite d'une compresse de gaze.

Le flacon d'environ 80 gr. : 17 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 306-3.

H. ROUTIER, Pharmacien de 1^{re} classe

20, rue Saint-Lazare — PARIS.

(Tél. : Trudaine 20-81.)

BAUME KALENDOL

Composition et forme. — Pommade en tube à base de bismuth, Teinture spéciale de Calendula, Extr. de ratanhia, associés à un excipient nouveau.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant, antiseptique, cicatrisant.

Indications. — Gerçures et crevasses des seins, Rougeurs et feux des bébés, brûlures, engelures. Coups de soleil, Impétigo et plaies de toutes sortes.

Mode d'emploi. — En applications, recouvrir de gaze et de coton.

Huit jours de traitement.

Laboratoire **G. COULLOUX**

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

BAUME LARTIGOL

A base de chloral, camphre, acide salicylique et menthol. Odeur agréable, incolore.

Mode d'emploi. — Étendre avec les doigts sur la région douloureuse et faire des frictions douces pendant 5 minutes.

Indications. — Contre les névralgies et douleurs de toute nature, assouplissement des articulations avant ou après les exercices sportifs.

Prix, le tube : 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : de 2 à 4 semaines.

ÉTABLISSEMENTS FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

BAUME DE LA MATERNITÉ

Composition :

Chlorhydrate d'amyléine.....	0,10
Résorcine.....	0,20
Acide borique	2 gr.
Dermatol	0,50
Baume du Pérou	0,10
Lano-vaseline.....	Q. S.

pour un tube.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisant énergique des crevasses du sein et de toutes les gerçures.

Indications. — Érythème fessier, toutes gerçures en général.

Dépôt : **Laboratoires NOGUÈS**

7, rue Galvani — PARIS.

BAUME OBERLIN

Sédatif des algies justiciables de la médication salicylée.

Douleurs névralgiques

(sciatique, névrites, etc.).

Rhumatismes, Lumbago, Goutte.

Formule. — Pour 100 gr.

Ulmarène.....	17 gr.	25
Menthol.....	3 gr.	45
Chloroforme	3 gr.	80
Lanoline-Vaseline.	Q. S.	

En tubes de 35 gr.

A employer en frictions ou en applications.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Pharmacie de Paris

17, rue Cadet — PARIS (IX^e)

(Tél. : Trudaine 14-73.)

BAUME-PANTHÉSINE

A base de Panthésine « Sandoz », anesthésique local.

Propriétés. — Calmant analgésique non révulsif pour toute douleur et névralgie *accessible extérieurement* (douleurs musculaires, articulaires, cutanées) et pour toute démangeaison. Modère les processus inflammatoires en neutralisant par sa réaction basique l'acidité des tissus enflammés et en supprimant les réflexes axoniques.

Indications. — Névralgies intercostales. pleurodynie, névrites, arthralgies. Rhumatisme aigu et chronique. Pseudo-rhumatisme infectieux. Sciatique. Contusions douloureuses. Coup de soleil. Erythème actinique. Lumbago. Crises hémorroïdales, tout prurit.

Présentation. — Tubes de 10 et 20 grammes.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BAUME RAFAX

Composition. — Borate de soude, sulfate double d'alumine et de potasse, alcool, huile d'amandes douces.

Indications. — Le *Baume Rafax* est indiqué dans le traitement des maladies de la peau, en particulier dans l'eczéma, dartres, acné, psoriasis, ulcères et *Brûlures*.

Avantages. — Agréablement parfumé, le *Baume Rafax* ne contient aucun acide et son emploi est rigoureusement sans danger.

Présentation et prix :

Flacon : 25 fr.

Un seul flacon suffit pour un traitement normal.

Agence Générale des Produits RAFAX

4, rue Boulard — PARIS (XIV^e).

Tél. : Ségur 96-72.

BAUME RHODIA

à base de Rheumacylal
(Salicylate de Glycol)

Succédané inodore du salicylate de méthyle.
Ne tache pas le linge.

Indication :

Traitement externe des douleurs rhumatismales et des névralgies.

Présentations et mode d'emploi :

Deux présentations : Forme liquide et forme crème.
Onctions légères suivies d'enveloppement ouaté non compressif.

Le tube de crème : 8 fr. 50. — Le flacon : 11 fr. 70.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean- Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Baizac 22-94.)

BAUME ROBUR

Toutes douleurs Rhumatismales, Névralgiques
et Musculaires.

Formule :

Extrait de belladone	0 gr. 30
Salicylate d'Amyle	5 gr.
Camphre	4 gr.
Menthol.....	2 gr.
Chloroforme.....	3 gr.
Teint. de Capsicum	4 gr.
Ess. de lavande.....	1 gr.
Ess. de Cèdre	3 gr.

Lanovaseline pour 100 grammes.

En tube de 90 grammes.

Mode d'emploi. — En massages et applications.

Le remarquable pouvoir de pénétration et d'entraînement dans les tissus de l'essence de Cèdre triple l'efficacité du Baume Robur.

Prix : 14 fr. 50.

Échantillon et Littérature :

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS

(Tél. : 15-56.)

BAUME SÉLÉNIA

AU SÉLÉNIUM COLLOÏDAL

Propriétés thérapeutiques. — Il en est quatre principales :

Le **Baume Sélénia** est *décongestif*, calme la *démangeaison*, le *prurit*, décape les *téguments*, est *cicatrisant*.

Indications. — Il est le médicament de choix dans le traitement des *Eczémas*, *Pyodermites*, *Ulcérations de la peau*, *Bouton d'Orient* (Clou de Biskra).

Mode d'emploi. — S'applique à froid, mais de *préférence à chaud*, l'action étant ainsi plus immédiatement calmante et plus grande. Dans ce cas, liquéfier le Baume complètement au bain-marie.

Prix du pot : 15 francs.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par **C. DAVID** et ses fils

Pharmaciens, 49, rue de Bitche — COURBEVOIE
(Seine). (Tél. : Défense 28-46.)

BAUME THOMAS

Formule :

Scuroforme 5

Borate de soude 4

Excipient insoluble, Q. S. pour 100 gr.

Présentation. — Pâte de goût et d'odeur agréables.

Indication. — Douleurs de la dentition chez les nourrissons.

Avantages. — Ne fond pas dans la bouche. Malgré les suctions de l'enfant, reste en contact avec la gencive pendant toute la durée de la friction et assure ainsi rapidement une anesthésie prolongée. Absolument inoffensif. Quinze ans d'existence. Nombreuses attestations médicales.

Posologie et mode d'emploi. — Effectuer avec le doigt recouvert d'un peu de Baume Thomas des frictions sur les gencives douloureuses aussi souvent que nécessaire.

Prix : 10 francs le tube pour une dentition.

Enregistré au Lab. N^o de Contrôle sous le n^o 650-2.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS,
(Tél. : Provence 49-77.)

BAUMIX

Formule :

Menthol	0 gr. 281
Calomel à la vapeur	2 gr. 81
Peroxyde de zinc	7 gr. 025
Baume du Pérou	5 gr. 62

pour 100 gr.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle 322-1.

Indications thérapeutiques. — Ulcérations variqueuses. Brûlures et toutes plaies de toute nature.

Chaque pot est accompagné d'un mode d'emploi très détaillé.

Livré en pot aluminium de 60 cgr.

Prix : 11 fr. 50.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

BAUMOLACPINE

pour bains à l'essence de pin.

Forme. — Liquide de fluorescence verte.

Composition. — Essence de pin soluble dans l'eau, ne salissant pas les baignoires.

Essence de pin 40,00 pour 100 gr.

Indications. — Convalescence, Faiblesse, Débilité, Anémie, Maladies nerveuses, Rhumatismes, Arthritisme.

Posologie. — Une à deux cuill. à soupe par bain.

Prix :	{	Flacon de	3 bains...	7 fr. 05
		— de	15 — ...	28 fr. 80
		— de	50 — ...	75 fr. 50
		— de	100 — ...	135 fr. 90

Enregistré au L. N. C. des M. sous n° 659-1.

Laboratoires FISCH et C^{ie} S. à r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Trudaine 92-52.)

BBDERM MARS

Pommade adhésive contre toutes les dermites simples et particulièrement contre celles des nourrissons. Recouverte d'une simple couche de poudre de talc, elle forme à elle seule un véritable pansement qui protège la peau.

Formule. — Oxyde de zinc pur, sous-gallate de bismuth, lanoline, vaseline.

Mode d'emploi. — Étendre une couche bien homogène sur toutes les parties atteintes et poudrer. Renouveler ce pansement au moins une fois par jour, après avoir enlevé la vieille pommade à l'aide d'un tampon d'ouate imbibé d'huile.

Indications. — Dermites, prurits, etc. C'est le préservatif et le curatif par excellence de tous les érythèmes des nourrissons. Dans les dermatoses suintantes et impétigo, employer le **BBDERM ECZÉMA** après lavages à l'eau Sanubrolée. (Voir à l'article **SANUBROL MARS**.)

2 sortes de Bbderm Mars :

Bbderm simple : toutes dermites des nourrissons.

Bbderm Eczéma : impétigo, eczéma et toutes dermites suintantes.

Prix 11 fr. 50 le tube.

Echantillons sur demande.

Enr. au L. N. C. sous Nos 1649-3 et 1649-4.

Laboratoire MARS

GUÉRANDE (Loire-Inférieure). Tél. : 22.

BÉATOL

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif nerveux. Hypnotique.

Indications. — Insomnies, Affections nerveuses ou mentales, Douleurs d'ordre toxique, psychique ou réflexe.

Composition. — A base de Diéthylmalonylurée, de jusquiame et de valériane.

Formes. — Comprimés, Liquide et Ampoules.

Doses et mode d'emploi :

1° *Liquide ou Comprimés* : A prendre dans ou avec une infusion de tilleul, de fleurs d'oranger ou d'eau sucrée : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés dans les 24 heures, de préférence au repas du soir, au coucher ou dans la nuit.

2° *Ampoules* : Le contenu d'une ampoule en injection sous-cutanée, ou mieux intramusculaire, le soir au coucher ou suivant prescription médicale.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

BÉCALCIOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie (non aurique) des Tuberculoses osseuses, ganglionnaires et pulmonaires.

Composition :

Association de catalyseurs en solution huileuse colloïdale contenant :

Manganèse	0,09 mgr.
Cuivre.....	0,08 mgr.
Calcium	0,05 mgr.
Potassium	0,02 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Becalcioi-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines, arrêt et reprise du traitement s'il est nécessaire. Il est recommandé d'associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

BEEF LAVOIX

ou Vin de Lavoix

Composition. — A base de vieux vin de liqueur, le *Beef Lavoix* contient les principes nutritifs de la viande, les principes actifs du quinquina et des phosphates.

Indications. — Convalescence, Inappétence, Tuberculose, Anémie, Épuisement, Grossesse, Allaitement.

Posologie. — Un verre à madère avant ou après chaque repas.

Prix : 25 fr. 50 le flacon ; 15 fr. 30 le 1/2 flacon.

Enregistré au L. N. C. n° 759-1.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

BELCARMINE

Association de Belladone, Jusquiame, Formine, Charbon animal et végétal.

Formule. — Une cuillerée à café de granulé contient : Teinture de Belladone, teinture de Jusquiame : à 5 gouttes. Formine 0 gr. 15. Charbon animal 0 gr. 50. Charbon végétal 1 gr.

Présentation. — Granulé fondant. Cachets. Dragées.

Indications. — *Troubles digestifs vagotoniques. Entérocolites, cholécystites chroniques, angiocholites, fermentations intestinales, constipation chronique, aérophagie.*

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café ou cachets après les repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café 2 fois par jour.

Prix : Boîte modèle courant : 14 fr. 50. (Durée moyenne 7 jours.)

Flacon Cure : 32 fr. 25.

Laboratoire R. THIRODE

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie.

33, Grande-Rue — BESANÇON. (Tél. : 30-37.)

BELHÉMINE

**Ampoules de Sérum pur de Sang de Cheval,
Sérum hématopoiétique.**

Indications. — Toutes les anémies, hémorragies, fausses-couches. En pansements locaux : plaies, ulcères variqueux, brûlures.

Mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 à 2 ampoules par jour.

Prix public : 22 francs la boîte de 6 ampoules.

Compléter le traitement par l'usage de la

SANGUIPLASMINE

Granulé préparé avec le Caillot sanguin :
Hémoglobine, 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 15 francs le flacon.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoire de Sérothérapie

H. AMMANN, Pharmacien, Licencié ès sciences,
Impasse Adam, 3, BOULOGNE-BILLANCOURT.

(Tél. : Molitor 01-90.)

BELLADÉNAL

Association de Bellafofine ($\frac{1}{4}$ de mgr.) et de Phényl-éthyl-malonylurée (5 centigr.).

Sédatif nervin général et des cas résistants.

Indications spéciales. — Epilepsie, angine de poitrine, tremblements, asthme, tous états de crise, anxiété, douleur morale, vomissements de la grossesse. Mal de mer.

Posologie. — *Comprimés* : 2 à 4 par jour. Dans l'épilepsie, 3 à 5 par jour. Enfants : 2 à 4 demi-comprimés. *Suppositoires* : 1 à 2 par jour.

Belladénal injectable : 1 à 4 cc. selon l'intensité des cas.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLAFOLINE

Alcaloïdes totaux de la Belladone.

Antispasmodique à effets constants. Modérateur des sécrétions.

Posologie :

Comprimés : 1 à 2, trois fois par jour.

Gouttes : X à XX, trois fois par jour.

Ampoules : $\frac{1}{2}$ à 2 par jour (injections sous-cutanées, intramusculaires et endoveineuses indolores).

Sirop : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Naupathie :

Bellafofine : 4 comprimés par jour, un de 2 heures en 2 heures et en plus :

Belladénal : 2 comprimés pris à la fois le soir au coucher.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLASODINE

Traitement Alcalino-Sodique Belladoné, établi d'après la formule du P^r Bourget.

Formule :

Sulfate Soude anhydre.....	0,30
Phosphate Soude anhydre.....	0,20
Bicarbonate Soude anhydre	0,15
Citrate Soude anhydre	0,10
Belladone pulvérisée	0,01

Essence de Badiane pour aromatiser, pour un paquet
n° 30.

Avantages. — Produits chimiquement purs et anhydres. Prix établi judicieusement, moins cher qu'une préparation magistrale tarif A. G.

Indications. — Toutes celles de la Solution de Bourget : insuffisances hépatiques et biliaires, gastralgies, dyspepsies, pyrosis et toutes dermatoses d'origine digestive.

Posologie. — *Adultes* : 1 paquet le matin à jeun et le soir avant dîner dans un verre d'eau tiède ou dans une infusion de badiane, pensée sauvage, etc.

Enfants : 1 paquet le matin.

Prix : 14 fr. 60 pour 15 jours de traitement.

Laboratoire Y. RAVALEC, Pharmacien.

Rue Nouvelle. VILLARD-de-LANS (Isère).

BELLERGA

Modérateur de l'éréthisme nerveux. Traitement du terrain névropathique et de l'émotivité. Régulateur des dystonies neurovégétatives. Traitement préventif du mal de mer.

Composition. — Comprimés dragéifiés renfermant : Tartrate d'ergotamine (Gynergène) : 0 mgr. 3.

Alcaloïdes totaux de la belladone (Bellafoline), 0 mgr. 1.

Phényl-éthyl-malonylurée : 2 cgr.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 dragées par jour, et jusqu'à 6 s'il y a lieu.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour à partir de 5 ans.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

BELLINGUOL

Traitement du diabète par amélioration progressive des fonctions glandulaires.

Organothérapie Bellas

Présentation. — En boîtes de 50 comprimés.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Extrait de rate, Poudre de bile.

Indications. — Toutes formes de diabète après l'âge de 40 ans. Particulièrement indiqué dans les cas de plaies diabétiques ou plaies accidentelles chez les diabétiques.

Posologie. — 3 à 9 comprimés par jour à prendre 1/2 heure avant les repas, matin, midi et soir.

Dans les cas de glycosurie persistante chez des malades impatients et habitués à ne reconnaître une amélioration de leur état que dans la diminution immédiate du taux de sucre dans l'urine, ce résultat peut être obtenu en administrant des doses massives, soit 9 comprimés par jour. Toutefois à cette dose le Bellinguol provoque parfois des troubles intestinaux (diarrhée) ne présentant aucun danger, mais souvent pénibles. Il vaut donc mieux faire patienter le malade et persister avec des doses moyennes pour arriver normalement au même résultat.

Régime. — Le régime habituel, mais moins rigoureux, est à suivre.

Enreg. au Labor. nat. de Contrôle des médicaments. N° 167-16.

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, Pharmacien, 3, place Intérieure-St-Michel - TOULOUSE (Tél. 213-06.)

BEMAX

Le produit naturel le plus riche connu en Vitamines B.

(15 unités internationales par gramme en vitamines B¹.)

Constitué de germes de blé sélectionnés et stabilisés, contient en outre des vitamines A et E en quantité notable. Teneur en phosphore 2,66 p. 100 en P 2 05.

Indications. — Toutes déficiences en vitamines B, et spécialement : Traitement curatif de la constipation et de l'atonie gastrique.

Grossesse et allaitement (dans ce cas, tripler ou quadrupler la dose, un minimum de 500 unités par jour étant nécessaire).

Enfants sous-alimentés, débilités ou simplement de constitution délicate ; rachitisme.

Convalescences, Suites de grippe.

Diabète (augmente la tolérance des hydrocarbures).

Doses. — Le traitement doit être prolongé au moins un mois. 1 cuiller par jour : à soupe pour les adultes ; à café ou à dessert pour les enfants.

Se prend dans du potage, du café, des compotes, etc.

Prix : 13 fr. 50 et 22 fr. 95 (durée : 3/4 semaines ; 6/6 semaines).

Laboratoire LACOMBE

Rue Barbès — COURBEVOIE.

(Tél. : Défense 10-48.)

BÉNERVA « ROCHE »

Composition. — Vitamine B1 cristallisée.

Propriétés. — Élimination rapide des déchets toxiques du métabolisme des sucres (acide pyruvique et ses dérivés). Aucune toxicité, aucun danger d'hypervitaminose.

Indications. — Béri-béri, Polynévrites alcoolique et nicotinique, Polynévrite des diabétiques, Sciatique, Névroses intestinales, Vomissements incoercibles de la grossesse, Auto-intoxications des nourrissons, Furonculose, Cardiopathies carentielles, Traitements neurologiques, Bourdonnements d'oreille post-grippaux, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Comprimés* dosés à 1 mgr. — *Ampoules* de 1 cm³ de dosage normal (2 mg.) — *Ampoules* de 1 cm³ de dosage fort (10 mg.) — 1 à 2 comprimés par jour ; 1 ampoule de 1 cm³ à 2 mg. tous les jours, 1 ampoule de 1 cm³ à 10 mg. tous les deux ou trois jours selon les cas.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N^{os} 504-81 (ampoules normales), 504-83 (comprimés), 504-84 (ampoules fortes).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Arch. 91-10.)

BENSAMINE

Composition. — Combinaison boro-benzoïque d'Hexaméthylènetétramine. Antiseptique général interne et anti-infectieux puissant. Action combinée du benzoate et de l'urotropine créant dans son absorption humorale et dans son élimination urinaire le milieu acide favorable au dédoublement de l'urotropine en son composant actif, le méthanal (formol).

Indications. — **Voies urinales :** urines troubles, alcalines, microbiennes, purulentes. **Syndrome entéro-rénal.** Pyélites gravidiques, colibacilluries, gravelles.

État général : Voies biliaires, coliques hépatiques, ictères, septicémies, rhumatismes, arthralgies.

Formes :

- 1° Comprimés instantanément solubles à 0 gr. 50 de combinaison active. Dose moyenne : 3 à 6 par jour (avalés ou dissous).
- 2° Bensamine liquide : Goût agréable, pure ou diluée : 1 cuillerée à café correspondant à 1 comprimé ; 3 à 6 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n^o 1444-6.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

BENZÉTHOL

Calme la toux. Tarit l'expectoration.

Relève l'état général.

Composition et présentations. — Benzoate de diéthanolamine : Ampoules intraveineuses de 10 cc., solution à 20 p. 100. Ampoules intraveineuses et intramusculaires de 5 cc., solution à 40 p. 100.

Indications. — Suppurations pulmonaires, Absès du poumon, Bronchite chronique, Dilatation des bronches, Broncho-pneumonies, Bacillose pulmonaire.

Posologie. — Une injection par jour. L'injection intraveineuse doit être poussée très lentement pour éviter les petits incidents : bouffées de chaleur, rougeur de la face, sensations douloureuses fugaces au creux épigastrique, impression de voile noir. L'injection intramusculaire doit être précédée d'un anesthésique.

Contre-indications. — Hépatiques et rénaux.

Prix : La boîte de 6 ampoules : 45 fr. 90.

Vrac sur demande.

Produit enregistré au L. N. C. M.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux, des Ministères des Colonies et de la Marine.

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine)

(Tél. : Plaine 24-30.)

BENZO-BISMUTH MILLOT

(Ampoules, Antisypilitique énergique.)

Adopté par le Ministère de la Santé et les Hôpitaux

Indolores. — Ni abcès. — Ni enkystement.

Le **Benzo-Bismuth**, sel soluble, contient 4 centigrammes de Bismuth métal par injection (soit 0 gr. 20 de sel), quantité nécessaire pour obtenir l'effet thérapeutique maximum avec une absence complète de toxicité, car il s'agit ici de 4 centigrammes de métal intégralement actif puisque intégralement absorbé. Ce qu'on ne peut obtenir avec un sel insoluble.

Le **Benzo-Bismuth**, présenté sous forme de poudre extemporanément soluble, s'injecte dans les muscles de la région fessière haute avec autant de commodité qu'une banale injection de cacylate.

Le traitement se fait par séries de 10, 15, ou 20 injections bi-hebdomadaires ou tri-hebdomadaires en cas d'urgence.

Les résultats thérapeutiques sont tout à faits comparables à ceux qu'on est accoutumé d'attendre des arsénobenzols, sans aucun des dangers ni inconvénients de ces derniers.

Les accidents primaires et secondaires disparaissent rapidement. Les syphilis viscérales et nerveuses sont profondément et durablement influencées.

La réaction de Bordet-Wassermann devient négative dans des délais très courts et reste négative sous l'influence du traitement benzo-bismuthé.

Vendu en boîtes contenant poudre et solvant, pour 5 injections. Prix médical : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

BENZOCARBINE

Formes. — Granulés. Cachets.

Composition. — Charbon animal, Benzo-naphtol, Hexaméthylène tétramine.

Indications. — Affections intestinales.

Posologie.

Granulés : 1 à 3 cuillerées à café après le repas.

Cachets : 3 cachets par jour au moment des repas.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale
du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.**

BENZOFLOLINE JULIEN

Gouttes et Comprimés.

Composition :

Benzoate de benzyle et dériv. benzylés.	10
Extr. fluide valériane fraîche stabil. . .	1 000
Alcoolature de Passiflora Incarn.	1 000
Teinture de Cratægus oxyacantha . . .	1 000

Indications. — Tous les états spasmodiques, Insomnies, Angoisses, Vertiges, Éréthisme cardio-vasculaire, Tachycardies, Arythmies, Palpitations.

Posologie. — Insomnies : L à LX gouttes le soir dans une infusion, ou 1 à 3 comprimés. Spasmes : XXV gouttes ou 1 comprimé 3 ou 4 fois par jour. Prix : Gouttes, 16 francs. Comprimés, 16 fr. 30. — Flacon gratuit sur demande.

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie,
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 80-76.)

BENZO-GYNŒSTRYL

Folliculine cristallisée du Dr Roussel
(Benzoate d'Œstradiol).

Voie intramusculaire. — Ampoule de 1 cc. contenant 1 mgr. d'hormone, soit 10 000 U. I. (1935) en solution huileuse.

Indications. — Infantilisme utérin, aménorrhée, oligoménorrhée, dysménorrhée, ménopause naturelle ou artificielle. Vomissements et troubles de la grossesse.

Posologie. — Si la fonction ovarienne n'est pas abolie, 1 à 4 injections réparties au cours des 2^e et 3^e septenaires de la période intermenstruelle.

En cas de carence totale, 4 injections dans le mois en maintenant entre elles un intervalle de 7 à 8 jours.

Prix au public : La boîte de 2 ampoules : 27 fr. 55.

Voir aussi **Gynœstryl** et **Benzo-Gynœstryl** 5.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

BENZO-GYNŒSTRYL 5

Folliculine cristallisée du Dr Roussel
(Benzoate d'Œstradiol).

Ampoule de 1 cc. contenant 5 mgr. d'hormone, soit 50 000 U. I. (1935) en solution huileuse (voie intramusculaire).

Indications. — Troubles fonctionnels ou généraux résultant des déficiences ou des carences ovariennes graves ou rebelles.

Posologie. — Si la malade est encore réglée : 1 à 4 injections par mois au cours des deuxième et troisième septenaires de la période intermenstruelle.

Si la malade est aménorrhéique, régler la posologie suivant le but à obtenir en utilisant une dose minima de 2 ampoules par mois.

Prix au public : 43 fr. 45 la boîte de 1 ampoule.

Voir aussi **Gynœstryl** et **Benzo-Gynœstryl**.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

BENZO-IODHYDRINE

La BENZO-IODHYDRINE n'est pas seulement la première réalisation de la cure iodée, sans iodisme (Thèse du Dr Chenal, F. M. Paris, novembre 1896), elle est aussi un corps iodé qui présente une activité thérapeutique très puissante, très étendue et rare parmi les corps iodés.

C'est un médicament iodé hypotenseur diurétique, éliminateur puissant d'acide urique. Ces diverses qualités en font le médicament par excellence des Cardio et des Artérioscléreux, des Goutteux, des Emphysémateux. Chaque capsule de gluten correspond à 30 cgr. de KI.

Doses. — 2 à 10 capsules par jour, aux heures des repas.

Fabrication, vente en gros et échantillons.

Laboratoires SECLO

J.-P. PINTA, Pharmacien,

6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Wag. 62-71).

BENZOQUINOL

Composition. — Benzoate de quinquoline, thymol, benjoin mentholé eucalyptolé, gaulicol, essence de niaouli, et essences diverses.

Propriétés. — Antiseptique et anesthésique des voies respiratoires. Sédatif et antispasmodique certain.

Indications. — *Coqueluche, asthme, emphysème, toux nerveuses, dyspnée, bronchites aiguës et chroniques.*

Caractéristiques. — Effet rapide et continu, pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — En inhalations, XV gouttes dans un quart de litre d'eau bouillante, deux à trois inhalations par jour.

Pour les enfants en bas âge, les inhalations au pied du lit dans une chambre bien fermée.

Remarque. — Que le médecin traite la coqueluche par des vaccins, des injections d'éther, de sérum, il est nécessaire de compléter le traitement par des inhalations au Benzoquinol.

Prix : 13 francs.

Laboratoires KERFYSER

DUNKERQUE.

BENZOSULFÈNE

Dragées glutinisées d'Hyposulfite de Na,
Hyposulfite de Magnésium et Benzonaphtol.

Indications :

Intolérances alimentaires, Dermatoses,
Eczéma, Urticaires, Déficiences hépa-
tiques, etc.

Doses :

Adultes : 1 dragée avant chacun des 3 repas
(à avaler sans croquer).

Enfants : 1 à 2 dragées par jour.

Laboratoire MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste—PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n^o 1122-5.

BENZYLOCALCIUM

Récalcification (vitaminée-phosphorée) intensive, ren-
forcée par le Fenugrec désodorisé.

Assimilation assurée par les actions combinées :

1^o Antispasmodique et hypnotique du noyau Benzy-
lique ;

2^o Antitoxique de la substance génératrice de vitamine B.

Formule :

Benzylohypophosphite de calcium..... 7 gr. 50

Fenugrec désodorisé 4 gr.

Substance véhicule de vitamine B..... 1 gr.

Deux formes : Granulé et cachets.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à café de granulé, ou un cachet
3 fois par jour, avant les repas.

Enfants : 1 demi-cuillerée à café ou un cachet 2 fois par
jour.

Indications. — Adénopathie ; Prétuberculose ; Débilité ;
Amaigrissement.

Prix :

Cachets 21 fr.

Granulé 19 fr.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

BÉTUL-OL MIDY

Composition. — Menthol et chloral, en solution dans le salicylate de méthyle.

Propriétés. — Calme rapidement les douleurs aiguës de la goutte et du rhumatisme.

Indications — Lumbagos, Sciatiques, Douleurs des articulations, Névralgies, Névrites, points de côté, douleurs thoraciques, courbatures.

Forme. — Liniment pour l'usage externe, parfaitement absorbé par la peau.

Posologie et mode d'emploi. — Le BÉTUL-OL MIDY peut être employé, soit sous forme d'onctions et de frictions, soit sous forme d'enveloppements.

1° *Onctions et frictions*: Enduire la région douloureuse avec une pièce de flanelle imbibée de BÉTUL-OL. Frictionner *doucement et longtemps*. Recouvrir avec la flanelle, puis avec un taffetas gommé imperméable et une couche de coton.

2° *Enveloppements*: Imprégner largement un morceau de flanelle, l'appliquer sur la partie douloureuse, recouvrir de taffetas gommé puis de coton. Renouveler l'application 2 à 3 fois par jour.

L'absorption du BÉTUL-OL se fait si rapidement par la peau que, 10 minutes après, on peut déceler dans l'urine la présence de l'acide salicylique.

Prix : 19 fr. 60. Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, av. de Wagram — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

BEVITA

Composition. — Levure de bière purifiée, désamertumisée et séchée, de goût agréable.

Protéines	56	p. 100
Hydrates de carbone	26	—
Lécithine	1	—
Glutathion	0,65	—
Vitamines B ¹ , B ² , B ³ , B ⁴ , B ⁵ , B ⁶ .		

Indications. — Convalescence, Affections cutanées, Staphylococcie, Diabète, Anorexie, Dyspepsie, Entérococolite chronique, Constipation, Ulcère gastro-duodénal, Vomissements de la grossesse, Hypovitaminose B de l'adulte, de l'enfant et du nourrisson.

Posologie. — *Enfants* : 5 à 10 grammes, soit 2 à 4 cuillérées à café par jour.

Adultes : 10 à 30 grammes.

Remarque. — Le goût agréable de BEVITA en permet l'utilisation infantile. Il est recommandé de l'ajouter aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux légumes ou pâtes, ou encore de l'absorber délayé dans un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 13 fr. 25 la boîte de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. (Tél. : 211-35.)

BEVITINE

Vitamine B1 cristallisée.

Vitamine B1 cristallisée, antinévritique. Comprimés et solution aqueuse.

Vente limitée à la France, Colonies Françaises, Pays de protectorat et sous mandat français.

Indications. — Bériberi, troubles du métabolisme, de la nutrition des nerfs, névrites, polynévrites (toxiques, infectieuses, gravidiques, diabétiques), névralgies, funiculites, myéloses, chorée, sclérose en plaques, diabète, anorexie du jeune âge.

Présentations et posologie.

Comprimés dosés à 0 gr. 005 (tubes de 20). 1/2 à 1 comprimé par jour suivant l'âge. Le tube : 31 fr. 20.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 002 de Vit. B1 =. 26 francs.

Boîtes de 5 ampoules de 1 cc. dosées à 0 gr. 01 de Vit. B1 =. 72 fr. 50.

Injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses (0 gr. 002 à 0 gr. 01 *pro die* suivant la gravité des cas. Séries de 10 à 12 injections).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

BEXININE

Sirop anticoquelucheux.

Composition. — Association d'essences aromatiques antiseptiques des bronches (eucalyptol, niaouli, cyprès, serpolet, etc.) et d'antispasmodiques (bromoforme, benzoate de benzyle, droséra et grin-délia).

Indications. — Efficacité remarquable dans le traitement de la *coqueluche*, toux spasmodiques, toux rebelles, catarrhe bronchique.

Posologie. — Peut être prescrit depuis l'âge de deux mois : X à XXX gouttes en 3 fois par 24 heures.

Enfants de 1 an : 2 cuillerées à café par jour.

Enfants de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Prix du flacon : 18 francs.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments, n° 1463-1.

Laboratoires de la Bexinine — L. COLIN

19, rue Saint-Jean — CAEN (Calvados).

BI-AS AGUETTANT

Cacodylate de **Bismuth** injectable.

Solution aqueuse stable.

Injectons intramusculaires indolores.

Indications. — Traitement de la Syphilis à ses différentes périodes.

Grâce à son absorption rapide, le *Bi-As* permet de blanchir rapidement les malades porteurs d'accidents apparents.

Posologie. — 1 ampoule tous les deux ou trois jours, par voie intramusculaire.

Les injections sont faciles, indolores et ne laissent aucun tatouage.

La solution est stable, limpide et incolore.

Prix ; La boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 26 francs.

Le *Bi-As* paru en 1939 apporte un nouvel élément utile à la thérapeutique bismuthique ; notre documentation est à la disposition des médecins.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 130-13.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

BIAZAN

Solution huileuse parfaitement limpide et incolore permettant de faire proprement une injection intramusculaire non douloureuse d'une quantité de bismuth bien déterminée.

Présentation. — Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. rigoureusement titrées à 0 gr. 035 de bismuth métal par cent. cube.

Propriétés thérapeutiques. — Le Biazan a été étudié et mis au point dans le service de M. le Dr L. Fournier à l'hôpital Cochin. Réunissant les effets rapides des composés hydrosolubles à l'action profonde et prolongée des bismuths insolubles, le Biazan est actuellement la meilleure préparation pour le traitement de la syphilis à toutes ses périodes.

Posologie. — Faire deux fois par semaine une injection intramusculaire de 2 cc. de Biazan. Continuer la série par 12 injections. Les 4 à 6 dernières piqûres pourront être faites à 5 et 6 jours d'intervalle. Les doses et le rythme des injections, donnés à titre d'indications générales, sont susceptibles d'être modifiés par le médecin traitant, en particulier chez les vieillards, les débilités et les sujets dont l'état général est mauvais.

Prix : 33 fr. 25.

Laboratoire des ANTIGÉNINES

1, Place Lucien-Herr — PARIS (V°).

(anciennement 43, rue Tournefort). (Gobelins 26-21.)

BI-CI-PA

Sirop eupeptique de l'enfance à la papaïne.
Régulateur et stimulant des fonctions digestives.

Bicarbonate de soude	1 gr.
Citrate de soude	1 —
Papaïne liquide à 50 p. 100....	2 —
Teinture de Belladone	III gouttes
Sirop simple..... Q. S. pour	120 cc.

Indications. — Troubles digestifs au cours de l'allaitement artificiel, Inappétence, Vomissements, Constipation. Etats spasmodiques de l'estomac. Agitation nocturne. Troubles cutanés. Acétonurie.

Posologie :

Nourrissons : une cuillerée à café avant chaque tétée ou mélangée au biberon.

Jeunes enfants : une cuillerée à dessert avant chaque repas.

Prix imposé : 18 fr. 50.

Laboratoires TRICA

A. WEBER, Pharmacien,

21, rue de la République — SAINT-MANDÉ (Seine).

Dépôt et vente en gros :

7, rue Chaptal — PARIS (1X^e).

(Tél. : Trinité 80-42.)

BI-CITROL MARINIER

L'Agent rationnel de la Médication citratée.

Citrates monosodique et trisodique en granulé soluble de goût agréable.

Eupeptique, Cholagogue, Antivisqueux, Décongestif.

Dyspepsies, Gastrites, Vomissements :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau chaude, au cours du repas ou au moment des malaises.

Insuffisance hépatique, Arthritisme :

Deux cuillerées à café le matin à jeun dans un verre d'eau tiède ; ou bien une cuillerée à café avant chaque repas.

Hyperviscosité sanguine :

(Pléthore, Hypertension, États congestifs, Stases veineuses) :

Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau trois fois par jour avant les repas.

Pneumonie :

Une cuillerée à café toutes les deux ou trois heures.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Prix du flacon : 18 fr. 65

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 48-1.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,

PARIS

BIÈRE DES NURSES

En DOSES-REPAS ou en LITRES.

La Bière du Corps Médical (40^e année).
En usage dans les Etablissements médicaux.

Non Alcoolisée quoique très riche en malt sans colorant, de conservation garantie car très pure, de saveur identique aux bières supérieures du Commerce, cette Véritable Bière de Santé, très appréciée des amateurs de bière fine, est la boisson parfaite des Alcooliques, Amaigris, Convalescents, Enfants, Nerveux, Nourrices, Vieillards, etc.

CORPS MÉDICAL : En remplacement des échantillons médicaux trop onéreux pour un produit non pharmaceutique :

1^o **Tarif spécial publicitaire ;**

2^o **A titre gracieux,** tiers de la 1^{re} livraison ou expédition.

La Bière des Nurses

à BOURG-LA-REINE (Seine).

BIFIDIGÈNE

Bouillon de culture antiputride du D^r Henry Tissier.
(ex-interne des hôpitaux de Paris)

Composition. — Symbiose de *Bacillus Bifidus* et de *Bacillus Acidiparalactici*.

Présentation. — Ampoules buvables de 5 cc.

Flacons de 1 litre, 1/2 litre,

Mode d'action. — Rétablit la flore intestinale physiologique. Le *Bacillus Bifidus* s'acclimate et pullule très rapidement dans le tube digestif.

Indications. — *Per os* : Putréfactions intestinales : Entérites, Diarrhées de l'adulte et du nourrisson, Auto-intoxication digestive, Appendicite chronique, Syndrome entéro-rénal, Etats typhiques et paratyphiques, Colibacilloses.

En pansements : Gynécologiques et chirurgicaux dans les plaies infectées.
Aucune contre-indication.

Posologie. — Une ampoule au milieu des deux principaux repas.

Un verre à madère au milieu des deux principaux repas.

Le régime du D^r Henry Tissier renforce et active les effets thérapeutiques de *Bifidigène*.

Dans les entérites graves du nourrisson, on peut sans inconvénient alimenter l'enfant uniquement au *Bifidigène*.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire du BIFIDIGÈNE

A. BOUDET, Pharmacien,

22, rue Pigalle — PARIS. Tél. Trinité 96-76.

BILAXYL

Le laxatif des Hépatiques.

Composition :

Bile poudre	0 gr. 05
Agar-Agar	0 gr. 03
Evonymine verte	0 gr. 02
Podophyllin	0 gr. 02
Diacétyl-dioxyphénylisatine .	0 gr. 005
Extrait de Belladone.....	0 gr. 005 cinq milligr.
Extrait de Jusquiame	0 gr. 005 — —

Pour 1 comprimé dragéifié.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés. — Laxatif cholagogue, rééducateur intestinal.

Doses. — 1 à 2 comprimés au début du repas du soir.

Prix au public : 13 francs les 40 comprimés.

Laboratoires LEOONTE

12, rue des Petits-Carreux — PARIS (II^e).

BILEYL

Sels biliaires dépigmentés et décholestérinés.

Forme. — Globules kératinisés, étui de 60 globules, 17 francs (chaque globule contient 0 gr. 20 d'extraits biliaires). 4 à 8 globules par jour après les repas.

Indications. — Les Stases biliaires, Ictères, Constipation, Insuffisance biliaire, Cholémie familiale.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45) (5 lignes groupées).

BILIASÉ RABY

Globules d'extrait de fiel de bœuf renfermant tous les principes actifs de la bile.

Mode d'action. — Cholagogue énergique. Le plus constant de tous les agents opothérapiques biliaires.

Indications. — Coliques hépatiques. Ictère. Lithiasé biliaire. Entérocolite et constipation par **insuffisance biliaire**.

Doses. — 4 à 12 globules par jour (aux repas).

Prix : 17 fr. l'étui de 80 globules.

R. RABY, pharmacien

ASNIÈRES (Seine).

(Échantillons sur demande.)

(Tél. : Grésillons 03-15.)

BILIBOLDO

Forme. — Pilules glutinisées.

Composition. — Ext. de bile dépigmentée, ext. total de feuilles de Boldo, podophyllin, ext. de belladone.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire, Lithiasé biliaire, Ictères, Constipation.

Doses. — 4 à 6 pilules par jour pour les hépatiques ; 1 à 2 pilules pour les constipés.

Prix : 14 francs les 60 pilules.

(30 jours de traitement).

Laboratoires BARTHÉLEMY

1, place Forbin — AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 1-70.)

BILICRINOL

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue et anti-anaphylactique.

Indications. — Insuffisance hépatique, Congestion du foie, Lithiase biliaire, Ictère, Cholécystite, Troubles anaphylactiques, Migraines, Dermatoses, Urticaire, Constipation par insuffisance hépatique, Troubles digestifs d'ordre hépatique, Anorexie, Vertiges, Nausées, etc...

Composition. — Peptones, bile dépigmentée et décholestérinée, sulfate de magnésie desséché.

Forme. — Granulé.

Posologie. — Le matin à jeun ou demi-heure avant les repas dans un quart ou un demi-verre d'eau.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café.

Enfants : 3 ans, 1/2 cuillerée à café.

8 ans, 1 cuillerée à café.

Prix : 18 fr. 55.

Laboratoires DEMASLES

VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

BILIDRAININE

Forme. — Granulé soluble, aromatisé à la menthe anglaise, n'écœurant pas.

Composition. — Peptone de fibrine, de viande, de poissons et d'œufs. (Peptones d'une pureté absolue) + Sulfate de magnésie desséché + Hypo-sulfite de soude + Extrait d'Artichaut + Extrait de vrai Boldo du Chili.

Propriétés thérapeutiques. — Excite la sécrétion et l'excrétion biliaires. Tous les troubles d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun dans un 1/2 verre d'eau chaude.

N. B. — Commencer par de petites doses et augmenter suivant la tolérance du malade.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL, pharmacien de 1^{re} classe,
8, rue Fleury, -LYON-OULLINS.

BILIFLUINE

du D^r L. BIGNON, de Vichy.
Traitement de la Lithiase Biliaire
et des Ictères.

Composition. — A base d'oléate de soude et de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications. — Lithiase biliaire. Ictère catarrhal. Ictère par rétention. Constipation. Colite muco-membraneuse. Congestion du foie et cirrhoses sous toutes leurs formes.

Posologie. — 4 pilules ou dragées par jour, au moment des repas : le matin, à midi, à 4 heures, et au souper ; ou encore en deux fois à midi et le soir (pilules et sirop).

Produits « STÉNÉ »

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

BILIFLUOL

Peptones magnésiées,
Phythothérapie hépatobiliaire.

Composition :

Sulfate de Magnésie desséché	15
Peptone de viande purifiée	5
Extrait de boldo	0,80
Extrait d'artichaut	0,20
Citrate de soude	4
Hyposulfite de Magnésie	15
Saccharose aromatisé..... Q. S. pour	100

Indications. — Insuffisance hépatique et ses conséquences. Antiarthritique.

Présentation. — Granulé. Boîte métallique de 120 gr. environ. Durée moyenne : 15 jours. Prix : 18 fr. 75.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau tiède.

(Se coucher 10 minutes sur le côté droit).

Laboratoires du BILIFLUOL

L. PROTS, pharmacien.

20, rue de Rivoli — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 03-07.)

BILIOGASTRINE

Médication anaphylactique.

Forme. — Granulé légèrement effervescent.

Composition. — *Citrus Vulgaris*, *Kinkelibah Raimbautii*, *Orthosiphon Staminus*, Sulfate, Phosphate, Citrate, Bicarbonate de Soude, Pipérazine, Helmitol.

Indications. — Troubles et Dermatoses d'origine gastro-intestinale de l'*Adulte* et de l'*Enfant*, Urticaire, Intolérance gastrique du jeune âge.

Posologie. — Autant que possible, prescrire la Biliogastrine le matin à jeun et le soir vingt minutes avant le repas.

Enfants : 1 à 6 ans, 1/2 cuillerée à café par jour en 2 fois.
6 à 10 ans, une 1/2 cuillerée à café matin et soir.
10 à 15 ans, 2/3 de cuillerée à café matin et soir.

Adultes : 2 à 4 par jour.

Prix : 18 fr. 50 (8 jours).

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise). (Tél. : 22.)

BILIVACCIN

1° Antityphique.

2° Antidysentérique. — 3° Anticholérique.

Vaccination préventive, par VOIE BUCCALE, contre la Typhoïde, les Para A et B, la Dysenterie bacillaire, le Choléra.

Aucune réaction. — Pas de contre-indication. Aucune limite d'âge.

A prendre à jeun trois matins de suite une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, un comprimé de vaccin.

Vaccination annuelle et revaccination en cas d'épidémie.

Prix : Dose pour adultes : 10 fr. 60.

Dose pour enfants (moins de 7 ans) : 8 fr. 45.

H. VILLETTE et Cie, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV°).

Tél. : Vaugirard 11-23.

BILIVACCIN ANTICOLIBACILLAIRE

Vaccination par voie buccale contre toutes affections colibacillaires du tractus intestinal, constipation, colites, appendicites et annexes. Cholécystites, voies urinaires.

N° 1 Bilivaccin coli pur.

N° 2 — coli-entérocoque.

N° 3 — polyvalent (coli-entérocoque-perfringens-proteus).

A prendre le matin à jeun, pendant 18 jours consécutifs, une pilule de bile et, 1/4 d'heure après, 2 comprimés de vaccin. Renouveler après repos de 6 jours.

Prix : 21 fr. 20 la dose.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Produits de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

BINIDIA

Suspension de **Bismutho-8-Oxyquinoléine** à 10 p. 100, rendue pénétrante par l'addition de 1 p. 1.000 d'isopropylnaphtalène-sulfonate de soude.

Propriétés. — Antiseptique génito-urinaire local, non toxique, non caustique, très bien toléré, pénétrant et adhérent.

Indications. — Métrites, endocervicites, vulvites, vaginites d'origine bactérienne, en particulier gonococcique. *Vulvo-vaginites des petites filles.*

Mode d'emploi. — Le BINIDIA s'emploie pur en tamponnements, mèches et instillations.

Présentation. — Flacon à large col de 120 cc. environ, permettant le prélèvement direct au moyen de la seringue de Bonneau.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des É^{ts} KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin - PARIS (XVI^e).

Service commercial :

15, rue de La Baume — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Elys. 99-51.)

BINOXOL

Bismutho-8-oxyquinoléine.

Propriétés. — Produit synthétique, défini et pur. Antiseptique gastro-intestinal dépourvu de toute toxicité et dont l'oxyquinoléine s'élimine par les voies urinaires. Inaltérable.

Indications. — Affections intestinales microbiennes, diarrhées saisonnières, entérites et colites spasmodiques bactériennes, entérites chroniques et rebelles. Particulièrement efficace dans le traitement des diarrhées des tuberculeux. Antisepsie urinaire. Traitement de l'Oxyurose.

Mode d'emploi. — *Adultes*: 2 à 4 cachets à 0 gr. 50 par jour avant les repas. Exceptionnellement jusqu'à 8 par jour.

Enfants: 6 mois-1 an: 1 paquet à 0 gr. 25 par jour en 2 fois;

1 an-2 ans: 2 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Au-dessus de 2 ans: 3 paquets à 0 gr. 25 par jour.

Présentation :

Adultes : { Tube de 12 cachets ou 15 comprimés à 0 gr. 50.
 { Boîte de 100 cachets à 0 gr. 50.....

Enfants et { Boîte de 12 paq. ou tube de 15 compr. à 0 gr. 25.
Nourrissons : { Boîte de 100 paquets à 0 gr. 25.....

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des E^{ts} KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin — PARIS (XVI^e)

Service commercial : 15, rue de La Baume — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Elysées 99-51.)

BIOCALCION

Spécifique des voies respiratoires.

Rhumes. — Bronchites. — Poumons.

Composition :

Sulfate de manganèse.....	0,060
— cuivre.....	0,213
— calcium.....	0,104
— magnésium.....	0,091
pour 1 cc. quantité en milligramme.	

Association de métaux catalyseurs ionisés sous forme d'oléate métallique parfaitement osmosable. Innocuité complète.

Formes : voie buccale : Capsules (étui de 20) et Elixir.

voie intramusculaire : ampoules de 2 et de 5 cc., boîtes de 6 et 12.

voie intrarectale : huile; lavements de 10 cc. à conserver 5 à 6 heures.

Instillations d'huile dans les plaies fistuleuses.

Indications : Maladies des voies respiratoires, tuberculose osseuse, pulmonaire, ganglionnaire, synoviale. **Bronchites.**

Posologie : Une Capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir au début des deux principaux repas pendant 10 jours — arrêt de 5 jours.

Tous les 3 jours, une injection intrarectale de 10 cc. ou une piqûre intramusculaire de 2 cc. ou de 5 cc. suivant la gravité du cas — piqûre faite *très lentement* avec aiguille de 9/10^e. Piqûres intramusculaires et injections intrarectales *alternées* pour traitement intensif.

Il est conseillé d'alterner à la fin des 3 dizaines **BIOCALCION** avec 1 dizaine de **Rénovitase**.

Inscrit au L. N. C. M. sous le N° 1024-3.

Laboratoires des HORMOMÉTALIONS

50, avenue Jacqueminot. — MEUDON (Seine-et-Oise). (Tél. : Obs. 13-33).

BIOCALCIUM

Composition :

Biocalcium arsénié : Gluconate de chaux, chl. de choline caco-ylate de soude.

Biocalcium non arsénié : Gluconate de chaux, chl. de choline.

Indications :

Chaque fois qu'il est nécessaire de :

- 1° Obtenir un relèvement rapide de l'état général ;
- 2° Stimuler les réactions de défense et les centres de production globulaire ;
- 3° Augmenter le taux du calcium sanguin et rétablir l'équilibre glycémie-cholestérolémie.

Notamment dans les états tuberculeux et prétuberculeux (parfaitement toléré même dans les tuberculoses évolutives), anémies, paludisme, les chocs traumatiques (fractures), interventions opératoires, hémorragies. Traitement préparatoire avant les opérations. Tétanie, spasmophilie déséquilibre du système neuro-végétatif.

Posologie :

Adultes : une ampoule de 5 cc. en injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 ampoule.

L'injection est indolore. Si besoin, faire tiédir l'ampoule.

Prix : Boîte 6 ampoules 21 fr. 35 : Boîte 10 ampoules 31 fr. 95

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

BIOCÉANE OLIVIÉRO

Eau de mer intégrale 100 p. 100 ionisée, stabilisée.

Véritable Lymphe marine. Sérum marin. Ampoules buvables et injectables de 10 cc.

Par boîte de 16 ampoules.

Action thérapeutique. — *Athrepsies, Diarrhées et vomissements* des nourrissons, Colibacillurie.

Toutes Phosphaturies, le pH urinaire est abaissé à 6-5 1/2.

Toutes déchéances, Fatigues, Surmenages, Précancer.

Doses. — *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour.

Adultes : 2 à 4 ampoules par jour.

Prix : 22 francs.

Laboratoire OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE. (Tél. : Molitor 27-06.)

BIOCHOLINE

Composition. — Chlorhydrate de Choline R et C chimiquement pur
Seule préparation contrôlée aux points de vue physiologique et clinique par les auteurs.

Propriétés. — Amélioration du terrain par l'augmentation régulière et durable du taux de cholestérol sanguin. Régularisation de la glycémie. Action génératrice sur les globules sanguins et la moelle osseuse. Excitation des fonctions d'élimination et du péristaltisme intestinal.

Avantages. — Innocuité complète ; Tolérance parfaite, aucune contre-indication.

Indications. — Tuberculoses externes ou viscérales, même évolutives, à tous degrés et tous âges. Anémies et conséquences. Insuffisances pancréatiques.

Forme. — Ampoule 1 cc. = 2 cgr. Boîte de 10 ampoules (type normal). Boîtes de 25 et 50 ampoules (cures prolongées). *Suppositoires*, boîte de 10 : *adultes* (1 suppositoire = 2 cgr.) ; *enfants* (1 suppositoire = 1 cgr.).

Posologie. — Ampoules : 1 injection sous-cutanée tous les 2 jours d'une façon continue et sans interruption.

Suppositoires : 1 suppositoire tous les 2 jours par séries de 20 jours.

Prix : 10 ampoules : 32 fr. 65 ; 25 ampoules : 52 francs ; 50 ampoules : 99 fr. 95 ; 10 *Suppositoires* : 37 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 507-19,55.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE,

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

BIOCRINA

Ampoules buvables (tubes scellés) de 5 cc.
(Méthode de Whipple).

Association d'Extrait de foie de cheval, de Plasma sanguin défibriné de cheval et de Nucléinate de fer soluble. (Procédé Alf. Daniel-Brunet et Oliviéro.)

Indications. — Anémies, Hypoglobulie, Hypohémoglobulinémie, Consommation, Atonicité, Convalescences.

Dose et mode d'emploi. — Une ampoule dans un peu d'eau : eau sucrée, — eau gazeuse, — infusion froide, — à prendre 1/4 d'heure environ avant les deux principaux repas.

Enfants : à partir de 5 ans : 1 ampoule par jour avant l'un des repas.

Adultes : 2 ampoules par jour.

Prix. La boîte de 12 ampoules : 30 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE

Tél. : Auteuil 11-86.

BIODARCINE

Elixir.

Puissant tonique, régénérateur, accélérateur de la nutrition et stimulant des fonctions vitales.

Composition :

Teinture de fénugrec désodorisé	6,25
— de cacao	5
— de coca	34
— de gentiane	5
Acide phosphorique	4
Glycéro-phosphate de soude liquide 40 p. 100	2,90
Phosphate de soude	3,70
Teinture de noix vomique	15

Excipient liquide aromatisé et Malaga : Q.S. pour 1 000 cc.

Indications. — Convalescence, surmenage, états anémiques, neurasthénie, dépressions nerveuses, suites opératoires, pré tuberculose, tuberculose, ichtiase, faiblesse etc...

Ne contient pas d'arsenic. — donc pas de risque d'hémoptysie chez les bacillaires.

Présentation. — Flacon.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à café. — *Adolescents* : 1 cuil. à soupe.

— *Adultes* : 1 verre à liqueur avant les principaux repas.

Prix au public 20 fr 20

Enregistré au laboratoire de contrôle des Médicaments sous le n° 598-19.

Laboratoire M. Dr RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

BIODYNAMINE

Indications générales. — Débilité, Neurasthénie, Phosphaturie, Convalescence, Surmenage intellectuel et tous états asthéniques et atoniques.

1° Ampoules :

pour 1 cc. :

Sulfate de strychnine	1 milligr.
Cacodylate de soude	5 cgr.
Glycérophosphate de soude	0 gr. 04
Sérum isotonique camphré	1 cc.
par ampoule de 1 cc. $\frac{1}{3}$.	

(1 ou 2 ampoules par 24 heures.)

2° Gouttes concentrées (facilitant l'administration progressive) : de X à XL gouttes, bien diluées, avant chaque repas, suivant le cas et d'après le tableau :

	20 Gouttes cont.	40 Gouttes cont.	60 Gouttes cont.	80 Gouttes cont.	100 Gouttes cont.
Sulfate de Strychnine . .	1 mill.	2 mill.	3 mill.	4 mill.	5 mill.
Méthylarsinate de soude.	0,03	0,06	0,09	0,12	0,15
Acide phosphorique....	0,15	0,30	0,45	0,60	0,75

3° Elixir : Préparation d'un goût très agréable et contenant par cuillerée à soupe de 15 grammes :

Phosphate de soude.....	0 gr. 060
Acide phosphorique officinal	0 gr. 053
Méthylarsinate disodique	0 gr. 012
Sulfate de strychnine	0 gr. 0006

2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

BIODYNOL

Tonique général.

Formes. — Vin. Granulés. Concentré.

Composition. — Phosphore, Manganèse, Noix vomique, Quina, Kola.

Posologie :

Vin : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Granulés : 2 à 3 cuillerées à café avant les deux repas.

Concentré : 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau sucrée.

**Laboratoire de Thérapeutique générale
du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER**

BIOÉLIXIR

Reconstituant complet.

Composition. — Formule complète réalisant sous une forme euphorique (excipient = vins liquoreux de muscat) :

1° Une médication substitutive, Iode (iodure de fer), Phosphore (acides phosphorique et nucléinique), Arsenic (Méthylarsinate de soude), Calcium (chlorure de calcium) ;

2° Une médication énergétique, comprenant :

- a. Un amer héroïque (noix vomique).
- b. Des amers exotiques (simarouba, coca, feuilles Yerba Santa).
- c. Un stimulant nervin aromatique (écorce de Winter).
- d. Un amer stomachique (condurango).

Indications. — Les convalescences médicales et chirurgicales, les anémies, l'asthénie, l'amaigrissement, les déchéances organiques.

Formes :

P. M. (450 cc. environ) : 18 fr. 80.

G. M. (900 cc. environ) : 33 fr. 50.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuillerée à bouche avant les deux repas.

Laboratoires REYGAGNE
160, avenue d'Italie — PARIS.
(Tél. : Gobelins 90-00.)

BIOENTÉRASE

Admis à l'achat par le Ministère des Colonies.

Ampoules buvables.

Non toxique. Sans contre-indication.

Extrait de *Phyllanthus Casticum*, *Scutia Commersoni*, *Psidium Pomi-ferum*, *Garcinia Mangoustana*, *Fraxinus Ornus* en solution stabilisée.

Indications. — Diarrhée verte, Gastro-entérite des nourrissons, Choléra infantile, Entérites aiguës, Entérocologie dysentérique, colibacillose, eczéma, dermo-épidermite, *Athrepsie*.

Propriétés. — Antidiarrhéique et antihémorragique énergique sans action constipante. Cholagogue. Antiparasitaire et bactéricide puissant. Calmant des douleurs abdominales et du ténésme, sans opiacés. Préviendrait ou fait disparaître l'*athrepsie*.

Doses. — Faire prendre le médicament dans de l'eau fortement sucrée ou en lavement dans 50 cc. d'eau bouillie.

La BIOENTÉRASE s'emploie de la naissance à deux ans à la dose quotidienne de 1 à 2 ampoules par année d'âge, suivant l'intensité des symptômes et jusqu'à leur sédation. Une ampoule tous les 2 jours évite l'*athrepsie*.

Remplacer le lait par de l'eau bouillie ou de l'eau de riz sucrée.

Prix de la boîte de 6 ampoules buvables 19 fr. 50.

— — — 3 — — — 10 fr. 60.

(Taxe d'armement comprise.)

Littérature et Échantillons :

69, rue de Wattignies — PARIS.

BIOGÉNOL

Composition. — Association Glycéro-arséniate de soude, Kola, Coca, Quinquina.

Indications. — Reconstituant général, accélérateur de la nutrition, tonique de la cellule nerveuse, stimulant de l'appétit. Anémies, Convalescences, toutes déficiences de l'organisme, Surmenage physique et intellectuel, Anorexie, Asthénie.

Formes. — Liquide, Granulé, Gouttes, Ampoules.

Posologie. — Liquide : un verre à liqueur avant les deux principaux repas.

Granulé : une cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas.

Ampoules : injection sous-cutanée, une ou deux par jour.

Prix : liquide et granulé : 17 fr. 45 ; Gouttes : 15 fr. 25 ; Ampoules : 13 fr. 05 (15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

BIOLACTYL

Ferments lactiques sélectionnés.

Formes :

Boîte de 10 flacons	27 fr. 60
— 6 flacons	20 fr. 15
— 2 flacons	9 fr. 55
Étui de 60 comprimés	17 fr. »
Boîte de 6 tubes (caillage du lait)	8 fr. 45

Indications :

Usage médical : Infections et auto-intoxications gastro-intestinales, Entérites, Diarrhées, etc. :

Posologie :

Comprimés : 2 à 4 comprimés avant les repas.

Culture liquide : 1 flacon par jour en 2 fois avant les repas (dans de l'eau sucrée).

Usage chirurgical : Pansements gynécologiques, Bouillie lactique (par mélange de poudre de lactose et biolactyl) pour pansements des périnées, Plaies infectées, Affections nasales et laryngées.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

BIOLIPASE « ROCHE »

Composition. — Extrait fermentaire lipolytique de foie.

Indications thérapeutiques. — Cirrhoses avec ascite et œdèmes, ictères aigus ou prolongés par hépatite, états post-opératoires chez les sujets atteints d'insuffisance hépatique.

Contre-indications. — Cirrhoses avec ictère grave, ictères rétentionnels néoplasiques ou calculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule de 5 cm³ par jour (10 Unités Butyrase par cm³.) par voie sous-cutanée ou intramusculaire pendant 6 jours. Deux jours de repos. Nouvelle série de 6 ampoules.

Selon gravité des cas : 3 à 6 séries.

Les injections de Biolipase « Roche » n'ont aucune action nocive sur les principaux appareils et sont toujours très bien supportées par les malades.

Recommandations très importantes. — Pendant la cure, faire observer au malade un repos absolu au lit, le soumettre à une alimentation lacto-végétarienne peu salée et n'appliquer aucun autre traitement. Ne pas faire d'injections de Biolipase « Roche » dans les 15 jours qui suivent une injection diurétique à base d'un dérivé mercuriel.

Ampoules de 5 cm³. : boîte de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-76 .

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

BIOMUCINE

Composition. — Mucine pure, neutre et stérile, obtenue à partir des muqueuses d'estomac et adaptée à la thérapeutique des affections gastriques.

Propriétés. — Protecteur naturel de la muqueuse stomacale contre les irritations des particules alimentaires et contre toute attaque chlorhydropeptique ; Anti-acide idéal assurant l'intégrité et le bon fonctionnement de l'estomac.

Avantages. — La BIOMUCINE est supérieure : *a.* aux alcalins qui saturent toute l'acidité ; la mucine ne fixe que les acides en excès ; *b.* aux poudres absorbantes : la mucine se laisse pénétrer par la pepsine, elle ne constipe pas ; *c.* aux mucilages ; la mucine est indigestible.

Indications. — Hyperacidité et toutes affections douloureuses qui en découlent. Ulcères gastriques et duodénaux. Ulcères peptiques post-opératoires.

Posologie. — 1° Hyperacidité : 2 cachets avant les 2 principaux repas ; 2° Ulcères : 2 cachets, 10 minutes avant toute prise de nourriture, la poudre délayée dans un 1/2 verre d'eau froide.

Prix : 33 fr. 65 la boîte de 36 cachets ; 78 fr. 55 la boîte de 100 cachets.

Enregistré au L. N. C. n° 507-41.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars, — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

BIO-ORGANIC

Granulés.

Reconstituant-type des enfants et des adultes délicats. A la fois reconstituant général par une médication phospho-calcique énergique et protection pulmonaire par le tétragaïacolate de calcium.

Formule :

Tétragaïacolate de calcium.....	0 gr. 10
Inosito-héxaphosphate de calcium et de magnésium	1 gr.
Gluconate de calcium	4 gr.

Pour 100 gr.

Indications. — Troubles de la croissance, Déminéralisation, Faiblesse de constitution, Affections broncho-pulmonaires, Adénopathie, Lymphatisme, Convalescences.

Mode d'emploi :

Nourrissons et jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant les 2 repas.

Adolescents ou adultes délicats : 1 cuillerée à bouche avant les 2 repas.

Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires P. REYGAONE

160, avenue d'Italie — PARIS. — (Tél. : Gobel'ns 90-00.)

BIOPHÈNE

Composition. — Chlorophylle, Carotène, Extrait de foie concentré et stabilisé, Extrait de rate concentré et stabilisé, Rumex crispus, Prêle, Carragaheen, Gluconates chaux, Ammonium, Magnésie, Manganèse, Plasma marin synthétique.

Indications. — Décalcification en général, tuberculose sous toutes ses formes, déséquilibre du système nerveux végétatif, Anaphylaxie, Hyperacidité gastrique, tous les états anémiques, Chlorose, surmenage, Insomnie.

Mode d'emploi. — Un cachet au milieu des 3 repas.

La boîte : 16 fr. 65.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

BIOPHÉNYL ROSSO

Simple et iodé

Antiphlogistique — Analgésique — Sédatif

Chimiothérapie antirhumatismale et cholagogue par injections intramusculaires et intraveineuses.

Pour le traitement de toutes les affections rhumatismales et douloureuses et toutes manifestations uricémiques.

Le *Biophényl* entièrement nouveau, par ses composants, créés pour répondre aux plus strictes exigences de la thérapeutique Antirhumatismale, possède l'activité de l'acide phényl-cinchoninique du phényl-éthyl-barbiturique et celle du Magnésium.

Il se produit entre ces combinés, du fait de leur association, une synergie qui accentue notablement les effets thérapeutiques.

Ces propriétés font du *Biophényl* le médicament spécifique de la goutte sous toutes ses formes, provoquant l'élimination de l'acide urique, cause initiale de la maladie ; il diminue la fluxion articulaire, apaise la douleur et combat la fièvre.

Le *Biophényl* par voie intraveineuse est indiqué dans tous les cas où l'on veut obtenir la sédation immédiate et durable. Son effet se manifeste plus spécialement dans le rhumatisme infectieux, primitif et secondaire, le rhumatisme dyscrasique par floculation, dans le lumbago et le syndrome du nerf sciatique et de ses branches.

Dans les algies rhumatismales : cervico-brachiales, thoraciques, rhumatisme de l'épaule et dans les divers types d'arthrites (post-traumatiques, du genou, de la hanche, sacro-iliaque).

Dans les cures prolongées de l'arthritisme ou polyarthrite essentiellement chronique, le praticien pourra utiliser avec succès le *Biophényl Rosso iodé*.

Il est indiqué également dans toutes les affections biliaires et hépatiques (ictère catarrhal, angiocholites et dans la lithiase biliaire).

Posologie :

Traitement d'attaque : A doses massives - 1 à 2 ampoules par jour.

Traitement d'entretien : 1 ampoule tous les jours. Intraveineuse ou intramusculaire.

Le *Biophényl* est préparé en ampoules de 10 cc. pour l'injection exclusivement intraveineuse. Et de 20 cc. pour injection parentérale.

L'injection de 20 cc. peut être pratiquée au siège même de la douleur, en plein muscle, au contact du plan osseux sous-jacent ou des lames vertébrales.

L'injection peut être périnerveuse, paravertébrale et épidurale.

Présentation : *Biophényl Rosso simple et iodé.*

Boîte de 5 ampoules de 20 cc. pour injections parentérales.

Boîte de 5 ampoules de 10 cc. pour injections exclusivement intraveineuses.

Prix de la boîte : 31 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits BIOCHIMIQUES ROSSO
Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

(Tél. Dor. 56-38.)

BIOPHORINE GIRARD

Granulé.

Extrait total de kola contenant la caféine, la théobromine et les principes actifs de la noix fraîche ; Glycérophosphate de chaux assimilable, Extrait de quinquina.

Propriétés thérapeutiques :

Régulateur cardiaque, reminéralisant, apéritif, tonique, nerveux et musculaire.

Indications :

Asthénies, Adynamie cardiaque, Anémie cérébrale, Dépression nerveuse, Grippe, Toutes convalescences, Surmenage physique et intellectuel.

Dose et mode d'emploi :

3 à 4 cuillerées à café par jour, aux repas, pur ou dans un liquide quelconque. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 14 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire national n° 405-1.

BIOPHYTOL

Elixir :

Composition :

Extrait hématique total.....	10 cc.
Méthylarsinate de sodium.....	0 gr. 03
Nucléinate de manganèse.....	0 gr. 05
Glycérophosphate de soude cristal.....	0 gr. 25
Extrait de cola.....	0 gr. 75
Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères.....	Q. S. P. 15 cc.

Indications. — Anémie, Asthénie, Surmenage, Convalescences, Ralentissements de la nutrition, Amaigrissement, Tuberculose, Troubles de la Croissance, Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Paludisme, Diabète.

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe au début des deux principaux repas. — *Enfants* : de 4 à 12 ans : 1 ou 2 cuillerées à café, au début des deux principaux repas.

Laboratoires R. BOUYSSOU

à CHAMBOIS (Orne).

BIOPLASTINE

Inscrite aux pharmacopées officielles de plusieurs pays.

Composition. — Association lécithine-éthers du cholestérol et vitamines extraits de jaunes d'œufs frais.

Propriétés. — Régularise le métabolisme cellulaire et le renouvellement azoté. Augmente le phosphate des tissus et provoque une augmentation de poids.

La BIOPLASTINE est entièrement assimilable.

Indications. — Tuberculose. Toutes les formes d'épuisement : croissance, rachitisme, lymphatisme, anémies, chlorose, Neurasthénie. Sénilité. Diabète. Autres maladies graves.

Posologie. — 1 injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours. Il existe également un type spécialement préparé pour injection intraveineuse. 25 injections suffisent pour un traitement. Ces injections sont indolores.

Présentation. — *Type intramusculaire* : en boîtes de 6 ampoules de 5 cc. ; en boîtes de 10 ampoules de 1 cc. 5.

Type intraveineux : en boîtes de 4 ampoules de 10 cc. ; en boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Enregistré au L. N. C. n° 161-4.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e). (Tél. : Dor. 56-71 et 72.)

Fournisseur des Hôpitaux et des Grands Réseaux de Chemins de fer.

BIORADYL

Complexe séro-vitastériné A et D, radioactif pour le traitement spécial des dermatoses inesthétiques.

Composition et mode d'action. — *Bioradyl*, à base de sérum normal d'équidés et d'huile d'halibut riche en vitamines A et D, est potentialisé par des traces de radium et se présente en pâte semi-forme.

Le traitement par *Bioradyl* assure une revigoration des tissus et supprime les anomalies pigmentaires, qu'il s'agisse d'hyperchromie (éphélides, lentilles, etc.) ou d'hypochromie (vitiligo, etc.) ; il fait disparaître les épidermisations provoquées par les brûlures solaires, le vieillissement des tissus et supprime la couperose et toutes les manifestations disgracieuses dues à l'acné ou à la séborrhée.

Son action cicatrisante est particulièrement remarquable dans les cas d'engelures, de brûlures ou de plaies atones ou torpides.

Indication et mode d'emploi. — *Bioradyl* s'utilise en applications locales, à l'aide d'une petite spatule qui facilite l'étaloment et la pénétration par massages légers, mais prolongés sur les régions traitées ou en applications simples si le tissu est fragile ou humide.

Forme pharmaceutique. — Le *Bioradyl* se présente en tubes de 20 gr. environ et son prix de vente au public est de 23 fr. 50 le tube.

Laboratoire DES NUTRIMENTS

34, rue Pigalle — PARIS (IX^e). — (Tél. : Trinité 18-18.)

BIOSIEDRA

Ampoules buvables.

Extrait musculaire de bœuf, de foie de veau, de rate de veau, extrait orchitique.

Toutes anémies, convalescence, surmenage, dépression nerveuse, troubles de la puberté et du retour d'âge.

6 ampoules buvables de 10 cc. : 35 fr.

Une ou 2 ampoules par jour.

Enregistré au L. N. C. M. n° 1573.

Laboratoire BIOSIEDRA

E. ESTRADER, Docteur en pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e)

(Tél. : Marcadet 10-23.)

BIOSÉRINE

Composition. — Sérum hémopoïétique de l'Institut Biologique Mérieux.

Présentation. — Boîtes de 6 et de 18 ampoules.

Posologie. — *Anémies, gripes, etc.* : 1 à 3 ampoules par jour en ingestion ou lavement. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Hémorragie : 3 ampoules en ingestion, lavement ou applications locales ; injection dans les cas graves.

Laboratoires
des Produits Biologiques I. M.

S. SAVIGNEUX,
Pharmacien concessionnaire
18, cours Suchet — LYON (II^e).

BIOSÉRONE DE BROWN

Soluté reconstituant injectable.

Présentation. — Par boîtes de 10 ampoules de 5 cc. (25 fr. 50.)

Principes actifs. — Cacodylate de soude, Arrhénal, Glycérophosphate de soude, Nucléinate de soude, Sulfate de strychnine, Soluté physiologique glucosé.

Indications. — Anémies de toutes origines, Anémies de croissance, Anémies graves idiopathiques ou consécutives aux infections, en particulier chez les paludéens, les convalescents de fièvres graves, typhoïdes, typhiques, Méliococcie, les Asthénies de causes diverses, Chlorose, Surmenage.

Mode d'emploi. — Les ampoules de 5 cc. peuvent être employées : *a.* par la bouche ; *b.* en injections sous-cutanées ; *c.* en injections intraveineuses, à la dose de 1 ampoule par jour chez les adultes.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-40.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél.: Turbigo 40-83.)

BIOSODINE

Composition. — Citrates alcalins naissants, phosphate de soude, bicarbonate de soude, sulfate de soude.

Indications. — Affections digestives, arthritisme, céphalées.

Présentation. — Granulé eupeptique, *effervescent*.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun, et avant les deux principaux repas.

Prix : 10 fr. 70 le flacon pour un traitement d'une semaine.

Échantillons :

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

BIOSULFOL DUCATTE

Nouveau laxatif scientifique (à base de soufre).

Une forme : Flacon de 50 dragées de 0 gr. 40.

Indications. — Contre la constipation, les affections du foie et de l'intestin et leurs complications sur la peau.

Le *Biosulfol* a été réalisé par l'union des extraits biliaires et du soufre. C'est un laxatif à la fois doux et antiseptique.

Par ses extraits biliaires, le *Biosulfol* produit au même titre que la bile normale les mouvements péristaltiques de l'intestin. Par le soufre qu'il contient, le *Biosulfol* réalise l'antisepsie intestinale.

Posologie et Mode d'emploi. — 1 à 4 dragées par jour.

Prix : 13 francs.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-14.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré, Paris.
(Tél. : Opéra 68-80.)

BIOSURGON

Forme. — Cachets.

Formule. — Formule classique : Inosito hexaphosphate de chaux et magnésie, Bioxyde de Manganèse purifié, Protoxalate de fer, Arrhénal, Noix vomique, Silicate, Carbonate et Fluorure de calcium.

Indications. — Phosphaturies, Anémies, Asthénies, Amaigrissements, Faiblesse générale, Surmenage, Convalescence, Croissance, Rachitisme, Scoliose, Grossesse, Allaitement, Modification du terrain chez le bronchitique chronique, Pré-tuberculose, etc.

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour. La cure comprend plusieurs boîtes.

Prix : La boîte de 36 cachets : 26 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1177-3.

Laboratoires SAUDEMONT

GRENAY (Pas-de-Calais).

BIOTÉOL

Composition. — Ferments lactiques : 4 milliards pour 100 grammes.

Propriétés. — On fait subir au *Biotéol* un traitement pour l'imprégner d'éléments biologiques tyndallisés qui lui confèrent une action anti-fermentescible remarquable.

Indications. — Soins et hygiène de la peau : enfants et adultes, toilette des nouveau-nés, transpiration, soins des pieds, massage, feu du rasoir.

Présentation. — Poudre.

Mode d'emploi. — Saupoudrer de produit la partie à traiter à l'aide de la boîte poudreuse.

Laboratoire du Dr **BOUCARD**

30, rue Singer — PARIS. (XVI^e.)

BIO-TITANE « PRIMA »

Poudre médicale pour les soins de l'épiderme du bébé et des adultes.

Composition. — Oxyde de Titane, Ferments lactiques, Stéarate de zinc, Acide borique, Silicate de magnésie.

Indications. — Irritations et rougeurs des bébés, Démangeaisons, Varicelle, Impétigo, Urticaires, Erythèmes fessiers, Escarres des vieillards, Eczéma.

Forme. — Boîte saupoudreuse.

Enregistrée au L. N. C. M. n° 1 229-2.

Prix de vente au public : 11 francs.

Dépôt général :

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

BIOTONE

(Ampoules buvables vitaminées)

Composition. — Acide orthophosphorique, inositolphosphate de calcium et de magnésium, phosphate de manganèse, noix de Kola fraîche stabilisée, foie frais adrénaliné, acide ascorbique (Vitamine C), en milieu glycérolé aromatisé.

Mode d'action. — Reconstituant général agréable au goût et extrêmement actif, présenté en coffret de 10 ampoules stériles. — Immédiatement tonique et euphoriant par sa noix de Kola fraîche stabilisée, enrichie en Vitamine C, anti-hémorragique.

Reminéralisant par ses phosphates calciques, magnésiens et manganés, d'assimilation rapide et complète, régénérateur du système nerveux par sa haute teneur en acide orthophosphorique. Stimulant de la cellule hépatique et de la fonction anti-toxique du foie, par l'extrait de foie frais adrénaliné.

Indications thérapeutiques. — Fortifiant des systèmes nerveux, musculaire et osseux :

Surmenage physique et intellectuel.
Anémies et asthénies passagères ou persistantes.
Convalescences, Suites de maladies infectieuses.
Neurasthénie. Inappétence. Amaigrissement.
Grossesse. Allaitement et toutes déminéralisations.

Doses et mode d'emploi : *Adultes et enfants au-dessus de 12 ans :*
Une ampoule dans 1/3 verre d'eau sucrée à la fin de chacun des deux principaux repas.

Enfants de moins de 12 ans : demi-dose.

Cure normale. — Deux coffrets séparés par un repos de quatre jours.

Prix : Le coffret de 10 ampoules de 10 cc. : 31 fr. 20

Enregistré au L. N. U. sous le n° 1337-2.

Laboratoire de Pharmacologie appliquée

Rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-R.) (Tél. 20.)

BIOTRIGON

Composition :

Élixir formule A. — Extrait fluide de fenugrec désodorisé, Arrhénal, Manganèse.

Élixir formule C. — Extrait fluide de fenugrec désodorisé. Chlorure de Calcium.

Dragées. — Extrait sec de fenugrec. Phosphate de chaux. Extraits opothérapiques fixateurs.

Propriétés :

Augmentation du poids, des forces, de l'appétit. Amélioration de l'état général.

INDICATIONS

Élixir formule A. — Insuffisance organique, Asthénie, Prétuberculose, Adénopathie, Débilité.

Élixir formule C. — Mêmes indications et malades présentant des lésions pulmonaires évolutives.

Dragées. — Mêmes indications.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au moment des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café au moment des repas.

BIOTRIGON HÉPATIQUE

(Voir CARBOTRIGON)

Laboratoire Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

BIOXYOL

du D^r P. Bourggraff.

Composition. — Anhydride titanique. — Diatomées stérilisées calibrées. — Peroxyde de zinc (titré 50). — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — La pâte *Bioxyol* a une action très active sur les trois stades de la cicatrisation. Stimule la poussée vasculaire, active la poussée fibreuse, accélère et régularise l'épidermisation. Les cicatrices ainsi obtenues sont souples, non adhérentes aux plans profonds, à peine perceptibles.

Indications. — Plaies de toutes natures, post-opératoires, atones, pertes de substances, ulcères phagédéniques, ulcères variqueux, etc., brûlures, radiodermites, chirurgie esthétique, varicelle.

Mode d'emploi. — S'en référer à l'opuscule édité par le Laboratoire du Praticien qui le tient à la disposition des médecins.

Présentation. — Pâte blanche en pot :

Grand modèle	32 fr. 65
Petit modèle	18 fr. 45

Le *Bioxyol* étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

**Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.)**

BIPHEDRINE

Vaso-Constricteurs + Antiseptiques.

BIPHEDRINE HUILEUSE

<i>Ephédrine naturelle pure</i>	0 gr. 50
<i>Camphre du Japon</i>	0 gr. 35
<i>Eucalyptol</i>	0 gr. 75
<i>Essence de Menthe privée de Menthol</i>	0 gr. 60
<i>Essence de Violette</i>	0 gr. 60
<i>Essence de Citron</i>	0 gr. 75
<i>Essence d'Anis</i>	0 gr. 90

Huile végétale rigoureusement neutre et stérilisée..... 95 gr. 55

Etats subaigus et chroniques. — Rhumes, Coryzas, Rhino-Pharyngites, Injections trachéales, Désinfection post-opératoire.

BIPHEDRINE AQUEUSE

<i>Chlorhydrate d'éphédrine naturelle pure</i>	1 gr.
<i>Solution au millième d'adrénaline</i>	4 gr.
<i>Novocaïne</i>	1 gr.
<i>Chloréthane</i>	0 gr. 125
<i>Eau de Laurier-Cerise</i>	1 gr.
<i>Excipient parfumé</i>	92 gr. 875

Etats aigus. — Coryzas, Rhinites, Rhumes de cerveau, Rhumes des foin, Sinusites, Asthme.

Particularité. — Un procédé spécial nous permet d'obtenir de l'éphédrine absolument pure, dénuée de propriétés irritantes, à action lente et prolongée. Notre huile végétale, rigoureusement neutre et stérile, ne rancit pas et ne laisse dans la gorge aucun goût âcre ou désagréable.

Mode d'emploi. — Instillations ou mieux pulvérisations. Nous avons créé un pulvérisateur permettant d'atomiser indifféremment les solutions Huileuse ou Aqueuse. Il est vendu dans un coffret accompagné d'un flacon de BIPHEDRINE Huileuse, sous le nom de :

PULVO-BIPHEDRINE HUILEUSE

ou d'un flacon de BIPHEDRINE Aqueuse, sous le nom de :

PULVO-BIPHEDRINE AQUEUSE

Prix : BIPHEDRINE Aqueuse ou Huileuse, le flacon de 24 cc. : 15 fr. 60.

PULVO-BIPHEDRINE AQUEUSE ou HUILEUSE : 29 fr. 75. (Pulvérisateur + flacon de Biphédrine).

Laboratoires E. BOUCHARA

Docteur en Médecine.

Docteur en Pharmacie.

Ancien interne des Hôpitaux de Paris

47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 94-65.)

BIS-HYD

Bismuth-Hydrargyre.

Ampoules de 2 et 3 cc. dosées à 0,024 de Bi-métal par centimètre cube. Suspension huileuse d'éléments *chimiques* : Iodo-bismuthate de quinine ; traces de Hg et Cu (Catalyseurs) et d'éléments *biologiques* : Lipoides cérébraux et testiculaires. BIS-HYD réalise pour la première fois une *thérapeutique antisyphtilitique complète*.

« Il accroît par cataryse les forces défensives de l'organisme contre la spirochétose. » (J. Schumacher.)

BIS-HYD exerce dans la Syphilis et la spirochétose en général une double action :

- 1° *Spécifique* vis-à-vis du spirochète par l'ensemble de ses composants chimiques ;
- 2° *Non spécifique* mais immunisante de l'organisme par ses composants biologiques : lipoides cérébraux et testiculaires.

Posologie. — Traitement d'attaque : 2 à 3 ampoules de 2 cc. par semaine.

Traitement d'entretien : 1 à 2 ampoules de 2 cc. par semaine.

Les injections indolores seront intramusculaires profondes (point fessier) *Thèse du Dr H. Nusem. Paris 1938.*

Prix :

6 amp. 2 cc. : 21 fr. 20 ; 12 amp. 2cc. : 38 fr. 15 ; 6 amp. 3 cc. : 23 fr. 35

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine) (Tél. : Mai. 17-77.)

BIS-KA-MA

POUDRE MICELLAIRE

Composition. — Bismuth (carbonate), Kaolin colloïdal, Magnésie, Mucilages végétaux, édulcorant vanillé.

Action. — Réalise le pansement par « poudrage » du tube digestif. Anti-acide, modificateur de la flore intestinale, absorbant des gaz.

Indications. — Acidité pré ou post-prandiale : 1 cuillerée à café aux trois repas au moment des malaises ou des douleurs.

Constipation chez les hyperchlorhydriques et les entérocolitiques : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun dans un verre d'eau.

Le flacon. Prix : 23 fr. 35.

La boîte triple dose. Prix : 51 francs.

DRAGÉES

Composition. — La même que BIS-KA-MA « poudre ».

Indications. — Spécialement destinées aux hyperchlorhydriques qui, en dehors de chez eux, ont à calmer les crises de pyrosis si fréquentes dans l'intervalle des repas. Complète en dehors des repas, l'action du BIS-KA-MA « poudre » :

Sucrer lentement 1 à 4 dragées au moment des douleurs.

Prix :

L'étui pour la poche : 16 francs.

Le flacon réserve de 4 doses : 42 fr. 50

SUPPOSITOIRE

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyre-hydroxydibromofluorescéine, Oxyde de Bismuth, Ephédrine, Jusquiame, Ciguë, Hédobutyl, Hypalène, Mucilage de Guimauve, Kaolin colloïdal.

Indications. — Hémorroïdes, Fissures anales, Ulcérations, Sphinctéralgies.

Au-dessus de 12 ans : 1 suppositoire après l'évacuation des selles et 1 suppositoire le soir au coucher.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 suppositoire.

Prix :

La boîte de 6 suppositoires : 15 fr. 90.

La boîte de 18 suppositoires : 34 francs.

PANSEMENT RECTO-COLIQUE

(Granulé à émulsionner dans l'eau pour lavement)

Composition. — Oxyquinoléine, Sous-Gallate de Bismuth, Ciguë, Mucilage de Guimauve, Hypalène, Kaolin colloïdal, Oxyde de Zinc.

Indications. — Colites, Rectites, Sigmôidites, Séquelles de dysenteries, Infections génito-urinaires, Salpingites.

Au-dessus de 12 ans : A) Lésions sphinctériennes ou génito-urinaires : 1 mesure de granulé dans 5 cuill. à soupe d'eau tiède.

B) Lésions des côlons sigmoïde et iliaque : 2 mesures dans 10 cuill. à soupe d'eau tiède.

Enfants de 6 à 12 ans : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix :

La boîte : 21 fr. 20.

La boîte triple dose : 46 fr. 70.

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

BISMHYDRAL

Composition. — Association définie et stable de chlorure mercurieux léger pur et d'azotate basique de bismuth spécialement préparés.

Propriétés thérapeutiques. — Réalise la synergie médicamenteuse du bismuth et du mercure dans le traitement de la syphilis (D^r Milian). Cholagogue doux.

Indications. — Syphilis (à toutes les périodes et sous toutes ses formes ; cure complémentaire d'entretien discrète par voie buccale, la boîte-vente ne renferme aucun prospectus et ne porte pas d'indication de maladies).

Insuffisance hépato-biliaire.

Tolérance parfaite, action sûre, aucune toxicité.

Posologie. — Un à deux comprimés une heure avant les deux principaux repas.

Prix : 13 fr. 50.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Élysées 17-46.)

BISMOKAOL

Pansement gastrique.

Action. — Associe l'action cicatrisante du bismuth et du kaolin à l'action sédative et analgésique de la belladone et de la codéine. (Ne constipe pas.)

Indications. — Ulcères, Hyperchlorhydrie, Gastralgie, etc.

Formule:

Kaolin colloïdal	72,5
Carbonate de bismuth léger.....	5
Magnésie hydratée	12,5
Codéine	0,10
Belladone pulvérisée	0,10

Pour 100 grammes.

Posologie. — De 2 à 4 paquets par jour, avant ou après les repas, de préférence le matin à jeun.

Présentation. — Poudre en sachets de 5 grs.

Prix : 17 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Lon 04-61.)

BISMULLIUM

Non constipant.

Sous-Nitrate de Bismuth chimiquement pur et Mucyllium.

Médication de choix des affections gastro-intestinales. — Calme la douleur. Désinfecte l'intestin. Pansé et cicatrise l'Ulère gastro-duodénal et les ulcérations coliques.

Antidiarrhéique à faible dose, à haute dose, traitement de la constipation.

Traitement de choix des parasitoses intestinales.

1 cuillerée à soupe de *Bismullium* contient une cuillerée à café de Sous-Nitrate de Bismuth.

Cures alternées de Bismullium et de Mucyllium contre la constipation.

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café 3 fois par jour, avant les repas, dans un peu d'eau.

Enfants au-dessous de 10 ans : 1 cuillerée à café dans les mêmes conditions.

Prix. — La boîte : 25 francs.

Enregistré au Lab. de contrôle des Médicaments sous le n° 914-2.

Littérature et échantillons sur demande :

Laboratoires Bernard GARCIN

SAINT-SATURNIN-LEZ-AVIGNON (Vaucluse).

Eugène GRAS

Pharmacien de 1^{re} classe. Ex-interne de hôpitaux.

BISMUSODINE

Granulée.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

0 gr. 50 carbonate de bismuth.

0 gr. 50 citrate de soude état naissant.

1 gr. 50 carbonates de chaux et magnésie.

Indications. — Gastropathies. — Hyperacidité.

— Sténoses pyloriques. — Colites. — Ulcus. —

Antisepsie intestinale.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour délayées dans un demi-verre d'eau ou même croquées telles, suivant indications du médecin.

Prix : 17 fr. le flacon d'environ 25 cuill. à café.

Laborat. S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

O. CHAMARD et R. NIEL

Ex-Inspect^r des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

BISMUTH ADRIAN

Composition. — Complexe bismuthique riche en oxyde de bismuth hydraté, sans excipient ni produit étranger.

Propriétés. — Pansement gastrique. Saturant de l'acidité gastrique. Antiseptique et cicatrisant gastro-intestinal. Parasiticide intestinal. Antiseptique dermatologique. Utilisable pour le radio-diagnostic.

Indications. — Hyperchlorhydrie, aérophagie, entérites aiguës et chroniques, gastralgies, infection intestinale, ulcères de l'estomac et du duodénum, cancers gastriques et intestinaux, parasitose intestinale (ascaris, nématodes, oxyures), antiseptisme des ulcères et plaies en dermatologie, irritations cutanées.

Indication particulière : examens radioscopiques.

Présentation. — Poudre.

Posologie et mode d'emploi :

1° A l'intérieur : délayer la poudre dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Adultes : 5 à 20 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. suivant l'âge.

2° Parasitose intestinale :

Adultes : 10 à 15 gr. par jour.

Enfants : 0 gr. 50 à 5 gr. par jour.

Cure de 7 jours, faire suivre d'une légère purgation au calomel.

3° A l'extérieur (dermatologie).

Poudre, pommade ou glycérolé à 5 % en applications locales.

Prix :

Boîte de 50 gr. : 22 francs.

Boîte de 100 gr. : 36 francs.

Boîte de 200 gr. (pour examens radioscopiques) : 65 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 523-3.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Ancⁱ ADRIAN et C^o

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

BISMUTH B-3

Composition. — Suspension homogène de sels de Bismuth (carbonate, sous-nitrate et salicylate) dans un mucilage. Une cuillerée à soupe renferme 1 gr. de sels de Bismuth.

Indications. — Toutes les affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin, *ulcère*, colites, etc...

Parasitoses intestinales (oxyures), Rectites (en petit lavement à garder).

Posologie. — 1° Affections gastriques 1 à 3 cuillerées à soupe avant les repas.

2° Affections intestinales, 1 à 3 cuillerées à soupe à jeun ou une heure avant les repas

3° Rectocolites, 2 à 5 cuillerées à soupe en lavement à garder toute la nuit.

Présentation et prix. — Crème aromatisée.

En flacon de 300 cc. : 22 fr. 90.

En flacon d'un litre : 52 francs.

N° contrôle : 1850-1.

BISMUTH B-3 poudre

Pour faciliter certains malades, nous présentons, sous la dénomination **Bismuth B-3 Poudre**, notre produit à l'état sec.

Une cuillerée à soupe de cette poudre correspond sensiblement à deux cuillerées à soupe de **Bismuth B-3 Crème** et représente la dose habituelle. On prendra donc en poudre la moitié des doses prescrites pour la forme crème.

Pour obtenir la **crème de Bismuth B-3**, ajouter à une cuillerée de poudre deux cuillerées d'eau. Bien délayer en tournant. Attendre quelques instants le développement du mucilage qui donnera la consistance voulue. On obtiendra ainsi une crème comparable au produit tout préparé sans atteindre cependant à la parfaite homogénéité que le brassage mécanique peut seul donner.

Sauf spécification expresse : **Bismuth B-3 Poudre**, la forme habituelle sera toujours délivrée.

Prix : la boîte 22 fr. 90.

N° contrôle : 1850-2.

Laboratoires L. BORNET

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences.

5, boulevard des Brotteaux — LYON.

BISMUTH DESLEAUX

Pansement Gastro-Intestinal Idéal.

Au carbonate de bismuth amorphe, obtenu par un procédé de fabrication spécial.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement gastro-intestinal de choix à teneur en bismuth élevée, assurant un tapissage intégral, homogène et uniforme de la muqueuse, joint à une action sédative, protectrice, cicatrisante et anti-infectieuse. Met à l'abri des accidents provoqués par le sous-nitrate.

Indications. — Ulcus, ulcérations gastriques et duodénales, hyperchlorhydrie, gastrites, ulcère peptique, entéro-colites, colibacillose, aérophagie, suites d'opérations gastriques, oxyurose.

Présentation. — Poudre impalpable, qui, délayée dans l'eau, donne un lait homogène, de goût agréable. Chaque flacon porte une mesure dont le contenu correspond à environ 6 gr. de produit.

Posologie. — *Pansement gastro-intestinal* : 12 à 50 gr. par jour suivant les cas, soit 1 à 3 mesures 2 à 3 fois par jour, prises à jeun, matin, midi et soir, une 1/2 heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau.

Aérophagie, Vomissements : 12 gr. (2 mesures) dans 1 verre d'eau pris en plusieurs fois dans la journée.

Colibacillose : 12 gr. (2 mesures) 1/2 heure avant les repas par cures de 7 jours.

Oxyures : Adultes, 30 gr. (5 mesures), enfants, 20 gr. (3 mesures) ; petits, 10 gr. (2 mesures), par jour, le matin à jeun. 2 à 3 cures de 7 jours suivies d'une légère purgation et espacées de 7 jours de repos.

Prix : 26 francs.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III, PARIS (VIII^e)
(Tél. : Élysées 17-46.)

CRÈME DE BISMUTH

du D^r QUESNEVILLE

Préparation créée en 1856 et toujours préconisée depuis plus de 80 ans dans toutes les indications du Bismuth en thérapeutique gastro-intestinale.

Action favorable et innocuité confirmées par la plus longue expérimentation.

Composition. — *Hydrate de bismuth neutre obtenu à l'état de précipité gélatineux par le procédé du D^r Quesneville et conservé en suspension dans de l'eau. Sans mélange avec aucune matière étrangère.*

Indications. — Traitement de tous états inflammatoires et affections lésionnelles du tractus digestif. Thérapeutique symptomatique des troubles fonctionnels (douleurs gastriques, pyrosis, spasmes, diarrhées, etc.).

Doses. — 1 à 5 cuillères-mesures (1 à 5 fois par jour) dans de l'eau ou du lait fournissant un lait de bismuth sans odeur ni saveur, facilement accepté.

Enregistré au L. N. C. n° 422-1.

Prix : 24 fr. avec cuillère-mesure en os (100 doses).

Crème de BISMUTH CHLORO-MAGNÉSIEENNE du D^r QUESNEVILLE

Nouvelle dénomination : MA. BIS. CAL.

Composition. — Crème de bismuth du D^r Quesneville additionnée de chlorure de magnésium et de phosph. bicalcique, éléments de reminéralisation et de régénération cytophyllactique.

Indications. — Prévention de lésions ulcéraives au cours de gastrites, entérites, colites chroniques ou infectieuses. Prophylaxie de la récédive des anciens ulcères.

Application à la cure de la colibacillose : médication fermant les lésions de l'épithélium intestinal qui sont à l'origine de l'invasion colibacillaire et de ses diverses localisations ultérieures.

Doses. — 1 cuillerée à café dans un verre à madère d'eau ou de lait, 1 ou 2 fois par jour un peu avant de manger.

Enregistré au L. N. C. n° 422-3.

Prix : le flacon pour 10 jours : 18 francs.

Laboratoire QUESNEVILLE

L. COLLESSON, Pharmacien, licencié ès sciences,

5, rue d'Angoulême — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 18-08.)

BISMUTHION

Description. — Le Bismuthion est un complexe colloïdal isotonique de Bismuth et or dans l'eau distillée, obtenu par procédé électrique et destiné au traitement de la syphilis. En boîtes de 6 ampoules de 3 cc.

Action thérapeutique. — Le Bismuthion s'injecte dans les veines ou les muscles sans précautions spéciales. Il est parfaitement toléré, non toxique, ne provoque aucune réaction douloureuse ou autre, diffuse rapidement dans l'organisme et particulièrement dans les lésions syphilitiques et est facilement éliminé sans irriter les reins. Il paraît agir sur les spirochètes comme *catalyseur*.

Indications. — Le Bismuthion, grâce à son absence de toxicité, est spécialement indiqué pour le traitement des syphilis anciennes qui exigent un long traitement, syphilis nerveuses, tabes, hérédosyphilis.

Prix : 34 fr. 30 pour 6 à 18 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BISMUTHOÏDOL

Bismuth colloïdal à grains fins.

Ampoules.

De 2 cc. titrées à 0 gr. 004 par cc.

Indolores.

Stériles.

Solution aqueuse.

Indications.

Spirillicide. Coqueluche.

Syphilis. Angines aiguës.

Toutes maladies à protozoaires.

Mode d'emploi. — Une ampoule de 2 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans les cas ordinaires. — Une tous les jours dans les cas graves.

Prix : 26 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

BISMUTH TULASNE

Composition :

Sous-nitrate de bismuth spécial.....	65 grammes
Kaolin lavé et gomme blanche.....	35 —

Propriétés. — Pureté chimique contrôlée, degré d'acidité bien au point et constant garantissant une innocuité absolue même aux plus hautes doses. Action sédative, cicatrisante et antiseptique puissante et rapide. Forme avec l'eau un mélange homogène, facile à boire, adhérant fortement à la muqueuse et insoluble dans les sucs digestifs Supérieur au carbonate de bismuth et aux sous-nitrates dits « légers » Action laxative à fortes doses (15 à 20 gr.), constipante à faibles doses (5 gr.).

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boltes de 10 sachets	28 fr. 50.
— 30 sachets.....	71 fr. 40.

N° de contrôle n° 91-1.

Indications et Posologie (Chaque prise dans 2/3 de verre d'eau environ).

Estomac: Ulcères, Gastrites : 1 à 3 sachets (10 à 30 gr.) soit en une seule fois le matin à jeun, soit en 2 ou 3 prises, au réveil et une demi-heure avant les repas.

Dyspepsies : 1 sachet (10 gr.) en se mettant à table.

Vomissements, Aérophagie : 1 sachet dans un verre d'eau en 3 ou 4 fois dans la journée.

Le produit peut se prendre également après les repas.

Intestin : Entérocrites, Troubles fonctionnels (diarrhée, constipation), Fermentations, Ballonnements, Intoxications, Troubles circulatoires, nerveux (migraines), psychiques (angoisses), d'origine intestinale.

Avec diarrhée prédominante : 1 demi-sachet (5 gr. environ) une demi-heure avant les deux repas. Avec constipation : 2 sachets (20 gr.) le matin à jeun. Si cette dose occasionne une diarrhée anormale, on la fera diviser en deux prises, un sachet avant les deux repas.

Colibacillose : 1 sachet (10 gr.) une demi-heure avant les 2 repas.

Oxyurose. Adultes : 1 sachet le matin à jeun et 1 sachet une demi-heure avant le repas du soir. *Enfants :* de 3 à 7 ans : 1 demi-sachet (5 gr. environ) ; de 7 à 12 ans : 1 sachet (10 gr.). En une seule fois le matin à jeun ou en deux prises égales dans la journée comme ci-dessus. Cures de 5 jours espacées par 6 jours de repos. Purgation entre chaque cure. Les lavements d'eau salée sont bien indiqués concurremment.

SOUS-NITRATE DE BISMUTH TULASNE

Pur

Composition. — Sous-nitrate de bismuth polybasique absolument pur.

Propriétés, Indications, Posologie. — Mêmes propriétés, mêmes indications et même posologie que le *Bismuth Tulasne*.

Présentation. — Sachets de 10 grammes :

Boîtes de 10 sachets	40 fr. 80.
----------------------------	------------

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. Marcadet 82-01.)

BISMUXYL

Solution hypertonique en ampoules.

Bismuthothérapie magnésienne, Traitement spécifique et aspécifique, du tréponème et des protozoaires pathogènes.

Des recherches attentives ont démontré que les sels de *Magnésium* ont la propriété d'augmenter les pouvoirs thérapeutiques du *Bismuth* et d'en diminuer, en même temps, la toxicité de 50 p. 100.

Par son action *catalysatrice* et *anaphylactique*, le *Bismuxyl*, entièrement nouveau, répond aux plus strictes exigences de la thérapie antisypilitique spécifique et aspécifique.

Le *Bismuxyl* possède l'activité du *Tartrate bismuthate de sodium* et du *Galacto-glucinate de magnésium* hydrosolubles ; par injections intramusculaires et intraveineuses, complètement indolores et ne donnant lieu à aucune réaction locale et intolérance générale.

Le *Bismuxyl* présente les avantages suivants : précision des doses administrées et entièrement assimilées, absence du phénomène d'accumulation et de durcissement au point d'injection.

Chaque ampoule contient :

Tartrate Bismuthate de Sodium 0 gr. 13 (0 gr. 07 Bi).

Gluc-Galactonate de Magnésium..... 0 gr. 35

Eau bidistillée Q. S. pour 1 ampoule de 5 cc.

Indications. — *Dans tous les stades et toutes les phases de la syphilis et toutes maladies à protozoaires.*

Posologie :

Traitement d'entretien : 1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.

Traitement d'attaque : 1 ampoule de 5 cc. tous les 2 jours.

Série de 12 à 15 injections avec un intervalle de 1 mois pour les deux séries suivantes.

Pour les enfants, la dose doit être réduite de la moitié.

Par injections intramusculaires ou intraveineuses.

Prix : Boîte de 12 ampoules : 35 francs.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1814-8.

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS.

(Tél. : Dor. 56-38.)

BISSYL

Composition. — Silicate de Bismuth chimiquement pur.

Produit obtenu synthétiquement et se décomposant sous l'action du suc gastrique en acide silicique et bismuth à l'état de division moléculaire.

Propriétés. — Réunit les propriétés de l'acide silicique et du bismuth.

Dénué de toxicité, anti-infectieux, anti-acide, cicatrisant. — Traitement gastrique et intestinal, efficace sous faibles doses. — Pas d'accoutumance, même après administration prolongée.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou chroniques du tractus gastro-intestinal : crampes, brûlures, dyspepsies hyper et hypo-acides. Leurs complications : gastralgie et gastrite, gastro-entérite, entérite, entérocolite, ulcus de l'estomac et du duodénum.

Présentation et prix. — 20 fr. la boîte de 20 cachets.

Posologie. — Un cachet avant les repas. Reprendre 1 cachet après les repas en cas de douleurs.

Laboratoire du BISSYL

117 ter, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Mont. 23-54.)

BISTOMAX

Composition. — Carbonate basique de bismuth pur, léger, de fabrication spéciale.

Propriétés. — Pansement gastro-intestinal, anti-infectieux, cicatrisant, sédatif ; d'innocuité absolue.

Indications. — Poussées évolutives des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin : Ulcères, Colites, Colibacillose.

Présentation. — Poudre impalpable, donnant mélangée à l'eau un lait homogène de saveur agréable.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à potage (suivant les cas) prises à jeun trois fois par jour, dans de l'eau ou de la tisane, 1/2 heure au minimum avant les trois repas : matin au réveil, midi et soir.

Prix : 32 fr. 50.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

BIVATOL

Formule. — α Carboxéthyl β méthyl nonoate basique de bismuth. Le premier des sels de bismuth français présenté en solution huileuse fluide.

Indications thérapeutiques. — Antisypilitique, ayant une action spirillicide intense. Traitement d'attaque et d'entretien. Provoque la négativation rapide et la disparition de tous accidents. Peut être utilisé chez les hérédos et les femmes enceintes.

Présentation. — Ampoules huileuses fluides.

Adultes : 12 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 07 de bismuth métal.

Enfants : 10 ampoules de 1 cc. contenant 0 gr. 035 de bismuth métal.

Chaque boîte constitue une cure.

Posologie :

Adultes : 12 injections de 1 cc. faites intramusculaires, à raison d'une tous les 2 jours pendant la première semaine, puis de 2 par semaine.

Enfants : 1/10 de cc. par semaine jusqu'à 3 ans ; 1/2 cc. par semaine de 3 à 5 ans ; 1 cc. par semaine à 10 ans.

Prix :

La boîte de 12 ampoules de 1 cc. (adultes) : 27 fr. 05.

La boîte de 10 ampoules de 1 cc. (enfants) : 21 fr. 75.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

BLAGNY

Dans toutes les *tox* de toutes origines, s'administre facilement grâce à ses trois formes :

Gouttes, Dragées, Sirop.

Sa formule. — *Éthylmorphine, Codéine, Bromoforme, Éphédrine, Drosera, Aconit, Eau de Laurier-Cerise.*

Mode d'emploi. — *Adultes* : L gouttes = 1 cc., correspondant à 2 dragées et à 1 cuillerée de sirop, 4 à 5 fois par jour.

Enfants : de X à XXX gouttes suivant l'âge, 4 à 5 fois par jour. — 1 à 2 dragées par jour à partir de 10 ans.

Laboratoire du VITARSENIC

René PAMELA, Pharmacien

85, rue Turbigo — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 12-39.

BLÉDINE JACQUEMAIRE

Composition. — Aliment rigoureusement complet, tant par sa teneur en albuminoïdes, graisses et hydrates de carbone, que par les éléments minéraux et *facteurs de croissance* (vitamines), extraits de la périphérie du grain de blé (recherches expérimentales effectuées sous la direction de MM. les Prof. Morel et Mouriquand au Lab. de Chimie organique et de tox. de la Faculté de Lyon, de mai 1919 à juillet 1920).

Propriétés. — Entièrement digestible et assimilable par les enfants dès le premier âge. Complément nécessaire du lait dans l'allaitement artificiel.

Indications. — Facilite la digestion du lait. Favorise la croissance et la dentition. Prépare et facilite le sevrage. Régularise d'une façon remarquable les fonctions digestives (Aliment de régime dans les cas suivants : Diarrhée, Constipation, Gastro-entérites); désodorise les selles en modifiant rapidement la flore intestinale.

Particularités. — Ni cacaotée, ni lactée, ni maltée, ni torréfiée, ni étuvée, et sans addition d'aucun produit pharmaceutique, la Blédine se conserve d'une façon parfaite, en boîtes de fer-blanc hermétiques, sans modification de goût, ni d'odeur, ni de composition.

Doses. — Du 1^{er} au 4^e mois : 1 *gramme par mois d'âge dans chaque biberon*. Du 5^e au 6^e mois : 1 1/2 à 2 *cuillerées par biberon*. A partir du 7^e mois : 1 *cuillerée à soupe par repas*, 1 1/2 à 2 *pour les adultes*.

Prix : La boîte P. M. 9 fr. 50.

Nota. — La *Blédine* peut se préparer à l'eau. Dans ce cas, doubler les quantités ci-dessus.

BLÉCAO. — Toutes les qualités de la *Blédine* se retrouvent dans le **Blécao**, déjeuner reconstituant, aliment de régime d'une digestibilité exceptionnelle. Prix : La boîte P. M. 6 fr. 75.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 de frs
VILLEFRANCHE (Rhône).

BLENNOPIAT

Composition. — Association de : Copahu, Cubèbe, Santal, Sassafras, Térébenthine. Ancien opiat complet du Codex sous forme pilulaire, *glutinisée*.

Action thérapeutique. — Synergie balsamique efficace, absorption facile, pas de troubles gastriques ni de réaction rénale.

Indications. — Blennorrhagie à toutes ses périodes et toutes complications dues au gonocoque. Cystites. Urétrites.

Mode d'emploi. — 6 à 12 pilules par jour, au moment des repas.

Prix : 17 fr. 55 la boîte.

Laboratoire **ADOL**

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe
78, Cours de la Liberté — LYON.
(Tél. : Moncey 13-37.)

[BLÜYL

Composition. — Cyanure de Mercure, Bleu de Méthylène, Chlorhydrate de Cocaïne, Eau distillée d'Hammélis, Excipient isotonique spécial.

Sans danger, sans douleur ni contre-indication.

Préventif et curatif des états congestifs et douloureux des yeux et des paupières : Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Kératites, Complications oculaires des maladies infectieuses, Surmenage et hygiène des yeux.

Posologie :

États aigus : III à IV gouttes 5 à 6 fois par jour.

États légers : II à III gouttes, 4 à 5 fois par jour.

Hygiène : II gouttes matin et soir.

Prix : 16 fr. 65. Durée à l'usage : 2 mois environ.

Toutes les Pharmacies et Dépôt général :

Office Pharmaceutique (O. C. P.),

108, rue Picpus, Paris.

Laboratoire du **BLÜYL**.

6, avenue Mirabeau — NICE.

BOLDINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

Boldine Houdé

Alcaloïdes totaux du Boldo.

Emplois thérapeutiques :

Toutes les *insuffisances hépatiques*, Cirrhoses hypertrophiques, Cholécystites chroniques, Lithiase biliaire, Congestion du foie. Constipation chronique.

Mode d'emploi :

De 2 à 6 granules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

BOLDOCHOL

Gouttes titrées.

Composition :

Extrait fluide de boldo	38 gr.
Extrait fluide d'artichaut	38 —
Extrait fluide de rhubarbe	11 —
Extrait fluide de combretum	11 —
Excipient. Q. S. pour	100 —

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Ictères, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique, Intoxications alimentaires, Dermatoses, Migrations, Urticaire, Troubles digestifs, Maladies des pays chauds, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : XXV à XXX gouttes.

Enfants : X à XV gouttes.

Deux fois par jour dans un peu d'eau de Vichy. Cure de trois flacons avec arrêt de dix jours entre chaque.

Prix : 17 fr. 75 le flacon de 45 grammes.

Laboratoire du BOLDOCHOL

55, avenue de Montredon.
MARSEILLE (Bouches-du-Rhône).

BOLDOCRINOL

Anciennement : Boldobiline Jammes
Boldo et Opothérapie biliaire.

Opothérapique utilisé en parfait état d'activité thérapeutique grâce à une date limite d'utilisation portée sur chaque boîte.

Le BOLDOCRINOL est le plus physiologique des cholérétiques. Rééducateur idéal du foie et de l'intestin, il réalise un drainage biliaire sans brutalité, évitant surtout la violente chasse biliaire des sels magnésiens et sodiques.

Constipation, Hépatisme, Infections intestinales, Coliques hépatiques, etc.

6 à 8 comprimés par jour.

La boîte de 60 comprimés : 16 fr. 65.

N° d'enregistrement 603-5.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — Paris (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 51-85.)

BOLDOCYNA

Composition :

Boldine.....	0,001
Extrait sec purifié de <i>Cynara scolymus</i>	0,10
Pour 1 comprimé.	

Indications :

- 1° Dans les *affections hépatiques* : l'insuffisance hépatique, les congestions du foie, les hépatites simples ou avec ictères, les cirrhoses, les coliques hépatiques et leurs complications, les cholécystites.
- 2° Dans les *manifestations digestives, rénales, cardiovasculaires, cutanées, humorales* des hépatiques.
- 3° Comme le complément naturel et indispensable des cures hydrominérales de Brides, Contrexéville, Pougues, Vals, Vichy, Vittel.
- 4° Comme préventif et curatif des affections hépatiques des pays chauds.

Posologie :

De 2 à 5 comprimés par jour au moment des repas.
 Prix : 13 francs.

Laboratoires du BOLDOCYNA : A. JOURDIN
 6, av. Victor-Hugo — PARIS (XIV^e) (Tél. : Passy 92-54).

BOLDO GMET

Composition. — Extrait *total liquide sans alcool ni sucre* renferme tous les principes actifs de la feuille de boldo fragrans ; correspondant à 2 grammes de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Cholagène et cholagogue. Diurétique, Stimulant antiseptique du foie et de la vésicule. Facilite l'élimination des calculs. Plus efficace que les infusions de feuilles.

Indications. — Tous les troubles hépatiques. Insuffisance, Congestion, Anorexie, Constipation, Entérocolite, Neurasthénie et insomnie des hépatiques, Lithiase biliaire, Cholécystite, Pyélonéphrite, Grossesse, Cellulite.

L'absence d'alcool rend le Boldo Gmet plus efficace que les teintures ; la présentation liquide et la présence des huiles essentielles et des matières aromatiques le font préférer aux granules de Boldine (ne contenant que l'alcaloïde de la plante) et aux teintures ou autres extraits alcoolisés.

Très employé pour les coloniaux. Prépare le foie à la cure thermale (Vichy, etc...), dont il maintient les effets.

A donner un mois avant une intervention sur le foie ou la vésicule et au cours d'un traitement opothérapique ou spécifique pour maintenir l'intégrité du foie.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une *tasse d'eau chaude* au repas du soir ou à défaut le matin à jeun.

Le flacon pour 1 mois : 27 doses 22 fr. 45.

Flacon géant 500 cc. 58 francs.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, rue du Fg.-Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél.: Provence 43-10.)

BOLDOINE ÉPARVIER

Forme. — Granulé fin sucré.

Composition. — 1 cuillerée à café équivaut à 4 gr. de Boldo frais, parties active et aromatique comprises.

Action. — Cholagogue, Stimulant général, Antisep-tique intestinal favorisant l'oxydation et l'éli-mination des déchets (urée).

Indications. — Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Lithiase rénale. Ictères. Dyspepsies d'origine hépatique. Anorexie. Atonie des voies digestives. Cachexies. Vomissements acétoné-miques chez l'enfant.

Posologie. — Après chaque repas, 1 ou 2 cuillerées à café, prises en nature ou dans un peu d'eau chaude. « Très bien acceptée par l'enfant. »

Peut être prise également à jeun et avant les repas.

Échantillons et littérature :

Laboratoires ÉPARVIER

Ch. MATHAIS, Docteur en pharmacie.

26, Grande-Rue Saint-Clair — LYON.

(Tél. : 150-21.)

BOLDOLACTIC LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Ext. de combretum.....	0,05
Ext. de bourdaine	0,05
Ext. de feuilles d'artichaut.....	0,10
Ext. de boldo	0,05
Ext. biliaires dépigmentés	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02
Lactose	Q. S. pour 1 comprimé.

Action thérapeutique. — Spécifique des mala-dies de la cellule hépatique et des voies biliaires.

Indications. — Ictère, Cholécystite, Angiocholite, Cirrhoses, Congestion hépatique, Dyspepsie bi-liaire, urticaire et dermatoses, Constipation.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour, 3 à midi et 3 le soir avant les repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés. 16 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35);

BOLDOLACTOL

Composition. — Association de ferments lactiques, de ferments biliaires dépigmentés et décholestérinés et de boldine (1/2 mgr. de boldine par comprimé).

Propriétés. — Empêche les fermentations intestinales, excite la sécrétion biliaire, stimule les fonctions hépatiques, laxatif.

Avantages. — Conservation indéfinie, tolérance digestive parfaite.

Indications. — Affections hépatiques, Entérites, Auto-intoxication intestinale, Diarrhées paludéennes, Constipation chronique.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour 20 jours par mois.

La boîte de 60 : 14 fr. 30 (Taxe armement comprise).

Laboratoires A. SALLES

R. FOSSOUL, Pharmacien.

11, boulevard de Strasbourg — PARIS (X^e).

(Tél. : Provence 10-01.)

BOLDOLAXINE

Laxatif à base de feuilles fraîches de boldo.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes.

Avantages. — Laxatif physiologique. Action douce et certaine, assurant des selles naturelles. Dépourvu d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi. — Un comprimé avant le repas du soir.

Enfants : demi-comprimé.

Présentation et prix. — 13 fr. 50 le flacon pour 25 jours de traitement.

Laboratoire Émile CHARENTIER

7, r. du Bois-de-Boulogne — PARIS (Tél. : Pas. 55-46.)

BOLDOLIVE

Composition. — Huile d'Olive vierge ultra-filtrée et neutre combinée à froid avec les principes actifs lipo-solubles de Boldo.

Propriétés. — Excite la sécrétion biliaire. Draine la bile. Rééduque la fonction intestinale. Constitue un pansement de la muqueuse.

Indications. — Angio-cholécystites, cholécystatonie, lithiase biliaire, typhlo-cholécystite, syndromes entéro-hépatiques, colites, stase intestinale droite, ictères et suites d'ictères.

**Produit actif ne présentant aucune toxicité
Toujours bien toléré.**

Présentation et posologie :

- 1° *En solution* : De préférence une ou deux cuillerées à soupe le matin à jeun ou 20 minutes avant chaque repas.
- 2° *En capsules* : 2 capsules de 2 grammes ou 3 capsules de 1 gramme 20 minutes avant le repas de midi.
- 3° *En suppositoires* (adultes ou enfants), 1 ou 2 suppositoires à quelques minutes d'intervalle le soir au coucher.

Enreg. au L. N. C. n° 1679.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.

19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30.)

ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.

(Voir *Suppolive, Dermolive et Sulfolive.*)

BOLDOMUCYL

Mucilage granulé.

Produit français. Créé et expérimenté avec succès à Plombières-les-Bains.

Composition :

Mucilage gommeux Normucyl.	45 gr.
Charbon végétal activé	10 —
Extrait d'artichaut.....	1 —
Extrait de boldo	1 —
Excipient non sucré. Q. S. pour	100 —

Mode d'action. — Accroît et accélère la sécrétion biliaire. Possède une action absorbante, antiseptique et antitoxique. Assure l'évacuation normale de l'intestin sans l'irriter grâce au mucilage rééducateur Normucyl. Pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation en particulier chez les ptosés, les hépatiques (syndrome entéro-hépatique). Intoxications intestinales. Insuffisance biliaire. Fermentations. Aérocolie.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café à chacun des deux principaux repas. Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix : 22 fr. la boîte de 200 gr. (15 à 20 jours de trait.). Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1232-2.

Laboratoires CHATRON, Docteur en Pharmacie,
PLOMBIERES-LES-BAINS (Vosges)
et 45, rue Cambronne — PARIS (XV°). (Tél. : Ség. 26-79.)

BOLDO VERNE

Le cholagogue sûr et régulier.

Composition. — Extrait total des feuilles de Boldo contenant tous les principes actifs : boldine, essence et matières aromatiques.

Indications. — Tous les troubles fonctionnels du Foie et des voies biliaires. Anorexie, Atonie gastrique, Séquelles du Paludisme.

Posologie. — L à C gouttes par jour.

Prix : 17 fr. 20.

Traitement de l'unité vente : 20 à 25 jours.

Laboratoire VERNE

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE
Téléphone : 19-84.

BOLÉASE MONAL

Médication spécifique des maladies du foie et de l'intestin

Forme. — Globules glutinisés.

Composition.	Extrait de Boldo	0,05
	— de Bile.....	0,10
	Calomel.....	0,005

Propriétés. — Cholagogue, décongestif et antitoxique.

Indications. — Troubles biliaires et hépatiques. Affections hépatiques : lithiase, ictères, congestion, cholémie, cirrhose. Affections intestinales : entérite muco-membraneuse, constipation, auto-intoxications.

Doses. — 4 à 6 globules par jour.

Le flacon de 50 globules : 17 fr. 35.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).
(Tél. : Invalides 52-73.)

BOLÈNE

*Désinfection des voies hépato-biliaires.
Normalisation des fonctions intestinales.*

Composition. — Sels biliaires, Poudre de muqueuse intestinale, Hexaméthylène-tétramine, Rhamnus frangula, Agar-agar.

Mode d'action. — Rééducation et désinfection de l'intestin par l'association de l'opothérapie biliaire et intestinale à l'hexaméthylène-tétramine.

Action douce et régulière. Pas d'accoutumance.

Présentation. — Comprimés dragéifiés de 0 gr. 50.

Doses et mode d'emploi. — Commencer par 2 comprimés avant le repas du soir. Augmenter ou diminuer la dose suivant les résultats obtenus. La boîte de 60 comprimés (traitement de 25 à 30 jours) : 13 fr. 50.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

BORINHALANT

Comprimés pour Inhalations et Gargarismes.

Composition. — Baume du Pérou, Borate de soude, Essences de Pin, de Lavande, d'Eucalyptus, de Niaouli et de Benjoin.

Indications. — Rhinites, Sinusites congestives ou suppurées, Angines, Amygdalites, Pharyngites, Laryngites, Trachéites et, en général, toutes les infections rhino-pharyngées.

Le *Borinhalant* calme rapidement les crises douloureuses, provoque l'ouverture des cavités sinusiennes, est un remarquable antiseptique.

Mode d'emploi. — 2 comprimés par inhalation, 1 comprimé dans un demi-verre d'eau en gargarisme.

Prix : 12 fr. 80 l'étui de 30 comprimés.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 62-7.

Laboratoire STOULS

156, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Passy 68-14.)

BORNEOSOL

Composition. — Solution aqueuse de Camphre de Bornéo.

Action. — Tonicardiaque, antiseptique.

Avantages :

Atoxicité complète. — *Injection facile et indolore.*
Solution directe de Bornéol, sans sulfonation.
Pouvoir antiseptique plus élevé que celui du camphre japonais.

Indications. — *Toutes celles du Camphre :* Pyrexies, Infections, etc.

Présentation et prix :

<i>Bornéosol simple</i> , 8 ampoules de 2 cc ...	16 fr. 30
— — — — — 5 cc ...	20 fr. 40
<i>Bornéosol Spartéiné</i> , 8 ampoules de 2 cc.	18 fr. 35
— — — — — 5 cc.	24 fr. 50

Laboratoires du BORNEOSOL
DEROME-PINAUD, Pharmacien
143 bis, rue Ordener — PARIS.
(Tél. : Montmartre 07-76.)

BOROSODINE LUMIÈRE

Médication calmante et antispasmodique
des Affections nerveuses de toute nature.

Constitution. — Solution aqueuse de Tartrate boricosodique éliminément pur dosée à 1 gr. par cc.

Propriétés. — Renferme, à poids égal, une plus forte proportion de bore actif que le Tartrate borico-potassique, beaucoup moins toxique et plus efficace.

Indications. — Agitation, insomnies, délires, hystéries, névrose, chorée et incontinence nocturne d'urine des anormaux instables ou agités. Les améliorations ne sont jamais obtenues aux prix de dépressions nerveuses profondes, elles s'accompagnent, au contraire, d'une amélioration très nette de l'état général, de l'état intellectuel et même du faciès du malade.

Mode d'emploi. — *Adultes :* Administrer à doses progressives de 2 à 10 grammes par jour, mais, en raison de sa parfaite innocuité et de sa très faible toxicité, cette limite peut être, dans certains cas, notablement dépassée sans aucun inconvénient.

Demi à 2 cuillerées à café de solution en deux fois dans un demi-verre d'eau sucrée, à la fin des principaux repas.

<i>Enfants</i>	{	1 à 2 ans :	Demi	à 1 cuillerée à café	} de SIROP par jour.
		3 à 4 ans :	1	à 2 cuillerées à café	
		5 à 7 ans :	2	à 4 cuillerées à café	
		8 à 14 ans :	4	à 6 cuillerées à café	

Formuler. — *Adultes :* Flacon de Solution BOROSODINE LUMIÈRE
Enfants : Flacon de SIROP DE BOROSODINE LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE
45, rue Villon — LYON.

BOROSTYROL SCHLATTER

Spécifique cicatrisant des pertes de substances cutanées ou muqueuses.

Composition et présentation. — 1° Soluté alcoolique ; 2° Pommade ; 3° Huile ; 4° Ovules à base de dérivés terpéniques et de phénols substitués.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de la cellule, Anesthésique local, Antiseptique. Non toxique.

Indications. — Plaies, Brûlures, Contusions, Boutons, Aphtes, Piqûres, Crevasses du sein, Rougeurs des nourrissons, Ulcères variqueux, Vulvites, Vaginites, Métrites, Prurits.

Mode d'emploi. — Badigeonnages, frictions, pansements adhérents au coton, selon les cas. — Prix : Flacon, 12 francs ; tube, 10 fr. 85 Huile, 21 fr. 75 ; ovules, 19 fr. 60.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL**, Pharmacien
4, avenue Orban.

BOUES RADIOACTIVES RHEMDA

L'activité permanente des Boues Rhemda est due à la présence de corps actifs tels que l'ionium, l'actinium, le polonium, l'uranium, séparés au cours de la fabrication du Radium et du Mésothorium.

De même essence que les Boues naturelles (Dax, etc.), mais 50 fois plus actives, elles conservent indéfiniment leurs propriétés.

Elles peuvent être utilisées pour les Rhumatismes divers, les Lumbagos, la Goutte, la Sciatique, les Maladies cutanées, les Ulcères variqueux et comme stimulantes sous forme de lotions, de bains, de cataplasmes ou d'emplâtres.

Mode d'emploi. — Pour un bain complet, délayer de 250 à 300 grammes de Boue dans l'eau du bain. Pour les bains locaux délayer de 10 à 20 grammes par litre d'eau.

Prix au public : 2 kg., 51 fr. ; 1 kg., 38 fr. 75 ; 1/2 kg., 23 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 466-7.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine),
Tél. : Wagram 58-89. — R. C. 255-068 B.

BOULES QUIES

Dormir et travailler au milieu des bruits.

Boules plastiques adoptant exactement la forme du conduit auditif, point de fusion plus élevé que la température maximum du corps. Antivibratoires, ne transmettant pas au tympan les vibrations de l'atmosphère qu'elles interceptent.

Indications. — Accessoire précieux de la thérapeutique, permettant d'assurer le repos. Contre les bruits de la rue, de l'usine, de l'hôtel, etc...

Permettent aux aviateurs d'atténuer à volonté les bruits des moteurs ou la déflagration des mitrailleuses.

Indispensables aux nageurs pour éviter les otites dues à l'introduction de l'eau dans les oreilles. Long usage.

La boîte de 10 boules : 11 fr. 45.

Echantillons sur demande :

Laboratoires « QUIES »

8, rue Auguste-Chabrières — PARIS (XV.).

(Tél. : Lecourbe 85-68.)

BOVCARDIAC LEFRANÇO

(Organozymothérapie cardiaque).

Composition. — Le *Bovcardiac* renferme par ampoule tous les ferments et principes solubles contenus dans 25 gr. de fibre musculaire de cœur de bœuf frais, concentrée à froid et dans le vide.

Propriétés. — Renforce la contractibilité du myocarde. Complète toutes les médications cardiaques.

Indications. — Asthénie cardiaque, irritabilité et instabilité, tachycardie, myocardite, asystolie, troubles cardio-pulmonaires, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc.; 2 à 3 ampoules buvables par 24 heures dans 1/2 verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse, pendant 10 jours.

Cures d'entretien : Même posologie, 3 fois par semaine. **Enfants :** demi-dose.

Laboratoires LEFRANÇO

36 à 46, av. de Metz. — ROMAINVILLE (Seine). (Tél. : Nord 19-52.)

BOVHÉPATIC LEFRANCQ

Composition. — Extrait Hépatique intégral et soluble sauvegardant le principe antitoxique du Foie.

Indications. — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémié.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses auto-toxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques.
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie, purpura.
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses. Forme sèche : Voir *Extrait Hépatique Lefrancq*.

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc. — 2 à 4 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau froide naturelle ou gazeuse. Demi-dose pour les enfants.

Laboratoires LEFRANCQ

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

BOVSTROL LEFRANCQ

Complexe organochimique.

Auxothérapie.

Composition :

Sulfate de Strychnine	1/2 mgr.
Glycérophosphate de Na	0,25
Suc Musculaire de bœuf cru à haute concentration glyciné et sucré	13 gr.

Propriétés. — Tonique musculaire et nervin, aliment de la cellule nerveuse, mais non excitant, reminéralisant.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, rachitisme, lymphatisme, neurasthénie, tuberculose, anémies de toutes natures, grossesse.

Présentation. — Coffret de 20 ampoules buvables de 10 cc. Boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc.

Posologie. — 2 ou 3 ampoules par jour pendant 10 jours, arrêter 10 à 20 jours entre 2 cures. Demi-dose pour les enfants à partir de 7 ans.

Nota. — Diluer chaque ampoule dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, vin de liqueur etc...)

Laboratoires LEFRANCQ

36 à 46 avenue de Metz — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

BRADYGASTRINE DUCLOY

Moderateur de la sécrétion gastrique.

Formes. — Granulé. — Comprimés.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-citrate trisodique-phosphate tricalcique-carbonate et bromure de calcium-magnésie calcinée-terre sigillée.

Propriétés thérapeutiques. — *Antinauséuses* par l'acide fumaro-protocétrarique et le citrate trisodique. *Neutralisantes* par la terre sigillée et la MgO. *Moderatrices de la sécrétion* par le phosphate et le bromure de calcium. *Dépourvues d'action excitante secondaire* grâce à la faible proportion de citrate trisodique : 5%.

Indications. — Toutes hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Contre-Indications. — Aucune. Même l'hyperchlorhydrie des cardia-rénaux.

Posologie. — Une dose : 1 cuillerée à café = 3 comprimés.

3 à 6 cuillerées à café de granulé à avaler à sec ou mieux avec une gorgée de liquide; ou 9 à 18 petits comprimés à sucer lentement.

Prendre une nouvelle dose : au bout d'un quart d'heure si l'action sédative n'est pas immédiate; au moment de la réapparition des douleurs si la sédation est passagère.

Ces doses moyennes peuvent être augmentées sans inconvénients et très rapidement si le soulagement se fait attendre. Une fois le soulagement obtenu, diminuer progressivement les doses, mais ne pas cesser brusquement.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée en cas de besoin.

Prix : 21 francs.

Laboratoires **DUCLOY et Cie**
ARQUES (Pas-de-Calais).

BROMÉINE MONTAGU

(Bromhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action sédative et analgésique, particulièrement puissante, sans brutalité par suite de l'union des qualités calmantes du Brome et de la Codéine.

Très efficace contre l'élément douleur, sans accoutumance et moins toxique que la plupart des sédatifs.

Indications. — Insomnies, Névralgies, Névrites, Toux nerveuses, Démorphinisation.

Formes pharmaceutiques. — *Ampoules dosées* 0,02 cgr, 19 fr. 50. — *Pilules* : 0,01 cgr. par pilule. Dose : 2 à 8 pilules par jour, 15 fr. 50; *Sirop* : 0,03 par cuillerée à soupe. Dose : 1 à 3 cuill. par jour, 19 fr. 50 — *Gouttes* : X à XXX gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée, 19 fr. 50.

Laboratoire **MONTAGU**

10, rue de La Barouillère · PARIS (6^e)
(Tél. : Suf. 36-59.)

BROMÉSÉRINE

Thérapeutique sédative des troubles fonctionnels digestifs cardio-vasculaires et neuro-glandulaires.

Composition. — La Bromésérine associe les bromures de Na et Ca, à dose réduite, au salicylate d'ésérine, médicament des *sympathicotoniés*.

Forme. — Comprimés dragéifiés, *stables*, dosés à 0 mmgr. 165 de salicylate d'ésérine par dragée.

Indications. — La Bromésérine exerce son action sédative, d'une façon constante, remarquable et rapide, dans :

Syndromes digestifs : ballonnement gastrique, somnolence, érythrose et constriction postprandiales ; dyspepsies nerveuses ; colites spasmodiques.

Syndromes cardio-vasculaires : solarites, battements aortiques, éréthisme, tachycardies, sympathoses pulsatiles.

Syndromes neuro-glandulaires : maladie de Basedow, hyperthyroïdie, anxiété, émotivité, irritabilité.

Posologie. — 2 comprimés au milieu de chacun des trois repas.

Le tube de 60 comprimés : 20 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié en sciences.

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

BROMIASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Bromure de potassium 0 gr. 30

Bromure d'ammonium 0 gr. 20

Levurine extractive 0 gr. 10

En flacons de 50 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle des bromures, mais sans bromisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère les bromures que dans le milieu alcalin de l'intestin. Préparation de dosage rigoureux, de conservation indéfinie et ne répugnant pas au malade.

Indications. — 2 à 12 capsules par jour; dans l'épilepsie, la chorée, l'hystérie, les névroses, les vomissements de la grossesse.

Prix : 34 fr. 30 pour 8 à 25 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

BROMICAL

Composition :

1° Ampoules pour injections intraveineuses :

Bromure de calcium	0 gr. 50
Gluconate de calcium	0 gr. 30
Sérum glucosé hypertonique (pH 5,7)..... Q. s. p.	10 cc.

2° Dragées :

Bromure de calcium	0 gr. 17
Gluconate de calcium	0 gr. 10
Arséniate de calcium	0 gr. 0002

Propriétés. — Action désensibilisante et anti-prurigineuse du bromure de calcium, action antispasmodique du calcium.

Indications :

Désensibilisant : Eczémas, Urticaire, Intolérances médicamenteuses et alimentaires, Accidents sériques, Asthme, Rhume des foins, Migraines.

Antiprurigineux : Tous prurits généralisés et localisés, Eczémas, Névrodermites, Maladies de Duhring.

Antispasmodique : Tous spasmes du tube digestif, Coliques utérines.

Régulateur du système neuro-végétatif : Insomnies, Convulsions, Épilepsies.

Posologie :

Ampoules.

Adultes : Série de 10 à 12 ampoules de 10 cc. Une injection tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants : De 5 à 15 ans : 3 à 5 cc. en injections.

Dragées.

Adultes : 4 à 8 dragées par jour.

Enfants : 6 à 15 ans : 1 à 4 dragées.

Présentation :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Flacon de 40 dragées.

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

BROMOCARBONE

Bromure de calcium	0,12
Charbon activé	0,15
Sucre anisé	Q. S. pour une tablette.

Propriétés :

Du charbon activé : absorbe l'air dégluti et les gaz de fermentation. Fixe les toxines circulant dans le milieu digestif.

Du bromure de calcium : sédatif nervin antispasmodique.

Indications. — **AÉROPHAGIE**, dyspepsies nerveuses. Troubles intestinaux secondaires à un mauvais fonctionnement de l'estomac.

Posologie. — 3 à 6 tablettes par jour, sucées ou dissoutes dans un liquide.

Présentation. — 18 à 20 tablettes par tube.

La boîte de 3 tubes : 17 francs.

Laboratoire LEURQUIN
DREUX

BROMOCODÉINE CHENU

Présentée sous la forme pratique de comprimés dragéifiés kératinisés, ne se dissolvant que dans l'intestin et par suite sans action irritante sur l'estomac.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Codéine	0,01	Aconit extrait.....	0,005
Belladone	0,01	Benzoate de soude	0,05
Terpine	0,05	Bromoforme spécial	0,10

Indications thérapeutiques. — Sédatif puissant de la toux (toux sèche, toux spasmodique et grippale, toux nerveuse, toux des tuberculeux).

Toutes les affections des voies respiratoires : bronchite aiguë et chronique, trachéite, laryngite, coqueluche, asthme et emphysème.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 4 à 6 comprimés par 24 heures. *Enfants :* au-dessus de 8 ans : 2 à 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni croquer avec une gorgée d'eau ou une tasse d'infusion.

Prix de la boîte de 30 dragées : 14 francs.

Laboratoire Thérapeutique du Centre,
J. CHENU, Pharmacien de 1^{re} classe,
Ancien Chef du Laboratoire de Pharmacologie,
Lauréat et diplômé d'Hygiène de la Faculté de Médecine de Lyon.
MONTFERRAND (Puy-de-Dôme). — Tél. : 45-01

BROMO-GARNAL

Sédatif nervin, Hypnotique.

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café :

Phényl-éthyl-malonylurée sodique	0,025
NaBr. chimiquement pur	0,25
Phosphoglycérate de Na	0,10

Indications. — Toutes névropathies : nervosisme, insomnie, excitation psychique, anxiété, épilepsie, convulsions de l'enfance, etc...

Avantages. — *Forme liquide* : action rapide et sûre, tolérance parfaite. Élimination totale, Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucun risque de toxicomanie. *Jamais de dépression consécutive. Ni goût* (après dilution) *ni odeur.* Ne contient ni sucre ni alcool.

Mode d'emploi. — Toujours dilué : eau (sucrée ou non), infusion, lait.

Posologie. — *Adultes.* Sédatif nervin : de 2 à 4 cuill. à café par jour, espacées. Hypnotique : 2 cuill. à café au coucher. Demi-dose pour les *enfants* au-dessus de 6 ans. Au-dessous de cet âge, X gouttes par dose et par année d'âge. De 2 à 4 doses par jour.

Prix : 15 fr. 60.

Enr. au L. N. C. M. n° 1888-2.

Laboratoire du **SIÈCLE**

13, rue Boïnod — PARIS (XVIII°).

BROMOGASTRINE VERGELOT

Sédatif et antispasmodique du système nerveux de l'adulte.

Composition :

Bromure de sodium	0 gr. 50
Extrait de belladone	0 gr. 01
Phényl-éthyl-malonylurée.....	0 gr. 005

pour une cuillerée à café.

Propriétés. — Antispasmodique et sédatif de l'éréthisme nerveux. — Hypnotique et calmant des affections douloureuses. Pas de bromisme.

Indications. — Troubles gastriques, douloureux des nerveux, Sténoses pyloriques, Pré-ulcères, Ulcères, Aérophagie douloureuse, Insomnies consécutives, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Présentation et mode d'emploi. — Granulés effervescents, n'irritant pas l'estomac.

Affections chroniques : une cuillerée à café dans de l'eau au milieu des deux grands repas.

Crises aiguës : une cuillerée à café ou deux dans une infusion de tilleul.
Ne pas l'employer chez les enfants.

Prix : 19 fr. 50 la boîte.

Laboratoires Ch. VERGELOT, Docteur en Pharmacie.

6, rue de Navarin — PARIS (IX°).

(Tél. : Trudaine 50-18.)

Enregistré au Lab. de Contrôle sous le N° 1236-2.

BROMOGÉNOL PÉPIN

Peptone bromée spéciale.

Forme. — Gouttes.

Doses et mode d'emploi. — XX gouttes de Bromogénol Pépin = 0 gr. 50 de Bromures métalliques. A prendre dans un peu d'eau ou d'infusion aromatique. Renouveler plusieurs fois.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique avec un faible poids de brome. Goût agréable. Tolérance parfaite. Préférable aux sirops bromurés et polybromurés.

Indications. — Toutes celles des Bromures métalliques : Affections du système nerveux, Insomnie, Hystérie, Convulsions, Epilepsie, Névralgies, etc.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 43-4.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

BROMO-MAGNÉSIUM

Du D^r J.-P. CLARY.

Composition. — $MgBr^2$ chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau.

Indications. — Toutes celles des composés bromurés halogénés et bromés organiques. Mieux toléré et plus actif à cause de l'action antispasmodique spécifique du magnésium.

En ampoules buvables, de conservation indéfinie.
Une ampoule : 1 gr. $MgBr^2$.

Posologie. — Suivant avis du médecin : 2 à 6 ampoules par jour.

La boîte de 20 ampoules : 22 francs.

Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS.

BROMOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe du *Brome* et d'une *Albumine* d'origine strictement *végétale*, sans aucune autre association médicamenteuse.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète du bromisme. Disparition de tous les inconvénients dus aux bromures dissimulés ou non. Aucune saturation de l'organisme. Absence de toute altération dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Médication donnant des résultats certains et permettant, si besoin, d'instituer un traitement intensif dans : tous états névropathiques, psychoses de toute nature, excitabilité, convulsions, épilepsies, insomnies, névralgies, spasmes et toutes affections relevant de la bromothérapie.

Posologie. — Chaque globule contient 2 cgr. de brome actif. Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme de bromure alcalin. *Enfants* : 2 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 15 globules et au delà par jour, en 2 fois, au début des repas.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Etablissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

Enregistré au Laboratoire national n° 213-1.

(Tél. : Gobelins 06-89.)

BROMONE ROBIN

Combinaison physiologique de *Brome*
et de *Peptone* trypsique.

Gouttes : XL gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. de bromure de potassium.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : XX à L gouttes. *Enfants* : X à XX gouttes.

A prendre en deux fois aux principaux repas dans un peu de boisson.

Propriétés thérapeutiques. — Non toxique, très assimilable. Ne fatigue pas le tube digestif. Pas de bromisme. Tolérance parfaite. Aucun mauvais goût.

Indications. — Excitabilité nerveuse, troubles de la femme, fatigues cérébrales, insomnie des vieillards, convulsions des enfants, hystérie, épilepsie.

Prix : 19 fr. 15.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

BROMOVOSE

Combinaison organique bromo-albuminoïde stable.

Propriétés thérapeutiques. — Grande affinité du brome pour les tissus, élimination beaucoup plus lente qu'avec les bromures alcalins, d'où action thérapeutique plus sûre et plus prolongée par imprégnation des centres nerveux.

Pas de phénomène d'accumulation, ni de bromisme. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — Insomnies. Excitabilité nerveuse. Palpitations cardiaques. Convulsions. Névroses. Épilepsie, etc.

Posologie. — XL gouttes à prendre 2 ou 3 fois par jour dans un peu de liquide.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS

(Tél. : Anjou 09-83.)

BROMURE DE CALCIUM

(Sirop Henry Mure, au)

Les convulsions de la première enfance, les coliques, les accidents et les douleurs de la dentition, l'agitation, l'insomnie, l'énervement.

Chez les enfants plus grands, le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium est le médicament qu'il faut donner contre les crises nerveuses, la Chorée, les toux nerveuses.

A donner aux enfants irritables, agacés, à ceux qui souffrent de névralgies, qui ont des colères sans motif et qui ne peuvent travailler sans être distraits. Rapidement leur caractère se transforme.

Ce sirop s'emploie aussi comme tonique.

Mode d'emploi. — Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium peut être administré sans danger dès la naissance jusqu'à la puberté.

La dose moyenne est de 2 à 3 cuillerées à café par année d'âge. En raison de l'innocuité du médicament et de la pureté du sel chimique qui entre dans sa préparation, cette dose peut être dépassée sans inconvénient.

Le sirop Henry Mure au Bromure de Calcium, d'un goût très agréable, se prend ordinairement pur. On peut aussi le donner dans du lait ou dans une infusion de tilleul.

Prix : 8 fr. 85

L. N. C. 428-4.

Laboratoires du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

BRONCHASMINE

Nébullisations buccales.

Spécifique préventif et abortif de la crise d'asthme. Résultat immédiat garanti, pas de contre-indication.

Composition. — Extrait pur de glandes surrénales stabilisé selon technique spéciale en liquide physiologique; ne contient ni alcaloïde, ni toxique, ni stupéfiant.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pulvérisations dans la gorge dès les premiers symptômes d'oppression suppriment radicalement et en quelques secondes la sensation d'étouffement.

Voir également *Garéphédrine, Diuréphédrine, Éphédrasmine.*

Prix :

Appareil avec liquide	50 fr
Flacon de rechange (pour plusieurs mois) . . .	16 fr.
Remise médicale 50 p. 100.	

Laboratoires F. SAUGIER

DOLE (Jura).

BRONCHIAL LUNA

Composition. — Gaïacol, Iodoforme, Camphre et Huile offic. Ampoules de 1 cc. et 5 cc.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour, en injections ou en lavements.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire du QUINA BOURCET

7, avenue du Doyenné — LYON
(Tél. : 25-35.)

BRONCHIVAX

Vaccin contre la grippe et les broncho-pneumonies

Ingérable.

Composition. — Vaccin polymicrobien et polyvalent préparé à partir de souches nombreuses comprenant le plus grand nombre possible de types et de variétés.

Indications. — Gripes et influenza sous leurs différentes formes, Complications grippales, Infections de l'appareil respiratoire aiguës ou chroniques : Bronchites, Bronchites chroniques, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Dilatation bronchique, Suppuration non spécifique du poumon, Infections rhino-pharyngiennes, Infections de la plèvre, Asthme, Emphysème.

Posologie :

Enfants : 1 ampoule par jour, le matin à jeun.

Adultes : 2 ampoules par jour, une le matin, une le soir leir des repas.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 5 cc.

Prix, la boîte : 20 fr. 40.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

BRONCHO FAVROT

Sirop actif, agréable.

Toux, gripes, bronchites.

Par cuillerée à soupe :

Ephédrine	0,01
Sulfogalacolate de K.....	0,40
Teinture Aconit.....	0,15
Teinture Drosera.....	0,15
Teinture Belladone	0,10
Eau laurier-cerise.....	0,20
Sirop Thébaïque.....	6
Elixir Garus.....	3
Excipient Q. S. pour	15 cc.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café.

Littérature et échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

L. MOREAU, Pharmacien.

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

BRONCHO-LACTOL

Composition. — Codéine; Teintures: Aconit et Belladone, Drosera et Grindelia; Tolu et Benjoin en nature, en suspension colloïdale.

Propriétés. — Balsamique énergique, calmant et diurétique remarquable.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires; Bronchites aiguës et chroniques, Tuberculose pulmonaire, Coqueluche, etc...

Présentation. — Émulsion pectorale de goût agréable d'Orgeat.

Deux formes { a. Simple : Affections aiguës des voies respiratoires.
b. Gaïacolé à 0,30 % ; suppuration chronique du poulmon.

Aucune intolérance.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à potage par jour.
Enfants : par cuillerées à café, suivant l'âge, pur ou pour sucrer lait ou infusion.

L. N. C. M. n° 338-1.

Laboratoire du BRONCHO-LACTOL

6, place de l'Académie — ANGERS.

BRONCHOPHILOS

Sirop pulmonaire.

Particulièrement actif dans l'état grippal.
Neutralise les crachats muco-purulents, grâce à ses peptones sélectionnées.

Composition :

Peptone, Lactophosphate de Chaux, Gaïacol, Codéine, Teinture Lobélie, Teinture Aconit, Teinture Belladone, Décoction de Tolu.

Présentation :

Flacon 210 cc. Prix : 12 fr. 50.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 10 à 15 ans, 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 4 à 10 ans, 3 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 1111-3.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

BRONCHOPNEUMOL

Le *Bronchopneumol* est un sirop pectoral pour enfants, renfermant : Benzoate de soude, Bromure de sodium, Citrate de soude, Eau distillée de laurier-cerise, Extrait d'Aunée Dausse, Extrait de Bourrache Dausse, Extrait de Capillaire Dausse, Extrait de Châtaignier Dausse, Teinture de Drosera Dausse, Sirop d'Eucalyptus, Sirop de Désessartz, Sirop de Tolu.

Indications. — Médicament de choix des affections des voies respiratoires des *enfants*, de la bronchite, de la coqueluche, de la laryngite, de la toux.

Propriétés thérapeutiques. — Le succès du *Bronchopneumol* vient de l'introduction dans sa composition, outre les produits classiques, de :

- a. Extrait d'Aunée, qui diminue l'hyperexcitabilité laryngo-pharyngienne et par conséquent la fréquence de la toux ;
- b. Extrait de Bourrache, sudorifique et diurétique ;
- c. Citrate de soude, dont l'action antiviscosante réduit la tendance à l'hépatisation.

Posologie. — *Nourrissons* : 1 à 2 cuillerées à café ; de 2 à 4 ans : 3 à 5 cuillerées à café ; de 5 à 8 ans : 3 à 5 cuillerées à dessert ; de 9 à 12 ans : 3 à 4 cuillerées à soupe.

Laboratoires DOLADILLE
à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
(Tél. : 69.)

BRONCHORECTINE

Suppositoires contre la toux, sans créosote et sans toxiques.
Sédatifs, tonicardiaques, antiseptiques.

Composition. — Héléanine, Essence de serpolet, Camphre, Cinnamate de benzyle, Eucalyptol, Carbonate de gaïacol.

Avantages. — Tolérance parfaite, aucune irritation rectale, aucune toxicité, calme la toux, soutient le cœur. Aseptise et désodorise le poumon.

Indications. — Toutes affections pulmonaires aiguës ou chroniques : Grippe, Bronchites, Pneumonies, Asthme, Emphysème, Bacillose, Rougeole, Scarlatine, etc... Action très favorable dans la coqueluche (3 suppositoires par 24 heures).

Contre-indications. — Aucune. Chez les chroniques, peut-être employée en cures prolongées.

Présentation. — *Trois formes* : adultes, enfants, nourrissons.

Posologie. — 2 à 3 par 24 heures.

Prix : Adultes : 19 fr. Enfants et nourrissons : 16 fr. 50

Laboratoires BONCOUR
46, rue de Saint-Mandé — SAINT-MAURICE (Seine).

BRONCHOSÉDOL

Forme. — Solution aromatisée à l'élixir de Garna.

Formule. — Chaque cuillerée à soupe contient :

Galacol.....	0,105
Terpine	0,26
Benzoate de Na.....	0,05
Codéine	0,0075
Acide salicylique.....	0,015
Biphosphate de Chaux	0,15

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et sédatif puissant des affections broncho-pulmonaires. Cicatrisant, récalcifiant.

Indications. — Gripes, Rhumes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhes, Tuberculose et toutes affections broncho-pulmonaires.

Mode d'emploi. — De 3 à 5 cuillerées à soupe par jour, pur ou dans un peu d'infusion.

Pour les enfants : par cuillerée à café ou à dessert suivant l'âge.

Prix : 13 fr. 50. — **Durée du traitement :** 4 à 5 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

BRONCHOSEPTOL-LAURIAT

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptise les bronches et les voies respiratoires. Calme la toux, facilite l'expectoration : fluidifie les sécrétions et tarit le catarrhe des muqueuses bronchiques.

Indications cliniques. — Toutes affections broncho-pulmonaires, rhumes, grippe, bronchites, catarrhes, trachéites, broncho-pneumonie, toux des tuberculeux, gazés de guerre.

Composition. — Chaque comprimé renferme :

Poudre de Dover codéinée (Opium 0,01 remplacé par Codéine 0,01).....	0,10
Bromol (Tribromophénol).....	0,02
Extrait d'Aconit (titré Codex).....	0,0025
Extrait de Belladone (titré Codex).....	0,005
Terpine.....	0,05
Benzoate de soude.....	0,10
Enrobage au gluten et au baume de tolu.....	0,33

Forme et avantages. — Comprimés glutinisés se dissolvant seulement dans l'intestin, pratiques à emporter. Dose uniforme. Volume réduit. Aucune saveur désagréable. Absence de sucre, donc recommandé aux diabétiques. Conservation indéfinie.

Mode d'emploi. — *Adultes :* 4 comprimés par jour et 2 dans la nuit s'il y a lieu.

Enfants : au-dessus de 8 ans : demi-dose.

Avaler sans sucer, ni croquer.

Prix : 13 fr. 85.

Laboratoires LAURIAT

L.A. GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

BRONCHO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Lysat polyvalent (B. diphtériques, Streptocoques, Pneumocoques, Staphylocoques, B. de Pfeiffer, M. Catarrhalis, Colibacilles).

Indications. — *Enfants, adultes, vieillards* : Grippe, Bronchites profondes, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonies (Rougeole, Coqueluche, Diphtérie), Vaccination pré-opératoire et Accidents pulmonaires post-opératoires, Suppurations pleuro-pulmonaires non fétides.

Posologie. — Première injection de 1/2 cc., les suivantes : 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Nourrissons, enfants, adultes, mêmes doses. (Voir VACLYDUN.)

Présentation. — En boîtes de 8 ampoules de 1 cc. (8 jours.

Prix : 43 francs.

La demi-boîte : Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

BRONCOSOL

Spécifique des affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Le Broncosol ne se présente que sous la forme de comprimés, chaque comprimé renferme : Codéine, 0 gr. 015 ; Extrait d'aconit, 0 gr. 01 ; Extrait de belladone, 0 gr. 01 ; Terpène, 0 gr. 10 ; Thiocol, 0 gr. 05 ; Ipéca pulvérisé, 0 gr. 02.

Action thérapeutique. — Hypnotique puissant, calmant nerveux, modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant parfait, régulateur des actes respiratoires.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 5 ou 6 comprimés par 24 heures.

Enfants de plus de 10 ans : 2 ou 3 comprimés par 24 heures.

Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer, de préférence dans l'intervalle des repas et au moment des crises.

Prix : 13 francs la boîte de 20 comprimés.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 158-3.

Laboratoires CH. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 87-05.)

BRONCUROL

Dragées glutinisées.

Composition. — Chaque dragée contient :

Créosote	0 gr. 05
Gluconate de chaux.....	0 gr. 10
Terpine	0 gr. 03
Extrait de grindelia	0 gr. 02
Extrait de drosera	0 gr. 01
Extrait de lobélie	0 gr. 002

Action. — Anticatatarrhale, antiseptique et cicatrisante par la créosote ; tonique et récalcifiant par le gluconate de chaux ; antispasmodique et expectorante par drosera, grindelia, lobelia ; sédative des sécrétions bronchiques par terpine.

L'enveloppe de gluten se dissolvant seulement dans l'intestin en présence du liquide pancréatique, la créosote ne se trouve pas en contact avec la muqueuse stomacale.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires ; toux, catarrhes, bronchites chroniques, grippe.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 dragées par jour de préférence aux repas.
Enfants au-dessus de 6 ans : 1 dragée matin et soir.

Prix du flacon : 15 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Lab. 26-47.)

BRONPHELIA

Sirop éphédro - benzothlocolé.

Antiseptique - Cicatrisant - Calmant.

Composition. — Chlorhyd. éthylmorphine ; Chlorhyd. éphédrine ; Teinture digitale ; Teinture aconit ; Teinture belladone ; Benzoate soude ; Sulfo-gaïacolate de potasse ; jus de cassis ; Baume de tolu.

Indications. — Trachéo-bronchite, Catarrhes, Coqueluche. Laryngite, Pharyngite, Asthme, Toux nerveuses, Coryza aigu.

Présentation. — Flacon de 250 cc. Prix : 17 francs.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants de 8 à 15 ans : 3 à 4 cuillerées à dessert, par 24 heures.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. n° 1111-11.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

BROSÉYL

Médication antinerveuse.

Forme pharmaceutique et composition. — *Dragées* à base de *brome colloïdal* associé aux *Ethers du Bornéol* et suc *frais* de Valériane. (Flacon de 60 dragées.)

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs *sans déprimer*, régît et discipline le système nerveux. Tonique et non toxique, le BROSÉYL n'a aucun des inconvénients et additionne tous les avantages des bromures, valérianates et albumines bromées.

Indications. — Neurasthénie, épilepsie, insomnie nerveuse, névralgies, palpitations cardiaques, asthme nerveux, troubles de la puberté et de la ménopause, etc.

Mode d'emploi. — 1° *Sédatif*, 6 dragées par jour dans le courant de la journée.

2° *Contre l'insomnie*, 4 à 6 dragées en une seule fois, avec une infusion avant de se coucher.

Dragées à avaler sans croquer.

Prescription. — Un flacon BROSÉYL FALVY.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès Sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 18-26.)

BRUZARINE

Farine lactée, maltée, vitaminée.

Goût exquis sans cacao.

Caractéristiques. — Aliment biologiquement complet, contenant tous les éléments nécessaires au développement normal et progressif des enfants, spécialement étudié au point de vue des vitamines de croissance et d'utilisation nutritive.

Propriétés. — Entièrement digestive et assimilable dès le Premier Age, augmente la valeur nutritive du lait. Favorise la dentition, prépare et facilite le sevrage.

Ne constipe pas. Régularise les selles.

Indications. — Aliment de choix des enfants dès l'âge de six mois, aliment de régime dans : sous-alimentation, retard de croissance, constipation. Aliment de Régime des adultes.

Suraliment des vieillards et des convalescents.

Particularités. — Par sa préparation spéciale dérivée d'un biscuitage préalable dans des fours appropriés, BRUZARINE subit, dans sa constitution, un commencement de transformation qui la rend éminemment digestible et en fait un aliment parfait.

Prescriptions. — Habituer progressivement l'enfant à une nouvelle alimentation, commencer par une cuillerée de BRUZARINE par jour, et progresser peu à peu pour arriver à la quantité indiquée sur le mode d'emploi imprimé sur la boîte.

Mode d'emploi. — BRUZARINE se prépare à l'eau, au lait frais, sec ou condensé.

En cas d'intolérance lactée, BRUZARINE se prépare à l'eau, au bouillon de légumes ou de céréales.

Prix : La boîte de 375 grammes : 9 fr. 50

La boîte de 1 kg. : 24 francs.

Laboratoire E. LATOUR

Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

BUCCASEPTYL

Bain de bouche, Gargarisme, Solution inaltérable.

Composition. — Hydrocinnamate de Stovaine (brevet français n° 789-156 du 2 avril 1935), Chloral-Antipyrine-Phénosalyl-Chloroforme-Borate de soude-Glycérine-Essence de menthe spéciale.

Indications thérapeutiques. — Fumeurs, Haleine fétide, Pharyngites, Angines de toutes natures, Abscès de l'amygdale, Ozène, Stomatites simples ou ulcéreuses, Aphtes, Muguet, Gingivites, Pyorrhée, Carie dentaire, Périostite, Abscès dentaires, Accidents de la dent de sagesse, Soins post-opératoires.

Posologie:

Hygiène buccale: 1 cuillerée à café pour un verre d'eau bouillie chaude.

Bains de bouche, Gargarismes: Action antiseptique: 1 à 2 cuillerées à café pour un verre d'eau bouillie chaude.

Action sédative et anesthésique: doubler les doses.

Grands lavages: 3 à 4 cuillerées à soupe pour un litre d'eau bouillie.

Topique local: Solution employée pure pour toucher les ulcérations.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix au public: 12 fr. 25; triple modèle: 25 fr. 25.

Laboratoires du BUCCASEPTYL et du PURGAREX

R. WALTER, pharmacien, ex-chef de laboratoire de la F. M.

17, Avenue Charles Lambert, CHATOU (Seine-et-Oise.)

BUCMINE

Composition. — Formine de pureté absolue, complètement indolore, buchu stabilisé. Benzoate de lithine, extrait d'Orthosiphon stamineus.

Formes et doses. — Granulés de saveur agréable, 2 à 4 cuillerées à café. Comprimés à 0 gr. 50, 2 à 4 par jour.

Indications. — Affections des voies biliaires et urinaires. Uricémie infantile. Irritation de l'épithélium urinaire. Maladies infectieuses. Infections entéro-rénales post-grippales.

Prix: 17 fr. 25.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS. Aut. 71-98.

BUFOX

Composition. — Ampoules injectables à base de Venin de Crapaud (décret du 19 juin 1937).

Action générale. — Par son action puissante sur le sympathique et les glandes endocrines, il réveille la force médicatrice de l'organisme et constitue ainsi la médication du « terrain ».

Indications. — Elles sont la conséquence des 5 propriétés physiologiques du venin de crapaud :

Action toni-cardiaque; action vaso-constrictive; action sur le sympathique et les glandes endocrines; action hémostatique; action analgésique.

Posologie. — 1 ampoule de 2 cc. en injection intra-musculaire, tous les 2 jours pendant toute la durée du traitement.

Comme hémostatique (hémoptysies, métrorragies) : 2 à 3 injections de 1 ampoule de 2 cc. chaque jour.

Présentation. — *Ampoules injectables* : Boîte de 8 ampoules (trait. de 1/2 mois) : 75 francs. — *Ampoules buvables* : Boîte de 12 ampoules (trait. de 1/2 mois) : 32 francs.

CARBO-BUFOX

Pommade contenant le produit de la carbonisation des crapauds. Cicatrise les ulcérations (néoplasiques, variqueuses, affections cutanées, eczéma). Elle est le traitement local complémentaire du traitement général injectable par le Bufox.

Le tube : 39 francs.

Laboratoires du BUFOX

21, rue de la Grange-aux-Belles — PARIS (Tél. : Nord 16-06.)

BULGARINE THÉPENIER

Culture pure de Ferments lactiques bulgares sur milieu végétal.

Formes. — Bouillon, comprimés, poudre et gouttes.

Indications thérapeutiques. — Entérite muco-membraneuse, gastro-entérite (des nourrissons et de l'adulte). Diathèse goutteuse, Constipation, Diarrhée, Entérite tuberculeuse, Infections hépatiques (d'origine intestinale). Dysenterie, Dermatose, Furunculose, Prophylaxie de la Fièvre typhoïde et du Choléra. *Poudre* : Rhinites, Ozènes, Stomatites, pansement des Plaies.

Modes d'emploi. — *Adultes* : Sucrer 2 comprimés ou boire un verre à madère de Bouillon ou prendre 20 gouttes dans un peu d'eau sucrée, 4 fois par jour, 1/2 heure avant le repas.

Enfants : Demi-dose.

Saupoudrer, insuffler ou priser la Poudre.

Prix : La boîte ou flacon : 13 fr. 40.

Le flacon de gouttes : 17 fr. 10.

**Laboratoire des Ferments
du Docteur A. THÉPENIER**

10, rue Clapeyron — PARIS

R. C. Seine 150-854. — (Tél. : Europe 58-97.)

BULGATROPINE-BULGADONE

Cure Bulgare pratique
du parkinsonisme postencéphalitique,
 par les alcaloïdes totaux de la racine de belladone
 exotique, bien tolérée et très efficace.

Composition. — *Bulgatropine* : vin bulgare stable,
 à 5 p. 100 de racine de belladone exotique.

Bulgadone : solution rigoureusement titrée à 0,50
 p. 100 des alcaloïdes de cette racine.

Indication majeure. — *Parkinsonisme* post-
 encéphalitique, à tout âge et à tout degré, sauf
 déficience excrétoire rénale (hyperazotémie, etc.).

Mode d'emploi. — Cesser toute autre médication
 belladonnée ou similaire. Administrer, en progres-
 sion lente et régulière, loin des repas, XL, L,
 LX gouttes et jusqu'à 3 cuillerées à soupe par
 jour de *Bulgatropine*, ou bien IV, V, VI et jusqu'à
 LX gouttes par jour de *Bulgadone*.

Prix. — *Bulgatropine* normale à 5 p. 100 :

Petit flacon de 125 cc. 15 fr.

Flacon de 250 cc. 25 fr.

(Ce flacon dure un mois pour un malade d'atteinte
 moyenne.)

Bulgadone, gouttes concentrées (*Bulgatropine* 100 p.
 100) :

Flacon de 15 cc. (représentant 300 cc.

Bulgatropine) 25 fr.

Flacon de 60 cc. (représentant 1 200 cc.

Bulgatropine) 60 fr.

Les gouttes *Bulgadone* présentent les avantages
 suivants :

Titre rigoureux ;

Peu de gouttes à compter pour l'administration des
 prises ;

Transport peu onéreux ;

Economie importante.

Produits enregistrés au L. N. C. M.

sous les n^{os} 1643-1 et 1643-3.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur ROURE-GUIOT

23, rue Louis-Astruc — MARSEILLE,

(Tél. : Gar. 55-28.)

BUXEMA

Pour le traitement des Affections de la peau.

Propriétés thérapeutiques. — Action calmante et cautérisante. Supprime les démangeaisons. Fait disparaître rougeurs et croûtes. Reconstitue l'épiderme. Convient à tous les cas d'irritation de la peau.

Composition. — Baume du Pérou, Goudron de Houille lavé, Oxydes de Zinc et de Titane, Menthol, Peroxyde de Zinc, Acide Orthoxybenzoïque, Essence de Thym.

Indications. — *Chez le nourrisson :* Eczéma, Rougeurs, Erythème fessier.

Chez l'enfant et l'adolescent : Dartres, Impétigo, Boutons.

Chez l'adulte : Eczémas professionnels ou accidentels. Toutes Dermatoses, y compris Ulcères.

Mode d'emploi. — Etendre une couche de BUXEMA sur la lésion et recouvrir de gaze hydrophile. Renouveler le pansement chaque jour. Enlever la pommade avec un tampon de coton imbibé d'huile d'amandes douces.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1687-I.

Prix : Le tube : 10 francs.

Laboratoire du BUXEMA

J. AVRIL, Pharmacien,

18, rue Thiers — MANTES-GASSICOURT (Seine-et-Oise).

C. 40

Principes actifs. — *Ampoules* : oléates doubles de Cu et Mg ; *Comprimés* : Silicates sod., pot. et Mg.

Indications. — Cancers et tumeurs malignes.

Formes :

C. 40 Injectable. — Boîtes de 10 ampoules 10 cc. et 2 ampoules début 5 cc.

C. 40 Comprimés. — Flacons de 120.

Doses :

Ampoules. — 3 à 5 séries de 12 à raison d'une ampoule par jour. Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy.

Comprimés. — 2 comprimés midi et soir, pris en mangeant.

Traitement renouvelable dans le courant de l'année.

Prix : 62 fr. 25 la boîte d'ampoules.

27 fr. 50 le flacon de comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

(Tél. : 32.)

CACHETS CHARVOZ**Digestifs.**

Composition. — Noix vomique, Colombo, Badiane, Gentiane, Rhubarbe, Aloès, Benzo-naphthol, Carbonate de chaux lavé, Bicarbonate de soude.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères.

Posologie. — Un cachet avant ou après chaque repas, suivant prédominance des symptômes hypoacides ou hyperacides.

Prix : La boîte de 36 cachets : 15 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 80-1.

Laboratoires CHARVOZ

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV°).

CACHETS LEKMA

Association végétominérale agissant dans les troubles du métabolisme du soufre et dans les cas de déminéralisation avec déficience hépato-biliaire.

Composition. — Soufre colloïdal ; Calcium et magnésium assimilables ; Boldo ; Levure de bière.

Indications. — *Dermatoses Prurigineuses* : Eczémas, Acné, Prurits, Anaphylaxie, Urticaire, accidents sériques, Ulcérations infectées, Ulcères variqueux.

Posologie. — Un cachet matin, midi et soir au milieu du repas.

Prix : 18 fr. 20 la boîte de 36 cachets.

Enr. au L. N. C. M. n° 978-1.

Laboratoire GUIN
à CONTRES (Loir-et-Cher).

CACHETS PACHAUT

(Cachets de santé.)

Propriétés thérapeutiques. — Laxatifs, cholagogues, ne provoquant ni coliques ni selles diarrhéiques. Rééduquent l'intestin.

Composition :

Alpha :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15

Gamma :

Extrait de cascara.....	0,25
Agar-agar.....	0,20
Bicarbonate de soude	0,15
Belladone	1 centigramme.

Mode d'emploi. — De 1 à 4 cachets par jour à prendre de préférence au début du repas du soir.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires THOMAS
33, faubourg Montmartre — PARIS.
(Tél. : Provence 49-77.)

CACHETS DU D^r RICHOMME

Composition :

Phényl-diméthyl-pyrazolone	0,40
Diméthylamino-Antipyrine	0,10
Poudre d'ovaire	0,02
Carbonate de chaux précipité.....	0,10
Cascara sagrada pulvérisé.....	0,10

Pour un cachet.

Propriétés. — Régulateur des règles, sédatif utéro-ovarien.

Indications. — Dysménorrhée douloureuse, douleurs intermenstruelles.

Posologie et mode d'emploi. — A. Au moment des règles : 1 ou 2 cachets par jour dans un verre d'eau de Vichy ou une tasse de tisane.

B. En cas de douleurs intermenstruelles : 1 cachet, suivant le besoin.

Présentation et prix. — 12 fr. 50 la boîte de 6 cachets.

Laboratoires **RICHOMME**

29, boulevard Voltaire — PARIS

(Tél. : Roquette 42-74.)

CACHETS SPÉVIN

Cure rationnelle d'amalgrissement.

Ni iode, ni produits opothérapiques. Aucun produit chimique nocif.

Indications. — Obésités simples, Obésités avec hypertension, avec manifestations dites « arthritiques » (Migraines, Asthme, Urticaire, Rhumatisme, Goutte).

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie intestinale. Assure le bon fonctionnement des voies digestives et des reins, maintient la force et l'activité.

Composition. — Chlorure de magnésium, Charbon végétal pulv., Cascara sagrada, Lactose, Quassia amara, Ergostérine irradiée (Vitamine D).

Présentation. — Cachets. Plusieurs numéros :

Cachets Spévin n° 5, formule normale.

Cachets Spévin n° 1, plus forts que n° 5.

Cachets Spévin n° 10, diurétiques.

Cachets Spévin n° 4, contenant en plus un purgatif (jalap).

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : La boîte de 15 cachets : 29 fr. 45.

— La boîte de 50 cachets : 81 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-1.

Laboratoires des produits **L. CHAUVIN**

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaug. 21-10.)

CACODYLE GONNON

Au Cacodylate de soude pur corrigé par le
procédé Hélier.

Présentation et composition :

<i>Sirop</i> : Cacodylate de soude (2 cgr. par cuill. à soupe) associé à un sirop iodophosphaté tannique spécial (Sirop de Lovel).....	Prix public. 16 fr.
<i>Vin</i> : 2 cgr. de Cacodylate de soude et 20 cgr. de phosphoglycérate de chaux, soude et potasse.....	16 fr. 20
<i>Granules</i> : 2 cgr. de Cacodylate de soude.....	10 fr. »
<i>Ampoules</i> : 5 à 10 cgr. par cc.....	10 fr. 50
<i>Gouttes</i> : 1 cgr. par V gouttes.....	10 fr. »

Propriétés thérapeutiques. — Toujours bien toléré, permet d'administrer l'arsenic à haute dose et pendant longtemps, sans craindre les inconvénients des composés minéraux de l'arsenic. Excitant de la nutrition et modérateur nervin.

Indications. — Affections pulmonaires, anémie profonde, chlorose, scrofule, impaludisme, psoriasis, et tout état cachectique.

Posologie :

Sirop : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Vin : 3 à 6 cuill. à soupe par jour.

Granules : 3 à 6 par jour.

Gouttes : V à XV gouttes par jour.

Ampoules : 1 par jour.

Durée moyenne d'une unité de vente :

Sirop : 5 jours. — *Vin* : 8 jours.

Granules : 25 jours. — *Gouttes* : 45 jours.

Ampoules : 10 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON,

(Tél. : Franklin 36-80.)

CACODYLINE JAMMES

Médication cacodylique intensive indolore.

Enfants : Cacodyline A. 10 cgr. Cacodylate de soude (1 cc.). Cacodyline B : 20 cgr. Cacodylate de soude (2 cc.).

Adultes : Cacodyline C, 30 cgr. (3 cc.). Cacodyline D : 50 cgr. (3 cc.). Cacodyline E : 1 gr. (3 cc.).
Magnésio-Cacodyline, Cacodylate de soude : 30 cgr. Chlorure de magnésium : 20 cgr. (3 cc.).

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

Indications. — Anémies, Asthénie, Tuberculose, Prétuberculose, Syphilis, Maladies de la peau.

Prix public : 26 francs.

N^{os} d'enregistrement : Cacodyline A. B. C., n° 603 1-1 ; D, n° 603 1-2 ; E, n° 603 1-3. Magnésio-Cacodyline, n° 603-4.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

CADIOR

du D^r E. MAIGRE

Composition. — Mélange, dépourvu de soufre, de sels complexes organo-métalliques, dans lequel l'or ajoute son action antibacillaire et antiseptique à celle de l'iode catalysé par le cadmium.

Tolérance parfaite, assurée par la présence de strontium et de calcium.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules (5 cc.) pour injections intraveineuses ou intramusculaires, et boîtes de 50 ampoules, réservées aux dispensaires et aux hôpitaux.

Indications :

Maladies aiguës : Grippe, Complications broncho-pulmonaires des infections non staphylococciques.

Maladies chroniques : Tuberculoses, Mycoses, Rhumatismes, Lèpre, Emphyseme, Asthme, Lupus non exedens, Convalescences traînant, Amaigrissements de cause indéterminée.

Mode d'emploi. — Deux injections intraveineuses ou intramusculaires par semaine.

Pour technique du traitement, voir la notice, qui sera adressée sur demande.

Laboratoire du CADIOR

19, rue Clapeyron — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 58-67.)

CAFÉINE GRANULÉE HOUDÉ

Granulé titré à 2 p. 100.

10 cent. de caféine pure par cuillerée à café.

Propriétés. — Tonique nervin et musculaire. Diurétique énergique (sans céphalées). Toni-cardiaque, action vaso-dilatatrice sur les artères coronaires. Eupnéique puissant.

Indications. — Efforts intellectuels et sportifs, Névralgies, Dyspnées pulmonaires, Anorexie, Convalescence. Toni-Cardiaque d'appoint. A associer aux barbituriques dans l'épilepsie.

Posologie. — 2 cuillerées à café par jour (maximum 4), matin et midi. (Pas le soir, pour éviter l'insomnie.)

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

CALCIBRONAT

Bromo-galactogluconate de Calcium.

Combinaison bromo-calcique associant en un seul médicament les effets sédatifs du Br et du Ca à dose efficace. Agissant aussi bien sur le système nerveux central que sur le système nerveux organo-végétatif. Bien toléré; à dose normale, n'amène pas de bromisme, pas de troubles gastriques ou intestinaux, pas d'éruptions cutanées, pas d'action dépressive.

Indications. — Indications de la médication Bromée et Bromurée.

Formes et Posologie :

Comprimés effervescents dosés à 0,45 de Brome: 1 à 4 p. j.

Granulé dosé à 0,45 de Brome par cuillerée à soupe : 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Ces doses peuvent être augmentées et au maximum doublées dans des cas particuliers.

Ampoules de 10 cc. (renfermant par ampoule 0 gr. 186 de Brome) et de 5 cc. (dose de Br. moitié moindre) : 1 ampoule de 10 cc. tous les 2 jours, 1 amp. de 5 cc. tous les jours. Voie intraveineuse ou intramusculaire.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIGÉNOL

**Phosphate tricalcique en suspension colloïdale
(avec mouvements browniens).**

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 18 fr. 15 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

CALCIGÉNOL IRRADIÉ

**Phosphate tricalcique en suspension colloïdale
(avec mouvements browniens)**

et « Vitamine D » cristallisée.

(450 unités internationales par cuillerée à potage.)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 21 fr. 35 le flacon.

Pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis

COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

CALCIGLANDINE

**Effet complexe de régulation
sur les fonctions de croissance.**

Composition. — La dose quotidienne unique comporte, pour 1 cuillerée à dessert de poudre aromatisée, stabilisée : 2 cgr. de Thyroïde (dose régulatrice) ; 5 mgr. de Vitamine B ; 1 gr. de Gluconate de Calcium auxquels sont associés, à doses actives *per os* : Hypophyse (0,10), Surrénale (0,10), Thymus (0,50).

Indications. — Retard et troubles du développement physiologique et psychique de l'enfant, Rachitisme Lymphatique, Spasmophilie, Cryptorchidie, Déficience intellectuelle, Nervosisme, Énurésie.

Mode d'emploi. — Quel que soit l'âge de l'enfant, la dose unique, nécessaire et suffisante est de :

1 cuillerée à dessert arasée par jour,

loin d'un repas, délayée dans un peu de liquide.

Traitement à suivre 10 à 20 jours par mois.

Prix : 40 francs.

— LABORA —

F. ARNAL, Docteur en pharmacie,
et **H. THÉVENIN**, Ex-Interne des hôpitaux de Paris,
Place de la Poissonnerie — TOULON.

CALCILÈVE

(Carbonate de chaux Lancosme)

Présentation. — Boîte métal renfermant du Carbonate de chaux précipité à froid, de très faible densité et de saveur très agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant de l'acidité gastro-intestinale, anti-acide et adsorbant.

Indications. — Entéro-colite acide, diarrhée de fermentations, diarrhée saisonnière et des pays chauds. Médicament de choix complémentaire du traitement spécifique des amibiases chroniques intestinales, troubles digestifs des gros mangeurs, fétidité des selles, déviations du péristaltisme intestinal, hyperkinésie gastrique, régurgitations, pyrosis.

Posologie et mode d'emploi. — *Sauf prescription spéciale du médecin* : Mettre 2 à 3 cuillerées à café dans un verre d'eau ou une tasse de tisane, attendre 7 à 8 minutes en agitant de temps en temps et absorber une heure avant les repas ou au moment des crises douloureuses.

Le CALCILÈVE (Carbonate de chaux Lancosme) est d'une innocuité absolue, il n'y a aucun inconvénient à doubler les doses ci-dessus indiquées.

Prix : 10 fr. 70. (Traitement de 15 jours.)

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 17-46.)

CALCILINE

Forme. — Comprimés, granulé.

PURE

Phosph. de chaux tric.....	0,35
Carbonate de chaux léger..	0,07
Fluorure de calcium.....	0,005

ADRÉNALINÉE

Phosph. de chaux tric....	0,35	Phosph. de chaux tric....	0,35
Carbonate de chaux léger..	0,07	Carbonate de chaux léger..	0,07
Fluorure de calcium.....	0,005	Fluorure de calcium.....	0,005
		4 gouttes solut. Adrénal. au 1 000 ^e .	

Par comprimé ou demi-mesure de granulé,

IRRADIÉE

Os frais épiphysaire.....	0,05	Lait sec irradié.....	0,10
Vitamine D cristallisée...	0,0005	Levure de bière pulv.....	0,10

Par mesure de granulé.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Maladies des os, Croissance, Convalescence, Grossesse, Carie dentaire.

Doses. — *Calciline pure et calciline adrénalinée* : 2 comprimés ou une mesure (granulé) dans un peu d'eau avant les deux principaux repas, 20 jours par mois. *Calciline irradiée* : Enfants : 1 à 2 mesures de granulé à croquer par jour. Adultes : 4 mesures.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 69-13.)

CALCIOCHOLINE

Composition. — Chlorhydrate de choline, Gluconate de calcium, Glycérophosphates de soude.

Indications. — *Tuberculose* dans toutes ses manifestations cliniques et sous toutes ses formes. *Prétuberculose* où la *Calciocholine* donne des résultats constants.

Présentation. — Discrète (le mot tuberculose ne figurant pas sur les conditionnements), en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Une ampoule intramusculaire profonde tous les jours ou tous les deux jours. Peut être faite aussi en injections intraveineuses sans avoir aucun choc à redouter et sous-cutanées (ces dernières parfois douloureuses).

Aucune contre-indication.

La boîte, prix au public : 27 fr. 50.

Laboratoires de l'ANALPYRINE

M. BERTRAND, Pharmacien

NOMEXY (Vosges).

CALCIO-DYNAMYL

Le plus pur gluconate de calcium français, le mieux assimilable, en solution à 10 p. 100 de Ca.

Parfaitement toléré par voie endoveineuse et intramusculaire. Les comprimés (à croquer), très agréables au goût, remplacent avantageusement les solutions de chlorure de Ca. Aucune contre-indication.

Indications :

En médecine générale : Amaigrissements, Asthénie, Tuberculose pulmonaire, osseuse, viscérale et ganglionnaire. Troubles nerveux, Tétanie, Anxiété, Neurasthénie, Hémorragies, États hémorragiques.

En chirurgie générale : Préparation aux interventions chirurgicales. Convalescence post-opératoire.

En oto-rhino-laryngologie : Otospongiose. Surdité. Préparation aux amygdalectomies. (Indication particulière pour les comprimés.)

En ophtalmologie : Toutes les hémorragies opulaires. En particulier les hémorragies rétinienues du vitré et post-opératoires, les lymphémas, les troubles et corps flottants du vitré.

En obstétrique : Utile à toutes les femmes enceintes, le Calcio-Dynamyl est très indiqué chez celles qui supportent mal la grossesse.

Formes :

Ampoules pour injections intraveineuses et intramusculaires en 5 et 2 cc. (boîtes de 12 ampoules), et en 10 cc. (boîtes de 6 ampoules).

Comprimés à croquer en boîtes de 32 comprimés.

Posologie : Une injection quotidienne ou tous les deux ou trois jours, selon l'avis du médecin.

4 à 6 comprimés comme récalcifiant, 8 à 16 comprimés comme anti-hémorragique.

J.-B. DUPEYROUX, Pharmacien

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

95, rue Lecourbe — PARIS (XV^e). (Tel. : Suffren 27-13.)

CALCIONAL

Ion Calcium Stabilisé.

Deux formes :

Comprimés sans goût. — Ampoules indolores.

1 comprimé = 25 cgr. de CaCl^2 naissant libéré au contact de l'eau et des sécrétions digestives.

1 ampoule = 1 milligramme de calcium ionisé, injectable par la voie sous-cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Celles du chlorure de calcium sans aucun de ses inconvénients.

Indications. — A titre préventif et curatif (hémorragies et états hémorragipares, albuminuries, réactions sériques tardives, spasmophilies, tétanies, décalcifications, asthénies).

Doses :

Comprimés : Nourrissons : 1 à 2 par jour. — Enfants 2 à 4 par jour. — Adultes : 5 à 8 par jour.

A faire dissoudre dans l'eau sucrée.

Ampoules : Enfants (2 à 10 ans), 1 tous les 2 jours. — Adultes, 1 tous les jours.

Boîtes de 6 amp. ou de 60 compr. Prix : 17 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte-90 — PARIS.)

CALCIPAÏNE

Cachets digestifs.

Indications. — *Toutes dyspepsies.*

Atonie gastrique. Ptose gastrique. Gastralgie.

Hyper et Hypochlorydrie.

Formule :

Charbon suractivé.....	0,15
Bicarbonate de Soude.....	0,15
Magnésie hydratée.....	0,15
Fluorure de Calcium.....	0,03
Papaïne extractive.....	0,20
Poudre Noix Vomique.....	0,10

pour un cachet

Posologie. — Un cachet à la fin des deux principaux repas avec une tasse d'infusion chaude.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

CALCIUM 30

Gouttes.

XXX gouttes = 1 cc. = 1 gr. de *Calcium* exprimé en *Chlorure de Ca* cristallisé, soit :

0,90 de chlorure de calcium cristallisé

0,20 de gluconate de calcium.

Posologie. — *Selon avis médical. Doses moyennes :*

XV à XXX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée ou de préférence dans un *jus de citron*.

Actions recalciifiante, antispasmodique, coagulante, anti-albuminurique, anticlasique, déchlorurante.

Prix : 20 francs, le flacon de 50 cc.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1781-3.

Laboratoire du CALCIUM 30

299, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 82-89.)

CALCIUM CORBIÈRE

Composition :

Solution de gluconate de chaux pur à 10 p. 100.

Présentation :

En ampoules de 5 cc. par boîte de 12 et 24 ampoules.

En ampoules de 10 cc. par boîte de 6 et 12 ampoules.

En ampoules de 2 cc. (infantile), boîte de 12 ampoules.

Propriétés. — Tuberculose pulmonaire et extra-pulmonaire, Rachitisme, Rhumatismes, Fractures, Hémoptysies, Hémorragies gastriques, intestinales, rénales, Pleurésies, Ascite, Diarrhée des tuberculeux. Associé au traitement par l'or, le Calcium Corbière atténue les accidents d'intolérance.

Emploi. — Indifféremment en injections intraveineuses ou intramusculaires, indolores.

Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours.

Pas de contre-indication à l'emploi.

Prix de la boîte : 22 fr. 50 et 35 francs.

CALCIUM CORBIÈRE en tablettes effervescentes

Chaque tablette renferme 0 gr. 27 de Ca pur. 1 tablette trois fois par jour, matin, midi et soir.

Enfants : 1/2 tablette trois fois par jour.

Prix : la boîte de 28 tablettes : 18 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. (Tél. : Carnot 78-11.)

CALCIUM INJECTABLE FRAISSE

Formule :

Gluconate de Calcium	0 gr. 50
Soluté isotonique.....	5 cc.

Indications. — Médication recalcifante par activation des diastases oxydantes. Précieuse dans les affections pulmonaires, chroniques, la tuberculose, les affections cardio-rénales, les hémoptysies. S'injecte indifféremment par voie intramusculaire ou voie intraveineuse.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Posologie. — Une injection tous les deux jours et plus si c'est nécessaire.

Prix : 18 fr. 35 la boîte.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils.

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

CALCIUM-PLÉ

Composition. — Gluconate de Calcium pur en solution aqueuse, stable, à 10 p. 100, suractivé par le Magnésium glycérophosphorique (2 p. 100) et par le Manganèse glycérophosphorique (0,02 cgr. p. 100).

Indications. — Anti-choc et spasmosédatif, Récalcifant, Diurétique, Tonique neuro-musculaire, Anti-infectieux, Auro et Arséno-solvant.

Formes. — *Ampoules* (de 5 cc. ou de 10 cc.) injectables par voie endo-veineuse ou intramusculaire (indolore sans anesthésique). *Poudre* (goût agréable).

Posologie. — Une injection tous les 2 jours ou chaque jour. 2 cuill. à café de poudre par 24 heures.

Prix : La boîte de 10 ampoules de 5 cc. ou bien de 5 ampoules de 10 cc. : 26 fr. 50. Poudre : 16 fr. 30.

Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie
111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).
(Tél. : Archives 83-52.)

CALCIUM ROSSO

Ex-Glucobiocalcium Rosso.

Solution Isotonique à 10 p. 100 de Gluconate de Calcium.

Par injections intraveineuses et intramusculaires.

Le Calcium Rosso est un sel organique de l'Acide Gluconique qui possède toutes les propriétés de l'ion Ca et contient 9,3 de Calcium correspondant à 12,80 de CaO. Ce sel permet l'administration de fortes doses de Calcium sans intolérance ni réactions locales ou générales.

Le métabolisme du Calcium a été, dans ces dernières années, l'objet de profondes études scientifiques, et tous les auteurs sont unanimes à proclamer, d'une façon formelle, la nette supériorité du Gluconate de Calcium sur les Chlorures et tous les sels de Calcium avec anion inorganique.

L'excellente action physiologique du Gluconate de Calcium, démontrée par une longue série d'expériences bien conduites, a porté très rapidement à une vaste application thérapeutique dans le *système neuro-végétatif, maladies anaphylactiques, tuberculose, dans l'action hémostatique, récalcifiante et corroborante (inflammation et certaines maladies infectieuses)*.

Par voie veineuse, hypodermique et *per os*, l'administration du Gluconate de Calcium est suivie d'une augmentation du Calcium sanguin. Ce fait démontre que le Ca est directement assimilé et constitue une source d'ions calciques apte à une parfaite nutrition de la cellule. La solution physiologique contenant du Gluconate de Calcium remet en activité le cœur des grenouilles arrêté par le moyen acalcique.

Posologie. — *Traitement d'attaque, à dose massive :* de 1 à 3 ampoules de 10 cc. tous les jours, par injections intraveineuses ou intramusculaires.

Traitement d'entretien : 1 ampoule de 10 cc. tous les jours, en injections intraveineuses ou intramusculaires.

Enfants : de 2 à 5 cc. tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours.

Présentation et prix :

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. pour les enfants : 22 fr. 25.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 25 fr.

Pour Sanatorium, Hôpitaux et Cliniques, conditionnement en vrac en boîtes de 50 ou 100 ampoules de 2, 5, 10 et 20 cc.

Per os, deux formes : *Granulé* : 25 fr. ; *Sirop* : 22 fr. 25

Agréé par le Conseil supérieur de santé du ministère de la Marine.

Expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Blochimiques ROSSO

Laboratoire CLÉVENOT ET ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor. 56-38.)

« CALCIUM-SANDOZ »

Composition et propriétés. — *Glucono-galacto-gluconate de Calcium* pour les ampoules, les comprimés eff., le sirop ; *gluconate de Ca* pour les autres formes.

Injection intraveineuse sans inconvénients. Injection intramusculaire profonde indolore.

Formes. — Ampoules à 10 et 20 p. 100 ; Poudre granulée (sans sucre). Comprimés effervescents ; Tablettes chocolatées ; Sirop.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule de 5 ou de 10 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Voie gastrique : par jour, 3 cuillerées à café de poudre granulée ou trois fois 2 tablettes chocolatées, ou encore deux fois 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz »

Sirop : 1 cuillerée à soupe deux à trois fois par jour.

Enfants : 1 ampoule de 2 ou de 5 cc. tous les jours ou tous les 2 à 3 jours.

Voie gastrique : par jour, 2 à 3 cuillerées à café de poudre granulée ou trois fois 1/2 à 1 tablette chocolatée, ou bien deux fois 1/3 à 1 comprimé effervescent. « Calcium-Sandoz » Sirop : 1 cuillerée à café ou à dessert deux à trois fois par jour selon l'âge.

PRODUITS SANDOZ, B. Joyeux,
Docteur en Pharmacie,
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALCIVITAM

Composition. — Solution de Chlorure de calcium dans des jus de fruits naturels (1 gr. par cuillerée à soupe).

Propriétés thérapeutiques. — Toutes celles du chlorure de Calcium, suractivées par les jus de fruits. Tonicardiaque, reconstituant, anti-hémorragique, stimulant de l'appétit, déchloration, adjuvant précieux dans l'accouchement.

Indications. — Hypocalcémie, chlorurémie, prévention d'hémorragie, d'inertie cardiaque ou utérine.

Mode d'emploi. — Se recommande par son goût agréable qui le fait accepter facilement.

De 1 à 4 cuillerées à soupe par jour suivant les cas.

Prix : 19 fr. 15, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

CALCOLÉOL

à base d'huile de foie de morue *concentrée et solidifiée*, contrôlée biologiquement sur sa teneur en vitamines A et D, de vitamine B et de sels de calcium et de fer.

Propriétés thérapeutiques. — Avitaminoses, assimilation défectueuse du calcium.

Indications. — Rachitisme, Troubles de croissance, Spasmophilie, Maladies infectieuses et contagieuses, Gastro-entérites, Déminéralisation (tuberculose, grossesse, allaitement).

Forme. — En dragées glutinisées inaltérables, sans odeur, forme la plus pratique de prise de l'huile de foie de morue et en granulés très friables pour les enfants de tous âges.

Dose et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 dragées ou 2 cuillers à café de granulés avant ou pendant chacun des trois principaux repas, à avaler.

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : *Dragées et Granulés* : 17 fr. 75.

Pour 10 jours de traitement.

Laboratoires des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

CALCOMAGNÉSIE

Comprimés à croquer sans addition de liquide. Médication antidyspeptique, neutralisant stomacal.

Indications. — Gastralgie avec douleurs et brûlures. Spasmes douloureux de la région stomacale. Fermentations et acidités gastriques. Aérophagie et dilatations gazeuses. Troubles digestifs d'origine nerveuse ou émotive.

Emploi et doses. — Croquer 3 ou 4 comprimés au moment des crises douloureuses, sans addition d'aucun liquide.

La **Calcomagnésie** ne renferme aucun produit toxique et peut être ordonnée aux enfants.

Prix : 15 francs.

Durée moyenne : 15 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande :

Laboratoire d'Hygiène et de Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

CALCOZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition. — Association de ferments digestifs : pancréatine, maltine, lab-ferment, avec un sel de calcium.

Mode d'action. — Chez les insuffisants digestifs et hépatiques, la Calcozymase réalise dans l'estomac une digestion artificielle et complète l'action de la Prézymase. (Voir *Prézymase*.)

Indications. — Tous les accidents dus à une sensibilisation quelconque : urticaire, asthme, arthropathies d'origine anaphylactique, accidents de la goutte, du rhumatisme, etc...

Mode d'emploi. — Deux à trois dragées au milieu de chaque repas.

Prix : 20 francs.

(20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal — PARIS (XIII^e).

(Tél. : Glacière 24-48.)

CALGLUQUINE

Anoïennement « QUININE-CALCIUM-SANDOZ »

Combinaison de Gluconate de quinine et de « Calcium-Sandoz ».

Indications. — Pneumopathies aiguës, grippe, rhumatisme, pyrexies. Accès paludéens.

En obstétrique, comme ocytocique. Fièvre puerpérale.

En chirurgie : prophylactique des affections respiratoires.

Posologie. — Moyenne : *Adultes* (voie intramusculaire ou endoveineuse) : 1 ampoule de 10 cc. par jour.

Par voie veineuse, il convient de tâter la susceptibilité du malade avec de faibles doses avant de recourir à la posologie normale.

En obstétrique, comme ocytocique : 2 à 4 cc. à la fois. Si nécessaire, après une à deux heures, injecter de nouveau 2 cc., une à deux fois, par la voie intramusculaire.

Enfants (voie intramusculaire) : jusqu'à 3 ans, 1 cc. par jour.

De 3 à 6 ans, 2 à 3 cc. par jour. Au-dessus de 6 ans, 5 cc. par jour.

Formes. — Ampoules de 2 cc., 5 cc. et 10 cc. pour injections intramusculaires et endoveineuses. Une ampoule de 10 cc. contient 0 gr. 60 de gluconate de quinine (corresp. à 0 gr. 37 de quinine basique anhydre) et une solution de « Calcium-Sandoz » à 10 p. 10^e.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

CALMABY

Composition. — Cachets de Calomel porphyrisé.
Lycopode. S. N. Bismuth et Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Active la fonction hépatique, combat la cholémie. Indiqué dans le Rachitisme tardif, les Infections intestinales, les Ulcérations stomacales. Peut servir comme cure d'entretien. Augmente la tolérance mercurielle ou iodée. Réussit dans l'AÉROPHAGIE.

Mode d'emploi. — Un cachet le matin à jeun et le soir au coucher, 15 à 20 jours par mois.
Comme désinfectant intestinal, 3 à 5 cachets par jour pendant quelques jours.

Prix 20 fr. 10 la boîte de 30 cachets.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 45-18.)

Préparateur des SUPPOGLANDINES

CAL-MAG-NA

Forme. — Poudre neutralisante de l'hyperacidité gastrique légèrement aromatisée.

Composition. — Sous-gallate et sous-carbonate de Bismuth, carbonate de Magnésium, Bicarbonate de soude, carbonate de Calcium, Kaolin colloïdal.

Action thérapeutique. — Neutralisation de l'hyperacidité et sédation des troubles gastriques qui en résultent. Action rapide et prolongée, sans formation d'acidité secondaire ni de gaz. Ne constipe pas. Aucune toxicité.

Indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsie, gastralgies, pyrosis, aigreurs, flatulence, atonie gastrique, aérophagie, ulcus gastrique et duodénal, vomissements et nausées de la grossesse.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau. Si nécessaire, renouveler la dose toutes les 2 ou 4 heures.

Prix : 19 fr. la boîte.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 150-4.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérout, Dr en Pharm., 13, rue Pagès — SURESNES (Seine)

(Tél. : Longchamp 16-85 — 16-86.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES

CALMARINE

Régulateur le plus parfait des dystonies neuro-végétatives, Antispasmodique et analgésique. Médication par excellence de la nausée, de l'anxiété et des phénomènes spasmodiques de toute nature.

Indications. — *Etats nauséeux*: Toutes crises résultant d'un déséquilibre vago-sympathique.

Aérophagie, Vomissements incoercibles de la grossesse, Anxiété, troubles nerveux.

Mal de mer, Mal de train, mal d'auto, mal d'avion, mal de montagne. Insomnie. Crises douloureuses comme celles de cholécystite par exemple (indication particulière pour les suppositoires).

Composition. — *Belladone* (Antispasmodique et modérateur des sécrétions).

Adrénaline (Tonicardiaque, antidépressive, antitoxique et antinauséeuse).

Cratægus (Sédatif du système nerveux cardiaque et vasculaire).

Phényl-Ethyl-malonyl-urée (Antispasmodique, sédatif du système nerveux).

Ergot de Seigle (Sédatif du sympathique).

Chlorh. de diméth.-amino-benzoyl-pentanol (Analgésique).

Présentation. — Deux formes : comprimés, suppositoires.

Posologie. — *Adultes*: 3 comprimés par jour jusqu'à cessation des troubles, suivant avis du médecin. Au moment des crises 3 comprimés ou 1 à 2 suppositoires. *Enfants*: 1 à 2 comprimés ou 1 suppositoire.

Laboratoires de la CALMARINE

J.-B. Dupsy roux, Pharmacien, Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
95, rue Lecourbe — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 27-13.)

CALMINAL

Cachet antinévralgique et antirhumatismal, d'action analgésique rapide et intense.

Pour le traitement de toutes les affections douloureuses : Migraines, Céphalées, Névralgies : faciales, dentaires, maux de tête. Rhumatismes, Grippe, Fièvres, Insomnies (ainsi que les troubles de la menstruation).

Formule, 1 cachet contient :

Diméthylaminophényldiméthylpyrazoloniédiéthylmalonylurée.....	0 gr. 40
Monobromhydrate de quinine	0 gr. 10
Guarana Paullinia sorbilis	0 gr. 25
Excipient, Q. S. pour	1 gr. 00

Le **Calminal** réalise l'application thérapeutique des plus modernes conceptions pharmaceutiques sur l'action des substances à effet analgésique. Il manifeste un effet particulièrement rapide et intense contre toutes les affections douloureuses, *quelles qu'en soient les origines*, sans provoquer de phénomènes secondaires toxiques.

Le **Calminal** possède également un effet antithermique et antirhumatismal qui en élargit considérablement le champ d'action.

L'usage en est recommandé pour tous les états fébriles, douleurs musculaires de nature grippale dues aux refroidissements et également contre les phénomènes douloureux d'origine nerveuse : céphalées, brûlures, entorses, fractures, etc.

Posologie. — De 1 à 4 cachets par jour. Un seul cachet de **Calminal** est suffisant pour éliminer toutes les algies *quelles qu'en soient les causes*.

La dose habituelle est de 1 cachet, dose qui peut être éventuellement répétée une heure après. Il est recommandé de faire suivre l'absorption du cachet par une boisson chaude.

Non toxique, très bien toléré, d'une action extrêmement rapide.

Prix : la boîte de 12 cachets : 12 francs.
Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd.

Produits Biochimiques ROSSO
Laboratoire CLÉVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

Tél. : Dor. 56-38.

CALMOBRO-NIEL (ex KALMOBROL)

(Spécialité absolument française.)

Composition. — Extrait de bouillon bromure liquide à base de bromure de sodium très pur.

Doses. — 1 cuillerée à café = 1 gr. de bromure de sodium.

Indications. — Tous les cas les plus divers d'Excitation nerveuse (Insomnie, Neurasthénie, etc., etc.)

Mode d'emploi. — Verser dans une tasse d'eau très chaude le nombre prescrit de cuillerées à café. On obtiendra immédiatement un délicieux bouillon que l'on absorbera bien chaud, soit au début du repas, soit à n'importe quel moment de la journée.

Prix : 18 francs, le flacon de 34 doses.

Laborat. S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

O. CHAMARD et R. NIEL

Ex-Inspecteur des pharmacies. Docteur en pharmacie.

3, rue Royet — LYON-CALUIRE.

(Tél. : Burdeau 23-31.)

CALMOCARDINE LAGOUTTE

Composition et forme. — Comprimés dragéifiés à base de :

Sulfate de quinine.....	0,05
Phényléthylmalonylurée.....	0,005
Sulfate de spartéine.....	0,01
Bromure de camphre.....	0,025
Extr. mou de cratægus.....	0,15
Extr. mou de passiflora.....	0,015
Extr. mou de valériane.....	0,015

Actions thérapeutiques. — Sédatifs des fibres musculaires et du système nerveux.

Spécifique des palpitations.

Indications. — Palpitations de cœur de toutes origines, Eréthysme cardiaque, Arythmie extrasystolique, Douleurs de l'angine de poitrine, Anxiétés cardiaques des névrosés et des surmenés.

Mode d'emploi. — Une dragée tous les 1/4 d'heure jusqu'à quatre, puis toutes les heures jusqu'à huit par jour.

Prix de la boîte de 50 comprimés : 23 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours A.-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35).

CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone, Extrait thébaïque, Camphre, Extrait d'anémone, Extrait d'hamamélis, Chlorhydrate de para-amino-benzoyl-diéthyl, Amino-éthanol, Onguent hydrargyrique double, Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blennorragies aiguës, cystites aiguës, blennorragies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE
81, rue Réaumur — PARIS (II^e).
(Tél. : Central 37-91.)

CALMOSUPPOS SÉDATIFS

Extrait Belladone, Jusquiame, Piscidia, Analgésine.

Insomnies, Convulsions, Hémorroïdes, Prostatites, Règles douloureuses, Coliques hépatiques, néphrétiques, Ante et post-partum, etc. 1 à 3 par 24 heures.

3 dosages :

Bébés (1 à 5 ans) — Enfants — Adultes (au-dessus de 15 ans)
Boîte de 6.

CALMOSUPPOS ANTITHERMIQUES

	3 dosages	Bébés jusq. 5 ans	Enfants 5 à 15 ans.	Adultes
Bromhydrate de quinine ..		0 gr. 035	0 gr. 07	0 gr. 10
Sulfate de quinine		0 gr. 065	0 gr. 13	0 gr. 20
Pyramidon		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Phénacétine.....		0 gr. 05	0 gr. 10	0 gr. 20
Caféine		0 gr. 005	0 gr. 02	0 gr. 05

Pour un suppositoire.

Tous les états fébriles, un matin et soir.

Boîte de 6 :

Enregistrés au Lab. de Cont. des Médicaments sous les n^{os} 100, 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Échant : Laboratoires des CALMOSUPPOS
MONTGUYON (Charente-Inférieure).

CALMOVARINE

Suppositoires analgésiques et sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocaïnum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat. Aucune toxicité. Aucune irritation pour les tissus. Administration facile. Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovaires, Dysménorrhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokystiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux. Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorrhagie, Cystite, Prostatite, Affection de l'appareil urinaire chez l'Homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum, tous les matins ou tous les soirs, un Suppositoire suivant avis du médecin.

Cas très douloureux : Un suppositoire matin et soir.

Laboratoire CALMOVARINE

81, rue Réaumur — PARIS (II^e). Central 37-91.

CALSÉDINE

Composition. — Produit à base de Ca, Mg et Phosphore.

Ne renferme aucune substance toxique : ni barbituriques, ni alcaloïdes. Pas de Bromures.

Action. — Hypnotique ou sédatif suivant les doses et le mode d'emploi.

Elle calme, en ne faisant intervenir que les ions minéraux de l'organisme. Elle fait dormir en utilisant un mécanisme naturel du sommeil.

Doses. — **Sédation nerveuse :** 1 à 2 comprimés 2 ou 3 fois par jour aux repas, ou une cuillerée à café de granulés pour un comprimé.

Somnifère : 4 comprimés à la fois (1 comprimé par 17 kg. de poids du sujet) 20 minutes environ avant l'heure habituelle du sommeil dilués dans un peu d'eau, ou de liquide légèrement alcoolisé, bière, eau rouge, etc.

Si cette dose n'est pas suffisante, l'augmenter ou, s'il y a réveil avant la fin de la nuit, renouveler la même dose.

Indications. — Tous les états d'irritabilité nerveuse, toutes les insomnies dites nerveuses ; surmenage cérébral, génital ; excitations émotives, inquiétudes, angoisses ; excitation due au thé, café, tabac, alcool, etc.

Spasmes avec prédominance de l'élément névropathique.

Entéronévrose spasmodique, coelialgies ; Pollakiuries où prédominent facteurs nerveux ou réflexes.

Dans les prurits, d'origine nerveuse, les bouffées congestives de la ménopause ; dans les poussées hypertensives de l'hypertonie artérielle ; dans certains spasmes rythmiques du sommeil.

D'une façon passagère, la **Calsédine** diminue la fréquence du pouls et abaisse les deux tensions maxima et minima.

Prix : 17 fr. 65 le tube de 50 comprimés.

Prix : 18 fr. 65 la boîte de granulés.

Laboratoire GERDA

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

CALYPTOL-CHARPENTIER

Dispersion aqueuse d'Eucalyptol à 20 p. 100.

AMPOULES :

2 cc. et 5 cc. Strictement intra-musculaires.
1 à 2 ampoules par jour.

Formule :

Eucalyptol 1 gr.
Ethylsulfate de soude 0 gr. 02
Excipient eau distillée 5 cc.

Les ampoules de 5 cc. diluées dans 30 cc. d'eau peuvent être administrées en *lavement*.

La boîte de 6 ampoules : 15 francs et 18 francs.

SUPPOSITOIRES :

Adultes. — *Enfants.* — *Nourrissons.*
2 à 3 par jour.

Formule. — Beurre de cacao et Eucalyptol pur dispersé (1 gr., 0 gr. 50 ou 0 gr. 25).

La boîte de 10 suppositoires : 18 francs et 15 francs.

SIROP :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Formule. — Eucalyptol pur dispersé et sirop d'amandes.

Le flacon : 15 francs.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, Trachéites, Congestions pulmonaires, Pneumonies et Broncho-pneumonies. Suppurations bronchiques et pulmonaires, Abscès du poumon, Gangrène pulmonaire, Dilatation des bronches, Asthme et Emphysème, Grippe, Rougeole, Coqueluche.

Toutes affections des voies respiratoires.

Laboratoire E. CHARPENTIER

7, rue du Bois-de-Boulogne — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Passy 55-46.)

CALYPTOPHÉDRYL

Forme. — Sirop.

Composition :

Camphosulfonate d'éphédrine naturelle....	0 gr. 07
Camphosulfonate de soude.....	0 gr. 15
Essence d'eucalyptus déterpénée.....	0 gr. 05
Essence de menthe déterpénée.....	0 gr. 025
Racine aconit.....	0 gr. 10
Drosera.....	0 gr. 50
Grindelia.....	0 gr. 50
Sulfo-gaïcolate de potasse.....	2 gr. 50
Propanone.....	2 gr. 50
Benzoate de soude.....	1 gr.

Sirop de sucre. Q. S. pour 100 cc.

Indications. — Asthme, coqueluche, emphyseme, grippe, bronchite aiguë et chronique, pneumonie, toux spasmodiques, et toutes les affections des voies respiratoires.

Posologie. — Enfants : 3 cuill. à café (à partir de 3 ans).
Adolescents : 3 cuillerées à dessert.

Adultes : 3 cuillerées à soupe par 24 heures.

Prix au public : 19 fr. 25.

Enr. au L. N. C. M. n° 598-12. *Diffusion strictement médicale*

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

CAMFORMINE

(Camphosulfonate d'Hexaméthylène-Tétramine.)

Composition. — Résulte de la combinaison d'une molécule d'acide camphosulfonique avec une molécule d'Hexaméthylène tétramine.

Corps chimiquement défini, cristallisable, soluble dans l'eau, solution à 10 p. 100.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant tonique du cœur, action diurétique, anti-infectieuse, rétablit la tension, règle les mouvements intestinaux.

Indications. — Spécifique de toutes défaillances cardiaques : choc nerveux ou opératoire, syncopes, infections, hémorragies, cardiopathies, fléchissement sénile.

Est particulièrement indiquée dans les endocardites infectieuses, gripes, infections puerpérales, typhoïdes, pneumonies, chocs quelle qu'en soit la cause.

Présentation. — Doses : Ampoules de 2 cc., de 5 cc. et de 10 cc.

Injection intramusculaire ou intraveineuse de 2 et de 5 cc. et plus, suivant les indications. Pas de contre-indications. Pas d'intolérance.

Action rapide et puissante.

Solution à ingérer. — Dans les affections chroniques, les convalescences, chez les vieillards : 100 à 120 gouttes en trois fois dans la journée

Prix :	{	Ampoules de 2 cc., la boîte de 10	16 fr. »
		Ampoules de 5 cc., la boîte de 10	21 fr. 30
		Ampoules de 10 cc., la boîte de 4	18 fr. 15
		Gouttes, le flacon.....	16 fr. »

Laboratoire ARMORIL

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 53-70.)

CAMPHOCALYPTOL

Indications. — Affections pulmonaires et maladies infectieuses. Grippe et complications, *Coqueluche*, Bronchites aiguës, chroniques, *abcès du poumon*, Pneumonie, Tuberculose, Accidents pulmonaires anesthésiques.

I. CAMPHOCALYPTOL INJECTABLE

Ampoules de 2 cc. Ampoules de 5 cc.

Camphocalyptol simple non gaïacolé.

Une ampoule de 2 cc. contient :

Goménol, Eucalyptol	5a	0 gr. 10
Camphre		0 gr. 20
Acide phénique		0 gr. 01
Excipient huileux spécial.....		Q. S.

Camphocalyptol gaïacolé.

Même formule avec, en plus, gaïacol, 0 gr. 10.

Une ampoule de 5 cc. contient :

Formule simple, formule gaïacolée : mêmes doses $\times 2,5$.

Emploi. — En injections intramusculaires profondes ; par jour : 1 cc. à 5 cc. et plus selon âge et gravité. Le Camphocalyptol s'emploie aussi en lavements : une ampoule dans lait ou huile tièdes.

Boîte 10 ampoules de 2 cc. ou 6 de 5 cc. 19 fr. 60

— 6 ampoules de 2 cc..... 13 fr. 05

II. CAPSULES DE CAMPHOCALYPTOL

A base de : codéine, éphédrine, eucalyptol camphré, terpinol. Capsules glutinisées : de 3 à 6 par jour *avant* les repas.

Le flacon pour 7 jours environ : 15 fr. 30.

III. SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

Adultes, Enfants, Nourrissons.

<i>Suppos Adultes</i>	Créosote éteinte	0,25
	Eucalyptol, Camphre.....	0,05
	Stovaïne	0,005

Suppos Enfants : le tiers environ de ces doses.

Suppos Nourrissons : le quart.

Un suppositoire matin et soir ou plus.

Supposit^{res} adultes, enfants, nourrissons : la b^{te} 18 fr. 35.

L. N. C. n^{os} 314.38 et 39 ; 314.41 à 314.43.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

CAMPHODAUSSÉ

(Camphre soluble dans l'eau.)

(Camphosulfonate de soude.)

Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. titrées à 10 % de camphre en solution aqueuse. Même posologie que l'huile camphrée. Action plus rapide grâce à sa facile résorption. Injection bien tolérée et ne provoquant pas les réactions locales dues au véhicule huileux.

Indications. — Stimulant cardiaque dans l'*adynamie* et au cours des *maladies infectieuses*. Son emploi est particulièrement recommandé dans les cas de *collapsus cardiaque imminent*, où il est nécessaire d'agir vite.

Formes: a) Camphodausse.

b) Camphodausse spartéiné.

Mode d'emploi. — 1 à 10 cc., une ou plusieurs fois par jour, par voie *hypodermique* ou *intramusculaire*. Le Camphodausse simple peut être injecté par voie intraveineuse également.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

CAMPHOGÉNINE

Analeptique en solution isotonique de :
Campho-sulfonate de soude,
Sulfate de spartéine et formiate de tétraméthyl-ammonium.

Ce sel, récemment introduit dans la thérapeutique, possède une triple action : Cardiotonique, Neurotonique et stimulante des fonctions endocriniennes.

L'action sur le cœur a une grande analogie avec celle de la Caféine, du Strophantus, de la Strychnine ; elle est aussi constante et sûre, mais moins brutale, et son emploi est indiqué :

En cas d'urgence : dans toutes défaillances.

En cures prolongées : dans toutes dépressions.

La Camphogénine, un complexe d'un emploi extrêmement fréquent, facile, effectif, inoffensif, dans :
 Toutes maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, toutes anémies, asthénies, atonies, cardiopathies, dépressions générales, nerveuses ou organiques, convalescences.

Indications thérapeutiques. — Cardiotonique d'action rapide sur le cœur et la circulation ; Stimulant des fonctions organiques des centres nerveux et respiratoires, ainsi que des sécrétions endocriniennes, Insuffisances cardiaques, Colapsus, Lypothymies, Cardiopathies, Anémies, Asthénies, Déficiences organiques et endocriniques, Neurasthénies, Maladies infectieuses, Tuberculose pulmonaire, Prophylaxie des accidents opératoires.

Posologie. — La Camphogénine s'emploie en injections sous-cutanées, intramusculaires, à la dose journalière de une ampoule *pro die* selon les indications du médecin traitant et les techniques habituelles.

L'injection est indolore et ne donne lieu à aucune réaction.

Présentation et prix :

Boîte de 12 amp. de 2 cc. : 22 fr. 25.

Boîte de 12 amp. de 5 cc. : 31 fr. 80.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd.

Produits Biochimiques ROSSO
Laboratoire CLÉVENOT et ROSSO
 3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).
 (Tél. : Dor. 56 38.)

CAMPHO-PNEUMINE

Antiseptique des voies respiratoires.

Formule :

Gaïacol.....	0,10
Niaouli	0,10
Eucalyptol	0,10
Phénol	0,02
Camphre	0,20
Huile. Q. S. pour.....	2 cc.

La *Camphopneumine* apaise la toux, soulage la dyspnée, renforce la défense de la muqueuse bronchique et raréfie les sécrétions.

Présentation-doses. — 1° **AMPOULES** de 2 cc. pour injections intramusculaires. Boîtes de 12 ou boîtes de 6.

Adultes : 1 à 2 ampoules par jour.

Enfants : 1/2 à 1 ampoule par jour.

2° **SUPPOSITOIRES** : 1 à 2 par jour (boîtes de 10).

Indications. — Gripes, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, coqueluches, infections secondaires chez les tuberculeux.

Enregistré au L. N. C. n° 535, 49-55 et 56.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Comprimés.

Composition. — Chaque comprimé contient 10 cgr. de Campho-Sulfonate de Spartéine.

Indications. — Palpitations, insuffisances cardiaques, Asthénies cardio-vasculaires. Dyspnées d'origine cardiaque et respiratoire. Mal de montagne et mal d'avion.

Forme. — Comprimés.

Posologie. — 2 à 5 comprimés par 24 heures au début des repas ou au moment des malaises. Avaler les comprimés sans les sucer ni les croquer. Durée de traitement : 10 jours.

Prix : 16 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-13.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

16, boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

(Tél. : Car. 45-62).

CAMPHO-SPARTÉINE DUBOIS

Gouttes et ampoules

Composition. — Solution de Campho-sulfonate de Spartéine.

Trois formes :

- 1° *Simple*. 1 amp. et XX gouttes = Spartéine 0,04 — Camphre 0,06.
 2° *Caféinée*. 1 amp. et XX gouttes = Form. simples + Caféine 0,05.
 3° *Strychninée*. 1 amp. et XX gouttes = Form. simples + Strychnine 0,0005.

Indications. — 1° *Cures d'amorçage* dans les Asystolies, notamment dans celles se compliquant de dilatation auriculo-ventriculaire et d'insuffisance cardiaque;

2° *Traitement d'urgence* dans les défaillances du myocarde et des crises hypotensives;

3° *Cures d'entretien* des états hyposystoliques et hyposphyxiques;

4° *Cures alternées* avec les cardiotoniques usuels chez les cardiaques rénaux.

Formes. — Gouttes et ampoules 2 cc.

Posologie. — *Gouttes* : XX à LX par 24 heures.

Ampoules : 1 à 4 par 24 heures (voie cutanée ou intramusculaire).

Leur injection est indolore.

Durée de la cure d'entretien (gouttes) : 3 semaines.

Prix : 17 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 238/3 et 238/4.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

16, boulevard Péreire, PARIS (17^e). — (Tél. Car. 45-62.)

CAMPHOSTYL LACROIX

Composition. — Nouveau dérivé du camphre soluble dans l'eau.

Avantages. — 1° Absorption immédiate. 2° Injection indolore ne produisant ni nodosité ni réaction. 3° Injection parfaitement indolore grâce à son pH = 7.

Indications. — Adynamie, pneumonie, broncho-pneumonie, collapsus.

Formes pharmaceutiques. — 1° *Camphostyl simple*.

A. *Ampoules* — 1° Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 10 : 2° boîtes de 6 et 12 ampoules à 0 gr. 20 : 3° boîtes de 6 ampoules à 0 gr. 50.

Pour le corps médical, en boîtes de 50 et 100 ampoules.

B. *Gouttes*. — XX à CXX gouttes par jour.

2° *Camphostyl spartéiné*. — A. *Ampoules*. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,05 de Spartéine.

B. *Gouttes spartéinées* XX à LXXX gouttes par jour.

3° *Camphostyl strychniné*. — Ampoules uniquement. Boîtes de 6 et 12 ampoules à 0,20 Camphostyl et 0,001 de Strychnine.

Echantillon sur demande.

<i>Camphostyl simple :</i>	{	Ampoules de 1 cc.	Prix : 15 fr. 60	la boîte de 12
		— de 2 cc.	— 18 fr. 75	— 12
		— de 5 cc.	— 18 fr. 75	— 6
		Gouttes	— 15 fr. 60	
<i>Camphostyl spartéiné :</i>	{	Ampoules	Prix : 12 fr. 50	la boîte de 6
		—	— 20 fr. 40	— de 12
		Gouttes	— 16 fr. 65	

Camphostyl strychniné :

Ampoules uniquement : 12 fr. 50 la boîte de 6; 20 fr. 40 la boîte de 12.

Laboratoires LACROIX

. MEROBIAN et fils, Successeurs.

Pajol — PARIS (XVIII^e) Tél. : Nord 54-57.

CAMPHROLYSE

Présentation. — En boîtes de 6 ampoules de 2 cc. et 12 ampoules de 2 cc. et en flacons stilligouttes.

Camphrolyse simple, gouttes ou 6 amp. : 16 fr. ; 12 amp. : 30 fr. 60.

— spartéine, — — 18 fr. — 33 fr. 65.

— caféine, — — 20 fr. — 36 fr. 70.

Principes actifs. — a. Camphrolyse simple : campho-sulfonate de soude liquide. — b. Camphrolyse spartéine : campho-sulfonate de soude liquide, spartéine. — c. Camphrolyse caféine : campho-sulfonate de soude liquide, caféine (benzoate de soude).

Indications. — Tous les états de faiblesse ou de collapsus cardiaque, Suite de choc traumatique ou chirurgical, Collapsus cardiaque, Imminence de collapsus dans les états infectieux, Gripes ou fièvres typhoïdes, etc., Pneumonies, Broncho-pneumonies grippales, Syncopes, Septicémie, Crises d'angine de poitrine et d'œdème pulmonaire.

Mode d'emploi. — a. *Adultes* : 1 à 4 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 à 2 ampoules par jour en injections intraveineuses, ou XXV à C gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée. — b. *Enfants* : 1 à 2 ampoules par jour en injections sous-cutanées, ou 1 ampoule par jour en injection intraveineuse, ou X à L gouttes par jour de la solution dans un peu d'eau sucrée.

Inscrit au L. N. C. sous les nos 900-34 à 900-39.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

CAMPHRO SALYL FRAISSE

Composition :

Salicylate de Benzyle 0 gr. 50

Camphre..... 0 gr. 10

Huile d'olive pure..... 5 cc.

Indications. — Désensibilisateur des zones algiques. Sciaticque, Névrites aiguës ou chroniques.

Forme. — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours dans le tissu musculaire.

Prix : boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 21 fr. 75 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-1.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

CAMPHYDRYL ROBIN

Dérivé du camphre naturel soluble dans l'eau (Campho-carboxylate d'ammonium), de diffusion rapide, sans réaction locale ni action secondaire, injections indolores.

Indications. — Les mêmes que celles des huiles camphrées (excitant du cœur et des centres nerveux, renforcé dans ses formes associées soit par la spartéine, soit par la spartéine et la strychnine : troubles cardio-vasculaires, états de choc, crises respiratoires, collapsus, maladies infectieuses) et de l'alcool camphré (analgésique et antiseptique : angines, prurits, brûlures).

Formes pharmaceutiques. — A. *Camphydryl simple*, à 5 p. 100 de principe actif, isotonisé.

1. Ampoules de 1, 2 et 5 cc. : 1 ou 2 par jour.

2. Comprimés effervescents, à 0 gr. 10 : 2 à 4 par jour.

Gargarismes : 1 ou 2 pour un verre d'eau.

B. *Camphydryl spartéiné.*

1. Ampoules de 2 cc. (0,03 spartéine base) 1 ou 2 par jour.

2. Ampoules de 5 cc. (0,05 spartéine base) 1 ou 2 par jour.

C. *Camphydryl strychno-spartéiné.*

1. Ampoules de 2 cc. (0,015 spartéine base et 0,001 strychnine).

2. Ampoules de 5 cc. (0,02 spartéine base et 0,002 strychnine).

Camphydryl simple :

Ampoules de 1 cc., boîte de 10.....	16 fr. 45
— 2 cc., — 10.....	18 fr. 60
— 5 cc., — 10.....	30 fr. 75
Comprimés, flacon de 50.....	18 fr. 60

Camphydryl spartéiné :

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	21 fr. 80
— 5 cc., — 5.....	21 fr. 80

Camphydryl strychno-spartéiné.

Ampoules de 2 cc., boîte de 10.....	21 fr. 20
— 5 cc., — 10.....	34 fr. »
— 5 cc., — 3.....	13 fr. 25

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

CANOL

Composition :

Poudres végétales, sans aucune addition de corps d'origine chimique.

Lawsonia	0,35235
Chimaphila	0,1425
Aphloïa	0,005
Lawsotanine	0,00015

Pour un cachet.

Absolument inoffensif, aucune contre-indication.

Le Canol noircit les urines au début du traitement, ne s'accumule pas, peut être employé indéfiniment sans danger.

Indications :

Spécifique de l'Albuminurie. Infections des voies urinaires et rénales.

Albuminurie gravidique.

Néphrites.

Pyélo-néphrites.

Lithiase rénale. Colibacillose.

Cystites.

Hématuries. Diabète rénal.

Forme pharmaceutique :

Boîte de 30 cachets de 0,50 environ.

Posologie : Dose moyenne.

Adultes : 4 à 6 cachets par jour.

Enfants : 1 à 3 cachets par jour.

On peut augmenter la dose jusqu'à dix cachets par jour dans les cas graves ou compliqués.

Prix de la boîte de 30 cachets : 15 fr 60.

Correspondance et échantillonnage :

Laboratoire du CANOL

MAIZET (Calvados).

J. GAUDIN. Pharmacien.

Dépôt général : O. C. P. Paris

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des médicaments sous le n° 1426-1.

CANTÉÏNE BOUTEILLE

Forme. — Élixir.

Composition :

Cratægus.....	XXV gouttes.
Passiflore	0 gr. 50
Hamamélis	XXX gouttes.
Salix Alba	0 gr. 025
Excipient : Q. s. par cuillerée à café.	

Indications. — Eréthisme cardiaque, Troubles circulatoires et troubles nerveux consécutifs, Ménopause, Neurasthénie, Mélancolie, Déprimés, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 18 fr. 90.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 04-02.)

CAPARLEM

La thérapeutique protectrice du foie.
Préventive et curative des affections hépatopancréatico-biliaires.

I. Sa formule. — *Huile de Haarlem d'origine*, pure et vraie, Hétéropolyvalente, à base de distillat du *Juniperus Oxycedrus*, spécifique hépato-vésiculaire, fluidifiant de la bile et bilio-sécréteur. Le plus fidèle et le plus doux cholérétique et cholécystokinétique.

II. — Ses indications thérapeutiques fondamentales. — **a. Foie.** — Cholécystites chroniques lithiasiques et non lithiasiques, douloureuses ou non. Calculs de transit et calculs sédentaires. Angiocholites et Angiocholécystites, Séquelles de Cholécystectomies, Asthme hépatique et Bile noire, Foie grippal, Amibiases et Lambliosés vésiculaires. Colibacillocholies.

b. Reins. — Lithiases rénales et toutes variétés de Pyélo-néphrites, Uricémie, Goutte, Gravelle, Colibacilluries, Rein atone.

III. — Sa posologie habituelle. — *Cure d'entretien* : une à deux capsules au milieu des deux principaux repas.

IV. — Ses avantages. — Titrage rigoureux, Efficacité officiellement reconnue, Pureté extrême des composants, Efficacité thérapeutique cliniquement expérimentée.

La seule huile de Haarlem sans mauvais goût ni renvois désagréables après l'ingestion. — Prix de vente modique.

Prix : 18 fr. 75.

**Les Laboratoires Lorrains
de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse).

(Tél. : 74) (Télégr. : Labodès-Étain).

CAPSULES BRUEL

A l'Éther Amyl Valérianique.

Sous la forme originale (1881) des capsules Bruel, l'Éther Amyl Valérianique est un médicament antispasmodique puissant dont l'emploi est formel toutes les fois qu'on voudra prescrire un antispasmodique puissant et sans danger.

Dépourvu de toute toxicité, il permet, aux doses thérapeutiques, de calmer sans morphine les spasmes les plus rebelles aux médicaments, depuis l'angoisse des aortiques et des nerveux, jusqu'au spasme douleur des coliques hépatiques et néphrétiques. C'est un précieux hypnagogue.

Doses. — 3 à 10 capsules par jour.

Fabrication, vente en gros et échantillons.

Laboratoires SECLO

J.-P. PINTA, Pharmacien,

6, rue Adolphe-la-Lyre — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Wag. 62-71).

CAPSULES HAARLEM BARDET

(Capsules Bardet)

Huile de Haarlem VRAIE, PURE, D'ORIGINE.

Composition. — Chaque capsule contient X gouttes d'Huile de Haarlem vraie, garantie importée de la seule maison fabriquant la véritable huile.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue puissant, fluidifiant la sécrétion biliaire.

Principales indications thérapeutiques. — Lithiase biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Angiocholites, Cholécystites, Asthme hépatique.

Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Pyélonéphrites, Goutte, Arthritisme.

Posologie. — Affections aiguës : 2 à 4 capsules par jour.
Affections chroniques et cures d'entretien : 1 à 2 capsules par jour.

A absorber au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle : N° 518-3.

LABORATOIRES BARDET

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

CAPSULES HENRY

Renfermant les principes actifs de la potion de Chopart.

Les **Capsules Henry** permettent au malade l'absorption facile de la potion de Chopart d'un goût particulièrement désagréable.

Elles sont le complément balsamique indispensable à tout traitement antigonococcique de la blennorrhagie, blennorrhée, cystite, quel que soit le traitement employé, lavages ou chimiothérapie.

9 à 12 capsules par jour.

La boîte de 50 capsules : 17 francs.

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

CAPSULES HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

Voir :

HUILE DE HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

CAPSULES JORET ET HOMOLLE

Emménagogue.

Forme. — Capsules de 0 gr. 20 spécialement étudiées pour être rapidement absorbées par l'organisme.

Composition. — Apiol pur et bien défini, préparé et purifié par le procédé des docteurs Joret et Homolle qui découvrirent et isolèrent ce corps.

Indications. — Aménorrhée, Dysménorrhée, Ménorrhagie. Innocuité absolue en cas de grossesse.

Posologie. — Une capsule matin et soir pendant toute la durée de la menstruation.

Prix : 14 fr. 70.

Pharmacie SEGUIN

165, rue Saint-Honoré — PARIS.

CAPSULES KUCHNER au Mécaptol.

Affections bronchiques et pulmonaires.

Composition. — Héléline crist., Gaïacol crist., Eucalyptol crist., Codéine et Chl. Thébaïque.

Action thérapeutique. — Calment la toux, modifient et tarissent l'expectoration. Propriétés fébrifuges et antidyspnéiques très prononcées.

Indications. — Bronchites simples et chroniques, Toux émétisante des tuberculeux, Toutes affections des voies respiratoires.

Posologie. — Trois à six capsules par jour en trois fois.

Prix de vente : 14 fr. 80.

N° d'enregistrement au L. N. C. : 298-5.

Laboratoires L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne). Tél. : 106.

CAPSULES NOGUÈS

Codéine 0,002, Aconit (extr.) 0,001, Belladone (extr.) 0,003, Lobélie (ext.) 0,002, Grindelia (ext.) 0,005, Terpène 0,012, Eucalyptol 0,02, Thiocol (Sulfogaiacolate de potasse) 0,04, par capsule.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 par jour, 2 à chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, antiseptique des bronches ; fluidifie les sécrétions bronchiques.

Indications. — Toux opiniâtres, bronchites chroniques, laryngites, asthme, catarrhe, etc.

Laboratoires H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

CAPSULES ET SIROP PRÉGA

Calmant de la toux et du spasme des bronches.

1° Calme l'irritation et tarit le **catarrhe des muqueuses bronchiques**, grâce à un ensemble d'agents à efficacité connue et éprouvée (codéine, tolu, aconit, benzoate de soude).

2° Combat en outre un autre symptôme pénible, jusque-là négligé, à savoir : le **spasme des muscles lisses de l'arbre bronchique**, par l'adjonction nouvelle d'un dérivé phényl-méthyllique, qui calme ces fibres aussi puissamment que la **papavérine**, sans en avoir la toxicité.

Posologie :

Sirop : 3 à 4 cuill. à soupe par jour ; 10 ans, 5 à 6 cuill. à café ; 5 ans, 2 à 3 cuill. à café.

Capsules : 3 à 4 par jour : 10 ans : 1 à 2 ;

Prix : 16 fr. 05

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CARBAGOL MARINIER

Composition :

Charbon animal, Charbon végétal, Charbon activé (par procédé spécial évitant complètement toute impureté chimique : chlorure de zinc, arsenic, etc.). Argent colloïdal.

Formes :

GRANULÉ friable légèrement aromatisé.
CACHETS (exempts de sucre).

Indications :

Tous les troubles gastro-intestinaux. Entérococolites banales ou muco-membraneuses et leurs conséquences. Toutes diarrhées. Irritations et infections intestinales. Colibacillose. Syndrome entéro-rénal. Intoxications alimentaires. Auto-intoxications.

Posologie :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas avec un peu d'eau ou de tisane.

Enfants : 1/3 à 1/2 dose.

Cachets : 1 cachet = 1 cuillerée à café de granulé.

Prix du flacon de granulé ou de la boîte de 30 cachets : 18 fr. 65.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous les N^{os} 48-2 et 48-3.

Laboratoires G. MARINIER

23, rue Ballu,
PARIS.

CARBALCALOÏDES

Alcaloïdes (ou principes actifs) adsorbés par un charbon polyvalent (Carbosanis) qui leur sert de véhicule et ne les relâche que dans l'intestin. Les principaux sont :

La Carbatropine. — Carbosanis atropiné (*Constipation spasmodique*). 19 fr. 50.

Le Carbarsèno. — C + ac. oxyaminophénylarsénique (*Contre parasites intestinaux*). 19 fr. 50.

La Carbémétine. — C. + chlorhydrate d'émétine (*Dysenterie amibienne*). 30 francs.

Le Carbalga. — C. + iode (*Antiseptique intestinal*).

La Carbésérine. — C. + sulfate d'ésérine (*Atonie colique*). 19 fr. 50.

La Carbocarpine. — C. + chlorhydrate de pilocarpine (*Constipation atonique*). 19 fr. 50.

Laboratoires MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e)

(Tél. : Suf. 36-59)

CARBARGYRE

Charbon végétal activé et Argent associés en un complexe colloïdal.

Antiseptique intestinal puissant, absorbant, anti-toxique, anti-infectieux.

Ne provoque jamais d'argyrisme.

Indications thérapeutiques. — Colibacillurie, Infections intestinales. Intoxications. Fermentations. Colites. Diarrhées. Deux formes :

Cachets : 1 cachet contient :

Argent colloïdal	0,02
Charbon actif titré	0,48

Granulé : 1 cuillerée à entremets contient :

Argent colloïdal	0,02
Peroxyde de magnésium	0,04
Urotropine	0,08
Charbon actif titré	1

Le Carbargyre se prend en général avant les repas.

Posologie. — Dose moyenne par 24 heures :

Adultes : granulé : de 2 à 3 cuillerées à entremets ; cachets de 2 à 5 cachets.

Enfants : de 2 à 3 cuillerées à café.

Cachets : la boîte de 30 cachets : 18 fr. 70.

Granulé : le flacon de 170 gr. : 18 fr. 70.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — Paris (VIII^e). — Tél. Laborde 08-51.

Docteur A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, Pharmaciens.

Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CARBATROPINE

Charbon organique (Carbosanis) atropiné.

Composition. — 1/2 mgr. de sulfate d'atropine pour 10 gr. de carbosanis, soit 1/4 de mgr. d'atropine par cuillerée à café.

Indications. — La Carbatropine est utilisée avec succès dans les spasmes du côlon et agit efficacement pour combattre la constipation qu'ils provoquent. L'atropine n'est relâchée par le charbon que là où le bol intestinal est retenu, c'est-à-dire au niveau même du spasme. Le spasme disparaît et la constipation cesse.

Formes. — Granulé dosé à 5 mgr. par 100 gr., soit 1/4 de mgr. par 5 gr. (cuillerée à café).
Poudre et cachets.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dosage spécial pour enfants:
1/10 de mgr. par cuillerée à café.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e)
(Tél. : Suf. 36-59.)

CARBOBEL

Granulés au goût agréable.

Deux formules. — Boîte rouge : simple.
Boîte bleue : benzonaphtolé.

Composition. — Charbon animal chimiquement pur — hexaméthylène tétramine pur — citrate de magnésie, avec ou sans benzonaphtol.

Indications. — Gastrites, aigreurs, inflammation des voies intestinales, biliaires et urinaires.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas, à prendre comme dessert. (Si possible ne pas mélanger à du liquide.)

Laboratoires du CARBOBEL

Dépositaires généraux pour la Belgique le Congo Belge et le Grand Duché de Luxembourg.

PECEBE

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

CARBO-BISMUTH ADRIAN

Ne contenant que du Carbonate de Bismuth chimiquement pur, légèrement sucré et menthé.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 gr. 50.

Indications thérapeutiques. — Forme pratique, active et inoffensive pour le traitement des affections douloureuses de l'estomac et de l'intestin : Hyperchlorhydrie, Ulcérations de l'estomac, Hémorragies intestinales, Fièvre typhoïde.

Médication antidysentérique et antidiarrhéique, pansement gastrique.

Posologie. — 5 à 20 comprimés par jour, suivant les cas et suivant avis du médecin, soit à jeun, soit avant ou après les repas.

Le flacon : 21 fr. 90.

Société Française de Produits Pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBO-COMBROSMOL

Médication végétale des infections gastro-intestinales et biliaires.

Composition. — Combretum, Buchu, Saponaire, Charbon végétal activé.

Forme. — Granulé fondant, aromatisé.

Propriétés. — Par le *Buchu* attaque l'élément infectieux hépatobiliaire ; par la *Saponaire* neutralise et élimine les toxines ; par le *Combretum* sollicite du foie un effort sécrétoire qui aide à l'élimination des éléments infectieux et toxiques ; par le *Charbon activé* adsorbe les bactéries et les toxines intestinales.

Indications. — Hépatites, ictères infectieux, angiocholites, cholécystites, colibacillose. Fermentations gastro-intestinales, auto-intoxication, états diarrhéiques, aérophagie, infections urinaires.

Posologie. — 1 à 2 cuillérées à café, à chaque repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en Pharmacie, Licencié ès sciences,

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 88-70.)

CARBOGENASE

Granulé.

Composition. — Extrait de Belladone, Citrate de soude, Hexaméthylènetétramine, Lactose, Carbonate de magnésie, Charbon végétal, animal et activé dans excipient aromatisé.

Indications. — Aérophagie, Fermentations intestinales, Douleurs stomacales, Dermatoses par auto-intoxications, Affections urinaires.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café à la fin de chaque repas.

Prix : 15 fr. 60.

Laboratoire RICHER, Docteur en Ph^{ie}
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de
Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

CARBOÏODURES FRAUDIN

Composition. — Iodure chimiquement pur, fixé sur du charbon activé, utilisé comme véhicule.

Granulé friable, d'un goût agréable, contenant 0 gr. 33 d'iodure par cuiller à café.

Deux formes : 1. Carboïdure à l'iodure de potassium.
2. Carboïdure à l'iodure de sodium.

Propriétés. — L'iodure fixé sur le charbon est seulement libéré en milieu alcalin (intestin). *La libération est intégrale, mais lente, ne causant ni intolérance stomacale, ni iodisme.*

Indications. — Toutes celles de l'iodure de potassium : artériosclérose, arthritisme, affections cardio-vasculaires, asthme, etc.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, avenue Desfeux — BILLANCOURT (Seine).

(Tél. : Molitor 02-62.)

CARBOLACTYL SIMPLE

Cure de désintoxication intestinale
hépatique et rénale.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, adsorbés par du charbon activé, extrait pancréatique, algues à mucilage.

Indications. — Auto-intoxications gastro-intestinales, Colibacilloses, Entérites, Diarrhées, Troubles de la nutrition, Troubles fonctionnels du foie, Dermatoses.

Formes. — 1° Boîte de 30 cachets ;
2° Poudre avec cuiller-mesure.
(N'existe pas sous forme de comprimés.)

Doses. — *Adultes* : 3 à 4 cachets ou 6 à 8 mesures *pro die*. — *Enfants* : 2 à 6 mesures *pro die*.

Prix : 16 fr. 50

CARBOLACTYL BILIÉ

Composition. — Identique à celle du Carbolactyl simple avec addition de Bile purifiée et dépigmentée.

Indications. — Entérite muco-membraneuse d'origine hépatique, Constipation essentielle, Insuffisances hépatiques et biliaires, Angio-Cholite et Cholécystite, Cholémie, Hépatisme et Cyrrhoses, Diabète par Dyshépatie, Colibacilloses, Artériosclérose par intoxication.

Forme. — Boîte de 30 cachets.
(Ni comprimés, ni poudre biliée.)

Doses. — 2 à 3 cachets *pro die*, à la fin des repas.

Prix : 17 fr. 50.

Échantillons et Littérature sur demande :

Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI^e).

CARBOLAXINE

Composition. — Graines sélectionnées de *Psyllium* enrobées de charbon activé (ACTICARBONE pur) 25 p. 100 et poudre de Belladone 0 gr. 015 par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Rééducateur intestinal, désinfectant énergétique, antispasmodique.

Forme une gelée épaisse, riche en ACTICARBONE, qui panse la muqueuse intestinale, s'oppose au dessèchement des selles et absorbe les toxines de fermentation.

Indications. — Coprostase et conséquences toxiques. Entérocolites. Spasmes de l'intestin, Diarrhée, Fermentations, Colibacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas.

1 cuillerée dès amélioration. Puis : doses décroissantes.

Enfants : par cuillerée à café.

Prix : 20 fr. 40.

Laboratoire du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-59.)

CARBOLIN MIDY

Carbolin simple. — Boîte verte : Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé.

Carbolin composé. — Boîte rouge : Graines de lin, mucilage gommeux, charbon végétal suractivé, Extrait de bile, Ferments intestinaux, Diastase du Codex, Extrait Bourdaine spécial.

Propriétés thérapeutiques :

Carbolin simple. — Régulateur physiologique de l'intestin, panse la muqueuse intestinale, absorbe les gaz, supprime les spasmes gastro-intestinaux.

Carbolin composé. — Stimulant physiologique de l'intestin, contrôle la digestion, assure la rééducation motrice des intestins paresseux.

Indications :

Carbolin simple. — La Coprostase et toutes ses conséquences. Aucune contre-indication. S'associe à toute médication complémentaire.

Carbolin composé. — Constipation chronique, Atonie intestinale, une selle par jour, sans spasmes, sans diarrhée.

Doses. — 2 à 6 cuillerées à café avant les repas. Mettre les graines sèches dans la bouche et les avaler avec une gorgée de liquide sans les croquer.

Prix : Carbolin simple (boîte verte) : 16 fr.

Carbolin composé (boîte rouge) : 17 fr.

Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

CARBOMUCIL

(Normacol + Charbon).

Préparation associant le pouvoir adsorbant d'un charbon activé aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Avantages. — Assure l'action du charbon tout le long du tractus digestif, les grains de CARBOMUCIL ne libérant la poussière de charbon que peu à peu, au cours de leur gonflement très progressif.

Permet en particulier l'action du charbon dans les côlons et le rectum, en s'opposant par le noyau mucilagineux à la dessiccation du contenu de ces organes (le charbon n'agit qu'en milieu humide).

Indications. — Tous états digestifs avec fermentations anormales. Aérophagie.

Emploi. — Par cuillerée à café, (2 à 4 par jour.) à la fin ou en dehors des repas. Mettre le granulé sec dans la bouche et l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 14 fr. 15.

Laboratoire NORGAN

PIERRE ALEXANDRE, Pharmacien
21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e).
(Tél.: Laborde 08-00.)

CARBONAPHTINE

Forme. — Granulé soluble, agréablement aromatisé à l'anis.

Composition. — Benzonaphtol + Salicylate d'alumine + Urotropine recristallisée dans l'alcool + Charbon animal pur en divisions extrêmes + Charbon végétal.

Indications. — Toutes infections gastro-intestinales. Infections biliaires et infections urinaires. Réalise l'antiseptie parfaite du tube digestif grâce à son pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas (1/2 cuillerée pour les enfants) à croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL, pharmacien de 1^{re} classe,
8, rue Fleury — LYON-OUILLINS.

CARBONATE DE CHAUX ADRIAN

Composition :

Carbonate de chaux pur, légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie.

Présentation :

Comprimés dosés à 25 centigrammes.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas, et autant après le repas si besoin.

Prix : Le flacon, 12 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. n° 523-36.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^e ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CARBONÉSIE

Cachets et Granulé

Composition. — Charbon activé, charbon animal, charbon végétal, magnésie calcinée légère, peroxyde de magnésium, carbonate de chaux.

Indications. — Gastro-entérites, fermentations intestinales, entérocolites, intoxications et auto-intoxications, diarrhées, colibacillose et ses conséquences.

Avantages :

1° Activité maximum vis-à-vis de toutes les toxines grâce aux 3 charbons, à parties égales.

2° Ne constipe pas, grâce à la magnésie.

3° Ne contient aucun corps chimique irritant ni toxique.

Posologie :

Cachets : Un ou deux après chaque repas.

Granulé : De goût très agréable : 1 à 3 cuillerées à café après chaque repas.

Prix :

Boîte de 30 cachets 17 fr. 55.

Boîte de 100 gr. de granulé..... 17 fr. 55.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

CARBOQUINOL

Comprimés à base de :

Sulfate neutre d'oxyquinoléine.	0 gr. 03
Hydrate de magnésie	0 gr. 05
Charbon végétal	0 gr. 10

Indications :

Colibacillose (syndrome entéro-rénal de Heitz-Boyer).

Gripes intestinales.

Tous les troubles *intestinaux, biliaires et urinaires.*

Avantages. — Antiseptique plus puissant que produits à base d'*Hexaméthylène-tétramine.*

Agit dans tous les milieux (acide, alcalin ou neutre), sans irriter les muqueuses.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés aux principaux repas.

Enfants : 1 à 2 comprimés aux principaux repas.

Prix : 15 francs la boîte de 60 comprimés, pour quinze jours de traitement.

Laboratoire RAVALEC

Rue nouvelle — VILLARD DE LANS (Isère.)

CARBOREXYL

Estomac-Intestin.

Principes actifs :

Charbon de peuplier léger et poreux à l'état d'extrême division, simple ou associé à l'Urotropine, au Benzonaphtol ou à la Belladone.

Composition :

Pour répondre aux exigences de la thérapeutique nous mettons à la disposition du corps médical 4 formules :

Carborexyl « S » (simple) chaque comprimé = 1 gr. de charbon.

Carborexyl « F » (forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine.

Carborexyl « NF » (naphto-forminé) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 5 cgr. d'Hexaméthylène tétramine et 25 cgr. de Benzonaphtol.

Carborexyl « B » (Belladone) chaque comprimé = 1 gr. de charbon + 1 cgr. d'extrait et 1 cgr. de poudre de belladone.

Forme :

Comprimés friables, agréables au goût.

Indications :

Hyperacidité, Hypersécrétion, Dyspepsie, Aérocolie, Spasmes douloureux, Dilatation d'estomac, Syndrome entéro-rénal et entéro-hépatique, Colibacillose, Cholécystite, Diarrhée, Intoxication exogène et endogène.

Remarque importante :

Par sa composition, le *Carborexyl Belladone* trouve plus spécialement ses indications dans les cas de gastropathies douloureuses, spasmes du côlon et la constipation qu'ils provoquent. Etant donné son pouvoir toxique, il ne devra être employé que sur ordonnance du médecin.

Posologie :

1 à 3 comprimés par jour, à diminuer ou à augmenter suivant les indications du médecin traitant.

Mode d'emploi :

Croquer ou, de préférence, laisser fondre le comprimé dans la bouche.

Prix :

Carborexyl S	} La boîte 15 fr. 30.
Carborexyl F	
Carborexyl NF	
Carborexyl B	: La boîte 16 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous n° 1079.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion

A. CHATAIN, Docteur en pharmacie.

Ex-Interne en pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Cornille — LYON.
(Tél. : Lalande 41-81.)

CARBOS

Composition. — Le premier charbon animal activé obtenu chimiquement pur, sans Sulfures ni Cyanures.

Forme. — *Comprimés* de 1 gr. *Granulé* à 60 p. 100, soit 3 gr. de charbon par cuillerée à café.

Indications. — Dyspepsies gastro-intestinales avec flatulences, Fermentations, Putréfactions, Infections intestinales aiguës et chroniques, Empoisonnements, Gastro-entérites des enfants, Diarrhées infantiles, etc.

Posologie. — *Comprimés* : 3 à 5 avant ou après les repas. *Granulé* : 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 fr. 40.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

CARBOSANIS

CHARBON ORGANIQUE A POUVOIR
D'ADSORPTION CONSTANT

Propriétés. — Pouvoir adsorbant considérable, puissant antitoxique dans toutes les infections de l'estomac et de l'intestin ; agit également comme pansement gastro-intestinal beaucoup plus sûr que le bismuth et le kaolin.

Indications. — Empoisonnements, Fermentations gastro-intestinales, Hyperchlorhydrie, Ulcus, Entérocrites, Diarrhées intenses.

Formes. — Granulé, poudre et cachets.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e)
(Tél. : Suf. 36-59.)

CARBOTRIGON

Synonyme Biotrignon Hépatique.

Composition :

Charbon végétal *activé*,
Extrait mou de fenugrec **désodorisé**,
présentés en granulé friable.

Propriétés :

Allie le pouvoir adsorbant et antitoxique du charbon activé aux propriétés stimulantes, nutritives et apéritives du fenugrec.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillerées à café par jour, avant les repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS.

(Tél. : Ségur 79-58.)

CARDIALGINE DUBOIS

Dragées et Gouttes.

Composition. — Pour une dragée ou XV gouttes :

Bromure de Sparteine	3 cgr.
Extrait de Strophantus gr.....	1 mgr.
Extrait d'Aubépine	10 cgr.
Extrait de Belladone titré	5 mgr.
Chlorhydrate de Papavérine	1 cgr.

Propriétés. — Association synergique chimico-végétale permettant de réaliser une médication cardiaque universelle, susceptible d'être employée sans arrière-pensée très efficacement dans tous les cas où l'on doit interrompre ou éviter l'emploi de la digitale ou de l'ouabaine.

Action. — La Cardialgine Dubois agit de la façon suivante : par sa *Sparteine*, elle régularise le rythme cardiaque et remédie à l'insuffisance du myocarde ; par son radical *Brome*, elle corrige l'excitabilité anormale du système nerveux ; par le *Strophantus gratus*, elle agit sur les arythmies, les syndromes asystoliques.

En outre le *Cratægus* lui confère ses effets modérateurs sur le système nerveux cardiaque et vasculaire, la Belladone la fait triompher des spasmes et algies. Le Chlorhydrate de Papavérine, enfin, fait cesser la vasoconstriction et baisser la tension.

Indications. — Troubles fonctionnels du cœur et des vaisseaux, Insuffisance cardiaque, Spasmes vasculaires de l'hypertension, Arythmies, Tachycardies, Eréthisme neuro-cardiaque, Insuffisance du myocarde dans les maladies infectieuses (septicémies, fièvres éruptives, fièvres typhoïdes, grippe) et la pneumonie des vieillards. Cure d'entretien des états hyposystoliques et hyposphyxiques.

Formes. — Dragées et gouttes.

Posologie :

Dragées :

Adultes : 1 à 3 dragées par jour.

Enfants : 3 à 6 ans 1 dragée par jour ; 6 à 12 ans, 2 dragées par jour.

Gouttes :

Adultes : XXX à XLV gouttes par jour en ayant soin de ne pas prendre plus de XV gouttes (1/2 cc.) en une seule fois.

Enfants : 3 à 6 ans, XV gouttes par jour à raison de V gouttes 3 fois par jour ; 6 à 12 ans, XXX gouttes par jour à raison de X gouttes 3 fois par jour ; 12 à 16 ans : XXXV gouttes en plusieurs fois.

Prix : 17 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 238-1 et 238-19.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie,
16, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Car. 45-62.)

CARDIBAÏNE

Ouabaïne cristallisée chimiquement pure.
Principe actif du *Strophantus gratus*.

Présentation et posologie :

- 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique à 2 p. 1 000 (XXV gouttes = 1 mgr. d'ouabaïne).
Petites doses : X à XXX gouttes par jour.
Doses moyennes : L à C gouttes par jour.
2° *Voie intraveineuse.* — Boîte de 8 ampoules titrées telles que 1 cc. = 1/4 mgr. ouabaïne ; 1/2 à 1 cc. p. injec.

Indications. — Insuffisances cardiaques avec importante dilatation ventriculaire et rythme régulier. Dans toutes les autres variétés d'insuffisance cardiaque, voir **Digibaïne**.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : *Agent général* : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

CARDIOFLORINE

(Dragées roses cardio-néphrotropes).

Priorité. — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, Adonis vernalis et Scille.

Propriétés. — Diurétique cardiotonique. Désintoxicant et uréopoiétique de grande valeur. Remplace et continue l'action des digitaliques. Ne s'accumule pas.

Indications. — Insuffisances cardiaques et cardio-vasculaires, Insuffisance rénale, Artériosclérose, Hypertension, Œdèmes de toute étiologie, Troubles valvulaires, Syndromes neuro-cardiaques, Essoufflement, Obésité, Oliguries, etc.

Posologie. — 1 à 6 dragées dans les intervalles des repas, en moyenne 3 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA » MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique. »

CARDIOPHYLLINE

Composition :

Adénosine.....	0,001
Aminophylline	0,10
Extrait myocardique.....	0,05

Propriétés. — Les composants de la cardiophylline concourent à faire de ce produit le traitement de choix des angoissés du cœur et des cardio-rénaux grâce à leur action vaso-dilatatrice sur les coronaires, antalgique cardiaque et diurétique.

Indications. — Toutes les algies cardiaques ; Angine de poitrine ; Aortites ; Palpitations, spasmes vasculaires ; Dyspnées, Asthme ; Ascites ; Edèmes.

Présentation et posologie. — Boîte de 30 globules (2 à 6 globules par jour).

La Cardiophylline ne s'accumulant pas dans l'organisme peut être prescrite longtemps sans inconvénient.

Elle n'a pas de contre-indications.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52).

CARDIOR

Introduction de l'Or en thérapeutique cardio-vasculaire.

Composition. — Or métallique rendu soluble par photolyse ; alcoolature de sumbul ; alcoolature d'uva-ursi.

Forme. — Gouttes.

Action :

- 1° Diminue la viscosité sanguine.
- 2° Apaise les spasmes artériels.
- 3° Dilate les artérioles.
- 4° Augmente la diurèse.

Indications :

- 1° Hypertension et ses troubles fonctionnels.
- 2° Artériosclérose.
- 3° Signes de petit Brightisme chez les hypertendus.

Posologie. — X gouttes dans un peu d'eau pure, loin des repas. Traitement prolongé sans inconvénient.

Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1820-1.

Laboratoires **ROBIA**
LILLE.

CARDIOSTHÉNINE

Médicament du Cœur et des Vaisseaux.

Définition :

La Cardiossthénine constitue un tonicardiaque antispasmodique par action vasculaire dilatatrice qui soutient le cœur et diminue les résistances.

Formule :

Chaque capsule contient :

Extrait de Strophantus	0 gr. 0005
Sulfate de Spartéine.....	0 gr. 02
Extrait de Cratægus Oxyacantha.....	0 gr. 05
— stabilisé de Valériane.....	0 gr. 05

Indications thérapeutiques :

Douleurs précordiales, Dyspnée d'effort, Palpitations, Tachycardie, Angine de poitrine, Goître exophtalmique, Arythmie, Myocardites, Endocardites, Hypertrophie du cœur, Dilatation des cavités du cœur, Hypertension artérielle, Cardio-artériosclérose, Urémie.

Posologie :

De 4 à 6 capsules par 24 heures, ou davantage suivant prescription du médecin traitant.

Prix : 16 fr. 30 le tube de 40 capsules.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, Successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. Gut. : 27-03.)

CARDIO-STREPTINE

Vaccin polyvalent pour la Prémunition de la maladie rhumatismale et de ses complications cardiaques.

Corps microbiens + lysats + anatoxine.

Posologie. — 1 injection sous-cutanée tous les 6 à 8 jours aux doses progressives de $\frac{1}{4}$ de cmc.

$\frac{1}{2}$ cmc. — 1 cmc. — 1 cmc. $\frac{1}{2}$.

Prix. Les 4 ampoules de 2 cmc. : 43 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. n° 514-6.

Littérature et échantillons aux

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS

(Tél. : Anjou 36-45 (2 lignes).

CARDIRÈNE

Composition par cachet. — Digitale stabilisée 0,035, Scille 0,035, Buchu 0,22, Phosphate de soude 0,15, Théobromine recristallisée 0,30.

Forme. — Cachets.

Indications. — Tonique du cœur, Diurétique puissant, Maladies du Cœur et des Reins, Artériosclérose, Albuminurie, Hydropisie.

Action rapide et de longue durée sans fatigue de l'Estomac ni accoutumance.

Doses. — 2 à 3 pendant 5 jours, puis 1 pendant 10 jours. Cesser 10 jours et reprendre le traitement.

Prix : 19 francs la boîte de 24 cachets.

Durée de la boîte : 20 à 25 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle dans le n° 1403-2.

L. ROBERT, Pharmacien

Place des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : 0-70.)

CARDITONE

(Toni-cardiaque pur.)

Propriétés thérapeutiques. — Cardiopathies valvulaires; Insuffisance cardiaque, Hyposystolie, Asystolie, Hypotension essentielle.

Composition :

Extrait de Strophanthus	0 gr. 001
Sulfate de Sparteïne.....	0 gr. 02
Extrait de Muguet	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé de.....	0 gr. 35

Mode d'emploi. — 2 à 5 comprimés par jour suivant prescription médicale.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

CARÉNA

L'aminophylline française.

THÉRAPEUTIQUE CARDIO-RÉNALE

Composition. — Aminophylline synthétique pure de fabrication française (théophylline-éthylène-diamine).

Action pharmacologique. (Voir *Aminophylline*.)

ANTALGIQUE CARDIAQUE, DIURÉTIQUE ATOXIQUE EUPNÉIQUE.

Dilate les vaisseaux coronaires, lève les spasmes coronariens, assure une meilleure nutrition du myocarde et accroît le débit systolique.

Augmente la diurèse. « Lève les barrages » et soulage le travail du cœur dans les syndromes rénaux avec complication cardiaque associée.

Indications : Douleurs et oppressions des cardiaques.

Angine de poitrine. Infarctus du myocarde.

Aortites, Arythmies, Ascites et Œdèmes.

Oliguries des maladies infectieuses.

Dyspnées, Asthme, Cheyne-Stokes.

Cardio-névroses : voir *Sédo-Caréna*.

Avantages : *Rapidité d'action par voie digestive.*

Ni mercure ni scille. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Posologie :

Comprimés : dosés à 0 gr. 10 d'aminophylline.
1 ou 2 comprimés, 3 à 4 fois par jour, à la fin des repas.

Boîtes de 40 et de 200 comprimés.

Gouttes : 1 goutte = ½ centigramme d'aminophylline.

X à XXX gouttes dans un peu d'eau,
3 à 4 fois par jour, après les repas.

Suppositoires : dosés à 0 gr. 40. Un ou deux suppositoires par jour.

Ampoules. (Voir *Caréna injectable*.)

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de La Tour-Maubourg, PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

CARÉNA-CALCIUM

Théophylline calcique française

La théophylline calcique possède toutes les propriétés et indications de la théophylline-éthylène-diamine (Voir *Aminophylline* et *Théophylline*); mais son absorption intestinale est plus lente et, si son action est moins rapide, ses effets sont plus persistants.

L'ion-calcium augmente les propriétés diurétiques et toni-cardiaques de la théophylline

Caréna-Calcium est indiqué chez les malades dont le tube digestif est délicat et chez les hyperchlorhydriques.

Présentations :

Comprimés : 3 à 8 comprimés par jour. (Tolérance gastrique absolue.)

Ampoules intraveineuses (10 cc.) : 1 ampoule par jour.

CARÉNA INJECTABLE

L'aminophylline française injectable.

Indications. — *Tous les cas d'urgence :*

Infarctus du myocarde, crises graves d'angine de poitrine, œdèmes aigus du poumon (*Caréna + Ouabaïne*), anasarques des cardiopénies, dyspnées cardiaques, ~~dyspnées~~ des urémiques, oliguries infectieuses (*goutte à goutte intraveineux*).

<i>Caréna</i>	{	Ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 50 d'aminophylline ; injecter en plein muscle $\frac{1}{2}$, 1 ou 2 ampoules par jour.
<i>Intramusculaire</i>		
(Cas habituels).		

<i>Caréna</i>	{	Ampoules de 10 centimètres cubes contenant 0 gr. 25 d'aminophylline ; injecter très lentement. en 3 minutes environ.
<i>Intraveineux</i>		
Cas spéciaux).		

On peut utiliser par voie intraveineuse une demi-ampoule de *Caréna* intramusculaire diluée dans 10 cc. de sérum glucosé.

CARÉNA-OUABAÏNE

Toutes les Indications de l'Ouabaïne.

Propriétés. — L'association *Caréna-Ouabaïne* augmente l'énergie du cœur tout en assurant une meilleure nutrition du myocarde par la dilatation des coronaires et évite le danger de syncope ouabainique. *Caréna-Ouabaïne* soulage la dyspnée et déclenche la diurèse.

Indications. — Toutes les formes d'insuffisance cardiaque.

Asystolie des aortiques. Œdème aigu du poumon.

Accidents d'insuffisance ventriculaire gauche.

Cœur des vieillards : traitement d'entretien.

Posologie. — *Comprimés* contenant 5 centigrammes de *Caréna* et 1 milligramme d'*ouabaïne*. 4 à 10 comprimés par jour.

Ampoules intraveineuses contenant 10 centigrammes de *Caréna* et un quart de milligramme d'*Ouabaïne*.

Injecter une demi à 2 ampoules, lentement, dans la veine, en suivant toutes les directives des traitements par l'*Ouabaïne*.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

CARNICALCINE

(Granulé très agréable.)

Indications. — Tous états de décalcification et de débilité, Convalescences, Surmenage, Faiblesse générale.

Formule :

Hémoglobine cristal.....	0 gr. 20
Glycérophosphate de chaux	3 gr. 00
Glycérophosphate de fer.....	0 gr. 50
Glycérophosphate de magnésie ...	0 gr. 50
Glycérophosphate de manganèse..	0 gr. 50
Phosphate tricalcique	3 gr.
Extrait hémopoïétique de foie (1 p. 33).....	0 gr. 06
Excipient sucré et aromatisé Q. S. P.	100 gr.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées par jour.

Enfants : 1 à 5 cuillerées par jour.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. Malaval, pharmacien de 1^{re} classe,
8, rue Fleury —LYON - OULLINS (Rhône).

CARNINE LEFRANCO

Composition. — Suc Musculaire de viande de bœuf crue concentré à froid sans addition de sang. Contient tous les ferments, vitamines et anti-t x in s, de la viande fraîche.

Propriétés. — Reconstituant énergétique reminéralisant, recalifiant.

Indications. — Toutes les anémies, tuberculose, convalescence, troubles de la croissance, rachitisme, lymphatisme.

Présentation et posologie. — Carnine ordinaire en flacons (650 grs. 325 grs. environ). Carnine concentrée en ampoules, 10 ampoules buvables de 10 cc., 2 à 3 ampoules ou cuillerées à soupe par jour dans un liquide froid ou tiède (eau naturelle ou gazeuse, lait, bouillon, etc.).

Remarque. — La Carnine Lefrancq peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait tiède, à la dose de deux cuillerées à café ou une ampoule.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

CARYPAÏNE

Papaïne, Extrait de malt-citro-phosphate de soude.

Affections gastro-intestinales chez l'enfant, Dyspepsies hyposthéniques chez l'adulte, Vomissements de la grossesse.

Sirop..... Enfants.

Dragées Adultes.

Posologie :

Enfants : 4 à 5 cuillerées à café, à dessert ou à soupe, suivant l'âge, dans du lait ou une infusion.

Adultes : 2 à 3 dragées à chaque repas.

La seule préparation dont l'action thérapeutique s'exerce sur les trois éléments physiologiques de la digestion :

La sécrétion, la motricité, la sensibilité.

**FLEURY GALVIN, Pharmacien,
SAINT-FONS (Rhône).**

CASCARA MIDY

A base de *Cascara Sagrada* naturel.

Pilules dosées à :

0 gr. 10 d'extrait hydro-alcoolique codex de *Cascara Sagrada* contenant les dérivés oxyméthyl-anthraquinoniques, à l'exclusion des résines drastiques et de l'huile essentielle.

0 gr. 20 de poudre sélectionnée de *Rhamnus purshianus*.

Doses et mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 pilules le soir au dîner. Après 15 jours, espacer les doses.

Propriétés thérapeutiques. — Constipation habituelle et ses troubles, peut être prescrit aux femmes enceintes et aux nourrices.

Prix : 10 francs.

Durée du traitement : un mois.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII).
(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

CASOL

Présentation. — Sirop.

(Voir LUDIN.)

Laboratoires REY

DIJON.

(Tél. : 22-12.)

CASTANOL

Coqueluche. Toux des ganglionnaires.

Toux quinteuses rebelles.

Composition. — Extraits de feuilles de châtaignier *iodé*, de Drosera, d'Anémone, de Grindelia, de Balotte.

Aucun produit chimique,

Aucun toxique.

Délicieux au goût.

Fortifiant iodotannique de choix.

Posologie :

Enfants : au-dessous d'un an : quatre 1/2 cuillerées à café par jour.

—	de 1 à 2 ans :	3 cuillerées à café	par jour.	—
—	de 2 à 4 ans :	4	à café	—
—	de 4 à 8 ans :	4	à dessert	—
—	de 8 à 12 ans :	3	à soupe	—

Adultes : 4 cuillerées à soupe.

Prix : 16 fr. 50.

Pierre LACHAISE, Docteur en Pharmacie
9, place Municipale — TULLE (Corrèze.)

CATALYL

Solution de Chlorure de Magnésium pur associé au Chlorure de Calcium dans un liquide physiologique spécial. Activité intense, Toxicité nulle, Stabilité.

Seule préparation Magnésienne de goût vraiment agréable.

Suppression sur les conditionnements et la littérature de toute allusion au cancer.

Indications :

Asthénies, Surmenages, Hépatisme, Paludisme, Sénilité prématurée, Dermatoses, Prostatites, Diabète, adjuvant puissant des traitements opothérapiques.

Mode d'emploi :

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun, dans demi-verre d'eau ou de lait sucrés ou non. Dose variable.

Une cuillerée à café = 0 gr. 50 de $MgCl^2$ anhydre + 0 gr. 10 de Chlorure de Calcium.

Prix : 17 francs. — L. N. C. n° 552-1

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)

CATHACIDE

(AMPOULES)

Curatif des États acidosiques.

Fixateur (par voie indirecte) des sels de calcium.

Propriété thérapeutique :

Neutralise l'acidose humorale pathologique, cause de la déminéralisation et des différentes manifestations liées à une rupture (vers l'acidose) de l'équilibre général acido-basique.

Composition

Solution injectable de citrate neutre de soude pur, en milieu aqueux (5 %), convenablement stérilisée.

Mode d'action :

Le Cathacide, introduit dans l'organisme, soit par voie hypodermique, soit par voie intraveineuse, se transforme par oxydation de la partie organique (ion citrique) en *carbonate de sodium*, développant ainsi dans l'intimité des tissus la faible alcalinité suffisante pour neutraliser, d'une manière efficace, progressive et durable, l'acidité pathologique. A noter que la plupart des manifestations acidosiques s'accompagnent des symptômes de *déminéralisation*. En effet, aussi longtemps que le terrain demeure acidosique, aucune fixation de sels de chaux ne peut se produire. Cette constatation, qui explique l'échec des traitements habituels, montre qu'il convient avant tout de neutraliser l'acidose pathologique. La fixation des différents sels (que l'alimentation normale suffit largement à fournir) se produira ensuite normalement.

Indications :

États légers d'Acidose. Carence minérale, rachitisme et déminéralisation, eczéma infantile, gourme, retard de dentition, carie dentaire, troubles de la puberté, lymphatisme, surmenages intellectuels et physiques, convalescences.

États chroniques d'Acidose. Ulcères gastriques et duodénaux, états allergiques en général, urticaire, maladie de Recklinghausen, détérioration calcique, ostéomalacie, ostéophytes, vomissements de la grossesse, états pré-tuberculeux, etc...

États graves d'Acidose. États anaphylactiques, syndromes hémorragiques, anémies graves, néphrites aiguës, choc post-opératoire, brûlures étendues, coma diabétique, etc...

Posologie :

États légers (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ou 2 ampoules hypodermiques de 2 cc. par 24 heures.

États chroniques (par décades alternées de cure et de repos) : 1 ampoule intraveineuse de 5 cc. (ou 2 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

États graves 2 ampoules intraveineuses 5 cc. (ou 4 hypodermiques de 2 cc.) par 24 heures.

Nota :

Dans tous les cas, le traitement doit être prolongé jusqu'à complète satisfaction confirmée.

L'efficacité et la rapidité d'action dépendent du stade d'acidose au cours duquel le traitement est instauré.

En général, la cure de Cathacide se traduit, au début, par une période de légère lassitude (1^{re} décade) suivie d'améliorations sensibles qui ne cessent de s'accroître (vitalité accrue, euphorie, augmentation de poids, raffermissement des tissus, etc...) ; ces résultats sont faciles à contrôler par les moyens habituels : pesées périodiques, analyses d'urines, taux de viscosité sanguine, etc...

Avantages :

L'injection est indolore. Ni réaction locale ou générale, ni contre-indication, ni accoutumance.

Prix et Formes :

Coffret	20 ampoules hypodermiques de 2 cc.	Frs. 26.50.
Boîte	10 — — —	2 cc. — 18.75.
—	10 — — — intraveineuses	5 cc. — 29.50.
—	5 — — —	5 cc. — 18.75.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-2.

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Pharmacien

95, rue de Prony — PARIS (17^e). Tél. Carnot 03-80.

CAVÉFORM

Simple ou benzonaphtolé.

Granulé ou cachet.

Composition :

	Granulé par cuiller à café.	Cachet.
Charbons :		
Animal exempt de cyanogène.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Végétal <i>activé</i>	0 gr. 50	0 gr. 25
FORMol naissant	0 gr. 20	0 gr. 10
(Hexaméthylènetétramine.)		
Avec ou sans Benzonaphtol.....	0 gr. 20	0 gr. 10

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique interne. Très puissant adsorbant des alcaloïdes, bactéries, toxines, gaz, poisons minéraux.

Indications. — Infections intestinales, urinaires et biliaires. Auto-intoxications. Colibacillose. Cystite. Diarrhée. Entérites. Empoisonnements aigus alimentaires. Fermentations intestinales. Mauvaise haleine. Urticaire.

Mode d'emploi. — Après chaque repas : 1 cuillerée à café de granulé ou 1 à 2 cachets.

Présentation pharmaceutique et prix :

Granule friable : 13 francs le flacon.

Cachets : 15 francs la boîte de 30.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur,

Licencie ès sciences,
114, rue Solferino — LILLE.

CÉDOSEPTOL

Médication anti-infectieuse

Composition :

Sulfate de manganèse.....	0,071	Sulfate de fer.....	0,072
cuivre.....	0,028	— calcium.....	0,104
magnésium.....	0,091	Camphre.....	0,077

Pour 1 cc. quantité en milligrammes.

Solution huileuse de catalyseurs métalliques associés au camphre et dissous en combinaison organique lipodique.

La dilution extrême de ses constituants le rend parfaitement osmosable et rapidement dissocié *ad intra*. Action extrêmement efficace.

Formes : Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. en boîte de 6 et de 12.

Capsules glutinisées (étui de 20). Pommade en pot de 30 et 90 grammes.

Indications : Pneumonie — Broncho-pneumonie — Congestion — Pleuresie — Endocardite — Palébite — Péritonite — Typhoïde — Fièvre puerpérale — Grippe — Meningite — Maladies éruptives — Scarlatine — Rougeole — Streptococcies — Staphylococcies — Erysipèle — Diphtérie — Encéphalite récente — Rhumatisme infectieux — Arthrite rhumatismale.

Posologie : En injections intramusculaires profondes, faites très lentement (aiguille 9/100), une piqûre matin et soir.

Dans les cas graves : une piqûre de 5 cc. toutes les 3 heures jusqu'à cessation de la fièvre. Jamais de complication.

Diphtérie et tétanos : dans ces cas-là, sans préjudice du *sérum spécifique*, on injectera deux ampoules de Cédoseptol par jour comme puissant adjuvant et *preservatif* des séquelles habituelles.

Pommade pour les pansements dans les plaies infectées.

L. N. C. M. N° 1024-1.

Laboratoire des **HORMOMÉTALIONS**

50, avenue Jacqueminot, MEUDON (Seine-et-Oise). (Tél. : Obs. 13-33.)

CELLARGOS

Antiseptique intestinal.

Composition. — Cellocarbone (charbon spécial de coton activé). Argent colloïdal et Bismuthate d'oxybenzopyridine.

Antiseptique, absorbant, sans toxicité.

Indications. — Infections intestinales, Diarrhées estivales, Syndrome entéro-rénal, Colibacilloses. Fermentations, Entérites, Colites.

Posologie. — Prendre 1 ou 2 cachets avant ou après chaque repas principal.

Présentation. — En boîte de 30 cachets pour un traitement de 10 à 15 jours.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE
27, rue Desrenaudes — PARIS.
(Tél : Carnot 78-11.)

Bande plâtrée CELLONA

(Bande **Platrix** à prise rapide.)

Forme. — Plâtre adhérent à la tarlatane, d'où présentation du plâtre en nappe. Bandes de 2 et 4 mètres de long sur 10-12-15-20-25 et 30 centimètres de large. (Largeur de 40 et 50 centimètres sur demande spéciale.) Atelle plâtrée pour membres inférieurs (genre Delbet) fournie sur demande.

Avantages :

- 1° *Transport des bandes* : Encombrement réduit, légèreté.
- 2° *Confection du plâtre* : Propreté ; à l'immersion, la bande est totalement imprégnée d'eau en 3 à 5 secondes ; rapidité de par la quantité de plâtre apportée par la bande.
- 3° *Masses constituées* : Plâtre à prise rapide d'excellente qualité, permettant un modelage parfait et accusant une résistance à la rupture et au choc, à la flexion, double de celle obtenue avec un plâtre courant, d'où : légèreté des appareils constitués, poids et encombrement réduits de moitié.

En fin, aspect extérieur lisse et brillant.

Mode d'emploi. — Immerger verticalement la bande, pendant 4 secondes environ, dans l'eau, sans addition saline. Exprimer légèrement et envelopper circulairement ou longitudinalement, en lisant la masse à chaque apport de plâtre. Pour parfaire le moulage, on peut, avant la prise du plâtre, envelopper la masse d'une tarlatane apprêtée et lisser une ultime fois à la main en apportant sur la masse un peu de plâtre. A cette fin, exprimer à fond une bande immergée et essorée.

Indications. — Tous les cas médicaux chirurgicaux nécessitant l'immobilisation.

S'emploie pour la confection des attelles et des négatifs orthopédiques.

Laboratoires FISCH et C^{ie} S. à r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS : 104, Fg Poissonnière (X^e) — (Tél. : Trudaine 92-52.)

CELLUCRINE

Régénération sanguine par un principe spécifique extrait du globule rouge.

Tonique général.

Indications. — Toutes les anémies, Déficiences organiques, aucune contre-indication.

Présentation. — Dragées de 0 gr. 40 contenant 0 gr. 035 du principe actif.

Posologie. — 3 dragées ou plus par jour suivant indication du médecin.

Prix. — La boîte de 30 dragées : 20 fr. 40.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaug. 11-23.)

CELLULAX

Laxatif antitoxémique physiologique à base de celluloses végétales ; de présentation agréable.

Composition. — Ni drastiques, ni cathartiques.

Son de blé 20 p. 100 : Laxatif sélectionné, stabilisé, déshydraté, désamidonné. (Travaux du prof. Fiessinger.)

Lactose 20 p. 100 : Antitoxique, antifermentescible. (Travaux des auteurs américains.)

Gélose pure 6 p. 100 : Emollient, absorbe quinze fois son poids d'eau. Aucune autre substance médicamenteuse.

Indications. — Constipation chronique et rebelle ; atonie intestinale, dystonie gastrique, ptoses, aérocolie ; colites membraneuses, entérocolites, colibacillose, dermatoses, migraines, mauvaise haleine, grippe à forme intestinale.

Présentation. — Granulés sans odeur et de goût délicat.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 cuillerées à café, à la fin des repas.

Enfants : au-dessous de 10 ans, une cuill. à café après le repas du soir.

Cure de dix jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 733-7.

Laboratoire BIOPHARMAX

40, Quai Jeanne-d'Arc — CHINON (Indre-et-Loire). (Tél. : 131-

CÉPAÏNE

Spécifique certain de toutes les toux, bronchites, laryngites, affections respiratoires, pulmonaires.

Composition. — Gelsemium sempervirens, Lobelia Inflata, Drosera rotundifolia, Cepallium, Erysimum, Aunée, Myroxylon Balsamum, Sulfogalacolate de Potasse, Phosphate de Codéine, Organes frais (poumon, glandes surrénales, hypophyse).

Indications. — Toux spasmodiques, coqueluchoïdes, catarrhales ; rhumes ; Bronchites aiguës, chroniques, hémorragiques ; enrrouements ; coryza ; laryngites ; trachéites ; gripes ; angines ; douleurs intercostales ; points de côté ; tuberculose, etc...

Posologie. — *Enfants* : jusqu'à 1 an 11 gouttes 6 fois par jour dans un peu de lait, d'eau, de tisane sucrés ou non.

De 1 an à 5 ans 5 gouttes 6 fois par jour.

— 5 ans à 10 — 10 — —

— 10 — 15 — 15 — —

Adultes 20 — —

La conservation de la Cépaïne est indéfinie, elle ne s'altère jamais. Sa préparation demande plus de trois mois.

Prix du flacon de 30^{cc} : 15 fr. 60

Enregistré au L. N. C. M. n 1837-1.

Laboratoire LORMEAU
27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

CÉPHALGI-LYSINE

DU

DOCTEUR L. DELALBRE

EX-GRAINS CÉPHALGIFUGES

PRÉPARATION

PHYTOTHÉRAPIQUE ET OPOTHÉRAPIQUE

AU

JASMIN DE VIRGINIE

CURATIVE

DES

NÉVRALGIES REBELLES

ET

ALGIES RHUMATISMALES

(articulaires-musculaires-viscérales)

pour

médication synergique végétalo-organique

AVEC ACTION ÉLECTIVE SUR LES

NERFS CÉPHALIQUES

(trijumeau-facial)

PRÉSENTÉE sous forme de PILULES

- COMPOSITION -

Poudre de racines de Gelsémium sempervirens	0 gr. 04
Poudre de racines d'Aconit napel	0 gr. 01
Poudre d'écorce de racines de Piscidia erythrina	0 gr. 04
Extrait mou de Quinquina jaune	0 gr. 04
Cholestérine pure	0 gr. 01
Poudre de Foie	0 gr. 03
Poudre de Rate	0 gr. 02
Extrait mou de Colombo, Gentiane, Quassia amara, Sa	0 gr. 01
Pour 1 pilule.	

Excipient spécialement étudié - Enrobage soluble dans l'eau.

NOTA. - Le Gelsémium sempervirens ou Jasmin de Virginie, arbuste grimpant à fleurs jaunes, surtout employé en Amérique contre les névralgies, est la base de la *Céphalgi-Lysine*.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES -

Toutes douleurs tenaces de toutes régions.

----- TRÈS RARES CONTRE-INDICATIONS -----

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

La *Céphalgi-Lysine* se prend généralement 1/4 d'heure avant les repas.

Les pilules s'avalent avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

ADULTES :

1 pilule 1/4 d'heure avant chacun des 3 repas (matin, midi et soir)
pendant 20 jours consécutifs - Cesser 10 jours pour reprendre s'il y a lieu.

Pour la durée du traitement et pour doses supérieures,
se conformer aux indications du Médecin.

ADOLESCENTS : 2 pilules par jour (matin et soir).

ENFANTS (au-dessus de 8 ans) : 1 pilule par jour.

PRIX AU PUBLIC : 25 fr. 50 LE FLACON de 60 pilules

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS.

2, Rue Claude-Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11.)

CÉRÉBRINE FOURNIER

(Produit non opothérapique.)

Liqueur agréable, de composition définie, spécifique par excellence des migraines, névralgies rebelles, règles douloureuses.

Cérébrine simple. — Pour tous les cas en général de migraines et névralgies.

Cérébrine bromée. — Migraines, névralgies tenaces, agit efficacement contre les coliques menstruelles et les tranchées utérines.

Cérébrine bromo-iodée. — Névralgies rebelles à tous traitements antérieurs, névralgies faciales, sciatiques.

Cérébrine iodée. — Névralgies rhumatismales.

Cérébrine quiniée. — Courbature, grippe infectieuse.

Dose. — Une cuillerée à soupe dans un peu d'eau une heure avant le repas ou deux heures après. Renouveler au besoin la dose jusqu'à 3 cuillerées par 24 heures.

Prix. — 15 fr. 70 le flacon.

Lab^{re} de la Cérébrine Fournier

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 50-57.)

CÉRÉBRO-LIPASE

Comprimés.

Médication reconstituante opothérapique.

Composition. — Cerveau total de taureau fraîchement abattu, substances blanche et grise. Jusquiame. Méthylarsinate disodique.

En comprimés kératinisés et glutinisés solubles au contact de la sécrétion pancréatique et duodénale.

Indications. — Etats pré tuberculeux, Anémies, Asthénies, Grossesse, Dépression cérébrale, Surmenage, Convalescence, Déficiences sexuelles.

Action. — Stimulant général de l'organisme et de ses fonctions : circulation, nutrition, respiration. Excitant de l'assimilation et de l'hématopoïèse. Accroissement de résistance et d'euphorie.

Posologie. — *Adultes* : 2 comprimés par jour, 10 jours par mois ; durée moyenne du traitement : 3 mois.

Enfants : (à partir de 10 ans seulement) 1 comprimé tous les deux jours.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS.

(Tél. : Odéon 56-67.)

CÉRÉBRON

Antitoxine cérébrale.

Traitement des états neurasthéniques et des maladies nerveuses. Lipoides et cholestérine en solution huileuse.

Deux formes. — Boîte de 8 Ampoules de 2 cc. par injections sous-cutanées, boîte de 50 Capsules pour médication interne.

Action thérapeutique et usages :

Le *Cérébron* apporte aux cellules nerveuses les éléments de défense utiles pour lutter contre les toxines ; c'est, de plus, un excellent tonique du système nerveux. Prescrit surtout dans la neurasthénie quelle qu'en soit la cause, chez les personnes dont l'état physique est affaibli en même temps que leur résistance nerveuse ; l'anémie cérébrale, les troubles de la mémoire, l'affaiblissement intellectuel consécutif même à certaines lésions du système nerveux.

Posologie, mode d'emploi. — Une ou deux ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Capsules, 6 par jour, 2 capsules avant chacun des trois repas.

Prix : 30 francs.

Enregistré au L. N. C. M. n° 240-3.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré, Paris. Tél. : Opéra 68-80.

CÉRÉBROSTHÉNINE DALIN

Formes. — Gouttes acides, cachets et dragées neutres.

Compositions :

	Gouttes	Cachets	Dragées
Méthylarsinate de soude.....	0.015	—	—
Acide phosphorique.....	0.30	—	—
Vanadate de soude	0.001	0.001	0.0003
Nucléinate de Manganèse.....	0.05	0.05	0.017
Sulfate de Strychnine.....	0.001	0.001	0.0003
Glycérophosphates { chaux.....	—	0.15	0.05
{ magnésie.....	—	0.10	0.035
{ fer.....	—	0.15	0.05
Carbonate de chaux.....	—	0.48	0.016

Indications. — Toutes les maladies déficitaires ou par carence organique, asthénies, anémies, lymphatisme, neurasthénies, maladies consomptives, gripes, convalescences, tuberculose.

Posologie :

Gouttes : XX gouttes avant les deux principaux repas. — De 12 à 18 ans : 1 goutte par année d'âge.

Cachets : 1 cachet avant chacun des deux principaux repas.

Dragées : 2 dragées le matin, midi, soir, avant les repas.

De 12 à 18 ans : 1 dragée seulement avant les repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Échantillons sur demande :

C. DALIN, Pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B 36-32.)

CÉRÉOSSINE DEHAUSSY

(Simple)

Reconstituant physiologique.
Minéralisateur complet.

Os frais : Os longs d'animaux en période de croissance, traités avec leur moelle rouge (facteur antirachitique et de croissance contrôlé biologiquement sur le rat blanc carencé. Vitamines D naturelles).

Phytophosphine : dosée à 21 % de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Sels minéraux : Silice, Manganèse, Fer (hémoglobine).

Extrait parathyroïdien : Fixateur des sels minéraux.

Aucune contre-indication : ni Adrénaline ni Surrénale.

Indications :

États pré-tuberculeux et tuberculose, Affections osseuses, Troubles de croissance, Grossesse, Lactation, Convalescences, Surmenage.

Posologie :

Cachets : Adultes, 2 cachets. Enfants, 1 cachet.

Comprimés : Adultes, 2. Enfants, 1.

Poudre : Adultes, 2 cuill. à café. Enfants, 1 cuill. à café. Nourrissons, 1/2 cuill. à café.

Granulé fondant : Adultes, 4 cuillerées à café. Enfants, 2 cuill. à café. Nourrissons, 1 cuill. à café.

Prix :

La boîte de 40 cachets : 17 fr. 80

Granulé : 18 fr. 50

Comprimés : 17 fr. 10

Poudre : 17 fr. 70

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

CÉRÉOSSINE SURVITAMINÉE

(Céréossine irradiée.)

Vitamine D titrée biologiquement,
Associée au complexe organo-minéral « Céréossine ».
Triple contrôle : chimique, spectrophotométrique, biologique.

Indications :

Rachitisme : Pré-rachitisme, Croissance, Tuberculose,
Déménager : isation accentuée chez la femme enceinte et
la nourrice. Fractures, Chirurgie osseuse.

Posologie :

Cachets : prix 23 fr. 55

Chaque cachet contient une quantité de Vitamine D pure
correspondant à 2 600 unités internationales.

Adultes : 2 à 3 par jour.

Enfants : 1 par jour.

Granulé fondant : prix 21 fr. 35.

Cent grammes de granulé fondant contiennent une quan-
tité de Vitamine D pure correspondant à 40 000 unités
internationales.

Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées. *Nourrissons* : 1 cuillerée à café
par jour.

Conservation :

Dans les cachets, la vitamine D cristallisée pure est
incluse en un granule à noyau gras recouvert d'une cou-
che de sucre glace.

Dans les granulés, la vitamine D est enrobée en un véhi-
cule stéarique additionné d'un réducteur.

Dans l'une et l'autre forme, la conservation de l'activité
de la vitamine D est donc parfaitement assurée.

CÉRÉOSSINE MÉTHYLARSINÉE

Par cachet 0,020 de méthylarsinate de soude.

Posologie : *Adultes* : 2 cachets.

Enfants : 1 cachet.

Prix : 17 fr. 10

CÉRÉOSSINE GAÏACOLÉE

Posologie. — *Adultes* : 2 cachets.

Prix : 17 fr. 10

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CERINIL

Neutro-toxine des Terres Rares.

Composition. — Chlorure de cérium, chlorure de sodium, bromure de radium (traces), eau bidistillée.

Propriétés thérapeutiques. — Agglutine le B. de Koch, neutralise les toxines, provoque l'oxydase permanente du sang. Augmente dans des proportions considérables le pouvoir défensif de l'organisme.

Indications. — Tuberculoses : pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, cutanée, Pré-tuberculose. Anémie, scrofule, chlorose.

Posologie. — Voie buccale, dose progressive de V à XXX gouttes par jour, avant les repas.

Prix : 31 fr. 20 le flacon de 40 cc. environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1201-5

Laboratoires DECHATRE-LEBAS, Ph^{1er}
11, rue de Flandre, Paris-19^e (Nord 59-64).

CÉTHOCAL

Formules du Dr LEMAY, pour l'emploi d'un complexe Cerium-Thorium-Calcium, dans le traitement des dermatoses.

POUDRE ET PÂTE CÉTHOCAL

Dermatoses, Eczémas, Lupus, etc.

Hygiène des Bébés et de la peau.

Incolores, Inodores et sans Corps Gras.

GOUTTES CÉTHOCAL

Adjuvant interne de tout traitement des dermatoses. XV à XX gouttes au début des repas.

AMPOULES CÉTHOCAL

Psoriasis, Désensibilisation, Asthmes, etc.

OVULES CÉTHOCAL

Ulcérations du Col, Métrites.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS (XII^e).

CHARBONS FRAUDIN

Composition. — Association de charbons de peuplier et de saule sélectionnés doués d'un grand pouvoir absorbant, avec :
1° le Naphtol B.

CHARBON FRAUDIN NAPHTOLÉ

Granulés sphériques aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme, contenant 0 gr. 10 de Naphtol B par cuiller à café.

Pouvoir désinfectant considérable.

Indications thérapeutiques. — Gastro-entérites, Grippe intestinale, Intoxications de toute nature.
2° la Belladone.

CHARBON FRAUDIN BELLADONÉ

Granulés vermicellés fondants aromatisés à la menthe, contenant un centigramme d'extrait mou de Belladone Codex par cuiller à café. Sédatif, Antispasmodique, Modérateur des sécrétions.

Toutes les indications de la Belladone. Particulièrement dans les troubles intestinaux toxi-infectieux avec constipation. Tolérance absolue.

3° Sans principe médicamenteux.

CHARBON FRAUDIN SIMPLE

Granulés : D'un grand pouvoir absorbant, contiennent 3 grammes de charbon végétal par cuiller à café. Aromatisés à la menthe, à l'anis ou sans arôme.

Indications thérapeutiques. — Dyspepsies flatulentes, Aérophagie.

Comprimés : 0 gr. 75 de charbon sans sucre par comprimé. Recommandé aux diabétiques.

Laboratoire des CHARBONS FRAUDIN

4, av. Desfeux — BILLANCOURT (Seine).
(Tél. : Molitor 02-62.)

CHASVERS MICHEL

Composition. — Le « CHASVERS MICHEL » est à base d'essence de chêne de Jérusalem.

Action. — Assure la destruction rapide de tous les vers intestinaux (Lombricoïdes, Oxyures, Ascarides, etc.).

Présentation. — Chasvers Michel *adultes* : en capsules renfermant 0,20 d'essence (prix au public : 6 francs). Chasvers Michel *enfants* : en perles renfermant 0,10 d'essence (prix au public : 6 francs).

Posologie :

Chasvers Michel adultes : de 15 à 18 ans, une capsule le matin à jeun trois jours consécutifs.

Au-dessus de 18 ans : deux capsules le matin à jeun trois jours consécutifs.

Chasvers Michel enfants : de 8 à 12 ans, une perle le matin à jeun trois jours consécutifs.

De 12 à 15 ans : deux perles le matin à jeun trois jours consécutifs.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n° 1478-1 et 1478-2.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

CHELICYNE

Médicament des Troubles hépato-vésiculaires.

Composition :

Borate de soude.....	2 gr.
Chelidoine, Ext. fl.....	5 —
Combretum, Ext. fl.....	15 —
Cynara scolymus, Ext. fl.....	15 —
Ononis Spinos, Ext. fl.....	15 —
Excip. Glycériné aromatisé	Q. S. P. 100 cc.

Indications. — Toutes les maladies du Foie et de la Vésicule : Hépatites, Insuffisance hépatique, Diabètes, Cirrhoses avec ou sans ascite, Anasarque, Lithiase biliaire, Angiocholécystites, Ictères, etc...

Forme. — Solution concentrée. Le flacon : 125 cc. environ : 18 fr. 70.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans une infusion chaude (fumeterre de préférence), à prendre 3 fois par jour, avant les repas matin, midi et soir, ou deux heures après.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS,
47, rue Maleret — BORDEAUX.

CHÉLOÏDINE

Pommade résolutive et calmante
à base de Thiosinamine, salicylate de soude
et chlorhydrate d'amylène,
Dépourvue de toute toxicité.

Indications thérapeutiques. — Traitement du rhumatisme chronique, des cicatrices vicieuses et douloureuses, des scléroses.

Mode d'emploi. — Deux fois par jour, appliquer gros comme une noisette sur la surface malade et faire suivre d'un massage léger.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 14 12.)

CHENANTHOL

(Vers intestinaux.)

Ascaris, Ankylostome, Anguillule, Oxyures, Trichocéphale, etc.

Seule présentation officinale, dosée en volume, de l'essence pure américaine de Chenopode, suivant les prescriptions de la *Fondation Rockefeller*.

Posologie et mode d'emploi. — Capsules dosées en volume et non en gouttes (1/4 de cc. par capsule): On donne une capsule par 3 années d'âge ; maximum . 6 capsules en 3 doses, heure par heure. Purge saline : 1 heure 1/2 après la dernière.

Régime. — Pas de régime préparatoire. *Diète de rigueur* pendant le traitement jusqu'à effet complet de la purge.

Il est recommandé en cas d'infection profonde de renouveler le traitement au bout de 10 jours pour obtenir une cure radicale.

Prix de vente : 18 fr. 35.

Boîte de 12 capsules pour la double cure complète.

Numéro d'enregistrement au L. N. C. : 298-2.

Laboratoire L. HINGLAIS
ÉPERNAY (Marne). — Tél. : 106.

CHIBROMERCUROBROME

Dérivé Bromé de la Fluorescéine Mercurique. Puissant antiseptique
(50 fois plus que l'Argyrol à 5 p. 100).

Pour l'Ophthalmologie :

En pommade, à 1 p. 100.

En collyre, à 1 p. 100 (adultes) (en instillations uni ou biquotidiennes).

En collyre, à 1 p. 100 (nouveau-nés) (deux gouttes dans l'œil de l'enfant à la naissance).

Pour Chirurgie :

En solution, à 2 p. 100 (flacon de 30 grammes) (pour badigeonnages, comme puissant désinfectant du champ opératoire).

Pour plaies infectées, plaies suppurées (abcès, furoncle, flegmon, anthrax). Pour les lavages chirurgicaux, diminuer plus ou moins la dose d'eau.

Pour Gynécologie :

En solution, 2 p. 100 pour désinfection préventive de l'accouchement, badigeonnage externe et interne, ovules, ampoules, etc.

Pour médecine générale

Examen dans toutes les maladies des femmes, en badigeonnage.

Solution 2 ‰, flacon de 30 grammes. Ovules, boîte de 6.

En injections vaginales par ampoules, 1 ‰ i cc., boîte de 12.

Maladies des voies urinaires, pour blennorrhagies, en désinfection du canal de l'urètre. Solution 2 ‰. Collutoire.

En ampoules injectables 1 cc. 1 p. 100, par voie veineuse, pour infections généralisées, Septicémie, etc., boîte de 12.

En collutoire pour gorge et oreilles.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n° 1471-1 à 1471-6.

Laboratoire H. CHIBRET, 5, rue St-Hérem, Clermont-Fd (P.-de-D.)

Voir à Collyres CHIBRET et à Pommades CHIBRET.

CHLOCCI

(Le chlore occit les cocci.)

Antiseptique, non toxique, à base de chlore naissant.

Composition. — Poudre ou comprimés de paratoluène sulfochloramine sodique (0,25).

Indications. — Petite et grande chirurgie. Pansements humides, lavages. Gynécologie. Urologie.

Doses. — 5 comprimés par litre d'eau pour lavages, injections; 10 comprimés par litre d'eau pour lavage de plaies, pansements humides, goutte à goutte.

Aucune toxicité. — Aucune causticité.

Prix : 5 francs.

Laboratoire ADAM
Docteur en pharmacie
GRANVILLE (Manche).

CHLOMAG

Composition. — Chlorure de Magnésium. Bromure de Magnésium. Peroxyde de Magnésium.

Indications. — Tonique du système nerveux faisant disparaître la fatigue nerveuse. Action remarquable sur la peau ; guérison de l'Acné, amélioration des Psoriasis et des Prurits. Véritable préventif des Néoplasmes et des Tumeurs. Résultats efficaces dans le Rhumatisme chronique et dans les manifestations de l'Arthritisme.

Posologie. — 2 comprimés par jour, les prendre le matin à jeun avant le premier déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Pour obtenir un résultat rapide dans la lutte contre l'Arthritisme et le Rhumatisme, il est nécessaire de renouveler la dose avant le repas du soir.

En flacon de 45 comprimés. Prix : 14 fr. 55.

L. N. C. 428-2.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 18-54.)

CHLORAL BROMURÉ DUBOIS

Toni-sédatif nervin d'innocuité longuement éprouvée, préférable aux uréides et opiacés.

Tous les mérites de la synergie chloral-brome et de l'état dissous.

Pas d'accoutumance, ni d'anaphylaxie.

Composition :

Liquide sucré représentant en milieu dissimulant la saveur du chloral, n'irritant pas les muqueuses (formule du D^r Dubois), 0 gr. 40 chloral, 0 gr. 60 bromure, par cuiller à soupe.

Posologie :

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à soupe ou à café suivant l'âge. Névralgies, névroses, psychoses, malaises des hypertendus, tous troubles essentiels ou symptomatiques du système nerveux : chorée, épilepsie, coqueluche, dysménorrhée, etc. : 1 à 6 cuillerées à soupe ou à café selon l'âge, dans les 24 heures.

Prix : Flacon 25 fr. 50. — 1/2 flacon : 15 fr. 30.

(Taxe d'armement comprise).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-3.

DURIEZ, 20, place des Vosges — PARIS.

CHLORALOSANE

(α Chloralose pur, exempt de parachloralose.)

Propriétés. — Hypnotique non toxique, inaltérable. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Pas d'action nocive sur le cœur, le rein, les voies digestives. Peut être prescrit aux femmes pendant la grossesse, aux vieillards, aux enfants.

Indications. — Insomnies nerveuses, de fatigue, de surmenage. Insomnies des cardiaques, des dyspeptiques, des neurasthéniques.

Auxiliaire des anesthésies générales. Adjuvant aux cures de désintoxication (alcoolisme, morphinomanie).

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 3 comprimés 1/2 heure avant le coucher et au moins 1 heure 1/2 après le repas. Avant l'anesthésie générale : 2 comprimés la veille, ou 2 heures avant à la place de la piqûre de morphine-scopolamine. Après l'opération : 2 comprimés.

Présentation : Flacon de 20 comprimés à 0 gr. 15.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des É^{ts} KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin, PARIS (XVI^e).

Service commercial :

15, rue de La Baume - PARIS (VIII^e). (Tél. : Élys. 99-51.

CHLORAMINE FREYSSINGE

Sodium-paratoluène-sulfo-chloramine

Forme. — Pilules à enrobage de gluten, inattaquable par le suc gastrique.

Composition. — Chloramine T 0 gr. 05.
Charbon de peuplier pulvérisé 0 gr. 10.

Indications thérapeutiques. — Dysenteries, Entérites, Paratyphoïdes, Porteurs de germes, Colibacillose, Dermatoses, etc.

D'une innocuité absolue, elles permettent *réellement* de réaliser la désinfection de l'intestin (Fétidité des selles, etc.), sans porter atteinte à aucune de ses fonctions digestives.

Posologie. — 2 à 8 pilules par jour au commencement des principaux repas.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

CHLORAMMONIC

Acidifiant.

0 gr. 50 de chlorure d'ammonium par dragée glutinisée.

Seule forme pratique du plus énergique acidifiant.

Indications. — *Toutes alcaloses.*

Colibacillose, Infections urinaires, Lithiases rénales, Phosphaturie, Arthritisme, Asthénies, Insomnies, Convulsions, Épilepsie, Tics, Psychonévroses, Dermatoses, Asthme, etc.

L'acidification par le Chlorammonic renforce l'action des diurétiques mercuriels (Novurit) et de certains antiseptiques urinaires (sels de mandelium).

Posologie. — En moyenne 6 à 10 dragées par jour, à raison de 2 ou 3 avant chacun des principaux repas.

En association avec le Novurit, 9 à 12 dragées par jour, uniquement durant les deux jours qui précèdent chaque administration de Novurit (3 ou 4 dragées au cours de chacun des trois principaux repas).

Enfants : 1 à 6 dragées par jour, selon l'âge.

Avaler les dragées sans sucer ni croquer.

Boîtes de 50 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

CHLORÉTHYLE BENGUÉ

Composition. — Chlorure d'éthyle pur.

Propriétés et indications. — Anesthésie locale, névralgies, art dentaire, anesthésie générale.

Formes. — *Flacons verre :* 10 gr., à vis ; 15, 30, 50 gr., à vis et à clapet. Fermeture à clapet très pratique. — *Flacons métal :* 50 et 100 gr., fermeture à vis et à clapet ; appareils automatiques pour l'art dentaire. — *Appareils jets variables, capillaires et pulvérisateurs.* — *Bidons de remplissage* 500 gr., 1 et 2 kg.

Anestile Bengué. — Mélange de chlorure d'éthyle et de méthyle volatil à 2°. Anesthésies locales, névralgies.

Narcotile Bengué. — Chlorure d'éthyle pur pour anesthésie générale. Flacons verre 50 gr. gradués, à gros jet, fermeture à clapet. Ampoules scellées de 1, 2, 3 et 5 cc., pour anesthésies générales.

Chlorure de méthyle pur. — Siphons de 250 gr., 500 gr. et 1 kg. Utilisation par pulvérisations au jet.

Indications. — Sciaticques rebelles, Lumbagos rebelles, Douleurs ataxiques.

Particularité. — Liquides inflammables.

Prix. — Suivant nature des réipients.

L. N. C. M., n° 516-1.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils,

Pharmaciens,

16, rue Ballu, PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 85-60.)

CHLORIDIA

Pepsine — Chlorhydro — Cocaïnée — Chloroformique.

Indications. — Dyspepsie, gastralgie, crampes, renvois, vertige stomacal, dilatation de l'estomac et, en général, toutes les maladies de l'estomac se reliant à une insuffisance de sécrétion du suc gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Le Chloridia restitue au suc gastrique tout son pouvoir digestif par l'effet de la pepsine et de l'acide chlorhydrique, oppose aux fermentations putrides l'action antiseptique de son eau chloroformée, et fait disparaître les sensations douloureuses grâce à la présence d'une légère quantité de chlorhydrate de cocaïne.

Forme et dose. — Le Chloridia est un liquide limpide de saveur sucrée et agréable, que l'on prend à la dose d'une cuillerée à café dans un quart de verre d'eau au commencement de chaque repas.

Les personnes qui n'obtiennent pas un soulagement rapide peuvent doubler la dose ou diminuer la quantité d'eau.

Prix : 18 fr. 75

L. N. C. n° 437-1

**Laboratoires des PRODUITS DANNEC'H
BRUN ET MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). Tél. : Arch. 87-44.
R. du C. Seine 218-670.

CHLORYPEPSINE

Comprimés.

Combinaison stable de HCL « ionisé » et pepsine.

Formule. — Chaque comprimé correspond à

HCL dilué officinal.....	V gouttes.
Pepsine titre 100	0 gr. 25

Action physiologique. — La Chloripepsine agit selon le moment de son absorption :

Avant ou au *début* du repas : stimule la sécrétion gastrique (HCL libre), complète et assure la digestion pepsique (HCL + pepsine), régularise le réflexe pylorique, agit sur les fermentations.

Après le repas, dans l'hyperchlorhydrie, son HCL libre déclenche une sécrétion de mucine qui protège la muqueuse et supprime la sensation de brûlures.

Indications thérapeutiques. — Insuffisances gastriques, Dyspepsies hypopeptiques, Hypo et anachlorhydrie, Pyrosis, Fermentations.

Posologie. — *Adultes* : de 1/2 à 3 comprimés généralement avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou coupée de vin.

Nourrissons : commencer par 1/2 comprimé.

Prix. Le tube de 22 comprimés : 15 francs.

LABORATOIRES BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (8^e). (Laborde 08-51.)

CHLORO-CALCION

Forme : Solution.

Composition :

Solution titrée de *Chlorure de calcium* cristallisé, chimiquement pur, stabilisé.

LXXX gouttes (ou 1/2 cuiller à café) = 1 gr. CaCl^2 .

Indications :

Recalcifiant : Croissance, Tuberculose, Entérites, Carie dentaire, Spasmophilie, Accidents sériques, Grossesse, Allaitement.

Hémostatique : Toutes hémorragies ; et comme préventif des hémorragies post-opératoires.

Diurétique déchlorurant : Albuminuries, Néphrites, Pleurésies, Ascite, Œdèmes.

Mode d'emploi et Doses :

Dans de l'eau sucrée, avant les repas.

Chez les enfants au-dessous de 10 ans :

IV gouttes par année comme *recalcifiant* ;

XX gouttes par année comme *hémostatique* ;

X à C gouttes comme *anti-albuminurique* ;

L à CC gouttes contre les *accidents sériques* ;

3 à 6 fois LXXX gouttes dans la *spasmophilie*.

Chez les adultes :

XL gouttes 2 fois par jour comme *recalcifiant* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *hémostatique* ;

L à CL gouttes par jour comme *anti-albuminurique* ;

3 à 10 cuillers à café comme *diurétique* ;

LXXX gouttes 4 fois par jour comme *anti-sérique*.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e).
(Tél. 5: Galvani 73-50, 51.)

CHLOROFORME ADRIAN

Composition. — Chloroforme chimiquement pur, préparé spécialement pour l'anesthésie. Répond entièrement aux conditions de pureté exigées par le Codex français.

Indication. — Anesthésie générale.

Présentation :

a. Ampoules de 15, 30, 60 gr.

b. Flacons de 30, 60, 125, 250, 500 gr. et 1 kilog.

Prix : Flacon de 30 gr. : 7 fr. 45

— 60 — : 12 fr. 80

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 15 gr. : 7 fr. 50.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 30 gr. : 11 fr. 50.

Ampoule ordinaire et ampoule compte-gouttes de 60 gr. : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 523-34.

Société Française de Produits pharmaceutiques
Anc^t ADRIAN et C^o

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORO-MAGNÉSION

Composition. — Solution titrée et stabilisée de Chlorure de magnésium pur sec, et de Chlorure de calcium pur cristallisé.

XXX gouttes — 1 gr. 20 $MgCl^2$ — 0 gr. 50 $CaCl^2$.

Indications. — Asthénie, Régulation de la sécrétion biliaire, Instabilité intestinale (notamment enfants et nourrissons), Désensibilisation, Urologie, Dermatologie (Verrues, Papillomes, Cancer), Tremblements.

Emplol. — Dix jours sur quinze :

Adultes : XV gouttes avant chacun des 2 principaux repas ou XXX gouttes le matin à jeun.

Enfants : 3 fois V gouttes.

Nourrissons : 3 fois III gouttes.

Accidents Sériques. — **Urticaires** : C gouttes en 4 ou 5 fois dans la journée pendant 3 à 5 jours.

Enfants : LX gouttes.

Enreg. au L. N. C. n° 27-1.

Prix : 14 fr. 60.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS. (Tél. : Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

CHLORUMAGÈNE

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Poudre.

Composition. — Hydroxyde de magnésium pur
Codex *de densité constante* sans odeur ni saveur.

Propriétés. — Au contact du suc gastrique *formation de chlorure de magnésium pur à l'état naissant à l'exclusion de tout autre sel halogène* (fluorure, bromure, iodure) ; de ce fait aucune contre-indication.

Régulateur de l'intestin convenant à tous les âges.

Indications. — Toutes les indications du chlorure de magnésium. Déficience de la cellule nerveuse. Troubles du sympathique. Hypertension artérielle. Constipation habituelle, entérites, etc.

Doses habituelles. — Une cuillerée à café délayée dans un peu d'eau ou de lait.

Prix : 21 francs pour un mois. — L. C. M. n° 563.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

CHLORURE D'AMMONIUM BRÉANT

Comprimés glutinisés.

Composition. — Chlorure d'ammonium pur, comprimés à 0,25 et glutinisés.

Indications. — Acidifiant urinaire énergique, antilithiasique, adjuvant de la vaccinothérapie anticolibacillaire dans les manifestations urinaires. •

Posologie. — 8 à 10 comprimés par jour.
Avaler sans croquer à chacun des repas.

Prix du flacon : 15 fr. 60.

**LABORATOIRE D'ANALYSES
BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

CHLORURE D'ÉTHYLE ADRIAN

Composition. — Chlorure d'éthyle préparé spécialement pour les anesthésies locales et générales.

Indication. — Anesthésies locales et générales.

Présentation et prix :	a. La boîte de 2 ampoules de		1 cc. : 3 fr. 70.
	—	2 —	2 cc. : 4 fr. 25.
	—	2 —	3 cc. : 4 fr. 75.
	—	2 —	4 cc. : 5 fr. 30.
	—	2 —	5 cc. : 6 fr. 40.
	b. La boîte de 1 ampoule de		10 cc. : 5 fr. 30.
	—	2 —	10 cc. : 7 fr. 95.
	—	6 —	10 cc. : 17 fr. 55.
	—	10 —	10 cc. : 27 fr. 70.
	—	1 —	25 cc. : 7 fr. 95.
	c. La boîte de 6 ampoules de		1 cc. : 9 fr. 05.
	—	6 —	2 cc. : 9 fr. 60.
	—	6 —	3 cc. : 10 fr. 65.
	—	6 —	4 cc. : 11 fr. 70.
	—	6 —	5 cc. : 13 fr. 85.
	—	6 —	25 cc. : 31 fr. 95.
	—	10 —	25 cc. : 63 fr. 90.

Tube métal de 50 grammes : 16 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 523-5.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e). (Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHLORURE DE MAGNÉSIUM ADRIAN

Composition :

Chlorure de magnésium anhydre : 0 gr. 121 pour un comprimé dragéifié.

Propriétés :

Tonique général et nervin, préventif des néoplasmes, régulateur des fonctions digestives et hépatiques.

Indications :

Asthénie, surmenage, convalescence, épuisement, neurasthénie, troubles digestifs, dermatoses, ver-
rues, thérapeutique antinéoplasique.

Présentation. — Comprimés.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 10 comprimés par jour.

Prix : 21 fr. 30 le flacon.

Enregistré au L. N. C. n° 523-37.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

CHOCOCHAUX

Recalcifiant, Hémostatique.

Composition. — Gluconate de Calcium enrobé dans un mélange de cacao malt et sucre.

Présentation. — Tablette de 16 divisions. Chaque division contient 1 gr. 50 de gluconate de calcium.

Indications. — Toutes les déficiences calciques de l'enfant et de l'adulte.

Médication adjuvante de la cure antinéoplasique par le Barcan.

Posologie. — 1 à 4 divisions par jour.

Prix. — Tablette de 16 divisions : 17 fr. 85.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux, des Ministères des Colonies et de la Marine.

79, rue de Paris, à SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 24-30.)

CHOCYNOL

Comprimés cholagogues et cholérétiques atoxiques.

Association des extraits stabilisés d'Artichaut et de Boldo aux Extrait Biliaire purifié et Extrait Hépatique total : 5 centigrammes de chaque par comprimé glutinisé et dragéifié.

Indications. — *Toutes insuffisances hépatiques.* Troubles circulatoires s'y rattachant. Insuffisance cardiaque, Hypertension, Cirrhoses infectieuses, toxiques, etc.

Troubles biliaires. — Lithiases, Ictères, Coliques hépatiques, Prurits, Migraines, Asthmes, etc. Auto-intoxications, Arthritisme, Dyspepsie d'origine hépatique, Paludisme, Foie des Coloniaux.

Présentation médicale. — La boîte (48 comprimés glutinisés) : 16 francs. (Soit 8 à 12 jours de traitement.)

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour répartis aux repas. **Aucune toxicité.**

Prix : 16 francs (au 11 Février 1938).

Laboratoires du « CHOCYNOL »

G. et J. HUYGHE, Pharmaciens

BRAZEY-EN-PLAINE (Côte-d'Or). (Tél. : 19.)

CHOLAGOL

Insuffisance Hépato-Intestinale.

Présentation. — Granulé fondant d'un goût agréable
(Cholagogue antiseptique et antitoxique).

Formule :

Calomel.....	0,05
Peptone de Witte.....	5,50
Sulfate de magnésie desséché	25 gr.

Indications. — Toutes les fois qu'à un titre quelconque il faudra drainer foie et tube digestif, produire une sécrétion et excrétion biliaire plus active, une exonération intestinale plus complète.

Ictères, Subictères, Angiocholites, Cholémie.

Lithiase hépato-intestino-rénale, Constipation.

Migraines, Amaigrissements, Vertiges.

Posologie. — Une cuillerée à café, à dessert ou à soupe, demi-heure avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau.

Rester couché sur le côté droit pendant ce temps.

Prix : 19 fr. 25.

Laboratoires REBOUL

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CHOLAL

Ampoules buvables.

Traitement causal de la Lithiase biliaire. Préventif et curatif

La Lithiase biliaire est provoquée par la floculation et la coagulation de la mucine, entraînant ensuite la cristallisation de la cholestérine. La cause déterminante de ce phénomène réside dans une tendance acidosique de l'ambiance hépato-biliaire.

Composition et mode d'action. — Les complexes ioniques minéraux de Cholal sont de vrais proto-colloïdes qui, par catalyse, corrigent le déséquilibre acido-basique par action sur le terrain humoral et tissulaire, et ramènent l'ambiance hépato-biliaire à la faible alcalose physiologique ; leur mécanisme d'action peut se comparer, par certains points, à celui d'une eau minérale prise à la source.

Sous cette action, l'ambiance, redevenue physiologique, s'oppose à la formation de concrétions nouvelles ; en même temps, on constate que les calculs existants se désagrègent lentement et sont ensuite éliminés. A la différence des cholagogues ou des cholérétiques habituels, Cholal est un modificateur du terrain et constitue de ce fait le traitement causal de la lithiase biliaire, aussi bien préventif que curatif.

Indications. — *Lithiase biliaire* : Congestion du foie. Coliques hépatiques. Ictère. Constipation d'origine hépatique. Troubles hépato-biliaires, etc...

Posologie. — L'efficacité de *Cholal* se traduit toujours dès la première quinzaine par différents symptômes qui rendent son traitement facile en clientèle (bien-être remarquable, éclaircissement du teint, atténuation et disparition des divers troubles).

Bien entendu, pour être vraiment curatif, ce traitement devra être prolongé. En pratique, la posologie optima devra prévoir :

1° Traitement d'attaque :

a. *Cas général* : durant un mois au minimum, une ampoule Cholal par jour à prendre le matin à jeun dans un verre d'eau une demi-heure environ avant toute ingestion.

Au besoin, ce traitement sera prolongé (pas d'accoutumance). Exiger la persévérance.

b. *Cas particuliers* : il est exceptionnel que le traitement normal ne soit pas toléré de façon absolument parfaite. Toutefois, si le médecin traitant juge préférable d'instaurer d'abord un traitement atténué, il lui suffira de prescrire un jour de Cholal pour deux ou trois jours de repos.

Le praticien pourra ainsi tâter la sensibilité du sujet, s'assurer par avance de son état exact et fixer ensuite, en toute connaissance de cause, le moment où le traitement normal pourra être entrepris.

2° Traitement d'entretien :

Par la suite, prescrire un traitement d'entretien, avec décades alternées de cure et de repos.

Après satisfaction continuée, on conseillera (pour éviter les récidives) une cure de printemps et une cure d'automne comportant au début de ces saisons 2 ou 3 décades de Cholal séparées par des repos équivalents.

N. B. — Pas de régime spécial. Une alimentation variée est à conseiller. Toutefois, faire usage du vin avec modération, proscrire l'alcool et en général éviter tous excès.

Pas de contre-indications permanentes, ni intolérance, ni accoutumance. Le Cholal est inoffensif et sans saveur.

Présentation et Prix de Vente.

Coffret Cholal 30 ampoules (modèle normal) pour un mois de traitement..... 36 fr. 50
Boîte Cholal 15 ampoules (petit modèle)..... 21 fr. 90
Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-3.

Laboratoires UROCLASE

G. BERTIN, Pharmacien, 95, rue de Prony — PARIS (XVII°).

(Tél. : Carnot 03-80.)

CHOLAXOL

Pilules.

Thérapeutique hépato-rénale.

Extrait mou de Taraxacum	0,005
— mou de Raphanus.....	0,005
— (napus) Brassica.....	0,005
— (napus) Cynara.....	0,02
— (frangula) Rhamnus	0,01
Bile décholestérinée.....	0,01
Garcinia hamburyi.....	0,0005
Ortosiphon pulvérisé.....	0,05

Pour une pilule vernie.

Stimule la cellule hépatique.

Stimule l'épithélium rénal.

Troubles hépatiques organiques ou réflexes.
Boues biliaires, Amibiase, Affections gastro-intestinales ou rénales.

Doses. — 2 à 6 pilules par jour aux repas.

Etui de 60 pilules : 18 francs.

Laboratoire AXOS

A. BOUNIOL, pharmacien,
3, rue Sarrette — PARIS (XIV^e).

CHOLÉCYSTINE

Pilules kératinisées de sulfate de magnésie.

*Réalisation en thérapeutique journalière de
l'épreuve de Meltzer-Lyon.*

Forme. — Pilules kératinisées de sulfate de magnésie dosées à 0,30 cgr. *La variété peptonée renferme en plus 0,05 cgr. de peptone.*

Indications. — Cholécystites aiguës et chroniques, ictères, migraines, entéro-colites muco-membraneuses.

Doses. — 6 à 10 pilules par jour, en une fois, le matin à jeun, ou en plusieurs fois, trois quarts d'heure avant les repas.

VINCENT, pharmacien.

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

CHOLÉFLUINE

Forme. — Granulé soluble, agréable au goût.

Composition :

Sulfate de magnésie	28 gr.
3 Peptones (Viande, Poisson, dite de Witte)	9 gr.
Hyposulfite de soude	4 gr.
Extrait de Boldo	2 gr. 50
Sucre parfumé. Q. S. pour	100 gr.

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, Lithiasse biliaire, Ictère, Insuffisance hépatique et ses conséquences, Intoxications alimentaires, Dermatoses récidivantes, Migraines, Urticaires, Troubles digestifs variés.

Contre-indication (temporaire). — Cholécystites aiguës.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède. Se coucher ensuite 10 minutes sur le côté droit.

Particularités :

Polyvalence peptonique sélectionnée au maximum :

- 1^o Peptone de viande.
- 2^o Peptone dite de Witte.
- 3^o Peptone de Poisson.

Activité cholagogue renforcée par extrait de Boldo, **Action antifloculente et anti-anaphylactique** par **Hyposulfite de soude**.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

CHOLÉFLUINE

Forme. — Comprimés.

Composition :

Sulfate de magnésie.....	0,20
Peptone de viande.....	0,03
Peptone de poisson.....	0,03
Peptone dite de Witte.....	0,03
Hyposulfite de soude	0,05
Extrait sec de boldo	0,01
Extrait sec d'artichaut	0,02
Excipient.....	Q. S. pour 1 comprimé.

Mêmes composants que le granulé, avec, en plus, *extrait d'artichaut*.

Mêmes Indications. — *Traitement d'entretien après traitement d'attaque par la Choléfluine granulée, anti-anaphylactique.*

Posologie. — 2 matin, midi et soir avant manger.

Pour diabétiques : 9 comprimés pris le matin 1/2 heure avant manger remplacent 2 cuillerées à café de *Choléfluine granulée*.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreux — PARIS (11^e).

CHOLÉINE CAMUS

Extrait inaltérable de fiel de bœuf, capsules dosées à 0 gr. 20.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, 2 ou 3 à la fin de chaque repas.

Propriétés thérapeutiques. — Opothérapie biliaire. *Cholagogue total*: Cholérétique « sécrétion », Cholécystokinétique « excrétion ».

Indications. — Lithiase Biliaire, Coliques Hépatiques, Ictère, Cholémie, Constipation, Entéro-Colites, Dyspepsie, Auto-Intoxication.

Prix : 15 fr. (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉINE LACTIQUE

Opothérapie biliaire et ferments lactiques.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 6 capsules par jour, dosées à 0 gr. 20, à la fin des repas.

Indications. — Congestion du foie, Lithiase, Cholécystite, Acholie, Ictères, Hépatites, Cirrhoses, Cholémie, Phénomènes gastro-intestinaux, Constipation, Colite muco-membraneuse, Arthritisme.

Prix : 15 fr. (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

CHOLÉLYSE

Médicament spécifique et préventif de la Colique Hépatique et de la Lithiase Biliaire, à base d'Acide oléique pur, d'après les études du D^r ARTAULT DE VEVEY.

Mode d'emploi. — La CHOLÉLYSE, en capsules dosées à 0,50 d'Acide oléique, se prend à jeun, pendant 10 jours par mois, par mesure préventive dans les cas de coliques mensuelles, ou, en cas de crises, 2 à 3 capsules d'un coup, dose qu'on peut renouveler un peu plus tard.

Prix : 19 fr. 50.

Préparé par

L. CARBOU, Pharmacien

8, rue Jean-du-Bellay — PARIS (IV^e).
(Tél. : Odéon 39-09.)

CHOLÉO-COMBRETOL BOLDINISÉ

Composition. — Extrait de Combretum. Extraits biliaires boldine et boldo.

Propriétés. — Opothérapie et Phythothérapie associées : Cholagogue, Diurétique, Eupeptique, Antitoxique, Laxatif.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Cirrhoses, Ictères, Cholécystites, Cholémie, Constipation, Entéro-Colite muco-membraneuse. Fièvre bilieuse hématurique et toutes intoxications.

Dose. — Prescrire 1 à 2 pilules après chacun des deux grands repas.

Prix : 12 fr. 50.

Flac. : 15 jours de traitement environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-3.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

CHOLÉO-FLUASE

Composition :

Sulfate de magnésie desséché	28 gr.
Peptone purifiée	5 gr.
Charbon activé	2 gr.
Surrénine	1 gr. 6
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé fondant.

Indications. — Agent cholagogue énergique. Traitement des troubles digestifs spéciaux d'origine hépatique. Migraines, vertiges, nausées, Urticaire, etc.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour dans de l'eau tiède ou une infusion, 1/2 dose pour les enfants.

Prix : 18 fr. 50.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-2.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

CHOLÉOKINASE

Extrait spécial de fiel de bœuf et de kinase.

Dragées ovoïdes kératinisées dosées

à : Bile en pâte : 0,20 ; Secrétine : 0,003.

Doses et mode d'emploi. — 6 dragées par jour en 3 doses égales, à la fin du déjeuner, à la fin du dîner, le soir, en se couchant. Ces doses peuvent même être doublées au début du traitement.

Propriétés thérapeutiques. — Active les sécrétions biliaire et pancréatique, améliore la digestion duodénale.

Indications. — *Entérocolite muco-membraneuse*, angiocholite, cholémie familiale.

Prix : 18 francs.

**Société Industrielle de Thérapeutique
Scientifique Appliquée**

**Laboratoires du Dr Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

CHOLÉO-LACTOL DAGUIN

Forme : Comprimés. Formule nouvelle avec **Boldo total.**

Composition :

Boldo total.....	0,035
Entérokinase	0,05
Ferments lactiques sélectionnés...	0,005
Pancréatine	0,10
Extraits biliaires dépigmentés.....	0,10
par comprimé.	

Dose :

Adultes : 4 à 6 par jour, 1/2 heure avant les repas.

Enfants : 1/2 dose. Avaler sans croquer.

Indications. — Infections intestinales et auto-intoxications. Toutes affections hépatiques. Diarrhées estivales. Troubles de la peau.

Prix : 14 fr. 90.

Échantillons sur demande.

Laboratoire DAGUIN, à SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 00-27.)

CHOLÉOLAX COLAS

Association des trois Cholagogues vrais.

Forme. — Granulés friables, aromatisés à la vanille, agréables au goût.

Composition. — Huile d'olive vierge, Sulfate de magnésie desséché, Peptone.

Propriétés thérapeutiques. — Draine la vésicule biliaire, Décongestionne le foie, Combat la constipation et les fermentations, sans irriter l'intestin.

Indications. — Infection et stase vésiculaires, Cholécytites aiguës et chroniques, Atonie de la vésicule, Hépatisme, Congestions actives et passives du foie, Constipation chronique et ses complications.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun pur ou dans un peu d'eau. *Enfants* : 1/2 doses.

Prix : 17 fr. 40.

Laboratoires Robert COLAS

Docteur en Pharmacie.

133, rue Lecourbe — PARIS.

(Tél. : Vaugirard 48-10.)

CHOLÉOPEPTINE

Le plus actif des Cholagogues.

Présentation. — Granulé soluble.

Composition. — Salicylate de soude, Peptone, Sulfate de Magnésie, Urotropine et Charbon activé.

Propriétés. — Augmente de plus de 50 p. 100 la sécrétion biliaire, facilite la dissolution des calculs vésiculaires.

Indications. — Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Rétention, Ictère, Herpès, Migraines rebelles, Urticaires, Nausées, Asthénie d'origine hépatique. Utilisé avec succès dans le Zona.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau ; 10 jours par mois.

Dans le Zona, faire prendre en plus une cuillerée à café après les repas de midi et du soir.

Enfants : De 1/2 à 1 cuillerée à café, le matin à jeun.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires MARCEL LOGEAS

Docteur en pharmacie.

24, rue des Plantes et 1, rue Bénard — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Suffren 03-38.)

CHOLÉO-ZYMATINE LESCÈNE

Composition. — Peptones associées (Viande, Poisson, Lait, Œuf, Gluten), Formine et sels de magnésie à faible dose. Artichaut, Zymatine.

Propriétés. — Décongestionnant hépatique, Pansement intestinal, Cholagogue alcalin, Laxatif doux, Antiémétique, Antichoc.

Action douce et non irritante.

Indications. — Affections hépato-biliaires, Anaphylaxies, Dermatoses, Troubles du sympathique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau (chaude de préférence) ou une cuillerée à café avant les repas.

Une boîte contient 8 jours de Traitement à 3 cuillerées à café par jour.

Laboratoires LESOÈNE

58, rue de Vouillé — PARIS (XV^e) Tél. Vaug. 08-19.
et LIVAROT (Calvados).

CHOLÉRÈNE (comprimés)

Médication cholagogue.

Drainage des voies biliaires.

Solubilisation du Cholestérol de la bile.

Formule. — 1 comprimé *glutinisé* contient :

Extrait de boldo	0,01
Extrait de Romarin.....	0,02
Extrait d'Artichaut.....	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée	0,05
Oléate de soude	0,20

Indications thérapeutiques. — Insuffisance hépatique. Ictère catarrhal. Etats congestifs du foie. Coliques hépatiques. *Lithiase biliaire*. Cholécystites.

Posologie. — De 2 à 4 comprimés par jour avant les repas.

Cure d'entretien : 2 comprimés le matin à jeun.

La boîte de 45 comprimés : 19 francs.

Laboratoire MARCEAU

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e).

Tél. : Laborde 08-51.

D^r A. GRIGAUT et A. BOUTROUX, pharmaciens
Chefs de Laboratoire à la Faculté de Médecine.

CHOLERGINE

Médication Antitoxique,

Colloïdes et Lipoides. Principes définis du foie et de la bile de taureau dissous dans l'huile végétale.

Soc. de Thérapeutique (1911-1912). — Académie de Médecine (1911). — Soc. Inter. de la Tuberculose (1911). — Académie des Sciences (1912). — Soc. de Biologie (1911). — Congrès de l'Ass. Fr. p^r l'Av. des Sciences (1911). — Soc. de Pathologie Comparée (1913-1914), etc... Deux formules : Cholergine simple, Cholergine camphrée.

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection tous les 2 jours, chaque série comprenant 20 à 30 injections avec arrêt de quelques jours entre chaque dizaine.

Injection intramusculaire profonde, aux points d'élection.

Injecter lentement.

Propriétés. — Antitoxique, antibacillaire et dynamogénique. — Tuberculose, Insuffisance hépatique, Convalescence des maladies infectieuses.

Préparation sans similaires employée journellement dans les hôpitaux.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 28 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

CHOLOFLUOL

Composition :

Sulfate de magnésium anhydre	20
Sulfate de sodium anhydre.....	2
Citrate trisodique	2
Bicarbonate de soude.....	1
Benzoate de soude	5
Chlorure de sodium	1
Chlorure de magnésium anhydre	0,50
Saccharose. Q. S.....	100 gr.

Propriétés. — Cholagogue, antiseptique des voies biliaires, stimulant et régularisateur des fonctions hépato-vésiculaires.

Indications. — Insuffisance hépatique, ictères, cholémie familiale, cholécystite, angocholite et toutes infections des voies biliaires.

Présentation. — Granulé friable, entièrement soluble et sans goût.

Prix : 18 fr. 50 le flacon de 110 grammes.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 cuillères à café le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède, 1/2 heure environ avant le petit déjeuner.

Laboratoire F. LAGARCE

Docteur en Pharmacie

13, place de la Nation — PARIS.

(Tél. : Diderot 61-05.)

CHOPHYTOL-Gouttes. CHOPHYTOL-Dragées.

Le *Chophytol* est à base d'extrait de *Cynara frais* (Artichaut), préparé s. l. f. G.-E. Rosa (100 cc. de gouttes ou 200 dragées correspondant à 2 kilos de suc de *Cynara frais*). Stimulant de la cellule hépatique et de l'épithélium rénal, il exerce des actions cholérétique et diurétique, et modifie le métabolisme du cholestérol et de l'urée.

Actions et indications :

- a. Action toni-hépatique et cholérétique : Toutes les insuffisances hépatiques aiguës ou chroniques, Hépto-néphrites et Hépatites diverses, Ictères, Cirrhoses à leur début, Congestions active et passive du foie, Surmenage hépatique des pléthoriques et des coloniaux, Excès de bonne chère, Angiocholites et Cholécystites, Urticaire et Accidents sériques, et dans tous les cas où une maladie générale ou des états diathésiques ont un retentissement ou une étiologie hépatiques.
 - b. Action sur le métabolisme du Cholestérol, par augmentation du pouvoir cholestérolitique du sérum, avec mobilisation et élimination des déchets tissulaires cholestériniques : Polysclérose artérielle, Athéromes et Artérites, Hypercholestérolémies de l'âge mûr et de la vieillesse, Précipitations oculaires cutanées ou autres, États diathésiques à pouvoir cholestérolitique négatif.
 - c. Action diurétique : Oliguries des néphrites aiguës ou chroniques, Oliguries des maladies fébriles, des Congestions pulmonaires et de tous les états infectieux à retentissement rénal, Oliguries au cours des infiltrations séreuses et tissulaires d'origine cardiaque, rénale ou autre (Œdèmes, Ascites, Pleurésies, etc...).
- Oliguries et anuries des intoxiqués, des brûlés, des infectés, des opérés.
- d. Action sur le métabolisme des corps azotés toxiques, avec transformation en urée et élimination : Insuffisance rénale aiguë ou chronique, Rétention azotée, Azotémie d'alarme de Widal et états préurémiques, Constante d'Ambard élevée, Dysfonctionnement uréogénique d'origine médicale ou chirurgicale, Néphrose lipopidique et certaines albuminuries.

Quelques indications particulières :

En pédiatrie : Troubles digestifs (vomissements de type acétonémique, digestions difficiles) ou cutanés (Prurigo strophulus, Urticaire, Eczéma), en rapport avec l'insuffisance fonctionnelle du foie.

En chirurgie : Traitement pré- et post-opératoire des insuffisants hépatiques et des rénaux à Constante d'Ambard et azotémie élevées. Évite les inconvénients de l'hyperazotémie et de l'oligurie ou l'anurie secondaires aux interventions.

Enfin, au cours de manifestations anaphylactiques ou diathésiques générales, où le rôle d'une déficience hépatique peut être incriminé.

Posologie. — X gouttes correspondent à 1 dragée.

Adultes : 60 à 120 gouttes par jour en 2 ou 3 fois aux repas dans un peu de liquide sucré ou non ; 6 à 12 dragées par jour dans les mêmes conditions.

Cure de 10 à 20 jours par mois.

Enfants : 1/4 ou 1/2 dose suivant l'âge. Les dragées peuvent être écrasées et mélangées aux aliments (purée, confitures). Il est préférable de donner des gouttes.

Nourrissons : X à XX gouttes par jour.

Étant donné l'absence de toxicité, ces doses peuvent être augmentées et modifiées suivant l'acuité des symptômes.

Présentation :

1/2 flacon, flacon et triple flacon.

Étui de 60 dragées et triple étui de 180 dragées.

N. B. — La richesse en principe actif du *Chophytol*, sous toutes ses formes, permet au praticien d'obtenir toujours une action rapide et constante.

Les formes perorales (dragées et gouttes) peuvent être utilisées soit isolément soit parallèlement à la forme injectable.

Spécialités légales de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA

« La Feuille fraîche d'Artichaut
en Thérapeutique »,

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. Etoile : 09-63.)

CHOPHYTOL-ROSA

Cristallisé injectable.

Boîtes de 6, 12 et 25 ampoules de 5 cc.

Médication préventive et curative de la Rétention azotée, de la Polysclérose et de l'Oligurie, à base du *principe actif cristallisé* de Cynara frais (artichaut), isolé par G.-E. ROSA en 1933. (6 ampoules correspondent à plus de 1 kilo de suc de Cynara frais.)

Propriétés. — *a.* Stimule la cellule hépatique ;
b. Stimule l'épithélium rénal (active l'élimination uréique et la diurèse).

Indications. — Troubles hépato-rénaux :

1° Dysfonctionnement et Insuffisance hépatiques :

Hépatites subaiguës et chroniques, Cirrhoses au début, Foie cardiaque, Congestion du foie et Hépatisme, Foie colonial, Ictères, etc...

2° Surcharge cholestérinique des tissus : Polysclérose artérielle et Athéromes, Artérites, Hypercholestérolémie, Xanthélasma, Troubles oculaires, etc...

3° Dysfonctionnement et insuffisance du rein :

Oliguries diverses (maladies infectieuses : Grippe, pneumonie, etc.), Néphrites aiguës infectieuses ou toxiques, Manifestations du brightisme, Azotémie « d'alarme », Néphrites hypertensives, Infiltrations séreuses (Œdèmes, Ascites, Pleurésies, etc.).

4° Traitement pré-opératoire et post-opératoire, particulièrement chez les Hépatiques, les Insuffisants rénaux à azotémie et Constante d'Ambard élevées (Adénomes prostatiques, Tuberculose et Lithiase rénales, Fibromes utérins et Kystes ovariens).

5° Manifestations anaphylactiques cutanées de l'insuffisance hépatique (Urticaire, Prurigo des enfants, Eczémas, Dermatoses prurigineuses ou non).
Manifestations générales de la diathèse neuro-arthritique. Sert de complément à l'auto-hémothérapie.

Posologie et mode d'emploi. — Traitement moyen de 12 à 25 *injections intraveineuses, intramusculaires* profondes ou *hypodermiques* (légère sensibilité par cette voie) à raison d'une à deux pi-

qûres tous les jours ou tous les deux jours. Les ampoules se prennent également *per os*. Cure complémentaire de *dragées* ou de *gouttes* de *Chophytol* ou de *dragées* de *Cynurool*. 1/2 dose ou dose entière chez les enfants suivant l'âge.

N. B. — Les premières injections s'accompagnent souvent d'une légère élévation de l'azotémie *sans gravité* ; ce phénomène ne doit pas surprendre, car il traduit la transformation, en un produit azoté d'élimination facile (l'urée), des substances azotées en rétention tissulaire. D'ailleurs, simultanément, la diurèse augmente, le pouvoir concentrateur du rein s'améliore et le débit uréique s'élève parallèlement, *ce qui ramène rapidement la Constante d'Ambard et l'Azotémie vers la normale*.

En ce qui concerne la cholestérinémie, les phénomènes sont absolument superposables. La preuve de l'amélioration du métabolisme cholestérinique est fournie par l'augmentation, dans des proportions considérables, du *pouvoir cholestérolytique* du sérum. De ce fait, il s'effectue une véritable « mobilisation » (hypercholestérinémie transitoire) de la cholestérine tissulaire en surcharge, dont l'élimination est ainsi facilitée (*hypcholestérinémie secondaire, en fin de cure*).

S'abstenir dans les cas de lésions rénales incurables médicalement (Tuberculose rénale bilatérale, Cancer, Néphrite chronique, azotémique et hypertensive ou œdémateuse à la période terminale, Anurie calculeuse). Le *Chophytol injectable* n'agit que si le foie est encore capable d'être stimulé et si le pouvoir concentrateur du rein permet l'élimination uréique. C'est en effet une médication de stimulation et non de remplacement.

RÉF. SC. : *Gaz. Hôpitaux, Soc. de Thérap., Soc. méd. des Hôpitaux, Presse médicale* ; Dr Monville *Thèse Paris* 1934 ; Dr Picart, *Thèse Paris* 1935 ; Dr Albrecht, *Thèse Paris* 1937 ; Dr Blouet, *Thèse Paris* 1937, etc.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA
« La Feuille fraîche d'Artichaut
en Thérapeutique »,

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).
 (Tél. : Etoile 09-63.)

CHRONICYSTINE MANOR

Présentation et composition. — Dragées glutinées de sulfate de Magnésie anhydre à 0 gr. 50, correspondant à 1 gr. de sel cristallisé Codex.

Indications. — Toutes les affections nécessitant un drainage biliaire intensif et pour lesquelles il est impossible ou difficile de le faire par sondage duodénal : Constipations, Cholécystites, Colites, Migraines, Ictères, lithiase oxalurique et toutes insuffisances hépatiques.

Doses. — 4 à 10 dragées le matin à jeun.

Remarque. — On fait généralement suivre le drainage par la Chronicystine de la désinfection et désensibilisation par l'Hépatostimuline Manor. (Voir ce mot.)

Prix : 15 francs. Le flacon pour 10 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1671-1.

Laboratoires MANOR

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (Saône-et-Loire).

(Tél. : 35.)

CHRYSÉMINE

(Pyréthrines Carteret.)

Propriétés thérapeutiques. — Vermicide et anthelminthique, sans aucune toxicité ou contre-indication.

Indications. — I. — Tous les cas de parasites bien définis (oxyures, ascaris, trichocéphales, tœnias, lamblbias, amibes, etc.).

II. — Traitement d'affections qu'on soupçonne être d'origine parasitaire : diarrhées à cause ignorée, entérites et colites à oxyures, troubles nerveux dus aux toxines vermineuses, etc.

Formes. — Gouttes (*enfants*). Perles glutinisées (*adultes*). (Équation d'équivalence : 1 perle = XL gouttes.)

Administration. — Les perles se prennent les unes après les autres dans une gorgée de liquide ; les gouttes dans de l'eau sucrée ou édulcorée par du sirop de fruits ou avec des confitures.

Posologie. — *Ascaris, Trichocéphales, tous Helminthes, Amibes, Lamblbias, tous Protozoaires.* — *Adultes* : 5 perles. — *Enfants* : L à CL gouttes suivant l'âge. Ces doses sont à prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. La même cure est à renouveler après un repos d'une semaine.

Oxyures. — *Adultes* : 5 perles. *Enfants* : L à CL gouttes, suivant l'âge. (XL gouttes pour un an, augmenter progressivement à raison de X gouttes par année d'âge.) A prendre le matin à jeun pendant 5 jours consécutifs. Le soir, au moment des démangeoisons anales, administrer un petit lavement (200 cc.) d'eau bouillie presque froide dans laquelle seront comptées C gouttes de Chrysémine. Le traitement est à renouveler plusieurs fois à 8 jours d'intervalle.

Tœnias. — *Adultes* : 12 perles. *Enfants* : 200 à 300 gouttes suivant l'âge. A prendre le matin à jeun pendant deux jours consécutifs. Diète hydrique la veille et régime alimentaire réduit les 2 jours de cure. Purgation saline ou huileuse le second jour, 3 heures après la dernière dose.

Prix de vente au public : *Perles* : 23 fr. 45

Gouttes PM. : 14 fr. 30 *GM* : 23 fr. 45

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél. : Opéra 43-79.)

CIBALGINE

Diallylmalonylurée
Diméthylaminophényl-diméthyl-pyrazolone.

ANALGÉSIQUE SÉDATIF.

Calmant du système nerveux. Analgésique et sédatif sans opium, sans aucune substance du tableau B. Atténue ou fait disparaître toute sensation douloureuse.

Indications. — Toutes les algies : Migraine, Névralgies, Courbature, Torticolis, Sciatique, Douleurs dentaires, Angines, Otites, Mastoïdites, Sinusites, etc. Très efficace aussi dans les douleurs dysménorrhéiques.

Comprimés — Gouttes — Ampoules.

Doses. — 1 à 4 comprimés, XX à C gouttes, 1 à 2 ampoules par 24 heures.

Formuler. — Flacon de 15 comprimés.

Flacon (gouttes).

Boîte de 5 ampoules.

Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

CIMALVOL

Composition :

Gaiacol synthétique	0,05
Terpinol	0,05
Eucalyptol	0,05
Goménol	0,05
Essence bourg. sapin	0,03
Essence serpolet	0,02
Goudron de Norvège	0,10

Pour une capsule.

Propriétés. — Antiseptique des voies respiratoires, antispasmodique, calmant de la toux, modificateur sécrétoire, expectorant.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, pneumonies, gangrène pulmonaire, tuberculose, séquelles d'intoxication par les gaz, grippe, emphyseme, asthme.

Présentation et prix. — Un étui de 50 capsules : 12 fr.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Laboratoires F. BAYLOT,

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 38-31.)

CINALOSE

Deux formes :

1° *Ampoules* : boîte de 10 ampoules injectables de 3 cc.

2° *Suppositoires* : boîte de 10 suppositoires.

Composition :

Cinnaméine du Baume du Pérou..	0 gr. 03
Lipoïdes spléniques.....	0 gr. 007
Camphre	0 gr. 09
Lécithine.....	0 gr. 10
Cholestérine	0 gr. 04
Lipoïdes hépatiques.....	0 gr. 007

par Ampoule ou Suppositoire.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de combat de tous les états de carence. Traitement antitoxique des états infectieux. Agent leucocytaire et phagocytaire. Facteur d'augmentation de poids au cours de la collapsothérapie.

Indications :

- 1° Dans tous les cas d'infections aiguës (voies respiratoires, fièvres éruptives, maladies infectieuses, septicémies) ;
- 2° Dans les différentes formes de la tuberculose pulmonaire, adénites, lupus, laryngites, tuberculose osseuse et rénale ;
- 3° Dans toutes les infections anergisantes et les états de dépression : séquelles de grippe ;
- 4° Dans les périviscérités.

Posologie. — 1° *Ampoules* : *Adultes* : Traitement d'attaque : 1 à 2 ampoules par jour en injections intramusculaires.

Traitement d'entretien : 1 ampoule tous les deux jours.

Enfants : 1/2 ampoule par jour ou tous les deux jours.

2° *Suppositoires* : Un suppositoire tous les deux jours, avec un repos de six jours après le dixième.

Enfants : 1/2 suppositoire tous les deux jours.

La forme suppositoire permet un traitement d'administration plus facile, tout en conservant à la préparation sa haute valeur thérapeutique.

Prix : Ampoules ou Suppositoires : 26 fr. 70.

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

G. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).

Tél. : Alésia 12-55.

CINARASCOL

Forme. — A. *Gouttes* ; B. *Pilules*.

Composition. — Extrait fluide spécial de feuilles fraîches de *Cynara Scolymus* (artichaut) soluble, épuré, hyperconcentré (procédé du professeur Quirin et Dagonnot). XL gouttes = 1 pilule = 0 gr. 35 de cet extrait.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, lithiase biliaire, hépatite, cholécystite, ictère, *hypercholestérinémie*, dermatose, arthritisme, *urémie*.

Drainage hépatique et rénal d'innocuité absolue.

Doses. — A. *Gouttes* : XL à CXX gouttes (1 à 3 fois le contenu du compte-gouttes joint).

B. *Pilules* : 1 à 3 pilules à la fin de chacun des deux repas.

Prix : Pilules : 18 fr. 50. Gouttes : 20 fr. 80.

Chaque boîte pour une durée de 20 à 30 jours.

Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Laboratoires DAGONNOT
CANNES.

CINASCOL

Toutes affections du *Foie* et de l'*Intestin*.

Composition. — *Pour 1 dragée* :

Extrait de Bucchu.....	0,03
Extrait de Boldo	0,03
Ext. Scolym. Cinara sec	0,07
Evonymine	0,02
Bile dépigmentée et décholestérinée ...	0,07
Oléate de sodium.....	0,07

Forme. — Dragée à noyau mou glutinisée.

Indications. — Insuffisance hépatique, constipation, cholécystite, Entéro-colite muco-membraneuse, ictères, intoxications.

Doses. — 2 à 4 dragées par jour. Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Prix : 16 fr. 85.

Enregistré au L. N. de C. sous le n° 1081-1.

G. BAETZ, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).

(Tél. : n° 21).

CINEYL

Composition. — Association de silicate de calcium, magnésium, fer, manganèse et codéine.

Indications. — Médicament de défense antibacillaire, Affections pulmonaires chroniques, Bronchites récidivantes, Toux, Grippe.

Présentation. — Comprimés.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour.

Laboratoires GRYSA

C. LÉTANG

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Paris.

7, rue Saint-André — LE MANS.

CINNESTÉROL

Adjuvant indispensable dans la lutte antibacillaire. Complément du pneumothorax artificiel. Action préservatrice intense chez les lymphatiques, asthéniques, affaiblis et surmenés. Relève les forces des convalescents des maladies infectieuses sévères.

Présentation. — Solution huileuse en ampoules de 5 cc.

Posologie. — Action antiseptique respiratoire : 1 à 2 ampoules par jour. Action antibacillaire : double dose.

Prix. La boîte : 24 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1766-4.

Laboratoires LAUGIER

56, rue St-Lambert — MARSEILLE.

CINNOZYL

Composition. — Solution huileuse de :

Cinnamate de benzyle.....	0. 05
Cholestérine.....	0. 10
Camphre.....	0. 125
Huile d'olive pure	5. cc.

Pour une ampoule.

Propriétés. — Par les actions biochimiques de la cholestérine, du camphre, du cinnamate de benzyle, augmente la cholestérinémie et la résistance à l'infection tuberculeuse.

Indications. — *Tuberculose pulmonaire* dans toutes ses formes cliniques. Adjuvant précieux à la cure de pneumothorax artificiel. *Tuberculoses extra-pulmonaires* : Adénites tuberculeuses, tuberculoses osseuses, génito-urinaires, péritonéales, cutanéomuqueuses. Fistules tuberculeuses. *Prétuberculose*, cure préventive chez les prédisposés : Enfants lymphatiques, scrofuleux, malades asthénisés, affaiblis, anémiés, en état d'anergie. *Convalescence* des maladies infectieuses et infections graves.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou intramusculaires indolores sans aucune réaction.

Adultes : 5 à 10 cc. par jour, cures de 20 à 25 injections. Repos de 10 à 15 jours, puis reprise du traitement.

Enfants : Jusqu'à 4 ans : 1 à 2 cc. chaque jour, en augmentant progressivement les doses.

De 4 à 12 ans : Dose moitié moindre que celle de l'adulte.

Au-dessus de 15 ans : Mêmes doses, même technique que pour l'adulte.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

CIPROMAROL

Composition. — Cupressus semperv. Equisetum Arvense. Capsella Bursæ Pastoris. Æsculus Hippocastanum. Hamamelis V.

Indications. — Toutes affections caractérisées par une dilatation temporaire ou permanente des veines.

Mode d'emploi. — L à LXXV gouttes et plus par jour, ou 2 à 3 mesures. La mesure en aluminium jointe au flacon contient XXV gouttes.

Prix : 13 francs.

LANDRIN et C^{ie}

12, rue de la République
PUTEAUX (Seine).

CIRVOSE

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base d'extraits végétaux (marron d'Inde, berberis, piscidia, cyprès, hamamelis), d'extraits organiques (hypophyse, surrénale, thyroïde), de citrate de soude et phényléthylmalonylurée.

Propriétés. — Vaso-constricteur énergique, tonique et régulateur du système veineux et du système artériel collatéral, modificateur de la nutrition générale, fluidifiant du liquide sanguin et sédatif doux.

Indications. — Traitement des troubles de la circulation (bouffées de chaleur, lourdeurs de tête, troubles congestifs, fourmillements et refroidissements des extrémités, sensation de doigts morts, crampes, engelures, etc.). Retour d'âge chez la femme. Affections veineuses (varices, hémorroïdes, phlébites, accidents de la puberté et de la ménopause). Hypertension et hyperviscosité sanguine.

Présentation. — Boîte de 50 comprimés.

Posologie. — 2 à 3 comprimés avant les deux principaux repas. (Pour la femme, cesser 5 à 10 jours par mois au moment des règles.)

Prescription. — 1 boîte de comprimés *Cirvose Falvy*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Pharmacien licencié ès sciences, ex-interne, lauréat des hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 18-26.)

CITRALIN

Granulé entièrement soluble.

Composition :

Sulfate de magnésie	21 gr. 40
Citrate de soude trisodique	18 gr. 60
Boldine	0 gr. 006
Excipient	Q. S. pour 100 gr.

Contenance de l'étui: 110 gr.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-8.

Propriétés thérapeutiques. — Antivisqueux, anticoagulant, cholagogue laxatif, excitant de la sécrétion hépatique.

Indications. — Gastralgie, Dyspepsie, Insuffisance hépatique, Etats lithiasiques, Diathèse arthritique, Goutte, Diabète, Régulateur vasculaire, Etats pléthoriques, Pneumonie.

Forme et mode d'emploi. — Granulé: 1 à 3 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun ou 1 cuillerée à café avant chacun des repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

CITRA-QUINT

Granulé anticoquelucheux soluble.

Formule :

Citrate de soude.....	8 gr.
Bromure de sodium.....	6 gr.
Extrait de drosera Dausse.....	0 gr. 08
Extrait de grindelia Dausse	0 gr. 04
Extrait de thym Dausse	0 gr. 025
Excipient	Q. S. p. 100 gr. de saccharine.

Action. — Antivomitif puissant, sédatif des quintes.
Antiseptique bronchique.

Indications. — Coqueluche. Toux spasmodiques.
Toux émétisantes.

Mode d'emploi. — 6 mois à 1 an : une demi-cuillerée à café 4 fois par jour.

A 4 ans : 1 cuillerée à café 6 fois par jour.

A 15 ans : 1 cuillerée à dessert 6 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1636-1.

Laboratoires CORTEEL

74, rue de La Fère, SAINT-QUENTIN (Aisne).
(Tél. 37-29.)

CITRATÆGUS

(Dragées).

Composition. — Citrate de Soude Mono et Trisodique, Cratægus, Hamamelis Virginica, teinture de Teskra, Viburnum Prunifolium.

Indications. — Hypertension, Etats congestifs, Insuffisances veineuses, Troubles de la circulation du sang.

Avantages. — Fluidificateur du sang, décongestif et tonique veineux, le *Citratægus* est également un cholagogue léger et un eupeptique. Toléré par les estomacs les plus délicats, il facilite même la digestion.

Posologie. — 1 à 2 dragées à chaque repas du matin, du midi et du soir, 20 jours par mois.

Prix : 20 francs.

Laboratoire du CITRATÆGUS

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).
(Tél. : Italie 12-24.)

CITRILEX

Granulé.

Hyperviscosité sanguine. Troubles de la Circulation.
Arthritisme, Gastralgie.

Indications. — Troubles circulatoires ; Hypertension ; Rhumatisme, Goutte ; Gastrite ; Dyspepsie ; Vomissements ; Hyper et Hypochlorhydrie ; Insuffisance Hépatique ; Constipation ; Migraines.

Formule.

Citrate monosodique	10 gr.
Citrate trisodique.....	5 gr.
Oléate de soude	1 gr.
Urotropine	0 gr. 50
pour 100 gr. de granulé.	

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café, le matin à jeun ou 1 cuillerée avant les principaux repas.

Enfants : moitié de la dose.

Faire dissoudre dans 1/2 verre d'eau ou infusion tiède.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX.

CITROCARBINE

Antisepsie digestive.

Composition. — Granulé fondant de goût agréable, répondant à la formule :

Citrate acide de soude, 10. — Charbon animal, 90.

Action. — Eupeptique, cholagogue par le citrate de soude, fixateur, antifermentescible par le charbon.

Avantages. — Stabilité du citrate acide non détruit dans l'estomac comme le citrate alcalin. Hyperactivité du charbon animal plus fin que le charbon végétal. Action constipante du charbon corrigée par le citrate.

Indications. — Dyspepsies, Aérophagie, Insuffisance et infections biliaires, Entérites aiguës et chroniques, Diarrhées, Fermentations intestinales, Auto-intoxication, Artério-sclérose.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.
Se fait aussi en comprimés.

Prix : 17 fr. 25.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI^e). Aut. 71-98.

CITROCHOLINE

Granulé de goût agréable.

Cholagogue. Décongestif.

Composition. — Citrate de soude 10, Hexaméthylène-tétramine 5, Sulfate de magnésie desséché 20, Lactose 30, Saccharose au citron, Q. S. p. 100.

Indications. — Affections hépatiques, Troubles digestifs, Lithiase, Affections urinaires, Hypertension, Viscosité sanguine, Varices, Phlébites, Arthritisme : Rhumatismes et Goutte.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café le matin, dans un demi-verre d'eau tiède.

Enfants (à partir de 5 ans) 1/4 ou 1/2 cuillerée.
Le flacon : 19 fr. 25.

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59).

CITROFLUYL

Citrate monosodique pur.

Forme. — Granulés à saveur agréable.
Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de citrate monosodique. Comprimés pour diabétiques à 0 gr. 50 de citrate monosodique pur.

Dose. — Par jour, 2 à 6 cuillerées ou comprimés dissous, avant ou entre les repas, selon l'avis du médecin et l'effet désiré.

Indications. — Hypertension artérielle, Insuffisance hépatique, Rhumatismes, Goutte, Dyspepsies, Gastrites, Vomissements, Congestions pulmonaires.

Prix : 17 fr. 25

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

Aut. 71-98.

CITROLARGOL

Argent. sol. et Citrate de Soude.

Action. — L'argent stérilise la muqueuse détergée par le Citrate de soude.

Indications. — Toutes les affections du Rhino-pharynx, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Grippe, Coryza.

Mode d'emploi. — IV à V gouttes dans chaque narine matin et soir. Badigeonnage. Pulvérisation.

Prix : 14 fr. 50.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et C^{le}, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

CITRONEMA

Les applications des Citrates et du Magnésium. Granulé soluble, de goût agréable, contenant 10 p. 100 de bicarbonate de Magnésium.

Indications. — Viscosité sanguine, Hypertension artérielle, Gastralgies, Vomissements, Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Goutte, Rhumatisme.

Doses moyennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Nourrissons : 1/3 à 1/2 cuillerée à café par jour.

Prix au public : 17 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. n° 33-3.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer. — SAINT-MANDÉ
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

CITROPAÏNE DU D^r FONTAL

Composition :

Phosphocitrate mangano-sodique associé à un ferment végétal (ext. de carica papaya).

Propriétés :

Eupeptique, Cholagogue, anti-acide, décongestive, régulatrice des fonctions digestives et circulatoires.

Indications :

Dyspepsies, hyperchlorhydrie, gastro-entérites, troubles digestifs du nourrisson, vomissements, mauvaises circulations, congestions veineuses, maladies d'estomac, foie, intestin.

Forme et Posologie :

Granulé : de 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Comprimés : de 6 à 9 par jour.

Cachets : de 2 à 3 par jour.

Enfants : 1/2 ou 1/4 des doses.

Laboratoires JICEM

304, rue Saint-Jacques — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 14-89.)

CITROPEPTOL

Poudre isotonisante du contenu stomacal.
Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.
Diurétique.

Composition :

Citrate de soude	0,25
Phosphate de soude	0,15
Sulfate de soude anhydre	0,10
Sucre de lait pulvérisé	4,50
Huile volatile de citron	Q. S. pour 1 sachet.

Indications. — Digestions lentes, pénibles, Ballonnement, Somnolence après les repas, Gaz de fermentation, Aérophagie, Constipation.

Posologie. — *Doses moyennes* : 2 sachets par jour, aux repas.

Échantillons :

Laboratoire R. FAURE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X°).

CITROSE-VICHY (Limonade)

Limonade purgative à base d'eau minérale de Vichy, parfumée avec les sucs de fruits (orange et citron).

Composition. — Cette limonade, préparée avec les sels de fruits associés au *sel naturel de Vichy*, constitue un excellent purgatif d'un goût très agréable et d'une conservation parfaite.

Elle n'occasionne jamais ni coliques, ni nausées. Sa composition, par bouteille de 200 cc., répond à la formule suivante :

Tartrate de soude.....	25 gr.
Acide citrique	0,22
Sucre	30,95
Essence de citron.....	} Q.S.
Essence d'orange.....	
Eau saturée de gaz naturel de source.....	Q. S. pour 200 cc.

Mode d'emploi. — Prendre le matin à jeun au réveil :

Laxatif : Un verre à bordeaux ou un demi-verre.

Purgatif : Un verre ordinaire ou un demi-verre suivant le tempérament.

Pour les enfants : Moitié ou tiers de la dose des adultes suivant âge, tempérament et avis du médecin.

Dépôt : Laboratoires NOGUÈS,
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

CITROSODINE LONGUET

Réalise la médication citratée sous 2 formes :

Comprimés à 0 gr. 25.

Granulé à 1 gr. de citrate par cuillerée à café.

Vomissements des nourrissons (1 comprimé par biberon) et des femmes enceintes (4 à 6 comprimés 3 ou 4 fois par jour).

Hyperacidité gastrique et dyspepsie : 3 ou 4 comprimés ou 1 cuillerée à café de granulé 2 ou 3 fois par jour.

Hypercoagulabilité sanguine : États pléthoriques, Stases veineuses, Phlébites, Thromboses, Pneumonies, 4 à 8 comprimés ou 1 à 2 cuillerées à café, granulé 4 à 8 fois par jour suivant indications.

Le flacon de comprimés ou de granulé : 16 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

CLEAROL

Pour Bains oculaires. 

Composition. — Hydrolat d'Hamamélis borosalicylé adréphédriné non caustique.

Propriétés. — Antiseptique, Calmant, Décongestionnant et Tonique des conjonctives et des paupières.

Indications. — *Toutes inflammations et infections oculaires externes, Conjonctivites, Blépharites, Dacryocystites, Orgelets, Kératites, etc.*

Tous états inflammatoires professionnels.

Hygiène oculaire.

Mode d'emploi. — Étendre le *Clearol* de moitié d'eau chaude en utilisant l'ocillère qui accompagne chaque flacon et y baigner l'œil pendant quelques minutes.

Les bains d'œil au *Clearol* calment, décongestionnent et soulagent toujours.

Formuler : *Clearol*, un flacon.

Prix : 16 fr. 60

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

CLONAZONE DAUFRESNE

Antiseptique organique chloré
non toxique.

(Méthode de Carrel.)

Composition. — Chloramine sodique du toluène en poudre cristalline ou comprimés dosés à 0 gr. 25.

Indications. — Gynécologie et obstétrique, urologie, angines, petite et grande chirurgie.

Posologie. — *Usages médicaux* : 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour gargarismes, lavages de gorge et du nez, irrigations vaginales.

Usages chirurgicaux : 10 comprimés par litre d'eau, pour pansements humides, tamponnements, irrigation des plaies suivant la technique de Carrel.

La solution à 10 comprimés est d'un emploi et d'une action identiques à ceux de la solution de Dakin.

Stérilisation instantanée de l'eau sans ébullition : 1 comprimé par litre.

Avantages. — Action antiseptique puissante et rapide, sans phénomènes d'irritation.

Deux formes :

Comprimés : tubes de 20 et 60 comprimés à 0 gr. 25.

Poudre : tubes de 20 gr. avec cuiller-mesure correspondant à 0 gr. 25 comme les comprimés.

Conditionnements vrac pour cliniques et hôpitaux.

Échantillons médicaux sur demande :

**Laboratoire Pharmaceutique
DAUFRESNE**

42, rue Thiers — LE HAVRE.

COAGULÈNE ET HÉMO-COAGULÈNE

CIBA

HÉMOSTATIQUES PHYSIOLOGIQUES.

A base d'extrait hématique total, renfermant les substances coagulantes du sang, et particulièrement des plaquettes sanguines. Accéléralant la coagulation, ils permettent de juguler les hémorragies inaccessibles, de tarir les hémorragies en nappe et de corriger les déficiences sanguines des diathèses hémorragipares.

Deux formes : Hémo-Coagulène et Coagulène : Hémo-Coagulène, forme injectable, en ampoules de 5 cc. (Injection intramusculaire, intraveineuse en cas d'urgence).

Coagulène, forme buvable, en flacons-ampoules de 20 cc. (Voie buccale et applications locales).

Indications. — Hémorragies en général. Hémoptysies, Hématémèse, Méléna, Métorrhagies, Purpura, etc. Traitement de l'Hémophilie, de l'Hémogénie et des états hémorragipares. Prévention des hémorragies opératoires et post-opératoires, en particulier lors des amygdalectomies, prostatectomies, avulsions dentaires.

Doses :

Hémo-Coagulène (Injectable) : Une ampoule tous les jours ou tous les deux jours. En cas d'hémorragie grave, injecter de 1 à 4 ampoules par jour. Chez les enfants, posologie proportionnée à l'âge : 1/4 ou moitié de celle ci-dessus.

Coagulène (buvable) : *Adultes :* 2 à 5 flacons-ampoules par 24 heures. *Enfants :* 1 à 4 flacons-ampoules par 24 heures. — Le contenu des flacons-ampoules est absorbé avec un peu d'eau ou une tasse de bouillon, suivant le goût du malade.

Poudre de Coagulène, pour préparation extemporanée de solutions, stérilisables par ébullition, qu'on utilise localement en tamponnements ou pulvérisations.

Formuler :

Boîte de 6 ampoules Hémo-Coagulène.

— de 5 ampoules buvables Coagulène.

— de 2 — — — — —

Flacons de 2 et 5 gr. poudre de Coagulène.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

COBRALLYRE

Composition : Suspension colloïdale stable et stérile de toxine de Cobra (venin purifié et désalbuminé) titrée à 2 U. S. par cc. (non injectable).

Indications :

Affections des yeux : Conjonctivites, hypertensions, hémorragies, traumatismes, kératites et kératalgies, iridocyclites, migraine et zona ophtalmiques, etc.

Affections du rhino-pharynx : Sinusites, ozènes, impétigo, états congestifs, irritations pharyngées, spasmes, asthme d'origine nasale, rhume des foins, coryza et rhinites.

Posologie et mode d'emploi :

a) *Affections oculaires :* Instiller 1 à 2 gouttes dans l'œil malade, matin et soir. Dans certains cas assez rares, l'application du cobrallyre devient douloureuse ; il faut alors diminuer la fréquence des instillations.

b) *Affections rhino-pharyngées :* Instiller dans chaque narine, en renversant le plus possible la tête en arrière, 2 à 3 gouttes, 3 à 6 fois par 24 heures. Le liquide dégluti par les fosses nasales est sans inconvénient, au contraire.

Présentation : En flacon-collyre à deux tubulures formant compte-gouttes calibré.

Prix : 20 francs.

COBRATOXINE

(voir KATOX-INTRA).

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Carnot 78-11.)

COCAÏNE MIDY

Pastilles de Cocaïne chloroborates.

Chaque pastille contient :

Stovaïne	0 gr. 001
Chlorhydrate de cocaïne	0 gr. 001
Biborate de soude.....	0 gr. 025
Chlorate de potasse	0 gr. 075

Doses et mode d'emploi. — Laisser fondre dans la bouche 10 à 12 pastilles par jour, 4 à 8 aux enfants selon l'âge.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésique local, antiseptique modificateur.

Indications. — Affections de la bouche, gorge, larynx : Pharyngites, Laryngites aiguës et chroniques, Granulations, Angines, Amygdalites, Toux nerveuses, Picotements et Chatouillements de la gorge (avocats, chanteurs, orateurs, prédicateurs, professeurs).

Prix : 10 fr. 90.

Durée du traitement : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

CODÉPHRYL DUFOUR

Traitement des affections des voies respiratoires.

A base de : Terpène, Bromhydrate de codéine, Baume du Pérou, Chlorure d'ammonium, Emétine, Chlorhydrate d'Ephédrine, Seigle ergoté.

Propriétés. — Fluidifiant et expectorant par la Terpène, le Berzoate de soude, l'Emétine, l'Ergot du seigle. Calmant par le Bromhydrate de codéine.

Antiseptique par le Baume du Pérou et le Chlorure d'ammonium.

Vagotonique par le Chlorhydrate d'Ephédrine.

Indications. — Toux, Bronchites, Asthme et toutes affections des voies respiratoires.

Posologie:

Toux, bronchites sèches : 2 à 6 comprimés par jour.

Toux avec expectoration : 4 à 8 comprimés par jour.

Echantillon sur demande.

Le tube de 30 dragées : 16 francs.

Laboratoire de L'ÉDISTOL

H. DUFOUR, pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

40, rue des Carmes — Orléans (Loiret). (Tél. : 21-28.)

CODÉRAX

Composition. — Chaque comprimé renferme : Codéine, 2 cgr. Terpène et Sucs résineux pulvérisés de Styrax Benzoin, aa 0,10.

Forme. — Comprimés pouvant être absorbés par les diabétiques ; conservation indéfinie.

Indications. — Sédatif des toux les plus rebelles : toux d'irritation, spasmodiques, quinteuses, nerveuses, toux des fumeurs, laryngites, trachéites, bronchites.

Insomnies : 2 comprimés au coucher.

Maladies d'estomac : 1 comprimé après le repas contre la gastralgie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer.

Dose. — 6 comprimés par 24 heures au maximum.

La boîte de 20 comprimés : 11 fr. 50.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 86-76.)

CODÉTHYLINE BORNE EX-DIONINE BORNE

Composition et présentation. — Dragées que l'on peut sucer, croquer ou avaler (légère amertume), dosées chacune à 1/2 ctgr. de **Dionine** (Méthyl Codéine ou codéthyline), chimiquement pure, ne contenant plus aucune trace de morphine libre.

Sans accoutumance. Tableau A, toxicité très faible.

Remède spécifique symptomatique de toutes les Toux.

Analgésique, Antispasmodique, Hypnotique très doux.

Posologie. — *Adultes: Selon le Codex.*

Doses maxima pour 24 heures : 20 ctgr. (40 dragées).

Doses maxima pour une prise : 5 ctgr. (10 dragées).

Faire prendre les dragées 2 par 2, trois à six fois par jour selon l'effet désiré. Pour les enfants de 5 à 12 ans diminuer les doses de moitié.

Prix : 16 fr. 30 la boîte de 40 dragées.

Voir à **Thiosédal** : Association **Thiocol Dionine**, sirop et comprimés.

Voir à **Diocamphine** : Association **Dionine camphre**.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux et des Ministères des Colonies
et de la Marine.

SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Pla. 24-30.)

CODÉTHYLINE HOUDÉ (Chlorhydrate d'éthyl-morphine.)

Granules titrés à 5 milligrammes.

Le nom de Codéthyline a remplacé définitivement la dénomination Dionine, au Codex 1937.

Propriétés. — Essentiellement *sédatif de la toux*.
Analgésique et hypnotique léger.

Indications. — Bronchite, emphysème, asthme, coqueluche, pneumonie, tuberculose pulmonaire et laryngée. Névralgies, gastralgies (ulcus et cancer).

Doses. — 3 à 20 granules par jour, en moyenne 5 à 8.

Enfants : 1 à 5 granules par jour suivant l'âge, à partir de cinq ans.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 40-58.)

CODOCOL

Calmant de la Toux.

Composition. — Association de Thiophénolate de Codéine, Cinnamate de soude, Soufre assimilable, sous forme de comprimés.

Action thérapeutique. — Antiseptise l'appareil pulmonaire. Fluidifie la sécrétion bronchique. Facilite l'expectoration. Diminue l'excitabilité du centre tussigène. Active la défense de l'organisme.

Avantages. — Médication à la fois causale et symptomatique, forme comprimés pratique, suppression du goût désagréable du Gaiacol.

Indications. — Trachéites, Bronchites aiguës et chroniques, grippe, prétuberculose et tuberculose, et toutes les affections de l'appareil respiratoire.

Mode d'emploi. — 4 à 8 comprimés par jour.

Laboratoires COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

CODOFORME

Composition. — Comprimés enrobés constitués par une nouvelle combinaison bromoformique solide associée à la codéine ; se dissolvent dans l'intestin seulement où ils libèrent sans fatigue pour l'estomac une quantité rigoureusement constante de bromoforme pur. Chaque comprimé représente : Codéine, 1 cgr. ; bromoforme, IV gouttes ; teinture d'aconit et belladone, aa V gouttes ; terpine et benzoate de soude comme excipient.

Indications. — Spécifique des toux sèches (spasmodiques, laryngo-trachéales, post-grippales, névropathiques). Sédatif remarquable de la toux des tuberculeux, assurant calme et repos sans irritation gastrique ou inappétence.

Posologie. — 5 comprimés p. j. ; 6 à 8 d. toux rebelles. Grands enf. (à partir de 5 ans) 2 à 3 compr. par 24 heures. Avaler sans sucer ni croquer.

L'étui (4 à 5 jours de traitement).

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI^e).
(Tél. : Danton 13-20.)

COLARSÉNOL

Pommade nasale.

Composition :

Novarsénobenzol	1	gramme.
Ch ^{ate} d'éphédrine	1	—
Essences de Pin, de Cèdre, de Géranium. ãã	1	—
Excipient Q. S. P.	100	grammes.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Désinfection du Rhino-Pharynx des porteurs de germes diphtériques.

Mode d'emploi. — Introduire gros comme un pois dans chaque narine plusieurs fois par jour.

Prix : 13 fr. 75.

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil — JOINVILLE-LE-PONT
(Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

COLARSÉNOL

Collutoire Inaltérable au Novarsénobenzol.

Indications :

Angines de Vincent, rouges, pultacées, lacunaires, à streptocoques, herpétiques, pseudo-membraneuses.

Diphtéries ; adjuvant du traitement par le sérum, désinfection du rhino-pharynx chez les porteurs de germes.

Pyorrhée alvéolo-dentaire, stomatites et gingivites.

Mode d'emploi. — En applications sur les amygdales ou les gencives. En gargarismes.

Prix : { Le flacon de 30 cc 16 fr. 85
 { Le flacon de 20 cc 11 fr. 20

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-1.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Créteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).
(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59).

COLAVÉ

Extrait spécial de Kola suractivé par addition de 1 p. 100 de caféine pure.

Forme. — Granulé fondant.

Indication. — Stimulant musculaire et nerveux, Tonique général, Régulateur du cœur, Convalescence, Dépression physique.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 12 à 15 jours.

Prix : 16 fr. 50.

Enregistré au laboratoire national de contrôle sous le n° 1107.

E. VERDON

Docteur en pharmacie.

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

COLCHICINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 milligramme.

La **Colchicine pure** cristallisée a été découverte par A. Houdé (1887).

Propriétés. — Augmente fortement les sécrétions. Excitant du sympathique. Modérateur des échanges nutritifs.

Indications. — *Spécifique* de la *goutte* : Accès aigus ou manifestations subaiguës ou larvées (rhumatismes goutteux).

Posologie :

Accès aigu : 3 granules le premier jour en 3 fois (1 à 2 heures d'intervalle).

2 granules le deuxième jour et jours suivants.

Traitement en 4 jours environ (ne pas dépasser 7). Cesser dès sédation, ou en cas de diarrhée.

Manifestations subaiguës (ou comme préventif) : 1 à 2 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

COLCHI-SAL MIDY

Composition. — Chaque capsule contient :

1/4 de mmg. de colchicine pure dissoute dans 0 gr. 20 d'Essence de Wintergreen (obtenue par fermentation et distillation de l'écorce de *Gaultheria procumbens*).

Propriétés. — Le COLCHI-SAL MIDY réunit dans une seule médication :

- 1° Les propriétés thérapeutiques de l'Essence de Wintergreen : *Anal-gésique, Antinévralgique, Antirhumatismale.*
- 2° Les propriétés thérapeutiques de la Colchicine : *Spécifique de l'accès de goutte articulaire aiguë, et de toutes les manifestations douloureuses de la goutte typique et larvée.*

Indications. — Accès de goutte, Rhumatisme goutteux, toutes névralgies, névrites et myalgies d'origine goutteuse. Lumbagos et sciatiques. Le COLCHI-SAL MIDY doit être essayé dans tous les cas de sciatique rebelle ; il réussit souvent là où tout a échoué.

Forme. — Capsules.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 16 capsules par jour, par prises fractionnées (2 à 3 capsules par prise).

Prix : 21 fr. 80.

Durée du traitement : 8 à 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

COLIBACINE

Thérapeutique Biochimique de toutes les manifestations provoquées par le Colibacille.

Composition :

Citrates de soude monosodique et trisodique, agents de leucocytose.

Acide nucléinique d'origine végétale, agent d'hyperleucocytose. L'acide nucléinique de la Colibacine est solubilisé par catalyse.

Chlorure de magnésium, agent de conservation des leucocytes.

Présentation. — En ampoules buvables pouvant être également utilisées en lavements.

La boîte de 7 ampoules : 25 fr. 50.

Laboratoire COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

COLIBYL

Granulé

Syndrome Entéro-Uro-Hépatique

Composition. — Peptone (lait, viande, végétaux), Magnésie (hyposulfite, salicylate, sulfate), Charbon (activé), Magnésium (peroxyde), Lithium (benzoate), Formine (citrate), Plantes (artichaut, boïdo, camomille, romarin).

Propriété. — Le caractère original et essentiel du Granulé COLIBYL réside dans son action proprement *désensibilisante* et antiseptique de la *muqueuse duodénale et intestinale* en dehors et à côté de son action cholagogue et antianaphylactique.

Indications. — Toutes affections du foie et de l'intestin (cholécystites, colite, lithiase biliaire, ictère, congestions et insuffisances hépatiques et vésiculaires), Entérites, Cystites. Toutes infections. Toutes anaphylaxies.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, soit le matin à jeun, soit une demi-heure avant le repas de midi et du soir.

Enfants : Demi-dose.

Croquer et avaler à la suite un demi-verre d'eau, ou encore délayer le granulé préalablement dans l'eau.

Prix : 20 fr. 25. Taxe d'armement comprise.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1307-7.

Laboratoires OPOS

Pharmacien HOMPS,

Bureaux : 33, rue Rempart-Matabiau, TOULOUSE. (Tél. 253-97.)

Usine : 1 et 3, rue Soumet, CASTELNAUDARY. (Tél. 3-10.)

COLIFLORINE CARRION

Vaccin coli-entérococcique pour ingestion.

Composition. — Émulsion de colibacilles et d'entérocoques à 2 milliards de germes par cc. (soit 10 milliards par tube scellé, obtenue à partir de souches multiples.

Forme. — Tubes scellés de 5 cc.

Indications. — Infections intestinales aiguës et chroniques. Auto-intoxications d'origine intestinale. Syndrome entéro-rénal, entéro-hépatique, etc. Septicémies et fièvres prolongées d'origine indéterminée. Vaccination préopératoire (appendicectomie, etc.).

Posologie et mode d'emploi. — Un tube scellé *per os*, le matin à jeun, et un tube scellé 2 heures après le repas du soir. (Enfants : demi-dose.) Dans les cas chroniques, un tube scellé par jour pendant une ou plusieurs semaines.

Présentation et prix. — La boîte de 12 tubes scellés : 28 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. n° 514-115.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45.) (2 lignes groupées.)

COLISEL

Composition. — Charbon animal et végétal ; chlorure de magnésium ; carbonate de chaux ; poudre titrée de Belladone.

Présentation. — Granulé, Poudre.

Propriétés. — Traitement actif des affections de l'intestin. Par son pouvoir absorbant et neutralisant supprime les fermentations et l'action nocive des toxines.

Indications. — Sédatif antispasmodique de choix, entérites et surtout entérocolites aiguës ou chroniques, associées ou non à d'autres maladies du tube digestif (gastro-entérite, appendicite chronique, cholécystites) ou à des affections des voies urinaires (syndrome entérorénal, pyélonéphrites à colibacilles).

Posologie. — 1 cuillerée à café matin, midi et soir après les repas dans un peu d'eau.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires J. LAROZE
54, rue de Paris — CHARENTON.
(Tél. : Ent. 01-41.)

COLISEPTINE

Granulé.

Composition. — Charbon (activé), Magnésium (sels), Lithium (Benzoate), Formine, Aubépine, Belladone, Passiflore.

Indications. — Infections gastro-intestinales, biliaires, urinaires, Syndrome gastro-entéro-rénal, Spasmes gastriques, pyloriques et intestinaux, hyperacidité, aérophagie, ulcères, gastralgies, ptoses, fermentations, flatulences, colites, colibacillose, dilatation de l'estomac, cystite, colibacillurie, intoxications alimentaires, dyspepsies douloureuses.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café après chacun des principaux repas. Croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Prix : 16 fr. 25. Taxe d'armement comprise.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-05.

Laboratoires OPOS

Pharmacien HOMPS,

Bureaux : 33, rue Rempart-Matabiau — TOULOUSE
(Tél. : 253-97.)

Usine : 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY.
(Tél. : 3-10.)

COLITIQUE

Vaccin curatif anticolibacillaire.

Adopté par le Ministère des Colonies
et par les Hôpitaux de Paris.

Indications. — Toutes les manifestations du syndrome provoqué par le colibacille.

Double action par son émulsion microbienne et par son principe lysant.

Formes : *Buccale, la plus active.* Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.
Injectable (10 ampoules de 1 cc.).

Filtrat, pour applications locales (6 amp. de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 27 fr. 30 ; 5 ampoules, 14 fr. 30.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52.)

COLI-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

2 formes ; Injectable, buvable.

Composition. — Lysat de Colibacilles (souches variées).

Indications. — Pyélonéphrites, Colibacilloses.

Posologie. — *Coli injectable* (ampoules de 1 cc.).

1^{re} injection : 3/4 de cc. Les suivantes : 1 cc. tous les jours, puis tous les 2 jours. *Coli voie buccale* (non injectable), ampoules de 3 cc. 1^{er} jour : 1/2 ampoule dans un demi-verre d'eau sucrée ; 2^e jour : 3/4 d'ampoule ; ensuite une ampoule par jour pendant 8 à 10 jours.

Présentation. — 1^o Coli-Vaclydun injectable en boîtes de 6 ampoules de un centicube. 2^o Coli-Vaclydun buvable. — En boîtes de 10 ampoules de 3 centicubes.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

COLIVAX

Vaccin anticolibacillaire

Ingérable.

Composition. — Vaccin mono-microbien et polyvalent préparé à partir de souches nombreuses soigneusement sélectionnées appartenant à différentes variétés du groupe *Bacterium Coli*.

Indications. — Colibacilloses, Infections intestinales, Entérites, Colites, Diarrhées, Diarrhées infantiles, Syndrome entéro-rénal, Pyélonéphrites, Infections des voies biliaires, Infections des voies génitales à colibacilles (Métrites, Salpingites), Colibacilluries, etc.

Posologie :

Enfants : 1 ampoule par jour le matin à jeun.

Adultes : 2 ampoules par jour, une le matin et une le soir, loin des repas.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 5 cc.

Prix, la boîte : 20 fr. 40.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

COLLARGOPHÉDRINE

Solution d'éphédrine naturelle associée aux sels d'argent indolores.

Composition :

Sulfate d'éphédrine naturelle.....	0 gr. 50
Nuclargyl (protéose argentique indolore à 20 p. 100 d'argent).....	0 gr. 45
Nitrate de para-aminobenzoyl diéthylaminoéthanol (Nitrate de novocainum).....	0 gr. 20
Argent colloïdal (Collargolum)	0 gr. 15
Camphre	0 gr. 01
Huile essentielle de Melaleuca viridiflora rectifiée.....	0 gr. 015

Pour 100 grammes.

Présentation. — En flacon compte-gouttes nasal.

Action. — Décongestion, antiseptisme de la muqueuse nasale, sans irritation ni douleur, anesthésique, excitant de la rénovation cellulaire.

Indications. — La Collargophédrine est indiquée dans toutes les affections nasales : catarrhe nasopharyngien, coryza spasmodique, coryza, sinusite, rhinite, rhume des foies, végétations, céphalée, rhino-pharyngite, œdème du pharynx et de l'épiglotte, états asthmatiques et dans les maladies infectieuses : état grippal, rougeole, scarlatine, angine, érysipèle, oreillons et toutes fièvres éruptives.

Mode d'emploi. — En instillation ou en pulvérisation :

Enfants : 1 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Adultes : 5 à 10 gouttes dans chaque narine 2 à 4 fois par jour.

Prix : 18 fr. 75.

En pulvérisation : 2 à 3 fois par jour.

Pulvo-Collargophédrine. — Flacon avec Pulvérisateur spécial.

Prix public : 26 francs. Flacon de recharge : 16 fr. 15.

Enregistré au L. N. C. M. N^o 593.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

COLLARMAN

Solution colloïdale chimique de Permanganate d'argent 1 p. 100.

Action bactéricide puissante. Tolérance parfaite, grande fluidité, pénétration du système muqueux.

Oto-Rhinologie. — Rhinites, Sinusites, Otites mastoïdites (adjuvant précieux des interventions).

Ophthalmologie. — Blépharites, Conjonctivites, etc. Ophthalmie blennorragique (adultes, nouveaux-nés).

Vulvo-vaginites des petites filles (instillation).

Présentation en flacons compte-gouttes de 15 gr.

Laboratoires de l'ARMANITE

J.-C. PERROTIN, Pharmacien de 1^{re} classe

3, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e)

(Tél. : Diderot 00-53.)

COLLOBACILLINE DU Dr GRIMBERG

(Extrait bacillaire colloïdal.)

Indications. — Toutes les tuberculoses externes, articulaires, osseuses, cutanées, péritonéales, épидидymaires, rénales, etc., fistulisées ou non (à l'exclusion de la tuberculose pulmonaire).

Présentation :

Comprimés de 0 gr. 0001. Commencer par 1 comprimé par jour, puis 2, 3, 4, 5 suivant la tolérance du malade.

Ampoules de 1 cc. Cinq concentrations :

A, B, C, D, E. Commencer par 0 cc. 1 de la concentration A et augmenter progressivement de 0 cc. 1 à chaque injection. Deux injections par semaine.

Prix : 50 fr. la boîte de 6 amp. ou 75 comp.

Laboratoire des COLLOVACCINS

74, rue Blanche — PARIS. - (Tri. : 55-13.)

COLLOBIASE DE SULFHYDRARGYRE

Teneur en Soufre-Mercure colloïdal par centimètre cube environ 1/4 de millig. de Soufre et 1 millig. d'Hydrargyre.

Ampoules de 2 centimètres cubes.

Aspect. — Pseudo-solution de teinte gris bleu.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Médicament anti-syphilitique de toutes les périodes de la maladie. Le soufre qu'il contient augmente l'activité du Mercure et explique l'action articulaire du médicament dans certains accidents spécifiques, tel le rhumatisme déformant.

Ce médicament est un des mercuriels les mieux supportés.

Mode d'emploi. — En injection, de préférence par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Posologie. — Voie intramusculaire : injection tous les jours ou tous les deux jours. Débuter par 1/2 cc. soit 1/4 d'ampoule ; augmenter de 1/2 cc. chaque fois pour atteindre 2 cc., dose à maintenir jusqu'à la fin du traitement (c'est-à-dire la dixième injection).

Par voie intraveineuse : procéder de même manière, mais par 1/4 de cc., c'est-à-dire 1/8 d'ampoule à la fois, jusqu'à 2 cc.

Opérer dans les deux cas par séries de 10 injections, avec 15 jours de repos entre chaque série.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

COLLOIDINE LALEUF

Composition. — Extrait total pluriglandulaire associé à l'Iodalbumine.

Propriétés et indications. — Remédie à la viciation fonctionnelle des glandes endocrines et, grâce à la présence de l'Iodalbumine, favorise la combustion intra-organique.

Toutes les affections dues à une carence endocrinienne, et principalement l'obésité, sont justiciables du traitement à la COLLOIDINE.

Formes. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 4 dragées par jour, suivant le cas, à prendre de préférence au début des repas. Les avaler en même temps qu'une gorgée d'eau.

Durée moyenne des unités de vente : 30 à 50 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 dragées : 27 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

COLLOÏDOGÉNINE

du Docteur BAYLE

Opothérapie splénique intégrale.

Nature. — Extrait total de rate.

Formes. — 1° Colloïdogénine injectable (ampoules de 5 cc.).

2° Colloïdogénine sirop.

3° Colloïdogénine (flacons-ampoules pour voie buccale).

Indications. — *Tuberculose* (toutes localisations et formes), où elle a fait ses preuves.

Anémies, où elle est supérieure à la méthode de Whipple.

Convalescences, grossesses pénibles, amaigrissement, rachitisme, neurasthénie, déminéralisation, déficiences organiques.

Action. — Augmentation rapide des hématies (50 p. 100) et des leucocytes.

Relèvement du taux de l'hémoglobine (25 à 115 p. 100).

Progression rapide des forces et du poids.

Cicatrisation des lésions (visible à la radio), disparition des bacilles de Koch.

Emploi et doses. — Séries de 12 injections (intramusculaires dans la fesse ou sous-cutanées abdominales) en 22 jours. Après chaque série 8 jours de repos. Pendant les 22 jours de chaque série, le sirop de colloïdogénine est donné en même temps (4 cuillerées à soupe par jour aux repas). Dans les anémies et les convalescences le sirop suffit.

Doses chez l'enfant. — Au-dessus de 5 ans, injecter 5 cc. Au-dessous de 5 ans, injecter 1 cc. par année d'âge.

Colloïdogénine sirop : 2 cuillerées à café par jour jusqu'à 3 ans, 4 jusqu'à 5 ans, 1 à 2 cuill. à soupe jusqu'à 7 ans, 2 à 3 jusqu'à 10 ans, ensuite 3 à 4.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 722-1, 722-2, 722-3.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

(Téléphone : Vaugirard 16-11.)

COLLO-IODE DUBOIS

Dragées.

Composition. — Chaque dragée représente 2 cgr. d'iode combinés à 2 cgr. de Caféine et à 8 cgr. de Théobromine pure. Dragées à noyaux facilement dissociables et assimilables.

Indications. — Cardio-tonique et vaso-dilatateur efficaces. Diurétique puissant et fidèle.

Asthme, Emphysème, Artériosclérose, Affections du cœur et des vaisseaux, Troubles de l'hypertension. Troubles vasculaires de la ménopause. Maladies infectieuses et intoxications, Hydropxies, etc...

Forme. — Dragées Théobromo-caféinées.

Posologie. — Sauf avis du médecin, la dose est de 1 à 5 dragées par jour chez les adultes, mais il reste seul juge de la médication chez les enfants et les hypertendus artériels.

Durée du traitement : 10 jours.

Prix : 17 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-14.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

16, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Car. 45-62.)

COLLO-IODE DUBOIS

Gouttes.

Composition. — Solution titrée d'iodhydrates acides aminés à 5 p. 100 d'iode pur.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, des iodures et leurs diverses préparations. Son champ d'activité est très étendu et s'exerce tout particulièrement dans la carence de la nutrition et des fonctions glandulaires, l'Artériosclérose et les affections du cœur, l'Obésité, l'Asthme, la Goutte et les Rhumatismes, la Syphilis, l'Hyperthyroïdie, la Tuberculose pulmonaire à évolution lente et les bacillooses diverses (osseuses, ganglionnaires, etc.), les Mycoses, les Etats infectieux, etc.

Forme. — Gouttes.

Posologie. — *Adultes* : de XX à C gouttes par jour, suivant les cas. Il peut se prendre avant, pendant ou après les repas, mélangé à un liquide quelconque.

Enfants : de V à L gouttes par jour.

Durée du traitement : 3 semaines.

Prix : 17 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-2.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie,

16, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

(Tél. Car. 45-62.)

COLLOSOUFRE

Composition. — Soufre colloïdal vrai et stable à gros grains amicroniques, à réaction neutre et à charge électrique forte.

Propriétés. — Complément naturel des cures thermales et hydrominérales sulfureuses.

Indications. — Anémie pernicieuse, bacilloses, rhumatisme chronique, diabète, artériosclérose, néphrites aiguës et chroniques, ictères infectieux; cirrhoses, auto-intoxications, dermatoses d'origine interne, pneumonies, pharyngites, laryngites, bronchites chroniques, coryza.

Présentation et prix :

Ampoules : Injections intraveineuses ou intramusculaires. La boîte : 20 fr.

Cachets : 25 francs la boîte de 25 cachets.

Granulé : 15 francs le flacon de 150 grammes.

Posologie. — 1 cachet midi et soir, ou trois cuillérées à café de granulé par jour.

Ampoules : Tous les jours ou tous les deux jours.

Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

COLLOVACCINS

Collobacilline. — Extrait bacillaire colloïdal du
D^r A. Grimberg.

Voir Collobacilline.

Collovaccins Injectables :

N° 22. Antistaphylococcique.

N° 23. Antistreptococcique.

N° 24. Antigonococcique.

N° 25. Anticolibacillaire.

N° 26. Thyphoïdes.

N° 27. Entérites.

N° 28. Antipyogène.

N° 29. Pulmonaire.

N° 30. Antiblennorragique.

N° 31. Gynovaccin.

N° 32. Préopératoire.

Injectations intramusculaires.

Prix : 25 francs la boîte de 6 ampoules.

Collovaccins pansements :

N° 2. Antiblennorragique.

N° 3. Gynovaccin.

N° 4. Furoncles, anthrax.

N° 5. Rhinites, sinusites.

N° 6. Colibacillaires.

N° 7. Plaies infectées. (Collo-chir.)

N° 8. Infections puerpérales.

Prix : 20 francs la boîte de 3 ampoules.

Suppovaccins (suppositoires vaccins).

N° 40. Prostatites, rectites.

N° 41. Métrites, salpingites.

N° 42. Colibacilluries.

N° 43. Typhoïdes.

Ovules : Gynovaccin-ovules.

Prix : 25 francs la boîte de 6.

Laboratoire des COLLOVACCINS

74, rue Blanche — PARIS (IX^e).

COLLUBIAZOL

Solution hydro-glycérinée de Rubiazol.

Traitement des infections provoquées par le streptocoque ou autres éléments microbiens associés au niveau des muqueuses.

Indications. — Angines, Amygdalites, Pharyngites et Rhino-pharyngites, Gingivites et Stomatites infectieuses, Vulvites et Vaginites, Exo- et Endocervicites.

Mode d'emploi. — A utiliser pour badigeonnages ou étendu d'eau bouillie, pour lavages et gargarismes.

Prix au public : Le flacon, 16 fr. 95.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

COLLUCROMEX

Collutoire au cristal violet, au vert lumière et à l'arsénobenzol stable. Chimiothérapie intensive par mordantage et par colorants électifs. Panvalent contre tous les germes infectant le cavum. Sédatif de l'élément douleur : adjuvant anesthésique.

Formule.

Vert lumière...	0 gr. 50
Cristal violet	0 gr. 50
4 Oxy-3 acétyl-amino-phényl-arsinate de Na.	1 gr.
Chl. de para-amino-benzoyl-diéthyl-amino-éthanol.....	0 gr. 50
Paraminophényl sulfamide.....	0 gr. 10
Citronellol	0 gr. 10
Camphre de menthe	0 gr. 10
Alcool phényl-éthylque	0 gr. 10
Glycérine et excipient spécial : pour 100 gr.	

Indications. — *Oto-rhino-laryngologie* : Toutes affections mono et polymicrobiennes du rhino-pharynx, angines de Vincent et diverses, stomatites, gingivites, pyorrhées, stérilisation des porteurs de germes diphtériques.

Dermatologie : Traitement des plaies infectées, suppurantes et à cicatrisation retardée, ulcères variqueux, infections cutanées à pyocoques.

Mode d'emploi : Badigeonnages, gargarismes, bains de bouche-applications locales. Adultes, enfants, nourrissons.

Prix : 17 fr. 50.

Diffusion strictement médicale.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 598

Laboratoires M. de RIVE.

J.-O. MOITY, Docteur en médecine, Docteur en pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris.

Services Commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS (X^{xe}).

COLLUNOVAR

Collutoire au Novarsénobenzol.

Affections du Rhino-Pharynx.

Indications. — Médication préventive et curative de toutes les angines. Angine de Vincent. Affections amygdaliennes. Pyorrhée alvéolo-dentaire, Stomatites, Gingivites. Affections nasales.

Formule :

Novarsénobenzol	1 gr.
Citrate sodique	5 gr.
Niéraline 1/1 000.....	0,50

Pour 100 cc.

Posologie. — En *badigeonnage léger* sur les amygdales ou sur les gencives.

En *gargarisme* ou *bain de bouche*, à la dose d'une 1/2 cuillerée à café par verre d'eau tiède.

En *gouttes nasales* : 5 à 6 gouttes, 2 fois par jour.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
(Tél : Longchamp 04-61.)

COLLUSULFAR

Collutoire au Sulfarsénol.

Formule :

Sulfarsénol 5 gr.
Excipient. Q. S. pour..... 100 cc.
Solution stabilisée de Sulfarsénol de forte concentration
qui lui assure une grande puissance antiseptique et
une action antimicrobienne remarquablement poly-
valente.

Indications. — Angine aiguë, Angine de Vincent, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi. — En badigeonnages : 4 par jour.
En bains de bouche : 1/2 cuillerée à café dans 1/2 verre
d'eau tiède.

Formes :

Flacons. Grand modèle de 30 cc. Petit modèle de 15 cc.

Prix de vente au public :

Flacons. Grand modèle : 16 fr. 30 Petit modèle : 8 fr. 70.

Laboratoires de Biochimie médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en Pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

COLLU-SULFAMYD

Collutoire au Novarsénobenzol et aux dérivés sulfamidés.

Toutes Angines, Amygdalites, Végétations, Infections pharyngées,
Pyorrhée, Stomatites, Gingivites.

Formule :

Novarsénobenzol 0 gr. 60
Dérivé sodique de l'ac. 3-Acétylamino-4-Oxyphénylarsin-
ique 0 gr. 50
Paraminophénylsulfamide (1162 F) 4 gr.
Rosaniline trisulfamidée..... 0 gr. 05
Excipient spéc. stabilisant et aromatisé, Q. S P..... 100 cc.

Le *Collu-Sulfamyd* attaque la flore microbienne tout entière, le *Streptocoque* et la flore banale par les dérivés *sulfamidés*, les *Spirilles* par le Novarsénobenzol et le dérivé sod. de l'ac. 3-acétyl-amino-4-oxyphénylarsinique.

Mode d'emploi. — En badigeonnage du fond de la gorge toutes les deux heures.

En gargarisme ou bain de bouche, 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède, 4 à 5 fois par jour.

Prix : 18 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92).

COLLUTOIRE COLLARGENT

Le premier collutoire français à base de sels d'argent.

Très grande activité.

Innocuité absolue.

Caractéristiques. — Sels d'argent chimiquement purs, doux, à pH constant, donnant une dispersion colloïdale maxima.

Formule :

Argentothioglycérine sulfonate de sodium 0 gr. 60

Vitellinate d'argent 2 gr.

Glycérine, Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Toutes les angines, les abcès, fluxions, gingivites, stomatites.

Mode d'emploi :

Collutoire : en badigeonnage de la gorge, 3 à 4 fois par jour.

Gargarisme : 1/2 cuillerée à café dans un demi-verre d'eau chaude.

Prix : 16 francs.

Laboratoires P. REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00).

COLLUTOIRE V.-E. DOUMER

Formule:

Bleu de méthylène V.-E.

Doumer..... 1 gr.

Résorcine..... 0 gr. 20

Excipient glyciné. Q. S.
pour 100 gr.

Indications. — Angines diverses, ulcérations bucco-pharyngées des angines, stomatites, abcès des amygdales, etc...

Laboratoires BOMEL

ANNONAY (Ardèche) — France.

COLLUTOIRE TRÉPALLIX

Composition. — Solution stabilisée de lactate de mercure à 0 gr. 60 pour 100 grammes.

Action. — Celle résultant de la composition même du lactate de mercure (acide lactique et mercure).

Cette préparation, tout en utilisant au maximum les puissantes propriétés anti-infectieuses et désinfectantes du lactate de mercure, réalise le double avantage : de conserver indéfiniment cette qualité sans subir aucune altération ; de n'entraîner à l'usage aucun accident toxique local ou d'ordre digestif.

Indications. — *Toutes les angines aiguës non-diphthériques* : angines érythémateuses simples, angines érythémato-pultacées, angines herpétiques, angines du fuso-spirillaire de Vincent, etc., stomatites toxiques ou infectieuses, gingivites.

Posologie. — Se prescrit en badigeonnages, attouchements, gargarismes, bains de bouche.

Angines aiguës : 2 à 4 badigeonnages par 24 heures ou 2 à 3 gargarismes par jour (40 à 50 gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie).

Stomatites : 2 ou 3 attouchements légers sur le pourtour des gencives et au contact même des lésions.

Enfants : La moitié des doses ci-dessus indiquées.

SYNTHESIS

R. L. MATHIVAT

Docteur en Pharmacie — Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
66, rue de la Pompe — Paris.
(Tél. : Trocadéro 30-52 et 32-91.)

COLLYRES CHIBRET

(Chibrocollyres)

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 1471-7 à 1471-21.
En ampoules compte-gouttes, contenant 10 cc. de liquide, pouvant se maintenir aseptique, ne modifiant pas la tension oculaire ni l'accommodation.

Chibroargyrol, Chibrocollargol, Chibrocoïcaine, Chibroprotargol, Chibroargent (Azotate), Chibrobleu (spécial), Chibroatropine, Chibroatropine et Cocaïne, Chibrohomatropine, Chibronovocaïne, Chibropilocarpine, Chibropilocarpine-Adrénaline, Chibrocuivre, Chibrozin, Chibrozin et Novocaïne, Chibroésérine, Chibroésérine et Adrénaline, Chibrofluorescéine, Chibroborate de Soude et Adrénaline, Chibroiodure de Potassium et Chlorure de Calcium, Chibrocyaneure de Mercure, Chibromercurobrome.

Collyres en ampoules de 1 cc. (pour nouveau-nés).
Chibromercurobrome, Azotate, Argyrol.

Renseignements thérapeutiques sur tous nos produits et échantillons, sur demande, à MM. les docteurs à

Laboratoire CHIBRET

5, rue Saint-Hérem, CLERMONT-FERRAND
(Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-36.)

(Voir à *Pommades* la liste des Produits Chibret.
Marque déposée « Optima ».

Voir à *Chibromercurobrome* le libellé spécial.)

COLLYRE ROSE

Formule :

Camphre	0 gr. 01
Chlorhydrate d'ammoniaque.....	0 gr. 02
Sulfate de zinc	0 gr. 04
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.	0 gr. 50
Eau distillée.....	10 gr.
Safranine, Q. S. pour colorer.	

Indications. — Larmoiement, Blépharites, Cils collés, Conjonctivites des vieillards et des enfants, Herpès de la cornée.

Posologie. — II à III gouttes, trois fois par jour.

COLLYRE BLEU

Formule :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Stovaine	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Toutes conjonctivites, Blépharites, Kératites, Ulcérations de la cornée.

Posologie. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

COLLYRE BLEU IRRADIÉ

Formule :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 004
Stovaine	0 gr. 02
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Toutes celles du Collyre bleu. Mais son efficacité est renforcée par l'application des Rayons ultra-violets et l'action tonifiante exercée sur les tissus, surtout dans les cas de *Blépharites par avitaminoses*.

Spécifique de la kératoconjonctivite phlycténulaire.

Posologie. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour.

Flacons-ampoules compte-gouttes de 15 cc.

Laboratoires LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie

52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS

(Tél.: Flandre 00-55.)

COLPOPHILE

Paquets de poudre soluble.

Formule :

Cérasine, Saponine, Acide Orthoxybenzoïque, Tétraborate de Soude, Sulfate d'alumine et de Potasse, Bicarbonate de soude, Parfum Q. S. pour 1 paquet.

Posologie :

- 1° Un paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède ;
- 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 3° Obstétrique, 2 à 3 paquets pour 2 litres d'eau ;
- 4° Hygiène masculine ou Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 ou 1 litre d'eau en compresses ou lotions.

Prix :

La boîte de 30 paquets : 18 fr. 70.

RICHER, docteur en Pharmacie

45, faubourg Saint-Denis, 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

COLTÈNE

Composition. — A base de Coaltar solubilisé, chloralé, mentholé et aromatisé.

Propriétés et Indications. — Antiseptique et anesthésique pour soins de la bouche, de la gorge et du nez.

Posologie et mode d'emploi. — Le Coltène s'emploie à la dose de XX gouttes par verre d'eau chaude, en bains de bouche, en gargarismes ou en pulvérisations.

Dans tous les soins dentaires post-opératoires, après les extractions, dans les abcès, les fluxions dentaires et les plaies de la bouche, les gingivites, les stomatites, les angines, les amygdalites, les pharyngites et tout autre état inflammatoire de la muqueuse bucco-pharyngée.

Comme dentifrice, quelques gouttes dans un demi-verre d'eau froide.

En vente dans toutes les Pharmacies.

Dépôt et vente en gros :

J. BLANCHARD, Pharmacien de 1^{re} classe
PONT-DE-VAUX (Ain).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1195-2.

COLUVAL

Collyre polyvalent.

Neutralisant, antiseptique, angiotonique
et astringent.

Composition. — A base d'eaux distillées d'*Hamamelis Virginica*, de Fenouil, de Rose, de Sureau ; d'acide borique et de borate de Soude.

Indications. — Toutes les infections de l'œil : conjonctivite, orgelets, blépharite, chalazions, kératite et kérato-conjonctivite, iritis, kérato-iritis, irido-cyclite, dacryocystite.

Le Coluval présente un pH = 8,5.

Mode d'emploi. — Bains oculaires, instillations, compresses.

Prix : Le flacon avec œillère (200 cc. env.) : 15 fr. 30.
Le double flacon sans œillère (400 cc. env.) : 23 fr. 95.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
Tél. : Charlebourg 39-70.

COMBEY-LAX

le délicieux laxatif.

Véritable confiture liquide absorbée comme une friandise par les enfants.

Composition exclusivement végétale aux sucres de fruits et plantes rafraîchissantes (Pomme de reinette, Cassia, anis vert, fenouil, coriandre, bourrache).

Action très douce, sans coliques et sans accoutumance, chez les nourrissons, les enfants, les adultes (femmes enceintes, opérés, convalescents et tous les organismes délicats).

Doses :

Enfants du 1^{er} âge : 1/3 ou 1/2 cuillerée à café.

Enfants au-dessus d'un an : une cuillerée à café ou une cuillerée à dessert.

Adultes : une ou deux cuillerées à soupe.

Doses variables suivant les indications du médecin traitant.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires COMBEFREYROUX

134, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
(Tél. : Oberkampf 51-10.)

COMBRETINE

BOCQUILLON-LIMOUSIN

Extrait fluide de Combretum Rambaultii H.

« Le plus actif des cholagogues. »

Professeur ROBIN.

Indications. — Coliques hépatiques, Congestion du foie et de la Vésicule biliaire, Crises douloureuses du foie, Insuffisance hépatique, Ictère et Cholémie.

Dyspepsies réflexes, Migraines, }
Vertiges, Prurit, Constipation, } d'origine hépatique.

Forme. — Extrait fluide.

Posologie. — XXX à LXXX gouttes par jour, à prendre en 3 fois au début des repas.

Avantages. — Action douce, constante et rapide sur les diverses fonctions du foie. Jamais toxique. Cholagogue d'une remarquable activité. Agit plus sûrement que le boldo et sans déterminer d'accoutumance.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 199-4.

Laboratoire BROCHON

202 bis, avenue Jean-Jaurès — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

COMBRETODRAINOL

Composition. — Agar-Agar, Évonymine brune, Podophyllin, extrait mou de Belladone, extrait de Combretum, Purgène, Entérokinase, Pancréatine, Extraits biliaires.

Indications. — Constipation, Insuffisance hépatique, Cirrhose, Ictère, Hypertension, Dermatoses.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux, Cholagogue, Traitement idéal des affections du foie et de l'intestin.

Posologie :

Enfants : 1 dragée le soir au repas.

Adultes : 2 dragées le soir à avaler sans mâcher avec un peu d'eau.

Laboratoires DOLADILLE

à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher).

(Tél. 69.)

COMITIOL

Formules. — Faible. Normale. Forte.

Chaque comprimé contient : Tartrate-borico-potassique, 0 gr. 50 + Phényl-éthyl-Malonylurée.

0 gr. 01 par comprimé, formule faible.

0 gr. 02 par comprimé, formule normale.

0 gr. 03 par comprimé, formule forte.

Indications. — EPILEPSIE, Convulsions, Parkinson, Chorée, Angor Pectoris, Angoisses.

Avantages. — Activité aussi grande que celle des hautes doses de Phényl-Ethyl-Malonylurée, sans leurs inconvénients.

Doses. — *Adultes* : 6 comprimés par jour, quelle que soit la formule employée.

Enfants : 1/3 de comprimé par année d'âge et par jour. Sous peine d'accident, ne jamais interrompre brusquement le traitement par le COMITIOL.

Prix.	Formule faible	Formule normale.	Formule forte.
Boîte de 10 jours.	13 fr. 10	17 fr. 45	19 fr. 65
— 30 —	32 fr. 80	43 fr. 75	54 fr. 70

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous les n^{os} 309-1, 309-2, 309-3, 309-4.

Pharmacie GRORICHARD

12, place de la Révolution — BESANÇON.

COMPOSÉ GMET

Tonique aux effets précoces et durables.

Composition. — Kola - coca - quinquina, sans addition d'alcool ni de caféine, ni de strychnine.

Propriétés. — Tonique général et nerveux. Effets *immédiats* mais *durables*.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, convalescences, suites de couches, d'opérations, fatigue, surmenage, pré tuberculose, Asthénies.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau froide avant les repas, une ou deux fois par jour. (En cas de tachycardie, ajouter une cuillerée à café de Cratægus Gmet, régulateur cardiaque.)

Le flacon pour 1 mois : 27 doses. 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

COMPRESSES GRASSES "ONCTUA"

Composition :

Para-Isopropylmétacrésol	0,35
Phenolum salicylicum	0,75
Oleum cacao	10
Paraffinum	15
Cera Alba	7
Adeps lanæ	7
Vaselinum	Q. S. p. 100 gr.
Baume du Pérou	1 %

Indications. — Tous pansements de brûlures, ulcères, furoncles, anthrax, abcès, escarres. Plaies diabétiques. Guérison assurée toutes plaies variqueuses.

Présentation et prix. — Carrés de tulle grec de 10 x 10. Compresses grasses de 10 x 10 ne séchant pas, s'enlevant rapidement, évitant l'arrachement des bourgeons d'épidermisation.

La boîte de 6 compresses : 10 fr.

— 12 — 15 fr.

— 20 — 23 fr.

Adresser les demandes :

Dépôt général **Établissements ECHARD-GILLIER**
Pansements
L'ARBRESLE (Rhône).

LORIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

COMPRESSIF BESLIER

Appareil perfectionné pour le maintien et la guérison de la **Hernie ombilicale** chez les enfants.

Le **Compressif Beslier** est un appareil sans caoutchouc confectionné en sparadrap Beslier très adhésif et non irritant pour l'épiderme délicat des enfants.

Le **Compressif Beslier**, très pratique parce que très simple, est d'une application très facile. Il ne se déplace pas sous l'influence des mouvements du corps et maintient continuellement la hernie refoulée.

Le **Compressif Beslier** supprime tous les inconvénients des bandages en caoutchouc.

N° 1. Bébés, la boîte de 2 : 18 francs.

N° 2. Enfants, la boîte de 2 : 22 francs.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

COMPRIMÉS D'ALIBOUR

Composition. — Association de sulfate de zinc et sulfate de cuivre dans les mêmes proportions que dans la formule d'Eau d'Alibour faible. 1 comprimé dissous dans 100 gr. d'eau donne l'Eau d'Alibour.

Indications. — Traitement des plaies, des inflammations des yeux, des flueurs blanches, impétigo, ecthyma.

Action. — Antiseptique d'usage courant, prophylactique, hygiénique, anticatarrhal.

Dose. — Deux comprimés dans 2 litres d'eau bouillie chaude pour injection vaginale, et en lotion pour les yeux et les muqueuses. Quatre comprimés par litre d'eau pour traiter les plaies superficielles infectées, l'impétigo, l'ecthyma.

Prix : 12 fr. 75 la boîte de 36 comprimés.

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

COMPRIMÉS « GALAC »

Ferment lactique titrant 50 % de culture pure de Bacille bulgare.

Antiseptique gastro-intestinal.

Traitement spécifique et inoffensif des Gastro-Entérites infantiles, Infections Gastro-Intestinales, Dermatoses.

Chaque flacon porte UNE ÉTIQUETTE PRÉCISANT LA DATE DE FABRICATION, GARANTISSANT AINSI LA DURÉE D'ACTIVITÉ REELLE ET INCONTESTABLE DU MÉDICAMENT.

Adultes : 2 à 3 comprimés ; **Enfants :** 1 à 2 comprimés.
Trois fois par jour, délayés dans un peu d'eau bouillie, avant les repas.

Prix du flacon de 60 comprimés : 11 francs.

Prix du flacon de 20 comprimés : 4 fr. 50.

Laboratoires LAMBERT
Place du Châtelet — ORLÉANS.
(Tél. : 34-50.)

COMPRIMÉS GUILLAUMIN

à l'oxycyanure d'hydrargyre.

Composition. — Comprimés d'oxycyanure d'hydrargyre dosés à 0 gr. 50 et 0 gr. 25.

Propriétés. — Ces comprimés sont très solubles dans l'eau avec laquelle ils donnent une solution très limpide, d'un pouvoir antiseptique élevé, très bien tolérée par les mains et les muqueuses et n'attaquant pas les instruments nickelés.

Indications. — S'emploient avec succès en gynécologie et en obstétrique, dans les maladies des voies génito-urinaires (métrite, flueurs blanches, vaginite, urétrite, blennorrhagie), dans le pansement des plaies, enfin comme antiseptique en général.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre un comprimé dans un ou deux litres d'eau. La dissolution s'effectue en quelques secondes si on a soin d'écraser le comprimé dans l'eau.

Prix : 10 fr. 70. et 11 fr. 50.

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

COMPRIMÉS LAXOCRINOL

Caractéristiques. — Extraits végétaux activés par l'action cholérétique de l'acide cholique.

Composition :

Acide cholique	0,05
Entérokinase.....	0,002
Pancréatine	0,0006
Ferments lactiques.....	0,001
Sulfate de quinine	0,01
Extrait de belladone.....	0,01
Poudre de Cascara sagrada.....	0,04
Poudre de podophylline.....	0,01
Essence d'Anis.....	0,01

Indications. — Traitement physiologique de la constipation aiguë et chronique et des maladies hépatobiliaires.

Mode d'emploi. — Un ou deux comprimés, au repas du soir ou avant de se coucher.

Prix : boîte grand modèle de 60 comprimés : 15 francs.

Laboratoires P. REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

COMPRIMÉS NICAN

Par comprimé :

Chlorhydrate d'Ethylmorphine (Dionine N. D.), 0 gr. 01.

Benzoate de soude 0 gr. 25, Extraits Serpolet et Coquelicot
(du sirop de Desessartz), Extraits Aunée et Marrube.

Sédatif de toutes les toux, *fluidifiant* et *expectorant*.

Complément pratique des **Gouttes Nican**, pour le traitement ambulatoire.

Bronchites saisonnières, Toux persistantes, Séquelles de Rhumes, Trachéites irritatives, Mucosités bronchiques.

Quand le rhume « traîne » et contre l'habitude de tousser.

Posologie. — *Adultes et adolescents :*

2 à 4 comprimés par jour dans les formes aiguës.

1 à 2 comprimés par jour, ou le soir au coucher, dans les formes chroniques.

Tube de 20 comprimés pour 5 à 10 jours de traitement.

Voir **Gouttes Nican** à base de Codéine et Bromoforme.

Laboratoires CANTIN

PALAISEAU (Seine-et-Oise).

COMPRIMÉS PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Streptococciques, Staphylococciques et Pyocyaniques, 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspondant à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Streptococciques, Staphylococciques et pyocyaniques.

Indications thérapeutiques. — Absès, Phlegmons, Anthrax, Panaris, Furoncles, Sycosis, Orgelets, Pyodermites, Impétigo, Intertrigo, toutes les affections à germes Pyogènes.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés, 23 fr. 95.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage, Voies Respiratoires 0,05, Excipient Q. S. pour 1 comprimé de 0,50.

Comprimé insoluble dans l'estomac, mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage. Voies Respiratoires.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés. 23 fr. 95.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Angine, Bronchites, Broncho-pneumonies, Grippe.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

PROBIOS INTESTINAL

Comprimés.

Formule. — Mélange à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal 0,05 pour 1 comprimé de 0,50. Comprimé insoluble dans l'estomac mais soluble dans l'intestin, correspond à 2 cc. de mélange liquide à parties égales d'Antivirus-Bactériophage Intestinal.

Indications thérapeutiques. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases, Dysenteries bacillaires et tous états toxi-infectieux intestinaux.

Présentation. — En boîte de 36 comprimés. 23 fr. 95.

Mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour, avant les repas. Avaler sans croquer, avec un peu d'eau.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-7.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e). (Tél. : Turb. 40-83.)

COMPRIMÉS PURGOS

Les **Comprimés Purgos**, aux sels concentrés de Vichy, de magnésie et de soude, ont été créés pour remplacer l'Eau Minérale de PURGOS dans tous les cas où il est difficile et même impossible de se la procurer, par exemple au cours d'un voyage, en excursions, et dans les pays lointains.

Composition. — Les **Comprimés Purgos**, dissous dans un peu d'eau minérale de Vichy, offrent toutes les qualités de l'eau minérale purgative et reproduisent exactement tous ses principes actifs.

Chaque comprimé représente en sels cristallisés :

Sulfate de soude	4 gr. 248
Sulfate de magnésie	0 gr. 747

Propriétés. — Les **Comprimés Purgos** ont une action toute particulière sur les voies digestives.

Indications. — Ils sont indiqués dans tous les cas d'atonie des voies digestives, dyspepsies, embarras gastriques, constipation chronique, maladies du foie, etc.

Dose purgative : 4 à 6 comprimés }
Dose laxative : 2 à 3 comprimés } le matin à jeun.

En tubes de 24 comprimés : dans toutes Pharmacies.

Dépôt : **Laboratoire NOGUÈS**
7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

COMPRIMÉS RECAL

Propriétés. — Reminéralisant. Recalcifiant.

Indications. — Décalcification, carie dentaire, lymphatisme, rachitisme, fatigue, surmenage, grossesse, allaitement, dépression nerveuse, convalescence, neurasthénie, pré tuberculose, déminéralisation, consolidation des fractures, phosphaturie, scrofule, chlorose, anémie, diabète, tuberculose.

La boîte de 50 comprimés : 20 fr. 80.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule F.

Ils ne s'adressent qu'aux fillettes ou jeunes filles de 9 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés, *dragéifiés* : 24 fr. 50.

COMPRIMÉS RECAL — PUBERTÉ

Formule M.

Ils ne s'adressent qu'aux garçons ou jeunes gens de 10 à 18 ans (troubles de la croissance).

La boîte de 50 comprimés *dragéifiés* : 25 fr.

Les **Comprimés Recal — Puberté-Formule F** et les **Comprimés Recal — Puberté-Formule M** sont deux spécialités distinctes, qui constituent chacune un complexe endocrino-minéral à la fois reminéralisateur particulièrement puissant et médication *spécialement destinée à l'époque de la puberté*.

Composition :	Comprimés Recal.	Comprimés Recal, Puberté, formule F.	Comprimés Recal, Puberté, formule M.
Chlorure de magnésium sec	0 gr. 0023	0 gr. 0023	0 gr. 0023
Poudre de surrénale.		0 gr. 008	0 gr. 008
Poudre de thyroïde.		0 gr. 01	0 gr. 01
Fluorure de calcium	0 gr. 01	0 gr. 01	0 gr. 01
Poudre d'ovaire ...		0 gr. 025	
Orchitine			0 gr. 025
Hydrocarbonate de magnésie léger...	0 gr. 05	0 gr. 05	0 gr. 05
Diphosphate tricalcique	0 gr. 15	0 gr. 25	0 gr. 25
Carbonate de calcium	0 gr. 30	0 gr. 13	0 gr. 13

Excipient pour 1 comprimé *dragéifié*.

Laboratoires FLEURY, ARCACHON Tél.: 124

G. FLEURY, Docteur ès Sciences

Docteur en pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

COMPRIMÉS VICHY-ÉTAT

Effervescents.

Au sel Vichy-État.

Médication Alcaline pratique et économique.

Mode de présentation. — Les « Comprimés Vichy-État », présentés sous forme de pastilles effervescentes, permettent de préparer par simple dissolution, au moment du besoin, de l'eau alcaline gazeuse artificielle.

Indications. — L'usage des « Comprimés Vichy-État » est indiqué dans les affections de l'estomac, du foie, des reins, etc.

Posologie. — 3 à 4 Comprimés Vichy-État pour un verre d'eau, 12 à 15 pour un litre.

Le flacon contient 100 comprimés Vichy-État.

Georges PRUNIER et Cie

4, rue de la Coutellerie — PARIS — (Tél.: Arc : 00-35)
et Pharmacies.

CONES Solubles Antiseptiques RENDELL

Antiseptique extrêmement puissant sans aucune action caustique ou irritante.

Forme. — Les « cônes » sont des ovules de forme particulière facilitant leur utilisation et assurant leur conservation aseptique.

Composition. — Dichlorhydrate d'Iso-octyl-hydrocupréine ; Sulfate neutre de Quinine ; Sulfate d'Orthoxyquinoléine.

Indications. — Action spécifique sur les bactéries et les protozoaires des voies génitales féminines.

Prévention et traitement de toutes les infections d'ordre gynécologique.

Aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Le cône introduit, avant le coucher, dans le vagin, doit y demeurer pendant toute la nuit.

Échantillon gratuit sur demande.

Prix : 25 fr. 50 la boîte de 12 cônes.

Dépôt général RENDELL

61, rue Damrémont — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 31-14.)

CONTINOL

Composition. — Association d'Ergot de Seigle, de Rhus aromatica et de Quinquina rouge.

Comprimés contenant 10 centigrammes d'extrait fluide d'Ergot, 10 cgr. d'extrait fluide de Rhus et 40 cgr. de poudre de quinquina rouge.

Propriétés. — Modificateur du système neuro-végétatif par l'Ergot et la Rhus. Tonique de l'état général par le Quinquina.

Indications. — Incontinence d'urine diurne ou nocturne.

Présentation. — Boîte contenant 45 comprimés, suffisante pour 1 mois de traitement.

Poscologie. — Dose moyenne 2 à 4 comprimés par jour suivant l'âge.

Prix : 18 francs.

Laboratoires H. et R. MASSON

2, place de la Porte-des-Ternes — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Etoile 31-10, 2 lignes.)

CONTRACIDE NORGAN

Constitution. — Mucilage finement divisé, en association avec une faible proportion de citrate de chaux.

Indications. — Tous les troubles de l'estomac provoqués par une acidité excessive de ses sécrétions ou de son contenu, depuis hyperchlorhydrie légère jusqu'aux ulcères constitués.

Mode d'action. — N'est pas un saturant chimique. Agit par fixation de l'acide, à la manière de la Mucine, mais d'une façon plus marquée.

Avantages. — Le Contracide retient l'acide fixé dans l'estomac et ne le restitue pas dans l'intestin. Il exerce ainsi un véritable drainage et l'acide peut être retrouvé dans les selles.

Par ses propriétés physiques, il réalise le meilleur pansement de la muqueuse.

Son action rapide contre l'élément douleur.

Emploi. — *Troubles légers*: 1/2 ou 1 cuillerée à café 3 ou 4 fois par jour.

Ulcères: 1/2 ou 1 cuillerée toutes les heures. Faire prendre le Contracide sec en conseillant de l'avaler à l'aide d'un peu de liquide.

Prix : 18 fr. 35.

Laboratoires NORGAN.

P. ALEXANDRE, Pharmacien,
21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e).

CONVALBAÏNE

Toni-cardiaque.

Composition. — Association de Convallamarine (glucoside du muguet) et d'Ouabaïne.

Comprimés contenant 1/2 cgr. de Convallamarine et 1 mgr. d'Ouabaïne.

Propriétés. — Toni-cardiaque. Stimule d'autant plus puissamment le tonus du myocarde que les actions, synergiques, de la Convallamarine et de l'Ouabaïne se renforcent.

Indications. — Toutes les déficiences du myocarde :

Grande asystolie, Insuffisance ventriculaire gauche, Petite insuffisance cardiaque, Insuffisance cardiaque des myocardites chroniques, Insuffisance ventriculaire droite, Myocardites des maladies infectieuses aiguës, Arythmie extra-systolique, Tachycardies.

Présentation. — Boîte contenant 36 comprimés, suffisante pour un mois de traitement.

Posologie. — Dose moyenne 2 à 3 comprimés par jour.

Prix : 21 fr. 50

Laboratoire PERRIER

12, rue Henner — PARIS (IX^e)

(Tél. Trinité 51-03)

COPHED

Sirop calmant non hypnotique.

Asepsie des bronches.

Traitement spécifique des Voies respiratoires.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 451-26.

Composition. — Association : Codéine, Ephédrine, Dionine, Belladone, Drosera, Sulfogalacolate de Potassium.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Grippe, Laryngites, Pharyngites, Trachéite, Emphysème, Asthme, Coqueluche, Rhume des foins, Rhinites spasmodiques.

Posologie. — Le *Sirop Cophed* est d'un goût très agréable qui le fait accepter par les estomacs les plus délicats ; il peut être pris pur ou dans une infusion pectorale.

Les doses moyennes, sauf prescription spéciale du médecin traitant, sont les suivantes :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (au-dessus de 6 ans) : 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

G. ROUSSEAU, pharmacien de 1^{re} classe.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

COPREX (Dragées de)

Laxatif très doux, garanti sans phénolphtaléine et cholagogue prudent.

Composition. — Son de grains d'orge, Sulfate de magnésie (à cette dose, il agit en provoquant un léger flux de bile), Chlorure de magnésium (principe rééducatif des eaux de Châtel-Guyon), Extrait spécial de Cascara.

Deux formes :

1° Coprex : dragées ordinaires : une ou deux dragées, 1/2 heure de préférence *avant* l'un des repas. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit.

2° Coprex : dragées demi-dose : (représentant la moitié des dragées ordinaires), particulièrement recommandé aux personnes âgées, délicates, aux enfants, convalescents, opérés, accouchées. Prendre une dragée *à la fois* ou deux si l'effet est insuffisant.

La boîte vente pour un traitement de cinq semaines.

Prix : 10 fr. 60.

Laboratoires du FÉMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

COQUELICÔNES

Suppositoires contre la toux

Extrait de coquelicot, eucalyptol ozonisé, droséra.

AVANTAGES. — Evitent fatigue de l'estomac et perte de l'appétit. Fluidifiants, antiputrides et antiseptiques, Exempts d'héroïne, de morphine, d'extrait thébaïque, de dionine, de bromoforme, ils ne provoquent pas de torpeur. Effet rapide, tolérance parfaite, aucune toxicité.

INDICATIONS. — La toux, quelle qu'en soit la cause, depuis le simple rhume ; maladies aiguës et chroniques des voies respiratoires, toux émetisantes, toux nerveuses, *coqueluché*, toux chez les diabétiques, *sédatif par excellence de la toux des tuberculeux*.

Formes. — Trois formes : Coquelicônes pour adultes
Coquelicônes pour enfants, Coquelicônes pour bébés.

Posologie. — Coquelicônes pour adultes, pour enfants ou pour bébés : 1 à 4 par jour (l'absence de toxicité permettrait de doubler cette dose).

Prix : 18 francs la boîte de 12.

Pharmacie DUC
24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII°).
(Tél. : Etoile 11-96.)

COQUELUCHYL

Traitement de la coqueluche et de ses complications et des
toux spasmodiques.

COQUELUCHYL GOUTTES

Exclusivement végétales.

Euphorba helioscopia, *Ephedra*, *Grindelia Robusta*, *Drosera*, *Cratæ-
gus*, *Passiflore*, *Coquelicot*, *Serpolet*, *Saule blanc*.

Le *Coqueluchyl*, non toxique, non irritant pour les voies digestives, n'a
pas de contre-indication et peut être prescrit aux nourrissons.

Dose habituelle dans les 24 heures. — Jusqu'à 1 an : 4 fois X gouttes.

De 1 an à 3 ans : 4 à 6 fois XV gouttes.

De 3 ans à 12 ans : 4 à 5 fois XXX gouttes.

Au-dessus : 4 à 6 fois XL gouttes.

COQUELUCHYL BAUME

aux essences pénétrantes de *Cyprès*, *Serpolet*, *Eucalyptus*, *Melaleuca*,
Pin et *Camphre*, véritable bain balsamique anti-infectieux, tonique,
eupnéique. Application pratique de la méthode de Milne.

Mode d'emploi. — A tous les âges, larges applications sur le thorax
main et soir, recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Spécialités inscrites au L. N. C. M. sous les n° 1244-8 et 1244-7.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

COQUELUVAX

**Vaccin contre la coqueluche et
ses complications.**

Ingérable.

Composition. — Vaccin polymicrobien et poly-
valent préparé à partir de souches nombreuses soi-
gneusement sélectionnées, comprenant le plus
grand nombre de types et de variétés.

Indication. — Coqueluche et ses différentes com-
plications.

Posologie :

Nourrissons : 1 ampoule par jour.

Enfants : 2 ampoules par jour.

Adultes : 3 ampoules par jour.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 5 cc

Prix, la boîte : 20 fr. 40.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

CORAMINE

Diéthylamide de l'acide pyridine- β -carbonique.
CIBA

CARDIO-TONIQUE EUPNÉIQUE.

Tonique du cœur, stimulant de la respiration et de la circulation.

Préparation aqueuse, très fluide. S'injecte facilement, n'est pas douloureuse et se résorbe rapidement. Action prompte et énergique. Bien tolérée par la voie buccale, elle permet d'instituer une médication cardio-tonique intercalaire entre les cures de digitale ou de strophantus. Aucune toxicité.

Possibilité de traitements très prolongés.

Indications. — Collapsus cardiaque, syncope, états lipothymiques. Faiblesse du cœur au cours des maladies aiguës, des infections, des intoxications, de la période post-opératoire. Hyposystolie des vieillards, etc.

Gouttes. — *Ampoules.*

Doses. — Voie buccale XX à Q gouttes par 24 heures.
— parentérale 1 à 8 cc. —

Formuler. — Flaçon (gouttes)

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 5.

— de 20 — de 1 cc. 5.

— de 5 — de 3 cc.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Bd de la Part-Dieu — LYON. (Tél.: Moncey 43-26.)

CORÉÏNE

Mucilage pur, sans adjonction d'aucune substance laxative.

Produit exclusivement végétal. Rien de commun avec les gommés.

La Coréïne est un mucilage pur, indigestible, indestructible.

Absorbe et retient 50 fois son poids d'eau.

Indications. — Constipation simple, Colite muqueuse, Colite muco-membraneuse.

Formes. — Granulé, Paillettes, Semoule.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : { Granulé, 22 francs. Grand mod., 103 francs.
Paillettes, 20 francs. — 93 francs.
Semoule, 18 francs.

La Coréïne est admise par l'Assistance publique.

Pour absorber la Coréïne.

Paillettes. — Le matin, mettre dans un bol la quantité de Coréïne en paillettes prescrite, et verser dessus un peu de lait... ou de café au lait à raison de 3 cuillerées à soupe pour 2 cuillerées à café de paillettes.

Mélanger *vivement* et absorber *de suite* comme un potage.

A midi et le soir, mélanger la paillette avec quelques cuillerées de purée de légumes, de compote, de potage.

Granulé et Semoule. — Se prennent comme tous les granulés.

Pansements Intestinaux Coréïnés.

3 à 4 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillante en battant continuellement avec un agitateur en verre pendant quelques minutes. Laisser reposer 1/4 d'heure. Ajouter eau bouillie chaude pour obtenir émulsion semi-liquide. Introduire dans l'intestin avec tube d'écoulement *large*. Régler le débit avec une *pince* au lieu de robinet.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

COROSÉDINE

Médication de la douleur cardiaque.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

Aminophylline (Vaso-dilatateur des artères du cœur et des reins).

Chlorhydrate de papavérine (Antispasmodique).

Phényléthylmalonylurée (Sédatif du système nerveux).

Aminopyrine (Analgésique).

Propriétés thérapeutiques :

Calme les douleurs cardiaques, en empêchant l'ischémie du myocarde, par vaso-dilatation des coronaires.

Tonifie le muscle cardiaque par une meilleure irrigation.

Augmente la diurèse par vaso-dilatation des vaisseaux du rein.

Calme la dyspnée, par action sur le centre respiratoire et par action toni-cardiaque.

Indications :

Douleurs cardiaques :

Syndromes coronariens : Angine de poitrine, Infarctus du myocarde.

Insuffisance cardiaque douloureuse (Cœur sénile, cœur de l'hypertension, cœur de l'artério-sclérose).

Palpitations réflexes et névrosiques (Extrasystoles, Tachycardie, Tachycardie paroxystique, cœur irritable, cœur Basedowien, etc.)

Douleurs aortiques. Algies précordiales.

Posologie :

Deux comprimés 2 ou 3 fois par jour, au début des repas.

Les cures prolongées constituent le meilleur traitement préventif des crises douloureuses.

Prix : 22 fr. 45. le tube. —

Emile MONAL

Docteur en Pharmacie.

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

CORTIODE

Régulateur des fonctions cardio-vasculaires.

Composition. — Association d'iodaseptine (42 p. 100 d'iode) et d'iodure de sodium (84,6 p. 100 d'iode) réalisant une dose d'iode élevée, sans risques d'intolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Fait baisser la tension artérielle, tonifie le cœur, dont il régularise et intensifie les contractions. Modifie rapidement le pouls bref et tardif.

Indications. — Angine de poitrine, Hypertension, Cardiopathies rhumatismales, Cardiosclérose, Ozène, Emphysème, Mycoses. Toutes les indications de la thérapeutique iodée intensive.

Présentation. — **Posologie :**

Ampoules de 5 cc. (0 gr. 250 d'iodaseptine, 0 gr. 221 d'iodure de sodium). 1 à 2 ampoules par 24 heures, en injection intraveineuse ; exceptionnellement intramusculaire. Jamais d'intolérance.

Solution à Ingérer. — XX gouttes = 0,050 d'iodaseptine et 0,0443 d'Iodure de Sodium.

Dose. — XXX à L gouttes 2 fois par jour au début du repas. Séries de 12 jours par mois.

Prix : La boîte de 10 ampoules 5 cc., 30 francs.

Le flacon, 21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70 et 53-71).

CORYDRANE

Comprimés.

Nouvelle substance synthétique (corps U. C. B. 22) cristallisée et chimiquement définie :

acétyl-salicylate de noréphédrane

analgésique antipyrétique décongestif tonique

Analgésique. — Calme les algies sans déprimer le malade.

Antipyrétique. — Par sédation de l'hypersensibilité des centres thermorégulateurs.

Décongestif. — Action décongestive rapide et prolongée intéressant particulièrement les muqueuses nasale et bronchique.

Tonique. — Relève le tonus, combat la dépression, excite le système ortho-sympathique et soutient la résistance de l'organisme.

Avantages. — Action plus prolongée que celle de l'aspirine. Action tonique sans équivalent, corrigeant la somnolence et l'hébétéude, et augmentant l'activité intellectuelle. *Corydrane* ne renferme *ni caféine, ni pyramidon, ni barbituriques.*

Indications. — *Courbatures fébriles*, Grippe, Coryza et leurs complications (voir Rhinalator). Algies, Névralgies, Migraines, Asthénie, Surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — 1 à 2 comprimés, le matin et à midi.

UNION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

5 et 7, rue Claude-Decaen — PARIS (XII^e). (Tél. Did. 37-93).

CORYPHÉDRINE

Association d'acide acétylsalicyllique (0 g. 50) et de Sanédrine (0 g. 015) pour un comprimé.

Indications. — Affections saisonnières des voies respiratoires supérieures.

Coryza aigu. Rhume des foins. Trachéo-bronchite grippale ou non. Névralgies post-opératoires.

Présentation. — Tubes de 20 comprimés.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 comprimés par jour par doses régulièrement espacées ; faire déliter les comprimés dans un demi-verre d'eau.

Prix de vente :

Le tube de 20 comprimés.... 7 fr. 30

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

COTON CATAPLASME ASTRUC

Pansement antiseptique, antiphlogistique, émollient.

Forme. — Constitué d'une nappe de coton hydrophile épaisse, protégée par un papier imperméable et recouverte d'une gaze adhérente imprégnée d'un mucilage desséché.

Présentation. — Présenté en boîtes de 5 ou 10 carrés.

Mode d'emploi. — Plongé dans l'eau bouillie chaude, le coton cataplasme se gorge d'humidité et emmagasine la chaleur. Essorer l'excès d'eau et appliquer sur la région intéressée.

Indications. — Toutes les applications de la chaleur humide prolongée, en médecine, petite chirurgie, oto-rhino-laryngologie : abcès, furoncles, phlegmon, anthrax, panaris, orgelets, ulcères variqueux, adénites, angines, etc.

Laboratoires de LA FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT

5, Grande-Rue — MONTPELLIER

(Tél. : 54-93.)

CRATÆGUS GMET

Très agréable au goût.

Composition :

Extrait total sans alcool ni sucre du *Cratægus oxyacantha* correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés :

Régulateur du système neuro-végétatif hypotenseur-cardiotonique sédatif psychique. Plus actif que les préparations alcoolisées.

Indications :

Tachycardie, arythmies, éréthisme cardiaque, plexalgies, cardialgies, prurit, céphalées, vertiges. Tous les troubles neuro-psychiques consécutifs aux soucis, surmenage, déceptions, inquiétudes; névroses sexuelles. Puberté, menstruation, ménopause. Psychasténie, manie avec ou sans idées délirantes d'origine réflexe. Agitation post-opératoire. Phobies. Enfants instables, difficiles ou agités. Réaction sympathique des cures thermales, etc.

Posologie :

Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de lait.

La dose peut être triplée et exceptionnellement quintuplée dans les grandes agitations (psychoses). Très efficace contre insomnie des angoissés. Aucune toxicité. Remplace avantageusement les barbituriques toujours dangereux. Utile pour les tuberculeux.

Le flacon de 135 cc. 22 fr. 45

Pour un traitement prolongé, conseiller : *Cratægus Gmet*, un flacon géant (500 cc.) 58 fr.

Laboratoire GMET

Dr. A. LOROT, Pharmacien,
27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

CRAYON TERMOSAN

Composition :

Oléorésine de Capsicum.....	0,75
Menthol.....	1,50
Salicylate de Méthyle.....	2,00
Camphre.....	2,00
Acide Salicylique.....	0,50
Essence de Térébenthine.....	2,00
Essence de Lavande.....	1,50
Essence de Thym.....	1,50
Essence d'Eucalyptus.....	2,50
pour 1 crayon.	

Propriétés : Grâce à ses composants, il possède une puissante action thermogène, anesthésique, antiseptique, désinflammatoire, décongestive et stimulante de la circulation. Il pénètre facilement à travers les tissus.

Indications : Refroidissements, fatigue musculaire et articulaire, névralgies, rhumatismes, sciatiques, angines, crampes et coups.

Présentation : Révulsif solide en bâton, dans un tube à glissière.

Mode d'emploi : Frotter légèrement la partie affectée pendant quelques secondes. Pour intensifier l'action, couvrir avec coton ou linge de laine.

Si l'intensité de la maladie nécessite plusieurs applications, il est recommandé de nettoyer la région avec de l'alcool avant chaque application, afin de faciliter la pénétration des essences.

Laboratoire du Docteur BOUCARD

30, rue Singer — PARIS. (XVI^e.)

CRÉAGÉNOL

Médication reconstituante et tonique.

Composition. — Inositolphosphate de chaux et de magnésie. Acétylamino-oxyphénylarsinate de chaux et hypophosphite de manganèse. Gluconate de chaux, en granulé sucré.

Indications. — Convalescences et états anémiques. Troubles de croissance. Rachitisme, Asthénie. Dépression nerveuse et surmenage. Tuberculose.

Mode d'emploi :

Adultes : une à deux cuillerées à café, 2 fois par jour au repas, pur ou délayé dans 1/2 verre d'eau.

Enfants : une cuillerée à café, 2 fois par jour.

Granulé très actif et d'un goût agréable.

Prix : 18 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e)

(Tél. : Carnot 78-11.)

CRÉDONE DEHAUSSY

Méthyl-acétyl-phényl-diméthyl-oxamyl-hydrazide.

Communication à l'Acad. des Sciences du 12 nov. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 23 déc. 1929.

Communication à l'Acad. des Sciences du 6 janv. 1930.

Communication à la Soc. chimique de France
du 24 janvier 1930.

Indications :

Algies : Migraine, Névralgies dentaires, Névralgies périphériques, Douleurs des tuberculeux, Algies cataméniales, Douleurs rhumatoïdes, Douleurs fulgurantes, etc., etc.

Etats infectieux : Grippe, Rhumatisme articulaire aigu, Angines.

Nervosisme : Insomnie, Agitation, Anxiété.

Posologie :

Adultes : 2 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1 à 2 cachets par jour.

De préférence avec une infusion ou un verre d'eau.

Boîte, 12 cachets : Prix : 9 fr. 65

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

CRÈME MEGÈVE

Crème *très hydratée* à base d'alcools cholestériniques (éléments inodores donnant à la Lanoline son pouvoir absorbant), stable, neutre, inoxydable.

Peut servir de crème de ville, aussi bien que de crème de sports (montagne, mer).

Traitement ou prévention des coups de soleil, brûlures au 1^{er} degré, zona, érythème, dermites professionnelles ou médicamenteuses.

Principales présentations :

Petite boîte contenant	30 gr.
Grande boîte contenant	100 —
Tube	60 —
Tube.....	30 —

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,

Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
(Tél. : Pereire 57-41.)

CRÈME RÉSOLUTIVE du D^r RAP

Composition. — Produit onctueux sans corps gras, à base de principes à actions fortement vasoconstrictive et analgésique :

(Hamamelis, Noix vomique, Arnica, etc.)

Propriétés. — Calme la Phlébaldgie, décongestionne, facilite la résorption des œdèmes.

Indications. — Varices, phlébites, hémorroïdes, insuffisances veineuses. Stase post-traumatique, entorses, fractures.

Mode d'emploi. — En massages matin et soir. S'il existe une contre-indication au massage, employer « l'Extrait Rap » en lotion ou en vaporisation.

Prix : 13 fr. 65 et 18 fr. 65.

Enregistré L. N. C. M. n° 20-6.

Laboratoires du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

CRÉOFORMINE

Spécifique de la toux et de l'expectoration.

Composition. — Tannocréosoforme, 0,20. Phosphate de gaïacol, 0,05. Bromoforme, III gouttes. Codéine, 0,01.

Forme. — Comprimés glutinisés, digérés seulement dans l'intestin.

Indications. — Grippe, Toux catarrhales, nerveuses et spasmodiques, Coqueluche, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Rhumes, Ectasie bronchique, Entérite tuberculeuse.

Mode d'emploi. — De 4 à 8 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 doses.

Avaler sans croquer.

Le traitement le plus actif et le plus économique
(25 comprimés par boîte).

Prix : 16 francs.

Laboratoire de la CRÉOFORMINE

18, rue de Jouvence — DIJON (Côte-d'Or).

CRÉOFRUITS

Composition. — Créosote associée au Thio-col et au chlorure de Calcium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les propriétés de la Créosote; désinfecte l'arbre pulmonaire, stimule l'état général, désinfecte le sang et est indiqué dans toutes les tuberculoses.

Indications. — Réalise l'imprégnation calcichlorocréosotée préopératoire prévient l'infection pulmonaire dans les meilleures conditions de goût et de digestibilité. Adénopathie trachéobronchique.

Mode d'emploi. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 15 fr. 55, flacon 210 cc.

Laboratoire des ABATILLES
Route du Moulleau — ARCACHON.

CRÉOSITOIRES

Méthode d'imprégnation créosotée par voie rectale à base de Créosote de hêtre pure et éteinte.

Suppositoires actifs et non caustiques.

Composition :

	Adultes.	Infantiles.
Créosote pure éteinte.	0 gr. 50 (XX g ^{tes})	0 gr. 125 (V g ^{tes})
Extrait thébaïque	0 gr. 015	Néant.
	P. 1 suppositoire adulte.	P. 1 supposit. enfant.

Indications. — Toutes les affections pulmonaires aiguës ou chroniques de l'adulte et de l'enfant, Bronchites, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Absès du poumon. Prophylaxie des complications pulmonaires grippales, rubéoliques et des accidents anesthésiques. Destruction des oxyures.

Prix (la boîte de 8) : Adultes : 15 fr. 90. Infantiles : 12 fr. 70.

Posologie. — 1 à 3 par jour suivant avis médical.

Laboratoires MARGEX

Docteur P. LAURENT, Pharmacien,
13, rue Mélingue — PARIS (XIX^e). (Tél. Botz. 56-44.)

CRÉOSOFORME LAMBIOTTE FRÈRES

Méthylène-Créosote. Combinaison d'aldéhyde formique (4 p. 100) et de créosote (95 p. 100). Inodore, non toxique, puissamment antiseptique. Supérieure à l'iodoforme dans tous ses emplois.

Propriétés thérapeutiques. — Au contact des cellules vivantes, il se décompose graduellement en créosote et aldéhyde formique à l'état naissant qui déterminent l'asepsie complète des plaies et leur rapide cicatrisation.

Indications. — Plaies, Ulcères, Brûlures, Engelures, Fistules, Tuberculoses chirurgicales, Dermites, Gynécologie, Hémorroïdes et toutes autres affections anales, etc.

Mode d'emploi. — Existe sous quatre formes :

- 1° *Créosoforme-Poudre*, pour saupoudrage des plaies.
- 2° *Créosoforme-Onguent*, présenté en tubes d'étain.
- 3° *Créosoforme-Ovules*, pour pansements gynécologiques.
- 4° *Créosoforme-Suppositoires*, 1 ou 2 par jour.

Prix : 20 f. 65

Littérature et Echantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

CRÉO-SUPPO-CAMPHRE

Traitement des affections bronchiques.
Imprégnation créosotée par voie rectale.

Formule :

<i>Adultes :</i>	Créosote pure. XV gouttes	0 gr. 40
	Camphre	0 gr. 05
	Véhicule spécial	Q. S. pour 1 suppositoire.
<i>Enfants :</i>	Créosote pure. VIII gouttes	0 gr. 20
	Camphre	0 gr. 03
	Véhicule spécial	Q. S.
<i>Nourrissons :</i>	Créosote pure III gouttes	0 gr. 075
	Camphre	0 gr. 015
	Véhicule spécial	Q. S.

Indications. — Dans les affections respiratoires, toutes les Hyper-sécrétions bronchiques, et toutes les fois qu'il s'agira de tarir un élément catarrhal en soutenant le cœur trop souvent fatigué par une toux incessante.

Préventif des complications pulmonaires, anté et post-opératoires.

Bronchites aiguës en fin d'évolution, Bronchites chroniques, Asthme, Emphysème pulmonaire.

Antisepsie respiratoire, si utile après tout infection, Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Rougeole.

Dans la pré-tuberculose et la tuberculose non évolutive.

Laboratoires REBOUL

62, av. de Paris — VILLEJUIF (Seine).

CRÉSENTYL

Le CRÉSENTYL est un benzo-méta-Crésol chimiquement pur, présenté en comprimés titrés à 0 gr. 50 de produit actif.

Ce produit a été étudié et mis au point dans le laboratoire et le service du Dr. Louis Fournier à l'hôpital Cochin. *Puissant anthelminitique, il a le grand avantage d'être dépourvu de toute toxicité.*

Spécifique des némathelminthes, ascaris, trichocéphales oxyures, etc., le CRÉSENTYL a aussi une action remarquablement rapide dans les amibiases et autres protozooses intestinales (*Lambli*a, *Balan*tidium, etc.). Excellent antiseptique intestinal, empêchant le développement des microbes de putréfaction (anaérobies), le CRÉSENTYL sera employé avec succès dans tous les cas nécessitant une désinfection de l'intestin.

MODE D'EMPLOI. — Désinfection intestinale :
4 à 6 comprimés par jour, par fraction de 2 ou 3 comprimés avant les repas, pendant 10 jours.

Vermifuge : *Adultes*, 8 à 10 comprimés le matin à jeun, par fraction de 4 à 5 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours. Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Enfants, 4 à 6 comprimés le matin à jeun, par fraction de 2-3 à la fois à 1/4 d'heure d'intervalle, pendant 5 jours.

Faire ainsi 4-5 cures de **Crésentyl** à 5 jours d'intervalle.

Le tube de 20 comprimés. Prix au public : 13 francs.

Laboratoires des ANTIGÉNINES

Dépôt et Bureaux : 1, place Lucien-Herr
PARIS (V^e).

(Anciennement, 43, rue Tournefort.
(Tél. : Gobelins 26-21.)

Laboratoire : 11, rue Michelet — PARIS (VI^e).

CRÉSOLARGOL

Suppositoires.

Médication créosotée par voie rectale.

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Créosote de Hêtre {		
purifiée.....	0,50	0,25
Argent colloïdal.....	0,02	0,01
	par suppositoire.	

Indications. — Traitement et protection des Voies respiratoires : grippe, bronchite, états fébriles, toutes affections pulmonaires. Sans intolérance et sans contre-indication ni causticité.

Présentation :

En boîtes de 8 suppositoires : 17 fr. 50

Doses :

1 à 2 suppositoires par jour.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403.

Laboratoire HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71.)

CRÉSOPHANYL

du Professeur Carrière

Ester des acides crésoïque et phénylcinchoninique.

Indications : Goutte, Rhumatisme goutteux, Rhumatisme aigu, Rhumatisme chronique, Sciatique, Lumbago, Analgésique.

Associe en un seul composé chimique défini les effets particulièrement appréciés de l'acide phénylcinchoninique et la médication homosalicylique.

Posologie : Dose moyenne : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 par jour, 2 à 6 cachets.


PRODUITS STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRÉSOPIRINE

des Professeurs G. CARRIÈRE et E. GÉRARD

Acide Acétyl-Crésotinique Ortho



Produit synthétique défini et pur.

Indications. — Traitement du rhumatisme aigu et chronique et de la douleur sous toutes ses formes.

Posologie. — *Douleurs rhumatismales, névralgies* : Prendre de 1 à 4 comprimés ou cachets d'un gramme dans la journée.

Insomnie : Le soir en se couchant, prendre 1 ou 2 comprimés ou cachets d'un gramme dans une tasse d'infusion de tilleul.

Rhumatisme articulaire aigu, fébrile : Se conformer à l'avis du médecin qui, selon les cas, peut prescrire d'emblée 4 à 8 gr. par jour.

Grippe : 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

Produits « STÉNÉ »

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRÉSOTANOL

Traitement externe de la douleur.

Composition. — Crésotinate de Butyle et Crésotinate de Propyle à parties égales.

Indications. — Toutes les formes de rhumatisme aigu et chronique, sciatique, zona, névralgies de toutes sortes, douleurs musculaires, lumbago, torticollis.

Présentation. — Le CRÉSOTANOL est présenté sous forme de gouttes pour usage externe.

Mode d'emploi. — Employer exclusivement à l'extérieur. On verse X à XX gouttes de CRÉSOTANOL pour une surface de la grandeur de la paume de la main, on étale avec le doigt, on recouvre de suite avec un imperméable, soit taffetas gommé ou une feuille de gutta-percha, et on recouvre d'une couche de ouate qu'on fixe avec une bande. Renouveler le traitement 2 ou 3 fois par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e)

CRINERGYL

Opothérapie énergétique et de croissance.

Forme. — Gouttes, 30 cc. Traitement de 15 à 20 jours suivant l'âge.

Propriétés thérapeutiques et indications. — Anorexies, Hypotrophie infantile, Anémie, Débilité congénitale, Rachitisme, Cryptorchidie, Carie dentaire, Asthénie.

Formule. — Glycérophosphate Fer, 5 ; Glycérophosphate Ca, 10 ; Cl²Mg, 1 ; Thymus (corresp. en glande fraîche), 20 ; Moelle osseuse, 8 ; Acide phosphorique off., 17,50 ; Exp. solvant, Q. S. 100 cc.

Posologie. — A prendre dans un peu d'eau très sucrée.

Enfants : { 5 à 8 ans : X gouttes par jour.
8 à 10 ans : XX à XXX gouttes par jour ;
10 à 15 ans : XXX à XL gouttes par jour.

Adultes : XL à L gouttes par jour.

Le CRINERGYL cimente les éléments vitaux de l'organisme.

Enregistré L. N. C. M. sous le n° 1994-1.

Prix : 22 fr. 50.

H. BENOIT

Docteur de la Faculté de Pharmacie de Paris.

POLIGNY (Jura). — Tél. 84.

CRINEX

Gouttes - Dragées - Ampoules.

Composition. — Biosymplexe ovarien total standardisé.
Contient toutes les hormones ovariennes.

Gouttes : Solution hydro-alcoolique. 1 cc. (45 gouttes)
correspond à 0 gr. 30 de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = 5 gouttes.

Ampoules injectables : Solution aqueuse isotonique,
indolore, 10 unités Doisy-Curtis par cc.

Indications. — Insuffisances ovariennes, Troubles menstruels, Dysménorrhées, Oligoménorrhées, certaines Aménorrhées, Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale, Affections générales par insuffisance ovarienne, Obésité, Eczémas, Prurits, etc., certaines Stérilités.

Avantages. — Actif par voie buccale à faibles doses. Contient toutes les hormones de l'ovaire : hormones métaboliques (Anselmino et Hoffmann), hormone de stimulation hypophysaire (Marlow). Provient exclusivement d'ovaires frais d'animaux jeunes.

Contrairement aux folliculines, *Crinex* agit en stimulant l'ovaire ou en remplaçant *intégralement* sa sécrétion (castration).

Posologie. — Pendant les 20 jours qui suivent les règles ou leur époque présumée, ou pendant les 10 jours qui les précèdent (dans certaines oligoménorrhées, dysménorrhées), prescrire :

Gouttes : dose moyenne optimum : 15 à 30 gouttes par jour, en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas, dans un demi-verre d'eau ou sur un morceau de sucre que la malade laissera fondre lentement dans la bouche (absorption *per linguam*).

Suivant le résultat :

Maintenir la dose initiale,

L'augmenter progressivement, jusqu'à 45, 50 ou 70 gouttes,

Ou, au contraire, la ramener à 5 ou 10 gouttes.

Croquer soigneusement les dragées.

Ampoules injectables : Tous les jours, ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter 1 ampoule seule ou associée à l'autohémothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 185-1.

Prix :

Le flacon (12 à 25 jours).....	21 fr. 20
Le double flacon.....	38 fr. 25
40 dragées.....	10 fr. 80
80 dragées.....	21 fr. 20
La boîte de 6 ampoules.....	23 fr. 35

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).
(Tél. Alésia 28-51.)

CRINEX-OREX

Étui ambohormonal

Médication basée sur l'ambocrinie physiologique des gonades.

Composition. — *Crinex*, biosymplexe ovarien total standardisé, et *Orex*, biosymplexe orchitique total standardisé : deux flacons distincts dans un seul étui.

Mode d'action. — L'ambocrinie des gonades (sécrétion physiologique mâle et femelle des glandes génitales) explique pourquoi nombre de dysfonctionnements ovariens relèvent d'une insuffisance double. Ces dysovaries qui sont peu influencées ou parfois même aggravées par une opothérapie sexuelle monohormonale (ovarienne ou orchitique) cèdent, au contraire, rapidement au traitement ambohormonal.

Indications :

- 1° *Insuffisance totale de l'ovaire* (ménopause, castration).
- 2° *Retards de puberté* : Aménorrhées primitives et les troubles concomitants.
- 3° *Troubles génitaux, psychiques ou généraux, d'origine ovarienne*, rebelles à l'opothérapie monoglandulaire (ovarienne ou orchitique).
- 4° Tous les cas où l'origine homologue ou hétérologue de l'insuffisance ovarienne n'est pas déterminée et qui exigent un *traitement rapidement actif*.

Posologie. — *Orex* { 10 à 20 gouttes de chaque
 Crinex { produit 1/2 heure avant les
 repas, dans 1/2 verre d'eau.

Le traitement ambohormonal peut aussi être prescrit *en alternant, par périodes*, un produit après l'autre.

Traitement de 20 jours par mois, dans l'intervalle des règles ou de leur époque présumée. Suivant les résultats, augmenter ou diminuer simultanément ou séparément les doses des deux produits.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N°s 185-1 et 185-4.

Prix. — L'étui *Crinex-Orex* (13 à 20 jours) : 21 fr. 20.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV^e).
 (Tél. Alésia 28-51.)

CRINHÉMOL

Composition. — Association endocrino-médicamenteuse. Extraits hépatique, orchitique, splénique. Fer. Arsenic. Acide phosphorique. Manganèse. Magnésium.

Indications. — Tonique général et nerveux. Hématopoiétique. Anémies de toute nature (médication pathogénique n'excluant pas les indications étiologiques). Asthénies. Convalescences. Anorexies. Déficiences fonctionnelles. Etats alcalésiques.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Deux ampoules par jour. Doses spéciales pour enfants et adultes. Préparation spéciale pour les tuberculeux (*Crinhémol T* sans fer ni arsenic). Prise quotidienne pendant 8 à 10 jours. Intervalles de même durée entre chaque cure.

Prix : 19 fr. 60 et 32 fr. 70 pour adultes (10 à 15 jours de traitement) ; 15 fr. 25 et 28 fr. 30 pour enfants (10 à 15 jours de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

CRINOCALCINE

Simple et irradiée.

Forme. — Granulé vermicelle.

Composition. — Crinocalcine simple : Chaux, phosphore, silice fluor, magnésie, fer, *en combinaison de proportions définies*, Extrait de capsules surrénales, extrait total d'hypophyse, vitamines d'orge germé, embryon de blé, *qui favorisent le métabolisme des calcaires et assurent une assimilation en plus de l'action opothérapique.*

Composition. — Crinocalcine irradiée : Aux principes précédents, adjonction d'ergostérine suractivée par les rayons ultra-violets.

Indications. — Rachitisme, lymphatisme, chloro-anémie, neurasthénie, grossesse, allaitement, troubles de croissance, convalescences et *toutes tuberculoses* toujours améliorées par la Crinocalcine irradiée.

Posologie. — 3 cuillerées à café par jour aux repas.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix. — Crinocalcine simple : 16 fr. 65.
Crinocalcine irradiée : 28 fr. 15.

Établissements André HATIER

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

CRINOCARDINE LALEUF

Composition. — Crinocardine simple

Extraits concentrés spéciaux de :

Myocarde, Pancréas, Foie, Rein, Muscle strié.

Associations diverses :

Crinocardine Digitalique.

— Strophantique.

— Digitalo-Strophantique.

— Scillitique.

— Apocynique.

— Spartéinée.

Propriétés et Indications.

Troubles cardio-vasculaires de toute origine, Insuffisances cardiaques, Oppressions, Œdèmes, Spasmes, Angines de poitrine, etc.

Tous états de déficience organique complexe : Anémies, Surmenage, Convalescences, Dépressions physiques et nerveuses, etc. Insuffisances hépatiques.

Formes.

Ampoules buvables et comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi.

1 ampoule (ou 5 comprimés) le matin, à jeun, dans un peu d'eau, pendant 10 jours consécutifs. Si nécessaire une seconde ampoule (ou 5 comprimés) au cours de la journée.

Durée moyenne des unités de vente.

10 jours.

Prix de vente au public :

Boîte de 10 ampoules de 12 cc. (simple ou composée):
34 francs.

Étui de 50 comprimés (simple ou composée) :
22 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI°).

(Trocadéro : 62-24.)

CRINOFLUX

Complexe **Ovaro-végétal** stabilisé renfermant :
 Suc total d'ovaires frais **Byla** { —
 Intrait de marrons d'Inde **Dausse** { aa 20 p. 100.

Alcoolatures d'Anémone, Arnica et Noix vomique.
 Extraits américains de Cyprès, Viburnum et Hamamelis virginica.

Forme. — Gouttes (le flacon renferme un compte-gouttes).

Indications. — Tous les troubles de la circulation du sang et leurs multiples conséquences ; puissant antihémorroïdal, Varices, Phlébites, Puberté. Ménopause. Maladies de l'utérus et de ses annexes

Doses. — *Moyennes* : XX goutt 2 fois par jour avant les repas.

Cas aigus : XXX gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 19 fr. 50 (pour 20 jours de traitement).

L. N. C. 1364-6.

Laboratoires à LYON (Rhône)

41, rue Germain.

Tél. : Lal. 23-63.

CRINO-MENSTRYL

Régulateur des fonctions ovariennes.

Forme. — *Comprimés* (Ovaire, Folliculine, Lobe antérieur d'hypophyse).

Prix : Étui de 40 comprimés : 23 fr. 35.

(2 à 6 comprimés par jour pendant 15 jours de la période intermenstruelle.)

Ampoules injectables : 2 ampoules de lobe antérieur d'hypophyse, 0 gr. 25.
 2 ampoules de benzoate de dihydro-folliculine à 5 000 U. I. : la boîte, 29 fr. 70.

Ampoules injectables « S. » : 3 ampoules d'Hormone Gonadotrope d'origine sérique à 30 U. R. et 3 ampoules de solvant ; 2 ampoules de Folliculine à 5 000 U. I. : la boîte 76 fr. 50.

Le lobe antérieur d'hypophyse ou l'Hormone Gonadotrope s'injecte généralement du 3^e au 8^e jour après la fin des règles.

La Folliculine, du 10^e au 18^e jour après la fin des règles.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes, Aménorrhées Oligoménorrhées, Dysménorrhées, Puberté, Ménopause, Obésité, Stérilité, Leucorrhée.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

CRINOPANCROME

Synergie endocrino-végétale, hypotensive et antispasmodique.

Forme. — Dragées.

Action. — Traitement de l'hypertension artérielle et de ses conséquences. Médication d'action constante et sûre favorisant l'équilibre du système vago-sympathique.

Composant. — Extrait de Pancréas désinsuliné (correspondant à 125 de son poids de substance fraîche), Chlorophylle, Nitrite de Sodium, Extrait sec de Scille (abaissement progressif du taux de l'Urée), Extrait sec d'Aubépine, Extrait mou de Belladone (0 gr. 0013 par dragée) (aucune adjonction de barbiturique).

Indications. — Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Spasmes vasculaires, Troubles visuels, Vertiges, Excitabilité, Angoisse, Emotivité, Insomnie nerveuse.

Posologie. — 3 à 6 dragées par jour avant les repas. — Traitement d'attaque : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des hypertensions : 6 dragées par jour. — Traitement d'entretien des hypertensions moyennes : 3 dragées par jour. Troubles névro-pathiques : 3 à 6 dragées par jour. — D'une innocuité absolue, les cures de CRINOPANCROME peuvent être prolongées sans inconvénient.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 586-16.

Prix : 21 fr. 35 (tube de 60 dragées).

(Littérature et échantillons.)

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). — (Tél. : Roquette 14-12.)

CRINO-SÉRUM

dénommé { **CRINO-ENFANT** (de 0 à 10 ans)
CRINO-ADULTE (à partir de 10 ans.)

Le **CRINO-ENFANT** réalise l'opothérapie infantile pluri-glandulaire de la première enfance. Il est le régulateur par excellence du développement physique et mental des nouveau-nés et des enfants.

Les principaux éléments actifs qui le composent sont des extraits de thyroïde, parathyroïde, thymus, hypophyse, surrénale, médullaire, hépatique, auxquels est adjoint du glycéro-phosphate de magnésie.

Mode d'emploi :

De 0 à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 3 à 6 ans : 3 cuillerées à café par jour.

De 6 à 10 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 17 fr. 50.

Le **CRINO-ADULTE** s'emploie à partir de 10 ans. C'est un régulateur nerveux et circulatoire de l'adolescence et de l'âge critique des deux sexes. Sa composition très complète avec extraits cérébraux et médullaires permet de l'utiliser avec succès dans la déficience cérébrale et dans le surmenage intellectuel.

Doses. — 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 22 fr. 50.

L. N. C. M. : Crino-Enfant, n° 1606-4. Crino-Adulte, n° 1606-5.

Laboratoire MOURÉ (P. COTARD, Pharmacien).

5 bis, bd des Italiens, passage des Princes — PARIS (II^e).

CRINO-STHÉNYL

Complexe endocrinien des « glandes de l'énergie ».

Surrénale, Hypophyse, Glandes génitales, Foie, Parathyroïde, Thyroïde.

Formes :

Étui : 40 comprimés : 21 fr. 20.

(3 à 6 comp. par jour au milieu des repas.)

Sirop : flacon de 180 grammes : 21 fr. 20.

(1 cuillerée à dessert = 2 comprimés.)

Ampoules inj. 6 ampoules de 2 cc. : 21 fr. 20.

(1 ampoule par jour.)

Indications. — Asthénies, Surmenage physique et intellectuel, Convalescences, Enfants instables, Inattention scolaire.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

CRINO-TENSYL

*Régulateur de la tension artérielle,
de la circulation et de la nutrition générale.*

Parenchyme rénal ..	0,15	Phényléthylmalony-	
Pancréas désinsuliné.	0,10	lurée	0,005
Glandes génitales	0,30	Papavérine	0,003
Iode organique.....	0,01	Aminophylline	0,02

Prix. — Le tube de 45 comprimés : 20 fr. 40.

Posologie. — *Cure normale* : 2 comprimés au début de chacun des 3 repas, pendant 3 semaines.

Cure d'entretien : 1 comprimé au début de chacun des 3 repas, 15 jours par mois.

Indications. — Hypertension artérielle. Artério-sclérose et Pré-sclérose. Troubles circulatoires et Spasmes vasculaires. Pléthorisme et Obésité. Troubles de la Ménopause et de la cinquantaine.

Laboratoires FOURNIER Frères,

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

CRISALBINE

(Thiosulfate double d'or et de sodium.)

Teneur en or : 37 p. 100.

Indications :

Tuberculose pulmonaire.

Adénopathies tuberculeuses, Lupus, Arthrites infectieuses, Asthme.

Présentations. — Ampoules contenant 0 g. 02, 0 g. 05, 0 g. 10, 0 g. 15, 0 g. 20, 0 g. 25, 0 g. 35, 0 g. 50 de poudre cristalline ; une ampoule d'eau bidistillée est jointe à chaque dose.

Posologie et mode d'emploi. — Injections intraveineuses d'une solution à 5 p. 100 préparée extemporanément, en débutant par 0 g. 05 ou 0 g. 10. Augmenter progressivement, selon la tolérance du malade. Asthme et arthrites 0 g. 02 à 0 g. 05. Prix de vente (suivant dosage et conditionnement).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

CRUXOL

**Adjuvant complet de croissance des Enfants
Médication polyglandulaire et polyvitaminique
des Adultes et Personnes âgées.**

Composition. — Hormone du lobe antérieur de l'Hypophyse agissant en corrélation avec les extraits endocriniens : Thymus, Thyroïde, Orchytique, Surrénal, agissant à doses conjuguées.
Les 4 vitamines (unités actives).
Les sels minéraux de croissance.
L'extrait de Boldo (insuffisance hépatique).

Présentation :

Trois préparations suivant l'âge.

1° Cruxol Bébé :

En neige fondante pour les nourrissons, agissant en milieu neutre.

Préparation vitaminée avec sels minéraux lab ferment et papaine destinée aux nourrissons et jusqu'à 2 ans.

Prescrire. — Ne pas donner de jus de fruits acides. Mettre dans la bouche du bébé ou faire dissoudre dans quelques gouttes d'eau et donner au bébé avant chaque tété ou biberon une dizaine de petits granulés neige fondante. Augmenter suivant le nombre de mois, la dose à utiliser dans les 24 heures allant de $\frac{1}{2}$ à 2 cuillerées à café.

La boîte : 22 fr. 95.

2° Cruxol granulé :

Pour les enfants de 2 ans à 7 ans, en tube métallique.

Prescrire. — Une cuillère à café de granulé à croquer avant chacun des 2 principaux repas.

Traitement à suivre pendant 20 jours de suite par mois, puis repos de 10 jours et reprendre le traitement (quelques mois).

La boîte : 25 francs.

3° Cruxol (ampoules buvables), en boîte de 2 séries de 6 ampoules, à partir de 7 ans.

Prendre dans $\frac{1}{4}$ de verre d'eau sucrée le contenu d'une petite ampoule avant le repas de midi, et le contenu d'une grande ampoule avant le repas du soir.

Traitement à suivre pendant quelques mois : au début, trois semaines de suite sans interruption ; puis une semaine sur deux, sauf autres indications médicales.

La boîte : 28 fr. 05.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle, n° 696.

Laboratoire MONIN

Bureaux et Correspondance.

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e). (Tél. : Trudaine 37-45.)

CRYOGÉNINE LUMIÈRE

Antipyrétique, Analgésique.

Adoptée par les Ministères de la Guerre, de la Marine et par l'Assistance publique.

La **Cryogénine Lumière** représente le médicament antipyrétique-analgésique type. Elle agit avec une égale sûreté contre les températures fébriles et contre les phénomènes douloureux de toute origine.

La **Grippe** ne résiste pas à l'administration, à doses suffisantes, de **Cryogénine Lumière**.

Elle permet d'éviter les bains froids dans la **Fièvre typhoïde**.

Contre le symptôme douleur, la **Cryogénine Lumière** exerce une action nette, rapide, durable.

Aucune accoutumance ni accumulation.

Produit toujours les mêmes effets aux mêmes doses.

Aucune action nocive, son usage peut être prolongé sans danger.

Il n'existe aucune contre-indication.

Son innocuité absolue en fait le médicament de choix chez les enfants.

Indications :

Fièvre, Grippe, Douleurs, Névralgies, Dysménorrhée.

Formuler :

Un tube de comprimés à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Une boîte de cachets à 0 gr. 50 ou à 0 gr. 25 de **Cryogénine Lumière**.

Doses :

Adultes : 1 à 6 comprimés ou cachets à 0 gr. 50 par jour et davantage en cas de besoin.

Enfants (doses moyennes) :

De la naissance à 15 mois, 0 gr. 10.

De 15 mois à 3 ans, 0 gr. 15 à 0 gr. 25.

De 3 ans à 5 ans, 0 gr. 25 à 0 gr. 40.

De 5 ans à 15 ans, 0 gr. 40 à 0 gr. 75.

A partir de 15 ans, 0 gr. 75 à 2 gr.

Ces doses peuvent être dépassées.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

CRYOSAN

Composition. — Soufre combiné et dissimulé, térébenthine du pin purifiée, huile pyrogénée du *Juniperus oxycedrus*.

Propriétés. — Antiseptique, cytophylactique, antiprurigineux désodorisant, cicatrisant.

Indications. — Eczéma sous toutes ses formes, psoriasis, lichens, mycoses diverses, herpès, urticaire et toutes dermatoses prurigineuses.

Présentation et prix. — 16 francs le flacon de 15 grammes.

Mode d'emploi. — Faire trois applications par jour à l'aide du pinceau joint au flacon.

**Les Laboratoires Lorrains
de Produits purs.**

ÉTAIN (Meuse). — (Tél. : 74.)

CRYPTARGOL LUMIÈRE

Antiseptique argentique, stable, atoxique.

Constitution. — (Argentothio-glycérine, sulfonate de sodium) 35 p. 100 d'argent métallique.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique égal à celui du nitrate d'argent, sans toxicité, ni causticité. Ne tache pas, ne précipite pas les albuminoïdes. Jamais d'argyrisme. Aucune réaction ni sensation douloureuse.

Indications. — Usage interne : embarras gastrique fébrile, états infectieux du tube digestif, diarrhées, typhoïde, para-typhoïde, diarrhées imputables aux bacilles de Shiga ou au colibacille, dysenterie amibienne, entérite, entéro-colite, dyspepsies gastro-intestinales avec coprostase, fermentations intestinales, etc.

Chez l'adulte, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré par la bouche, en pilules dosées à 10 centigr. (4 à 6 pilules par jour au repas.)

Chez l'enfant, le CRYPTARGOL LUMIÈRE est administré sous forme de granulé à la dose d'une ou quatre cuillerées à café, selon l'âge de l'enfant sans aucun danger.

Usage externe — Antisepsie générale.

DERMATOLOGIE, UROLOGIE, GYNÉCOLOGIE, OPHTALMOLOGIE

Formuler : Usage interne : Etois de pilules de CRYPTARGOL LUMIÈRE. — Flacon granulé de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Usage externe : Flacon de solution-mère de CRYPTARGOL LUMIÈRE, titré à 1 gr. pour 10 cc. en flacon de 30 cc. et de 120 cc.

Gynécologie : Boîte d'ovules de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

Ophtalmologie : Ampoules collyre dosées à 1 p. 100 ou à 5 p. 100 de CRYPTARGOL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE : 45, rue Villon — LYON.

CRYPTHERMOL DEHAUSSY

Médication antisypilitique dissimulée.

Préparation à base de bi-iodure de mercure et d'iodure de potassium permettant le traitement masqué ou ambulatoire de la syphilis et de l'hérédo-syphilis sans troubles gastro-intestinaux, même en cas d'intolérance hydrargyrique (Sirop et granulés de goût agréable, pilules glutinisées).

Dosage

<i>Sirop</i> : par cuillerée à soupe.	
Iodure de potassium.....	1 gr.
Bi-iodure de mercure.....	0 gr. 01
<i>Pilules glutinisées</i> : par pilule.	
Iodure de potassium.....	0 gr. 20
Bi-iodure de mercure.....	0 gr. 002
<i>Granulé fondant</i> : par cuillerée à café.	
Iodure de potassium.....	0 gr. 005
Bi-iodure de mercure.....	0 gr. 0005

Posologie :

Adultes : *Sirop* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour. — *Pilules* : 5 à 10 par jour.

Enfants : *Granulé* : 1 an : 1 ou 2 cuillerés à café par jour.

5 ans : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

10 ans : 5 à 10 cuillerées à café par jour.

Sirop. Prix : 19 fr. 15

Pilules. Prix : 16 fr. 05

Granulés. Prix : 16 fr. 05

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale. — LILLE

CRYPTHIOL

Composition. — Nouveau composé organique soufré, dérivé de la série aromatique, ni toxique, ni irritant.

Forme. — Capsulines glutinisées.

Action. — *a.* Par le pouvoir catalytique du soufre non oxydé, le CRYPTHIOL active la désintégration des albuminoïdes jusqu'à leur terme final : l'urée, et accélère l'oxydation des déchets nuisibles de l'organisme.

b. Par son action élective sur la cellule hépatique, le CRYPTHIOL constitue un puissant cholagogue et stimule les fonctions uropoïétique et glycémique du foie.

Indications. — Insuffisance hépatique, États congestifs du foie, Lithiases biliaire et rénale, Goutte, Obésité, Rhumatisme chronique, et en général toutes les affections provenant d'une carence soufrée de l'organisme ou d'un métabolisme défectueux.

Posologie. — 2 à 4 capsulines par jour, un peu avant les repas.

Prix : l'étui de 30 capsulines, 15 fr. 60.

Durée moyenne de l'étui : 10 jours.

Autorisation au L. N. C. : N° 994-5.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY (Seine).

(Tél. : Pereire 14-08.)

CRYPTOSOTE NEDA

Composition :

Antiseptique pulmonaire.	{	Créosote	0,05
Sédatif de la toux.			
Modificateur des sécrétions bronchiques.	{	Eucalyptol	0,01
Hémostatique, cicatrisant..		Tannin	0,05
Balsamique.....		Benjoin	0,05
Enrobage. {	Par dragée.		
Insoluble dans l'estomac.			
Soluble dans l'intestin.			

Propriétés. — Antiseptique et tonique des voies respiratoires.

Par son enrobage, la créosote n'irrite pas l'estomac.

Indications. — Bronchites, bronchites aiguës et chroniques, trachéites, congestions pulmonaires, asthme, catarrhes.

Présentation. — Boîte normale 60 dragées : 15 francs pour un traitement de 15 jours.

Boîte triple : 180 dragées : 30 francs.

Posologie. — 2 dragées au milieu de chacun des 2 repas.

Laboratoires DANEY, 134, cours de Verdun
BORDEAUX (Gironde). (Tél. : 27-10.)

CRYPTOTOXYL

du Docteur Louis Bignon, de Vichy.

Composition : Oléate, palmitate, ricinoléate de soude, bile.

Indications : Neutralisation des toxines microbiennes et de la morphine.

Mode d'emploi : Dose utile 4 pilules par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

CRYSIODAL

Complexe organo-métallique à base d'or et d'iode, associé au cadmium.

Indications. — Pré-tuberculose et tuberculose

Présentation. — Deux sortes de solutions réparties en ampoules de 5 cc. :

- 1° Pour injections intraveineuses (7 gr. d'iode et 0 gr. 0545 d'or pour 100 cc.) ;
- 2° Pour injections intramusculaires (3 gr. 50 d'iode et 0 gr. 027 d'or pour 100 cc.).

Doses et mode d'emploi. — Deux séries au moins de 25 ou 30 injections, à raison de deux injections par semaine, avec repos de 1 ou 2 mois entre les séries.

Prix { intraveineux, 31 fr. 80 la boîte de 6 amp.
 { intramusculaire, 26 fr. 50 la boîte de 6 amp.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens.
 5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
 (Tél. : Vaugirard 11-23.)

CUPRASE

du Docteur GAUBE du GERS contre le cancer.

Cuivre colloïdal albumonique. Guérit souvent, arrête toujours l'évolution du cancer. Une forme : Boîte de 8 ampoules de 5 cc. pour injections sous-cutanées.

Action thérapeutique et Usages. — Préconisée pour la décancérisation dans toutes les formes. La *Cuprase* possède de remarquables propriétés contre les néoplasies anciennes ou récentes, ulcérées, quel qu'en soit le siège.

Elle arrête le développement des tumeurs malignes ; elle est capable de supprimer avec le temps les tumeurs et les ulcères malins.

Posologie et Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, une ampoule de 5 cc. tous les 4 jours d'abord, puis, après la 4^e injection, une ampoule tous les 5, 6 ou 7 jours suivant tolérance.

Le *Cuprase* n'est point toxique. Prix : 60 francs.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-2.

Laboratoires DUCATTE
 191, rue Saint-Honoré, Paris — (Tél. : Opéra 68-80.)

CUPRAZUROL

Composition. — Collyre à base de :

Bleu de méthylène spécial.....	0 gr. 002
Soluté de chlorhydrate d'adrénaline à 1/1 000.....	1 gr.
Stovaine	0 gr. 05
Chlorhydrate d'Ethylhydrocupréine (optochin)	0 gr. 10
Eau distillée.....	10 gr.

Indications. — Conjonctivites granuleuses, Trachomes, Kératites granuleuses, Catarrhe printanier, Larmoiement.

Instillations indolores.

Disparition rapide de la douleur due aux granulations.

Mode d'emploi. — II à III gouttes, trois à quatre fois par jour. Dans les milieux contaminés, continuer longtemps le traitement contre la conjonctivite ou la kératite granuleuses, si tenaces, et sujettes à rechutes.

Prix : 17 fr. 75, 1 flacon-ampoule compte-gouttes de 15 cc.

Laboratoires LAITER

P. TERRASSE, Docteur en Pharmacie
52, rue Heurtault — AUBERVILLIERS.
(Tél. : Flandre 00-55.)

CUPREMONE « F »

**Médication Hormonique (folliculine) associée
au complexe végétal CUPREMONE**

Composition. — Extraits Anémone, Cupressus, Cratœgeus, Condurango, Hamamélis, Marrons d'Inde, Noix vomique, Sèneçon, Viburnum.

Folliculine purifiée rigoureusement titrée : 2.500 unités physiologiques par 100 cc. de préparation.

Deux gouttes de *Cupremone F* correspondent à une unité physiologique de Folliculine.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de choix des désordres génitaux et des troubles de la circulation sanguine.

Activité par voie buccale.

Forme et mode d'emploi. — Prendre XL à LXXX gouttes par jour, au début des 2 repas, dans un peu d'eau sucrée, 20 jours par mois, en dehors des règles.
Durée de l'unité de vente : 1 semaine environ.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Écoles — PARIS (V°).
(Tél. : Danton 81-53.)

CUPRÉMONE MASCULIN

Composition. — Extraits végétaux régulateurs et toniques du système veineux et extraits orchitique, surrénalien, hypophysaire, thyroïdien.

Indications. — Déficiences endocriniennes, masculines et troubles circulatoires.

Posologie. — L à LXXX gouttes par jour, dix minutes avant les repas, et suivant avis du médecin.

Durée de l'unité de vente : 1 semaine environ.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Danton 81-53.)

CUPRESSIODE FAVROT

Gouttes.

Spécifique des maladies de la cinquantaine chez l'homme.

Formule :

Iode assimilable.....	1 gr. 50
Ext. fl. Cupressus stabilisé...	5 gr.
— Marron d'inde stabilisé.	5 gr.
— Gui stabilisé.....	10 gr.
— Aubépine stabilisé.....	2 gr. 50
— Genêt stabilisé.....	2 gr. 50
Alcoolature d'anémone.....	2 gr. 50

Excipient : Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Troubles fonctionnels cardio-vasculaires. — Hypertension. — Artério-sclérose. — Angine de poitrine. — Spasmes divers.

Posologie :

XX à XXX gouttes à la fin des 2 repas.

Littérature et échantillons :

Laboratoire D^r H. FERRÉ

L. MOREAU, Pharmacien.

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

CUPROBALT

Composition. — Association de Silicates de manganèse, fer, cuivre, nickel et cobalt.

Indications. — Diabète sous toutes ses formes. Toutes ses complications. Pas d'intolérance, ni d'incompatibilités.

Présentation. — Dragées.

Posologie. — Dose moyenne : 2 dragées avant chacun des 2 repas principaux. Dans les cas graves, cette dose peut être doublée.

Laboratoire GRYSA

C. LÉTANG, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

7, rue Saint-André — LE MANS.

CUPROFORMINE

Composition. — Sulfate de cuivre pur, Trioxyméthylène, Perborate de soude, Excipient effervescent.

Mode d'action. — Par sa haute teneur en cuivre associé au trioxyméthylène et au Perborate de soude, la *Cuproformine* est un antiseptique puissant dans toutes les affections à streptocoques, à staphylocoques et autres germes pathogènes.

Indications et Mode d'emploi.

- 1° En *Gynécologie*, hygiène intime, prophylaxie et traitement des affections septiques des organes génitaux : en injections, 1 comprimé pour 2 lit. d'eau.
- 2° *Antiseptique général et Dermatologie*, Plaies de toute nature, Ulcérations, Panaris, Pyodermites, Eczémas, Furoncles, etc., en lavages, applications, compresses : 1 comprimé pour 1 ou 2 litres d'eau.

Présentation. — Comprimés très effervescents, d'odeur agréable et ne tachant pas le linge.

Laboratoire YVRARD

17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

CUPRO NICKEL INTRAVEINEUX FRAISSE

Composition :

Lactate de cuivre.....	0 gr. 004
Citrate de Nickel	0 gr. 002
Sélénite de Soude	1/2 mill.
pour	4 cc.

Indications. — Méthode de défense contre le cancer.

Forme. — En ampoules de 4 cc. (boîte de 6 ampoules).

Posologie. — Injecter lentement, tous les 2 jours, dans la veine du pli du coude, le contenu d'une ampoule, en évitant la diffusion du liquide en dehors de la veine.

Prix : Boîte de 6 ampoules de 4 cc : 19 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-14.

Laboratoires FRAISSE, Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

CUPROSTÉNOL

« MÉTÈRE »

Indication :

Chimiothérapie active des néoplasies cellulaires. Tumeurs malignes de toute origine tissulaire. Leucémies myéloïdes ou lymphatiques. Maladie de Hodgkin. Septicémies à streptocoques.

Composition :

Cuivre et Magnésium en solution huileuse colloïdale contenant :

Cuivre.....	0,12 mgr.
Magnésium	0,03 mgr. par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intra-musculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. En même temps prendre 2 capsules par jour de Cuprosténol-capsules par la bouche.

Au bout de 5 semaines, arrêter le traitement quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire.

Autre forme : Cuprosténol-pommade pour les ulcérations cutanées.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

CUPROXIL

Désinfectant gynécologique et urinaire.

Composition. — 100 grammes contiennent :

Boro-Salicylate de soude.....	53,39
Sulfate de cuivre desséché	12,51
Chlorate de potassium.....	34,100

Propriétés. — Désinfectant gynécologique, Microbicide, Décongestionnant, Désodorisant.

Indications. — 1° Hygiène intime quotidienne.

2° Traitement des Leucorrhées en général, des Vaginites, Vulvites, Vulvo-Vaginites, Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, etc.

3° Blennorrhagie.

Avantages. — Antiseptique puissant, non caustique, ne tache pas le linge, d'odeur agréable (parfumé à l'eau de Cologne). Action décongestionnante et sédative, Sensation de bien-être.

Forme. — Poudre blanche, entièrement et rapidement soluble dans l'eau tiède, à laquelle elle communique une légère teinte vert clair.

Mode d'emploi. — Lavages, injections et irrigations tièdes (y compris la période des règles). Faire dissoudre le contenu d'une mesure dans 2 litres d'eau.

Emploi général. — Désinfectant général en lavages externes, notamment en gargarismes.

Flacon d'environ 50 doses

Produits POLYPHARMA

Concess^{re} L. BRUN, Ph^{en} — 92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

CURAMIDA CHAPELLIER

Composition. — Sirop de sucres frais de géraniums, Rudbeckias, Tropéolon M, fleurs de Marronniers d'Inde iodés, Phosphate monocalcique, Iodure de Calcium, Sirop Antiscorbutique et Chicorée Cposée.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour (3 ans, 5 ans, 10 ans).

Indications. — Puissant tonique déterminant la fonte des **grosses amygdales** et la disparition des **végétations adénoïdes** des enfants.

Cure complète : 2 flacons de 3 à 7 ans.

3 flacons au-dessus de 7 ans.

Prix du flacon 450 cc. : 30 francs.

Laboratoire A. CHAPELLIER

SAINT-AIGULIN (Charente-Inférieure).

CURATINE BRUNET

Analgésique.

Spécifique de l'élément douleur.

Composition. — Association rationnelle de :
Phénacétine, Théine, Analgésine bicarbonatée.

Indications. — Grippe, Migraines, Névralgies diverses, Rhumatismes, Règles douloureuses, Algies dentaires, etc.

Posologie. — 1 à 4 cachets par jour, de préférence loin des repas, pris à sec ou mieux dans un verre d'eau ou de tisane ; n'a pas de goût désagréable.

Se vend en boîtes de 1 cachet et boîtes de 6 cachets.

Prix réglementé de la boîte :

1 cachet : 1 fr. 20. — 6 cachets : 6 fr. 60

Enregistrée au L. N. C. M. sous le N° 32-1.

Laboratoire

de la CURATINE BRUNET

23, rue des Ecouffles — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 35-17.)

CURIOSAN

Mercurérythrosine.

Sel nouveau ayant fait l'objet d'une thèse soutenue à la Faculté de médecine de Paris (6 juillet 1926) et d'une communication à l'Académie de médecine (27 nov. 1928).

Présentation. — Solution à 2 p. 100.

Indications. — Affections des voies génito-urinaires, Prurits, Métrites. Affections des yeux et des oreilles, Affections buccales, Plaies infectées, Dermatoses.

Mode d'emploi. — En attouchements, en instillations intracervicales, en applications sur la peau, lavage en solution à 1 p. 1 000.

Prix : 32 francs le flacon de 180 grammes.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine)

CUROGÈNE

Élixir antidouleur (forme liquide, seule rationnelle), à base de camphorate de pyramidon et de pyramidon.

Indications. — Sédation de la douleur : Migraines, Névralgies, Rages de dents, Rhumatismes, Sciatiques, Dysménorrhée, Douleurs post-partum, Grippe, etc.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café ; par jour : 2 à 8 cuillerées à café.

Enfants au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café.

Prix au public : 17 fr. 20.

Le flacon de poche : 6 francs.

L. N. C. M. n° 515-1.

Laboratoire du Curogène

Docteur J. GALIMARD, O. * * *

145, rue Yves-le-Coz — VERSAILLES.

CUROZEMA

Médication opo-sérothérapique rationnelle des dermatoses chroniques et récidivantes et des états arthritiques.

Composition. — Sérums activés et organes frais de jeunes animaux.

Indications. — Eczéma et eczématides, Prurits localisés ou généralisés, Prurigo, Urticaires, Maladie de Quinck, Psoriasis, Impetigo, Acné, Certaines formes de Névrodermites et de Sclérodermites, Lichen.

Présentation. — Dragées en flacon de 90 (le grand flacon), de 40 (le flacon).

Mode d'emploi et doses :

Traitement d'attaque. — 9 dragées par jour prises par 3, à jeun, une heure avant les repas, pendant 10 jours.

Traitement d'entretien. — 4 dragées par jour, pendant 10 jours.

Prix : Le grand flacon : 30 fr. — le flacon : 18 fr.

Laboratoires VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS (Tél. : Élysées 28-12.)

CUSCUTINE FOULON

Indications. — Laxatif doux, sans accoutumance. Stimule les sécrétions intestinales et décongestionne le foie.

La Cuscutine ne détermine jamais de coliques et peut être prise pendant la grossesse, l'allaitement, les périodes menstruelles, etc...

Composition. — La CUSCUTINE est composée d'extraits végétaux : Cuscute, Séné, Aloïne, etc.

Posologie. — Une à 2 pilules au repas du soir.

L'étui de 40 pilules : 7 fr. 15.

Laboratoires FOULON

12, boulevard Saint-Martin — Paris (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

CUTIGÉNOL

Pommade cicatrisante.

Composition. — Huile de foie de Flétan, hormones, insuline.

Indications. — Traitement des plaies atones ou torpides, escarres, ulcères variqueux, retards de cicatrisation.

Mode d'emploi. — Appliquer à l'aide d'un pansement qui restera en place au moins 24 heures. Le premier sera même laissé 48 ou 72 heures, selon la gravité du cas, ou le degré d'infection.

Présentation. — Le tube de 35 gr. : 19 fr. 10.

Échantillons.

Laboratoires du D^r F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

CUTISANINE

Pour toutes irritations de la peau, crevasses, fissures, coups de soleil, plaies atones, eczémas, intertrigos, transpirations abondantes ou fétides, etc...

En poudre *la boîte.* 15 fr. 30.

En pâte *le tube.* 9 fr. 70.

Laboratoire R. B. D.

Dr J. WILLOT, Pharmacien.

35, rue Christophe Colomb — LILLE
(Nord.)

CUTOBRONCHYL

Forme. — Pommade exempte de matières grasses en tube.

Mode d'action. — Absorption intégrale des substances médicamenteuses par la peau grâce à son Excipient à base d'Extraits opothérapiques de peau animale, renfermant :

- a. Du Cholestérol, favorisant l'absorption des médicaments à travers les couches grasses de la peau.
- b. Des Diastases et des Hormones actives de la peau.
- c. Un composé de Magnésie, catalyseur animal.

Substances médicamenteuses actives. — Camphre, Galacol, Acide Cinnamique et Salicylique, Essences stabilisées.

Indications. — Traitement des maladies des voies respiratoires et circulatoires, par médication cutanée au moyen d'extraits opothérapiques et catalysants de la peau.

Mode d'emploi. — Enduire deux à trois fois par jour, alternativement, la poitrine, le dos ou une autre partie du corps. Effectuer une bonne friction, afin d'obtenir une absorption complète et rapide.

Prix : 10 francs. **Durée moyenne de traitement d'un tube :** 8 jours.

Laboratoires G.-R. STROHL

G. HORNUS, Pharmacien

2 rue Sédillot — STRASBOURG (Bas-Rhin).

(Tél. : 243-64.)

CUZINARGOL

Seule solution stable d'argent, de cuivre et de zinc permettant une destruction spécifique complète de toute la flore microbienne urinaire. Gonocoques (argent). Staphylocoques et Streptocoques (cuivre et zinc).

Traitement des blennorragies aiguës et surtout chroniques et des métrites.

Trois formes :

- 1° *Ampoules* de 10 cc. pour injections uréthrales. Blennorragies récentes.
- 2° *Solution*, 1 cuillerée à soupe pour 2 litres d'eau. Blennorragies après 48 heures. Métrites.
- 4° *Ovules*. Métrites.

La boîte de 6 ampoules	25 fr. 50
Le tube de pommade.....	15 fr. 30
La boîte de 6 ovules.....	18 fr. 35

Laboratoire COUSSINET

122, Champs-Élysées. — PARIS (VIII°).

CYANHERMINE

pour traitements antisyphilitiques
à base de Cyanure de mercure.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Composition :

Cyanure de mercure (chimiquement pur)	0 gr. 01 cgr.
Sérum isotonique	2 cc.

Propriétés :

La Cyanhermine, étant une solution à 1/200 en sérum isotonique, réalise le maximum de tolérance.

Mode d'emploi :

Voie intraveineuse et posologie habituelle du Cyanure de mercure.

La boîte de 12 ampoules : 12 francs.

Laboratoire National de Contrôle n° 339-5.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV°).
(Tél. : Suffren 12-63.)

CYANURE ISOTONIQUE FRAISSE

Formule :

Cyanure d'Hydrargyre 0 gr. 01
Soluté calcique isotonique 2 cc.

Indications. — Ces ampoules étant indolores peuvent s'injecter indifféremment par voie intramusculaire ou intraveineuse. Elles ne sont pas sclérosantes, ce qui a une grande importance. On les emploie comme cure d'entretien dans la syphilis.

Forme. — En boîte de 12 ampoules.

Posologie. — Une injection tous les deux jours.

Prix : 20 fr. 40 la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils.

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

CYCLITON « ROCHE »

Analeptique central et stimulant de la circulation sanguine.

Composition. — Diéthyl-amide de l'acide 3,5 diméthylisoxazol-4-carbonique.

Propriétés. — Action analogue à celle du camphre, bien qu'étant d'une constitution tout à fait différente.

Indications. — Insuffisances circulatoires, Affections aiguës de l'appareil respiratoire, Intoxications par les narcotiques, Collapsus, etc.

Posologie et modes d'emploi. — 1 à 2 ampoules de 2 cm³. et plus toutes les 2 heures par voie sous-cutanée, intramusculaire ou endoveineuse, XX à XL gouttes (1 à 2 cm³.) par voie buccale ou 2 à 5 comprimés.

Présentation. — Le Cycliton « Roche » est présenté sous trois formes : Ampoules de 2 cm³. dosées à 25 p. 100. — Solution dosée à 25 p. 100. — Comprimés dosés à 0 g. 10.

Ampoules (boîte de 6) ; comprimés (flacon de 20) ; solution (flacon 15 cm³.).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-86 (ampoules), 504-87 (solution), 504-88 (comprimés).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Arch. 91-10.)

CYNABILINE

Médication végétale et opothérapique associées destinée au traitement des déficiences entéro-hépatiques.

Composition. — Principes actifs de l'artichaut frais (plante fraîche stabilisée), du Kinkéliba, du Romarin et du Boldo. — Extrait désalbuminé et délipoidé de foie frais. — Extrait de bile. — Citrate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule la cellule hépatique, la sécrétion et l'excrétion biliaire, supplée par ses extraits d'organe aux déficiences momentanées. — Régularise la fonction hépatique par l'artichaut. — Analgésique et tonique par le Kinkéliba et le Romarin. — Décongestif vésiculaire par le citrate de soude.

Indications. — Insuffisance hépatique et biliaire. — Ictères. — Lithiases. — Hépatisme tropical. — Constipation. — Intoxications. — Hépatites. — Hépatomégalie. — Cirrhoses diverses. — Hypotonies entériques. — Prurits. — Asthénies.

Présentation. — Liquide sirupeux aromatique de saveur agréable.
Le flacon ; 20 fr. 30.

Posologie. — Une à cinq cuillerées à café par 24 heures dans un peu d'eau ou de vin avant les repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1337-1.

Laboratoire de PHARMACOLOGIE APPLIQUÉE
rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-Rh.). (Tél. 29.)

CYNARACHOLINE

Médication citratée concentrée combinée
avec extraits de Romarin, Boldo,
Ficaire, Artichaut.

Forme. — Granulé fondant agréable au goût.

Indications. — Dyspepsies, Gastralgies, Vomissements, Viscosité sanguine, Insuffisance biliaire.

Mode d'emploi :

Enfants : 1 cuillère à café avant chaque repas.

Adultes : 2 cuillères à café avant chaque repas.

DUCAS, Pharmacien

112, Grande-Rue, NOGENT-SUR-MARNE

CYNÉFLUINE

du Docteur Moity.

Granulé soluble à base d'extrait d'artichaut.
 Drainage biliaire idéal, Cholagogue, Cholérétique, Spécifique hépato-biliaire rationnel, Tonique du foie.
 Anti-anaphylactique.

Formule :

Peptone de viande 2 ; Peptone d'œuf 2 ; Peptone de poisson 2 ; Peptone de fibrine 2 ; Hyposulfite de soude 2,50 ; Extrait total d'artichauts 5 ; Sulfate de magnésie 25 ; Sucre glace Q. S. p. 100.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café de granulé le matin à jeun dans un demi-verre d'eau tiède ; se coucher ensuite dix minutes sur le côté droit.

Dans les eczémas, migraines, névralgies, urticaires, prendre en plus une cuillerée à café vingt minutes avant les repas.

Prix : 16 fr. 50. Boîtes de 125 grammes.

Laboratoire du D^r J.-O. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,
 ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE

CYNUROL-ROSA (DRAGÉES)

Antiurique, antiseptique et diurétique.

Spécifique des diathèses précipitantes et des infections des appareils hépato-biliaire et urinaire et des troubles humoraux complémentaires.

Forme. — Dragées inaltérables et très assimilables.

Composition. — *Extrait de feuilles fraîches d'artichaut* (Cynara), Uva-Ursi, Urotropine et Salicylate double de Phényle-Pipérazine,

Indications. — a. *Maladies diathésiques* : Rhumatisme, Arthritisme. Urémie, Uricémie et Goutte, Polysclérose, Lithiase biliaire et urinaire, etc.

b. *Affections vésico-rénales* : Cystite, Urétrite, Pyurie, Colibacillurie, Oxalurie, Prostatite, Oligurie, etc.

c. *Maladies infectieuses* (parallèlement au traitement spécifique) : Grippe, Fièvres diverses, etc.

d. Et toutes les fois où il faut réaliser une action antiuricémique, antiseptique ou diurétique (complément de la cure hydrominérale).

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, aux repas. Cure de 10 à 20 jours par mois. Chez les enfants (1/4 ou 1/2 dose). Etui de 60 dragées.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA,

« La Feuille fraîche d'Artichaut en thérapeutique »

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

CYPROVEINOL

**Millefeuille-Ficaire-Cupressus
sans Hamamélis ni Marrons d'Inde.**

Indications. — Congestions prostatiques, Congestions veineuses ; Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Ulcères variqueux, Troubles de la Puberté et de la Ménopause.

Deux formes :

Gouttes : 30 gouttes 2 fois par jour dans un quart de verre d'eau bien sucrée.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

La boîte de 12 suppo : 16 fr. 50.

Le flacon (traitement 25 jours) : 16 fr. 50.

Laboratoire DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07.)

CYSTOCONE

Suppositoire.

Composition. — Association de l'Acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine et la Belladone totale.

Action. — Antalgique, Antispasmodique, Décongestionnant des organes du petit bassin.

Indications. — Traitement des algies et des spasmes douloureux de l'appareil génito-urinaire. Médication idéale du prostatique et du vésical : calme, décongestionne et assure le repos nocturne.

Chez l'homme : Cystites, Prostatites, Urétrites aiguës et chroniques. — Chez la femme : organes génito-urinaires, Angoisse et douleurs pré et post-opératoires de l'appareil urogénital

Posologie :

Adultes : 1 à 2 suppositoires CYSTOCONE par 24 heures, de préférence le matin au réveil et le soir au coucher, autant que possible après l'évacuation de l'intestin.

Adolescents : au-dessus de 15 ans : 1 suppositoire CYSTOCONE le soir au coucher.

Prix { La boîte de 6 CYSTOCONE : 17 fr.
 La boîte de 18 CYSTOCONE : 38 fr. 20.

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée
Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

CYSTOCURE

(Dragées glutinisées.)

Indications. — Néphrites, Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Urétrites, Prostatisme, Incontinence d'origine vésicale, etc.

Formule. — Salol, Bétol aa 0 gr. 02, Urotropine, Benzoate de soude aa 0 gr. 05, Bromure de camphre 0 gr. 03, Rénine, Bleu de méthylène aa 0 gr. 01 pour 1 dragée.

Dose et emploi. — Dose moyenne, 6 dragées par jour, 2 à 2. Au début du traitement, cette dose ira jusqu'à 10 et même 12 dragées par 24 heures, toujours 2 à 2.

Prix : 18 fr. 75 la boîte de 50 dragées.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1676-3.

Traitement complété par Cysto-suppos (suppositoires calmants), Prostacure (dragées).

Laboratoire G. CALMELS

AUTERIVE (Haute-Garonne).

(Tél. : 39 Auterive (Haute-Garonne)).

CYSTOFLORINE

(Dragées bleues néphro-pyélotropes).

Priorité. — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale. Hexaméthylène-tétramine, Chlorure de tétraméthylthionine. Camphre monobromé.

Propriétés. — Diurétique antiseptique et sédatif, *médication spécifique des affections génito-urinaires*. Décongestif des organes pelviens. Antiinfectieux chromothérapique (colore l'urine en vert). Désintoxicant général.

Indications. — Cystites, Néphrites, Pyélonéphrites, Bactériurie et Pyurie, Colibacillose, Oligurie, Urétrites, Hémorroïdes, Prostatisme, Métrites et Annexites, Écoulements muqueux ou muco-purulents, etc.
Chez l'enfant : Enurèse, Rougeole, Scarlatine, etc.

Posologie. — *Adultes :* 5 à 10 dragées par jour avant les repas. *Enfants :* depuis 1 dragée (tolérance parfaite).

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »

MONTE-CARLO

« La Barbiflore en thérapeutique. »

CYTOBAUME

Composition. — Pommade chlorurée magnésienne au stéarate d'ammonium.

Propriétés thérapeutiques. — Cette préparation réunit les deux indications principales pour la médication de l'épiderme et du derme : cytophylaxie des éléments cutanés en un milieu toujours acide à pH constant voisin de l'acidité habituelle de la peau.

Indications. — Dermatoses, psoriasis, érythème, érythrasma, prurits séniles. Néoforations de la peau, bénignes ou malignes, radiumdermites et radiodermites, mycoses unguéales, crasse des vieillards, fragilité et taches des ongles, piqûres d'insectes, coups de soleil. Préserve de la piqûre des aoûtats.

Mode d'emploi. — En applications fréquentes par léger massage sur la région à traiter, en particulier le soir au coucher. (Le Cytobaume ne tache ni le linge ni les draps.)

Prix : 16 fr. 30 le pot.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, Successeurs

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.).

CYTOBIASE

Extrait opothérapique de foies frais de Morue.
(Vitamines A et D.)

Formes :

1° *Gouttes* : Cytobiase simple. Cytobiase composé (addition de 5/1 000 d'arrhénal.)

2° *Granulé* : association à l'extrait de foies de morue, de poudre d'os, glycérophosphates de Ca et Mg.

Indications. — Anémies, avitaminoses, adénopathies, croissances, rachitisme, inappétence.

Posologie :

Gouttes. Enfants : 7 ■

Jusqu'à 5 ans : II gouttes par année d'âge.

De 5 à 15 ans : XV à XXV gouttes.

Gouttes. Adultes :

XXX à XL gouttes. A prendre respectivement 2 fois par jour avant les repas dans un peu de vin, bière, eau, bouillon.

Granulé. Enfants :

Jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour.

De 5 à 15 ans : 4 cuillerées à café par jour.

Granulé. Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix. *Gouttes* : 14 fr. 05.

Granulé : 15 fr. 60.

} Traitement pour 8 à 10 j

Laboratoires MARTIN

25-27, rue du Commandant-Rivière,
COLOMBES (Seine). (Tél. : Charlebourg 03-62.)

CYTO-CHOLINE

Composition :

Chlorhydrate de Choline pur.....	2 centigr.
Sérum chloruré isotonisant.....	2 centicubes.

Indications. — L'injection de **Cyto-Choline** peut être associée aux divers traitements chimiothérapiques et collapsothérapiques de la tuberculose.

Elle est indiquée chaque fois qu'une lésion tuberculeuse est en cause, que la localisation soit pulmonaire ou extra-pulmonaire, que l'évolution soit aiguë ou chronique.

Mode d'emploi. — La **Cyto-Choline** s'emploie en injections sous-cutanées, pratiquées avec les précautions aseptiques habituelles, au niveau de la cuisse, tous les deux jours.

Comme il s'agit d'une médication ayant pour but de modifier le terrain, elle doit être poursuivie pendant plusieurs mois, sans interruption.

Résultats. — Associée à la cure hygiéno-diététique, la **Cyto-Choline** favorise le développement du processus de solérose cicatricielle chez les tuberculeux pulmonaires, et détermine chez ces malades une amélioration des symptômes fonctionnels.

Dans les tuberculoses extra-pulmonaires, les résultats de ce traitement ne sont pas moins remarquables.

Traitement pour 24 jours.

Boîte de 12 ampoules : 21 fr. 50.

Laboratoire pharmaceutique **CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes, 27 — PARIS (XVII^e).

(Téléphone : Carnot 78-11.)

CYTO-MANGANOL CORBIÈRE

Médication mangano-calcique arsénée.

Le **CYTO-MANGANOL** constitue la médication hypodermique la plus active dans les cas d'asthénie, les états de dénutrition, la convalescence des maladies infectieuses et les troubles endocriniens.

Indications. — Déminéralisation en général et en particulier : décalcification ; dénutrition ; asthénies ; surmenage ; amaigrissement ; adénopathies ; lymphatisme, tuberculose.

Mode d'emploi. — En injection intramusculaire au niveau de la région fessière supérieure, en plein muscle.

Dose. — Une ampoule de 5 centicubes tous les jours ou tous les 2 jours pour les *adultes* ; une ampoule de 2 centicubes pour les *enfants*. Traitement pour 18 jours.

Présentation :

Cyto-manganol pour adultes.

Boîte de 12 ampoules de 5 cc. : Prix : 24 francs.

Cyto-manganol infantile.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. : Prix : 17 fr.

Laboratoire pharmaceutique **CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

CYTOPAN

Forme. — Élixir de goût agréable.

Composition :

CYTOPAN Simple : Acide phosphorique, teinture de noix vomique, kola.

CYTOPAN F : même composition que CYTOPAN Simple, avec extrait fluide spécial désodorisé de Fenugrec.

Indications. — Toutes décalcifications, prétuberculose, faiblesse générale, asthénies de toute nature, surmenage physique et intellectuel.

CYTOPAN F : celles du CYTOPAN Simple et plus spécialement amaigrissement, anémies grossesse, lactation, faiblesse générale.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir, avant les repas. Enfants au-dessus de 8 ans 1 cuillerée à café.

Prix : 18 francs.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).
(Tél. : Ent. 01-41.)

CYTOPEPSAL

Composition :

Pepsine	0 gr. 10
Sulfate neutre d'atropine.....	0 gr. 00125
Eau bi-distillée.....	1 cc.

Ampoules de 2 cc.

Indications. — Ulcères digestifs et duodénaux, Dyspepsies douloureuses hyperacides.

Posologie. — S'emploie par série de 12 injections intramusculaires profondes, 3 la première semaine, 1/4 d'ampoule, 1/2 ampoule et 3/4 d'ampoule. Continuer à raison de 3 injections d'une ampoule de 2 cc. par semaine.

La boîte de 12 ampoules pour 4 semaines de traitement.

Prix : 20 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél.: Carnot 78-11.)

CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Composition :

Cacodylate de soude chimiquement pur. Trente centigr.
Sulfate de strychnine Un milligramme.
Sérum isotonisant chloruré Cinq centicubes.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Action. — Multiplie les globules rouges, stimule l'activité cellulaire et accroît la résistance de l'organisme.

Indications. — Lymphatisme, Anémies, Tuberculose. Neurasthénie. Asthénie post-grippale, Convalescences.

Présentation. — Cyto-Sérum pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Traitement pour 18 jours.

Prix : 23 francs.

HEMO-CYTO-SÉRUM CORBIÈRE

Cyto-sérum ferrugineux.

La boîte de 12 ampoules de 5 cc. : 24 fr. 50.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

DABOÏNE

Hémostatique local (Usage Externe).

Solution stérile en eau distillée de venin de vipère Daboïa.

Indications. — Toutes les hémorragies et tous les saignements du domaine de la petite chirurgie, de l'oto-rhino-laryngologie et de la stomatologie. Tous saignements en nappe.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Présentation :

Boîte de 2 ampoules de 2 cc.....	18	francs.
Boîte de 4 ampoules de 2 cc.....	32	—
Flacon compte-gouttes de 20 cc. .	53	—

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, pl. du Présid^t-Mitouard, PARIS (VII^e).
(Tél. : Suffren 46-57.)

DAGÉNAN

(Corps 693)

« (p.-amino-benzène-sulfamido, pyridine.

Antibactérien polyvalent, actif sur les infections à : gonocoques, pneumocoques, méningocoques, streptocoques, staphylocoques, B. de Pfeiffer, coli-bacilles.

Indications. — Urétrites gonococciques aiguës ou chroniques, blennorrhagie chez la femme, pneumonies, infections grippales, méningites et méningococcies, cystites, infections chirurgicales, kératites, dacryocystites, otites.

Présentation. — Comprimés à 0 g. 50 (tubes de 20).
Solution injectable : voir à *Soludagénan*.

Posologie. — Dose moyenne de début : 3 g. (pour adulte); diminuer ensuite progressivement les doses, qui seront toujours fractionnées par 0 g. 50.

Enfants : par 1/4 de comprimé : 1 g. à 2 g. suivant l'âge.
Prix de vente : 25 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

·21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e)

DAMICOL

Cholagogue - Cholérétique.

Composition :

Peptone de foie.....	0,18
Sulfate de magnésie anhydre.....	0,63
Extrait de bouillon aromatisé..	Q. S. P. 1,80

Indications. — Congestion hépatique, Ictère, Lithiase biliaire, Cholécystites, Insuffisances hépatiques, Cholémie, Dyspepsies réflexes, Constipation, Migraines, etc.

Posologie et mode d'emploi. — Faire dissoudre 1 ou 2 comprimés de Damicol dans une tasse d'eau bouillante. Absorber le consommé ainsi obtenu le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

« Le petit déjeuner de l'hépatique. »

Présentation. — Boîte de 20 comprimés pour 10 jours de traitement.

Prix : 16 fr. 30.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, r. de Vaugirard - PARIS (VI^e). - (Tél : Lit. 68-22, 23 et 24.)

DÉCHOLESTROL

CHOLAGOGUE DOUX

Cure de décholestérinisation.

Composition. — Sels alcalins anhydres, sulfate de magnésie desséché, à faible dose, hexaméthylène-tétramine 1 p. 100.

Propriétés. — Stimule et draine le foie, augmente le pouvoir cholestérolitique du sérum sanguin, aide à la résorption des scléroses.

Indications. — *Toutes les manifestations de l'Hépatisme* (cholémie, lithiase, insuffisance hépatique, migraines, urticaire, prurit, eczéma, dyspepsie hépatique).

Toutes les manifestations de l'arthritisme. Hypertension artérielle, diabète, goutte, obésité, artériosclérose ; surdité et troubles oculaires des scléreux, xanthome, xanthélasma des paupières, arc sénile, cataracte.

Mode d'emploi. — Un paquet matin et soir, 1/4 d'heure avant les repas, dans un 1/2 verre d'eau ordinaire ou minérale tiédie, de préférence, pendant 12 jours par mois. (Vichy, Vals, Vittel, Evian, Châtel-guyon, etc.)

Prix : 17 francs.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris — CHARENTON (Seine)

(Tél. : Ent. 01-41).

DECORPA

Mucilage spécial contre la faim.

Mucilage pur, sans adjonction médicamenteuse, gonflant en milieu acide, indigestible, inassimilable, infermentescible ; « faux repas », remplissant l'estomac (après gonflement), illusionnant le tube digestif, assurant ses fonctions mécanique, sécrétoire et éliminatoire ; ne nourrissant pas.

Action. — Supprime la sensation de faim. — Maintient l'équilibre du tube digestif. — Evite la constipation des hypoalimentés. — Ne nourrit pas, mais rend tolérables les régimes de restriction alimentaire, même le jeûne complet.

Indications. — Adjuvant indispensable de toutes les cures de régime avec restriction alimentaire prescrites chez : *Obèses, Hypertendus, Pléthoriques, Urémiques, Uricémiques, Artério-Scléreux, Boulimiques, etc.*

Doses. — 2 à 3 cuillerées à café, 1 heure avant le repas (pour que le sujet se mette à table sans appétit), ou quand la faim se fait sentir.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien
21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Laborde 08-00.)

DELBIASE

Comprimés de sels halogénés de magnésium.

Stimulant biologique général par hyperminéralisation magnésienne.
Méthode cytophylactique du professeur Pierre Delbet.

Indications thérapeutiques particulières. — Asthénie et fatigue générale. Surmenage. Convalescence des maladies infectieuses, Dépression de certains malades devant être opérés. — Entérite chronique (désodorisation des selles), Constipation habituelle, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires. — Tremblements séniles ou autres : Maladie de Parkinson, Sclérose en plaques, Contractures et Crampes — Troubles cardiaques par hypervagotonie. — Affections de la peau, Prurits, Eczéma chronique, Psoriasis, Acné, Verrues. — Adénome prostatique. — Lésions du type précancéreux et prophylaxie du cancer.

Mode d'emploi et doses. — De 2 à 4 comprimés par jour, selon qu'il s'agit d'obtenir une simple action stimulante, ou que l'on désire, au contraire, lutter énergiquement contre un état pathologique déjà institué, surtout s'il revêt un caractère un peu menaçant. Faire dissoudre les comprimés dans un demi-verre d'eau, à prendre immédiatement avant le petit déjeuner.

La boîte de 48 comprimés. Prix : 19 francs.

La boîte de 96 comprimés. Prix : 32 fr 65.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, Successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gutenberg 27-03.)

DELCAÏNE ROQUES

Chlorhydrate de pseudococaïne droite.

Cocaïne aneuphorique par double isomérisation stéréochimique.

Trois fois plus active, trois fois moins toxique que la cocaïne officinale. N'est pas un stupéfiant, ne figure pas au tableau « B ».

Emploi. — Anesthésie locale, régionale. Anesthésie par instillations, par contact. Endoscopies (bronchoscopies, gastroscopies).

Forme. — Solutions à 0,5 %, 1 %, 2 %, en ampoules de 1, 2, 5, 10, 50 cc. pour anesthésie locale, régionale. Ampoules spéciales pour l'anesthésie buccale et laryngopharyngée : Delcaïne « 838 ».

Flacons de 15 cc. et 50 cc. à 5 % et 10 % et Bonain à la Delcaïne pour anesthésie par contact. Delcaïne en poudre, flacon de 2 gr., tube de 0 gr. 50.

Les ampoules de Delcaïne ne contiennent pas d'Adrénaline.

Établissements ROQUES

36, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie

PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 62-00, 62-01.)

DÉMORPHÈNE

Désintoxication rapide par les émulsions de lipides végétaux des morphinomanes, cocaïnomanes, opiomanes et tous intoxiqués (Procédé de MM. Delaville et R. Dupouy, Ac. de Médecine, 25 mars 1934).

Admis par le Service de la Santé de la Marine. Autorisation Ministérielle du 26 octobre 1936 par le Ministère des Colonies et par l'Assistance Publique.

Durée du traitement,

4 à 6 jours suivant le degré d'intoxication,

Disparition, au cours de la cure, de l'état de besoin si pénible et si redouté des malades.

Caractéristiques:

La morphine ou ses succédanés étant liposolubles (travaux d'Overton) se fixent rapidement sur la substance nerveuse riche en matières grasses et s'y intègrent en remplacement d'un des constituants normaux de cette substance.

Le **Démorphène** qui est une émulsion huileuse composée d'huile d'olives ricinée et lécithinée met en liberté le toxique fixé sur le système nerveux, le dissout et prend sa place dans la substance nerveuse.

Mode d'emploi:

Le **Démorphène** s'administre en injections intramusculaires, à raison de 25 cc. pro die, chaque injection étant de 5 cc. Avoir soin de bien agiter chaque ampoule avant usage. A ces injections on associera deux injections quotidiennes d'insuline de 15 unités chacune (augmentation des échanges nutritifs) deux injections de 2 cc. d'huile camphrée spartéinée. Aux vagotoniques on fera prendre 0,05 à 0,06 cgr. d'éphédrine par jour et on leur injectera avant les deux principaux repas une ampoule d'hypophyse et d'adrénaline. Chez les sympathicotoniques on remplacera l'éphédrine par de la génésérine (L à XC gouttes par jour) et l'hypophyse adrénalinée par des sels de calcium. Pour favoriser le repos du malade on donnera des sédatifs du système nerveux (**Eunéryl**) à petites doses matin et soir. Une bonne évacuation intestinale sera assurée par des pilules laxatives et diaphorétiques (cascara, évonimine, podophyllin, pilocarpine).

Chaque boîte d'ampoules est accompagnée d'un schéma indiquant de façon précise la marche à suivre.

La boîte de 10 ampoules de 5 cc. : 113 fr.

Laboratoire BIOLABO

9, boulevard Malesherbes — PARIS (Anjou 61-61.)

DENISOLINE

Lotion colloïdale au Soufre électro-négatif.

(Trente ans de succès dans les hôpitaux et en clientèle.)

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne les tissus sanguins sous-épidermiques ; apporte au derme le soufre déficitaire et rend la peau souple, ferme et saine.

Indications. — Acné sous toutes ses formes. Etats séborrhéïques, Pityriasis.

Mode d'emploi. — Une application le soir à l'aide d'un tampon d'ouate hydrophile. Laisser sécher.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

DENTAMIDE

Dentifrice tensio-négatif au Septoplix (1162 F ou paraminophénylsulfamide) de pH 7.

Composition :

Paraminophénylsulfamide.....	5 gr.
Ricinélate de soude	2 —
Sulforicinate de soude.....	4 —
Excipient sans sels calcaires Q. s. p.	100 —

Propriétés :

- 1° Préviend la formation du tartre par son pH neutre et son absence de sels calcaires.
- 2° Dissout le tartre déjà formé grâce au sulforicinate.
- 3° Aseptise la cavité buccale par le 1162 F et le ricinélate de soude qui exercent une action bactéricide élective sur les microbes buccaux et pénètrent dans toutes les anfractuosités dentaires.

Indications. — Hygiène quotidienne de la bouche. Traitement complémentaire indispensable de la carie, des stomatites, de la pyorrhée alvéolo-dentaire, des gingivites. Adjuvant des traitements antisypilitiques.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

DENTOCHRYSSINE LUMIÈRE

Traitement aurothérapique curatif de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (Paradentose), des stomatites ulcéreuses, des gingivites expulsives et des infections buccales en général.

La Dento-chryssine Lumière est constituée par une pâte à laquelle est incorporé un composé aurique spécial (aurothiopropanol sulfonate de Calcium) composé, qui possède un index thérapeutique des plus élevé, *capable d'exercer une action remarquable, aussi bien sur l'infection locale que sur les processus métaboliques tissulaires.*

L'absorption d'un composé aurique de cette nature, au niveau des gencives et des alvéoles dentaires, telle qu'elle est obtenue avec la **Dento-chryssine Lumière**, dont le taux de solubilité a été spécialement réglé à cet effet, complète heureusement la destruction des germes « in situ » par une imprégnation profonde, qui favorise la défense de l'organisme et la restauration des tissus mortifiés.

La Dento-chryssine Lumière réalise donc pour la première fois, seule ou associée à l'**Allauroi Lumière**, le *traitement complet, à la fois local et général, de la Pyorrhée alvéolo-dentaire (maladie paradentosique), affection organique, liée à un état général défectueux.*

Mode d'emploi. — Brosser les dents avec l'**Allauroi Lumière**, Pâte dentifrice médicale à base d'or. — Prendre la pâte **Dento-chryssine Lumière** sur la pulpe de l'index et masser la gencive doucement, jusqu'à absorption. Les applications en nombre variable (plusieurs fois par jour, selon la gravité) doivent être quotidiennes. Dans les cas simples, le traitement est continué pendant un mois environ. En cas de suppurations importantes ou chroniques, le nombre des applications consécutives peut être porté à 70 ou 80.

Laboratoires **LUMIÈRE**
45, rue Villon — LYON.

DENTOMA

Pâte Dentifrice

Spirillicide par son sel arsenical stable,
Microbicide par le chlorétone, Neutralise
l'acidité buccale génératrice des caries,
par la magnésie.

Exempte de pierre ponce. L'abrasif utilisé
est de l'alumine qui ne raye pas l'émail mais
blanchit admirablement les dents.

Indications. — Pyorrhées, gingivites, stomatites. Hygiène quotidienne de la bouche et des dents, Prévient la carie dentaire.

Le tube : 7 fr. 65.

Laboratoires **G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

DENTOVAL

**Solution saline, alcaline,
antiseptique, décongestive
pour tous les soins de la bouche.**

Employé comme dentifrice, remplace
poudre, pâte et tout autre produit
pour les dents.

Spécifique de la Pyorrhée.

Dépôt :

**PHARMACIE ANGLAISE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées —
PARIS.

DEPRESSYTOL

Nouveau régulateur du débit artériel.

Composition :

<i>Phényléthylbarbiturate double</i>	
<i>d'Yohimbine et de Quinine</i>	0,026
Extrait de <i>Cratægus</i>	0,013
Extrait de <i>Passiflore</i>	0,013
Extrait de <i>Gui</i>	0,013

Indications. — Hypertension artérielle (disparition
rapide et durable des malaises, baisse progressive, sans
chute brutale, de la pression artérielle), l'éréthisme
cardiaque, angine de poitrine, états spasmodiques et
retentissement circulatoire.

Dosologie. — Une dragée avant chacun des deux prin-
cipaux repas.

Observation. — Traitement peu onéreux, la boîte de
24 dragées, pour douze jours.

Prix ; 18 fr. 75 (le traitement).

R. DUNESME, Pharmacien

4 et 6, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : NOR. 68-53.)

DÉPURATIF CHAUVIN

(aux hyposulfites)

Principes actifs. — Hyposulfites de soude et de magnésie, extraits de badiane et d'anis vert. (Solution glycinée ne contenant ni iode, ni iodures, ni substances végétales dites à tort dépuratives.)

Action. — Réducteur, modificateur du tissu humoral, antianaphylactique, désensibilisant, antitoxique.

Mode d'emploi et posologie. — *Adultes* : Une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, 2 fois par jour, avant chacun des deux principaux repas. *Enfants* : de 5 à 7 ans, 1/3 de la dose ; de 7 à 14 ans, 1/2 dose ; à partir de 15 ans, dose normale.

Indications. — Affections cutanées, Eczémas, Furunculose, Urticaires, Intoxications du foie y compris intoxications thérapeutiques (comme préventif et comme curatif). Facilite la chrysothérapie et les traitements antisiphilitiques, qu'il rend inoffensifs. Ne fatigue pas l'estomac comme cela se produit pour les hyposulfites en cachets ou en comprimés.

Prescription. — Peut être prescrit aux diabétiques. Prescrire ainsi : un Dépuratif Chauvin. (Les médecins qui n'aiment pas le mot « dépuratif » peuvent prescrire cette spécialité sous la dénomination : *Désensibilisant Chauvin*.)

Prix : 17 r. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 624-139.

Établissements Alfred CHAUVIN

(Laboratoire des Tubes Blache)

AUBENAS (Ardèche).

DÉPURATIF SALGANYL

Dépuratif exclusivement médical.

Indications. — Lymphatisme, Dermatoses, Prurits, Arthritisme, Furunculose, Affections du foie, Infections, Intoxications.

Forme. — Elixir peu alcoolisé de goût agréable présenté en deux modèles, un normal (12 jours de traitement), un réduit destiné aux enfants (15 jours de traitement).

Composition. — Bardane stabilisée, Boldo, Salsepareille, Sulfate de manganèse, Iode en faible quantité sous forme de composé iodotannique : Chlorure de magnésium, Acide phosphorique.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe pour les adultes, une à café pour les enfants, pur ou dans un peu d'eau avant les deux repas.

Prix : 20 francs.

Modèle réduit : 12 francs.

Inscrit au Laboratoire national du Contrôle des médicaments sous le n° 1438.

Laboratoires GAMES

place de la Salamandre — NIMES.

DÉPURIODE

du Dr Roger Weber.

Dépuratif diurétique, ioduré, sans sucre ni alcool.

Une cuillerée à soupe contient
0 gr. 25 d'iodure de potassium.

Formule. — Extraits de bardane stabilisée, de fumeterre, de patience, de salsepareille, de pensée sauvage, de guaco, de stigmates de maïs, de noyer stabilisé : à à 2 gr. Régisse : 5 gr. Iodure de potassium 16 gr. 70. Pour 1.000 cc.

Indications. — Furonculose, clous, anthrax, orgelets, éruptions, boutons, rougeurs, eczémas, impétigo, gourme, dartres, herpès, aphtes, scorbut, acné, psoriasis, urticaire, démangeaisons, dermatoses. Arthritisme, uricémie, rhumatisme chronique, goutte, douleurs, névralgies, lumbago, sciatique, obésité.

Artériosclérose, athérome, hypertension, étourdissement, vertiges, mouches volantes, bourdonnements, céphalée, troubles cérébraux, pouls fort et tendu, signe de la temporale, crampes musculaires, refroidissement et engourdissement des extrémités, sensation de doigt mort, congestion, couperose, âge critique, scléroses, myocardite chronique, aortite, asthme cardiaque, angine de poitrine, bronchite chronique, emphysème, asthme, cirrhoses, ictère spécifique, néphrite interstitielle, albuminurie spécifique, oligurie, myélites, tabès, névrites, paralysies, infections et intoxications, spécificité, bacillose, lymphatisme, scrofule, adénites, mycoses, actinomycose, alcoolisme, tabagisme, saturnisme, grippe, goître, abcès, suppurations, etc.

Mode d'emploi et posologie. — 20 jours par mois, au milieu de chacun des deux principaux repas, dans un demi-verre d'eau.

Adultes (dose moyenne) : 1 cuillerée à soupe. Contre artériosclérose et hypertension : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : au-dessus de 5 ans (dose moyenne) : 1 cuill. à café.

DRAGÉES DE DÉPURIODE :

2 dragées = 0,25 KI.

Prix du flacon : 20 francs.

Laboratoire Angelini

61, rue de Seine — PARIS (VI^e). (Danton 92-73.)

DÉPUROGÈNE

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et de Citrate de Soude.

Propriétés. — Épurative et Décongestive, selon la méthode du D^r A. Chaix, de Vichy. Puissant agent de décongestion et d'élimination de l'Urée et de la Cholestérine du sang.

Indications. — États pléthoriques, variqueux, hémorroïdaires, hypertendus.

Urémie, Diabète, Goutte, Rhumatismes, Artériosclérose.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Tube : 60 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-23.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DÉPUROGÈNE « T »

Composition. — A base d'extraits d'Artichaut, de Salsepareille, de Ficaire et d'extrait hépatique spécial.

Propriétés. — Épuratif et décongestif de l'organisme féminin, selon la méthode du D^r A. Chaix, de Vichy.

Indications. — Traitement par excellence de tous les troubles de la ménopause et des troubles congestifs dus à la stase veineuse et à l'intoxication du sang.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour.

Boîte 60 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-27.

Laboratoires de LA LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

DERMACIDE PORCHER

Tous les savons sont *alcalins* en présence d'eau — même ceux dits neutres ou acides — ; ils détruisent, de ce fait, l'acidité naturelle de la peau et des muqueuses, rendant celles-ci facilement infectables.

D'autre part, les acides diminuent les démangeaisons, tandis que les alcalins les exacerbent (Darier).

Dermacide est un **substitut acide du savon (pH moyen 3,6)**.

Caractéristiques. — 1° Il contient à l'état libre : Acide acétique, 0,60 ; tartrique, 1,10 ; salicylique, 0,25 ; benzoïque, 0,20 p. 100.

2° Son **acidité thérapeutique (pH moyen 3,6)** — *il rougit le Tournesol bleu* — est proche de l'acidité naturelle de la peau (pH 4,5).

3° Il s'emploie, nettoie et mousse comme le savon.

4° Les actions antigénétique et microbicide de *Dermacide liquide* sont effectives aux concentrations respectives de 2 et 4 p. 100.

Indications :

Infections de la peau, du cuir chevelu, de la muqueuse vaginale.

Mycoses, Eczémas professionnels, Eczématides, Intertrigos des plis, Prurits sous toutes ses formes, Bourbouille, Séborrhées grasses, Acnés, Psoriasis, Pyodermites (furoncles, impétigos, etc.).

Métrites, Vaginites, Prurits vulvaires.

Mode d'emploi :

Dermacide liquide : *Lotions épidermiques* avec un tampon de coton imprégné de la solution : 1 partie *Dermacide liquide* + 2 parties d'eau. (Acnés, Séborrhées, Pyodermites, Hyperhidrose, etc.).

Agent de nettoyage (Eczémas professionnels, Dyshidrose).

Cuir chevelu : Nettoyage avec 2 cuillerées à bouche pour 1/4 de litre d'eau tiède. Rincer à l'eau.

Injectons vaginales : 1 à 2 cuillerées à bouche pour 1 litre d'eau.

Dermacide pain : Remplace le pain de savon dans tous ses usages.

Dermacide pâte : Sans corps gras, sèche rapidement et s'enlève à l'eau ; complète l'action des deux autres formes.

Traitement. — *Supprimer complètement l'usage des savons* — toujours alcalins. Les remplacer par *Dermacide liquide* ou pain.

Sur les lésions accentuées, compléter, après quelques jours, le traitement ci-dessus par des applications de *Dermacide pâte*.

Sur la face, les lésions subaiguës, les plis, toujours débiter par lotions de *Dermacide liquide* coupé de 4 à 6 fois son poids d'eau. Les premières applications déterminent parfois, pendant quelques minutes, des sensations de picotement qui disparaissent à la deuxième ou troisième application. Augmenter progressivement la concentration.

Sur les peaux très sèches (dépourvues de graisses), faire suivre l'usage de *Dermacide* d'onctions de corps gras (*Vita-Dermacide*, pâte vitaminée acide, sans huile de Flétan).

Pain : Boîte de 1 et 3 pains. **Pâte :** Tube de 90 gr. env.

Liquide : Flacon courant. Flacon G. M.

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 69-03.)

DERMALIBUT

POMMADE NOVALIBUT

Pommade biologique vitaminée pour pansements, à base d'huile pure d'hippoglossus-hippoglossus L à hautes concentrations de vitamines A et D naturelles et naturellement associées.

NOVALIBUT (Voir ce mot.)

Caractéristiques. — 500 000 U. I. vitamine A et 62 500 U. I. vitamine D par 100 grammes.

Propriétés. — Anti-infectieuse, antiphlogistique, cytophylactique antalgique.

Indications. — Toutes plaies, brûlures, ulcérations, escarres, dermatoses, inflammations, suppurations (cutanées, muqueuses, osseuses).

Emploi. — Médecine, pédiatrie, chirurgie, dermatologie, otorhinolaryngologie, gynécologie, stomatologie, ophtalmologie.

Mode d'emploi. — En larges applications directes sur l'endroit à traiter, sans antiseptie préalable. Proscrire l'emploi conjugué d'antiseptiques chimiques, nuisibles à l'action des vitamines.

Prix : 21 fr, 20 le tube de 50 grammes environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 689-40.

Laboratoire DU GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

DERMASULINE

(Ex-Pommade FORNET à l'Insuline.)

Cicatrisant parfait.

Principe actif :

Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des îlots de Langerhans véhiculé par un excipient spécial, à pouvoir transdermique remarquable. Titrage régulier. Aucun adjuvant.

Indications :

Ulcères variqueux. — Prurits et hémorroïdes.

Cancroïdes et cancers ulcérés de la peau.

Orgelets récidivants, Blépharites, Ulcères de la cornée.

Radiodermites. — Brûlures et plaies de toutes natures.

La *Dermasuline* (ex-Pommade Fornet à l'Insuline) est utilisée dans tous les hôpitaux de Paris.

Prix : 17 fr. 50.

L. N. C. 353-5.

Laboratoires THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

DERMATHORIUM

Pommade se composant de terres radioactives à activité uranique : I, terres rares (titane, lantane, néodyme, etc.), produits organiques (acide salicylique, résorcine, huile de cade), produits minéraux (soufre, oxyde de zinc).

Le Dermathorium est un complexe jouissant de propriétés antiseptiques (acide salicylique, soufre), kératoplastiques (résorcine, titane), analgésiques et sédatives (acide salicylique), qui convient à toutes les manifestations cutanées morbides.

Indications. — Le Dermathorium est utilisé dans toutes les affections de la peau : Eczéma, Acné, Prurits divers, Psoriasis, Intertrigo, Ichthyoses, Lichens, Ulcères, Epithéliomas cutanés.

Mode d'emploi. — Enduire chaque soir, après nettoyage soigné, les parties atteintes d'une couche assez épaisse de Dermathorium Rhemda, protégé ou non par un pansement.

Prix au public : 1 tube : 14 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 468-5.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068 B.

DERMODULCIS LAGOUTTE

Composition et forme. — Pâte neutre en tube aseptique à base de : oxyde de zinc, amidon, huile de noyaux, lanoline et vaseline pure : aa p. e.

Actions thérapeutiques. — Isolante, adoucissante, astringente, siccatrice. S'étend facilement et s'enlève aisément.

Indications. — Erythèmes, Eczémas aigus ou chroniques, Dermite aiguë de natures diverses. Radio-dermites, Prurigo, Impétigo, Herpès, Séborrhée, Dartres, Ulcères des jambes, Crevasses, Pansements chirurgicaux, Fistules, Anus artificiel.

Mode d'emploi. — En onction matin et soir.

Prix du tube de 60 gr. : 12 fr. 50.

Son efficacité est heureusement complétée par la **DERMODULCIS** (Poudre) adhérente, infermentescible, adoucissante.

Prix de la boîte : 9 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON (III^e).

(Tél. : Moncey 14-35.)

DERMOFAGINE

Crème pommade, légèrement parfumée, en tube.
(Extr. de hêtre et Vitamines A et D).

Propriétés. — Antiparasitaire, Antiseptique, Antiprurigineuse cicatrisante.

Indications. — Toutes les Dermatoses, principalement les Dermatoses sèches, Pityriasis du visage (dartres) ; du cuir chevelu (pellicules).

Eczémas secs, chroniques, hyperkératosiques.

Eczémas séborrhéiques (séborrhée concrète des vieillards, verrues plates séniles).

Impétigo, Herpès : Tricophyties (herpès circiné).

Toutes affections croûteuses et pelliculaires du cuir chevelu.

Erythèmes, crevasses, Hémorroïdes.

Irritations de la peau, rougeurs, engelures, par rasoir, fards, intempéries.

La *Dermofagine* est une excellente crème de toilette.

Prix au public : 13 fr. 50.

Donner en même temps à l'intérieur un dépuratif (cholagogue et diurétique), le *Ralforyl* (granulé) à la dose de 4 ou 5 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 13 fr. 50.

Laboratoires de la DERMOFAGINE

15, pl. Godefroy-de-Bouillon — BOULOGNE-SUR-MER
(Pas-de-Calais.) (Tél. : 537.)

DERMOFLETOL

Composition. — Pommade vitaminée à base d'Hali-flétol (huile de foie de flétan pure extra-riche en vitamines naturelles A et D).

Propriétés thérapeutiques. — Applique, sous forme de pommade d'odeur et de consistance agréables, les propriétés reconnues à l'huile de foie de flétan pour l'activation des mitoses cellulaires et des régénérations épithéliales, donnant une cicatrisation rapide et souple de toutes plaies, surtout atones, ulcères, surtout variqueux. Pansement biologique incomparable des brûlures, suppurations, irritations de la peau, engelures, eczémas, rougeurs des nouveau-nés.

Mode d'emploi. — Etaler une large couche de *Dermoflétol* sur une compresse stérile (gaz ou toile) et l'appliquer sur la lésion. Pour les ulcères variqueux, réaliser la contention élastique nécessaire par une bande souple.

Prix. — Le tube : 17 fr. 85.

Echantillons et littérature.

Laboratoires du Dr NARODETZKI,

19, boulevard de Bonne-Nouvelle — PARIS (II^e).
(Tél. : Louvre 35-36.)

DERMOLIVE

Composition. — Pommade à base du support actif : *Oléostat* (nom déposé), Huile d'olive *Vierge* solidifiée et saturée par procédé catalytique associé synergiquement aux acides benzoïque et borique, Kérosène et essences.

Propriétés. — L'Huile d'olive, support actif, garde ses qualités naturelles et agit par sa vertu extraordinaire de pénétration et sa richesse en vitamines.

Indications. — Toutes les dermatoses (eczéma, zona, acné, furonculose). Cicatrisation de toutes les plaies (brûlures, engelures).

Mode d'emploi. — Bien nettoyer la partie malade. Appliquer *Dermolive* qui fond aussitôt et imprègne profondément le tissu atteint. Recouvrir d'une compresse stérilisée de préférence. Renouveler matin et soir.

Grand tube. — Petit tube.
Enreg. au L. N. C. n° 1679-1.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.
19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30).

ARNOUX-BERENQUIER, Pharmacien.

(Voir *Boldolive*, *Suppolive* et *Sulfolive*.)

DERMO-PLASTOL

Composition. — Pâte poreuse additionnée de : Acide orthoxybenzoïque, huiles essentielles végétales, huile pyrogénée, tuménol.

Propriétés. — Réductrice, antiprurigineuse, kératoplastique. Assure à la peau son fonctionnement normal.

Indications. — Eczémas et dermatoses analogues.

Forme. — Présentation en tube. Deux modèles.

Posologie. — Application matin et soir en couche épaisse. Suivre les indications du prospectus.

Dans la période subaiguë des dermatoses et chez les enfants : *Cremo-Plastol* (antiphlogistique, antiprurigineux).

Pansement de jour : *Solu-Plastol* (soluble à l'eau).
Dermatoses rebelles : *Zebo-Plastol*.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

DERMORADOL

Complexe à radioactivité stabilisée.

Composition. — Pommade à base de **Bromure de Radium** associé aux meilleurs topiques usuels (soufre, camphre, Pix betulina, oxyde de Zn).

Propriétés. — Action particulière du Radium sur les réactions inflammatoires locales.

Accentuation des propriétés de chacun des topiques par radioactivité induite.

Le DERMORADOL calme l'irritation et la douleur dès la première application. Cicatrise rapidement toutes les dermatoses.

Indications. — Acné, brûlures, eczémas, érythèmes, furoncles, herpès, impétigo, prurits, plaies atones, psoriasis, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer 2 ou 3 fois par jour la quantité de pommade nécessaire pour recouvrir complètement la partie malade.

Établissements LABORADIUM

25, rue Friant — PARIS.

(Tél. : Van. 25-07.)

DERMO-REIPAR

Médication salicylée par voie transcutanée.

Composition. — Crème à l'éther benzyl salicylique (6,6 p. 100 d'acide salicylique).

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Sciatique, Lumbago, Arthralgies, Névralgies. Complément toujours utile de la médication salicylée.

Avantages. — Crème s'étalant facilement. *Odeur agréable.* Absorption rapide du fait de son excipient spécial. *Action calmante rapide.*

Présentation. — Tube de 35 gr. environ.

Prix : 15 francs.

Échantillons et littérature.

Laboratoires DRAPIER

RETHEL (Ardennes).

(Tél. : 0-19.)

DERMO-RHINO-GÉNÉSINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

EX-DERMO-RHINHISTOL

CRÈME

Opothérapique et Chimiothérapique

RÉGÉNÉRATRICE DE LA PEAU

à haute teneur en

Extrait embryonnaire total et Vitamines liposolubles A, D, E, F

— COMPOSITION —

Extrait embryonnaire total.....			8 gr.
Huile de foie de Flétan.	2 gr.	Oxyde de zinc.....	2 gr.
Huile de germes de blé..	0 gr. 75	Chlorure mercurieux par vola-	
Acide linoléique pur	0 gr. 25	tilisation, Camphre, aân ...	1 gr.
			pour 100 gr.

Excipt^l spécial^l étudié avec Vaseline, Lanoline, Essences aromatiques

— INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES —

Épidermisation certaine dans toutes altérations ou pertes de substance de la peau et des muqueuses accessibles.

Domaines des applications :

Dermatologie. Oto-Rhino-Laryngologie. Traumatologie
Chirurgie. — SOINS DU VISAGE — Gynécologie.

PRIX AU PUBLIC : 21 fr. 40 LE TUBE de 40 gr.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS.

2, rue Claude-Matrat, ISSY-PARIS (Seine). — Tél. : Michelet 24-11.

DERMOSEPTAZINE

Pommade à 5 % de *p* p-amino-benzène sulfamide (1162 F.).

Application des propriétés antistreptococciques et bactéricides du noyau actif de la Septazine à la désinfection locale.

Indications. — Streptococcies cutanées. Impétigo, ecthyma, eczémas infectés, pyodermites, érythèmes fessiers. Dermo-mycoses, retard de cicatrisation des plaies liés à l'infection.

Présentation et mode d'emploi. — Tubes de 30 gr. environ. Applications locales recouvertes ou non de pansements, à renouveler 1 à 2 fois par jour, après nettoyage de la région.

Prix de vente : 12 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

DERMOSPLÉNINE

Extrait désalbuminé aqueux de rate.

Communication à la Société Médicale des Hôpitaux (Paris, 5 décembre 1930).

Eczémas secs et suintants, aigus et chroniques.

Prurits — Urticales — Œdème de Quincke.
Ampoules de 2 centicubes correspondant à 25 gr. de rate fraîche de veau.

Mode d'emploi. — Injection intramusculaire. —
Commencer le traitement par l'injection de 2, 3, 4 ou même 5 ampoules à la fois selon la gravité du cas traité ; une injection tous les 2 jours ; dès que le prurit est nettement atténué et que les lésions cutanées commencent à s'effacer, l'on peut réduire la dose à 1, 2 ou 3 ampoules, également tous les 2 jours.

Références cliniques et échantillons :

Liposplénine du D^r Groc.

J. OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes, PARIS (III^e). Tél. : Arch. 03-94.

DERPHYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-39.

Forme. — Poudre.

Composition. — Stéarates métalliques.

Propriétés dermatologiques. — Infermen-tescible, hydrofuge, antiseptique, isolante.

Indications. — Toilette des nourrissons et des alités, dermites, intertrigo, prurits, macérations, urticaire, impétigo, dartres, piqures d'insectes, coups de soleil.

Présentation. — Boîte poudreuse.

La boîte poudreuse de 100 grs : 10 fr. 10.
La boîte de recharge de 330 grs : 15 fr. 90.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

DÉSARTYL

Hypotenseur végétó-polyhormonique.

Composition. — Gui, Hépatine, Pancréine, Pulmine.

Dose. — 3 ou 4 dragées par jour (de préférence avant les repas) amènent un abaissement rapide et durable de la tension artérielle. — Les symptômes alarmants sont immédiatement amendés.

Indications. — Hypertension artérielle, troubles de la ménopause, menaces d'hémorragie cérébrale chez les pléthoriques, troubles oculaires et auditifs provoqués par l'hypertension.

Prix : Le tube de 36 dragées : 19 fr. 15.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

DESCHLÉRO-SEL

Traitement de la Cholestérinémie et de ses conséquences.

Composition. — Boldine à 0 gr. 05 ; Formine, 2 gr. pour 100 gr. de Sulfate de Soude et de Magnésie, Benzoate, Citrate, Phosphate et Bicarbonate de Soude.

Indications. — Artério-Sclérose vraie, Scléroses organiques, Hypertension artérielle, Angine de Poitrine, Cataracte, Tophi des Goutteux, Arthritisme, Urticaire, etc.

Propriétés. — Facilite la fonction hépatique. Intensifie la sécrétion des sels biliaires qui sont les agents de dissolution du Cholestérol.

Présentation et dose. — Boîte de 20 paquets de 2 gr. Un paquet matin et soir, avant les repas, dans une infusion de Boldo.

Enregistré au L. N. C. n° 388-3.

Laboratoire E. BEZIE, Pharmacien
6, place de l'Académie — ANGERS.

DÉSENSIBILYSINE

Traitement de l'asthme et de l'emphysème (méthode du Dr Paul Cantonnet).

Traitement principal d'attaque:

1° Soluté de polypeptone iodée et de chlorure de calcium jaborandique injectable.

La boîte d'ampoules : 41 fr. 60.

Traitements adjuvants et de maintien:

Pulvérisations huileuses (aérol, trachéol).

Aérol : Le flacon avec pulvérisateur : 62 fr. 40,
seul : 26 fr.

Trachéol : Le flacon : 20 fr. 80.

Seringue spéciale pour injections trachéales : 70 fr.

Pilochlorine : Pilules, le flacon : 26 francs.

Traitement forme bronchitique:

Stock-vaccin bronchitique Beauvy-Cantonnet.

La boîte : 41 fr. 60.

Laboratoires BÉLIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

DÉSINTEX

Médication hyposulfite rationnelle.
Désintoxicant. Désensibilisant. Correcteur
humoral. Générateur de glutathion.

COMPRIMÉS glutinisés et dragéifiés d'hyposulfite de magnésium et de sodium chimiquement purs.

Inattaquables par le suc gastrique, les comprimés ne sont décomposés qu'en milieu intestinal, où ils sont absorbés en libérant des ions S instables, à l'état naissant et actifs.

Maximum d'efficacité, aucune intolérance gastrique.

Posologie. — Avaler, sans sucer ni croquer, 2 ou 3 dragées avant les principaux repas.

Durée du flacon : 10 jours en moyenne.

AMPOULES de 5 cc. en injection intramusculaire quotidienne. Aucune réaction locale ou générale.

Indications. — *Vecteur du soufre*: toutes dermatoses, acné, séborrhée, eczéma, herpès, etc.

Maladies de la nutrition: Affections articulaires et péri-articulaires, rhumatismes chroniques, goutte, diathèse arthritique. Affections hépatiques : insuffisance, ictères.

Désensibilisant: Dermatoses de sensibilisation, accidents sériques, urticaire, prurits. Manifestations anaphylactiques diverses (migraines, chocs, asthme), etc.

Désintoxicant: Intoxications alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Facilite la fonction rénale et hépatique au cours des traitements par les sels d'or, de Bi, Hg, As et évite les incidents.

Troubles psychiques, angoisse, instabilité émotionnelle, déséquilibre du vague.

Laboratoire M. RICHARD

AUBENAS (Ardèche).

DEXOPLASMA

Opothérapie anti-anémique.

Association Hépat-Mangano-Cuprique.

Extrait de foie	0 gr. 03
Extrait de rate	0 gr. 03
Extrait de groseille	0 gr. 01
Nucléinate de manganèse	0 gr. 015
Nucléinate de cuivre.....	0 gr. 0025
Sérum, hémoglobine, glycérine. Q. S. p	5 cc.

Indications. — Anémies de toutes natures (médicales et chirurgicales), Chlorose, Asthénie, Surmenage, Convalescence, tous états dépressifs.

Présentation.

Ampoules buvables de 5 cc. Boîte de 12 ampoules : 24 fr. 50.
 — — — Coffret de 25 — 36 fr. 95.

Sirop : 20 fr. 15.

Posologie :

Ampoules buvables : 1 à 3 ampoules par jour selon âge.

Sirop : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à dessert par jour.

— *Enfants* : 5 cuillerées à café par jour.

(Peut être pris pur ou dilué dans un peu d'eau ; goût agréable.)

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
 (Tél. : Lon 04-61.)

DEXTROSOL

Indications. — Toutes les indications du glucose, et notamment tous états d'hypoglycémie et d'acidose ; insuffisance hépatique, cirrhose, lithiase et affections allergiques (asthme, prurigo, etc...) ; myocardites, angine de poitrine ; maladies infectieuses (diphtérie, coqueluche, encéphalite, pneumonie, typhoïde), intoxications (alimentaire, barbiturique, etc...), toxémies gravidiques, morphinisme ; ulcères gastriques et duodénaux ; néphrite et pyurie ; surmenage. Sucre de choix dans l'alimentation des enfants. Administration pré et post-opératoire. Cures d'engraissement.

Mode d'emploi. — A incorporer aux boissons (eau, thé, café, lait, jus de fruits) et aux plats.

Adultes : 50 à 400 gr. par jour.

Tolérance parfaite de quantités importantes, en raison du faible pouvoir sucrant.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par biberon de 100 gr.

Sucrer les aliments avec 5 à 10 p. 100 de *Dextrosol*.

Enfants : 10 à 20 gr. par kilog. du poids.

Prix : 7 francs la boîte de 250 gr.

Société des PRODUITS DU MAÏS

29, rue de Berri — PARIS. (Tél. Ely. 72-06.)

DIABÉTIFUGE

Spécialité synthétique antidiabétique à base de bioxyde de manganèse, de bicarbonate de soude, de chlorhydro-méthylarsinate de lithine, d'anti-pyrine, de nitrate d'urane et de santonine.

Médication complémentaire de l'Insuline.

Doses. — Un cachet, le matin et l'après-midi, avec un demi-verre d'eau minérale, Pougues de préférence. Continuer pendant 10 jours : diminuer, s'il y a lieu, après analyse du sucre ; cesser au bout de 20 jours. Repos de 20 jours et reprendre.

Prix au public : 27 fr. 50, pour 10 jours de traitement.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — Paris (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIABÉTOSAN

Comprimés.

Insulinoïde végétal obtenu par dialyse de germes d'une espèce sélectivement cultivée d'orge, et dont la germination est conduite dans des conditions de temps et de température rigoureusement déterminées, sans aucune autre association chimique ou organique (C. R. *Académie des Sciences*).

Propriétés thérapeutiques. — Action hypoglycémiante constante et prolongée. Diminution parallèle des taux de sucre sanguin et urinaire.

Indications. — Diabète moyens et légers. Hyperglycémie, Polydipsie, Polyurie. Meilleure utilisation des substances hydrocarbonées. Dermatoses. Cures d'engraissement. Adjuvant de l'insuline dans les diabètes graves permettant le remplacement d'un quart ou d'un tiers environ des unités d'insuline.

Posologie. — *Adultes* : 8 à 12 comprimés par jour, en trois fois au cours des repas.

Enfants : demi-doses,

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

DIADERMINE

Crème.

Excipient pour pommade. Crème de toilette.

Définition. — La Diadermine est un savon mou à la glycérine, sans odeur, inaltérable, absolument neutre, soluble dans l'eau et les sérums et pénétrant très rapidement l'épiderme.

Indications. — Remplace la vaseline, l'axonge et la lanoline dans la préparation des pommades médicamenteuses, *éteint le mercure. Touchers, ne graisse pas et n'abîme pas les gants.*

Massages, Soins de la peau. Brûlures, Engelures, Gerçures du sein. Erythème fessier du nouveau-né.

Prix de vente au public : Pot : 7 fr. 75 ; Tube : 5 fr. 50.

DIADERMINE U. V.

Crème.

A base de crème Diadermine et de sels de quinine. Empêche la photo-sensibilisation de la peau par les rayons ultra-violets.

Indications. — *Évite, supprime les coups de soleil* (supprime la douleur en quelques minutes. Fait disparaître l'érythème en 24 heures).

Protection de la peau au cours des traitements par rayons ultra-violets ou rayons X (empêche la radiodermite).

Mode d'emploi. — *Avant.* Enduire la partie à protéger d'une légère couche de Diadermine U. V.

Après. — Mettre sur l'érythème une couche épaisse de Diadermine U. V. Panser sous gaze stérilisée.

Prix de vente au public : Grand tube : 20 francs ; Tube moyen : 8 fr. 50.

DIADERMINE B. B.

Poudre.

Poudre minérale hygiénique stérilisée à 125° (complément de la crème Diadermine pour les soins de la peau).

Présentation. — En boîtes poudreuses hermétiques (en aluminium) et stérilisées.

Indications. — Toilette des nouveau-nés : érythème fessier. *Adultes* : toutes irritations de la peau, intertrigo, dermatoses. *Feu du rasoir, transpiration.*

Prix de vente au public : la boîte 6 fr. 50. Recharge 4 fr. 25.

Conditions spéciales au Corps Médical.

Remise 40 p. 100.

Échantillons sur demande à :

BONETTI Frères

60, rue Étienne-Dolet — MALAKOFF (Seine).
(Tél. : Alésia 24-01 et 24-02.)

DIAGNOTHORINE

Solution colloïdale à 25 p. 100 d'Oxyde de Thorium pour l'exploration radiologique du tube digestif.

Indications. — L'étude des contours des segments du tube digestif est obtenue par l'emploi de la GELOBARINE (Voir Gélobarine). La DIAGNOTHORINE révèle les *plis de la muqueuse* dans tous leurs détails.

Présentation. — Flacons de 60 et 300 cm³.

Posologie et mode d'emploi. — Pour un examen : en général 2 cuillerées à soupe, à faire ingérer par petites gorgées au moment de l'examen, le malade n'ayant rien absorbé pendant les 8 heures précédentes.

La Diagnothorine peut également être administrée par voie rectale pour l'examen des plis de la muqueuse du gros intestin.

Prix de vente : Le flacon de 60 cm³. : 16 francs.

— de 300 cm³. : 69 —

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DIAL

Diallylmalonylurée

CIBA

HYPNOTIQUE ANTINERVEUX.

Hypnotique actif et rapidement éliminé, d'où réveil normal, non suivi d'hébétéude. Procure un sommeil calme et réparateur et, à dose modérée, n'a jamais d'action nocive, même par son usage prolongé.

Indications. — Insomnie nerveuse en général : agités, émotifs, surmenés. Etats d'excitation psychique et de nervosisme. Agitation démentielle.

Doses. — 1/2 à 2 comprimés (au coucher pour les insomnies du soir ; au réveil pour celles du cours de la nuit).

Formuler. — Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIALYL

Dissolvant urique.

Médicament-type de l'arthritique et du rhumatisant.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Goutte, Sciatique, Névralgies, Migraines, Lumbago, Gravelle, Calculs, Coliques néphrétiques et hépatiques, Dermatoses, Surmenage physique ou intellectuel.

Forme. — Granulé effervescent.

Posologie. — Deux cuillerées à café par jour, chaque cuillerée dans un peu d'eau, entre les principaux repas. — Dans les crises aiguës, 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 14 fr. 35 le flacon.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 64-2.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

(Tél. : Auteuil 20-21.)

DIASES

Composition. — Farines fraîches diastasées non stérilisées renfermant toutes leurs vitamines.

Propriétés. — Elles réduisent au minimum le volume alimentaire à absorber.

Grâce à une prédigestion s'opérant pendant la cuisson, elles permettent l'obtention de bouillies très concentrées possédant une agréable fluidité. Elles assurent une alimentation rationnelle, sans aucun surmenage des organes digestifs.

Les repas de Diases, prédigérés pendant leur cuisson, conviennent aux organismes les plus délicats.

Variétés :

Diase Cacao : Diase de gourmandise pour déjeuners et goûters.

Diase Céréale : Donne des bouillies très fluides pour l'alimentation au biberon. Convient à tous les estomacs délicats. Ne contenant aucun condiment, elle est naturellement fade et doit être accommodée selon le goût du consommateur.

Diase légumineuse : Permet de préparer instantanément des potages excellents dont la condimentation peut être complétée suivant le goût de chacun.

Boîtes
de
300 grs net,
1 kilo
net,
et
3 kilos
net.

Indications :

Bébés : au moment du sevrage.

Enfants : pendant la période de croissance.

Adultes : tous régimes.

Mode d'emploi. — Délayer parfaitement et à froid 3 fortes cuillerées à soupe (soit 50 grammes environ) de Diase dans environ 10 à 15 cuillerées à soupe d'eau, de lait, de bouillon de légumes ou de viande. Chauffer à *feu très doux*, en remuant ; la préparation s'épaissit d'abord, puis s'éclaircit : elle est prête alors à recevoir tous les condiments (sel, beurre, épices) qu'on désire lui ajouter.

PROGIL, Sté An. au capital de 50.000.000 fr.

10, quai de Serin — LYON (IV^e).

(Tél. : Burdeau 85-31.)

Laboratoires à RIS-ORANGIS (S.-et-O.).

DIASTOGÈNE DEHAUSSY

Reconstituant Intensif.

Permet au convalescent, au déprimé, au surmené de récupérer la plénitude de ses moyens.

Diastogène simple. — Elixir (légèrement alcoolisé). Arsine, stimulant de la nutrition. Nucléine manganésifère, catalyseur nutritif, excitant des centres hématopoïétiques.

Kola fraîche stabilisée, toni-cardiaque, éliminateur des toxines et des déchets de la nutrition.

Adultes : 2 verres à liqueur par jour, pur ou dans un peu d'eau.

Indications. — Reconstituant type, le plus agréable.

Prix : 18 fr. 20.

Diastogène F. (Cachets).

Complexe Diastogène (Arsines, nucléine manganésifère, kola fraîche) plus Fenugrec *total*, inclus en un comprimé glutinisé parfaitement toléré.

Adultes : 1 à 3 cachets par jour, *au milieu des repas*.

Indications. — Convalescences, asthénies avec amaigrissement, diabète.

Il existe une forme Diastogène F cachet, non arsénié.

Prix : 18 fr. 80.

Diastogène granulé hépato-splénique.

Application pratique de la méthode de Whipple : extrait titré de foie frais et de rate fraîche, caséinate ferro-cuivrique associés au complexe Diastogène (non arsénié) renforcé par addition de phosphore organique extrait des graines de céréales.

Adultes : 4 cuill. à café par jour.

Enfants : 10 ans : 2 à 3 cuill. à café par jour ; 5 ans : 1 à 2 cuill. à café ; 1 an : 1/2 à 1 cuill. à café par jour.

Indications. — Anémies et Convalescence de l'enfant. Anorexie, Asthénies.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

DIASTO-PEPSINE RICHEPIN

Pilules et Elixir (très agréable).

Contiennent toutes les vitamines
et hormones des glandes fraîches.

L'activité des ferments digestifs : *Pepsine*, *Pancréatine* et *Diastase* dépend de la façon dont ils ont été recueillis et préparés. Aussitôt isolés par les procédés décrits ailleurs à basse température, ils sont incorporés aux excipients spéciaux, pilule ou élixir (très agréable). Leur puissance active est ainsi bien supérieure aux agents habituels du commerce.

La digestion stomacale et intestinale est donc complète : viandes, graisse, légumes, féculents, etc. L'assimilation est totale : c'est le repos du foie, du pancréas et de tous les organes digestifs souvent déficients, surtout avec l'âge et la fatigue.

Doses. — 2 ou 3 pilules après les repas ou 1 verre à liqueur d'éllixir. Pour les enfants, faire fondre 1 pilule dans du lait ou 1 cuillerée à café d'éllixir dans de l'eau sucrée.

Prix : Taxe d'état comprise.

Elixir : 18 francs. — *Pilules* : 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

DIATHERMIE

A. Diathermie médicale.

- 1° Troubles de la circulation artérielle et veineuse ;
- 2° Douleurs thoraciques d'origine pleurale et douleurs abdominales : gastralgies, entéro-colite, épiploïtes et périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, Affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux ;
- 3° Rhumatismes chroniques, Arthralgies et Myalgies ;
- 4° Névralgies et Névrites ;
- 5° Trophicité des tissus : paralysies, poliomyélite.

B. Diathermie chirurgicale. Diathermo-coagulation.

Utilisée pour la destruction de nombreuses lésions en Dermatologie, en Gynécologie, en Oto-rhino-laryngologie, en Ophthalmologie, ainsi qu'en Chirurgie générale.

Appareils en Location sur Ordonnance médicale.

Livraison rapide par :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV^e).

(Tél. : Littré 90-13.)

DIATHÈS

« MÉTÈRE »

Indications. — Contre toutes les manifestations de l'Arthritisme. Rhumatisme. Asthme. Rhume des foies. Goutte. Fibromes. Obésités. Troubles hépatiques et circulatoires. Eczémas.

Composition. — Solution huileuse colloïdale de Manganèse et de Fer contenant 0,13 mgr. de Manganèse et 0,03 mgr. de Fer par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. 2 injections par semaine pendant 5 semaines. Prendre en même temps 2 capsules par jour de Diathès-capsules par la bouche. Au bout de 5 semaines arrêter quelques jours et refaire une nouvelle série s'il est nécessaire. Associer une opothérapie appropriée à chaque cas.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

DIATOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Pulvis Diatomei lavée, stérilisée, calibrée, anhydre, Talcum.

Propriétés. — Le *Diatol*, pâte neutre très poreuse active le « restitutio ad integrum ».

Indications. — Eczémas suintants, prurigineux des membres inférieurs pré ou post-ulcéreux. Toutes dermatoses irritées.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther, appliquer en couche de un demi-centimètre d'épaisseur sur toute la surface des lésions. Le pansement doit être fait en évitant l'emploi du coton.

Demander les brochures
des Docteurs P. et R. BOURGGRAFF :
Ulcères Variqueux et Eczéma pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATIOIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

DIBROMOTYROSINE « ROCHE »

Composition. — Dérivé bromé de la tyrosine dont l'action sédative complète et consolide l'action en quelque sorte spécifique de la diiodotyrosine. Ne provoque aux doses thérapeutiques aucun phénomène de bromisme.

Indications thérapeutiques. — Renforce la diiodotyrosine contre les symptômes nerveux du Basedow. Remplace les bromures dans toutes leurs indications.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par jour.
Tube de 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-79.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 91-10.)

DICALIODE

Complexe colloïdal d'iode.

4 p. 100 d'iode total.

Dont 3 p. 100 d'iode libre.

Avantages :

- 1° *Toxicité abaissée* : des lapins de 2 kg. tolèrent 20 cc. par jour.
- 2° *Causticité supprimée*, car l'iode est adsorbé. Phénomène comparable à l'action du charbon sur les toxines intestinales.
- 3° *Activité augmentée* du fait de la division colloïdale.

Le Dicaliode est l'iodique des *petites doses*, parce que *très actif*.

Le Dicaliode est l'iodique des *hautes doses*, parce que très actif et *facilement toléré*.

Mode d'emploi. — Se prescrit en cc. ou par gouttes dans du lait, avant ou pendant les repas. 1 cc. = XXXVI gouttes.

Indications. — Dicaliode à petites doses : 1 à 2 cc. par jour. Goître. Enfants : perte d'appétit, ganglions, grosses amygdales, rachitisme.

Dicaliode à doses moyennes : 2 à 5 cc. par jour. *Hypertension*. Affections du cœur et des vaisseaux, de l'appareil respiratoire (bronchite chronique, asthme, emphysème, coqueluche, tuberculose). Affections de la peau : eczéma, psoriasis.

Dicaliode à hautes doses : 5 à 10 cc. et plus par jour. Tuberculoses localisées, adénites, ostéites, iritis, rhumatisme chronique, mycoses, septicémies, syphilis tertiaire.

Prix : 20 fr. 15.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, pl. V.-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

Bruxelles :

LE MARINEL, pharmacien

4, Avenue Orban.

DICODÉINE LAFRAN

Indications. — Toux rebelles et toutes affections broncho-pulmonaires. Efficacité rapide.

Composition. — Codéinéméthylcodéine : 0,013 ; Aconit : 0,01 ; Belladone : 0,02 ; Terpène : 0,055 ; Benzoate de soude : 0,08 ; Glycyrrhizine et Excipient : Q. S. p. 1 comprimé dragéifié.

Posologie. — Doses pour 24 heures :

Adultes : de 5 à 6 dragées.

Enfants : de 10 à 15 ans : 4 dragées ; 5 à 10 ans : 2 à 3 dragées. A prendre entre les repas avec un peu d'eau ou une tisane.

On peut également les sucer.

Littérature et Échantillons aux Docteurs seulement.

Prix : 15 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 36-78.)

DIDIAL

Diallylmalonylurée et éthylmorphine.

CIBA

HYPNOTIQUE, ANALGÉSIQUE.

N'est pas au tableau B.

Un comprimé contient : Diallylmalonylurée, 0 gr. 11 ; Éthylmorphine, 0 gr. 015.

Pouvoir narcotique prononcé et action nettement analgésique, d'où indication lorsque l'insomnie est sous la dépendance de la douleur ou de l'anxiété.

Indications. — Toutes les insomnies relevant de la douleur ou de l'anxiété : Algies, Traumatismes, Tabes, Cancer. Agitation maniaque, Excitation psychique. Calmant pré et post-anesthésique.

Doses. — 1 à 3 comprimés par jour, à prendre le soir dans les cas d'insomnie due à la douleur ; par doses réfractées, aux repas, dans les autres cas.

Formuler. — Tube de 12 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIEMENAL

Indications. — Paludisme chronique, Paludisme, Fièvre bilieuse hémoglobinurique.

Composition. — Fer, Manganèse colloïdaux, obtenus par électrolyse.

Forme. — Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 5 ampoules.

Mode d'emploi. — Dans le Paludisme et la fièvre bilieuse hémoglobinurique :

Injection hypodermique ou intraveineuse d'une ampoule de 10 cc. toutes les 12 heures environ.

Dans le Paludisme chronique : Commencer le traitement par : 12 injections à raison de une par jour ;

Le continuer par : 6 injections à raison de une tous les 2 jours ;

Le terminer par : 6 injections à raison de une tous les 4 jours.

En se conformant à la posologie ci-dessus, on peut être assuré de voir les accès disparaître complètement chez le paludéen chronique, devenu le plus souvent insensible à l'action de la quinine.

Prix de la boîte de 5 ampoules : 17 fr. 35 (en France).

Laboratoire J. DEPRUNEAUX

23, rue du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).
(Tél. : Tremblay 12-04.)

DIÉNOL

Indications. — Broncho-pneumonie, Rougeole, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Infections septicémiques et tous états toxi-infectieux médicaux et chirurgicaux.

Composition. — Métaux colloïdaux, FeMn, obtenus par électrolyse.

Forme :

1° *Pour injections* : Ampoules isotoniques de 10 cc. en boîtes de 5 ampoules ;

2° *Pour emploi par voie rectale* (V. R.) : Tubes-doses de 40 cc. en boîtes de 6 tubes, ou par tube isolé.

Mode d'emploi :

En injection hypodermique (indolente) ou intraveineuse : une ampoule toutes les 12 heures environ.

Par la voie rectale, on donnera par 24 heures :

Adultes et enfants au-dessus de 5 ans : 3 tubes-doses (à 6 heures d'intervalle environ).

Enfants de 2 à 5 ans : 2 tubes-doses (à 10 heures d'intervalle environ).

Enfants de 0 à 2 ans : 1 tube-dose.

Pour les nourrissons jusqu'à 6 mois, le tube à donner dans les 24 heures sera administré en deux fois (1/2 tube chaque fois) à 7 ou 8 heures d'intervalle, en se servant d'une poire.

Il n'y a absolument aucun inconvénient à augmenter ces quantités. La réduction des doses, suivant l'âge, est uniquement indiquée pour ne pas administrer un volume de liquide disproportionné avec la capacité intestinale du jeune malade.

Prix de la boîte de 5 ampoules injectables : 15 fr. 30

Prix de la boîte de 6 tubes-doses (voie rectale) : 29 fr. 70

Prix de la boîte de 1 tube isolé (voie rectale) : 4 fr. 80

Prix d'un nécessaire d'accessoires (voie rectale) : 6 fr. »

J. DEPRUNEAUX

Pharmacien de 1^{re} classe

23, r. du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).
(Tél. : Tremblay 12-04.)

DIETOFCO

Lactosérum de lait OFCO, désalbuminé, stérile.

Flacons de 500 cc. de Lactosérum, désalbuminé, stérile, préparé à partir de lait OFCO provenant d'étables soumises au Contrôle officiel (décret du 15 novembre 1927), exempt de toxine tuberculeuse.

Indications. — La diète des maladies infectieuses, Cures d'amaigrissement et de désintoxication, Urémie, toutes affections où l'on doit assurer la diurèse, Opérés.

Posologie. — Dans tous les cas où la diète est prescrite, prendre environ 40 cc. (1/2 verre à bordeaux) de Dietofco toutes les heures ou 80 cc. (1 verre à bordeaux) toutes les 2 heures. Les doses peuvent être doublées ou triplées dans certains cas.

Prix : Le flacon de 500 cc., pour la diète d'une journée: 17 fr. 35.

M. GUILBAUD, Pharmacien

25, avenue Michelet, SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 04-31.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1833.

DIFOLLISTÉROL

Benzoate de di-hydro-folliculine obtenu par synthèse.

Indications. — *Chez la femme :*

Retard du développement de l'appareil génital ; Certaines stérilités ; Dysménorrhées, hyperménorrhées, aménorrhées ; Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.

Dans les deux sexes : Artérites oblitérantes.

Présentations. — *En solution huileuse :*

Boîte de 2 ampoules de 1 cc. dosées à 10 000 unités intern. benz. Prix : 27 fr. 55.

Boîte de 1 ampoule de 1 cc. dosée à 50 000 unités intern. benz. Prix : 43 fr. 45.

En comprimés : mêmes indications que solution injectable.

Posologie. — En injections intramusculaires.

Doses à fixer par le médecin : faire les injections dans la première moitié de la période intermenstruelle.

DIFOLLISTÉROL (Comprimés).

Laboratoire pour la Diffusion des Produits synthétiques,

Léonce GODEAU, Pharmacien,

73, rue Dutot — PARIS (XV^e).

DIGALÈNE « ROCHE »

Digitale totale injectable.

Composition. — Tous les glucosides de la feuille de digitale pourpre titrée d'après les prescriptions du Comité d'Hygiène de la S. D. N.

Propriétés. — Toute l'activité thérapeutique des préparations digitaliques.

Indications. — Toutes les indications des préparations digitaliques chaque fois que le cœur faiblit, même chez les enfants.

Posologie et modes d'emploi. — *Doses faibles* ou d'entretien cardiotonique : *Adultes* : XX gouttes. *Enfants* : I à V gouttes.

Doses moyennes ou sédatives : *Adultes* : XX à XL gouttes ou 1 à 2 ampoules (voie intramusculaire). *Enfants* : V, X à XV gouttes.

Doses fortes ou antiasystoliques : *Adultes* : LX à CLXXX gouttes, 3 à 6 ampoules (intramusculaires ou endoveineuses). *Enfants* : V à XX gouttes et même 1 à 2 ampoules (cas d'urgence).

Ampoules (boîte de 6) ; solution (flacon de 15 cm³.).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-9 (ampoules), 504-11 (solution).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

DIGASTRINE

(Cachets)

Composition. — Benzoate de naphthol, Pepsine, Charbon spécial, Poudre de belladone stabilisée.

Mode d'action. — Sédatif, absorbant, antiseptique ; stimulant de la sécrétion gastrique, antispasmodique.

Indications. — Aérophagie, dyspepsies, embarras gastrique, fermentations intestinales, entérocite, crampes de l'estomac, spasmes du cardia, de l'estomac, du pylore. Entérospasmes, constipation spasmodique.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cachets à la fin de chaque repas. Prix : 15 francs.

Laboratoire de la DIGASTRINE

M. DELORME, pharmacien

11, r. St-Agricol, AVIGNON (Vaucluse) (Tél. : 1-00.)

DIGÉROL

Thérapeutique interne nouvelle et unique, d'action immédiate.

Forme. — Gouttes.

Formule. — Sel marin, 7 gr. ; Chlorure de zinc purifié, 4 gr. ; Formol, 0 gr. 50 ; Acide chlorhydrique pur, 0 gr. 40 ; Glycérine, 3 gr. ; Eau Q. S., 100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Fermentations gastro-intestinales, Gastrites, Diarrhée verte des nourrissons, Entérite, Hyperchlorhydrie.

Posologie. — VIII gouttes *de suite* après le repas, dans un demi-verre d'eau (*dès la dernière bouchée absorbée*).

Enfants : 4 gouttes dans deux tétées par jour.

Résultats immédiats. Pas de contre-indications.

Laboratoire LADIV

Pharmacie des Archives,

A. VIDAL, pharmacien,

36, rue des Archives — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arc. 95-66.)

Chèques postaux Paris 2229-29.

DIGESTONIC

Composition. — Citrate de soude, Phosphate de Bismuth, Fluorure d'Ammonium, Macération hydroglycérique de *Sedum telephum* et de *Gonolobus condurango*.

Forme. — Elixir.

Propriétés thérapeutiques. — Action sédative s'exerçant sur les terminaisons nerveuses de la muqueuse gastrique. Calme le spasme, Action anti-émétique. Pouvoir antiseptique s'opposant aux fermentations. Supprime la constipation.

Indications. — Dyspepsies hypersthéniques, hyperchlorhydrie, spasme du pylore, irritations gastriques douloureuses, motrices et sécrétoires, vomissements du début de l'ulcus, fermentations gastriques par stase, constipation.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de tisane. Répéter la dose jusqu'à cessation de la douleur. Adjonction d'un régime le cas échéant.

Prix : 19 francs le flacon de 80 cc. environ.

Laboratoire des Produits SCIENTIA.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

DIGEX

Antigastralgique, réalisant la saturation totale de l'acidité stomacale.

Composition. — Carbonates de chaux, soude et magnésie, Kaolin pur lavé, Magnésie hydratée, Phosphate tricalcique, crème de tartre, *peroxyde de magnésie*, condurango, fenouil, acide acétyl-salicylique. Sucre de lait.

Forme. — Paquets.

Indications. — Dyspepsies, aigreurs, brûlures d'estomac, ballonnements, nausées, vertiges, crampes, ulcères gastriques et duodénaux.

Doses :

Un à deux paquets après les repas. Durée du traitement : quinze jours.

Prix : 16 fr. 50

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 403-7.

Laboratoire REIVILO

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot. 04-71).

DIGIBAÏNE

Complexe tonicardiaque.
Association digitaline-ouabaïne.

Présentation et posologie. — 1° *Voie buccale.* Solution glycéro-alcoolique titrée de telle sorte que XV gouttes = 1/10 millig. Digitaline crist. pure + 2/10 millig. ouabaïne crist. pure.

Doses faibles (cures prolongées d'entretien)
X à XV gouttes par jour.

Doses moyennes : XXX gouttes par jour en 2 fois (pendant 6 à 7 jours).

Doses fortes : XL gouttes par jour en 3 fois (pendant 4 ou 5 jours).

2° *Voie intraveineuse* (méthode exceptionnelle). Boîte de 8 ampoules titrées à XV gouttes de solution par cc. (1 cc. par injection et par jour pendant 6 à 7 jours).

Indications. — En général toutes celles des préparations digitaliques. Action plus sûre, plus rapide et plus durable. Tolérance parfaite. Agit là où tous les autres tonicardiaques ont échoué.

Remarques importantes. — La Digibaïne est la première association digitaline-ouabaïne préconisée en thérapeutique cardiaque (C. R. Soc. méd. hôpitaux de Paris ; 26 janvier 1923).

La Digibaïne est préparée *uniquement* par les Laboratoires Deglaude.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

(Cardibaïne,

Spasmosédine, Théoxanthine, etc.)

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

DIGICARDINE DIGICARDINE QUININÉE

Chaque pilule de *Digicardine* contient :

Poudre de feuilles de digitale stabilisée. 2 cgr. 5
Scille 3 cgr.
Théobromine chimiquement pure..... 5 cgr.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Insuffisances cardio-rénales, Rétentions chlorurées ou azotées avec ou sans hypertension, Cardiopathies aiguës et chroniques, Retentissement cardiaque des maladies infectieuses.

Posologie. — *Dose asystolique*: 10 pilules par jour pendant 4 jours.

Dose hyposystolique: 2 à 4 pilules par jour pendant 10 jours.

Dose eusystolique: 1 ou 2 pilules par jour pendant 10 jours, une ou deux fois par mois.

Prix. — La boîte de 36 pilules : 16 fr. 50

Chaque pilule de *Digicardine quininée* contient :

Poudre de feuilles de digitale stabilisée.....	0 gr. 01	Extrait de belladone...	0 gr. 01
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 10	Arséniat de strychnine.	0 gr. 001
		Glycérophosphate de chaux.....	0 gr. 05

Indications. — Arythmies, Extrasystoles, Tachycardies, Eréthisme cardiaque, Palpitations.

Posologie. — 2 à 10 pilules par jour.

Prix. — La boîte de 36 pilules : 22 fr.

Laboratoires IMMUNOS, 8, avenue des Sources — NICE.

DIGIFOLINE

CIBA

PRÉPARATION DIGITALIQUE TOTALE.

Extrait digitalique contenant l'ensemble des glucosides cardioactifs de la feuille de digitale.

Stable, d'action constante, toujours bien tolérée.

Rigoureusement dosée.

Indications. — Celles de la digitaline et de la digitale, par voie buccale, hypodermique et intraveineuse. Plus spécialement lorsque le foie est gros (ampoules), et lorsqu'il y a lieu de stimuler la diurèse.

Posologie. — Celle de la poudre de feuille de digitale.

Présentation :

Comprimés de 10 cgr. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Ampoules de 1 cc. = 10 cgr. poudre de feuilles.

Formuler. — Tube de 25 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

DIGI-LANATINE OU LANATINE

Soluté au millièmo du Totum Digitalique de Digitalis Lanata.

Cinquante gouttes = Un milligramme = 1 cc.

Remplace avantageusement et plus sûrement la poudre et l'infusé de la feuille de Digitale.

Soluble dans l'eau, d'où élimination plus rapide et accumulation moindre.

Action rapide, Constante, Durable, Action physiologique constante et continuellement contrôlée, Ralentit, Renforce, Régularise le cœur, Provoque la diurèse, Réduit les œdèmes, Insuffisance cardiaque, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux, Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie :

Cardiotonique : V à X gouttes par 24 heures.

Sédatif : X à XX gouttes par 24 heures.

Antiasystolique : jusqu'à C gouttes par 24 heures.

A haute dose : 2 mgr. par 24 heures (X gouttes toutes les heures).

Diurétique puissant.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cc. Prix : 21 fr. 20.

Ampoules au 1/10 et au 1/4 de milligramme intraveineuse et intramusculaire.

L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE.

8, rue Favart — PARIS (2°). (Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGILANIDE

Totum digitalique cristallisé.

Complexe cristallisé isomorphe des glucosides initiaux (A, B, C) du *Digitalis lanata*.

Avantages. — Toutes les propriétés d'une macération de feuilles fraîches de digitale qui serait parfaitement préparée, toujours identique, d'activité constante.

Le Digilanide est remarquablement toléré par la voie gastrique, les voies intraveineuse, intramusculaire et rectale. Son action est plus rapide que celle des autres digitaliques et ses effets diurétiques plus nets. Sa posologie est plus maniable, son élimination plus facile en cas de surdosage.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiaques.

Dosage. — 1 mgr. = 400 unités grenouille = 3 unités chat.

Formes. — *Gouttes* : 1 cc. = un demi-milligr. = XL gouttes du compte-gouttes normal. *Dragées* dosées à un quart de milligr. *Suppositoires* dosés à un demi-milligr. *Ampoules* de 2 et de 4 cc. : 1 cc. = 0 mgr. 2.

Posologie :

Voie gastrique. — Solution. *Dose forte* : 3/4 de cc. ou XXX gouttes, 3 fois par jour pendant 3 à 4 jours. Reprendre si nécessaire au bout de 8 à 10 jours.

Dose moyenne : 1/2 cc. ou XX gouttes, 3 fois par jour pendant 8 à 10 jours.

Dose faible (dose d'entretien cardiotonique) : 1/4 de cc. ou X gouttes, 3 fois par jour.

Dragées : dosées chacune à 1/4 de milligr. — 2 dragées correspondent à XL gouttes ou 1 cc. de la solution gastrique.

Dose moyenne : une dragée, 3 fois par jour.

Voie rectale. — *Suppositoires* : un à deux par jour.

Voie veineuse. — Une *ampoule* de 4 cc. par jour, pendant 2 à 3 jours. A renouveler, s'il y a lieu, après 5 à 8 jours ou remplacer par l'administration gastrique ou rectale.

Voie intramusculaire. — Une *ampoule* de 2 cc., 1 à 2 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

DIGI-MIAL-BAINE

Composition :

Cinquante gouttes contiennent :

1/3 de mgr. de Digitaline cristallisée ;

2/3 de mgr. de Ouabaïne cristallisée.

Ralentit, renforce, régularise le Cœur. Provoque la Diurèse. Réduit les Œdèmes. Insuffisance cardiaque. Endocardite-Myocardite. Péricardite. Soutient admirablement le Cœur dans tous les états infectieux. Médication spécifique du Cœur gauche.

Posologie.

Cardiotonique : V à X gouttes par jour.

Sédatif : X à XV gouttes par jour.

Anti-asystolique : jusqu'à LX gouttes dans les 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cc. Prix : 21 fr. 20.

L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGISTABILINE

Gouttes - Pilules au 1/10^e mg. et au 1/4 mg.

Ne peut être prise que sur prescription et sous contrôle médical.

Indications. — Déficiences du myocarde, Arythmie complète, Hyposystolie et asystolie, Asthénie des pyrexies infectieuses générales et pulmonaires.

Composition. — La *Digistabiline* en « gouttes » et en « pilules » renferme, non altéré, le complexe glucosidique de la digitale fraîche.

Mode d'emploi. — La préparation liquide est logée en compte-gouttes. Elle peut être facilement dosée. — VII gouttes de *Digistabiline* correspondent à 1/10 de gr. de feuilles de digitale fraîches, ou 1/10 de milligr. de digitaline crist.

Pharmacie Centrale de Belgique

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

DIGITALINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Toni-cardiaque, régularise et stimule les contractions cardiaques, diurétique cardio-vasculaire.

Indications. — Insuffisance aortique, rétrécissement mitral, affections pulmonaires, œdème, hydropisie.

Formes. — Granules roses au 1/10^e de milligr.; flacons de 50.

Solution au 1/1000^e, flacons de 10 et 5 cc.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 18-67.)

DIGITALINE-MIALHE

Soluté au millième de Digitaline Cristallisée.
Cinquante gouttes = 1 milligramme.
Supériorité incontestable sur toutes les préparations de Digitalis Purpurea.

Action rapide, Constante, Durable.

Pureté chimique, Action physiologique constante et continuellement contrôlée. Effets thérapeutiques toujours identiques à eux-mêmes (employée dans les hôpitaux depuis 1889).

Préparée uniquement par les Laboratoires Mialhe.
Ralentit, renforce, régularise le cœur. Provoque la diurèse. Réduit les œdèmes, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, péricardite. Soutient admirablement le cœur dans tous les états infectieux.
Médication spécifique du cœur gauche.

Doses :

Cardiotonique : III à IV gouttes par jour.

Sédatif : V à X gouttes par jour.

Antiasystolique : jusqu'à L gouttes dans les 24 heures.
Conservation indéfinie.

Flacon de 12 cmc. Prix : 21 fr. 20.

Ampoules au 1/10 de milligramme.

L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2^e). (Tél. : Richelieu 35-10.)

DIGITALINE NATIVELLE

Principe actif pur, cristallisé et invariable de la digitale pourprée.

Prix Orfila (1872), Prix Desportes (1904), de l'Académie de Médecine de Paris.

Propriétés. — Ralentit, renforce et régularise le cœur, provoque la diurèse et réduit les œdèmes.

Indications. — Insuffisances cardiaques, notamment quand le pouls est rapide et irrégulier. — Cardiopathies valvulaires — Myocardites — Asthénie cardiaque (maladies infectieuses et opérations) — Arythmies — Fibrillation et Flutter auriculaires.

Formes. — *Solution* au 1/1.000 (50 gouttes = 1 mg.). — *Granules* au 1/10 de mg. — *Ampoules* au 1/4 de mg. (intramusculaires) et au 1/5 de mg. (intraveineuses).

Doses.

Per os : Dose faible (d'entretien) : 1/10 de mg. par jour.

Dose moyenne (de soutien) : 1 mg. en 5 jours.

Dose forte (d'attaque) : 1 mg. 1/2 à 3 mg. en 10 jours (jusqu'à saturation).

Injectons : 1 cc. d'une ampoule matin et soir le premier jour, puis 1 cc. d'une ampoule par jour les 3 ou 4 jours suivants.

Prix.

Ampoules : 20 fr.

Granules : 14 fr. 90

Solution : 20 fr.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

DI-iodo-TYROSINE BYLA

Composition. — Di-Iodo-tyrosine = acide aminé iodé contenant 58 p. 100 de son poids d'iode organique.

Indications thérapeutiques. — Tous états d'hyperthyroïdisme, notamment maladie de Basedow et certains troubles de la ménopause (bouffées de chaleur, métrorragies, etc...) liés à une suractivité de la thyroïde.

Nous attirons également l'attention sur la **Di-Bromo-Tyrosine Byla** (acide aminé bromé, contenant 47 p. 100 de son poids de brome organique) qui remplace avantageusement, parce que plus assimilable, les bromures dans toutes leurs indications. La **Di-Bromo-Tyrosine Byla** s'associe à la **Di-Iodo-Tyrosine Byla** contre les troubles nerveux du Basedow.

Présentation, Posologie. — Comprimés de Di-Iodo-Tyrosine Byla à 0,10. Comprimés de Di-Bromo-Tyrosine Byla à 0,25. Boîtes de 20 comprimés ; un à trois comprimés par jour.

Prix : 22 fr. 30.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée
Concessionnaires des Marques des
ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

DIIODOTYROSINE « ROCHE »

Médicament biochimique synthétique
de la maladie de Basedow.

Médicament stable possédant toutes les propriétés essentielles et directement utiles de l'iode inorganique (solution de Lugol) et n'offrant aucun risque d'iodisme.

Indications thérapeutiques. — Tous les états hyperthyroïdiens ; tous les symptômes basedowiens.

Posologie. — 1 à 3 comprimés dosés à 0 g. 10 par jour. (Tube de 20 comprimés.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-59.

Produits **F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie**
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

DIMITENSYL**Composition :**

Sulf. n. Spartéine	0 gr. 015
Scille.....	0 gr. 02
Peptone iodée à 10 p. 100.....	0 gr. 05
Silicate de sodium	0 gr. 05
Extrait de Gui	0 gr. 03
— de Cratægus.....	0 gr. 05
— de Convallaria	0 gr. 02
— d'OLIVIER	0 gr. 05

Par comprimé.

Indications. — Hypotenseur, Diurétique, Régulateur des fonctions hépatiques et intestinales.

Posologie. — 3 à 6 comprimés par jour, avant les repas, dans un peu d'eau ou de tisane (ortie blanche).

Prix : Le tube (pour 15 jours de traitement) : 20 fr. 40.
(Taxe armement comprise).

Laboratoires ETIENNE

19, avenue Secrétan — PARIS.

(Tél. : Nord 89-34.)

DINITRA

Animateur des combustions cellulaires.

Dinitrophényl-lysidine pure.

Moins toxique que la thyroxine.

Plus actif que l'opothérapie.

Permet des traitements prolongés.

Dinitra active l'oxydation des réserves, élève le métabolisme basal, favorise l'élimination des déchets organiques, sans action secondaire sur aucun organe.

Communication à l'Académie de Médecine: Professeur Pouchet (18 février 1936.)

Thèses: E. Rivierez, « Contribution à l'étude de l'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4. » (Paris 1935).

P. Rothea, « L'alpha-dinitrophénol 1. 2. 4, accélérateur des combustibles cellulaires » (Paris 1935).

Jacques Bell, « La thérapeutique dinitrée ». (Paris 1937).

OBÉSITÉ

Dinitra est le médicament des obésités d'origine *exogène* (sédentarité, polyphagie), *Opo-Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine *endogène* (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause, syndrome adiposo-génital). Voir **Opo-Dinitra**.

Posologie classique. — 1 comprimé par 10 kilos de poids (dose à atteindre progressivement).

Dose maxima : 10 comprimés par jour.

RALENTISSEMENTS DE LA NUTRITION

ARTHRITISME

Hypothermies. Hyposphyxies. États dépressifs.

A faible dose : 2 à 4 comprimés par jour.

(Dose non amaigrissante).

TOLÉRANCE REMARQUABLE

Dinitra respecte le cœur, le foie et les reins.

Prudence chez les albuminuriques et diabétiques.

Comprimés dosés à 0 gr. 036. (B^{tes} de 60 et 300 comp.)

Ampoules injectables de 5 cc. (1/2 cc. = 1 comprimé).

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, B^d de La Tour-Maubourg. PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

DIOCAMPHINE BORNE

Association synergique *Dionine Borne* (codéthyline)
Camphre.

**Sédatif analgésique tonicardiaque
à prédominance sympathique**

Dyspnée, Toux rebelles, Angor, Eréthisme cardiaque, Spasmes, Vomissements incoercibles, Algies, Distonies douloureuses vago-sympathiques, Insomnies, Anxiété, Agitation.

Formes :

Diocamphine Gouttes (X gouttes = 1 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Comprimés (1 comprimé = 1 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Suppositoires (1 suppositoire = 3 centigr. *Dionine Borne*) ;

Diocamphine Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 2 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble) ;

Diocamphine chirurgicale, Ampoules de 2 cc. (1 ampoule = 4 centigr. *Dionine Borne*, 20 centigr. Camphre soluble ; 2/10 mmgr. Scopolamine HBr.)

Doses :

Faibles : X gouttes, 1 comprimé, 1/2 ampoule.

Moyennes : XX gouttes, 2 comprimés, 1 ampoule, 1 suppositoire.

Fortes : XL Gouttes, 4 comprimés, 2 ampoules ou, mieux, 1 ampoule chirurgicale concentr. double.

Une, deux ou trois fois par jour si besoin.

Médicaments enregistrés au Laboratoire national de Contrôle.

Laboratoires M. BORNE

Fournisseurs des Hôpitaux
et des Ministères des Colonies et de la Marine.

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

DIONOL (SIROP)

Composition. — Codéthylène (1 cgr. par 5 cc. de Sirop Dionol). Hydrolat de laurier-cerise, Benzoate de soude, Sève de Pin d'Arcachon.

Propriétés. — Spécifique de la toux. Sédatif, Hypnotique.

Indications. — Grippe, Bronchite, Congestion pulmonaire, Pneumonie, Asthme, Emphysème, Coqueluche, Phtisie, Tuberculose laryngée, Insomnie.

Posologie. — *Ne se prend que par cuillerées à café.*
1 cuillerée à café = 1 centigramme de codéthylène.

Adultes :

Toux : 4 à 8 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnies : 2 à 3 cuillerées à café au coucher.

Enfants :

Toux : 2 à 4 cuillerées à café à répartir dans la journée.

Insomnie : 1 à 2 cuillerées à café au coucher.

Présentation et prix : Sirop, 1 flacon de 125 cc. : 16 fr. 80 pour un traitement de 5 à 8 jours.

Laboratoires FLEURY. — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie,

Lauréat du Ministère de la Santé publique.

DIORINE

(Granulés.)

Présentation. — En boîte métal (21 fr. 40).

Principes actifs. — Pipérazine, Benzoate de soude, Carbonate de lithium, Urotropine, Bicarbonate de soude, Acide tartrique.

Indications. — Dissolvant de l'acide urique, antiseptique urinaire et biliaire, arthritisme, obésité, rhumatismes goutteux.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées par jour.
Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-10.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

DIOSÉINE PRUNIER

Comprimés Fluo-Nitrités renfermant les Glycérophosphate et Formiate Sodiques associés à la Caféine.

Mode de présentation. — Présentée sous forme de pastilles comprimées pesant chacune 0 gr. 25.

Mode d'action. — La « Dioséine Prunier » diminue la tension artérielle et régularise la circulation du sang.

Indications. — Artériosclérose, Dilatations veineuses, Menstruations difficiles, Troubles de la ménopause.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, à prendre en deux fois, matin et soir, en les accompagnant d'une gorgée de liquide.

Prix en France : 13 fr. 85 le flacon de 75 comprimés.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

DISMINE FAVROT

Capsules glutinisées — Granulé.

Composition. — Capsules renfermant la totalité des principes actifs, glucosides et alcaloïdes retirés par un procédé spécial du BUCHU (*Barosma crenata*) } \overline{aa} 0 gr, 05 et Salicylate de Phényle.

Propriétés et indications thérapeutiques. — *Antiseptique urinaire, décongestif, sédatif, diurétique.*

Indiquée dans toutes les affections pyogènes et douloureuses de l'appareil urinaire : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyélites, Pyélo-néphrites, Coliques néphrétiques.

La Dismine Favrot n'irrite ni l'intestin, ni les reins et ne cause pas d'éruption.

MODE D'EMPLOI

Forme capsule. — Prescrite à la dose de 6 à 9 capsules par jour prises dans une gorgée d'eau à raison de 3 au lever, 3 au déjeuner et 3 au coucher.

Forme granulé. — De préférence avant les repas, prendre 3 à 4 cuillerées à café par jour, et absorber ensuite un peu d'eau.

La Dismine Favrot a été expérimentée avec succès dans les hôpitaux.

Littérature et Échantillons :

Laboratoire Docteur H. FERRÉ

L. MOREAU, Pharmacien.

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

DISONYL

Composition. — Extrait pancréatique désinsuliné.
Phényl-éthyl-malonylurée. Trinitrine.

Propriétés. — Médication sédatrice et régulatrice
du système neuro-végétatif.

Indications. — Troubles fonctionnels cardio-vas-
culaires : Tachycardies, Extrasystoles, Algies
cardiothoraciques, Palpitations, Dystonies neu-
rovégétatives, Anxiétés, Insomnies nerveuses,
Vertiges, Aérophagies, Céphalées.

Forme. — Boîte de 60 dragées pour un traitement
de 10 à 20 jours.

Posologie. — 2 à 6 dragées par jour à prendre
1/4 d'heure avant les repas.

Prix : 19 fr. 10.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

DISTILBÈNE

Cœstrogène de synthèse beaucoup plus actif et beaucoup moins coûteux que la Folliculine.

Présentations et composition :

Distilbène 1 : dragées à un milligramme de di-éthylstilbœstrol.

Distilbène 5 : dragées à cinq milligrammes.

Indications et posologie :

Aménorrhée primitive-castration : 3 dragées de un milligramme *pro die*, 10 jours chaque mois, avant l'époque présumée des règles.

Aménorrhée secondaire-oligoménorrhée : 1 à 2 dragées de cinq milligrammes tous les deux jours pendant les 10 jours qui précèdent les règles.

Troubles de la ménopause et de la castration : Un milligramme par jour, 16 jours par mois, au besoin cinq milligrammes *pro die*.

Dysménorrhée : 1 à 3 dragées de un milligramme tous les deux jours pendant les 15 jours qui suivent les règles.

Stérilité : 1 à 2 dragées de un milligramme durant 3 semaines par mois et avant les règles.

Affections non génitales d'origine ovarienne : Un à trois milligrammes par jour jusqu'à l'obtention d'un résultat. La cure doit être interrompue pendant la période existante présumée des règles.

Prix :

Distilbène 1 : La boîte de 25 gradées.	18 fr.
— 1 : La boîte de 100 dragées.	50 fr.
— 5 : La boîte de 25 dragées.	40 fr.
— 5 : La boîte de 100 dragées.	100 fr.

Laboratoires M. BORNE

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 24-30.)

DITHIORAL

Dithiosalicylate de Magnésium R. A. L.

Propriétés. — Antirhumatismal, analgésique, antitoxinique.

En un seul composé chimiquement défini, réalise simultanément les médications *salicylée* et *soufrée*.

Le Dithioral est très bien supporté par l'estomac.

Pas d'intolérance, pas d'action secondaire.

Indications. — *Rhumatismes* aigus, chroniques, déformants.

Sciaticques, Lumbagos.

Névralgies : dentaires, faciales.

Migraines.

Mode d'emploi. — Dose usuelle : 1 à 2 comprimés par jour.

Dose d'attaque : 2 à 6 comprimés espacés dans la journée, accompagnés d'un peu de liquide.

Présentation. — Boîte de 20 comprimés à 0 gr. 50.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des E^{ts} **KUHLMANN**

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin, PARIS (XVI^e).

Service commercial :

15, rue de La Baume - PARIS (VIII^e). (Tél.: Élys. 99-51.)

DIURÈNE

(Extrait total d'*Adonis vernalis*.)

Formes. — Liquide (" Solution " et " Concentré ").
Pilules.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique cardiaque et diurétique azoturique. — Agit rapidement sans accumulation. — Non toxique. — Prolonge l'action digitalique. — Provoque une diurèse abondante.

Contient tous les principes actifs de l'*Adonis*.

Indications. — Arythmie complète. Insuffisances ventriculaires. — Scléroses artérielles. — Néphrites chroniques. — Œdèmes.

Posologie :

Diurène ordinaire : 2 à 6 cuill. à café	} par jour.
Diurène concentré : 1/2 à 2 cuill. à café	
Diurène pilules : 4 à 12 pilules	

Prix de vente au public :

Liquide : 18 fr. 85 ; pilules : 15 fr. 30.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél.: Opéra 43-79.)

DIURÉPHÉDRINE

Élixir.

Chl. Ephédrine naturelle.....	2 cgr.
Iodure de Sodium et Caféine.....	30 cgr.
Teinture Adonis Vernalis.....	X gouttes.
Par cuillerée à café.	

Action. — Antispasmodique, Bronchodilatateur, Bronchosécréteur, Toni-cardiaque, Diurétique.

Indications. — Traitement de fond, Asthme bronchique, Emphyseme, Asthme intriqué, Oppression, Bronchites chroniques, Catarrhe, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Suites de grippe, Insuffisance cardiaque, Urémie, Gazés, Toux.

Posologie. — Trois cuillerées à café par jour, matinée, après-midi, soir (à diluer dans un peu de liquide).

Voir également : **Garéphédrine**, **Éphédrasmine** et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 20 francs le flacon de 25 cuillerées à café environ.

Laboratoires F. SAUGIER

DOLE (Jura).

DIURÉTIQUE GMET

Composition. — Extrait *total*, liquide et sans alcool de la pulpe d'oignon cru.

Propriétés. — Diurétique puissant et jamais contre-indiqué. Aucune toxicité.

Indications. — Oliguries diverses : Pneumoniques, cardio-rénaux, brightiques, gripés, etc. Ascites et tous épanchements séreux. Rhumatismes.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un peu de liquide. Ces doses, en général suffisantes, peuvent être augmentées dans les grandes oliguries.

Le flacon de 210 gr. : 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

DIUROBROMINE

Composition :

Théobromine pure isotonisée et recristallisée.

Forme :

Cachets de 0 gr. 50.

Indications :

Toutes affections où l'on doit assurer la diurèse.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 16 fr.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.

DIUROCALCINE GROS

Association Calcium-Théobromine.

Indications. — Diurétique cardio-rénal.

Propriétés. — Pouvoir diurétique exalté.

Tonique et régulateur cardiaque. Innocuité et tolérance parfaites.

Posologie. — 3 à 5 comprimés par jour.

Prix : 12 fr. 50 les 24 comprimés à 0 gr. 50.

Durée moyenne : 8 jours.

DIUROCALCINE IODURÉE

Indications. — Sclérose rénale et tous troubles physiologiques survenant après la quarantaine.

Dose. — 3 à 5 comprimés par 24 heures.

Par comprimé : Iodure de Potassium, 0 gr. 10 associé à 0 gr. 50 de DIUROCALCINE.

Prix : 15 fr. 60 (durée moyenne : 8 jours).

Laboratoire GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 60-55.)

DIUROCARDINE

Composition. — Digitale titrée et stabilisée totale, Scille décathartiquée, Théobromine isotonisée, Buchu.

Propriétés. — Diurétique puissant et sûr. Affections cardiaques et rénales.

Forme. — *Cachets* : chaque cachet correspond à 1/20 de milligr. de *Digitaline cristallisée*.

Indications. — Insuffisances cardiaques, Cardiopathies, Tachycardie, Arythmie, Myocardite, Œdèmes, Albuminurie, Ascite, Urémie.

Doses. — Cas aigus : 2 à 5 cachets par 24 heures.

Dose cardiotonique. — 2 cachets par jour pendant 10 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Dose cardiotonique d'entretien. — 1 cachet tous les 2 jours, pendant 10 jours, cesser 10 jours et reprendre.

Boîte : 20 cachets. — Prix : 20 fr.

Compte chèques postaux : LYON n° 134-34.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON.

(Tél. : Parmentier 31-29.)

DIUROCYSTINE

Composition. — Benzo-camphorate de Lithine, Terpène, Castoreum.

Forme. — Cachets.

Indications. — Antisepsie des voies urinaires, Cystites aiguës ou chroniques, Urétrites, Catarrhe vésical, draine vessie et canal en fin de blennorrhagie. Aucune contre-indication.

Doses. — 2 à 6 cachets par jour selon les cas.

Boîte : 30 cachets. — Prix : 20 fr.

Laboratoires L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON

(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.

DIUROPHYLLINE

Diurétique rénal et Cardio-rénal.

Mieux toléré et plus actif que la *théobromine*:

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition :

Aminophylline (Vaso-dilatateur des artères du rein et toni-cardiaque)..... 0,10
Extrait stabilisé de Scille (Diurétique azoturique). 0,02

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique puissant et complet.

Diurétique aqueux.

Diurétique déchlorurant par action sur les vaisseaux du rein et par action toni-cardiaque.

Diurétique azoturique.

Indications. — Insuffisance rénale.

Néphrite chlorurémique et hydropigène; avec rétention du sel, œdème, ascite.

Néphrite azotémique avec élévation du taux de l'urée sanguine.

Oligurie des maladies infectieuses, des intoxications, des cardiopathies.

Posologie et prix. — 3 à 4 comprimés par jour, avant de manger ou entre les repas, Le tube : 22 fr. 45.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 52-73.)

DIUROPHYTE

Extrait total d'Orthosiphon stamineus.

Extrait total d'Humulus lupulus

(Houblon).

Préparés par un procédé spécial, présentés sous forme de solution concentrée sucrée et aromatisée à l'orange.

Propriétés. — Diurétique végétal atoxique, modificateur des éliminations, stimulant des fonctions hépatiques.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, diluées dans de l'eau, ou même plus suivant avis du médecin. A prendre au moment des repas.

Laboratoires Jacques LORTHIOIR

22, rue Perceval — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Ségur 79-58.)

DIVACSOL-AMICROS

Complexe Colloïdal Électrique,
Or, Argent, Cuivre, Manganèse, Étain, Bismuth, Magnésium,
en solution stable équimoléculaire.

Préparation anti-infectieuse polyvalente catalytique, associable à n'importe quel vaccin : action synergique colloïdothérapie + vaccinothérapie.

Deux formules :

1° **DIVACSOL AB** : Ampoules de 5 cc. Buvables (AB) :

Prescrire. — *Divacsol AB* : une boîte.

Posologie. — Une ampoule par jour dans de l'eau pure, le vaccin pouvant être mélangé à la préparation.

Indications. — Tous les états infectieux en complément de tous les vaccins : gripes, affections pulmonaires, staphylococcie, coqueluche, etc.

Boîte de 6 ampoules de *Divacsol AB* buvable, 5 cc.

Prix : 18 francs.

2° **DIVACSOL AI** : Ampoules de 2 cc. Injectables (AI) :

Prescrire : *Divacsol AI* : une boîte.

Posologie : Une ampoule avec le vaccin choisi, soit en une même injection (mélangée dans la seringue), soit en deux injections successives.

Boîte de 6 ampoules de *Divacsol AI* injectable, 2 cc.

Prix : 18 francs.

Laboratoire AMICROS 177, rue de Courcelles — Paris.

DMELCOS

Stock-vaccin antichancrelleux.

Émulsion de bacilles de Ducrey (225 millions par cm³), injectable exclusivement par la voie veineuse.

Indications. — **Tratement du Chancre mou et de ses complications** : Bubon, Phagédénisme, Paralysie générale (pyrétothérapie).

Présentations et mode d'emploi. — Série de 6 ampoules à doses croissantes.

Une injection intraveineuse tous les trois ou quatre jours.

Prix de vente :

La boîte de 6 ampoules : 35 francs.

CUTI-DMELCOS. — Diagnostic du chancre mou par intradermoréaction. Ampoules de 1/4 de cm³, titrées à 450 millions de germes par cm³ (boîtes de 5 ampoules).

Prix de vente :

La boîte : 11 fr. 70.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

DOLOMA

Professeurs Dubard et Voisenet, de Dijon.

Composition. — Carbono-Fluophosphate-Magnésien-Mangano-Calcique.

Formes. — Poudre, granulé et comprimés.

Propriétés. — Antidyspeptique. Spécifique des états hyperacides, reconstituant puissant des réserves minérales.

Indications. — Dyspepsies. Entérites chroniques. Tous états déminéralisants et leurs conséquences : *Cancer et Tuberculose.*

Cure antidyspeptique. — Entre et loin des repas. *Doloma*, 2 à 3 sachets de poudre, ou 2 à 3 cuillerées à café de granulé, ou 6 à 10 comprimés.

Cures reminéralisantes, simple ou intensive. — Voir fiche *Ænophos*.

DOLOMA INJECTABLE

Composition. — Lactophosphite. Magnésien. Mangano-calcique. Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. sans toxiques. Injections hypodermiques indolores.

Propriétés. — Névrosthénique idéal. Agent le plus actif de reconstitution des réserves minérales : Ph. Mg. Ca., de la cellule nerveuse.

Indications. — Epuisement du système nerveux, déminéralisation phospho-terreuse. Prétuberculose. Cancer, Prophylaxie de la récurrence post-opératoire. 1 à 2 ampoules de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour, par période de 10 jours.

Prix et N° d'Enregistrement au L. N. C. M.

La boîte de poudre *Doloma* 17 fr. 15

L. N. C. M. 216-1..

— granulé *Doloma* 18 fr. 70

L. N. C. M. 216-2

— 10 ampoules *Doloma* 2 cc. 18 fr. 70

L. N. C. M. 216-4

— 6 ampoules. *Doloma* 5 cc. 18 fr. 70

L. N. C. M. 216-5

— 100 comprimés *Doloma* .. 19 fr. 20

L. N. C. M., 216-3.

Communications : à l'Académie de médecine, avril 1918 ; à la Société française pour l'étude du cancer, juin 1919 — décembre 1920 ; Concours médical, mars 1920 ; Journal des Praticiens, mai 1920, etc., etc.

Littérature et échantillons sur demande à :

Laboratoire général d'Études Biologiques
S. A., 29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

DOGASTRO

Présentation. — Granulés en boîtes métal (17 fr. 85).

Principes actifs. — Pepsine amylacée, paneréatine, belladone pulvérisée, S. N. de bismuth, kaolin, carbonate de chaux, bi-carbonate de soude, malt, essence d'anis.

Indications. — Hypersécrétion, Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies. Pyrosis, Brûlures et aigreurs de l'estomac.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, à la fin de chaque repas ou au moment des douleurs. Inscrit au L. N. C. sous le n° 900-31.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél.: Turbigo 40-83.)

DOLOTENSINE

Médication spécifique et régulatrice du tonus artériel cérébral et céphalique.

Hypotenseur, Sédatif, Antigrippal.

Forme. — *Gouttes*. Durée du flacon : 20 jours.

Composition. — Complexe végétal associé à une dose « dynamisée » de trinitrine, Veratrum viridé, Aconitum napellus, Gelsemium, Cimicifuga, Glonoinum.

Indications. — 1° Hypertension artérielle et tous désordres dynamiques de la circulation cérébrale. (Vertiges, Bourdonnements, Mouches volantes, Confusion, Amnésie, etc.)

2° Migraines, Névralgies multiples, Algies de la nuque.

3° Etats fébriles : Grippe, Rougeole.

Posologie. — Dose unique pour les adultes : XV gouttes dans un 1/2 verre d'eau à prendre en plusieurs fois durant chaque repas

Prix : 16 francs. (Durée du traitement : 20 jours.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1703-1.

Laboratoires A. CLANCHE

VARs (Charente). (Tél.: 11.)

DOLPYC

Thérapeutique, thermogène et révulsive.

Composition. — Alcaloïdes totaux de plantes de solanées, Chloroforme. Essences de serpolet, lavande, thym, géranium.

Avantages. — Puissant révulsif et sédatif, d'odeur agréable, dont on peut aisément doser l'action. Ne détermine aucune irritation de la peau.

Indications et mode d'emploi. — Dans tous les cas où une révulsion est indiquée : Rhumatismes articulaires, aigus et chroniques, Sciaticques, Lumbagos, Points de côté, Pleurites, Entorses, Sequelles de fracture, Contusions.

Appliquer sur la région douloureuse une très légère couche de *Dolpyc* recouverte d'un carré de flanelle ou de coton cardé. Action renforcée par la chaleur humide (compresses chaudes).

Présentation et prix. — 11 fr. 50 le tube pour 20 applications environ.

Recommandation importante : Eviter le contact du *Dolpyc* avec les muqueuses et les parties sexuelles.

Laboratoires René KROTOFF

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII^e).
(Tél. 1 Marcadet 6196.)

DOLYSINE

Goutte. — Rhumatismes. — Névralgies.

1° **Cachets.** — Acide phénylcinchoninique, 0 gr. 50.
Puissant dissolvant de l'acide urique.

Doses. — De 1 à 4 grammes par 24 heures, puis doses décroissantes. Pas d'accoutumance. A prendre aux repas ou en même temps qu'une boisson alcaline (eau de Vichy).

La boîte de 12 : 9 fr. 50.

2° **Topique.** — Chloral, Chloroforme, Menthol, Ether amyloalcylique en solution éthérée aromatisée. Badigeonnages suivis d'enveloppements.

Le flacon : 9 fr. 50.

3° **Pommade.** — Même formule que ci-dessus avec excipient gras pour onctions douces et applications.

Le tube : 9 fr. 50.

Enreg. au Laboratoire N^{al} de contrôle N^o 1612-1-2-3.

M. ROCHEREAU, Pharmacien
ex-interne des Hôpitaux de Paris
SALBRIS (Loir-et-Cher).

DO.SA.NO.SAL

DOuce amère, **SA**ponaire, **NO**yer, **SAL**separeille.

Formule du Dr MARTIN DU THEIL

Forme. — *Granulé soluble.*

Composition. — Ce granulé contient par cuillerée à café : Extraits de douce-amère, 0 gr. 09696; de saponaire, 0 gr. 04848 ; de noyer, 0 gr. 07272 ; de salsepareille, 0 gr. 19292.

Dosage constant, titrage toujours identique.

Propriétés. — Diaphorétique, diurétique.

Indications. — Tous états congestifs et troubles circulatoires : Hypertension, Ménopause, Varices, suites de Phlébite.

Doses habituelles. — 1 cuillerée à café 2 fois par jour en se levant et en se couchant dans eau ou tisane.

Cures de 2 mois environ à prolonger suivant le cas.
Prix : 22 francs pour 10 jours. — L. C. M. n° 563.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 25-51.)

DOSOTOL

Présentation. — Capsules-doses en gélatine.

Composition. — Paramino-benzoate de butyle, résorcine, excipient aromatisé.

Indications. — Affections congestives de l'oreille : *Otites, Otalgies.*

Sédatif, Antiseptique, Non irritant, Non toxique.

Mode d'emploi. — *Enfants et adultes :*
Couper l'extrémité de la capsule et, la tête étant inclinée, injecter par pression le contenu dans le conduit de l'oreille malade.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoires J. LAROZE

54, rue de Paris, CHARENTON (Seine).
(Tél. : Ent. 01-41.)

DOSURINE (TROUSSES)

Les Examens d'Urine et le dosage des éléments anormaux (**Sucre, Albumine, Acétone**) sont grandement facilités par l'emploi des

Trousses Dosurine

qui, en assurant à ces examens la plus grande précision scientifique, permettent de les faire en quelques minutes.

Ces Trousses se présentent sous 4 modèles :

- 1^o **Trousse Index** « La Dosurine », qui permet de déceler la présence de l'*Albumine* ou du *Sucre*.
- 2^o **Trousse A** « La Dosurine », destinée à doser l'*Albumine* contenue dans l'urine.
- 3^o **Trousse D** « La Dosurine », destinée à doser la quantité de *Sucre* (Glucose).

Prix de chaque Trousse : 36 fr. (franco par poste : 38 fr. 40).

Ampoules de renouvellement

La boîte de 10..... 16 fr. 75 (par poste : 18 fr. 75)
La boîte de 20..... 32 fr. (par poste : 34 fr.)

- 4^o **Trousse AC** « La Dosurine », qui permet de déceler et doser l'*Acétone*.

Prix de la Trousse AC : 115 fr. (franco : 119 fr. 50).

Ampoules de renouvellement :

La boîte de 12 Ampoules pour 6 Recherches. 16 fr. 75 (par poste : 18 fr. 75)
La boîte de 8 Ampoules pour 4 Dosages... 28 fr. 50 (par poste : 30 fr. 50)

Remise de 30 % à MM. les Docteurs.

(Envoi franco notices sur demande.)

LA DOSURINE, 16, rue Charlemagne — PARIS (IV^e).

Chèques Postaux N^o 1352.39 Paris.

(Tél. : Archives 71-92.)

DRAG-BIL

Le laxatif physiologique.

Composition :

Extrait sec stabilisé de feuilles d'artichaut.....	0 gr. 050
Extrait de romarin.....	0 gr. 025
Oléate de soude	0 gr. 025
Phénolphthaléine	0 gr. 065
Agar-agar.....	0 gr. 045

Propriétés thérapeutiques. — « DRAGUE » les canaux biliaires et permet à la bile de s'écouler normalement. Combat la constipation. Désinfecte l'intestin. Agit mécaniquement sur le péristaltisme intestinal.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés à avaler, après le repas du soir de préférence. Ne pas croquer, ne pas sucer.

Prix : 11 fr. 80.

Laboratoire GERAUDEL

3, rue Watteau — COURBEVOIE

DRAGÉCALCION

Dragées de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosées à 0 gr. 25 par dragée.
4 dragées = 1 gr. de Chlorure de Calcium.

Avantages. — 1^o Efficacité accrue par absorption *progressive*. 2^o Agréables à prendre, elles évitent le goût écœurant des solutions et des gouttes. 3^o Tolérance parfaite de l'estomac.

Indications. — Toutes les indications du Chlorure de Calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme *re-calcifiant, antispasmodique, antianaphylactique*, contre les engelures, on préfère les *doses faibles* : 1 dragée au début de chaque repas avec une gorgée d'eau et une entre chaque repas (6 par jour), pendant 20 jours par mois, à continuer longtemps.

Comme *hémostatique, antialbuminurique, dé-chlorurant, antisérique*, on préfère les *doses fortes* : 20 dragées par jour pendant 5 jours avec repos de 10 jours.

Non toxique, son emploi peut être continué avec avantage pendant des mois.

Prix : 18 fr. la boîte.

DRAGÉCALCION GRANULÉ

Granulé de Chlorure de calcium crist. chimiquement pur, dosé à 0,25 par cuillerée à café : 2 cuill. à entremets = 1 gr. de chlorure de calcium.

Indications. — Pour les petits *enfants* et pour tous ceux qui ne peuvent avaler les dragées : toutes les indications du Chlorure de calcium.

Posologie et mode d'emploi. — Comme ci-dessus : une cuill. à café = 1 dragée.

Prix : 18 fr. la boîte.

Pharmacie DUC

24, avenue Mac-Mahon — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 11-96.)

DRAGÉES BENQUÉ

Composition. — Menthol, Borate de soude, Cocaïne ou Menthol, Borate de soude (sans cocaïne).

Propriétés et Indications. — Antiseptiques et anesthésiques sans sécheresse. Affections de la gorge, Pharyngites, Laryngites, Angines. Bien-faisantes dans les affections de l'estomac et contre les vomissements de la grossesse.

Forme. — Dragées.

Posologie. — 6 à 8 dragées par jour (laisser fondre dans la bouche).

Prix : 5 fr. 30 la boîte.

L. N. C. M., n^{os} 516-2, 3.

Laboratoires du Docteur BENQUÉ et Fils,
Pharmaciens
16, rue Ballu — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trln. 85-60.)

DRAGÉES BONDONNEAU

Traitement de l'obésité et de l'arthritisme.

Composition :

Sels de la Source Bondonneau.....	0 gr. 10
Extrait mou aqueux de fucus vésiculosus.	0 gr. 05
Poudre de Cascara-Sagrada	0 gr. 05
Iodure de potassium.....	0 gr. 05

Pour une dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Favorise l'oxydation des graisses en activant la production du ferment lipolytique. Aucun retentissement sur l'état général.

Indications. — Obésité. Toutes les manifestations de l'arthritisme.

Doses. — 3 à 6 dragées par jour, au milieu des repas.

Prix : 14 fr. 30 les 60 dragées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N^o 537-1.

G. BRIENS, Docteur en Pharmacie.
20 et 22, rue de la République — LYON (Rhône).

DRAGÉES HECQUET

(Sesqui-Bromure de Fer).

Propriétés. — Associent les qualités anti-spasmodiques du brome et l'action hématopoiétique du fer sous la forme d'un sel très assimilable ne produisant jamais de troubles digestifs ou intestinaux. Le seul ferrugineux qui réponde à cette indication :

Calmer sans affaiblir,

Reconstituer sans exciter.

Indications. — Chloro-Anémie, Nervosisme.

Dose. — 4 à 6 dragées par jour.

(Se fait également sous forme de « Sirop ».)

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e).

(Tél. : Suf. 36-59)

DRAGÉES HÉPATO-RÉNALES GROS

Composition. — Extrait mou de feuilles d'artichaut, Extrait mou d'orthosiphon Hexaméthylènetétramine, Salicylate de phényle, Salicylate de pipérazine.

Propriétés. — Diurétique, antiurique, sédative, antiseptique.

Indications. — Rhumatisme, arthritisme, uricémie, goutte, cystite, colibacillurie, maladies infectieuses, urémie.

Forme. — Dragées.

Doses. — 4 à 10 dragées par 24 heures, à prendre au milieu des repas.

Prix : 18 francs.

Durée moyenne de l'unité : 10 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. 60-55.)

DRAGÉES LEBRUN TONI-CARDIAQUES

Composition.

Strophantus total.....	0,01	pour une dragée.
Sulfate de Sparteïne..	0,01	— —
Caféine pure.....	0,05	— —
Ext. de Scille.....	0,04	— —
Benzoate de lithine...	0,015	— —

Propriétés thérapeutiques. — Cardiotonique, sédatif de la dyspnée cardiaque. Régulatrices et renforçatrices, elles tonifient le myocarde et activent la diurèse.

Indications. — Insuffisance cardiaque, Asystolie, Maladies mitrales, Œdèmes cardiaques, Myocardites.

Posologie. — 6 dragées par jour, en 2 prises, soit au début, soit entre les repas.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck, PARIS (XVI^e).

DRAGÉES MANNET FERRO-ERGOTÉES

Composition :

Ergot de Seigle	5	cgr.
Fer	10	—

Par dragée.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant les repas.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoire MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

DRAGÉES NÉVROSTHÉNIQUES « YSE »

à base de Phosphure de Zinc (2 milligr. par dragée), Nux vomica-Kola-Guarana.

Indications et propriétés thérapeutiques.

— Spécifique de la Neurasthénie, du *surmenage intellectuel*, des *dépressions physiques, cérébrale* et des états adynamiques et asthéniques.

Mode d'emploi (sauf avis du médecin). —

Six dragées par jour : deux avant chacun des trois principaux repas.

Formule B. Spéciale pour diabétiques.

Prix : 15 francs.

Laboratoire « YSE »

H. Chatelut, pharmacien

65, rue Louis-Blanc — PARIS (Xe).

DRAGEVAL

(ex-DRAGÉES LUMEVAL)

Sédatives, antispasmodiques.

Composition. — Pilules glutinisées renfermant :

Extrait stab. de Valériane.....	}	aa 0 gr. 03
— — Passiflore.....		
— — Cratægus.....		
Butylethylmalonylurée.....		

Indications. — Troubles d'origine nerveuse, Insomnies, Agitation, Anxiété, Syndromes Neurasthéniques en général, Palpitations et Troubles cardiaques spasmodiques.

Posologie. — Jusqu'à 7 dragées par jour ; dose moyenne 2 à 4 par jour. Pas d'accumulation ni d'accoutumance.

Enreg. au L. N. C. M. sous le n° 27-2.

Prix : 17 fr. 60 l'étui de 42 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS.

(Tél. : Roq. 49-22.)

Descouraux et Fils, Pharmaciens

Docteur en Pharmacie.

DRAGUROL

Diurogène Hépaté et Cardio-rénal
Azotémique Cholérétique.

Composition. — Par cuillerée à café :

Ext. fl. <i>Orthosiphon</i>	0.65	Extrait mou Artichaut...	0,16
Extrait fl. <i>Adonis Vernalis</i> ..	0,25	Extrait mou s. am. <i>Cascara</i>	0.01
Forming Lambiotte	0.20	Excipient aromatisé.....	Q. S.

Action thérapeutique. — Provoque une Diurèse abondante, prompte. Draine et excrète tous déchets organiques (urée, acide urique, sables, calculs, chlorures, cholestérine, etc.) et toxines (états infectieux). Renove les fonctions hépatiques. Augmente la sécrétion biliaire. Abaisse le taux d'urée sanguine. Ménage l'épithélium vésico-rénal.

Indications. — Troubles du Métabolisme de l'eau d'origine rénale, hépat-rénale, cardio-rénale (lithiasiques, congestifs ou infectieux), consécutifs à une crise aiguë ou nécessitant une cure de fond. Azotémie, Cardopathies, Obésité, Affections néphro-pyéliques. Oliguries, Albuminurie. Diathèse neuro-arthritique, Ictère, Dermatoses rebelles.

Spécifique des Lithiases et insuffisances excrétoires.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, sucrée ou non. — *Enfants* : 1/2 dose. — Pas de contre-indications.

Le flacon : 18 francs (9 jours de traitement).

Enregistré au L. N. O. M. n° 1888-1.

Laboratoire du SIÈCLE
13, rue Bolnod, PARIS (XVIII^e).

DRAINOBYL

Du Dr L. Lafay

Forme. — Granulé effervescent très soluble, de goût agréable (limonade citrique).

Composition :

Salicylate de soude	6 gr.
Benzoate de soude	6 gr.
Bicarbonate de soude	10 gr.
Chlorétone.....	0 gr. 05
Hexylrésorcine	0 gr. 03
Nickel, cobalt colloïdal.....	aa 0 gr. 01
Teintures de boldo, romarin, pissenlit, combretum.....	aa 1 gr.
Excipient effervescent. Q. S.	100 gr.

Propriétés. — Antiseptique biliaire, Antispasmodique-sédatif, Cholagogue, Cholérétique.

Drainage doux des voies biliaires, avec action spécifique dans les crises douloureuses et les affections de la vésicule.

Indications. — Coliques hépatiques ou vésiculaires, Cholécystites, Angiocholites, Foies sensibles ou douloureux.

Lithiase biliaire, Congestion hépatique, Ictères, Maladies de la nutrition, Maladies hépatiques des pays chauds.

Troubles chroniques digestifs et généraux dus à une insuffisance hépatique ou hépatorénale.

Aucune contre-indication.

Posologie. — *Troubles chroniques* : 1 à 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau, le matin à jeun, 10 jours par mois.

Cholécystites, Congestion hépatique, Ictères : suivant la gravité de l'affection, 2 à 6 cuillerées à café, espacées dans la journée, une heure avant les prises alimentaires.

Crises douloureuses : 2 cuillerées à café dans 1/2 verre d'eau chaude, tous les quarts d'heure, jusqu'à sédation des douleurs.

Enfants : dans les troubles chroniques, et suivant l'âge, 1/4 à 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau, le matin à jeun. Augmenter les doses suivant la gravité de l'affection.

Présentation. — Boîte pour traitement de 10 à 15 jours :

Prix : 19 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1090-1.

Laboratoires du Dr L. LAFAY

LECOQ et FERRAND, Pharmaciens,

69, rue de Provence, 54, Chaussée d'Antin —
PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 21-06.)

DRAINOCHOL

Agent de drainage des voies biliaires.

Stimulant des fonctions hépatiques.

Sédatif des spasmes biliaires.

Désensibilisation.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur très agréable.

Composition :

Peptones de viande.....	2 gr. 500
— de poisson.....	0 gr. 500
— d'œuf.....	0 gr. 166
Extrait total de jaborandi.....	0 gr. 333
Extrait sec d'artichaut.....	0 gr. 830
Chlorure de magnésium.....	0 gr. 333
Sulfate de magnésie P. C.....	16 gr.
Lactosérum.....	30 gr.

Pour 100 gr. de saccharure.

Indications :

- 1° *Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires :* Insuffisance hépatique, Cholémie, Congestion du foie, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystite chronique, Angiocholites.
- 2° *Troubles dyspeptiques d'origine hépatique :* Somnolences post-prandiales, Dyspepsies secondaires, Vertiges et nausées, Inappétence, Constipation.
- 3° *États anaphylactiques d'origine alimentaire :* Prurit et urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Rhume des foins, Asthme, Dermatoses.

Particularités. — Le plus actif et le plus doux des médicaments de drainage biliaire, parce que sans action drastique sur l'intestin. Par son *Jaborandi*, évite toute réaction violente. Par son *Lactosérum*, agit à la fois sur l'évacuation biliaire et sur la diurèse.

Posologie :

Adultes : Le matin, à jeun, une demi-heure avant toute alimentation, deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède. Cette dose peut être portée, suivant indication médicale, jusqu'à 4 et 6 cuillerées à café.

Enfants : demi-dose ou quart de dose selon l'âge.

Prix : 21 francs.

traitement de 20 jours, soit 2 cures.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Docteur en pharmacie

78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 33-78.)

DRINAL

Cachets. Comprimés.

Composition :

<i>Pour</i> 1 cachet :	{	Aspirine	0,30
		Pyramidon	0,10
		Phénacétine	0,10
		Caféine	0,05
		Poudre de Dower	0,03
		Poudre d'aconit	0,005
		Carb. de chaux	0,10
<i>Pour</i> 1 comprimé :	{	Aspirine	0,30
		Acétanilide	0,10
		Caféine	0,05
		Phényléthylmalonylurée	0,01

Indications et doses. — *Cachets* (en boîte de 10) : Grippe, fièvre, rhumatismes, etc., 2 à 4 par jour ;
Comprimés (en tube de 15) : Névralgies, migraines : douleurs, maux de dents, etc., 2 à 4 par jour.

Prix. — 9 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 1082-1.

A. MIRONNEAU, pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18.)

DROSOL

Gouttes.

Composition. — Drosera, Grindelia, Lobélie, Terpène, aromatisées à l'orange.

Indications. — Coqueluche, toux rebelle, asthme, bronchites, gripes, laryngites, trachéites, toux spasmodique.

Mode d'emploi. — Prendre *loin des repas* (1 heure avant ou 2 heures après).

Posologie :

Nourrissons : II à X gouttes, trois fois par jour.

Enfants : XV à L gouttes, — — — —

Adultes : LX gouttes et plus, — — — —

Coqueluche : mêmes doses, mais augmenter d'une goutte par prise, tous les jours, le deuxième jour de traitement.

Ne pas dépasser 100 gouttes pour les enfants le premier jour de traitement.

Prix : 15 francs.

Laboratoires JEAN BOUTES

rue Clément-Ador — MURET (Haute-Garonne).

DRYCO

Lait sec non sucré.

Analyse approximative :

Matières grasses	12	p. 100.
Sucre de lait	46	—
Matières azotées	32	—
Sels	7	—
Eau	3	—

Indications. — Lait rigoureusement pur, partiellement écrémé.

Pour nourrissons : digestibilité et assimilation parfaites, supprime vomissements et troubles intestinaux.

Pour adultes : régime de suralimentation, affections du foie et de l'estomac.

Doses. — Dilution normale : une cuillerée à soupe arasée de poudre non tassée (6 gr.) et 50 gr. d'eau bouillie chaude.

A modifier suivant l'âge du nourrisson et selon les prescriptions médicales.

Sucre comme pour le lait ordinaire.

Préparer sans cuisson.

Société Française du Lait Sec DRYCO

5, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 59-09.)

DULFOR DULCAO

sont des aliments énergétiques, complets, polyvitaminés, dont les principaux éléments sont tirés du *soya*, du son de froment, d'avoine, de riz, de la banane, du germe de blé, de la levure.

L'association des 16 composants alimentaires est calculée pour équilibrer : albumines, graisses, hydrates de carbone et sels minéraux (sodium et calcium, phosphore, iode, potassium, magnésium).

Les deux produits ont été soumis à de longs essais cliniques avant d'être livrés au public.

INDICATIONS

Chez l'homme normal : pour accroître sa puissance de travail cérébral ou physique.

Préventivement : pour mieux supporter une dépense organique (grossesse, allaitement).

Chez le malade : dans tous les états de faiblesse, de déchéance, de fatigabilité, dus à l'âge, au surmenage, à la convalescence des maladies, à une mauvaise constitution.

N. B. — DULCAO renferme du cacao ; il a une puissance calorifique plus grande.

DULFOR est plus riche en polyvitamines.

Les deux produits sont utilement alternés.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à potage par jour, préparé comme du cacao ou incorporé, le matin, à une soupe au gruau d'avoine.

Laboratoires DULFRANCE

38, place de la Victoire — TOURCOING.

DUNA-CAÏNOL

Pommade sédative.

Principe Actif. — *Duna-Caine* L. P.

Excipient. — Constitué en majeure partie par une graisse animale à pénétration rapide et intégrale, dépourvue de toute action irritante.

Indications. — Pommade sédative des douleurs de la peau et des muqueuses : prurit anal et vaginal, prurit sénile, prurit diabétique, hémorroïdes, brûlures, urticaire, zona, radiodermite, plaies cancéreuses, algies, démangeaisons.

Contre-indication. — Eczémas évolutifs et toutes affections dermatologiques non justiciables d'un traitement par les anesthésiques.

Mode d'emploi. — *S'il y a plaie*, appliquer une compresse enduite de *Duna-Cainol*.

S'il n'y a pas plaie, onction plus ou moins prolongée avec le *Duna-Cainol* et laisser en place une compresse enduite de pommade.

Prix : 15 fr. 30.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}
17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

DUNA-PHORINE

Sels de Morphine à acides organiques.

AMPOULES

3 Formules, 3 Modes d'Action.

La *Duna-Phorine*, préparée avec des acides organiques expérimentalement choisis, permet :

- 1° De régler la vitesse d'apport de la morphine à l'élément nerveux selon le but poursuivi ;
- 2° D'utiliser pleinement les propriétés de l'alcaloïde, par conséquent d'en diminuer les doses ;
- 3° D'éviter la majeure partie des actions préliminaires ou secondaires indésirables. .

Indications :

Duna-Phorine rapide (phényl-propionate de morphine) : action presque immédiate. Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, analgésies pré-opératoires, crises d'asthme.

Duna-Phorine lente (gluconate de morphine) : action moins immédiate, mais très prolongée. Zonas, hémoptysies, douleurs néoplasiques et tabétiques, grandes algies.

Duna-Phorine mixte (phényl-propionate et gluconate de morphine) : action à la fois immédiate et prolongée.

SUPPOSITOIRES

Une seule formule.

Mêmes indications que les suppositoires de Morphine avec tous les avantages de nos sels spéciaux.

Formes :

Ampoules : boîtes de 7 ampoules correspondant à 1 ou à 2 centigr. de chlorhydrate de morphine.

Suppositoires : boîtes de 6 suppositoires dosés à 0 gr. 005 de morphine base hydratée à l'état de sels organiques.

Mode de prescription :

Ampoules : *Duna-Phorine lente* ou *rapide* ou *mixte* à 1 ou 2 p. 100.

Une boîte de 7 ampoules : 1 ampoule par jour.

Deux boîtes 7 ampoules : 2 ampoules par jour, etc...
(Produit du tableau B.)

Suppositoires : 1 à 3 suppositoires par jour (*prescription ordinaire*).

Prix :

La boîte de 7 ampoules à 1 p. 100.....	19 fr. 65
— 7 — à 2 p. 100.....	25 francs
La boîte de 6 suppositoires	18 fr. 35

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie

17, rue de Berri — PARIS (XIII^e).

DYCHOLIUM

Composition. — Ampoules de 5 cc. contenant 1 gr. de déhydrocholate de soude et comprimés de 0 gr. 30 d'acide déhydrocholique.

Propriétés. — *Cholérétique* (non cholagogue), diurétique, désensibilisant.

Indications :

Des injections intraveineuses: Ictères par angiocholite, cholécite, ictères par hépatite prolongés, suites d'interventions portant sur les voies biliaires avec ou sans drainage externe. Toutes maladies par sensibilisation; intolérances médicamenteuses, accidents sériques... Delirium tremens, dépression. Oligurie d'origine cardiaque (employé seul ou associé aux diurétiques mercuriels, dont il potentialise les effets).

Des comprimés: Complément des cures par voie veineuse. Tous les phénomènes de petite insuffisance hépatique: cholémie, démangeaisons, céphalée, somnolence post-prandiale, selles décolorées. Constipation. Lithiase biliaire à toutes les phases de son évolution. Ictères.

Posologie. — Ampoules: Une injection de 1 ou mieux 2 gr. tous les jours ou tous les deux jours pendant 6 à 10 jours. *De 5 à 15 ans: une ampoule de 5 cc.*

Comprimés: 1 à 6 comprimés par jour, à prendre au début des repas du matin, de midi et du soir, pendant 10 jours par mois. De 2 à 15 ans: de 1 à 4 comprimés.

Diminuer les doses en cas de diarrhée.

Médicament rigoureusement atoxique. Prévenir le malade d'un goût amer transitoire apparaissant pendant l'injection intraveineuse.

Boîte de 6 ampoules.
Tube de 20 comprimés.

Société Générale d'applications thérapeutiques

« THÉRAPLIX »

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

DYNAMOGÉNINE du Docteur Chaboud.

Extrait Fluide Américain.

Composition :

Quinquinas, 11 gr. ; Kola 8 gr. 8 ; Noix vomiques, 1 gr. 55 ; Arrhénal, 0 gr. 12 ; Acide orthophosphorique, 0 gr. 12 ; Can-nelle, 0 gr. 33 ; Vanille, 0 gr. 12 ; Cacao, 0 gr. 75 ;
pour 100 cc. de véhicule (alcool à 60° et glycérine).

Propriétés. — Tonique énergique, Puissant fortifiant, Régénérateur puissant du sang et des muscles.

Indications. — Anémie, Chlorose, Surmenage, Neurasthénie, Convales-cence de maladies graves (grippe, bronchite, pneumonie, etc.), suites de couches, pré-tuberculose, faiblesse générale, manque d'appétit.

Posologie. — Un quart d'heure avant chacun des deux principaux repas, dans la valeur d'un verre à bordeaux de vin sucré ou d'eau sucrée :

Adultes : Une cuillerée à café. **Enfants,** au-dessus de 8 ans : 1/2 dose.

Suspendre pendant une dizaine de jours entre chaque flacon.

Durée. — La cure normale est de trois flacons. Le flacon dure dix jours environ. Prix : le flacon 15 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1540-1.

Laboratoires de la DYNAMOGÉNINE

RUMILLY — (Haute-Savoie)

Bureau de Correspondance : Boîte postale 33.

AIX-LES-BAINS (Savoie).

DYNOSTHÈNE

Comprimés.

*La cure magnésienne rationnellement conduite par adjonction d'un com-
pexe polyminéralisé équilibré et assimilable.*

Indications. — Tous les états de carence magnésienne :

1° Atonie du tube digestif, congestion hépatique, constipation atonique.

2° Syndromes neuro-dépressifs (Psychasthénie, angoisse, surmenage intellectuel, débilité génitale).

3° Convalescence des maladies infectieuses ésthéniantes (grippe, fièvre typhoïde, etc.).

4° Prophylaxie du cancer. Puissant modificateur du terrain (prévention des récidives post-opératoires).

Composition. — Complexe phospho-magnésien polyminéralisé.

(Chl. de Magn. Magnésie calcinée, Glycéroph. de Magnésie, Glycéroph. de Ca., Phosphore organique, Nucléinate de fer et Manganèse.)

Forme et Posologie. — 1 boîte de 45 comprimés.

2 à 4 comprimés par jour avant ou pendant les repas, de préférence le matin et à midi.

Traitement. — Ininterrompu pendant quelques semaines (aucun in-convenient à être continué pendant plusieurs mois).

Adjuvant des cures thermales (Vichy, Vittel, etc...)

Aucune contre-indication.

Prix : 19 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Ph. 183, rue de Rome — MARSEILLE.

DYSARIODE

Association d'Iodobismuthate d'Oxyquinoléine (corps organique nouveau contenant 36 p. 100 d'Iode fixé) et de sous-gallate de bismuth.

Comprimés à libération intestinale.

Propriétés. — *Action antitoxique* par l'iode et l'oxyquinoléine.

Action topique sur les muqueuses (libération de l'oxyhydrate de bismuth colloïdal).

Action régulatrice sur les sécrétions et le transit digestif.

Action de drainage par les petites doses d'Ipéca.

Parasitocides puissantes.

Indications. — Aérocolies, Aérogastries, selles fétides, Gastro-entérites aiguës et chroniques, Entéro-colites, Fermentations intestinales, Intoxications alimentaires, Amibiase, Parasitoses, Constipation.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 4 comprimés par jour, au milieu des repas.

Enfants : à partir de 6 ans, 1 à 2 par jour.

Laboratoire National de Contrôle des Médicaments,
n° 196-8.

Laboratoires du VIOPHAN

91, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

R. C. Seine 715.088.

C. C. P. Paris 2.365-71.

DYSPEPTINE HEPP

Suc Gastrique physiologique pur,
extrait de porc vivant.

Procédé du D^r HEPP

Ancien Interne en Chirurgie des Hôpitaux de Paris.

Indications. — Hypopepsie. Dilatation, Gastrites chroniques, Dyspepsie nerveuse, Anorexie des tuberculeux et convalescents, Diarrhées, Entérites tropicales, Gastro-entérites et Dyspepsies des nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe un peu avant ou pendant le repas.

Enfants : 1/2 cuillerée à café avant chaque tétée ou prise d'aliments.

Enregistré au L. N. C. n° 514-8.

Adresser toutes demandes:

Laboratoire

de Physiologie du PUIITS-d'ANGLE

Le Puits-d'Angle — LE CHESNAY (S.-et-O.).

Dépôt pour la France:

Laboratoires CARRION

51, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Représentant pour la Belgique:

M. MICHAUD

23, rue Plantin — BRUXELLES.

DYSPNÉ-INHAL

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foies, Coryza spasmodique, Obstruction nasale, Gaz de guerre.

Composition. — Solution pour pulvérisation *buccale* d'adrénaline stabilisée et activée à dose infinitésimale.

Avantages. — Supprime toute crise, même violente; en quelques secondes. Supprime les piqures. Innocuité permettant l'application aux jeunes enfants.

Mode d'emploi. — Quelques gouttes dans l'atomiseur spécial de poche. Au moment de la crise, faire une pulvérisation dans la bouche en aspirant. La crise cesse instantanément.

Prix: *Pulvérisateur* : 36 fr. *Liquide* (pour 2 mois) : 16 fr. Prix spécial au médecin pour usage personnel.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. sous le n° 1020-1

A. FOURTON, Docteur en Pharmacie

38, rue du 11-Novembre

CLERMONT-FERRAND (P.-de-D.). (Tél. : 31-21.)

DYSTHÈNE

Médication tonique et régulatrice, complexe phosphorique et magnésien.

Indications. — Syndromes d'hypotonie, Dépressions, Asthénie, Fatigue, Faiblesse générale, Diminution de l'activité physique et cérébrale, Inaptitude au travail.

1^o Forme gouttes :

Emploi et doses. — *Adultes* : XL gouttes au total par jour, en deux fois aux repas, dans un peu d'eau.

Vieillards : XXX gouttes au total par jour.

Enfants : de 7 à 12 ans : VIII gouttes par jour.

— — 12 à 16 ans : XII — —

— — 16 à 18 ans : XX — —

Prix : 18 francs.

2^o Forme élixir :

Emploi et doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe à chacun des repas de midi et du soir.

Vieillards : 1 cuillerée à dessert.

Enfants : de 16 à 18 ans : 1 cuillerée à café. Au-dessous de cet âge, prendre uniquement le DYSTHÈNE-GOUTTES.

L'élixir peut être absorbé pur ou partie égale d'eau.

Prix : 18 francs.

Durée moyenne : 15 à 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine). (Tél. : Grésillons 00-15.)

DYSTONINE CHATRON

Comprimés.

Association équilibrée des médicaments du sympathique et du vague.

Ethyl-phényl-malonyl-urée ..	0 gr. 01
Extrait de Crataegus	0 gr. 05
Bromure de Calcium	0 gr. 10
Poudre de parathyroïdes....	0 gr. 0003

Propriétés. — Sédatif et régulateur parfait des dystonies neuro-végétatives, cardio-tonique, antispasmodique.

Indications. — *Insomnies, aërophagie* et tous troubles et dérèglements du système vago-sympathique : émotivité, anxiété, nervosité, angoisses, dépressions, dyspepsies nerveuses, entérocolites spasmodiques, spasmes cardio-vasculaires, angor, troubles endocriniens notamment de la menstruation et de la ménopause.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour en plusieurs fois, de préférence avant les repas. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés.

Prix : 18 fr. 50 le flacon de 40 comprimés.

Enregistré au L. N. G. M. sous le n° 1232-1.

Laboratoires CHATRON, Docteur en Pharmacie,
PLOMBIERES-LES-BAINS (Vosges)
 et 45, rue Cambornie — PARIS (XV^e). (Tél. : Ség. 26-79.)

EAUX-MÈRES

Eaux chlorurées, bromodurées, sodiques et magnésiennes. Un litre d'eau contient 322 grammes de sels provenant de la concentration des eaux salées naturelles par la chaleur après extraction de la majeure partie du chlorure de sodium et conservant dans de fortes proportions des chlorure de potassium, sulfate de sodium, sulfate de magnésium, sulfate de calcium, chlorure de calcium, carbonate de calcium, silicate de sodium.

Indications. — 1° Maladies de l'enfance : lymphatisme, scrofule, rachitisme, scoliose, séquelles de paralysie infantile, anémie ;
2° Maladies de la femme : aménorrhée, dysménorrhée, fibrome utérin, métrite, salpingite, ovarite.

Contre-indications : tuberculose pulmonaire, affections organiques du cœur, néphrite chronique, maladies aiguës et affections cancéreuses.

Présentation et prix. — 1° Sels pour bains et injections en paquets de 2 kgs : 9 fr. 20 ;

2° Eaux-mères pour bains et irrigations vaginales, compresses, pansements, en bouteille de 1 litre environ : 5 francs ;

3° Eaux-mères concentrées pour injections vaginales, en boîte de 6 ampoules de 20 cc., stérilisées : 18 francs,

Durée du traitement : 21 jours environ.

Pour tous renseignements s'adresser au Directeur
de l'Établissement Thermal
DE SALIES-DU-SALAT (Haute-Garonne).

ECZÉDA

Ichtyosalicylé.

Pommade polyréductrice, doit à son excipient :

Son pouvoir absorbant.

Ses qualités d'épidermisation.

Ses propriétés antitoxiques.

Indications. — *Dermatoses suintantes et prurigineuses* : Eczémas sous ses différentes formes ; Érythèmes, Prurits ; Eczéma et Érythème fessier des nourrissons — *Brûlures. Engelures. Plaies.*

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux
PARIS (IV^e). Tél. : Arch. 69-03.

ECZOSEC PORCHER

Pâte adhésive sans corps gras. Sèche rapidement.
Ne tache pas. S'enlève à l'eau.

Véritable pansement dermatologique ne nécessitant l'emploi ni de bandes, ni de gaze, ni de poudre.
Protège la peau et permet la respiration.

Mode d'emploi. — Etendre en *couche mince*, mais homogène, et laisser sécher simplement. *Ne jamais mettre de pansement ni poudrer.* Renouveler chaque jour l'application après avoir enlevé la couche précédente avec un tampon d'ouate imbibé d'eau.

Indications. — *Eczémas secs. Dermites, Prurits.*
Préservatif et curatif des différentes formes d'*Erythèmes* :
Erythèmes solaires, Erythèmes des nourrissons,
Erythèmes provoqués par le vent, les reflets de la neige, les piqures d'insectes.

Dans les *Dermatoses suintantes*, complément de l'*Eczéda* comme pansement de jour.

Eczosecs spéciaux : *Ichtyolé* (Dermites eczémateuses).
Benzoïque (Dysidroses parasitaires).

Laboratoires PORCHER

35, rue des Blancs-Manteaux — PARIS (IV°).

Tél. : Arch. 69-03.

ÉDISTOL

Composition. — Acide borique, tartrique, citrique ;
menthol, huile de Pinus sylv., gaiacol, terpinéol,
pinéol, cinéol, Styrax benz.

Indications. — Toutes affections et antiseptie des
muqueuses rhino-bucco-pharyngo-laryngées.

Mode d'emploi. — *Gargarismes* et bains de gorge :
1 cuillerée à café par verre d'eau bouillie chaude.

Fumigations : 1 à 2 cuillerées à café par verre d'eau
bouillante.

Vaporisations : 1 cuillerée à café dans le verre d'eau
d'un pulvérisateur à vapeur.

Bain nasal : 1/2 cuillerée à café dans un verre d'eau
bouillie tiède, au moyen de la pipette nasale.

Échantillon sur demande.

Prix : G. M., 15 fr. 25 ; P. M., 10 fr. 50.

Laboratoire de l'ÉDISTOL

H. DUFOUR, Pharmacien de 1^{re} classe,
Anc. interne des hôp. de Paris,

40, rue des Carmes — ORLÉANS (Loiret). (Tél. : 21-28.)

EDRICAMPHRE

Forme pharmaceutique et composition. — Ampoules de 2 cc. de solution aqueuse correspondant à 2 cgr. d'*Ephédrine naturelle* et 20 cgr. de *Camphre*. (Boîte de 5 ampoules.)

Propriétés et avantages. — L'EDRICAMPHRE est le médicament type de la *défaillance du cœur périphérique*. Facilité de l'injection sous-cutanée. Indolence absolue, diffusion et absorption rapide. Pas de rétention ni d'abcédation.

Indications thérapeutiques. — Tous états *hypotensifs* (choc toxique, infectieux ou traumatique).

Avant, pendant et après les *interventions chirurgicales*.

Accidents sériques et post-opératoires.

Mode d'emploi. — 1, 2 ou 3 ampoules par jour en injections *sous-cutanées* ou intramusculaires.

Prescription. — 1 boîte ampoules EDRICAMPHRE FALVY.

L'EDRICAMPHRE existe également sous la forme *gouttes* (même composition) pour instillations et pulvérisations nasales et pour l'usage interne (XX à XL gouttes 3 à 5 fois par jour) dans l'asthme, le coryza spasmodique et les états allergiques.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Étoile 18-26.)

ÉDUCTYL

Suppositoire antidyschésique « sui generis ».

Procédé de Fabrication Breveté S. G. D. G.

Mode d'action. — Dégagement lent dans le rectum de gaz carbonique (méthode du Professeur Ch. Glaesner), ce qui déclenche promptement le réflexe dilatateur.

Avantages particuliers. — 1° Remplace les purgatifs et les lavements ; 2° Ménage le tube digestif ; 3° Emploi propre et aisé.

Indications. — Toutes formes de constipation rectale ou rectosigmoïdienne, surtout chez les dyschésiques habituels, les hémorroïdaires, les congestifs pelviens, et chez les constipés occasionnels : infectieux, opérés, parturientes, malades alités de tout ordre.

Posologie. — Un suppositoire au moment voulu ; un deuxième une demi-heure après dans les cas opiniâtres.

Boîtes de 6	7 fr. 50
— de 12	13 fr. 50
— de 25	25 fr.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1492-1.

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assaït — NICE (A.-M.). Tél. : 814-61.

Sirop EFRYL

à base d'Ephédrine et de Codéthyline.

Action. — Sédation constante de la toux et de la dyspnée. Diminution rapide de la congestion des organes respiratoires.

Formule :

Chlorhydrate d'éphédrine...	0,10	Salicylate de soude...	0,10
Codéthyline.....	0,08	Drosera.....	2 gr.
Benzoate de soude.....	0,10	Sirop de serpolet Q.S.P.	100 cc.

Indications. — *Toux en général.* Rhumes, Trachéites, Laryngites, Bronchites aiguës et chroniques, Complications pulmonaires de la grippe, *Emphysème, Asthme, Rhume des foins, Coqueluche.*

Posologie. — 1 cuillerée à bouche contient 0 gr. 015 d'éphédrine.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à bouche par jour, *Enfants :* 1 à 4 cuillerées à café par jour (au-dessus de 2 ans).

A prendre 1/2 heure avant les repas, ou 2 heures après,

Éviter de donner le Sirop EFRYL immédiatement avant le coucher.

Flacon de 150 cc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

« **THERAPLIX** »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

EGIDOL

Vaccin polyvalent en comprimés.

Entérites, colibacilluries, Staphylococcies.

Mode d'emploi. — Un comprimé à chaque repas, quinze jours par mois.

Prix de la boîte de 30 comprimés :

12 francs.

J. DURSENT,

Docteur en pharmacie

74, rue Blanche — PARIS (IX^e).

EKTOGAN BOCQUILLON

A base d'un peroxyde de zinc spécialement préparé, dont la partie active a pour formule $2(\text{Zn}^+ \text{C}^{18} \text{O}^{16} \text{H}^{11})$, l'Ektogan Bocquillon dégage d'une façon lente et continue de l'Oxygène à l'état naissant dès qu'on le met en contact avec les tissus ou les sécrétions organiques (sang, pus, transpiration, etc.).

Indications. — Chirurgie, Dermatologie, Oto-Rhino-Laryngologie, Obstétrique, Gynécologie, Soins des nouveau-nés.

EKTOGAN-POUDRE pour désinfection, désodorisation et cicatrisation, avec action desséchante de toute plaie. Traitement de l'Hyperhydrose.

Prix : le flacon poudreur : 16 francs.

EKTOGAN-POMMADE pour cicatrisation et traitement des dermatoses et brûlures.

Prix : le tube : 14 fr. 40.

Pansements à l'**EKTOGAN** : gaze, mèches (largeur 1 cm., 2 cm. 5 et 5 cm.), ekto-plaste, ovules, pâte occlusive pour ulcères variqueux.

Laboratoires DERNIS

12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Trudaine 09-64.)

EKTOPHANOL

Sel de Lithium de l'acide phénylquinoléine carbonique.

Indications. — Rhumatismes musculaires ou articulaires, aigus ou chroniques, goutte, sciatique, lumbago, etc.

Mode d'emploi. — 4 cachets par jour (2 avant chaque repas) pendant 4 jours.

Repos 4 jours.

Présentation :

Boîte. G. M. de 32 cachets dosés à 0 gr. 20 : 17 fr. 40.

Boîte. P. M. de 16 cachets dosés à 0 gr. 20 : 9 fr. 30.

Durée moyenne des unités vente :

G. M. : 12 jours. — P. M. : 4 jours.

Laboratoires de Biochimie médicale.

CH. DESGREZ

Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

ÉLAIADINE

(ελαια-Olivier.)

Traitement phytothérapique de l'hypertension artérielle.

Forme. — Gouttes.

Composition. — Extrait stabilisé :

De feuilles fraîches d'Olea Europea ...	80 gr.
De fruits de Cratægus Oxyacantha ...	10 gr.
D'écorce de Betula Alba.....	10 gr.
Total :	100 gr.

Indications. — Hypotenseur, fébrifuge, diurétique, antitoxique.

Préclérose, Artériosclérose, Hypertension, Brightisme, États anxieux, Vertiges, Éréthisme cardiaque, Tachycardie, Angor pectoris, Syndrome hépatobiliaire.

Posologie. — XX à XXX gouttes par jour aux deux principaux repas dans un peu d'eau.

Laboratoires de l'ÉLAIADINE

Marcel MURAT,

Pharmacien, docteur ès-sciences.

CASTRES (Tarn).

ÉLASTOPLASTE

Forme essentielle. — Bandes de 1 et 2 m. 1/2 de long et de 3 à 30 centimètres de large.

Composition. — Sparadrap adhésif, élastique, résultant de l'association d'une bande élastique (genre crêpe) et d'une masse adhésive au ZnO.

Formule A : Entièrement enduite (occlusive).

Formule B : Partiellement enduite.

Formule C : Ajourée.

Formule S : Bandes enduites sur la moitié de leur largeur.

Indications :

Contention des plaies. Pansements aux articulations (toutes largeurs).

Extensions continues (formule A ou B : 2 m. 1/2 x 6 et 8 cm).

Traitement sdes ulcères variqueux (formule A : 2 m. 1/2 x 8 cm).

Prévention et Traitement abortif des phlébites chirurgicales et périphlébites.

Redressement des pieds bots (formule A ou B : 2 m. 1/2 x 3 cm).

Luxations, entorses, bandages de soutien, etc...

Autres présentations :

Elastodoigts : noir ou chair.

Elastoplaies : existe en 4 x 4 cm. — 6 x 4 cm — 6 x 6 cm, etc...

Sparaisa : Pansement élastique en largeur, portant une compresse au Derrnatol dans le sens de la longueur; existe en 4, 6 et 8 cm. de large.

Elastovaccin : Protecteur après vaccination.

Elasto-yeux : S'adapte à la forme de la tête.

Elastocapsil : Emplâtre élastique au Capsicum.

Elastofuron : Emplâtre au Vigo, élastique et poreux.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 659-5.

Laboratoires FISCH et Cie, S. à r. l

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence : 104, Frg Poissonnière — PARIS (X^e). (Tél. : Trudaine 92-52.)

ÉLATINE BOUIN

Provient du traitement du Goudron de Sapin de Norvège.

Liquide limpide et de conservation indéfinie.

Dose et mode d'emploi. — Se prend mélangée à du lait chaud ou tisane pectorale ou diurétique, à la dose de 2 cuil. à soupe par tasse, plusieurs fois par jour. 1 à 2 cuil. à café pour les enfants.

A titre préventif. — En temps d'épidémie, et chez les sujets prédisposés aux inflammations trachéo-bronchiques, l'*Elatine* peut être prise additionnée à la boisson habituelle au repas, à raison d'une cuil. à dessert par verre de liquide.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches (toux rebelles, catarrhes, emphyseme, asthme) ; de la vessie et des reins (cystites, pyélites, gravelle).

Prix : Le flacon 12 fr. 80.

L. N. C. n° 474-3.

Laboratoire **FAQARD**

LONS-LE-SAUNIER (Jura).

ÉLECTRARGOL

Composition. — Argent colloïdal électrique à petits grains, isotonique et stabilisé, titrant 0,40 0/00.

Propriétés. — Antimicrobien; leucocytogénétique, sans toxicité Anti-infectieux polyvalent local et général.

Indications. — Septicémies, Pneumopathies graves, pleurésies, méningites aiguës, maladies générales, infectieuses, suppurations et infections en chirurgie générale, urologie, gynécologie et obstétrique, ophtalmologie, oto-rhino-laryngologie.

Forme et mode d'emploi.

1° *Ampoules* : de 1, 2, 5, 10, 25 cc., pour injections intramusculaires ou intraveineuses.

Doses variables suivant la gravité des cas : de 5 à 50 cc. et plus par jour.

2° *Ampoules compte-gouttes stérilisées* de 25 cc., pour instillations nasales et oculaires.

3° *Ampoule de remplissage du flacon compte-gouttes.*

4° *Flacons stérilisés* de 50, 100, 250 cc., pour pansements, lavages, injections locales.

5° *Pommade* : Tubes de 30 grammes.

6° *Ovules* : Boîtes de 6 ovules.

Laboratoires **CLIN, COMAR et Cie.**

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ELGINE JULIEN

Comprimés.

Composition :

Collargol argent colloïdal	0,05 cent.
Benzoate de soude	0,40 —
Formine.....	0,20 —

En comprimés glutinisés.

Indications. — Maladies infectieuses aiguës, Intoxications, Voies urinaires (urétrites, cystites, pyélites, prostatites), Diathèse urique (rhumatismes, goutte, lithiase).

Posologie. — *Adultes* : 3 à 6 comprimés par jour.
Enfants : 1/2 dose. Avaler avec une infusion.

Prix : 13 fr. 60. — Boîte gratuite sur demande.

Louis JULIEN

Docteur en Pharmacie de la Faculté de Paris
105, rue de Rennes — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 80-76.)

ÉLIPOL

Principe actif. — Dinitro 4-6-0-Crésol chimiquement pur.

Indications. — Embonpoint, Obésités, Oreximanie, Sédentarité, Ralentissements de la nutrition

Forme. — Comprimés glutinisés.

Doses. — 1 comprimé par fraction de 10 kg. de poids, soit :

De 70 à 80 kg. : 7 comprimés.

De 80 à 90 kg. : 8 comprimés.

De 90 à 100 kg. : 9 comprimés.

100 kg. et au-dessus : 10 comprimés.

(Dose quotidienne usuelle.)

Prix :

20 fr. 50 la boîte de 70 comprimés.

76 fr. la boîte de 350 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

ÉLIXIR BONJEAN

Mode d'action. — Tonique puissant des voies digestives. Excellent stimulant diffusible.

Indications. — Troubles de la digestion par hypofonction, gastropathies d'origine nerveuse, diarrhée de l'adulte et des enfants, choléra infantile, grippe intestinale.

Mode d'emploi. — Un verre à liqueur après les repas ou au moment des douleurs. Renouveler une demi-heure après.

Enfants : Demi-dose.

Prix : Le flacon : 19 fr. 75. Le demi-flacon : 11 fr.

Docteurs FAURE et DUSSUEL
Pharmaciens de 1^{re} classe
AIX-LES-BAINS — Tél. ; 7-48,

ÉLIXIR DÉRET

Composition. — Solution vineuse d'iode double de tanin et de mercure (0 gr. 0275 d'iode et 0 gr. 005 de Hg par cuillerée à soupe).

Propriétés. — Absence d'accidents d'hydrargyrisme grâce à la présence du tanin ; innocuité sur les voies digestives (jamais de diarrhées).

Indications. — Antisymphilitique doux, convenant aux personnes qui ne peuvent supporter un traitement mercuriel ou arsenical interne. Particulièrement recommandé chez les enfants.

Traitement d'entretien de la syphilis et de l'hérédo-syphilis par voie buccale chez les enfants, les adolescents, les femmes enceintes.

A ses propriétés d'agent thérapeutique mercuriel, l'Elixir Déret ajoute celle d'être un tonique actif.

Pesologie:

Adultes ; 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

A prendre en deux fois, dans un verre à liqueur gradué, pour éviter la réaction qui se produirait sur le métal de la cuiller, doses pouvant être doublées en cas de besoin.

Forme. — Flacons de 300 cc.

Permet le traitement d'entretien dissimulé,

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉLIXIR DUCHAMP


Composition. — Extrait d'eaux-mères de Foie de Morue, Quinquina, Arrhénal et Phosphates, Cacao vanillé.

Propriétés thérapeutiques. — D'un goût exquis, apéritif puissant, reconstituant énergique, tonique et hématopoïétique, l'*Elixir Duchamp* remplace avantageusement l'huile de foie de morue, les amers et les fortifiants.

Indications. — Tous états de faiblesse physique ou intellectuelle, Manque d'appétit, Grippe, Tuberculose, Rachitisme, Convalescence, Lymphatisme, Scrofule, etc.

Dose. — 1 verre à liqueur (enfants, 1 cuillère à soupe) un quart d'heure avant les repas. Pur ou avec de l'eau.

Prix : 24 fr. 50 le flacon de 350 cc.

Laboratoires RENÉ de GRAUWE,   
Pharmacien de 1^{re} classe.

La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS.

ÉLIXIR DUCRO

Agent dynamique aux oranges amères et phosphore assimilable.

Tonique *antianorexique* : asthénie, convalescences, états consomptifs, sénilité, grossesse : 1 cuillerée à soupe ou 1 verre à liqueur, selon l'âge, pur ou étendu d'un peu d'eau, avant ou entre les repas.

Eupeptique, euphorisant : mêmes doses, pur, après les repas.

Action d'*épargne* : pneumonie, grippe, maladies infectieuses adynamiques : 1 cuillerée à café ou à soupe, selon l'âge, toutes les 2 heures.

Prix : le flacon, 18 fr. 85.

(Taxe d'armement comprise)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-2.

DURIEZ

20, place des Vosges. — PARIS.

ÉLIXIR EUPEPTIQUE TISY

Composition. — Pancréatine, diastase et pepsine additionnées de sécrétine et d'entérokinase.

Avantages. — Digère les corps gras, amylacés et protéiques.

Contient à l'état de pureté tous les ferments de l'estomac et de l'intestin. De goût très agréable. Se conserve pendant de longues années.

Indications thérapeutiques. — Embarras gastriques, dyspepsie, gastro-entéralgie, douleurs et dilatations d'estomac, manque d'appétit, digestions difficiles, diarrhée, athrepsie, vomissements

Posologie. — Un à deux verres à liqueur au début ou à la fin de chaque repas.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le N° 544-1.
Prix : 24 fr. 50.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

ELIXIR eupnéique MARTIN MAZADE

Composition. — Iodure de Caféine stable, 0 gr. 25 par cuillerée à café.

Posologie. — *Etats aigus* : 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée, de café, de lait.

Etats chroniques : 1 cuillerée à café le matin avant le petit déjeuner.

Propriétés thérapeutiques. — Antiasthmatique, Diurétique, Toni-Cardiaque, Respiratoire.

Indications. — Emphysème, Asthme, Artériosclérose, Dyspnées, Néphrites, Angine de poitrine, Affections cardio-rénales, Maladies infectieuses, Obésité, Bronchites chroniques.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 643-1.

Prix : 18 fr. 75 le flacon de 185 cc. environ.

Laboratoire MARTIN MAZADE

Pierre SUIFFET, Docteur en Pharmacie.

SAINT-RAPHAEL (Var). (Tél. : 0-40.)

ÉLIXIR GODFRIN

Formule. — Teinture de simarouba, 7 gr. 50 ; Teinture de grenadier, 7 gr. 50 ; Elixir parégorique, 12 gr. ; Sirop de cachou, 40 gr. pour 125 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Antidysentérique, astringent, sédatif.

Indications. — Diarrhées de toute nature, Entérites et entéro-colites, Dysenteries amibiennes et bacillaires.

Mode d'emploi. — *Cas aigus.* — Prendre toutes les 2 heures : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe. — *Enfants de plus de 10 ans.* : 1 cuillerée à dessert. — *Enfants de 6 à 10 ans* : 1 cuillerée à café. Ne pas donner au-dessous de 6 ans.

Cas chroniques. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, loin des repas.

Prix : 10 francs.

C. MAURY, Pharmacien de 1^{re} classe.

6, rue de Paris — JOINVILLE-LE-PONT

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 117-1.

(Tél. : Gravelle 20-50.)

ÉLIXIR GREZ

Chlorhydropepsique.

Spécialement préparé pour combattre l'insuffisance gastrique dans toutes les formes de l'Hypochlorhydrie.

A base de chlorhydropepsine unie aux amers digestifs. Son action doit être recherchée dans tous les cas où les fonctions sécrétrices de l'estomac sont déficientes, depuis la simple dyspepsie due à une mastication insuffisante ou trop rapide (mauvaise dentition, repas précipités, etc.) jusqu'aux plus graves troubles sécrétoires.

Indications. — Insuffisances gastriques, Hypochlorhydrie, Aérophagie, Régime déchloruré, Vomissements de la grossesse et de la tuberculose, Gastro-entérites, Ptoses gastriques, Inappétence, etc...

Posologie. — Un verre à liqueur pur ou coupé d'eau, après chaque repas.

Prix : 23 fr. 45. Enregistré au L. N. C. M., n° 696. Laboratoire **MONIN**

Bureaux et correspondance.

49, rue de Maubeuge - PARIS (IX^e). (Trud. : 37-45.)

ÉLIXIR HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Titrage. — Par cuillerée à soupe : 0,01 Bi-iodure de mercure. — 0,05 Iodure de potassium.

Originalité. — Excipient spécial à base de Miel, lui procurant un *goût très agréable*, et une parfaite *tolérance* pour l'estomac.

Présentation dissimulée. — Aucune indication de maladie, ni de nature de médicament.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour au début ou au milieu des repas.

Enfants de 9 à 14 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

— de 5 à 8 — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— de 2 à 4 — 1 à 2 — — —

A prescrire. — Par périodes de 20 jours, intercalées de préférence entre deux périodes de 20 jours de suppositoires Hymel.

Indications. — Traitement d'entretien de la Syphilis, Imprégnation mercurielle (entre les séries de piqûres). Hérédo-syphilis. Dermatoses.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen, PARIS.

ÉLIXIR MANNET FERRO-ERGOTÉ

Composition :

Ergot de Seigle 5 cgr.

Fer..... 10 —

Par cuillerée à café.

Indications. — Anémie, Leucorrhée, Règles irrégulières, Métrorragies consécutives à l'Avortement, à l'Accouchement et à la Ménopause, Ménorragies de la puberté, Incontinence d'urine.

Posologie. — 4 à 8 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires MANNET

LOUDUN (Vienne).

(Tél. : 134 Loudun.)

ÉLIXIR MIALHE

Pepsine ou pancréatine.

Préparation. — Suc gastrique ou pancréatique complet. Un procédé particulier lui conserve toute son activité plusieurs années. (*Journal de Pharmacie et de Chimie.*)

Indications thérapeutiques. — Dans tous les cas où le suc gastrique ou pancréatique fait défaut : Dyspepsies, Douleurs nerveuses, Digestions lentes et difficiles, Vomissements incoercibles de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe ou un verre à liqueur immédiatement après le repas.

Demi-dose pour les enfants.

Conservation : 5 années. Contenance 250 cmc.

Prix : 21 fr. 20. — L. N. C. M. n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, r. Favart — PARIS (2^e). (Tél. : Rich. 35-10.)

ÉLIXIR RODI

Traitement arsenico-mercuriel dissimulé.

Formule. — Contient par cuillerée à soupe :

Iodure d'arsenic.....	0,005
Iodure d'Hg	0,01
Iodure de K	0,25

Dans un véhicule de goût agréable, « non alcoolisé ».

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe au milieu des 2 principaux repas dans un peu d'eau.

Enfants (très bonne tolérance) : 1 cuillerée à café par jour en 2 fois pour les nourrissons.

Ensuite, 1 cuillerée à café par 3 ans d'âge.

Indications :

Traitement complémentaire et d'entretien de la S. acquise ; traitement facile de la S. héréditaire des enfants ; traitement efficace des S. tertiaires grâce à la présence d'iodes ; traitement dissimulé (Dépuratif tri-iodé) de toutes les formes : S. conjugale, cas douteux, traitement discret dans les affections évoluant sur terrain syphilitique ou hérédo-syphilitique (dermatoses, eczéma, ulcères variqueux, incontinence d'urine, migraines, épilepsie, rhumatismes, etc.).

Se prescrit généralement par cure de 20 jours (2 flacons) tous les 3 mois.

Prix : 21 fr. 20.

Laboratoires FABIU

132, avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 87-85.)

ÉLIXIR SPES DU D^r GUIRAUD

Ex-pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Composition de l'Elixir. — Iodure double d'Arsenic et de Mercure.
Préparation moins alcoolique qu'un vin et posologiquement assimilable au **Sirap de Gibert**.

Une cuillerée à soupe contient exactement :

l.....	0,008	} correspondant à {	0,01 Biiodure Hg. 0,005 Iodure As.
Hg.....	0,006		
As.....	0,001		

Très agréable à prendre.

Indications. — *Syphilis et Hérédo-syphilis*. Bien toléré, son emploi n'occasionne ni hydrargyrisme, ni stomatite, ni érythème, ni diarrhée.

Doses : { *Nourrissons* : 1 demi-cuillerée à café par jour.
De 1 à 3 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.
De 3 à 7 ans : 2 cuillerées à café par jour.
De 7 à 15 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.
De 15 à 20 ans : 3 cuillerées à dessert par jour.
Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage par jour.

A prendre au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau. Se servir du verre gradué qui accompagne chaque flacon.

Observation importante. — Présenté comme tonique et modificateur, l'Elixir **Spes** ne contient aucune indication permettant de soupçonner la présence du Mercure. Susceptible de rendre les plus grands services en Gynécologie, Ophthalmologie, Oto-Rhino-Laryngologie.

Prix : 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-6.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél.: Marcadet 37-98.)

ELKIN (Dragées, Granules).

Bile, Soufre, Pancréatine.

Sans aucun drastique.

Indications thérapeutiques. — **Digestions incomplètes**, Somnolence, Ballonnement, **Douleurs Post-Prandiales**, Pesanteurs après les repas. Insuffisance hépato-biliaire, Insuffisance pancréatique, Dermatoses hémoclasiques, Rougeurs de la face, Urticair, Eczéma, Acné juvénile.

Présentation et Posologie. — Pour les **Adultes**:
Forme **dragées** (à 0,05 par pilule dragéifiée), une ou deux pendant ou après les deux principaux repas. (Avaler sans croquer.)

Pour les **Enfants**: forme **granules** (à 0,01 par granule), deux à quatre par repas (à prendre dans un dessert : compote, confitures, etc.).

La boîte de 40 dragées ou 60 granules : 16 fr. 50.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél.: Littré 54-07.)

EMBROCAN

Embrocation au tiers d'essence de térébenthine sans aucune addition de rubéfiant.

Composition. — Essence de térébenthine pure, une partie. — crème de savon, 2 parties. Ne dessèche pas l'épiderme, ne rancit pas.

Massage, frictions, applications.

Aussi agréable à employer qu'un Cold-Cream.

Le révulsif le plus efficace et le mieux toléré.

TÉRÉBANE. — Solution mère à 66 p. 100 d'essence de térébenthine.

Embrocane et Térébane sont miscibles à l'eau en toutes proportions.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SAPORTA

59, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 02-27.)

EMBROCATION ROSSO

Résolutive et analgésique, stimule la circulation périphérique complète toute massothérapie.

Formule :

Essence de térébenthine.....	50 cc.
Trichlorodéthylméthane.....	5 cc.
Camphocarbonate d'ammoniaque.....	4 cc.
Emulsion d'albuminoïde, Q. S. pour.....	100 cc.

Donne vigueur, souplesse et élasticité aux muscles. Supprime radicalement : Fatigues, crampes, engourdissements. Accroît la contractilité musculaire, augmente les moyens physiques.

Mode d'emploi :

I. *Entraînement et sports.* — Verser un peu d'Embrocation Rosso dans la paume de la main et frictionner légèrement les membres jusqu'à l'obtention d'une sensation de chaleur et de bien-être. La même opération répétée au cours de l'entraînement ou en vue d'un effort empêche toute crampe musculaire douloureuse et élimine la rigidité et l'engourdissement.

II. *Rhumatismes, Névralgies, Lumbago, Entorses, Foulures.* — Frictionner la région douloureuse deux à trois fois par jour et la recouvrir de coton cardé.

Dans les entorses et foulures, appliquer en outre un pansement sec compressif (bande élastique). Si la douleur est très vive, augmenter le nombre d'applications.

III. *Refroidissements et coups d'air.* — Frictionner énergiquement la poitrine et la région dorsale avec un linge imbibé d'Embrocation Rosso.

Usage externe.

Prix : Le flacon de 210 gr. : 25 francs.

Produits Biochimiques ROSSO.

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e). (Tél. : Dor. 56-38.)

EMBRYHORMONE

Cure de revitalisation et de rajeunissement.

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Association d'hormones embryonnaires et d'hormones désalbuminées de glande interstitielle, glandes surrénales, glande thyroïde, [extrait hépatique en solution phosphorique catalysée par le chlorure de zinc et de manganèse.

Propriétés. — Tonique très puissant qui assure un relèvement rapide des forces physiques et intellectuelles, produit un état d'euphorie et entraîne un véritable rajeunissement de l'organisme.

Recommandé dans tous les cas de *déficience organique*, d'*asthénie*, de *déséquilibre nerveux*, d'*impuissance*, de *fatigue cérébrale*, d'*anémie* et de *surmenage*.

Mode d'emploi. — 1 ampoule par jour pendant 10 jours par mois.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 403-49.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-St-Antoine — PARIS.

EMBRYOXYTOL

Synergie Embryocalcique

Composition. — Pulpe embryonnaire desséchée à froid et Gluconate de chaux.

Indications. — Troubles de la croissance, Troubles endocriniens, Rachitisme, Décalcifications, Terrain tuberculeux, Pleurésies, Consolidations de fractures, Troubles de la gestation, Insuffisance du myocarde, Caries dentaires, Convalescences.

Forme. — Granulé fondant à croquer. Goût agréable.

Posologie :

Adultes : 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour avant les repas.

Prix de la boîte : 20 fr. 40.

Laboratoires " LA BIOMARINE "

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. : 14-54.)

EMBRYO-DYNAM

Forme. — Ampoules buvables de goût agréable.

Composition. — 1° Extrait embryonnaire.

2° Extrait de foie de veau et de muqueuse gastrique.

3° Phosphates, fer, cuivre assimilables.

4° Acides aminés.

Propriétés. — Puissant dynamiseur.

Indications. — Anémies, Asthénies, Anorexies, Convalescences, Croissances, Cachexies, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Déficiences endocriniennes.

Posologie. — *Adultes* : 1 ampoule dans le premier verre de boisson aux deux principaux repas.

Enfants : 1 ampoule dans un peu d'eau avant le repas de midi.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 10 cc.

Laboratoires de L'EMBRYO-DYNAM

4, rue Balzac — PARIS (VIII^e).

EMBRYOL

Suc embryonnaire vivant

Activité contrôlée biologiquement par le test de la culture des tissus.

Propriétés et indications : Catalyseur biologique de toute récupération tissulaire et fonctionnelle. — Troubles de la croissance, Troubles endocriniens, Troubles de l'hématopoïèse (anémies, leucémies), Ulcères gastriques, Cicatrisations cutanées et muqueuses, Suppurations, Maladies infectieuses, Choc opératoire, Surmenage, Sénilité, Psychasthénies.

Formes et posologie :

EMBRYOL buvable

Boîte de 10 amp. de 5 cc. (1 unité-embryon par amp.) Prix : 48 fr. 95.

Adultes : 2 ampoules par jour dans de l'eau froide sucrée, un quart d'heure avant les repas.

Enfants jusqu'à 10 ans : demi-dose.

Opérés : voie rectale : 3 doses de 5 amp. dans 30 cc. sérum physiologique (matin de l'opération, 1 heure et 4 heures après).

EMBRYOL injectable

Boîtes de 5 amp. de 5 cc. EMBRYOL (1 unité-embryon par amp.) et de 5 amp. de 5 cc. sérum physiologique glucosé. Prix : 35 fr. 70.

Adultes et enfants : série de 10 injections (1 injection par jour).

Nourrissons : demi-dose.

EMBRYOL pansements

Boîte de 3 amp. de 10 cc. (2 unités-embryon par amp.) Prix : 30 fr. 60.

Plaies atones — Cicatrisations difficiles.

Laboratoires " LA BIOMARINE "

DIEPPE (Seine-Inférieure).

(Tél. 14-54.)

EMBRYONA PROBIOS

Présentation. — En boîtes de 8 flacons-ampoules : 51 francs, et 4 flacons ampoules : 25 fr. 50.

Principes actifs. — Extraits secs d'embryons de poulets. Application thérapeutique des propriétés vivifiantes des tréphones embryonnaires (gallinacées).

Indications. — *Chez le nourrisson et l'enfant :*
Tous les troubles de développement musculaire, squelettique ou intellectuel, Amyotrophies, Paralysie, Rachitisme, Retard de la marche ou de la parole, Athrepsies, Cachexies, Anémies et états prétuberculeux.

Chez l'adulte des deux sexes : Toutes les déviations des fonctions physiologiques, Insuffisances digestives, Instabilité mentale, Sénilité précoce (vieillesse prématurée), Aspect vieillot du visage, Atrophie et taches cutanées, Rides précoces, Fatigabilité anormale.

Chez les femmes : Acné de la puberté, Dysménorrhées, Incommodités de la ménopause normale ou provoquée chirurgicalement.

En chirurgie, traitement préventif et curatif du choc opératoire.

Mode d'emploi. — A prendre en poudre ou délayée dans un peu d'eau ou de bouillon avant les repas.

Adultes : 2 à 4 flacons-ampoules par jour.

Enfants : 1 à 2 —

Nourrissons : 1 —

Pour le traitement préventif du choc *chirurgical*, 3 flacons-ampoules dissous dans ~~20~~ de sérum artificiel *en lavement à garder*. Renouveler 5 heures après l'opération la dose précédente en lavement et de même 24 et 36 heures après l'opération.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-55.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

EMGÉ LUMIÈRE

Prophylaxie et traitement de tous Troubles liée à un état d'instabilité humorale.

L'Emgé Lumière correspond à la formule $S^2 O^3 Mg$. Son action est complexe, nous vous l'exposons ci-dessous :

Sous la forme de Comprimés :

Il est le médicament des maintes Constipations.

Il est indiqué dans les Diarrhées post-prandiales ;

Il est particulièrement efficace dans les insuffisances hépatiques ;

Il réalise une médication des manifestations anaphylactiques, luttant contre l'instabilité humorale ;

Il est un antiseptique bronchique pulmonaire ;

Il est le médicament type des Toxémies d'origine intestinale ;

Il permet de réaliser la reminéralisation magnésienne, et maintient ou rectifie l'équilibre neuro-végétatif.

En résumé, les comprimés d'Emgé Lumière sont essentiellement régulateurs des fonctions digestives.

Ampoules d'Emgé Lumière, pour injections intramusculaires, est un stimulant des fonctions endo et exocriniennes du foie, mais il est surtout un médicament anti-choc omnivalent.

C'est la médication type de toutes les manifestations dites arthritiques. — Elles exercent une action directe sur l'équilibre humoral. — En injections intra veineuses, c'est une médication héroïque des états dépressifs de la cyclothymie. — Indications particulières en psychiatrie (Epilepsie, Manie, Accès anxieux).

Indications. — Tous états d'instabilité humorale (anaphylaxie), Insuffisance hépatique et pancréatique, Désintoxication par formation de sulfo-conjugués atoxiques.

Formuler. — Une boîte de comprimés d'Emgé Lumière, dosés à 0 gr. 60.

Une boîte de 3 ampoules de 10 cc. d'Emgé Lumière, à 10 p. 100.

Doses. — 1 à 4 comprimés par jour (avalés tels quels avec un peu d'eau) au milieu des repas.

De l'injection intra musculaire quotidienne à 3 ou 4 par semaine. Aucune réaction locale ni générale.

Injection intra veineuse, 1 tous les deux jours (administrer lentement).

Laboratoires LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

EMPLATRES ROGÉ-CAVAILLÈS

Caoutchoutés, Adhésifs (formule de l'hôpital Saint-Louis).

Huile de cade : Psoriasis, Dermatoses squameuses.

Oxyde de zinc : Eczémas torpides, Lichénisation.

De Vidal : Furoncles, Impétigo, Folliculites.

Prix : 12 fr. 25, L. N. C. M. n° 20-15.

Colopastre. — Bandes adhésives à l'Oxyde de zinc pour pansements : toutes dimensions.

Gaze anadhère. — Gaze grasse stérilisée, non adhérente aux plaies.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, r. Singer. — PARIS (XVI^e). (Tél. : Auteuil 65-97.)

Détail : Phie 116, boulevard Haussmann, et toutes pharmacies.

ENDOCAÏNE-ADRIANINE

Composition :

Association de l'adrénaline physiologique pure et du para-aminobenzoyldiéthylaminoéthanol (Novocaïnum).

Indications :

Anesthésique employé principalement en chirurgie dentaire.

Présentation et prix. — 2 formes :

a. Ampoules de 1 cc. contenant 1 cgr. d'endocaïne, et 1 goutte d'adrianine.

b. Ampoules de 1 cc. contenant 2 cgr. d'endocaïne et 1 goutte d'adrianine.

La boîte de 6 ampoules : 7 fr. 95.

— 12 — : 11 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. n° 523-6.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ENDOCARBONE ERCE

Composition. — Suspension colloïdale de charbon végétal activé à l p. 100.

Propriétés et avantages :

- 1° Produit chimiquement neutre ;
- 2° Hautes qualités physiques : adsorption, absorption, charge électronique, rayonnement ;
- 3° Tamisage sélectif. Préparation soignée.

Indications. — *Action anti-infectieuse :*

- a. Infections générales : Septicémies, Fièvre puerpérale, Méningite, Tétanos, Colibacillooses, etc...
- b. Infections locales : Lymphangites, Phlébites, Cholécystites, etc.
- c. Affections dermatologiques : Erysipèle, Furonculose, Eczéma, Anthrax.

Action anti-toxique : Coma barbiturique.

Forme. — Ampoules de 5 cc.

Posologie. — Injections intra-veineuses. *Adultes :* doses croissantes, 3, 4, 5 cc. Cas graves : 2 à 3 injections de 5 cc. par 24 heures.

Enfants : doses croissantes, 1, 2, 3 cc.

Prix : 18 fr. 35.

Enregistré au L. N. C. n° 506-56.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

ENDOCRISINES

(Voir *Opothérapie Fournier.*)

Extraits totaux d'organes frais. Hormones.

TOUTES LES GLANDES

(Voir le détail à *Opothérapie Fournier.*)

Prescrire : ENDOCRISINE FOIE, etc.

Cachets et comprimés dosés en extrait sec.

Ampoules dosées en glande fraîche, soit environ 5 fois le poids d'extrait sec.

Posologie générale. — 2 à 4 cachets, 3 à 6 comprimés ou 1 ampoule par jour.

Exécution rapide de toutes les prescriptions magistrales opothérapiques.

Échantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

ENDOLACGÉNINE

Composition. — Extrait total de glandes mammaires en activité et de placenta.

Propriétés. — Détermine une rapide excitation sécrétoire de la mamelle suivie d'une activité régulière et constante. Provoque dès le 2^e jour une turgidité de la mamelle suivie 3 ou 4 jours après d'une sécrétion lactée très nette.

Posologie :

3 comprimés du 1^{er} au 6^e jour ;

6 comprimés du 7^e au 12^e jour ;

9 comprimés du 13^e au 18^e jour.

Ensuite diminuer la dose graduellement selon la tolérance individuelle.

A prendre en trois doses avant les repas.

Présentation : flacons de 50 comprimés.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71 et 72.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ENDO-OVARINA

Composition. — Extrait total concentré d'ovaire.

Propriétés. — Compense chez la femme l'insuffisance ovarienne. Est recommandée en particulier à l'époque de la puberté et pour corriger les troubles de la ménopause. Elle fait disparaître les malaises dont souffre la femme : migraines, règles douloureuses, etc., et permet de rester très longtemps jeune.

Présentation :

Ampoules : en boîte de 6 amp de 1 cc.

Comprimés : en boîtes de 50.

Solution : en flacons de 60 grammes.

Posologie :

Posologie :

Solution : De XX à XXX gouttes par jour.

Comprimés : De 4 à 8 par jour.

Ampoules : 1 injection de 1 cc. par jour.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71 et 72.)

Fournisseur des Hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ENDOPANCRINE

Insuline Française présentée sous forme liquide
pour injections hypodermiques.

Endopancrine tube de 5cc. Chaque cc. titré à 20 unités cliniques.

Endopancrine 40 : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

Endopancrine 5 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 5 unités cliniques.

Endopancrine 10 : boîte de 12 ampoules de 1 cc. titré à 10 unités cliniques.

Endopancrine 20 : boîte de 10 ampoules de 1 cc. titré à 20 unités cliniques.

Endopancrine-Protamine-Zinc : tube de 5 cc. Chaque cc. titré à 40 unités cliniques.

Indications : Diabète et ses complications — Acidoses — Vomissements incoercibles de la grossesse — Dénutrition chez l'adulte et chez l'enfant — Troubles trophiques des nourrissons — Insuffisances hépatiques — Artérites oblitérantes — Troubles Parkinsoniens — Ménorrhagies d'origine ovarienne — Ulcérations chroniques — Furonculose chronique.

Dose du début dans le diabète : 20 unités cliniques. La conduite du traitement ultérieur sera dictée par les dosages du sucre dans les urines ou éventuellement dans le sang.

Endopancrine : 16 fr. 30. — Endopancrine 40 : 30 fr. 60.

Endopancrine 5 : 13 fr. 25. — Endopancrine 10 : 22 fr. 95.

Endopancrine 20 : 30 fr. 60. — Endopancrine-Protamine-Zinc : 40 fr. 80.

Demandez nos notices :

« La thérapeutique du diabète par l'Insuline. »

« Les applications de l'Insuline en dehors du diabète. »

Pour recevoir, à titre d'échantillon gracieux, le modèle de vente, en faire la demande en indiquant exactement le dosage que l'on désire utiliser. L. N. C. nos 234-1-1, 234-16, 234-1-3, 234-1-2, 234-36.

Laboratoire de l'Endopancrine

48, rue de la Procession — PARIS (15^e). (Tél. : Suffren 07-70.)

ENDOTHYMUSINE

Extrait de thymus injectable délipodé
et désalbuminé.

Indications. — Retard de croissance de l'enfant, arrêt de croissance du nourrisson, achondroplasie, ectopies testiculaires, troubles des règles chez la jeune fille, syndromes d'obésité dystrophiques de la période prépubère.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube.

Chaque centimètre cube = 1 gr. de thymus frais. Prix : 19 fr. 90.

— — — = 3 gr. de thymus frais. — : 26 francs.

— — — = 5 gr. de thymus frais. — : 32 fr. 65.

— — — = 10 gr. de thymus frais. — : 48 fr. 95.

— — — = 20 gr. de thymus frais. — : 70 fr. 40.

Conduite du traitement. — Série de 12 injections à raison de 3 par semaine. *Adultes* : commencer par 5 gr., faire 10 gr. si nécessaire. *Enfants* : commencer par 1 gr., faire 3 gr. si nécessaire. Intervalle d'un mois entre les deux séries pendant lequel il est bon de donner 2 cachets par jour de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50. Pour les enfants indociles qui ne supportent pas les piqûres, remplacer celles-ci par 2 cachets de « HOLOTHYMUSINE » à 0 gr. 50 de poudre de thymus avant les principaux repas.

L. N. C. nos 234-2-1, 234-2-3, 234-2-4, 234-18, 234-35.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e). (Tél. Suffren : 07-70.)

ENDOXIDINE

Traitement de l'obésité
par l'opothérapie embryonnaire.

Composition. — Extrait embryonnaire séché dans le vide et pulvérisé. Ne contient pas de thyroïde.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Stimule les combustions organiques et provoque l'utilisation des réserves adipeuses. Détermine une diminution progressive du poids sans provoquer le moindre trouble. Constitue le traitement de choix pour les personnes ne supportant pas les préparations thyroïdiennes ou chimiques.

Posologie :

4 comprimés	par jour	pendant la première semaine.
6	—	— la deuxième —
8	—	— la troisième —
10	—	— la quatrième —

Ne pas dépasser la dose de 10 comprimés par jour.

A prendre avant les repas : la moitié de la dose au repas de midi et la moitié au repas du soir.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71 et 72.)

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

ÉNERGINE IODÉE DE BERCK

Bardane — Iode — Noyer — Arsenic.

Forme. — Sirop agréable.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Croissance, lymphatisme, scrofule, ganglions.

Le flacon : 18 fr. 75.

ÉNERGINE PHOSPHORÉE DE BERCK

Complexe opo-minéral nucléine.

Forme. — Granulée.

Posologie. — *Enfants* : 1 cuillerée à dessert deux fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe deux fois par jour.

Indications. — Convalescence, pré tuberculose, faiblesse osseuse, asthénie, etc.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire Dr RUIN,

Pharmacien des Hôpitaux,

10, rue du Bloc — AMIENS (Somme).

ÉNÉSOL

Sels arsenico-mercuriels.

Propriétés. — 70 fois moins toxique que le biiodure. Ne donne pas de phénomènes de stomatite. Indolence de l'injection. Activité spéciale accrue du fait de l'arsenic. L'élément arsenical, d'autre part, agit comme antitoxique à l'égard du mercure que l'on peut administrer à doses plus fortes sans accidents.

Indications. — Syphilis dans toutes ses manifestations, surtout cures d'entretien. Syphilis tertiaires et Syphilis anciennes. Psoriasis.

Posologie. — Doses moyennes : 2 cc. correspondant à 0 gr. 06 d'Enésol par jour.

Doses massives ou de saturation : Injections intramusculaires de 4 à 6 cc. (soit 12 à 18 centigr. d'Enésol), tous les 2 ou 3 jours. Injections intraveineuses de 2 à 10 cc. (soit 6 à 30 centigr. d'Enésol), selon le sujet, l'urgence et la gravité, tous les 2 ou 3 jours.

Formes. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc. d'une solution dosée à 0 gr. 03 par cc.

Collyres d'Enésol à 0 gr. 03 d'Enésol par 10 cc. : Affusions ou instillations oculaires de quelques gouttes d'Enésol plusieurs fois par jour (Complications oculaires de la syphilis).

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ÉNIODE LEFEBVRE

Composition. — Iode en combinaison stable avec une albumine d'origine animale.

Forme. — Comprimés kératinisés contenant chacun 1 centigramme d'iode en combinaison organique.

Propriétés thérapeutiques. — L'Éniode possède toutes les propriétés de l'Iode, sans les inconvénients de l'iodisme.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 à 2 comprimés par jour.

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, avant les repas.

Prix : 15 fr. 30.

Pharmacie GRIGNON.

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Opéra 30-50.)

« Sel de fruit » **ENO** « Fruit Salt »

Poudre fine, entièrement soluble dans l'eau avec effervescence. Ne contient ni sucre, ni édulcorant, ni sulfates alcalins.
Très agréable à prendre.

Indications :

Troubles de l'appareil digestif. Régularise le fonctionnement de l'estomac. Active les digestions paresseuses (ballonnements, malaises après les repas). Modère l'hypersécrétion pathologique (brûlures, renvois acides). Particulièrement efficace dans les écarts et changements de régime, dans les vomissements simples ou gravidiques.

Sur l'intestin, action laxative, douce et régulière, très indiquée chez les femmes enceintes et les enfants.

Affections du foie. Soulage cet organe en favorisant ses sécrétions.

Arthritisme, goutte, obésité, éruptions cutanées, migraines. Contribue à l'élimination des déchets toxiques qui, dans ces affections, encombrant l'organisme.

Doses :

Adultes : 1 cuiller à café dans un verre d'eau, le soir au coucher ou le matin au réveil.

Enfants (à partir de 6 ans) : 1/3 et 1/2 cuiller.

Prix : 14 fr. 55 et 25 fr. 50, Durée : 3 et 6 semaines.

Laboratoire LACOMBE

Rue Barbès — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 10-48.)

ENTÉRARGOL

Spécifique puissant de toutes les affections intestinales.

Composition. — Association d'Argent Colloïdal, Sulfate Neutre d'Oxyquinoléine et Magnésie légère.

Propriétés. — Bactéricide et Antiseptique Intestinal, Stable, Atoxique, ne constipe pas, n'irrite pas.

Indications thérapeutiques. — Entérite, Diarrhées, Dysenterie, Affections à colibacilles, Typhoïde, Grippe intestinale. Diarrhées des nourrissons et des enfants, Maladies infec. des voies urinaires.

Présentation.

Granulé : *Nourrissons* dès le premier âge et *Enfants* jusqu'à huit ans, Pilules : *Enfants* à partir de huit ans et *Adultes*.

De 10 à 15 jours de traitement, 18 francs.

Posologie. — *Nourrissons* : Dès le premier âge et jusqu'à 6 mois : 1 cuillerée à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

De 6 à 18 mois : 1 cuill. et demie à café de granulé en 3 ou 4 fois dans une journée.

Enfants : De 18 mois à 4 ans : 1 à 2 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour.

De 4 ans à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à café de granulé 2 fois par jour. A faire prendre avant les tétées ou repas.

Enfants à partir de 8 ans : 1 à 2 pilules avant chacun des principaux repas.

Adultes : 2 à 3 pilules avant chacun des principaux repas.

Laboratoires PHOSMA, Marcel FRÉMONT, docteur en Médecine de la Faculté de Bordeaux, Ph^{en} de 1^{re} classe.

47, rue Maleret — BORDEAUX

ENTÉRASPIRINE SANOVA

Synergie médicamenteuse plus active que l'aspirine seule et sans dommage pour l'estomac et le cœur.

Formule pour une dragée :

Bromhydrate de quinine	0,03
Pyramidon	0,02
Aspirine	0,35
Caféine	0,02

En deux noyaux solubles l'un dans l'estomac et l'autre dans le duodénum.

Le Bromhydrate de quinine tonifie l'estomac, — la caféine, le cœur, — l'aspirine n'est mise en liberté que dans l'intestin.

Indications. — Antithermique, antirhumatismale, antialgique, anti-infectieuse et tonicardiaque.

Doses. — 1 ou 2 comprimés, jusqu'à 6 ou 8 par jour, de préférence aux repas.

Pourquoi prendre 0,50 d'aspirine si 0,35 suffisent.

Pourquoi prendre 1 gr. d'aspirine si 0,70 font mieux.

Prix : 8 francs.

Produits SANOVA
Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 04-49.)

ENTÉRIODE

Comprimés combinés d'IODE et d'hydrocarbures de Carbone donnant naissance dans l'intestin seulement à de l'IODE NAISSANT.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant désinfectant intestinal,

Facile à absorber, ne provoquant ni irritations ni iodisme.

Spécifique de toutes les entérites et plus particulièrement des entérites infantiles,

Posologie.

Nourrissons : 3 fois par jour 1 comprimé écrasé dans un peu d'eau, de bouillon de légumes ou de lait.

Enfants : 3 fois par jour 2 comprimés à la fin des repas.

Adultes : 3 fois par jour 3 comprimés à la fin des repas.

Cures de 3 semaines à 1 mois, renouvelées aussi souvent qu'il est nécessaire,

Prix : 19 fr. 15

Laboratoires de l'Entériode
89, rue de Clichy — PARIS.
(Tél. : Trinité 65-16.)

ENTÉRO-ANTIGÈNES

du prof. DANYSZ, de l'Institut Pasteur.

Indications. — *Maladies des voies digestives* : Pharyngites chroniques, dyspepsies de sensibilisation, constipations chroniques, diarrhées, intoxications alimentaires, colites, entérocolites, dysenteries microbiennes (Shiga, Fleixner, etc.). Appendicite chronique et tous les troubles fonctionnels de l'intestin.

Asthme, Rhume des foins, Emphysème, Dyspnée provoquée par certaines odeurs, certaines substances alimentaires, les changements de température, etc.

Maladies de la peau : Eczémas, Eczéma variqueux, Urticaires, Prurits généralisés ou localisés (anal, vaginal, etc.), Maladie de Quincke, Psoriasis, Prurigo de Hébra, Furunculose, Acné juvénile, Folliculites, Sclérodermie, etc.

Affections du foie : Insuffisances hépatiques. Cholécystites aiguës ou chroniques non lithiasiques.

Colibacillose, Cystites à colibacille.

Certaines formes de rhumatismes aigus ou chroniques, troubles de la ménopause.

Certaines migraines, neurasthénies,

Et dans tous les cas de *Dysharmonie endocrinienne*, soit par excès, soit par insuffisance.

Deux formes. — 1° Ampoules à injecter ; 2° Ampoules à boire.

Boîtes de 10 ampoules de 1^{cc}. — Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 30 francs.

Durée moyenne du traitement des unités de vente :

Au début du traitement 10 à 20 jours ; ensuite 15 à 30 jours et plus, suivant indications du médecin traitant.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-1.

Lab. DUCATTE, 10, rue Barbette — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 78-10.)

ENTÉROBYL DEHAUSSY

En une seule prescription réalise effectivement :

Le drainage médical des voies biliaires ;
La désinfection atoxique de l'intestin et de la bile évacuée.

La désensibilisation de l'organisme.

Composition :

Cholérétiques et cholagogues : Chlorure de Magnésium, Sulfate de Magnésie, Polypeptides.

Antiseptiques : Hexaméthylènetétramine, Charbon animal pur.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholécystites chroniques, Congestion hépatique, Cirrhoses (alcool, paludisme), Ictère, Cholémie familiale.

Troubles digestifs et troubles divers d'origine hépato-biliaire : Constipation, Diarrhées, Migraines, Vertiges, Urticaire, Prurit.

Posologie et Formes. — Granulé. Cachets.

Drainage biliaire : 1 à 4 cuillerées à café ou 1 à 4 cachets, le matin à jeun avec un demi-verre d'eau chaude ou une infusion. Rester étendu sur le côté droit un quart d'heure.

Tâter la sensibilité du malade en commençant par des doses faibles.

Cure d'entretien : 1 à 2 cuillerées à café, ou 1 à 2 cachets, vingt minutes avant les repas.

Prix : 18 fr. 50

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE

ENTÉROCOCOÈNE CARRION

Vaccin entérococcique buvable.

Composition. — Emulsion d'entérocoques de Thiercelin, 2 000 millions de corps microbiens pour 1 cc. d'eau physiologique (soit dix milliards par tube scellé).

Forme. — Tubes scellés de 5 cc.

Indications. — Grippe, infections gastro-intestinales et généralisées (Entérites coloniales).

Posologie et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 3 tubes scellés 2 fois par jour, avec un peu d'eau ; le matin à jeun et 2 heures avant le repas du soir.

Enfants : Demi-dose.

Nourrissons : Pour traité l'érythème fessier par la méthode Blechmann, prescrire : Vaccin *Entérococcique* buvable Carrion, en tubes scellés de 1 cc.

(Prix : voir Vaccins Carrion).

Présentation et prix :

La boîte de 12 tubes scellés : 23 fr. 35.

La boîte de 6 tubes scellés : 14 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. n° 514-9.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ENTÉROCUPROL

(cachets)

Existe aussi sous forme granulés (sans poudre de Dower ni ipéca).

Indications. — Antiseptie du tube digestif. Infections gastro-intestinales, urinaires, biliaires. Aérophagie.

Formule. — Sulfate de cuivre, 0 gr. 0025 ; poudre de Dower, 0 gr. 05 ; poudre d'ipéca, 0 gr. 025 ; poudre de badiane, 0 gr. 05 ; Dermatol, 0 gr. 10 ; salicylate de bismuth, 0 gr. 05 ; peroxyde de magnésium, 0 gr. 05 ; carbonate de chaux, 0 gr. 05 ; sulfate de magnésie anh., 0 gr. 15 ; benzoate de naphtol, 0 gr. 15 ; urotropine, 0 gr. 03 ; thymol, 0 gr. 02 ; acide acétyl-salicylique, 0 gr. 05 ; charbon animal, 0 gr. 10 ; charbon végétal, 0 gr. 20 pour un cachet emboîté (et non collé).

Emploi et doses. — Habituellement, 2 ou 3 cachets par jour après les repas. Dans le cas particulier de l'*aérophagie*, prises une demi-heure avant les repas, précédées elles aussi d'une demi-heure par *Hépatocure* (2 comprimés).

Acide acétyl-salicylique, thymol et sulfate de cuivre sont introduits dans chaque cachet sous la forme d'un comprimé glutenisé assurant le dédoublement, entre autres, de l'acide acétyl-salicylique dans l'intestin.

Prix : 18 fr. 75 la boîte de 24 cachets.

Numéro d'enregistrement : 1676-16.

Laboratoire G. CALMELS

AUTERIVE (Haute-Garonne).

ENTÉRODAUSSE

et

ENTÉRODAUSSE CALCIQUE

(Antisepsie du tube digestif.)

Granulé se présentant sous deux formes :

1° Entérodausse magnésien (à base de Phosphate de soude et Hydrat de Magnésie) pour les constipés, applicable aux troubles suivants

a. Affections gastriques : Gonflements, Flatulences, Aérophagie, Digestions difficiles, Haleine fétide, langue saburrale.

b. Affections intestinales — Putréfaction et fermentation intestinales: selles fétides, Entérites sèches, Aérocolie, Rectocolites graves, Sigmoïdites avec fausse diarrhée, Syndromes entérorénaux (infection rénale et vésicale d'origine intestinale, colibacillose), Appendicite chronique).

2° Entérodausse calcique (à base de sous-gallate de Bismuth et Carbonate de chaux) pour les diarrhéiques :

Mêmes indications que précédemment, bien que plus spécialement applicable aux entérites et colites diverses.

Dose et mode d'emploi. — Ce sont les mêmes pour les deux produits : Entérodausse simple et calcique.

Chez les adultes : 1 à 2 cuillerées à café au début de chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Chez les enfants : demi-dose.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. — (Tél. : Turbigo 63-40.)

ENTÉROFAGOS

Bactériophages intestinaux polyvalents.

Composition. — Bouillon filtrat de bactériophages actifs contre les microbes que l'on trouve dans les infections intestinales.

Dose. — Ampoules à ingérer, 2 par jour, dans un peu d'eau bicarbonatée de préférence.

1 ampoule par jour pour les *enfants*.

Les bactériophages se distinguent par la rapidité de leur action et leur innocuité absolue.

Pas de réaction thermique, pas de choc.

Indications. — Entérites, colites, dysenteries bacillaires, typhoïdes, paratyphoïdes, diarrhées de type varié, constipation, fermentations intestinales, colibacilloses diverses, syndrome entérorénal d'Heitz-Boyer.

Remplace avantageusement les ferments lactiques.

Prix : la boîte de 10 ampoules : 21 fr. 50

la boîte de 5 ampoules : 11 fr. 95

**Laboratoire de Biologie médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

ENTEROMUCINE

Composition. — Mucine pure, neutre et stérile obtenue à partir des muqueuses intestinales et adaptée à la thérapeutique de la constipation et des entéro-colites.

Propriétés. — Régulateur naturel : laxatif idéal qui permet l'hydratation rapide et le cheminement normal des fèces.

Protecteur mécanique et protecteur chimique fixant les ions acides ou alcalins nuisibles au bon fonctionnement de l'intestin ou irritants pour la muqueuse.

Avantages. — L'Entéromucine est supérieure : *a.* aux laxatifs drastiques ou salins très irritants ; *b.* aux mucilages végétaux qui se digèrent et augmentent les fermentations ; *c.* aux poudres inertes et à l'huile de paraffine qui gênent l'assimilation et provoquent souvent des irritations graves ; *d.* aux celluloses indigestibles (son) qui raclent l'intestin, d'où des désastres chez les colitiques.

L'Entéromucine est particulièrement remarquable par la douceur de son action.

Indications. — Constipation simple et des colitiques, Colites, Entérites, Entérocolites.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café de granulé à chacun des 2 principaux repas.

Prix. — Modèle normal, granulé adultes et semoule pour enfants : 23 fr. 45 ; quadruple modèle : 78 fr. 55

Enregistré au L. N. C. n° 507-42.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. Inv. 20-60.)

ENTÉRO-PANSEMENT

du Docteur ZIZINE

Protection, désinfection de la muqueuse intestinale.

Composition. — Deux formules :

Simple. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Lactose.

A l'ipéca. — Charbon activé, S. N. de Bismuth, Ipéca.

Forme. — Granulé fondant aromatisé.

Propriétés thérapeutiques. — Diarrhées de l'adulte et de l'enfant. Infections et intoxications intestinales ; leurs conséquences. Fermentations intestinales ; ballonnement abdominal. Dermatoses d'origine intestinale. Colites infectieuses et parasitaires. Entérite des pays chauds. Entérocolite. Colibacillose (localisations hépato-vésiculaires et rénales).

Propriétés thérapeutiques spéciales à l'ipéca. — Amibiase, Dysenteries à Protozoaires.

Posologie. — *Adultes* : de 1 à 2 cuillerées à soupe par jour, à jeun ou au repas (à croquer ou délayer dans un peu d'eau).

Enfants : de 1 à 2 cuillerées à café, suivant l'âge.

Prix de la boîte : 19 fr. 75.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie,
Ex-interne en Pharmacie, Lauréat des Hôpitaux,
Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et de Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

ENTÉROPATHYL

Bactéricide et Antiseptique puissant de toutes les infections intestinales, biliaires et urinaires.

Forme. — Granulé fondant, aromatisé, agréable au goût.

Composition :

Charbon végétal purifié	20 gr.
Charbon végétal suractivé	20 gr.
Charbon animal lavé.....	10 gr.
Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine...	1 gr. 50
Excipient, Q. S. pour	100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — **L'Entéropathyl**, dont l'association judicieuse des **trois charbons** employés en thérapeutique représente **50 p. 100** de produits actifs et sélectionnés, a son pouvoir antiseptique renforcé par l'action bactéricide du **sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine**, plus efficace et moins irritant que les adjuvants chimiques ordinairement employés. **L'Entéropathyl ne constipe pas.**

Indications. — Entérites aiguës et chroniques
Colites, Diarrhées diverses, Intoxications alimentaires, Fermentations intestinales, Aérophagie, Colibacillose, Oxyurose, et toutes infections intestinales et leurs conséquences.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café après les repas. A croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Prix : la boîte : 23 francs. (Toutes pharmacies.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1907-3.

Les Laboratoires « MÉDICIA »

7, Impasse de la Sous-Préfecture — ROANNE
(Loire).

ENTÉROSALICYL

(Admis par l'Assistance Publique et les Services de Santé de la Marine et des Colonies.)

Salicylate de soude en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin. Suppression totale de toute irritation gastrique.

Composition. — 2 dosages : normal, 0 gr. 50 par capsule ; infantile, 0 gr. 25 par capsule.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Goutte, Algies rhumatismales, Sciatique, Maladie de Basedow, Syndromes infectieux, Désensibilisant, Chologogue.

(Dans les cas graves de Rhumatisme articulaire aigu, compléter par Glucosalyl, en injections intraveineuses. Dans les Rhumatismes chroniques : Sulfosalyl *per os* et Histalgine en piqûres intradermiques.)

Posologie. — Celle du Salicylate de soude. Jusqu'à 15 gr. et plus par 24 heures.

Enfants : 1/2 à 1 gramme par année d'âge. De préférence, pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-7 (1 et 2).

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN
14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Jasmin 00-37.)

ENTÉROSEPTYL

Phosphate de B trinaphtyle, 0 gr. 05 par comprimé ou par cuillerée à café de granulés.

Indications. — Diarrhées saisonnières, Intoxications alimentaires (gibier, crustacés, champignons), Entérites, Ictères, Urticaire, Colibacillurie, Rougeurs postprandiales, Fétidité d'haleine, Syndrome entéro-uro-génital.

Avantages. — Ne se décompose que dans l'intestin, n'irrite pas l'estomac, ni hépato-toxique, ni déminéralisant comme les ferments lactiques. Peut se prescrire aux enfants, de préférence sous la forme de « granulés ».

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour en dehors des repas.

Enfants : 1 cuillerée à café de granulés par année d'âge et par jour.

Prix : le flacon de comprimés ou granulés : 13 fr. 75.

Laboratoires de L'ENTÉROSEPTYL
78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 35-51.)

ENTÉROVACCIN LUMIÈRE

Vaccin antitypho-colique polyvalent
Immunisation antityphique par voie gastro-intestinale.

Constitution. — Masse pilulaire constituée par des corps bacillaires (éberth-coli-bacille, paratyphique A et B) rigoureusement stérilisée et enrobée dans une enveloppe kératinisée qui leur permet d'arriver jusqu'à l'intestin sans subir aucune désintégration des produits immunisants. S'emploie à titre curatif et préventif.

Propriétés :

Durée de l'immunité variable selon les individus : elle est en général de deux à trois ans. En période d'épidémie et en cas de séjour dans les régions contaminées, renouveler l'immunisation au bout d'un an. Efficacité de même ordre que celles des vaccins s'administrant par voie sous-cutanée, mais aucune contre-indication, pas de réaction, rien à changer aux occupations habituelles ni au régime normal.

Le procédé le plus simple, le plus inoffensif d'immunisation et de traitement contre la Fièvre typhoïde, les Fièvres paratyphoïdes (A et B). Efficacité attestée par des rapports officiels et de nombreuses observations. Plus de 500.000 expériences sans un seul échec.

Pas de contre-indication, pas de réaction.

Doses. — Pour adultes, 4 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs ; 2 le matin et 2 le soir, aussi loin que possible des repas.

Pour enfants, demi-dose, soit 2 pilules par jour pendant 7 jours consécutifs, aussi loin que possible des repas.

Formuler : Une boîte de 28 pilules d'Entérovaccin Lumière.

VACCINOTHÉRAPIE CURATIVE

L'Entérovaccin Lumière est également utilisé avec succès à titre curatif, dans le traitement des états typhiques, paratyphiques et colibacillaires en cours d'évolution. L'employer à la même dose.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

ENTÉRO-VACLYDUN

Lysat vaccin du Docteur DUCHON

Composition. — Entérocoques, Colibacilles, Staphylocoques et Streptocoques, Lysat-vaccin intestinal à employer par voie *buccale*.

Indications. — Infections intestinales communes, Entérites, Colites, Diarrhées estivales, Diarrhées infantiles, Syndrome entéro-rénal, états appendiculaires, auto-intoxications intestinales, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 ampoule par jour dans 1/2 verre d'eau sucrée le matin à jeun.

Enfants : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre en 3 fois dans la journée.

Nourrissons : 1 ampoule dans 1/2 verre d'eau sucrée à prendre par cuillerée 1/2 heure avant les tétées.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.)

ENTÉRO-VIOFORME

Iodochloroxyquinoléine.

CIBA

ANTISEPTIQUE INTESTINAL.

Agent chimiothérapique d'action hautement spécifique dans les dysenteries infectieuses ou parasitaires, aiguës ou chroniques. Non toxique et non irritant. Son usage peut être prolongé aussi longtemps qu'il est nécessaire par périodes de traitement de 10 à 12 jours.

Indications. — *Dysenteries parasitaires et infectieuses* : dys. amibienne, dys. bacillaire, suites de dysenteries. Infections à balantidium et lamblia. Dysenteries et diarrhées d'origine non définie, Colibac. et helminthes.

Doses. — *Cas aigus* : 1 ou 2 comprimés, 3 fois par jour, aux repas, pendant dix jours, puis suspension et reprise.

Cas chroniques : 1 ou 2 comprimés par jour, trois ou quatre jours par semaine.

Prophylaxie : 1 comprimé tous les deux jours.

Formuler. — Tube de 20 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

ENZYPPAN

Dragées réunissant la totalité des Enzymes digestifs : Pepsine, Amylase, Trypsine, Lipase et Bile associées.

Médication digestive polyvalente pour tous les troubles par insuffisance d'un ou plusieurs ferments.

Bonne solution d'un problème ancien demeuré jusqu'alors sans solutions satisfaisantes.

Pas de cloison de gluten ou de kératine entre les ferments destinés à l'estomac et les ferments destinés à l'intestin. Trop souvent kératine comme gluten, ou se laissent attaquer par le suc gastrique ou traversent l'intestin sans libérer leur contenu.

Dans les dragées d'Enzypan, la protection des enzymes intestinaux, pendant leur séjour dans l'estomac, est assurée, particule par particule pour ainsi dire, par l'enduit où elles baignent, et qui s'est révélé aussi bien inviolable par le suc gastrique, que détruit par le suc intestinal dès leur arrivée dans le duodénum.

Doses. — 2 ou 3 dragées pendant les repas. En cas d'hypochlorhydrie, certaine ou probable, prescrire conjointement :

Acide chlorhydrique officinal : X à XX gouttes pendant ou à la fin de repas

Prix Petit modèle 17 fr. 35.

Grand — 37 fr. 75.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

EPANAL

Régulateur du déséquilibre vago-sympathique.

Composition :

Phényl-éthyl-malonylurée	0 gr. 02
Extrait hydroalcoolique de cratægus ...	0 gr. 03
— — — de valériane	0 gr. 03
— — — de passiflore ...	0 gr. 02
— — — de saule blanc..	0 gr. 02
— — — de ballote	0 gr. 02
Poudre de marjolaine.....	0 gr. 02
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 03

Par comprimé dragéifié et glutinisé.

Principales Indications. — Tics, Chorée, Epilepsie, Névrose, Mélancolie, Anxiété, Hyperémotivité, Vertige, Insomnie, Tachycardie.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour.

Prix : le tube de 40 comprimés : 16 fr. 65.

Laboratoires E. BOUCHARA

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie

Ancien interne des Hôpitaux de Paris

47, rue de Bretagne, PARIS (III^e). (Arch. : 94-65.)

ÉPHASMA

Repousse la crise.

Médication pathogénique de l'asthme.

S'attaquant à tous les facteurs de la crise :

Sympathique par l'éphédrine,

Parasympathique par la belladone,

Bulbaire par la lobélie et l'euphorbe,

Cardio-pulmonaire par l'iodure de caféine,

Bronchique par le benzoate de soude.

Traitement de la crise. — Un à deux comprimés dès l'apparition des signes avant-coureurs. Trois comprimés dans les 24 h.

Traitement de fond. — Un comprimé par jour, 10 à 20 jours par mois.

Prendre le comprimé finement écrasé dans une tasse d'infusion ou dans un peu d'eau bien sucrée.

Comprimés : 18 fr. 80.

Prix : Sirop, P. M., 20 fr. 80. — G. M., 25 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

ÉPHÉDERMINE BÉRAL

Crème-pâte sans graisse à l'Éphédrine naturelle zincique.

Mode d'emploi. — En application comme une pâte et autant que de besoin.

Indications. — Toutes affections cutanées prurigineuses. Eczémas suintants. Dermatoses allergiques, Hémorroïdes, etc.

Prescrire : ÉPHÉDERMINE BÉRAL. Un tube.

Prix : 14 fr. 55

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAFÉINE BÉRAL

Deux formes : comprimés et ampoules :

3 centigrammes d'Ephédrine naturelle et 5 centigrammes de Caféine par comprimé ou par centicube.

Propriétés. — Toutes les propriétés de l'Ephédrine et des Ephédroïdes, mais avec, en plus, l'action diurétique et toni-cardiaque de la Caféine, d'où suppression des palpitations, de toute action déprimante sur le myocarde, et des troubles de la miction.

Les comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE sont particulièrement indiqués chez les sujets hypocardiotoniques enclins aux palpitations, et chez les sensibilisés vésicorénaux.

1 à 2 comprimés d'Ephédraféine dans les 2 heures précédant l'accès.

Les ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, pour injections sous-cutanées ou veineuses sont particulièrement indiquées, avant les interventions et les rachianesthésies pour éviter les chocs et crises hypotensives.

1 à 2 cc. 10 minutes avant l'intervention ou au moment des chocs.

Prescrire :

Comprimés d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 16 fr. 60

Ampoules d'ÉPHÉDRAFÉINE, une boîte : 22 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL

*Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine
Béral par centicube.*

Pour injections sous-cutanées, intramus-
culaires ou intraveineuses :

1 à 4 centicubes par jour.

S'emploient aussi en pulvérisations nasales,
et pour autres applications externes de
l'Éphédrine.

Prescrire : ÉPHÉDRAMPOULES BÉRAL.

Une boîte ; 18 fr.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS,

ÉPHÉDRAMYD

Solution aqueuse antiseptique et décongestive pour le traitement des affections rhino-pharyngées.

Sulfamide (1162 F.), **Argent colloïdal**. **Éphédrine** (chl. à 0,75 p. 100). **Rosaniline trisulfamidée**.

Excipient spécial isotonique et visqueux formant émulsion et assurant l'adhérence du pansement plastique et médicamenteux sur la muqueuse pituitaire. Aromatisation discrète aux essences végétales naturelles.

L'*Éphédramyd* n'est pas irritant. Il ne contient ni adrénaline ni menthol.

L'*Éphédramyd* est actif vis-à-vis de la flore microbienne tout entière, et sur le *Streptocoque* en particulier, grâce à l'argent colloïdal et au paraminophénylsulfamide (1162 F.) associé à la rosaniline trisulfamidée qu'il contient en solution.

L'*Éphédramyd* décongestionne sans brutalité grâce à son chlorhydrate d'éphédrine naturelle à 0,75 p. 100.

Suffisamment visqueux pour que soit assurée la persistance de son action sur la muqueuse irritée et congestionnée, il est assez liquide pour entraîner mécaniquement le pus si besoin est, et aussi pour être pulvérisé dans les atomiseurs.

Indications. — Coryza, rhinites atrophiques et hypertrophiques, ozène, sinusites, pharyngites, rhume des foins, végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale, asthme.

L'*Éphédramyd* peut être employé même chez les nourrissons.

Présentation, posologie. — Une seule forme : flacon compte-gouttes de 30 cc., II à V gouttes dans chaque narine 2 ou 3 fois par jour.

Nota. — L'*Éphédramyd* utilise un argyrol très peu coloré. Il ne tache pas le linge.

Prix : le flacon compte-gouttes de 30 cc. : 18 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

ÉPHÉDRASMINÉ

Pulvérisations nasales.

Solution physiologique.

Sulfate éphédrine naturelle 2 p. 100

Adrénaline physiologique 1 p. 10.000

Action. — Décongestion prolongée de la muqueuse nasale. Inhibition des ramifications terminales du sympathique.

Indications. — Obstruction nasale, Asthme, Rhume des foins, Rhinites, Sinusites, Coryza, Coryza spasmodique, Catarrhe, Laryngites, Affections congestives du rhino-pharynx, Migraines. Infections grippales.

Mode d'emploi. — Pulvérisations, tamponnements ou instillations.

Voir également : **Garéphédrine, Diuréphédrine**
et **Bronchasmine**

Échantillons et littérature sur demande.

Prix : 15 francs le flacon pour un mois environ.

Pulvérisateur spécial de poche : 25 francs.

Laboratoires F. SAUGIER

DOLE (Jura).

ÉPHÉDRICONES BÉRAL

Suppositoires contenant chacun :

Chl. sulf. d'éphédrine nat. Béral . . 0 gr. 03

Excipient correctif. 2 gr.

Un éphédricone produit les mêmes effets par voie rectale qu'un éphédroïde à 3 cgr. d'éphédrine *per os*.

Toutes indications
de l'éphédrinothérapie.

Formuler : Ephédricones Béral, une boîte.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE BÉRAL (Grains d') à 1 centigramme.

Les mieux appropriés à l'éphédrinothérapie fractionnée, notamment chez les intolérants et pour la prophylaxie des chocs thérapeutiques (injections arsenicales, sériques ou autres). Entièrement solubles.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 10 grains par jour : 1 grain toutes les 3 ou 4 heures, le jour et le lendemain de l'injection choquante. *Ne pas confondre les grains d'Éphédrine Béral à 1 centigr. avec les compr. à 3 cent. dénommés Éphédroïdes.*

Prescrire : GRAINS D'ÉPHÉDRINE BÉRAL. Un flacon. Prix : 14 fr. 55.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE naturelle BÉRAL

Produit français Intégral.

Formes pharmaceutiques spécialisées :

Grains d'Éphédrine Béral. Dosés à 1 cgr. d'éphédrine par grain, 14 fr. 55.

Éphédroïdes Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine naturelle, 14 fr. 55.

Éphédraséine Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. de caféine, 16 fr. 60.

Éphétropine Béral. Comprimés à 3 cgr. d'éphédrine-caféine et hyosciamine-barbiturique, 18 fr. 70.

Éphédromel Béral. Sirop mellité à 1/2 cgr. d'éphédrine par cuillerée à café, 15 fr. 60.

Éphéiodine Béral. Elixir de Lobélie à 3 cgr. d'Iodé-éphédrine, par cuil. à café, 20 francs.

Éphédrampoules Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine par cc. Boîte de 10 : 18 francs.

Éphédraséine injectable Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine + 5 cgr. caféine par cc., 22 francs.

Spartophédrine Béral. Ampoules à 3 cgr. d'éphédrine et 5 cgr. spartéine par cc., 16 francs.

Adréphédrine Béral. Ampoule à 1/4 mgr. d'adrénaline et 3 cgr. d'éphédrine par cc., 16 francs et 22 francs.

Éphédriisol Béral. Hydrolat d'éphédra à 3 et 5 p. 100 d'éphédrine, 16 francs et 20 francs.

Éphédroprises Béral. Poudre à priser à 3 cgr. d'éphédrine par prise, 15 fr. 60.

Éphédermine Béral. Gelée-pâte sans graisse à 2 p. 100 d'éphédrine, 14 fr. 55.

Nasophédrine Béral. Pommade nasale (huile gélifiée) à 3 p. 100 d'éphédrine, 12 fr. 50.

Oléophédrine Béral. Huile d'éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine, 12 fr. 50 et 15 fr. 60.

Mydriédrine Béral. Ampoule-collyre à 4 p. 100 d'éphédrine, 22 fr. 85.

Clearol. Bain oculaire à l'hamamélis adréphédriné, 16 fr. 60.

Rhinodrops Béral. Capsules nasales à l'huile d'éphédra chlorétonée, 11 fr. 45.

Éphédricones Béral. Suppositoires à 3 cgr. d'éphédrine. 16 francs.

(Voir annonces concernant chacun de ces produits.)

Laboratoire de l'ÉPHÉDRINE BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRINE HOUDÉ

(Chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.)

Propriétés. — Sympathicotrope. Excitant du centre respiratoire bulbaire. Relâche les muscles lisses de la paroi bronchique. Hypertenseur par vaso-constriction périphérique. A petites doses, ralentit et soutient le cœur. Tonique général. *Antianaphylactique.*

Avantages. — Non modifiée par les sucs gastro-intestinaux, comme l'adrénaline, ce qui permet de l'employer *per os.*

Indications :

- a. *Essentielles* : Asthme sous toutes ses formes. Dyspnée. Urticaires.
- b. *Secondaires* : Rhume des foins. Dysménorrhée. Réactions sériques. Hypotension permanente d'allure idiopathique. Myasthénies et myopathies. Syndromes vagotoniques. Enurésie.

Présentation. — Granules à 1 cgr. de chlorhydrate d'Éphédrine naturelle.

Posologie et mode d'emploi. — *Asthme.* 2 à 3 granules le plus près possible du début de la crise.

Répéter cette dose 25 minutes après, si pas d'amélioration nette.

Traitement de fond : même dose, le matin au réveil et le soir vers 4 heures.

Hypotension permanente : 4 granules par jour en 3 fois, par séries de 10 à 12 jours.

Urticaire : 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. — (Tél. : Nord 40-58.)

ÉPHÉDRISOL BÉRAL

Hydrolat d'Éphédra à 1, 2, 3 et 5 p. 100 d'Éphédrine naturelle, sans adjonction d'analgésiques.

Pour **pulvérisations** nasales, préventives et curatives des crises d'asthme, du rhume des foins et contre les coryzas, rhinites, sinusites, céphalées et surdités catarrhales, etc...

Sans indication de dosage, c'est l'éphédrisol à 3 p. 100 qui est délivré.

Prescrire : Ephédrisol Béral, un flacon.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRIVAÏNE

Pommade nasale anesthésique éphédrinée.

Formule :

Chlorhydrate d'éphédrine.....	1 gr.
Protéinate d'argent	0 gr. 20
Para-aminobenzoate de butyle normal	2 gr.
Baume du Pérou	0 gr. 25
Essences aromatisées de thym, de serpolet, de lavande, de bergamote	0 gr. 75
Essence d'orange douce.....	0 gr. 10
Lanovaseline et excipient, Q. S. pour.....	100 gr.

Présentation. — Tube avec embout spécial. Prix public:
7 fr. 80.

Affections des voies respiratoires. Traitement du
rhume de cerveau, rhume des foins, sinusites, gripes.
Enfants et adultes : 3 à 5 fois par jour gros comme un
pois dans chaque narine.

Enregistré au L. N. C. M., n° 598.

Laboratoires M. DE RIVE

J.-O. MOITY, Docteur en médecine, Docteur
en Pharmacie, ancien interne des Hôpitaux de Paris.

Services commerciaux :

11 bis et 13, rue Levert — PARIS (XX^e)

ÉPHÉDROCURE

Pommade nasale.

Formule. — Chlorhydrate d'éphédrine : 1 gr. ; Chlorhydrate d'amyline : 0,20 ; Soufre précipité : 0,25 ; Métadioxyphénol : 0,30 ; Camphre : 0,40 ; Sulfo-ichthyolate d'am., 0,25 ; Baume du Pérou : 1,50 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 1 gr. ; Excipient non mentholé, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foin, coryza, rhinite, ozène, sinusite, affections des voies respiratoires.

Présentation. — Tube avec embout spécial pour injection nasale.

Enfants et adultes : Introduire 2 à 4 fois par jour gros comme un pois de la pommade dans chaque narine.

Prix au public : 12 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous le n° 598-17

Solution huileuse.

Formule. — Ephédrine base : 0,50 ; Paraforme : 0,40 ; Huile essentielle de melaleuca viridiflora : 2,60 ; Myrtol : 0,30 ; Huile essentielle de lavande vraie : 0,55 ; Métadioxyphénol : 0,12 ; Huile d'olive médicinale neutre et stérilisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Rhume de cerveau, rhume des foin, coryza, sinusite, céphalée, ozène, prophylaxie de l'asthme et de l'emphysème, traitement préventif de la grippe et toutes affections du rhino-pharynx, peut s'employer en pulvérisations ou en instillations.

Présentations :

a. **Ephédrocure Huile.** — Flacon de 30 cc. (à compte-gouttes nasal intérieur) pour instillations. *Enfants et adultes :* III à VI gouttes dans chaque narine 3 à 4 fois par jour.

Prix : 18 fr. 75.

b. **Pulvo-Ephédrocure.** — Flacon (avec pulvérisateur spécial).

En Pulvérisations : 3 à 4 fois par jour dans chaque narine.

Prix : 25 francs. Flacon de recharge : 15 fr. 50.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 598-16.

Rhino-Capsules :

Même formule que la solution huileuse (L. N. C. M. 888-9).

Indications. — Traitement préventif de la grippe et toutes affections du rhino-pharynx.

Présentation. — Boîte de 20 capsules nasales longues.

Enfants : 1/2 capsule dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Adultes : 1 capsule dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Prix au public : 14 fr. 05.

Comprimés :

Forme A. — 0,015 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée. par comprimé.

Forme B. — 0,025 d'éphédrine et 0,01 de phényléthylmalonylurée par comprimé.

Indications. — Asthme, Rhume des foin, Rhinites, toux spasmodiques, Bronchites chroniques, Etat d'hypotension.

Prix : Forme A, 13 fr. 90. Forme B, 16 fr. 05.

Enregistrés au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous les n°s 598-18.

(Publicité exclusivement médicale.)

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX°).

ÉPHÉDROÏDES BÉRAL

Comprimés d'Éphédrine Béral à 3 centigr.

Posologie et mode d'emploi. — Débuter par un Éphédroïde pris dès les premiers symptômes avant-coureurs de l'accès d'asthme ou dans les 2 heures précédant cet accès. Renouveler la dose si l'effet est insuffisant. La dose utile une fois établie (elle est souvent de 2 Éphédroïdes), donner cette dose en une fois lors des accès ultérieurs.

En période de crise, prendre préventivement un Éphédroïde le matin.

Chez les hypocardiotoniques et les sujets enclins aux palpitations, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphédratine, qui évitent les palpitations.

En cas d'insomnie ou d'agitation, remplacer les Éphédroïdes par les comprimés d'Éphétropine, qui contiennent les correctifs appropriés.

Prescrire : Éphédroïdes Béral, un flacon : 14 fr. 55.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDROLÉNOL

Huile non irritante pour les fosses nasales.

(sans menthol, inaltérable).

Composition : Éphédrine base, camphre, huiles essentielles sélectionnées, véhicule huileux neutralisé et stabilisé par un procédé original.

Se fait à 1 % et à 1/2 % d'éphédrine.

Présentations et mode d'emploi :

Flacon d'huile à 1 %.

Instillations, pulvérisations : 18 francs.

Capsules nasales à 1 %.

Instillations 18 francs.

Flacon d'huile à 1/2 % (éphédrolénol dédoublé).

Instillations, pulvérisations } 18 francs.

Injectons intratrachéales }

Capsules nasales d'huile 1/2 %.

Instillations 18 francs.

Ampoules d'huile 1/2 % de 5 cc.

Injectons intratrachéales.. 18 francs.

Pommade (excipient spécial sans vaseline), tube à canule : 13 francs.

Indications :

Coryza, rhinites atrophiques et hypertrophiques, ozène ; sinusites, pharyngites, rhume des foins, végétations adénoïdes et en général toutes les altérations aiguës ou chroniques de la muqueuse nasale.

Asthme. Augmentation de la résonance de la voix chez les chanteurs. L'Ephédrolénol dédoublé donne des résultats remarquables en médecine infantile. Il peut être employé même chez les nourrissons.

Préparation agréable, non irritante, non toxique. Très pratique en flacons compte-goutte et en capsules gélatineuses.

(Anciennement aux Laboratoires Merlet, à Boulogne.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous les n^{os} 535-50, 51, 52, 53, 54 et 55.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

ÉPHÉDROLYPTOL

Composition :

Solution **aqueuse** d'essence d'eucalyptus de sulfo-camphonate de soude et de Ch^{te} d'éphédrine.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. renfermant 0,01 d'éphédrine pour injections intramusculaires.

Indications :

Toutes les affections aiguës ou chroniques broncho-pulmonaires, Catarrhe bronchique, Asthme, Pneumonie, Bronchopneumonie.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, calmant de la toux et de l'oppression, médicament antigrippal.

Laboratoire MERLET

24, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-91.)

ÉPHÉDROMEL BÉRAL

Siróp mellité à un demi-centigramme seulement d'Éphédrine naturelle Béral par cuillerée à café.

Indications. — Le sédatif par excellence des **Toux spasmodiques des enfants et des adultes. Asthme infantile, Coqueluche, Énurésie.**

Posologie.

Jusqu'à 6 ans, 2 à 8 cuillerées à café.
6 à 12 ans, 2 à 8 cuillerées à dessert.
Adultes, 2 à 8 cuillerées à soupe.

Prescrire : ÉPHÉDROMEL

Un flacon : 15 fr. 60.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉDRO-RHINOL

à l'Éphédrine végétale lévogyre.

Forme. — Pommade et Solution huileuse.

Composition. — Ephédrine végétale chl., Novocaïne, Linalol du Bois de Rose, Excipient aromatisé.

Indications. — Coryza et Coryza spasmodique, Rhinites congestives, Sinusites, Rhumes des foin, Céphalée d'origine nasale.

Mode d'emplol. — *Pommade* : 3 fois par jour ou plus, gros comme un pois dans chaque narine.

Solution huileuse : En instillations. *Adultes* : V à X gouttes 3 fois par jour dans chaque narine.

Enfants : I à III gouttes, 2 fois par jour.

En pulvérisations avec le pulvérisateur spécial Ephédro-Rhinol.

Prix : Pommade, 13 francs. Solution, 15 fr. 10.

Vaporisateur et solution : 25 francs.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n^{os} 219-19 et 219-20.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

ÉPHÉIODINE BÉRAL

Élixir de Lobélie à 3 centigr. d'Iodéphédrine par cuillerée à café.

La plus efficace des préparations éphédri-
nées dans les Périodes intercalaires de
l'Asthme et contre les Bouffées asthma-
tiques des Catarrheux bronchiques et
des Emphysémateux.

*Dilate les bronches, Facilite l'expectoration,
Soulage toujours. S'applique à tous les cas.*

Posologie et mode d'emploi. — Une
cuillerée à café le matin et au début des
accès.

Prescrire : ÉPHÉIODINE BÉRAL

Un flacon : 20 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHÉTROPIE BÉRAL

Comprimés contenant chacun :

Chl. d'éphédrine nat. Béral.....	3 egr.
Br. d'hyoscinamine (atropine gauche).....	0 mgr. 25
Caféine cinnam.....	5 egr.
Buth.-éth.-mal.-urée.....	5 egr.

Représentent l'association la plus rationnelle des synergiques et correctifs de l'éphédrine.

Particulièrement appropriés au traitement préventif et curatif des accès d'asthme rebelles ou nocturnes avec insomnie, des troubles vago-sympathiques (mal de mer et d'avions, embolies pulmonaires) et à la prophylaxie des réflexes vago-toniques.

1 à 4 comprimés *pro die*.

Prescrire : Ephétropine Béral. Une boîte: 18 fr.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

ÉPHOLÉINE

Forme pharmaceutique et composition. — Huile éphédrinée au centième (éphédrine *naturelle* chimiquement pure) avec addition d'acétone-chloroforme et orthoforme. (Flacon de 20 grammes.)

Propriétés. — Vaso-constricteur local à action non irritante, diffusible et durable.

Avantages. — *Décongestionnant* de la muqueuse nasale, outre ses indications particulières, l'Epholéine remplace l'adrénoléine dans les cas d'intolérance individuelle à l'adrénaline.

Indications. — Asthme, Emphysème, Rhume des foins, Coryza spasmodique, Rhinites congestives.

Mode d'emploi. — En instillations (III ou IV gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour ou en pulvérisations). Chez l'asthmatique, l'ordonner *préventivement*.

Prescription. — Un flacon *Epholéine Falvy*.
Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 18-26.)

ÉPHYDION

Éphédrine. Dionine.

Composition. — Association synergique d'Ephédrine naturelle, Dionine, Belladone, Benzoate Na, Drosera et Grindelia. Sous forme de comprimés glutinisés qui se dissolvent dans l'intestin et respectent intégralement l'estomac.

Action thérapeutique. — Antispasmodique, Anti-dyspnéique, Analgésique, Hypnotique léger, Ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — Sédatif puissant de toutes les formes de la toux (Spasmodique, Quinteuse, Coqueluchoïde, Emphysémateuse, Névropathique, Réflexe). Calme remarquablement la toux des tuberculeux et leur assure sans fatigue stomacale repos et sommeil.

Posologie. — Éphydion comprimés : 5 comprimés par jour. 6 à 8 dans les toux rebelles. Grands enfants : 2 à 5 comprimés par jour.

Gouttes Éphydion. — Un cc. ou XXX gouttes = un comprimé. *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge 5 à 8 fois par jour.

Sirop Éphydion. — 3 à 4 cuillerées par jour.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ
RENNES (Ille-et-Vilaine).

ÉPHYNAL « ROCHE »

Composition. — Vitamine E de synthèse stabilisée, acétate de dl- α -tocophérol, vitamine de fertilité.

Propriétés thérapeutiques. — Assure un harmonieux développement du fœtus et du nouveau-né, combat les tendances à l'avortement spontané, indispensable à la spermatogenèse et à la gestation normale.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles de la fertilité et de l'eugénisme, du fœtus et du nouveau-né, avortements habituels, menaces d'avortement imminent, azoospermies, traitement de la stérilité, troubles encéphalopathiques, nerveux et musculaires du nouveau-né, etc.

Avantages. — Dosage rigoureux, stabilité parfaite, toxicité nulle, action constante par voie buccale, permettant une thérapeutique précise et sans contre-indications.

Présentation. — Comprimés sans odeur ni saveur, dosés à 3 mg. d'acétate de dl- α -tocophérol. Flacon de 30 comprimés.

Posologie et mode d'emploi. — *Pour assurer une gestation normale* : 1 à 2 comprimés par jour durant la grossesse.

En cas de menaces d'avortement : prescrire 5, 10 ou même 20 comprimés par jour pendant 15 à 20 jours, sans craindre d'intolérance.

Chez le nouveau-né : donner 1/2 comprimé par jour délayé dans du lait.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 504-90.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

ÉPICRAL

Ἐπικρασίς, action de tempérer les humeurs, et Ἐπικραταῖω, fortifier.
Solution iodo-arséno-mercurielle (lactate) citratée (1 mgr. Arséniate Soude, 2 mgr. Iode organique, 6 mgr. Lactate mercurique, etc..., par cuillerée à soupe).

D'emploi très commode, de saveur très agréable, parfaitement toléré, présenté sans indication de sa nature mercurielle.

Originalité. — Formule bien spéciale, très active et sans aucun inconvénient, avec lactate mercurique (sel de mercure le mieux toléré), Arsenic, Iode (doses très faibles), citrate de soude (rôle très important), etc...

Propriétés thérapeutiques. — Antisypilitique, tonique, agit très favorablement sur les sécrétions (glandes endocrines, foie, muqueuses...) et sur la circulation (diminue la viscosité sanguine, abaisse la tension, etc.). Augmente l'appétit et améliore toujours l'état général.

Indications. — Toutes les manifestations de l'Hérédo-syphilis, prophylaxie pendant la grossesse, traitement d'entretien. Ses résultats sont tout particulièrement remarquables dans les troubles endocrinien et de croissance, dans les affections hépatiques, nerveuses et circulatoires. Comme il est tonique, qu'il agit très favorablement sur les sécrétions et la circulation, et que son emploi améliore toujours l'état général, il est très souvent prescrit, avec profit, en dehors de toute manifestation spécifique.

Posologie. — *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. *Adolescents* : 2 cuillerées à dessert à 2 cuillerées à soupe par jour. *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au Lab^o Nat^l de Contrôle des Médicaments sous le n° 699-2. Flacon P. M. de 125 gr. : Prix : 9 fr. 75. — Flacon G. M. de 250 gr. : Prix : 17 fr. 75.

Laboratoires G. LAMBERT O. ✱, Docteur en Pharmacie
 Rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54.)

ÉPIPALINE

Pommade vitaminée

Augmente la défense naturelle de la peau et active la réparation des tissus.

Compositions. — Huile de Flétan (33 %) particulièrement riche en Vitamines A et D.

Excipient composé exclusivement de produits d'origine animale et végétale, de tolérance parfaite.

Propriétés. — Action puissante due à sa pénétration facile dans l'intimité des tissus :

1° Décongestionnante et sédative.

2° Régénératrice et cicatrisante.

3° Anti-infectieuse par la vitamine A (sans adjonction d'aucun antiseptique).

Indications. — Lésions cutanées banales, dermites aiguës, intertrigo, érythème des nourrissons, crevasses du sein.

Brûlures de quelque origine qu'elles soient.

Radiodermites accidentelles ou thérapeutiques.

Plaies atones, ulcérations chroniques, ulcères variqueux.

Affections gynécologiques, ou obstétricales.

Affections anales, hémorroïdes, fissures douloureuses.

Affections rhino-pharyngées.

Enregistré au Laboratoire de contrôle sous le N° 1050-4.

Prix de vente : Le tube 16 fr.

Laboratoire du Docteur JOUVE .

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI^e) (Troc. : 69-87.)

ÉRANOL

Iode colloïdal physico-chimique à micelles de sens électropositif.

La première préparation d'iode présentée sous la forme micellaire.

L'*Éranol* ne saurait être comparé aux composés iodo-organiques, aux peptones iodées, à l'albumine iodée, à la caséine iodée, à l'huile iodée, ni aux iodures alcalins, tous produits dans lesquels l'iode se trouve à l'état de combinaison stable, difficilement dissociable. C'est un iode non combiné, en milieu aqueux, à l'état colloïdal (mouvements browniens), non caustique ni toxique, même aux doses thérapeutiques élevées.

Propriétés. — Grâce à l'état particulier sous lequel se présente cet iode, l'*Éranol*, de beaucoup plus actif que l'iode métalloïdique dans ses indications habituelles, possède une action catalytique très nette, due à ses ions, qui augmente, par excitation, le pouvoir thérapeutique de l'iode. Son hyperactivité, sa haute teneur en iode (10 p. 1 000), sa parfaite tolérance (enfants, vieillards) et sa forme aqueuse en font la préparation d'iode la plus maniable, la plus active et la moins toxique.

Résultats thérapeutiques inégalés. Jamais d'iodisme.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Lymphatisme, Hypertension, Arthritisme, Rhumatismes, Prétuberculose, Tuberculoses torpides, Mycoses, Basedow, Goitre, Angor, etc.

Forme. — Flacon, avec compte-gouttes.

Mode d'emploi et Posologie. — Pendant les repas ou entre les repas, dans du vin, de l'eau rougie et toute boisson.

Adultes : XX à L gouttes et plus, deux fois par jour.

Enfants : II à V gouttes par année d'âge et par jour, en deux fois.

Nourrissons : II à V gouttes *pro die*.

Laboratoire de L'ÉRANOL

45, rue de l'Échiquier — PARIS (X°).

(Tél. : Provence 48-40.)

ERCERHINOL

Composition. — Argent colloïdal électrique.

Propriétés. — Bactéricide puissant. Traitement pratique, rapide et propre.

Indications. — Grippe, Infections broncho-pulmonaires, Catarrhe naso-pharyngien, Coryza, Sinusite, etc.

Forme. — Ampoule nasale de 25 cc. avec tétine. Ampoule de rechange de 25 cc., sans tétine.

Posologie. — Verser quelques gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour, la tête inclinée en arrière.

Prix. — Ampoule complète : 18 fr. 35 ; Ampoule de rechange : 13 fr. 25 (8 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. Erцерhinol n° 507-12.
Erцерhinol Ephédriné n° 507-59.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE
1, av. de Villars, PARIS (VII^e). (Inv. 20-60.)

ERGÉPATINE

Médication hépatique de drainage et de désintoxication des voies digestives.

Peptone de viande purifiée.....	2 gr. 14	Extrait mou de Boldo ..	0 gr. 28
Peptone de poisson.....	1 gr. 28	Extrait sec d'Artichaut.	0 gr. 20
Peptone d'œuf.....	0 gr. 85	Salicylate de soude.....	1 gr. 70
Sulfate de magnésie desséché	14 gr. 20	Charbon animal décoloré	2 gr. 28
Extrait mou de Genièvre	0 gr. 28	Podophyllin	0 gr. 028
		Sucre parfumé Q. S. p.	100 gr.

Granulé fin, agréable, très soluble. Prix : 18 fr. 35.

Contenance de la boîte 125 gr. env.

Particularités. — Association des 3 peptones au Sulfate de magnésie, au Salicylate de Soude, et aux extraits végétaux (boldo, artichaut, genièvre) ; antiseptique (charbon) et laxatif.

Emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin et à midi.

Indications. — Maladies du Foie et des voies biliaires. Intoxications. Anaphylaxie. Maladies de la peau. Urticaire. Migraines. Constipation par insuffisance biliaire.

Agréable au goût, indiqué chez la femme et chez les enfants.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle N° 169-5.

J. C. ARNAULT
SAINT-JUST-EN-CHAUSSEE (Oise).

ERGOPHOS

Principes actifs. — Ergostérine irradiée, Acide ortho-phosphorique, Phytosphosphine (sel calco-magnésien de l'acide anhydro-oxyméthylène diphosphorique).

Indications. — Carences vitaminiques D (Rachitisme), Carences phosphocalciques (Ostéomalacie, tétanie, caries dentaires, fractures à consolidation lente, état pré-tuberculeux).

Formes : A = *Solution* concentrée.

B = *Gouttes* (enfants de 1 an à 8 ans).

Mode d'emploi :

Solution : 1 cuillerée à café à chacun des 2 principaux repas, diluée dans un grand verre d'eau mélangée ou non de vin, sucrée de préférence.

Gouttes : III gouttes par année d'âge, à chacun des 2 principaux repas, comme ci-dessus.

Prix : { *Solution* 19 fr.
 Gouttes 16 fr.

Durée du traitement : 15 à 20 jours.

Laboratoires S. A. R. L. au capital de 100 000 fr.

C. CHAMARD et **R. NIEL**
Ex-Inspecteur des Pharmacies et Docteur en Pharmacie
3, rue Royet — LYON-CALUIRE
Tél. : Burdeau 23-31.

ERGORONE

Solution glycéro-alcoolique de vitamine D cristallisée titrée à 12.000 unités internationales par cm³, soit 400 unités pour une goutte.

Indications. — Rachitisme, Spasmophilie, Ostéomalacie, Déminéralisation dans la grossesse. Pendant la lactation, comme prophylactique contre le rachitisme de l'enfant.

Présentation et posologie. — Flacons de 15 cm³.

Nourrissons : III à IV gouttes par 24 heures.

Enfants : VI à X gouttes par 24 heures.

Adultes : X à XX gouttes par 24 heures.

Prix de vente : Le flacon : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

ERGOTINE BONJEAN

Contient les principes actifs de l'ergot de seigle extrait par un procédé spécial.

(Procédé Bonjean, approuvé par l'Académie de médecine.)

Indications thérapeutiques. — Hémorragies de toutes natures : utérines, pulmonaires, gastro-intestinales. Fibromes, Hémorroïdes, Métorrhagies, Hémoptysies, Rétentions urinaires.

Formes. — Ampoules injectables indolores de 1 cc, dosées à 0 gr. 15 d'Ergotine Bonjean par ampoule, et correspondant à 1 gramme d'ergot de seigle.

Dragées : Chaque dragée correspond à 0 gr. 15 d'extrait mou ou 1 gramme d'ergot de seigle.

Extrait mou : pour préparations magistrales.

Solution : XV gouttes correspond^t à 0 gr. 15 d'Ergotine.

Posologie. — *Adultes.* — Ampoules : suivant le succès de son action (1 à 4 par jour). La boîte de 6 amp. : 17 fr. Dragées : 4 à 6 par jour avant chaque repas.

Le flacon de 30 dragées : 15 fr. 50,

Solution : XV gouttes, 4 à 6 fois par jour.

Le flacon de 30 grammes : 12 fr. 50,

Enfants : 1/2 dose.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.)

ERYSULFURE ÉON

Composition. — Monosulfure de Sodium à odeur et saveur dissimulées, Erysimum, Aconit, Goudron. Sirop stable, facile à prendre.

Propriétés. — H²S assainit l'arbre respiratoire ; régularise les sécrétions, les active et les fluidifie, ce qui facilite l'expectoration, ou les diminue si elles sont exagérées.

Indications. — Fragilité ou irritation chronique des voies respiratoires supérieures et moyennes.

Soins de la Gorge. Rhino-pharyngites. **Spécifique de l'enrouement et de l'extinction de voix.**

L'Erysulfure pourra réussir dans certaines formes de toux et bronchites persistantes, de catarrhes, d'asthme. Permet de combattre la fréquence des Rhumes ; les suites de grippe, de coqueluche.

Posologie. — *Adultes :* 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Jeunes gens : 1 à 3 cuillerées à dessert,

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Si possible avec une boisson chaude et une heure avant ou deux heures après les repas.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix du flacon : 19 fr. 10. (Taxe armement comprise.)

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord.

ÉRYTHÉMA

(Pommade)

Médication rationnelle des épidermes lésés.

Composition. — Pommade à base de Calcium, Magnésium et Extrait d'Aunée.

Indications. — Toutes lésions de l'épiderme, Dermatoses aiguës et chroniques, en particulier : Érythèmes des nourrissons, Crevasses des seins, Eczémas, Prurit, etc...

Présentation. — Pommade en tube.

Posologie. — Une application matin et soir.

L'Érythéma ne tache pas.

Laboratoires de l'ÉRYTHÉMA

139, rue Jean-Jaurès

MAISONS-ALFORT (Seine).

(Tél. : Entrepôt 13-97.)

ÉRYTHRA

Chimiothérapie élective de la ROUGEOLE.

Antithermique puissant, bien toléré par les enfants, sans action secondaire sur le rein.

INDICATIONS :

ROUGEOLE. — Arrête la poussée fébrile, abrège l'évolution, évite les infections secondaires (Thèse Boz, Paris, 1933).

Fièvres éruptives, saisonnières, septiques.

TYPHOÏDE. — Plus pratique que les bains froids, abaisse la température, augmente la résistance de l'organisme (Thèse Bernard, Paris 1935).

GRIPPE. — Pyrexies, algies.

Le plus maniable des antithermiques.

POSOLOGIE

ROUGEOLE.

<i>Enfants</i> : II à IV gouttes par année d'âge.	} toutes les 4 heures.
<i>Adultes</i> : L à LXXX gouttes.	

GRIPPE, PYREXIE, ALGIES, TYPHOÏDE :

<i>Enfants</i> : I à II gouttes par année d'âge.	} toutes les 6 heures.
<i>Adultes</i> : XXX à LX gouttes.	

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

Invalides 43-60 et 43-61.)

ÉSÉRATROPINE

Thérapeutique balancée[†] des déséquilibres vago-sympathiques.

Régulateur effectif du tonus neuro-végétatif par inhibition simultanée du vague et du sympathique.

Agit à la fois sur les syndromes des deux systèmes, sur l'ensemble des causes et sur l'état nerveux lui-même.

Sédatif nerveux, antispasmodique.

Provoque la détente psychique.

Composition. — Salicylate d'ésérine, Sulfate d'atropine, Chloralose, Bromure de calcium, Extrait sec de ballote, Extrait sec de Cratægus.

Indications principales. — Dystonies, Hyperémotivité, Spasmes, Anxiété, Vertiges, Dépression, Asthme, Gastronévroses, Entérocrites spasmodiques, Spasmes cardio-vasculaires et tous les troubles fonctionnels dus à l'hyperexcitabilité du système neuro-végétatif.

Posologie. — 2 à 5 comprimés dragéifiés par 24 heures, de préférence avant les repas ou 30 minutes avant le coucher.

L'Esératropine est immatriculée au L. N. C. M. sous le n° 29-14.

Laboratoires Henri FOUCHER

22, rue Lakanal — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 11-33.)

ÉTHÉR ANESTHÉSIQUE ADRIAN

Composition. — Éther sulfurique pur à 66° du Codex français.

Indication. — Anesthésique général.

Présentation et prix :

a. Ampoule de 50 gr. : 13 fr. 85.

— 100 — : 19 fr. 15.

b. Flacon de 50 gr. : 6 fr. 90.

— 100 — : 11 fr. 70.

— 125 — : 13 fr. 85.

— 250 — : 21 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 523-7.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

ÉTHYL-PNEUMINE

Spécifique des affections pulmonaires aiguës.

Composition. — Solution d'alcool éthylique pur à 33 p. 100 en milieu glucosé isotonique.

Forme pharmaceutique. — Ampoules de 10 cc.

Indications thérapeutiques. — *Traitement efficace de toutes les pneumopathies les plus graves : pneumonies, broncho-pneumonies, congestions pulmonaires, bronchites, abcès du poumon, gangrène pulmonaire.*

Maladies infectieuses et complications pulmonaires : septicémies, fièvres puerpérales, coqueluche, grippe, etc.
Traitement des intoxications barbituriques.

Doses. — *Adultes : Cas graves : 20 à 40 cc. par voie intraveineuse ou intramusculaire, répétées tous les jours.*

Cas moyens ou légers : 10 cc. par voie intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Enfants : Au-dessous de 6 ans : 5 cc.

Au-dessus — : 10 cc.

Prix. — La boîte de 6 ampoules : 25 francs.

Échantillons, Littérature :

Laboratoires INGÉ

14, rue Maublanc, PARIS (XV^e). (Tél. Vaugirard 88-90.)

EUBINE

Composition. — Chlorhydrate de dihydrooxycodénone.

Propriétés. — **REMPLACE LA MORPHINE.** Quatre fois moins toxique. Injection indolore.

Indications. — Toutes douleurs, Cancer, Tuberculose, Coliques hépatiques et néphrétiques, Douleurs fulgurantes et Crises gastriques du tabès, Névralgies, Sympathalgies.

Son action est particulièrement favorable dans les crises douloureuses accompagnées de vomissements.

Présentation :

10 ampoules à 2 cc ; 10 ampoules à 1 cc. ; 10 suppositoires à 2 cc. ; 20 cachets à 2 cc.

Tableau B.

Posologie et mode d'emploi :

Chirurgie : Injecter 3/4 d'heure avant l'opération une ampoule de 2 centigrammes, et 1/4 d'heure avant une ampoule de 1 centigramme.

Laboratoire National de Contrôle n° 1504.

Laboratoires KOEHLY

18, rue de Ménilmontant — PARIS

(Tél. : Ménil. 63-95.)

EUCALYBROL

Toutes les formes de toutes les maladies, de toutes les voies aériennes.

AMPOULES :

Formule

Ether benzylique du Gaïacol.....	0,03
Cinnamate de Benzyle.....	0,002
Cholestérol.....	0,002
Eucalyptol.....	0,10
Ether.....	0,03
Camphrè.....	0,03
Huile d'olive neutralisée et stérile Q. S. pour 1 cc.	
En ampoules de 1 cc., 2 cc. et 5 cc.	

Posologie

Adultes : de 2 à 5 cc. par jour.

Enfants : au-dessus de 5 ans, de 1 à 5 cc. par jour.

Enfants : au-dessous de 5 ans, de 1/2 à 1 cc. par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-14.

Ampoules. — Les Ampoules, dont l'injection intra-musculaire ou même sous-cutanée est *parfaitement indolore*, existent sous 3 formes : Ampoules de 1cc., Ampoules de 2 cc. et Ampoules de 5 cc.

SIROP :

Formule

Codéïne.....	0,12
Bromoforme.....	0,12
Acide Phénique.....	0,10
Sulfogaïacolate de Potasse.....	2,
Teinture de Belladone.....	0,50
— d'Aconit.....	0,50
— de Grindélia.....	0,50
— de Polygala.....	0,50
Chlorure de Tétraméthyl-Thionine.....	0,005
Sirop d'Eucalyptus Q. S.....	100

Posologie

Adultes : 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : au-dessus de 10 ans, 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : de 3 à 10 ans, de 2 à 4 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-6.

SUPPOSITOIRES :

Formule

Ether Benzylique du Gaïacol.....	0,15
Cholestérine.....	0,01
Camphrè.....	0,03
Eucalyptol.....	0,05
Chlorydrate d'Amyléine.....	0,005
Excipient Q. S. 1 suppositoire	

Posologie

Adultes : 1 à 3 par jour.

Enfants : 1 à 2 par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 718-15.

Indications générales :

Affections broncho-pulmonaires aiguës : Trachéo-bronchites simples, aiguës et subaiguës, congestion pulmonaire, pneumonie broncho-pneumonie, en particulier préventivement et curativement dans les gripes.

Fièvres éruptives : Rougeole, coqueluche.

Pleurésies séro-fibrineuses ou purulentes, pleurésies sèches.

Suppurations broncho-pulmonaires : Bronchites chroniques, catarrhes, gangrène pulmonaire, abcès du poulmon, tuberculose pulmonaire.

Prévention des complications pleuro-pulmonaires en milieu chirurgical.

Laboratoires BRICHARD et Fils.

BAR-LE-DUC (Meuse).

EUCALYPTINE LE BRUN

(Antiseptique broncho-pulmonaire).

Formules et posologies :

AMPOULES de 1, 2 et 5 cc. contenant par cc. :

Eucalyptol .	0 gr. 12	Ac. phénique...	0 gr. 01
Gaïacol	0 gr. 025	Camphre	0 gr. 10

Les Ampoules existent également sous forme *non gaïacolée*.

Pour injections sous-cutanées ou intramusculaires

Doses. — *Adultes* : 1 à 5 cc. par jour.

Enfants : 1 à 3 cc. suivant l'âge et le cas.

CAPSULES

Eucalyptol	0,10	Gaïacol	0,025
Acide phénique..	0,005	Camphre.....	0,012
Ether.....	0,012	Codéine.....	0,005
Bromoforme.....	0,005	Pour une capsule glutinisée.	

Doses. — 6 à 9 par jour à avaler avec un liquide.

Eviter les eaux alcalines (type Vichy ou Vals).

Ces capsules étant glutinisées se dissolvent dans l'intestin et n'ont aucune influence sur l'estomac.

SIROP : Voir à la page **SIROP EUCALYPTINE**.

SUPPOSITOIRES : Voir à la page **SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE**.

Indications. — *Toutes les Affections aiguës des voies respiratoires : Grippe, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Bronchites, certaines formes de Tuberculose, Gangrène pulmonaire, Maladies infectieuses, Coqueluche, Absès du poulmon, Dilatation des bronches.*

Dans le traitement de la Coqueluche chez le nourrisson et l'enfant : émulsionner le contenu d'une ampoule de 2 cc. dans 1/2 verre d'eau de guimauve et donner chaque jour en lavement à conserver.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 71-33.)

EUCHOL INJECTABLE

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Composition. — Complexe actif retiré de l'extrait de *Cynara Scolymus Euchol* 0 gr. 15, par ampoule de 5 cc.

Nota. — Ce corps est l'un des principes actifs de l'*Euchol* qui se trouve dans le commerce sous forme de comprimés depuis de nombreuses années. Il a fait l'objet dans notre laboratoire d'une étude attentive d'extraction et de dosages définis, suivie d'une expérimentation physiologique rigoureuse d'abord sur cobayes et lapins, puis sur l'homme par plusieurs médecins des hôpitaux de Paris.

Propriétés thérapeutiques. — Ce corps active les fonctions du foie par contact immédiat et sanguin avec cette glande.

Comme conséquence de son action tonique cellulaire hépatique, signalons l'élimination plus intense de l'urée sanguine et la diurèse uréique.

Il augmente le pouvoir dissolvant du sérum sanguin vis-à-vis du cholestérol et évite ainsi le premier stade de la sclérose des parois artérielles.

Indications. — Insuffisance hépatique à syndrome hépato-rénal ; Cirrhose avec ascite ; Cholémie familiale ; Lithiase biliaire et rénale ; Migraines hépatiques ; Hypercholestérinémie ; Hypertension ; Brightisme. Petite urémie de Widal.

Posologie. — Une injection intramusculaire, en général tous les deux jours (prendre six comprimés d'*Euchol* pendant le jour intercalaire).

Nota. — L'*Euchol injectable* peut être donné aussi par voie buccale ou en lavement.

Voie buccale.

Une ampoule par jour.

(Jusqu'à 10 ans) une 1/2 ampoule.

Voie rectale.

Adulte : Deux ampoules.

Enfants : Une ampoule (à ajouter à une décoction de guimauve).

L'*Euchol injectable* est fabriqué par le

Laboratoire MORELLET, à Bagnoles-de-l'Orne.

J. MORELLET, Docteur en Pharmacie.
ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

EUCHOL MORELLET

Comprimés.

Composition. — Extrait stabilisé sec de cynara. (artichaut), 0 gr. 30 par comprimé.

Forme pharmaceutique. — Comprimés dragéifiés.

Propriétés :

Tonique hépatique cellulaire.

Cholérétique.

Décongestionnant des voies biliaires.

Abaisse le taux de l'urée dans le sang.

Lutte contre les dépôts tissulaires de cholestérine.

Diurétique puissant.

Remarque. — L'EUCHOL ne contient toujours que de l'artichaut. Il est le *premier* et il a été le *seul* jusqu'à fin 1933 à ne contenir que de l'artichaut.

Posologie. — 4 à 6 comprimés à avaler par jour.

Dose de 2 comprimés au moment des repas.

Indications :

Ictère catarrhal.

Cholécystite et angiocholite.

Toute insuffisance hépatique.

Cholémie familiale.

Cirrhose.

Lithiase biliaire et rénale.

Coliques

Congestions

Migraines

Constipation

Intoxications

Urticaire

Arthritisme

Cholestérinémie.

Etats uricémiques, hypertension.

8 à 11 jours de traitement par boîte.

Enregistré sous le n° 336-1 au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire MORELLET

J. MORELLET, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Paris.

Docteur en Pharmacie.

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris,
BAGNOLES-DE-L'ORNE (Orne).

EUGYNOL GRANDVAL

Composition :

Association d'extraits d'*Hydrastis-Hamamelis-Viburnum Gossypium*.

Propriétés thérapeutiques. — Il favorise la formation chez les jeunes filles, évite les palpitations et provoque l'élimination des toxines.

Vaso-constricteur par excellence ; il régularise la circulation du sang, décongestionne les organes, et apporte toujours un soulagement à la souffrance produite par la moindre affection des organes de la femme.

L'Eugynol permet d'enrayer la formation des Varices ; soit au moment de la grossesse, soit au retour d'âge.

Il rétablit la régularité des règles. Son usage à dose modérée finit par supprimer les douleurs qui accompagnent ou qui précèdent si souvent ce moment désagréable.

Indications thérapeutiques. — Complications du retour d'âge, telles que Varices, Hémorroïdes, Hémorragies, Flux sanguins de toute nature, Eruptions diverses, etc.

Dose. — XV à XX gouttes avant chaque repas. On peut aller jusqu'à XXX gouttes.

Le flacon : 10 fr. 65 (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12, 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

EUNÉRYL

Médication de l'anxiété et des dystonies neuro-végétatives, antispasmodique et tonique.

Composition :

Phényléthylmalonylurée soluble.....	4 grammes.
Hyposulfite de magnésium.....	10 —
Extrait fluide d'Adonis vernalis.....	16 —
Excipient.....	Q. S. pour 100 grammes.
X gouttes — 0,01 de phényléthylmalonylurée.	

Propriétés thérapeutiques :

La phényléthylmalonylurée, obtenue en Solution rigoureusement stable par un procédé spécial, est mieux assimilée et agit à doses plus réduites.

L'hyposulfite de magnésium, régulateur du tonus vago-sympathique, est un stimulant qui permet d'éviter la légère action dépressive de la phényléthylmalonylurée. De plus, grâce à l'antagonisme existant entre le magnésium et le potassium, le magnésium procure la sédation des phénomènes d'hyperpotassiémie avec décharge d'adrénaline notés chez les émotifs.

Enfin, l'Adonis vernalis, en plus de ses propriétés cardiotoniques et diurétiques, exerce une action sédative sur certains centres moteurs cérébraux et médullaires régissant le système musculaire (Masslow).

Indications :

Dystonies neuro-végétatives, anxiété, hyperémotivité, instabilité, irritabilité, syndrome solaire, légères insomnies, cauchemars, convulsions, toux de la coqueluche, mal de voiture

Formes. — Gouttes.

Posologie :

Adultes : L à LXXX gouttes par jour,

Enfants : XV à XXX — —
en trois fois avant les repas.

Nourrissons : V à XX gouttes.

En lavement : Doubler les doses.

Prix. — Le flacon de 20 grammes (800 gouttes) :
19 fr. 10.

Laboratoires BIOLABO

9, bd Malesherbes — PARIS (VIII^e). (Tél. : Anjou 61-61.)

EUONYMINE PAUL THIBAUT

Pilules d'Euonymine purifiée, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien Président de la Société de Pharmacie de Paris, Evonymine associée à l'extrait stabilisé de boldo. Le plus actif cholérétique et cholagogue d'origine strictement végétale. Stimulant par excellence de la cellule hépatique.

Indications. — Affections du foie, Insuffisance biliaire, Cirrhoses, Ictères, Lithiase biliaire, Cholécystites, Céphalée, Migraines et Constipation chronique d'origine hépato-biliaire.

Posologie. — Pilules dosées à 0 gr. 02 d'Evonymine, de l'*Atropurpureus americanus*, et à 0 gr. 02 d'extrait de boldo — 1 à 4 pilules par jour, soit au dîner, soit au coucher.

Prix : 9 fr. 65.

Pour un traitement de 15 à 30 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Nota. — Afin d'éviter les mécomptes donnés par de nombreuses evonymines du commerce, prescrire toujours : *Pilules d'Euonymine Paul Thibault.*

Enregistré au Laboratoire National n° 218-2.

EUPAVÉRYL PACHAUT

Chlorhydrate de Papavérine.

Chimiquement pur.

Action thérapeutique :

Régulateur du système nerveux, végétatif. Agit soit sur le sympathique, soit sur le para-sympathique en rétablissant l'équilibre vago-sympathique.

Freinateur du spasme de la fibre lisse ; agit directement sur la cellule musculaire lisse sans paralyser le nerf.

Ne modifie pas les sécrétions. Sans action hypnotique.

Indications :

Spasmes viscéraux, Spasme œsophagien, Spasme du pylore, Constipation spasmodique, Coliques hépatiques, Hypertension spasmodique, Angine de poitrine. Asthme, Toux spasmodiques, Coqueluche, Dysménorrhée spasmodique, Déséquilibre vago-sympathique.

Présentations :

Gouttes. Granules. Prix : 21 fr. 20.

Ampoules. Prix : 15 fr. 90.

Gouttes : X gouttes = 1 centigramme.

Ampoules : 1 cc. = 5 centigrammes.

Granules : 1 granule = 2 centigrammes.

Posologie :

Adultes : de 0 gr. 50 à 0 gr. 25 en doses fractionnées.

Enfants : 1 centigramme par année d'âge en doses fractionnées.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS (Tél. : Provence 49-77.)

EUPEPTIQUE MONAVON

Composition. — Liqueur exactement dosée et renfermant par cuillerée à soupe :

Pepsine pure	0 gr. 12
Diastase	0 gr. 15

Propriétés thérapeutiques. — Digère les viandes et les féculents.

Avantages. — Il supplée à l'insuffisance et à l'inactivité des liquides digestifs, et par là améliore la digestion, augmente l'absorption et l'assimilation et lutte efficacement contre l'amaigrissement.

Indications. — Digestions lentes et difficiles ; dyspepsies, gastralgies, crampes d'estomac, certaines formes de migraine, et tous les états de faiblesse que ces maladies produisent, tels que : amaigrissement, consommation, anémie, etc.

Posologie. — Un à deux verres à liqueur pour les adultes, après chaque repas, pur ou mélangé d'eau. Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 20 fr. 75.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

EUPHON

Sirop et Pastilles contre l'enrouement.

Composition et forme. — Sirop à base d'extraits de plantes et de Produits organiques : codéine 0,02 + Teinture rac. aconit 0 gr. 20 ; formiate sodique 5 + sirop d'erysimum et d'aunée 100.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique par excellence des cordes vocales (tant chez l'adulte que chez l'enfant), calme complètement les picotements de la gorge qui accompagnent souvent un rhume ou une bronchite. Son emploi s'associe à tous les sirops pectoraux sans aucune contre-indication.

Indications thérapeutiques et posologie. — Entretien de la voix : 3 cuill. à café par jour. — Enrouements, toux laryngées : 3 cuill. à dessert par jour. — Aphonies, trachéite, laryngite (simple ou chronique), 3 cuill. à potage par jour. — Chez les enfants, ne pas dépasser 3 cuill. à café par jour.

Prix : Sirop : 16 fr. 85 — Prix : Pastilles : 7 fr. 45
(8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12
A Bruxelles : LE MARINEL, Pharmacien,
4. avenue Orban.

EUPHORYL

Dragées. Cachets. Intraveineux. Intramusculaire:

Méthode de désensibilisation polyvalente. Traitement des dermatoses prurigineuses et affections anaphylactiques.

Formule. — Thiosulfate de sodium et chlorure de calcium en combinaison bromurée silicatée.

Indications. — *a.* Dermatoses prurigineuses : Eczémas secs et suintants, érythrodermies, dermites alimentaires, médicamenteuses et professionnelles. Psoriasis, toxidermatoses, accidents de l'aurothérapie.

b. Prurits essentiel, toxique, génital, sénile, parasitaire.

c. Manifestations anaphylactiques : Urticaire, migraines, œdème de Quincke, maladie sérique, chocs anaphylactiques.

Posologie. — *Cas moyens :* 3 cachets ou 6 dragées par 24 heures ou 1 injection intramusculaire profonde de 5 cc. tous les 2 jours (8 à 12 injections).

Cas aigus : 1 injection intraveineuse bihebdomadaire, avec prise de 2 cachets ou 4 dragées les jours intercalaires.

Nota. — Il est recommandé de pratiquer simultanément l'injection intraveineuse d'Euphoryl et une autohémothérapie de 10 cc.

Prix : cachets : 21 fr. 75 ; dragées : 21 fr. 75 ; intraveineux : 21 fr. 75 et 36 fr. 90 ; intramusculaire : 30 fr. 40.

Laboratoires ANA,

M. VIENNE, Pharmacien

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e). (Tél. : Did. 16-49.)

EUPHORYL-INFANTILE

Granulé soluble.

Traitement des troubles digestifs de l'enfance et de leurs complications cutanées. Anaphylaxies. Intoxications.

Formule. — Thiosulfates alcalins, Citrate de sodium, Lactate de magnésium, en combinaison bromurée silicatée.

Présentation. — Granulé soluble de goût agréable, facilement accepté par les enfants les plus jeunes.

Indications. — L'Euphoryl Infantile est particulièrement indiqué dans trois groupes d'affections infantiles.

1^o *Dermatoses prurigineuses.* — Eczémas secs ou suintants, eczémas dysidrosiformes, eczémas séborrhéiques, séborrhée, dermites médicamenteuses, érythrodermies, toxi-dermatoses, strophulus, prurits, herpès, trichophyties, pityriasis.

2^o *Troubles digestifs.* — Anorexies, Vomissements, État saburral des voies digestives, intoxications alimentaires, constipation des nourrissons, Petite insuffisance hépatique.

3^o *Anaphylaxies.* — Urticaire, migraines, œdèmes de Quincke.

Posologie et mode d'administration. — L'Euphoryl Infantile doit être prescrit à la dose de 1 cuillerée à café par année d'âge. Il peut être croqué ou dissous dans une petite quantité d'eau ou de lait. Chez les nourrissons il se dissout aisément dans les biberons.

Prix : 21 fr. 75.

Laboratoires ANA

M. VIENNE, Pharmacien

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e). (Tél. : Did. 16-49.)

EUPHRÉNINE BASTIA

Sédatif. Décongestif. Hypotenseur.

Non toxique.

Forme. — Gouttes.

Composition :

Extrait fluide de Scrofularia Tournefortii..	40 gr.
— de Betonica officinalis	40 —
— de Ballota nigra	10 —
pour 100 grammes.	

Indications. — Tous les Hypertendus quels qu'ils soient en relèvent, Athéromateux séniles, Artérioscléreux ; Cardiopathes gauches, Aortiques, Cardio-rénaux ; Crise d'angor, Œdème aigu, Pseudo-asthme ; Troubles de la ménopause.

Dose habituelle. — LX gouttes, une ou deux fois par jour, suivant le cas, dans un peu d'eau sucrée ou non.

Laboratoire MOUSSELON

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON.

EUPHYTOSE

Traitement phytothérapique des états anxieux et des Dystonies du sympathique.

Forme. — Solution.

Composition. — Une cuillerée à café contient

Cratægus oxyacantha..... 31 centigr.

Extrait fluide de *passiflora incar-*

nata 50 —

Extrait fluide de *Paullinia sorbilis* 16 —

Extrait mou de *Valeriana officinalis* 12 —

Alcoolature de *Ballota nigra*..... 98 —

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café en 24 heures dans un peu d'eau sucrée ou dans une infusion chaude.

Indications. — Angoisse et états anxieux, Insomnie anxieuse, Eréthisme cardio-vasculaire, Palpitations, Tachycardie, Angoisse précordiale, Vertiges, Spasmes viscéraux, Douleurs angineuses, Angoisse de la ménopause.

Propriétés thérapeutiques. — L'Euphytose est antispasmodique par la Ballote. Elle est tonique cardiaque par le *Cratægus oxyacantha*. Par la Passiflore, elle est sédative de tous les troubles nerveux ayant leur point de départ dans le sympathique. Elle modère l'excitabilité réflexe par la Valériane. Enfin, elle doit au *Paullinia sorbilis* (Guarana) une action tonique puissante, mais non excitante, action régulatrice qui produit cette euphorie spéciale, si appréciée après la phase d'angoisse qu'elle remplace.

L'Euphytose, d'autre part, n'entraîne aucune accoutumance ; ne s'accumulant pas, son usage peut être prolongé, et même alors elle n'arrive jamais à troubler le fonctionnement rénal ou à modifier l'équilibre de la tension artérielle. Enfin elle est parfaitement tolérée par les voies digestives.

Pour toutes ces raisons, l'Euphytose représente le médicament parfait de la crise d'angoisse.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09-83.)

EUPLASTYL

Forme. — Pommade très pénétrante, demi-grasse, ne formant pas de croûte, et sans odeur.

Indications. — Calmant instantané de tout prurit ou douleur, antiseptique puissant, cicatrisant extraordinairement rapide.

Toutes lésions cutanées : ulcères, brûlures, eczémas secs, prurits, impétigos, etc.

Composition. — Huile de chaulmoogra, sulfo-ichtyolate d'ammoniaque, sulfate de cuivre, para-aminobenzoate de butyle, oxyde de zinc et de titane.

Mode d'emploi. — En couche épaisse sur la lésion.
Le tube normal : 5 fr. 20.

Le triple tube pour dermatoses étendues ou rebelles :
14 fr. 50.

La poudre EUPLASTYL, au prix de 5 fr. 20 la boîte, complète utilement l'action de la Pommade, très efficace pour le poudrage des bésés, pour les dermatoses bénignes et pour la transpiration excessive.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1248-4.

L. QUÉRET, Pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

EUPNINE VERNADE

à l'Iodure de Caféine stable.

Dose et mode d'emploi. — Une cuillerée à café le matin et le soir, au commencement des repas, mélangée dans 2 cuill. à potage d'eau, de lait ou de bière.

Propriétés thérapeutiques. — “ L'Eupnéique ” Diurétique et toni-cardiaque.

Indications. — Asthme, Emphysème, Dyspnées, Bronchite chronique, maladies du Cœur et des Vaisseaux, Artério-sclérose, Hydropisies, Angine de poitrine, Intoxications, Urémie, suites de Grippe.

Prix : 18 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Galv. 86-17.)

EUPNOGÉNOL

Forme. — Élixir.

Indications. — Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques. Oppressions et toutes affections des voies respiratoires.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par 24 heures pour les adultes et suivant avis du médecin pour les enfants.

Prix du flacon : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1873-1.

Échantillon envoyé sur demande.

Préparé par le laboratoire de
l'Eupnogénol.

F. VELLAY

Pharmacien de 1^{re} classe

116, avenue Berthelot — VIENNE (Isère).

EUPNOL (Poudre et Pastilles)

Asepsie des muqueuses des premières voies respiratoires (nez et gorge).

Composition. — Eucalyptol, terpinol, menthol (peu), essence de pin sylvestre, acide benzoïque.

Propriétés. — Décongestionnant, désinfectant, ni caustique ni toxique, des fosses nasales, du pharynx et de la trachée.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie, rhinites, sinusites, pharyngites, laryngites, trachéites.

Emploi. — *Poudre* : 1 cuillerée à café par doses fractionnées dans un bol d'eau bouillante en inhalations, gargarismes et grands lavages de gorge.

Pastilles : Sucrer 8 à 10 par jour.

Prix :

Poudre : le flacon, 17 fr. 35.

Pastilles : la boîte, 6 fr. 65.

L. N. C. 314-33 et 34.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

EUPNOPHÉDROL

Pour instillations nasales et pulvérisations.

Présentation. — Flacon avec compte-gouttes spécial.

Composition. — Ephédrine base, 0 gr. 50 ; Eucalyptol, Goménol, Chlorétone, Essence de lavande, Huile neutralisée, Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Coryza, Rhume des foins, Asthme et Asthme nasal, Congestions fluxionnaires avec migraines d'origine nasale, Sinusites, Rhinites suppurées.

Emploi. — V à X gouttes dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour. *L'Eupnophédrol* réussit mieux encore en pulvérisations.

Prix. — Le flacon : 15 fr. 80.

L. N. C. n° 314-37.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

EUPULMOL

LAVEMENTS. SUPPOSITOIRES.

LAVEMENTS. — Traitement d'urgence des affections pulmonaires aiguës. Tonicardiaque. Véritable spécifique des Broncho-pneumonies. Le *Lavement* réalise une dispersion quasi instantanée d'éther et de goménol dans tout l'organisme, mettant celui-ci en état de défense et capable de supporter l'action secondaire du camphre et de la strychnine.

Formule. — Pour 250 cc., 8 cc. de goménol, 8 cc. d'éther sulfurique; 4 mgr. de strychnine sulf., 4 gr. de camphre, 60 gr. d'huile d'olive stérilisée. Emulsion à la gomme adragante.

Indications. — Broncho-pneumonie. Pneumonie. Congestion pulmonaire. Bronchite simple, aiguë. Coqueluche. Grippe à forme respiratoire.

Posologie. — L'*Eupulmol* se donne pur, en lavements à conserver à l'aide d'une petite poire en caoutchouc.

Jusqu'à 1 an 2 lavements par jour de 1 cuillerée à soupe.

de 1 à 2 — 3	—	1	—
de 2 à 4 — 4	—	1	—
de 4 à 6 — 3	—	1 1/2	—
de 6 à 10 — 3	—	2	—
Adultes 3	—	4	—

Dès que la phase aiguë de la maladie est passée, ces doses peuvent être réduites de moitié.

SUPPOSITOIRES. — Médication d'entretien dans toutes les affections pulmonaires. Tonicardiaque. Antiseptique de choix des voies respiratoires.

L'*Eupulmol* « Suppositoires » contient les mêmes principes actifs que le « Lavement ».

L'Éther a été remplacé par le Cinnamate de Benzyle, dérivé possédant les mêmes propriétés.

Même processus d'action, simplement action moins instantanée dans l'organisme.

Le « Suppositoire » joue le rôle de désinfectant respiratoire électif et de ce fait, réalise le véritable spécifique de toutes les affections pulmonaires chroniques.

Formule. — *Suppositoires Enfants :*

Goménol	0 gr. 25
Camphre	0 gr. 10
Cinnamate de Benzyle.....	0 gr. 015
Sulfate de Strychnine.....	1/10 de mgr.

Excipient Q. S. pour 1 suppositoire terminé à 2 grammes.

Suppositoires Adultes :

Goménol	0 gr. 50
Camphre	0 gr. 25
Cinnamate de Benzyle.....	0 gr. 05
Sulfate de Strychnine.....	0 gr. 001

Excipient Q. S. pour 1 suppositoire terminé à 3 gr. 60.

Indications. — En général toutes les indications de l'*Eupulmol* « Lavement », mais dans la forme chronique de la maladie. Tuberculose pulmonaire. Emphysème. Asthme. Oppression. Laryngite.

Posologie. — *Suppositoires Enfants :* Jusqu'à 1 an : 1 par jour.

De 1 à 2 ans : 2 par jour.

De 2 à 4 ans : 3 par jour.

Au-dessus de 4 ans : 4 par jour.

Suppositoires Adultes : Dans la période active de la maladie : 1 suppositoire matin et soir au lever et au coucher. Dans les cures d'entretien, un suppositoire le soir au coucher.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1966-1-2-3.

Laboratoires de l'EUPULMOL

M. CHAVATTE, Pharmacien.

88, rue de France — ROUBAIX.

EUQUINARGOL

Formes :

Suppositoires dosés pour bébés et enfants.
— — — adultes.

Composition. — Euquinine, Analgésine, Collargol, Cinéol.

Propriétés. — Analgésiques, Antiseptiques.

Indications — Tous états fébriles, infectieux et pulmonaires.

Doses. — 1 ou 2 suppositoires par 24 heures, suivant la température.

Prix : *Bébés, enfants* : 11 francs.

Adultes : 13 francs.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

EURINASE (Pilules)

Composition :

Hexaméthylène tétramine	0,06
Benzoate de lithine	0,050
Chlorhydrate de tétraméthylthionine ...	0,002
Excipient dont Carbonate de magnésium.	Q. s. p. une pilule

Propriétés. — Antiseptique et désinfectant des voies urinaires, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Pyélite, pyélonéphrite, colibacillurie, cystite, prostatite, orchite, hypertrophie prostatique, catarrhe vésical, blennorrhagie chronique, pyurie, coliques néphrétiques, lithiase rénale, goutte, rhumatisme chronique, arthritisme, lumbago, colibacilliose.

Présentation. — Une boîte de 75 pilules : 20 fr. 80 pour un traitement de 9 à 12 jours.

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour.

Notices et Échantillons sur demande.

SUPPO-EURINASE

Composition :

Novocaïne	0,01	} anti-douleur.
Extrait de belladone	0,02	
Extrait de jusquiame	0,03	
Bleu de méthylène.....	0,04	désinfectant.
Extrait d'hamamélis	0,05	décongestionnant.
Beurre de cacao	Q. s. pour 1 suppositoire.	

Propriétés. — Triple action : *anti-douleur, désinfectant, décongestionnant.*

Indications. — Chez l'homme : Prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, uréthrites, blennorrhagies et leurs complications, orchites, rétrécissements, goutte militaire, douleurs à la miction.

Chez la femme : Métrites, salpingites, métrorragies, règles douloureuses, congestions utéro-ovariennes.

Chez l'homme et chez la femme : Néphrites, pyélonéphrites, toutes cystites aiguës ou chroniques, catarrhes de la vessie, colibacillurie, syndrome entérorénal, hémorroïdes, congestion du petit bassin.

Présentation. — Une boîte de 8 suppositoires : 16 fr. 65.

Posologie. — *Etats chroniques* : un Suppo-Eurinase, le soir au coucher. *Etats aigus* : un Suppo-Eurinase matin et soir.

Notices, Littérature et Échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCACHON. Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences.

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique

EUSEDYL

Suppositoires.

Composition. — Association de : Chl. de méthylcodéine, 0,03 ; ext. de belladone, 0,01 ; bromhydr. de scopolamine, 0,0002 ; phényléthylmalonylurée, 0,03 et d'ouabaïne crist., 0,0005.

Indications. — Toutes les indications de la morphine. Syndromes douloureux abdominaux et pelviens. Névralgies et Myalgies. Néoplasies. Dyspnée, agitation, insomnie des asthmatiques, emphysemateux et cardiaques. Grande et petite chirurgie.

Avantages. — Prescription facile (aucun produit du tableau B). Aucune contre-indication. (Spécialement indiqué chez les insuffisants cardiaques et rénaux.)

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures. *Enfants* au-dessus de 8 ans : par 1/3 ou 1/2 suppositoires.

Prix : 18 fr. la boîte normale de six suppositoires ;
54 fr. la quadruple boîte.

Laboratoire de l'EUSEDYL

32, rue des Vallées — COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 02-45.)

EUSOMNINE BÉLIÈRES

(Diéthylmalonylurée ammonio-bromée.)

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Hypnotique, sédatif, antialgique.

Indications. — Insomnies nerveuses, Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Dyspnée, Névralgies, Démorphinisation, Dyspepsie nerveuse.

Mode d'emploi et dose. — *Comme sédatif* : Un comprimé pour les adultes. Un demi-comprimé pour les femmes. Deux fois par jour.

Comme hypnotique : Une heure avant de se coucher : Pour les adultes, 2 comprimés. Pour les femmes, 1 comprimé 1/2. Ces comprimés doivent être pris le soir dans une tasse de tisane chaude, camomille, tilleul, oranger, thé léger.

Chez les enfants atteints de Coqueluche et de Crises nerveuses, on peut très utilement donner 1/6 ou 1/4 de comprimé.

L'étui : 6 fr. 25.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

EUTENSYL GRÉMY

Traitement de l'hypertension artérielle.

Formule. — Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais.

Muscle cardiaque	0 gr. 50
Parenchyme rénal	0 gr. 50
Iodotyrosine	0 gr. 05
Scille	0 gr. 06
Scammonée	0 gr. 04

Pour un comprimé.

Doses et mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour à prendre une demi-heure ou une heure avant les repas.

Indications. — Artériosclérose au début, hypertension artérielle, obésité avec hypertension, athéromateux, néphrite chronique hypertensive, cardiopathies avec hypertension.

L'Eutensyl provoque une hypotension qu'il compense en excitant le rein, en favorisant les évacuations intestinales, en rassurant le cœur.

Le médecin peut associer à l'Eutensyl la digitale.

Prix : 22 fr. 45.

Enregistré L. N. C., n° 608-03.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 48-43.)

ÉVATMINE CARRION

Médication adrénalino-hypophysaire de l'asthme.

Composition. — Solution injectable renfermant 1 demi-milligramme d'adrénaline naturelle, associée à l'extrait d'hypophyse.

Forme. — Ampoules de 1 cc.

Indications. — Crise d'asthme, Toux spasmodique.

Contre-indication : hypertension notable.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire au moment des crises 3, à 4 ampoules dans les 24 heures s'il est besoin. S'assurer que l'injection n'est pas poussée dans un vaisseau.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules 1 cc. : 17 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 514-11.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII°)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

ÉVINE

Poudre soluble Évine.

Antiseptique, parfumée, alcaline, détersive, décongestionnante, sédative, cicatrisante, non caustique. Ne tache pas.

Indications. — Hygiène intime et journalière de la femme. Gynécologie, Obstétrique, Dermatologie, suivant doses.

Posologie. — 1° Hygiène féminine : 1 paquet pour 2 litres d'eau bouillie tiède, en injections et lotions ; 2° Gynécologie, Leucorrhée, Vulvite, Prurit : 2 à 3 paquets pour 2 litres eau bouillie (injections, lotions, compresses), précieux adjuvant aux pansements médicaux ; 3° Obstétrique (même posologie qu'en gynécologie) ; 4° Hygiène masculine : 1 paquet pour 1 litre d'eau bouillie en bains et lotions ; 5° Dermatologie : 1 paquet pour 1/2 litre d'eau bouillie tiède (bains, lotions compresses).

Ovules Evine.

Puissamment antiseptiques et non irritants, cicatrisants, décongestionnants, désodorisants, fondent à 36°, 5. Ne tachent pas.

Indications. — Toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Un ovule le soir au coucher. Au préalable, prendre une injection avec une solution de Poudre Evine dans de l'eau bouillie tiède. Renouveler cette injection le matin au lever.

Prix : Poudre : 16 fr. 10. — Ovules : 18 fr. 75.

Laboratoires ÉVINE

15, boulevard des Batignolles — PARIS (VIII°)
(Tél. : Europe 35-63.)

ÉVOLAXINE

(Le laxatif de la Femme.)

Traitement physiologique de la constipation habituelle de la femme.

Pas d'accoutumance. Pas de coliques.

Par ses Iloïdes ovariens stabilise et régularise la sécrétion endocrinienne en général, la sécrétion intestinale en particulier.

Par son muilage lubrifie les parois intestinales.

Par son rhamnus frangula excite le péristaltisme.

Par sa duodénase augmente les sécrétions biliaires, pancréatique et intestinale.

Par ses sels biliaires désinfecte le tube digestif.

Indications. — Constipation habituelle de la femme, Entéro-colite chronique, Dermatoses, Acné, Furunculose, Auto-intoxication intestinale.

Doses. — 1 à 3 comprimés le soir en se couchant (action rapide), 1 comprimé par jour pendant 30 jours (cure de régularisation intestinale).

Prix au public : 13 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. M. N° 111-4.

Laboratoires du D^r LAURENT-GÉRARD

Docteur ès sciences,

Ancien Chef de Laboratoire, Faculté de Médecine de Paris.
40, rue de Bellechasse — PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

ÉVONYL

Composition. — Synergie OPOTHÉRAPIQUE (extraits biliaires et de glandes intestinales, ferments lactiques) et VÉGÉTALE (Evonymine, Fucus, Agar-Agar, Podophyllin, Belladone, etc.).

Propriétés. — Cholagogue de premier ordre. Laxatif doux absolument certain. Un seul produit pour toutes les affections du foie et de l'intestin.

Indications. — Affections hépato-biliaires, Constipation aiguë ou chronique, Insuffisance hépatique, Cholécystites, Lithiases biliaires, Hypertension, Laxatif des grands alités.

Forme. — Tablettes dragéifiées.

Posologie. — *Adultes* : 2 tablettes le soir avant ou après le repas, à avaler sans mâcher.

Enfants : 1 tablette après le repas.

Prix au public : 15 fr. 30 la boîte de 60 dragées pour le traitement d'un mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-1.

Laboratoires FLUXINE

Produits BONTHOUX

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie,
VILLEFRANCHE (Rhône).

EXENTÉROL

Composition. — Pansement-vaccin intestinal constitué par le mélange extemporané d'une ampoule de vaccin (contenant 65 milliards de bacilles coli, entérocoques, Gærtner, Proteus, Fæcalis, Lactis) et d'une mesure de granulés mucilagineux spéciaux.

Indications. — Entérites, Entérocolites, Infections intestinales, Syndromes entéro-rénaux, Colibacilloses, Auto-intoxication.

Propriétés. — L'*Exentérol* assure un contact prolongé du vaccin et de la muqueuse. Il favorise d'autre part l'acheminement des matières fécales, évitant ainsi les fermentations intestinales qui accroissent l'infection.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour.

Présentation :

Adultes : boîte de 8 ampoules de 10 cc. et 8 doses de granulés mucilagineux : 28 fr. 70.

Enfants : boîte de 8 ampoules de 5 cc., et 8 doses de granulés mucilagineux : 21 fr. 20.

Échantillons :

Laboratoires du Dr DEBAT,

60, rue de Monceau — PARIS.

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

EXHEPA

Extrait de foie en poudre.

Agrémenté de goût de bouillon.

Indications. — Anémie pernicieuse et autres genres d'anémie grave, Tuberculose, Convalescence.

Forme. — Tubes contenant l'équivalent de 100 grammes de foie frais.

Boîtes de 5, 10, 20 tubes.

Mode d'emploi. — Délayer la poudre dans un liquide froid ou mieux tiède, mais jamais bouillant.

Posologie. — De 1 à 4 tubes par jour suivant les cas.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

EXOBOL

Guérison de la constipation.

Deux formes : **Émulsion, Comprimés.**

1° **Forme émulsion.** — Emulsion d'huile de paraffine pure, de goût extrêmement agréable, d'action certaine.

Ne produit aucune action irritante, aucun suintement.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour à prendre au milieu des repas.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

2° **Forme comprimés.** — Mucilages, extrait spécial de foie, boldo et diacétyldioxyphénylisatine, action sûre, ne provoquant pas de coliques ni d'accoutumance.

Posologie. — 1 à 4 comprimés au milieu du repas du soir ou avant de se coucher.

Enfants : moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT
VILLENEUVE-LA-GARENNE (Seine).

EXOSEPTOPLIX

(Paraminophénylsulfamide)

EXOSEPTOPLIX POUDRE

(Usage externe.)

Poudre de 1162-F en flacon pulvérisateur de 7 gr., pour une durée de 2 à 3 jours au minimum.

Indications. — Chancres mou, ulcère phagédénique. Toutes ulcérations et brûlures infectées de la peau et des muqueuses. Rhinite, mastoïdite. Après avulsion dentaire, stomatite, pyorrhée alvéolo-dentaire.

EXOSEPTOPLIX SOLUTION

(Usage externe.)

1162-F à 5 p. 100 en milieu glyciné.

Indications. — Collutoire : Amygdalite, Stomatite, Gingivite.

Gargarismes (une cuillerée à dessert pour 150 gr. d'eau) : Angine, particulièrement à streptocoque.

En instillation dans les otites.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

EXSUGYL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Anhydricum titanicum, Zincum peroxydatum (titre 50), Amylon tritici, Pulvis diatomei, Talcum.

Propriétés. — Poudre éminemment absorbante, anti-prurigineuse, microbicide.

Indications. — Eczémas suintants rebelles, toutes dermatoses avec exosérose, Dermite par irritation.

Mode d'emploi. — Sous forme de compresses de gaze matelassées d'*Exsugyl* dans les affections suintantes.

Demander les brochures des docteurs

P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

EXTENSOPLAST

Albuplast élastique.

Bandes adhésives extensibles en *largeur* ou en *longueur*, recouvertes d'une masse adhésive identique à celle de l'Albuplast.

Se présentent en bandes de 1 mètre ou 2 m. 50 de long et de toutes largeurs de 2 à 30 centimètres de large.

Peuvent être livrées :

- | | |
|--|---|
| 1° Entièrement enduites | } extensibles en <i>lar-</i>
<i>geur</i> ou en <i>lon-</i>
<i>gueur</i> . |
| 2° Partiellement enduites (striées) .. | |
| 3° Perforées | |

Indications. — Pansement des ulcères variqueux. Pansements aux articulations. Prévention et traitement de luxations, entorses. Renforcement des articulations (sports d'hiver).

Le type extensible en largeur se prête particulièrement à l'utilisation dans les cas ci-dessus.

Dimensions les plus usuelles : 1 m. \times 3, 1 m. \times 5, 1 m. \times 7, 2^m,50 \times 5, 2^m,50 \times 7, 2^m,50 \times 10 cc.

**Anciens Établissements F. VIGIER et Cie,
Jean HUERRE et Cie**

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET
(Tél. : Péreire 57-41.)

EXTRAIT DE BILE LEFRANCO

Composition. — Extrait sec et soluble de bile de bœuf intégrale, concentrée dans le vide et à froid.

Action. — Les extraits biliaires possèdent une double action : *Hépatique* : « Les vrais cholagogues et les meilleurs sont la bile et les sels biliaries » (Professeur Loeper).

Intestinale : La bile agit sur la motilité de l'intestin et sur les sécrétions, elle favorise la formation du bol fécal et son évacuation.

Indications. — *Constipation* : Par sa double action, l'extrait de bile réalise le drainage hépato-intestinal idéal ; c'est le laxatif physiologique par excellence, le seul qui ne soit pas irritant pour la muqueuse. Constipation atonique avec hypocholie.

Insuffisance biliaire : Inappétence, nausées, pesanteur épigastrique et asthénie postprandiale.

Présentation. — Globules glutinisés dosés à 0 gr. 10 d'extrait sec de bile totale correspondant à plus de dix fois son poids de bile fraîche.

Posologie. — 6 à 12 globules par jour, de préférence 10 à 15 minutes avant les repas.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).
(Tél. : Nord 19-52.)

EXTRAIT DE MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.
Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15, verre compris.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 03-04.)

EXTRAIT HAMYD

Composition. — Mélange en proportions définies de Hamamelis Gmet, Hydrastis Gmet, Condurango Gmet.

Propriétés. — Vaso-constricteur. Puissant décongestif pelvien et vasculaire. Sédatif gastrique.

Indications. — Tous les troubles de la circulation veineuse. Tous les états congestifs du petit bassin (fibromes, métrites, prostatites, hémorroïdes, varicocèle, etc.). Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies réflexes. Constipation des femmes enceintes.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau 1 ou 2 fois par jour.

Le flacon 125 cc. : 23 fr. 45.

Le flacon géant 500 cc. : 68 francs.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

EXTRAIT HÉPATIQUE LEFRANÇO

Composition. — Extrait intégral de tissu hépatique desséché dans le vide et à froid, renfermant les principes antitoxiques du Foie.

Indications. — Toutes les insuffisances de la cellule hépatique :

- a. Troubles de la fonction biliaire : Ictères, Cholécystites, Cirrhose biliaire, Cholémie.
- b. Troubles de la fonction antitoxique : Dermatoses, migraines, arthritisme, intoxications alimentaires, psychoses autotoxiques ou hétérotoxiques, manifestations anaphylactiques...
- c. Troubles de la Crase sanguine : Hémorragies, hémogénie, hémophilie purpura...
- d. Cirrhoses d'origine toxique ou infectieuse.
- e. Intolérances médicamenteuses.

Présentation. — Globules glutinisés, dosés à 0 gr. 25 d'extrait correspondant à plus de dix fois son poids de tissu hépatique.

Posologie. — 4 à 8 globules par jour, au cours des repas de préférence.

Laboratoires LEFRANÇO

36 à 46, av. de Metz. — ROMAINVILLE (Seine). (Tél.: Nord 19-52.)

EXUBYLE

Agent de drainage des voies biliaires. Désensibilisant.

Forme. — Granulé fondant, soluble, aromatisé, de saveur agréable.

Composition. — Association de peptones (de viande, de poisson, de fibrine), de sulfate de magnésie, d'hyposulfite de soude et d'extrait d'artichaut et de boldo.

Indications. — a. Tous les états pathologiques du foie et des voies biliaires : Insuffisance hépatique et biliaire, cholécystite subaiguë, chronique avec ou sans calcul, ictères, congestion du foie, cirrhose.

b. Troubles digestifs d'origine hépatique : Dyspepsies, gonflement, vertiges, nausées, somnolence après les repas, constipation.

c. Etats anaphylactiques d'origine alimentaire : Eczéma, prurit, œdème de Quincke, migraine, asthme, certaines dermatoses, etc...

Particularités. — Cholagogue puissant sans action irritante sur l'intestin.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café le matin à jeun, 1/2 heure avant toute alimentation, dans un demi-verre d'eau tiède.

Prix : 18 francs.

Laboratoire PHYSIA

R. PAULY, Pharmacien,

9, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET.

FA-NER-VAL

Faolt-nervum-validum.

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Granulé.

Composition. — Ce granulé contient par cuillère à café : Arrhénal, 0,025 ; teinture de noix vomique, 0,10 ; glycérophosphate de soude, 0,333 ; extrait hyd. alcool. de quinquina jaune, 0,0666 ; extrait aq. de quinquina rouge, 0,0666.

Indications. — Toutes les dépressions du système nerveux et les troubles du grand sympathique.

Doses habituelles. — 1 cuillère à café, 2 fois par jour avant les repas. Cures de 4 semaines séparées par un intervalle de 8 jours.

Prix : 22 francs pour 10 jours.

Enregistré au L. C. M. sous le n° 563.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

FANGO - FISCH

Forme : présenté :

En poudre et ramené à l'état de boue par addition d'eau. Sous forme de Cataplasme prêt à l'emploi.

Mode d'emploi :

En application directe sur la peau à des températures variables. Par applications du cataplasme amené par immersion dans l'eau bouillante à la température appropriée.

Indications. — Affections chroniques douloureuses musculaires, tendineuses, nerveuses, articulaires, gynécologiques, uro-génitales et des organes internes.

Contre-Indications. — Fièvre et insuffisance fonctionnelle circulatoire.

Présentation et prix :

En paquet de : 1 kg. 500 : 17 fr. 40. 4 kg. 500 : 48 fr. 90.

Pour Clinique et Hôpitaux, prix spéciaux sur demande, par 100, 1.000 kilogs, etc.

En cataplasme :

A = 15 x 40 cm. (rectangulaire) 21 fr. 75.

B = 25 x 40 cm. (rectangulaire) 27 fr. 45.

C = 20 x 40 cm. (rectangulaire) 27 fr. 15.

Centre d'Applications à Paris.

« Au Centre Français de Médecine et de Chirurgie »

12, rue Boileau — PARIS (XVI^e). (Tél. : Auteuil 80-84.)

(Renseignements sur demande.)

Laboratoires FISCH et Cie, S. à r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.

(Tél. : Trudaine 92-52.)

FARINE MALTÉE VIAL

Autodigestive

Composition. — Aliment de premier ordre, riche en éléments azotés et en phosphates naturels assimilables.

Formule. — Composition centésimale en poids :

Farine de riz.....	49 gr. 5
Farine de malt.....	5 gr. 5
Farine de maïs.....	5 gr. 5
Poudre de cacao.....	3 gr. 9
Sucre de canne.....	35 gr. 6
Vaniline.....	0 gr. 35

Propriétés. — Les principes nutritifs des différentes farines entrant dans la composition de la Farine Maltée Vial ayant été rendus solubles pendant la préparation, cet aliment se digère de lui-même, sans fatigue pour l'estomac.

Indications. — Facilite le sevrage dès le plus jeune âge; recommandée pendant la dentition et la croissance; prescrite aux estomacs délicats et à toutes les personnes présentant des troubles de la digestion et de l'assimilation.

Dose. — Pour les enfants élevés au biberon, délayer une cuillerée à bouche de farine dans la quantité de liquide (eau ou lait) indiquée pour remplacer la tétée. Pour les enfants au-dessus de un an, la proportion pour une bouillie est de une cuillerée à bouche de farine pour cinq à six cuillerées de lait ou d'eau. Pour les adultes, délayer la quantité de farine suivant la consistance désirée pour le repas.

Prix : 13 fr. 05 la boîte de 500 gr. environ.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, Successeurs

8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

FARINE MONT BLANC

Caractéristiques et avantages. — Extraite des meilleurs blés dur de France, transformée en biscottes par une double cuisson au four électrique, la *Farine Mont Blanc* n'est pas lactée, mais grillée, diastasée et sucrée.

Sous l'influence de la chaleur humide et par l'addition d'extrait de malt au moment du pétrissage, les ferments transforment l'amidon en une pâte diastasée et dextrinée très digestible.

Composition moyenne :

Hydrates de carbone solubles.	32. » %	Matières grasses...	0. 50 %
Hydrates de carbone transformés.....	52. » %	Phosphates en P ² O ⁵	0. 80 %
Matières azotées.....	10. » %	Cendres totales.....	2. 20 %
		Humidité.....	2. 50 %

Principales indications. — Chez les *nourrissons normaux*, la *Farine Mont Blanc* constitue dans l'alimentation naturelle, mixte ou artificielle, le complément physiologique du lait dès le septième mois, et même plus tôt, à la condition d'être prescrite par le médecin.

Dans les cas *pathologiques, débilité congénitale, athrepsie, troubles gastro-intestinaux, intolérance lactée*, elle peut être conseillée dès les premiers mois comme aliment d'exception associée au lait écrémé, au babeurre, au bouillon de légumes ou même à l'eau.

Chez les *adultes dyspeptiques ou entériques*, elle rend de grands services comme aliment diététique.

Posologie et mode d'emploi. — La *Farine Mont Blanc* s'emploie aux mêmes doses et de la même façon que les autres farines utilisées à l'époque du sevrage.

Vente. — Pharmacies, herboristeries et maisons d'alimentation.
Echantillons, littérature et prix sur demande

Compagnie Générale du Lait, RUMILLY (Haute-Savoie)

FARINES HEUDEBERT

pour les enfants et le régime

Crèmes de Céréales :

Farines maltées (premières semaines du sevrage et périodes de troubles digestifs). Soupe d'Heudebert maltée, arrow-root maltée, crèmes d'orge, d'avoine, de blé vert, de riz, maltées.

Farines naturelles :

Normales : Crème de froment grillé, d'une digestibilité totale, Soupe d'Heudebert, Farine lactée, Crèmes de blé vert, de maïs.

Rafraîchissantes : Crèmes d'avoine, de seigle, de sarrasin, d'orge.

Antidiarrhéiques : Crème de riz, arrow-root.

Farines de légumineuses. — Farines de pois, haricots, lentilles, fèves, soja.

Farines de fruits. — Farines de banane, de châtaigne.

Flocons. — D'avoine, d'orge, de blé vert, de riz.

Ces différents produits, du fait de leur préparation spéciale, contiennent tous les éléments utiles de la graine et sont d'une très grande digestibilité.

Indications. — Sevrage, alimentation des enfants, des dyspeptiques, des entéritiques.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)

2 et 4, chemin Feuillat — LYON (Rhône).

FARINES DE RÉGIME BLOCH

Pures, Variées, Riches en Phosphates,
Blutées au minimum.

Farines de Céréales :

Crème de Riz, d'Orge, d'Avoine, de Blé vert.

Farines de Légumes :

Farine de Pois, de Lentilles, de Haricots.

Farines de Fruits :

Farine de Bananes.

Semoules : de Blé, de Riz, d'Avoine.

Flocons : d'Avoine, d'Orge.

Rapidoats : Petits flocons d'Avoine. Cuisson 5 minutes.

Blokao : Déjeuner de suralimentation à base de Farine de Bananes et Hydrates de Carbone aromatisés au cacao.

Riz — Tapiocas — Féoules — Arrow-Root

Indications thérapeutiques. — Alimentation des enfants, régime des Dyspeptiques et Entéritiques, Constipés, Nerveux, Anémiés et Surmenés.

Laboratoire des Établ. AUG. BLOCH et FILS

à TOMBLAINE, près NANCY (Meurthe-et-Moselle).
Fondés en 1811.

Médaille d'or : Paris 1867-1878-1892. — Bruxelles 1888.

FÉCULYSE

Composition. — Diastases de céréales associées à une protéine alimentaire neutralisant l'acidité stomacale en excès.

Principe. — 1^o Assurer la transformation des hydrates de carbone en suppléant, par l'action des diastases, à la déficience partielle ou totale du ferment salivaire.

2^o Permettre aux diastases d'agir dans les meilleures conditions en les protégeant contre l'acidité du milieu stomacal.

Indications. — La Féculyse donne une boisson digestive constituant la base du régime d'accompagnement dans les cas de dyspepsie des hydrates de carbone, hyperchlorhydrie, flatulence, fermentations. Utile à adjoindre également aux régimes riches en hydrates de carbone (albuminuriques, hépatiques, suralimentation), et à celui des personnes dont la dentition défectueuse ne permet pas une mastication suffisante.

Mode d'emploi. — Se prend dans un liquide froid ou chaud (50° environ) tel que café, lait, infusion, ou simplement eau.

Doses. — La Féculyse ne présentant aucune contre-indication, les doses indiquées constituent des moyennes pouvant être dépassées sans inconvénient.

Adultes : Au petit déjeuner et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à soupe.

Dans les cas d'hyperchlorhydrie : prendre une cuillerée à dessert avant et après chaque repas et au moment des crises.

Enfants : Le matin et après chacun des principaux repas, 1 à 2 cuillerées à café ou plus selon l'indication du médecin.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain, NANTERRE (Seine)

2 et 4, chemin Feuillat, LYON (Rhône).

FÉLAMINE

Association d'acide cholique cristallisé pur et d'hexaméthylène-tétramine.

Propriétés thérapeutiques. — Cholagogue, désinfectant des voies biliaires, dissolvant de la cholestérine.

Indications. — Cholélithiase et cholécystites ictères, constipation par hypochole, insuffisances hépatiques.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 0 gr. 30,

Posologie. — Après les repas, avaler les dragées sans les mâcher.

1^o Cas aigus et subaigus : 2 dragées, 3 fois par jour; 2^o Cas chroniques : 3 à 4 dragées par jour.

Traitement : 15 jours par mois et pendant plusieurs mois de suite (cholélithiase).

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

FÉLISÉDINE

Médication synergique complète, à la fois régulatrice et sédative, des Dystonies du Sympathique et des Insomnies.

Formule:

Extrait de Cratægus	0,05
Chlorhydrate de Papavérine	0,01
Phényléthylmalonylurée	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Extrait de Boldo	0,01
Extrait d'Anémone.....	0,03
Extrait de Valériane stabilisée	0,05
par comprimé.	

Indications. — *Nervosisme, Emotivité, Etats anxieux, Psychasthénie, Surmenage, Troubles cardiaques, Palpitations, Tachycardie, Troubles de la Ménopause, Insomnies.*

Posologie:

1° *Comme équilibrant du système nerveux*: 3 à 6 comprimés par jour.

2° *Contre l'insomnie*: 3 à 4 comprimés le soir.

L'étui de 30 comprimés: 18 francs.

L'étui de 140 comprimés: 60 francs.

Laboratoires du Docteur LAVOUÉ

RENNES

FÉMIDIOL

Phytothérapie gynécologique.

Deux formes. — Injections et ovules.

Avantages. — Antiseptique, décongestionnant non caustique, non toxique, ne tache pas.

Indications. — *Toutes affections gynécologiques* nécessitant un traitement local antiseptique, décongestionnant et sédatif.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher et une injection le lendemain (LX gouttes dans 2 litres d'eau bouillie).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-2.

Laboratoires ROBIA

LILLE.

FÉMINADÈNE

Deux formes :

1° Féminadène (dragées).

Synergie d'extraits des glandes génitales, magnésium (oxyde de), phényléthylmalonylurée.

Indications. — Nervosité féminine dans toutes ses manifestations, à toutes les périodes de la vie génitale. Anxiété, Émotivité, Dépression, Subagitation, Insomnies, etc... Troubles à la puberté, à la ménopause, après castration, après couches. Malaises des femmes célibataires, veuves, stériles.

Doses. — 4 dragées par jour en moyenne. La boîte de vente contient un traitement de 3 semaines environ.

Prix de la boîte : 23 fr. 85.

2° Féminadène (gouttes).

Extrait ovarien total, activité maxima *par voie buccale*.

Indications. — Toutes celles de la déficience partielle ou totale de la sécrétion ovarienne.

Doses. — Dose moyenne de début : VI gouttes trois fois par jour, *loin* des repas ; augmenter ou diminuer suivant les effets.

La boîte de vente contient un traitement de 25 jours environ.

Prix de la boîte : 32 fr. 65.

Laboratoires du FÉMINADÈNE

120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

FENUCALCIUM

Forme. — Cachets.

Formule. — Hémoglobine, Phytosphosphine, Protoxalate de fer, Carbonate de Manganèse, Poudre de Colombo, Poudre de Quassia, Poudre de Prêle, Lactate de chaux, Poudre de Rhubarbe, Magnésie hydratée, Fluorure de calcium, Poudre de noix vomique, Poudre de gentiane, Phosphate tricalcique, Arrhéнал, 0,015, Poudre de Fenugrec.

Indications. — Anémie, Amaigrissement, Phosphaturie, Grossesse, Allaitement, Convalescences, Manque d'appétit, Tuberculose, Etats pré-tuberculeux.

Posologie. — Un cachet au début des trois repas. Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 884-4.

Laboratoire HOOQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI°).

(Tél. : Diderot 04-71.)

FENUGRÈNE

Poudre de Fenugrec déshuillée et désodorisée. Contenant tous ses principes actifs : phosphates organiques, lécithine, calcium, fer et manganèse organiques.

Propriétés. — Stimulant puissant de l'appétit. Agent d'augmentation de poids. Producteur d'énergie et de forces.

Indications. — Tous les cas d'amaigrissement ; maigreur habituelle, amaigrissement au cours ou à la suite de maladies aiguës ou chroniques, amaigrissement chez les nerveux, stimulant de la nutrition et de la lactation chez les femmes enceintes et les nourrices. Donne des couleurs, de l'embonpoint et des forces aux enfants débiles.

Mode d'emploi. — Le Fenugrène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulé et d'élixir.

Dose journalière moyenne : 4 *cachets* ou *dragées* pour les adultes. : *Elixir* : 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants, 2 cuillerées à soupe pour adultes. *Granulé* : 2 à 4 cuillerées à café pour les enfants.

Boîte de 100 cachets. Boîte de 36 cachets.

Tube de 50 dragées. — *Elixir*. — *Granulés*.

Enreg. au L. N. C. M. sous les numéros : Cachets, 590-6.

Dragées, 590-5. Granulés, 590-4. *Elixir*, 590-17.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

FENUROBUR

Cachets et granulé.

Puissant agent de l'augmentation du poids, excitomoteur et reconstituant.

Formule :

Fénugrec désodorisé.....	0,90
Poudre de rate	0,014
Poudre de surrénale	0,002
Oxyde de magnésium.....	0,083
Pour 1 cachet n° 50 ou 10 gr. de granulé.	

Mode d'emploi. — 3 à 6 cachets par jour au milieu des repas.

Granulé : 3 cuillerées à café par 24 heures pour les enfants, 3 cuillerées à soupe par 24 heures pour les adultes.

Amaigrissement, Convalescences, Asthénies, Croissance.

Prix : 19 fr. 75 la boîte de 50 cachets.

19 francs le flacon de granulé.

Durée moyenne de la boîte vente : 15 jours.

Échantillons et littératures :

Laboratoire ABARNOU

72, avenue Thiers — LE MANS.

(Tél. : 15-56.)

FER BRAVAIS

Formule. — Ions de Fer catalysé actifs.

Composition. — Solution colloïdale de Fer à 30 p. 1 000 et de Manganèse catalyseur à 0,50 p. 1 000.

Propriétés thérapeutiques. — Fer pur (infiniment divisé, puisque colloïdal), accompagné de son catalyseur naturel, le Manganèse (mêmes proportions que dans le sang) ; donc Fer assimilable sans nécessiter de réactions internes.

Indications. — Appauvrissement du Sang et toutes ses conséquences : Anémie, Chlorose, Débilité, Dysménorrhée, Fièvre des pays chauds. Formation de la jeune fille, Incontinence d'urine, Leucorrhée, Neurasthénie, etc.

Dose. — X à XX gouttes (I goutte par année d'âge) à chaque repas dans de l'eau sucrée. Vingt gouttes de Fer Bravais contiennent 3 centigr. de Fer et $\frac{1}{2}$ milligr. de Manganèse.

Examen du sang avant et après le traitement par le Fer Bravais.

(Moyenne de très nombreux cas.)

	Avant.	Après.	Augmen- tation.	Diminu- tion.
Globules roug.	3.500.000	4.500.000	30 %	10 %
Globules bl ...	7.150	6.500		
Hémoglobine.	60 %	85 %	40 %	

Prix : 24 fr. 50 le flacon pour un mois.
17 francs le $\frac{1}{2}$ flacon pour 15 jours.

Lab^{res} René de GRAUWE, , , .

**Pharmacien de 1^{re} classe,
La Plaine-Saint-Denis — Près PARIS,**

FER INTRAVEINEUX FRAISSE

Composition :

Cacodylate de fer.....	0 gr. 01
Lactate de Cuivre.....	0 gr. 001
Cacodylate de Soude.....	0 gr. 02
Solution Isotonique	5 cc.

Indications. — Anémies graves, symptomatiques ou post-opératoires.

Forme. — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

Injecter dans la veine le contenu d'une ampoule tous les 2 jours.

Prix : boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 19 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-13.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

FERMENT DEP

Composition et propriétés. — Ferments lactiques sélectionnés, acquérant à un très haut degré les propriétés antagonistes des ferments lactiques, vis-à-vis d'autres espèces bactériennes pathogènes. — De plus, la régénération cellulaire se fait d'une façon remarquable. Sont mis à l'état de vie latente et se conservent indéfiniment sans s'altérer. Reviennent à la vie avec toutes leurs facultés dès que sont réunies les conditions propres à leur reviviscence — chaleur et humidité — réalisées parfaitement par le milieu intestinal, le contact des plaies, muqueuses, etc.

Formes et Indications. — *Comprimés* : Infections gastro-intestinales.

Poudre insoluble : Plaies de toute nature.

Poudre soluble : Plaies très profondes, plaies variqueuses, cystites gastro-entérostomies et tous endroits inaccessibles à la poudre insoluble.

Ampoules : buvables et injectables — forme la plus active : infections profondes (otites, sinusites, etc.) difficiles à atteindre.

Ovules : pour soins gynécologiques

Le Ferment Dep est toujours vivant au moment de son emploi.

Grâce à ses cinq formes, le Ferment Dep atteint le microbe pathogène partout où il se trouve.

Prix :

Boîte de 60 comprimés 1/2 gr.....	18 fr. 75
— Poudre soluble en flacon.....	22 fr. 90
— Poudre insoluble en flacon.....	18 fr. 75
— 10 ampoules de 5 cc.....	29 fr. 15
— 6 ampoules de 2 cc. 5.....	20 fr. »
— 6 Ovules.....	18 fr. 75

Numéro d'enregistrement au L. N. C. : 1609-1 à 5.

Durée de la cure : 21 jours.

P. FALIU, 44, rue Taitbout, PARIS (IX^e) — (Tél. ; Trinité 40-46.)

FERMENTÉRYL

(Boîte de 50 comprimés.)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base de :

- 1° Ferments (ferments lactiques, entérokinase, levure de bière) ;
- 2° Extrait végétal (bardane stabilisée) ;
- 3° Médicaments chimiques antiseptiques et anti-infectieux (bi-oxyde d'étain, orthoxyquinoléine, paraminophényl sulfamide).

Propriétés. — Dépuratif, régulateur de la leucocytose, antiseptique bactéricide et antitoxique à titre préventif et curatif.

Indications. — Intoxications intestinales. Troubles généraux d'origine digestive ou infectieuse, asthénie, colibacillose. Maladies cutanées (furunculose, urticaire, érysipèle, etc.). Maladies d'origine microbienne (pneumonie, fièvre puerpérale, grippe infectieuse, cachexie, etc.). Maladies des voies urinaires. Plaies infectées.

Mode d'emploi. — 6 à 9 comprimés par jour (2 à 3 au début de chacun des repas. Pour les enfants 2 à 5 comprimés par jour.

Prescription. — 1 boîte de comprimés *Fermentéryl*.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Pharmacien licencié ès sciences ex-interne lauréat des hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 18-26.)

FERMENT PUR DE RAISIN

du Professeur Jacquemin.

(*Exposition Pasteur, Strasbourg 1923,*
Hors concours, Membre du Jury.)

Immunisation et Désintoxication générale de l'Organisme.

Source de Diastases et de Vitamines.

Indications physiologiques. — Dépuratif et anti-staphylococcique. Affections gastro-intestinales. Stimulant de la Nutrition et de la Croissance. Régénérateur dermique et épidermique.

Thérapeutique. — Furunculose, Maladies de la Peau, Dyspepsie, Entérite, Diabète, Grippe, Rhumatismes, Insuffisances endocriniennes et Nutrition.

Posologie. — 1 flacon pour une cure de 3 semaines à prendre 1/2 heure avant les repas.

Prix : 37 fr. 50

Littérature et échantillons à :

INSTITUT JACQUEMIN

à MALZEVILLE-NANCY (Meurthe-et-Moselle).

FER-OVARINE VITALIS

(Pilules)

Contre anémie et insuffisance ovarienne.

Composition. — Pilules composées, à base d'extrait d'ovaire, de fer et de manganèse.

Indications. — Anémie, Puberté, Ménopause, Asthénie nerveuse, Obésité, Dysménorrhée, Anorexie.

Deux pilules avant les 2 principaux repas, 20 jours par mois.

Prix : 17 francs.

FERANDRINE VITALIS

(Dragées) 2 à 5 par jour.

Composition. — P. de glandes interstitielles, fer, manganèse, hypophyse.

Indications. — Infantilisme, troubles de la puberté, Fatigue de l'adolescence, Paresse intellectuelle, Impuissance en général, Énurésie, etc...

Chez la femme : Carence sexuelle, Troubles complexes des femmes privées de maternité, ménopause. La Férandrine chez la femme est une médication de remplacement.

Prix : 17 francs.

Échantillons et notices documentaires.

Laboratoires **BEAULIEU**

40, bd de Charonne — PARIS. — (Tél. : Diderot 34-55.)

FEROXAL (1)

Composition :

Protoxalate de fer	2 gr. 739
Phosphate de soude	0 gr. 216
Phosphate de magnésie	1 gr.
Phosphate mono-calciq.	0 gr. 600

pour 100 grammes.

La présence de phosphates alcalins prévient les troubles digestifs et la constipation : le phosphate de soude, en particulier, stimule la sécrétion gastrique et augmente les oxydations provoquées par les sels ferreux.

Présentation : Flacon de 85 gr. de granulés.

Indications. — Anémies hypochromes, toutes les anémies symptomatiques (associé au traitement étiologique), anémies post-hémorragiques, anémies des jeunes enfants, anémies pernicieuses, convalescences, carences en fer de la grossesse, chlorose.

Posologie. — Une cuillerée à café correspond à 0 gr. 10 de protoxalate de fer.

Nourrissons et jeunes enfants : 1 cuillerée à café par année d'âge et par jour : 10 à 20 jours.

Adolescents et adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour pendant un mois au besoin.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

(1) Sous le nom de *Néo-Feroxal*, Theraplix a spécialisé une préparation plus riche en fer et contenant en plus du cuivre.

FERROPHYTINE

CIBA

MÉDICATION PHOSPHO-MARTIALE.

Sel ferrique neutre colloïdal de l'acide inosito-hexaphosphorique, contenant 7,50 p. 100 de fer et 6 p. 100 de phosphore, ces deux éléments associés en une combinaison très assimilable.

Stimulant de l'hématopoïèse et de la nutrition.

Médicament type des états anémiques et chloroanémiques accompagnés de dénutrition.

Parfaite tolérance.

Indications. — Toutes affections déglobulisantes.

Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Scrofulose, Croissance défectueuse.

Doses. — *Adultes* : 1 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé. — *Enfants* : 1/2 à 2 cuillerées à café de granulé.

Formuler. — Boîte de 30 cachets.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26)

FERYDAL

Composition. — Fer Colloïdal assimilable.

Trois formes. — Enfants, Adultes, Gouttes concentrées suractivées.

Indications.

Enfants : Anémie du Nourrisson et de la seconde enfance, Anorexie, Nervosisme, Insomnie, Convalescence des maladies aiguës, Anémie Paludéenne.

Adultes : Anémies, Paludisme, Hémorragies, Grossesse, Traitement ferrique pré-natal, Convalescences, Dépressions nerveuses, Prurit.

Doses.

Forme « Enfants ». A donner aux tétées ou aux repas :

De 6 mois à 18 mois : 2 ou 3 cuillerées à café.

De 18 mois à 3 ans : 3 ou 4 cuillerées à café.

A partir de 3 ans : 2 cuillerées à dessert.

Forme « Adultes » :

Adolescents : 2 cuillerées à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à soupe.

Le *Ferydal* se prend pur ou dans un peu d'eau gazeuse (eau de Seltz, limonade), au début des repas.

Forme « Gouttes » (permettant un traitement prolongé plus actif et plus avantageux).

Enfants : A donner aux tétées ou aux repas, dans le biberon ou un peu d'eau sucrée.

De 6 mois à 18 mois : XV gouttes 2 ou 3 fois par jour.

De 18 mois à 3 ans : XV gouttes 3 ou 4 fois par jour.

De 3 ans à 10 ans : XXX à XXXV gouttes 2 fois par jour.

Adolescents : XL gouttes 2 fois par jour.

Adultes : LX gouttes 2 fois par jour.

(A prendre dans la boisson : eau, vin, bière.)

Durée moyenne du traitement de l'unité de vente (gouttes) :

Enfants : 15 à 25 jours. — *Adultes* : 10 à 12 jours.

Prix :

Forme *Enfants*..... 18 fr.

— *Adultes*..... 20 fr.

— *Gouttes* 18 fr.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 681-4.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND.

FIBRIGELASE

Hémostatique Intégral. Cicatrisant.

Composition

Solution stérile, stabilisée, concentrée, étalonnée de THROMBASE de sang de mammifères domestiques.

Base scientifique

Réalise l'introduction, en thérapeutique antihémorragique, de la Thrombase, *seule substance capable de transformer le fibrinogène en fibrine, trame du caillot sanguin.*

Doublement actif : *per os*, par diffusion rapide dans l'organisme et, *in situ*, par action directe et immédiate (C. R. Ac. Méd., 24 mars 1936, G. Crut).

Indications

Médication spécifique, préventive et curative, de *toutes les hémorragies*, externes ou internes, pathologiques ou traumatiques et de tous états hémorragipares.

Sans aucune contre-indication.

Présentation

Boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 48 francs.

grosses hémorragies - *per os* : *adultes*.

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 28 francs.

petites hémorragies - *per os* : *enfants*.

Mode d'emploi

PER OS :

Prévention opératoire ou traitement d'attaque :

2 à 3 ampoules dans les 2 heures précédant l'opération ou suivant l'hémorragie, dans 1/2 verre d'eau froide.

Traitement curatif ou post-opératoire :

1 à 3 ampoules par jour, dans 1/2 verre d'eau froide, à jeun ou 1/2 heure avant les repas.

IN SITU :

Pulvérisation, tamponnement ou pansement imbibés. Instillation : 1 à 3 ampoules dans Q. S. d'eau ou de sérum physiologique à 37°.

Octave BAILLY

Docteur ès-sciences physiques, Pharmacien

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

Lauréat de la Faculté de Pharmacie de Paris

44, rue A.-Carrel, Montreuil-s/-Bois — AVR. 30-03.

FILHOSA

Pâte escharotique de FILHOS

Traitement de la métrite endocervicale.

Pâte homogène non grasse ayant toutes les propriétés déshydratantes du caustique de Filhos (chaux vive : 1 ; potasse caustique : 5).

Facile à manier et de conservation indéfinie.

Guérit les endocervicites chroniques les plus rebelles.

Evite la sténose consécutive à la cautérisation au crayon comme celle produite par un fragment détaché et abandonné dans la cavité cervicale.

Permet au malade de continuer ses occupations.

Seul traitement local indiqué après les applications
injections vaginales avec les comprimés :

GYNOSTER

et application quotidienne d'un
FILHOSOVULE

Laboratoires Robert COLAS, Doct^r en Ph^{ie}.

133, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 48-10.)

FIXASE

Reminéralisateur effectif.

Présentation. — Poudre insoluble agréable à boire dans l'eau.

Composition. — Chaux, Magnésie, Phosphate, Fluor, Silice *sous forme utilisable.*

Posologie. — *Adultes et enfants* : 1 cuillerée à café après les 2 repas. *Très jeunes enfants et bébés* : 1/2 ou 1/4 de cuillerée à café. *Avant le sevrage* : 1/4 de cuillerée à café dans un peu d'eau bouillie tiède.

Indications. — **Enfants, Adolescents, Bacillaires, Prédisposés, Syphilitiques, Surmenés, Phosphaturiques, Affaiblis, Femmes enceintes, Nourrices.**

Prix : 14 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 342-1.

FIXASE IRRADIÉE

(Fixase + Vitamine D cristallisée.)

Titrée à 1000 unités internationales par  *Cachet* ou cuillerée à café de *Poudre*.

Poudre : Même posologie que la FIXASE.

Cachets : *Adultes et Adolescents* : 3 par jour

Enfants : 1 à 2 par jour.

Prix :

Poudre : 20 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 15 jours.)

Cachets : 20 francs. (Durée du traitement pour les adultes : 10 jours.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n°s 342-3 et 4.

Laboratoire PARET

28, rue Guibal — MARSEILLE.

FIXOCALCION

Opo-calcithérapie sans barbituriques.

Forme. — Gouttes 60 cc. Traitement de 15 à 20 jours suivant l'âge.

Propriétés thérapeutiques et indications. — Modification du système nerveux central par Calcium à fortes doses et Parathyroïde opothérapie fixatrice. Toutes les manifestations de la spasmophilie latente ou manifeste. Irritabilité, Agitation, Tics, Emotivité, Terreurs nocturnes.

Formule. — Parathyroïde (correspondant en glandes fraîches)..... 0,20
 CaCl² chimiquement pur 80
 CaBr² chimiquement pur..... 8
 Excipient solvant Q. S. 100 cc.

Posologie. — Gouttes à prendre dans un peu d'eau très sucrée.

6 mois : XXX à LX gouttes par jour.

6 mois à 1 an : L à LXXX gouttes par jour.

1 an à 3 ans : LXXX à CXX gouttes par jour.

3 ans à 5 ans : CXX à CLXXX gouttes par jour.

Le FIXOCALCION rend l'équilibre aux enfants.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1994-2.

Prix : 22 fr. 50.

H. BENOIT

Docteur de la Faculté de pharmacie de Paris
POLIGNY (Jura). — Tél. 84.

FLAVEX

Biosymplex lutéinique total.

Actif par voie buccale.

Composition. — Extrait total de corps jaune frais (procédé Biosymplex). 1 cc. de solution hydro-alcoolique (45 gouttes) correspond à 0 gr. 30 de glande fraîche.

Mode d'action. — En apportant les hormones lutéiniques déficientes, en stimulant la fonction lutéogène, *Flavex* rétablit l'équilibre lutéo-folliculinique. C'est la médication par excellence de l'hyperfolliculinie et des troubles de la gestation d'origine hormonale.

Avantages. — A l'encontre de la progestérone, médication purement substitutive, coûteuse et inactive *per os*, *Flavex* est une *médication curative*, rééducatrice de l'ovaire, active par *voie buccale*, à faibles doses, donc économique et de prescription facile.

Indications. — Syndrome hyperfolliculinique et ses conséquences : règles de quinzaine ; règles surabondantes, insuffisantes ou absentes ; congestion mammaire, mastodynie ; nervosisme, etc. Fibromatose utérine. Stérilité et avortements à répétition d'origine hormonale (Devraigne, Seguy). Méno-métrorragies de la puberté et de la ménopause. Ovarite scléro-kystique. Troubles généraux de la ménopause et de la castration.

Posologie. — 15 à 50 gouttes par jour, en 2 prises pendant la seconde moitié du cycle. *Absorber les gouttes 1/2 heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre que les malades laisseront fondre lentement dans la bouche.*

Recourir aux **doses faibles** (15 à 30 gouttes) comme **médication stimulante**, aux **doses fortes** dans les manifestations hyperfolliculiniques ou ménopausiques marquées, les mastodynies.

En cas d'hémorragie utérine, associer *Flavex* (50 gouttes par jour) et *Frénovex* (1 à 6 cuillerées à café par jour) suivant l'intensité des pertes. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-13.

Prix : Le flacon : 25 fr. 50.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Alésia 28-51.)

FLAVUROL

Dibromoxymercurifluorescéine.

Antiseptique puissant.

Pommade à 1 p. 100. — Intertrigo, Impétigo, Ecthyma
Eczémas infectés, Staphylococcies cutanées, Sycosis-
Balanites, Ulcérations de toute nature.

Solution à 2 p. 100. — Désinfection pré-opératoire,
abcès, furoncle, anthrax, ulcérations de toute nature,
plaies opératoires suppurantes, phlegmons, fistules,
otorrhées aiguës et chroniques, suppurations auricu-
laires, etc...

Solution à 1 p. 100. — Traitement des urétrites, cys-
tites, pyélonéphrites, vaginites, métrites, antiseptie
obstétricale, ophtalmologie.

Crayons, bougies et ovules à 1 p. 100. — Traitement
des métrites et des vaginites.

Bougies à 1 p. 100. — Traitements des urétrites aiguës
et chroniques, des rétrécissements de l'urètre, des
prostatites.

Pilules. — Traitement des colibacilloses, diarrhées et
toutes infections intestinales.

Produits STÉNÉ

2bis, place des Vosges — PARIS (IV°).

FLÉTAGÈNE

Huile de foie de Flétan.

Composition. — Huile de foie de Flétan, concentrée, raffinée, d'une
pureté absolue, renfermant 22.500 u. i. de vitamine A et 1.300 u. i.
de vitamine D par gramme.

Avantages. — Activité supérieure, sous un faible volume, à celle de
l'huile de foie de morue. Concentration en vitamines A et D. Tolé-
rance parfaite du tube digestif. Aucune saveur désagréable. Bien
acceptée par les enfants en toute saison.

Indications. — Etats de carence vitaminique, Troubles de l'ossification,
Rachitisme, Caries dentaires, Troubles de la croissance, Décalci-
fication de la grossesse et de l'allaitement, Lymphatisme, Scrofule,
Adénopathies, Chloro-anémie, Convalescences, Pneumonie, Pré-
tuberculose, Tuberculose pulmonaire, Bronchites, Surmenage,
Amaigrissement, Otites, Infections puerpérales, Lithiase rénale
et vésicale.

Présentation. — Gouttes.

Posologie :

Enfants au-dessous de 5 ans II à V gouttes par jour.

— de 5 à 15 ans VI à X —

Adultes XV à XX —

en 2 ou 3 fois, aux repas, dans du lait, du jus de fruit ou du potage.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Dr en pharmacie

rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

FLÉTAGEX

(Pommade aux Vitamines A et D naturelles.
(Odeur agréable.)

Composition. — Huiles de foie de Flétan et de Morue incorporées à la lanoline, graisse animale assurant la conservation parfaite des vitamines.

Propriétés thérapeutiques. — Cicatrisante, Anti-algique, Antiprurigineuse, Anti-infectieuse.

Indications. — *Dermatoses de l'enfant et de l'adulte.*

Plaies et lésions cutané-muqueuses infectées ou non : Ulcères variqueux. Plaies atones. Ulcères post-phlébitiques. Escarres de décubitus. Moignons d'amputation. Coupures. Blessures. Ecorchures. Abcès. Anthrax. Panaris.

Brûlures. Engelures. Crevasses. Radiodermite.

Rhinites. Ozène. Cavités de Mastoïdectomie.

Mérite. Vaginite. Ulcération du col. Fissure et Fistules anales. Anorectite hémorroïdaire. Ostéomyélites chroniques. Stomatite. Pyorrhée alvéolaire.

Emploi. — Etendre en couche épaisse. Recouvrir d'un pansement stérile.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires SUJAL

J. LAFARGE, Docteur en Pharmacie

62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

FLÉTASE

Succédané de l'Huile de Foie de Morue particulièrement riche en Vitamine A. Huile de Foie de poisson raffinée, présentée sous forme de solution huileuse (25.000 unités intern. de Vit. A par cm³).

Indications :

Enfants : Croissance retardée ou insuffisante. Troubles digestifs, anorexie, états ganglionnaires, infections chroniques du rhino-pharynx et des bronches.

Adultes : Convalescences, Grossesse, Anémie.

Présentation et Posologie. — Flacons de 10 cm³.

Enfants au-dessous de 5 ans : I à V gouttes par jour.

Enfants à partir de 5 ans : V à X gouttes par jour.

Adultes : X à XX gouttes par jour.

Prix de vente ;

Le flacon ; 14 fr. 35.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FLÉTOBIOL

Composition :

Complexe : d'huile de foie de Flétan (vitamines A et D), biologiquement activée par un apport de vitamine D naturelle ; d'extrait de malt (vitamine B) ; de jus d'orange et de citron concentrés (vitamine C).

Vitamine A, minimum 500 U. I. par CC.

Vitamine D, minimum 100 U. I. par CC.

RECONSTITUANT COMPLET

(Vitamines A, D, B, C.)

« Flétobiol » remplace l'huile de foie de morue et ses succédanés. Goût délicieux.

Indications :

Enfants : Croissance difficile, troubles de la dentition, rachitisme, convalescence.

Adultes : Anémie, prétuberculose, grossesse.

Posologie :

Enfants : De 1 à 3 ans : une cuillerée à café par jour
de 3 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; ensuite :
1 ou 2 cuillerées à dessert par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à dessert ou à soupe par jour.

Enregistré au L. N. C. M., n° 442-7.

Prix : le flacon 20 fr. 40.

Le flacon grand modèle spécial (4 flacons ordinaires)
63 fr. 75.

FLÉTODERM

(Pommade aux vitamines A et D.)

Spécifique de la prolifération cellulaire et de la régénération épithéliale.

Vitamine A, 3.000 U. I. par gr.

Vitamine D, 300 U. I. par gr.

Rougeurs des nouveau-nés, Dermatoses, Brûlures,
Ulcères variqueux, Toutes plaies.

Prix : le tube, 18 fr. 35.

FLÉTOLINE

Ampoules, Pansement pour usage chirurgical,
Pansements post-opératoires, Plaies sulfurées, Plaies
atonies, Escarres, Trajets fistuleux.

Prix : la boîte de 5 ampoules : 30 fr.

Laboratoire du FLÉTOBIOL

DARRASSE, Pharmacien

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 84-40.)

FLETONIC

Tonique. Reconstituant.

Spécialement préparé pour les enfants.

D'un goût agréable, accessible aux estomacs les plus délicats.

A base d'huile de Flétan (vitamines A et D), Extrait de Malt, Vitamines B et sels minéraux en combinaison organique; Ph, Ca, Mg et lécithines végétales.

Indications. — Rachitisme. Troubles de la Croissance. Décalcification (caries dentaires). Surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — 2 à 5 ans : 1/2 cuillerée à 1 cuillerée à café; 5 à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café; au-dessus de 10 ans : 1 à 3 cuillerées à dessert par jour à prendre avant les repas.

Prix : 17 fr. 50.

Le triple flacon : 36 francs.

Laboratoires UNIS-SPES

14, rue Demarquay — PARIS.

(Tél. : Nord 71-64.)

FLETYOL

POMMADE

Calmante. Cicatrisante.

A base de Carotène, Ergostérol irradié, Huile de Chaulmoogra, Oxyde de titane, Oxyde de zinc, Oxyde jaune de mercure, Amidon, Bol blanc, Sulfoïchtyolate d'ammon.

Très active (Vitamines A et D et huile de Chaulmoogra). Régénère rapidement les tissus, active la cicatrisation, n'adhère pas au pansement, calme le prurit, inodore.

Indications. — Plaies de toutes sortes, Ulcères, Brûlures, Acné, Eczéma, Psoriasis, Hémorroïdes.

Prix : 15 francs le tube d'environ 45 gr.

SUPPOSITOIRES

Mêmes constituants principaux. — Contient, en outre, Antipyrine et Belladone.

Action. — Calmants, décongestionnants, hémostatiques

Prix : 18 francs la boîte de 10 suppositoires.

Laboratoires NOVITA

REICHSHOFFEN (Bas-Rhin).

Robert HOH, Pharmacien.

FLOCULYSINE VALTRY SIMPLE

Biophylaxie des états allergiques.

La *Floculysine Valtry* est un traitement biophylactique de toutes les manifestations allergiques utilisant une synergie micro-pluriglandulaire associée à la sérothérapie totale de jeunes taureaux.

Forme. — Dragées.

Action. — Action catalysante de la synergie micro-pluriglandulaire sur les protéines du sérum de jeune taureau « choqué » par transfusion sanguine d'animaux plus âgés.

Composition. — La *Floculysine Valtry* comprend d'une part le sérum total de jeune taureau « choqué » par transfusion sanguine d'animaux plus âgés, et d'autre part une synergie micro-pluriglandulaire.

Indications. — La *Floculysine* a son emploi dans tous les cas où l'**ANAPHYLAXIE** s'accompagne d'intoxication, d'hyperuricémie, de vagotonie ou de déséquilibre endocrinien et humoral, et dans les principales manifestations suivantes :

Phénomènes allergiques d'ordre intestinal: Gastropathies allergiques. Entérite muco-membraneuse, colique vésiculaire ; Constipation. Diarrhée, intolérances digestives. Colite muqueuse.

Phénomènes allergiques d'ordre nerveux: Migraine. Déséquilibre vago-sympathique. Certain mal comitial.

Phénomènes allergiques d'ordre cutané: Eczéma, Prurits, Urticaire, Eruptions médicamenteuses et toxi-alimentaires, Eruptions observées au cours de traitements spécifiques, Ictères anaphylactiques.

Phénomènes allergiques d'ordre circulatoire: Troubles cardio-vasculaires, Troubles veineux, Certaines hypertensions. Douleurs angineuses. Bradycardies et tachycardies liées au déséquilibre sympathique.

Phénomènes allergiques d'ordre respiratoire: Syndrome asthmatique. Emphysème post-asthmatique.

Phénomènes allergiques d'ordre endocrinien: Troubles endocriniens, et, en particulier, puberté retardée, troubles menstruels et de la ménopause. Obésité.

Symptômes généraux diathésiques: Arthritisme, HEPATISME, Goutte.

Travaux scientifiques :

Essai dans le traitement des états dits arthritiques d'une association sérothérapique et opothérapique, par le D^r J. Saillant. (Thèse Paris).

Essai d'une association sérothérapique et opothérapique dans les manifestations anaphylactiques du chien et du chat, D^r Lebreton. (Thèse Alfort).

Réflexions sur l'eczéma et son traitement oposérothérapique per os, D^r Marceron.

Allergie cutanée et uricémie, D^r Marceron.

Biophylaxie et instabilité humorale, par le D^r Marceron.

Posologie :

8 dragées par jour à prendre au moins une heure avant les repas.

Prix du traitement :

le grand tube : 25 francs ;

le petit tube, 19 francs.

Laboratoire Biologique VALTRY

122, avenue des Champs-Élysées — PARIS.

FLOCULYSINE INFANTILE VALTRY

Traitement biophylactique de tous les états anaphylactoïdes et des crises anaphylactiques du nourrisson et de l'enfant en bas âge.

Forme. — Granulés.

Composition :

1^o Sérothérapie totale de jeune taureau « choqué » par transfusions sanguines d'animaux plus âgés.

2^o Opothérapie hépato-spléno-rénale.

3^o Synergie micro-endocrinienne.

Indications :

Troubles respiratoires : Asthme infantile, rhume des foins.

Troubles cutanés : Eczéma des nourrissons, prurits, dermites médicamenteuses.

Troubles digestifs : Éruptions toxi-alimentaires, Intolérance lactée, Diarrhée, Gastropathies allergiques.

Symptômes généraux : Arthritisme, Hépatisme.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, à prendre au moins une heure avant les repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoire Biologique VALTRY

122, avenue des Champs-Élysées. — PARIS.

FLORHÉPATINE

Cal nant et antispasmodique, puissant diurétique, sans toxique, à base d'extraits végétaux.

Composition. — Ether amyvalérianique, Boldo, Artichaut, Arénaria, Uva-Ursi Buchu, Corydalis, Fabiana, Genièvre, Menthe dans solution alcalinée glycinée.

Indications. — Etats d'anxiété (fausse angine de poitrine, tachycardie), Règles douloureuses, Gastralgies, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections du foie en général (Insuffisance hépatique, ictères du foie, paludisme, etc.).

Deux formes.

Solution. — 1 à 4 verres à madère par jour: Crises aiguës; 1 verre à madère tous les quarts d'heure jusqu'à la cessation de la douleur.

Enfants : 1/2 dose.

Prix : 17 fr. 45 le flacon de 500 cc.

Gouttes. — *Adultes* : XXX gouttes 2 à 3 fois par jour dans un demi-verre d'eau pure ou minérale.

Enfants jusqu'à 5 ans : III gouttes 2 fois par jour et par année d'âge.

Prix : 18 francs.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS
(Tél. : Provence 34-87.)

FLORIX

Comprimés effervescents.

Présentation. — En boîte métal de 20 comprimés (11 fr. 95).

Principes actifs. — Soluté officinal de formaldéhyde, Peroxyde de magnésium, Sulfate de zinc, Amidon, Sulfate d'alumine et de potasse.

Indications. — Leucorrhées (pertes blanches), Métrites, Soins d'hygiène intime de la femme.

Mode d'emploi. — 1 comprimé pour 2 litres d'eau chaude pour injections vaginales, 1/2 comprimé pour un litre.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-22.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

FLOR-PEYOTL

Régulateur du grand sympathique. Antispasmodique parfait tout en étant un stimulant des systèmes nerveux et musculaire.

Thérapeutique certaine du déséquilibre du sympathique, des états chroniques du système nerveux sous toutes leurs formes, en un mot des états neuro-musculaires déficients : dépression, neurasthénie, myasthénie, mélancolie, fatigue, états spasmodiques et anxieux, nervosisme, insomnie, troubles cardiaques.

Toni-sédatif de choix sans accoutumance, sans accumulation, sans toxicité.

Composition :

Extrait fluide à P. E. de Peyotl.....	35
— — — Passiflore	20
Teinture de Cratægus	10
Excipient. Q. S. pour	100

Posologie. — Suivant l'âge et la gravité de l'affection, de X à L gouttes dans un peu d'eau, au début de chacun des trois repas.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Présentation. — Flacon de 30 grammes. Contient pour environ 15 jours de traitement.

Prix : 19 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1090-2.

Laboratoire du Dr L. LAFAY

LECOQ ET FERRAND, Pharmaciens

54, Chaussée d'Antin, 69, rue de Provence — PARIS (IX^e)

(Tél : Trinité 21-06.)

FLUASE

(Gouttes.)

Composition. — Extrait fluide d'Hamamelis, d'Hydrastis, de *Cimicifuga racemosa*, de Marron d'Inde stabilisé, Teinture de noix vomique.

Mode d'action. — Tonique et stimulante par sa Noix Vomique, Vaso-constrictive par son Hamamelis et son Hydrastis, Analgésiante par son Marron d'Inde et son *Cimicifuga*, qui est en même temps un bon toni-cardiaque.

Indications thérapeutiques. — Stases sanguines, Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la ménopause et de la puberté, Ménorragies, Métrorragies, Dysménorrhées, Aménorrhées, Douleurs utérines, Métrites.

Doses et mode d'emploi. — XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin sucrés avant les principaux repas.

Dans les états aigus, augmenter les doses jusqu'à XXX gouttes trois fois par jour.

Prix du flacon pour un mois et demi de traitement : 15 fr. 60

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1343-1.

Laboratoire de Pharmacologie Appliquée
rue Frédéric-Chevillon — ALLAUCH (B.-du-R.) (Tél. 29.)

FLUCHOLINASE

Granulé cholagogue et antianaphylactique de saveur légèrement anisée très agréable.

Composition. — Extrait de boldo, d'artichaut frais stabilisé, peptones polyvalentes (poisson, viande, lait, œufs), citrate de magnésie, hyp-sulfite de magnésium, sulfate de Mg et Na, uro-tropine.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire, certains troubles digestifs et intestinaux, certaines dermatoses, Chocs anaphylactiques, Migraines, Urticaires.

Prix :

P. M. (20 cuillerées à café) : 18 fr. 75.

G. M. (60 cuillerées à café) : 48 fr.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
n° 1947-1.

Laboratoire TIXIER

Saint-Quentin (Aisne).

FLUDIOSE

Composition :

Iode, Tanin, Lactophosphate de chaux, Fer, Iodure de manganèse, Méthylarsinate de soude, Vanille et Cacao.

Chaque cuillerée à café contient : 1 cgr, 25 d'iodure de manganèse pur et 2 mmgr. 5 de méthylarsinate de soude.

Forme pharmaceutique :

Sirop de goût très agréable, Infermentescible, ne constipe pas.

Indications :

Les diverses manifestations du lymphatisme et les troubles de la croissance. Les indications de la *Fludiose* sont toutes celles des préparations iodo-tannique-, mais, par la présence des autres éléments constitutifs, *et en particulier du manganèse*, elle dépasse toutes ces préparations, par son activité et sa rapidité dans ses effets. Elle présente l'avantage d'être de digestion facile, de goût agréable, constante dans sa composition.

La *Fludiose* est le plus puissant succédané de l'huile de foie de morue.

Mode d'emploi et doses :

Enfants de 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

3 à 6 ans : 2 cuillerées à dessert par jour.

6 à 12 ans : 2 cuillerées à potage par jour.

12 à 16 ans et *adultes* : 3 cuillerées à potage par jour.

Se prend pure ou dans un peu d'eau avant ou pendant les repas.

Pas d'iodisme.

Pas de constipation.

Prescrire : *Fludiose* : 1 flacon.

Prix, le flacon : 18 fr. 15.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 553-1.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).

(Tél. : 0-50.)

Échantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

FLUIDOBILE

Composition. — Comprimés à base des extraits suivants : Feuilles d'Artichaut-Biliaire-Boldo-Cascara-Chardon Bénit-Belladone.

Indications. — Insuffisances hépatiques, Insuffisances biliaires, Coliques hépatiques, Ictères, Lithiase biliaire, Congestion du foie.

Migraines, Urticaire, Arthritisme, Maladies de la Peau, Constipation chronique, Hémorroïdes.

Doses et mode d'emploi :

Maladies du Foie. — 1 à 2 comprimés à la fin des deux principaux repas.

Migraine, Urticaire. — 1 à 2 comprimés dès la sensation de malaise.

Constipation chronique. — 2 comprimés le soir en se couchant et, si besoin est, un autre comprimé le matin à jeun.

Maladies de Peau, Hémorroïdes, Arthritisme. — 1 à 2 comprimés le matin à jeun.

Prix au public : 14 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1478-3.

Laboratoires MICHEL

CIREY-SUR-VEZOUZE (Meurthe-et-Moselle).

FLUOBYL

Granulé

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire.

Composition. — Lactosérum ; Citrate de Magnésie ; Peptone de Fibrine sèche.

Indications. — Drainage des voies biliaires. *Maladies du foie :* Ictères ; Cholécystites ; Coliques hépatiques.

Dyspepsies réflexes : Nausées, vertiges, constipation d'origine hépatique.

Maladies rénales.

Posologie : 1 à 4 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun ; se coucher dix minutes sur le côté droit ; attendre une demi-heure avant de prendre le petit déjeuner.

Suivre le traitement deux semaines par mois.

Prix : 20 fr. 40.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

FLUODYLE

Forme : AMPOULES.

Chaque ampoule renferme:

Fluorure de sodium.....	0,001
Hypophosphite de manganèse.....	0,001
Cacodylate de soude.....	0,15
Sulfate de strychnine.....	0,002
Sérum physiologique.....	2 cmc.

Mode d'emploi. — Pendant 10 jours consécutifs, faire une injection sous-cutanée. Repos de 10 jours. Puis recommencer une nouvelle série de piqûres. La boîte de 10 ampoules : 14 fr. 80.

Forme : GRANULÉ vitaminé.

Contient tous les minéraux indispensables à l'organisme. Chaux, Phosphore, Fer, Manganèse, Fluor, Silicium, Zinc, Soufre et Magnésie, vitamine D.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café, 3 fois par jour.

Indications. — Déminéralisation, Convalescence, Affections pulmonaires, Anémie, Surmenage.

La Boîte : 14 fr. 80.

Établissements SABATIER

A. EMPTOZ, Pharmacien

10, rue René-Bazin - PARIS (XVI^e). (Tél.: Auteuil 06-40.)

FLUOKOL

Granulé entièrement soluble, aromatisé à la menthe.

Association de cinq peptones (viande, poisson, œuf, lait et blé) et d'hyposulfite et sulfate de magnésie.

Propriétés. — Cholagogue, antianaphylactique complet et cytophylactique.

Indications. — Toutes affections du foie (cholécystite, lithiase biliaire, etc.). Troubles digestifs d'origine hépatique, Anaphylaxie (hyposulfite de magnésie et 5 peptones différentes), Urticaires, Prurits, Migraines, Constipation. Toutes intoxications.

Doses et mode d'emploi. — Comme cholagogue : 1 à 3 cuillerées à café de granulé dans un peu d'eau le matin à jeun.

Comme désensibilisant : une demi-cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, une demi-heure avant les repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix : 19 francs la boîte pour 10 à 15 jours de traitement.

Laboratoires LAFFORT, Pharmacien

Licencié ès sciences, Ingénieur E. C. B.

JOUE-LES-TOURS (Indre-et-Loire). (Tél. : 38.)

FLUOSALYL BEAUGOURDON

Formule. — Solution de fluorures alcalins préparée en partant de l'acide fluorhydrique, soumise à l'action de dérivés aromatiques dans des conditions spéciales.

Propriétés. — Détruit le tartre dentaire. Antiseptique buccal de premier ordre, ne coagulant pas l'albumine et ne détruisant pas les cellules vivantes.

Usages. — Dans toutes les affections de la bouche et particulièrement dans la *pyorrhée alvéolo-dentaire* à tous les degrés. Dans les gingivites mercurielles ou bismuthiques les accidents ont un arrêt si rapide que le traitement peut être repris et continué deux ou trois jours après que le FLUOSALYL aura été employé.

Emploi. — A la dose d'une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau tiède en bains de bouche de cinq minutes.

Dans les cas aigus et en cas d'abcès les séances de bains de bouche devront être répétées 4 à 5 fois par jour.

Employé pour les pulvérisations suivant la méthode Joyeux.

Pour le détartrage mécanique on emploie FLUOSALYL'S PASTE, et brosse à dents FLUOSALYL.

Prix : Liquide : 18 fr. 35. — Pâte : 8 fr. 60. — Brosse : 12 fr.

Laboratoires BEAUGOURDON, pharmacien,
43, avenue Kléber - PARIS (XVI^e). — (Tél. : Passy 83-68.)

FLUVEINOSE MAUCHANT

(Gouttes.)

Régulateur circulatoire.

Principes actifs. — Sulfonate double de benzyle et de sodium, chlorure de magnésium. Extraits fluides : Yohimbehe, marron d'Inde, hamamélis, séneçon, armoise.

Indications. — Troubles propres de la ménopause, aménorrhée, dysménorrhée, métrorragies, hémorroïdes, hypertension artérielle, tendance aux néoplasies, affaiblissement provoqué par l'âge.

Dose. — XXV gouttes 3 fois par jour.

Prix : 15 fr. 25.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 05-21.)

FLUXIDIA

Composition. — Teinture de Teskra, Alcoolature stabilisée de marron d'Inde, Hamamélis, Hydrastis, Viburnum, Séneçon, Iode, Tannin.

Indications. — Traitement des maladies provenant des troubles de la circulation du sang.

Doses. — XXX gouttes deux fois par jour.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

FLUXINE

Composition. — Complexe phytothérapique réalisé par la synergie : Intrait de Marron d'Inde Dausse, Alcoolature d'Anémone, Noix vomique.

Propriétés. — Vaso-constricteur énergique. Tonique de la paroi vasculaire. Stimulant ovarien. Sédatif utérin.

Indications. — Troubles de la circulation veineuse des deux sexes, Phlébites, Varices, Hémorroïdes, Ulcères variqueux. Affections gynécologiques : Métrorragies, Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause. Règles douloureuses, certaines Névralgies, Prostatites, etc.

Formes. — Gouttes, Dragées.

Mode d'emploi. — (Une dragée = X gouttes.)

Gouttes : X gouttes à la fois dans un peu d'eau sucrée ou non, dose à renouveler 3 fois par jour avant les repas.

Dragées : 1 dragée à avaler sans mâcher 3 fois par jour avant les repas.

Prix au public : 15 fr. 30 pour un mois de traitement.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-2.

Laboratoires FLUXINE

PRODUITS BONTHOUX

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie
VILLEFRANCHE (Rhône).

FOLLESTRINE GRÉMY

Hormone folliculaire.

Indications. — Aménorrhée de la puberté, de l'âge adulte et de la ménopause. Hypoplasie utérine. Diabète ovarien. Sclérodémie.

Mode d'emploi. — Tous les jours ou tous les 2 jours, faire une injection intramusculaire, pendant les huit jours qui suivent les règles.

Contre-indications. — La FOLLESTRINE GRÉMY est formellement contre-indiquée au début de la grossesse : elle peut avoir une action abortive à cette époque.

Médication associée. — La FOLLESTRINE GRÉMY et l'OCRÉINE GRÉMY peuvent être employées en médication associée dans le traitement des déficiences ovariennes ; il est nécessaire alors de les administrer de la façon suivante :

Dès la fin des règles jusqu'au 8^e jour environ, FOLLESTRINE GRÉMY : 1 injection intramusculaire par jour ou 6 à 10 granules.

Du 10^e jour jusqu'au 1^{er} jour des règles suivantes, OCRÉINE

GRÉMY : 4 à 6 pilules par jour loin des repas ou 1 injection intramusculaire.

Granules (chaque granule équivaut à 250 unités internationales).

Ampoules (chaque ampoule équivaut à 500 unités internationales).

Prix : *Ampoules* : 35 fr. 65. *Granules* : 22 fr. 45.

Enregistré L. N. C., n° 608-67.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 48-43.)

FOLLICORMONE BUCCALE HINGLAIS

**Première préparation d'hormone ovarienne active
par voie buccale.**

(Acad. Méd., 27 Janvier 1931.)

(Soc. belge de gyn., Février 1931.)

Activité buccale contrôlée.

Composition. — Solution huileuse, concentrée,
d'hormone folliculaire en capsules de gélatine.

Mode d'emploi. — *Trois doses par jour à inter-
valles de 4 heures au minimum, pendant les repas
de préférence.*

Traitement type d'attaque.

40 capsules à doses croissantes :

Matin, midi et soir.	{	pendant 3 jours	:	1	+	1	+	1;
		les 2 jours suivants :		2	+	2	+	2;
		les 2 jours suivants :		3	+	3	+	3.

(N. B. On peut également prescrire avec de bons résultats
4 capsules par jour pendant 10 jours en 3 ou 4 prises
quotidiennes espacées de 4 heures au minimum.)

Cures d'entretien.

15 à 20 capsules par mois : 1 capsule matin, midi et
soir : pendant 5 à 7 jours.

Date du traitement. — *Quand les règles existent :*
les capsules seront toujours absorbées dans les
dix jours précédant la date présumée des règles.

Dans tous les autres cas (castration, aménorrhées) :
la cure sera régulière et mensuelle (première se-
maine du mois par exemple).

Dysménorrhées : Commencer 1 ou 2 jours avant le
début présumé des règles et poursuivre jusqu'à
cessation des troubles (6 à 9 capsules peuvent
suffire).

Indications spéciales : Stérilité inexpliquée; Vulvo-
vaginite gonococcique. Prurit vulvaire. Troubles
nerveux menstruels, Poussée fébrile prémenstruelle
des tuberculeuses, etc...

La boîte de 40 capsules pour une cure de
1, 2 ou 3 mois : 42 francs.

Produits HINGLAIS

30, rue de Miromesnil — PARIS. (Tél. : Anj. 37-14.)

FOLLI-LOBINE

du D^r Frayssé.

Deux formes : Pilules, Ampoules injectables (Voir aussi *Opothérapie du D^r Frayssé*).

Folliculine ovarienne associée aux Hormones du Lobe antérieur de l'Hypophyse. Le lobe antérieur renforce l'action de la folliculine.

Pilules. — Glutinisées, actives par voie buccale, non détruites par l'action des sucs digestifs qui décomposent la folliculine.

1 pilule = 30 unités physiologiques.

Doses : 2 à 6 par jour, espacées dans la journée.

Ampoules. — 20 unités par ampoule : 10 U, Folliculine. 10 U, Lobe antérieur.

Doses : 1 ampoule par jour pendant 6 jours, 10 jours avant les règles.

Indications. — Déficiences ovariennes en général. Troubles menstruels, Puberté et Ménopause.

Pilules. — Deux modèles de flacons : 1 fl. ordinaire ; 1 double flacon.

Ampoules. — Boîte de 6 ampoules injectables de 2 cc.

Traitement : 3 semaines.

Laboratoires du D^r FRAYSSE et Cie

21, rue de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88.

FONDANT DE SOUFRE DAUSSE

Composition. — Collobiase de soufre : 15 mgr. par cuillerée à café.

Présentation. — Fondant blanc d'une saveur sucrée et très légèrement sulfurée.

Propriétés et Indications thérapeutiques. — Modificateur de la nutrition soufrée ; Arthralgies, formes légères du rhumatisme, névralgies, arthritisme, affections cutanées, laryngites, trachéo-bronchites.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, ou plus, suivant indication du médecin.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.).

FORIOD

Tétraiodophénolphtaléinate de Sodium.

Substance opaque aux rayons X, s'éliminant par les voies biliaires.

Indications. — Cholécytographie, Examen radiologique de la région vésiculo-duodénale.

Posologie et mode d'emploi. — Employer l'une des méthodes suivantes :

1° *Voie buccale*: Méthode des doses fractionnées (dite de Sandström), le premier soir prendre 1 flacon de Foriod Poudre composée ; le lendemain, 1 flacon de Foriod Poudre composée en deux prises (la 1^{re} moitié le matin, la 2^e le soir). Examen radiologique le lendemain matin.

2° *Voie intraveineuse*: Solution aqueuse à préparer extemporanément avec le contenu d'une ampoule de poudre cristallisée (2 gr. 40) et 50 à 60 cc. d'eau distillée stérile. Examen de la 8^e à la 24^e heure après l'injection.

Prix de vente :

L'ampoule de poudre : 14 fr. 35. — Le flacon de dragées : 29 francs. —

Le flacon de poudre composée : 29 francs.

Le nécessaire (pour méthode de Sandström) : 46 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

FORMOBENZYL

Désinfecte l'arbre bronchique, tient le cœur, calme la toux.

Composition. — Goménol à 20 %, camphre, orthoformiate d'éthyle.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou subaiguës de l'appareil respiratoire. Bronchites, congestions pulmonaires actives, broncho-pneumonies et pneumonies. Complications respiratoires de la grippe et de la rougeole. Coqueluche. Toux spasmodiques.

Ampoules huileuses. — *Adultes* : 5 cc. *Enfants* : 3 cc.

Posologie. — Injection intramusculaire : 1 ou 2 ampoules par jour.

Voie rectale : une ou deux ampoules par jour en lavement, étendues d'un volume égal d'huile d'olive.

Lavement évacuateur au préalable.

Gouttes. — *Enfants* : par 24 heures : VI gouttes par année d'âge.

Dix ans : LX gouttes ; *adultes* : CXX gouttes.

Boîte ampoules *adultes* 5 cc. : 19 fr. 15.

Boîte ampoules *enfants* 3 cc. : 17 fr. 10.

Forme Gouttes : 17 fr. 10.

Laboratoire DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

FORMOCARBINE

Composition :

Association du *Charbon animal*, ultradivisé, absolument privé de Cyanogène, à la *Formine* (Hexaméthylènetétramine cristallisée), avec ou sans addition de *Benzonaphthol*. Donc deux formules :

Formocarbine simple.

Formocarbine naphtolée.

Il est à remarquer que la *Forme Naphtolée* ne provoque jamais de constipation.

Forme pharmaceutique :

Granulé friable, aromatisé, agréable au goût. volontiers accepté par les malades, même les plus difficiles.

Le Granulé de Formocarbine n'est pas dur à la dent, fond très bien dans la bouche, se désagrège instantanément dans l'eau.

Propriétés :

Antiseptique interne de choix. Pouvoir absorbant et adsorbant considérable.

Indications thérapeutiques :

Injections gastro-intestinales. — Dyspepsie, Fermentations, Diarrhées, Entérites, Flatulences, Putréfactions intestinales, Stase intestinale, Auto-intoxication, Maladies infectieuses, Colibacillose, Aérophagies, *Intoxications alimentaires.*

Injections biliaires. — Désinfecte par la *Formine* la Vésicule et les canaux en même temps que son *Charbon animal* absorbe les bactéries intestinales montant au foie par la Veine porte en ses diverses origines.

Angiocholites, Angiocholécystites, Lithiase biliaire, Hépatisme.

Infections urinaires. — Toutes les infections urinaires, rénales, vésicales, Cystites, Pyélonéphrites, Urétérites, Prostatites, Colibacillurie.

Syndrome entéro-rénal.

Radiologie.

Posologie :

1 à 2 cuillerées à café après les repas à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Par demi-cuillerées à café chez les enfants.

Dans les grandes crises d'*Aérophagie* ou dans les cas d'*Intoxication alimentaire*, la dose devra être portée à 3 cuillerées à soupe, une toutes les demi-heures.

En *Radiologie* : Pour obtenir l'absorption complète des gaz qui dilatent les organes et gênent l'examen : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour dans les 48 heures qui précèdent cet examen.

Prescrire :

Formocarbine simple ou *Formocarbine naphtolée* : 1 lacon.

Prix : la boîte, 14 fr. 65 ; la triple boîte, 36 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous les n^{os} 553-2 et 553-3.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE
1 et 3, rue Malherbe — BEAUVAIS (Ois.). (Tél. : 0-50.)

Echantillons et Littérature à la disposition de
MM. les Docteurs.

FORMOCARBOS

Composition. — Ocharbon animal chimiquement pur activé (Carbos). Urotropine. Peptones de poisson, d'œuf, de viande, de lait et sulfate de magnésie.

Forme. — Granulé rond anisé.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique. Congestion du foie, Insuffisance hépatique. Cholécystite. Colibacillose. Migraines. Prurit. Rougeur de la face. Somnolence. Fermentations et en général **toutes les manifestations anaphylactiques.**

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 cuillerées à café.
Enfants : 1/2 ou 1 cuillerée à café suivant l'âge, avant (de préférence) ou après chaque repas.

Prix : 16 fr. 40.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise.)
(Tél. : 30.)

FORMOCHOLINE

Drainage des voies biliaires.

Propriétés. — Cholagogue, renforçateur du pouvoir antitoxique du foie, évite l'encombrement de la vésicule biliaire et des canaux excréteurs.

Indications. — Cholécystites, angiocholites, affections hépatiques des pays chauds, maladies de la nutrition, goutte, diabète, obésité, tous syndromes gastriques réflexes et dermatoses sous la dépendance d'un dysfonctionnement hépato-vésiculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café le matin dans un quart de verre d'eau légèrement tiédie.

Présentation et prix. — Granulés : 16 francs.
Durée moyenne du traitement des unités :
10 à 12 jours.

Laboratoires du Dr ADLER
36, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.
(Tél. : Arch. 63-27.)

FORMULE JACQUEMAIRE N° 60

Composition.

Milieu magnésien associé aux Glycérophosphates de Calcium, Magnésium, Fer, Manganèse et à la Silice.
Sa formule diffère de la VERRULYSE par des proportions différentes en magnésies (hydroxyde et non chlorure) et l'addition de silicate de soude.

Propriétés. — Reconstituant cellulaire par reminéralisation polyvalente à prépondérance magnésienne. Redresse et élimine toute production cellulaire anormale. Rétablit l'équilibre acido-basique. Antiacide. Véritable aliment minéral, subvient à la carence minérale de l'alimentation.

Relève l'état général en huit jours.

Indications. — Toutes les proliférations anormales épidermiques ou des tissus profonds, verrues, papillomes, végétations, kératoses séniles ou autres ; améliore ou freine les tumeurs ; évite le terrain précancéreux. Troubles post-opératoires par déminéralisation.

Toutes les débilités par sub-minéralisation ou déminéralisation. Enfants débiles, malingres. Adultes surmenés et déprimés. Transformations de la quarantaine.

Dermatoses diverses dues au déséquilibre du pH. Verrues plantaires.

Complément nutritif moderne indispensable.

Forme. — Cachets ouvrables, contenant une poudre que, pour les enfants ou adultes ne pouvant avaler les cachets, on peut faire prendre dans un aliment (potage, purée, compote, etc.).

Posologie. — 2 cachets par jour au milieu des repas.

Remarques. — Formule Jacquemaire n° 60, comme une formule magistrale, conserve le secret du diagnostic, parce que les boîtes, les conditionnements ne portent que la posologie sans aucune indication. Cette qualité est très précieuse pour la prescription chez les précancéreux. Dans tous les cas, le prétexte de la prescription est la reminéralisation.

Le traitement peut se prolonger indéfiniment, car Formule Jacquemaire n° 60 ne contient que les éléments minéraux qui devraient toujours se trouver dans les aliments.

Prix public : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 16 fr. 30.
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-3.

**Laboratoires FLUXINE
Produits BONTHOUX**

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie.
VILLEFRANCHE (Rhône).

FORNOSE

Pommade nasale sans essences.

Novocaïne, Adréraline, Baume du Pérou,
Ichtyol, Résorcine, Oxyde jaune de Hg,
Excipient fondant.

Cicatrisante, Désodorisante, Non irritante.
Tous états congestifs du nez et de la gorge.
Soins pré-opératoires et post-opératoires.
Furonculose du nez, Ozène, Antisepsie res-
piratoire.

Étaler comme un pois de pommade à l'in-
térieur de chaque narine 2 ou 3 fois par
jour.

Le tube : 6 fr. 25.

Échantillons :

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).
(Tél. : Observatoire 01-83.)

FORTOSSAN

CIBA

Sel sodique neutre de l'acide
inosito-hexa-phosphorique.

PRÉPARATION PHOSPHORÉE POUR ENFANTS.

Médicament reconstituant et rectificateur de
la nutrition spécialement préparé pour
la pratique infantile. Très assimilable,
parfaitement toléré.

Indications. — Retard du développement
et de la dentition. Scrofulose et tuberculose
infantile. Convalescence des maladies infec-
tieuses, etc.

Doses. — Poudre s'administrant avec le lait
du biberon ou les bouillies, à la dose de 2 à
4 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Formuler. — Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

FORTOSSAN IRRADIÉ

CIBA

PRÉPARATION PHOSPHORÉE AVEC VITAMINE D.

Puissant antirachitique par association de la vitamine D au phosphore organique végétal. La vitamine D développe, dans ces conditions, le maximum de son efficacité thérapeutique sans aucun effet secondaire: ni anorexie, ni diarrhée.

Indications. — Rachitisme, Ostéomalacie, Tuberculose, Prétuberculose, Anémie infantile, Etats de dépression liés à une insuffisante assimilation de la chaux et du phosphore, Fractures, Caries dentaires.

Doses. — 1/2 à 4 cuillerées à café par jour.

Formuler. — Boîte de 20 à 30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

FOSFOMAGNYL DU D^r CHURCHILL

Cytophylaxie leucogène. Association de phosphore et de chlorure de magnésium.

Forme. — Comprimés.

Composition. — Chlorure de Magnésium chimiquement pur : 0 gr. 30 ; Hypophosphite de Magnésie : 0 gr. 10 ; Hypophosphite de Chaux : 0 gr. 05 ; Hypophosphite de Manganèse : 0 gr. 02.

Posologie. — 4 comprimés par jour. Deux avant le petit déjeuner du matin et un autre avant chacun des deux autres repas.

Indications. — Asthénie, Régulateur des fonctions hépatiques, Préventif de l'artério-sclérose, Anémies, Faiblesse générale, Stimulant de l'activité cellulaire.

Produit français. Prix : 22 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. n° 225-16.

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL
P. DESCHAMPS, Pharmacien,
92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 74-02.)

FOSFOXYL CARRON

PHOSPHORE COLLOÏDAL

Colloïde chimiquement défini par Carron, Bourcet et Chevalier. CR. Société thérapeutique, 11 novembre 1925.

A l'état de terpénol hypophosphite de sodium.

Formes. — Fosfoxyll sirop : sirop opalin anisé, goût agréable.

Fosfoxyll pilules : petits grains couleur de jade, très faciles à avaler.

Fosfoxyll liqueur : liquide opalin glycéринé menthé spécialement destiné aux diabétiques.

Dosage. — 10 cc. de formes liquides (soit une cuillerée à dessert) ou 4 pilules contiennent 0 gr. 10 de colloïde chimique exprimé en terpénol hypophosphite sodique et équivalent à 13 milligrammes de phosphore blanc.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de la dépression nerveuse et mentale, stimulant des glandes endocrines et tonique du système nerveux central. Modificateur de la nutrition et de l'assimilation. Apéritif. Créateur d'énergie physique et mentale. Fixateur de l'ion calcium. *Action rapide et régulière.*

Indications. — Maladies du système nerveux, maladies de la nutrition. Dépressions nerveuses et mentales. Impuissance, Surmenage, Neurasthénie, Psychasthénies, Convalescence, Anémie, Tuberculose, Diabète, Rachitisme, Arthritisme, Rhumatisme, Fatigues cérébrales ou physiques exagérées, Périodes d'entraînement, de préparation à des examens ou concours.

Contre-Indication. — État congestif aigu.

Mode d'emploi. — Dose moyenne: une cuillerée à dessert (10 cmc.) de liqueur ou sirop, étendue de quantité égale d'eau ou d'un liquide froid quelconque, ou 4 pilules, avant ou au cours des deux principaux repas. Si le malade est très excité ou dans le cas d'insomnie nerveuse, commencer par une cuillerée à café ou 2 pilules.

Dans le cas de dépression accentuée, doubler la dose moyenne.

Prescrire:

Sirop de FOSFOXYL CARRON (19 fr. 40).

ou **Pilules de FOSFOXYL CARRON** (17 fr. 35).

ou **FOSFOXYL LIQUEUR** (18 fr. 35).

Chaque flacon ou boîte pour une semaine de traitement.

Laboratoires du FOSFOXYL

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 00-10.)

FOSYLS CARRON

Terpénolhypophosphites minéraux.

Reminéralisateurs chimiques physiologiques.
assimilables directement.

Calcofosyl : *Sirop* (pour enfants) : 2 à 4 cuillerées
à café, suivant l'âge.

Comprimés : 4 à 8 par jour.

Magnéscosyl : 4 à 8 comprimés par jour.

Manganofosyl : 4 à 8 comprimés par jour.

Cuprofosyl : 2 à 4 comprimés par jour.

Tous ces corps possèdent les propriétés dynamiques
et trophiques du phosphore sur le système ner-
veux et sur la nutrition générale, mais chacun
d'eux, en raison de la base qu'il contient, présente
une activité d'action particulière qui conditionne
sa prescription dans diverses affections.

Comprimés et sirop : 14 fr 80.

Laboratoires CARRON

69, rue de Saint-Cloud — CLAMART (Seine).

FRANCALCIUM

Calcithérapie.

Composition. — Acétylglycocoollate de calcium.

Présentation :

- 1° En solution à 20 p. 100 (sans odeur ni saveur).
- 2° En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 10 ampoules).
- 3° En ampoules de 10 cc. à 10 p. 100 pour injections intraveineuses (boîtes de 5 ampoules).
- 4° En comprimés de 15 mgr. (boîtes de 45 comprimés).
- 5° *Franccalcium B.* (Quinate de Ca). En ampoules de 5 cc. à 10 p. 100 pour injections intramusculaires indolores (boîtes de 10 ampoules).
- 6° En ampoules de 10 cc. à 10 p. 100 pour injections intramusculaires indolores (boîtes de 5 ampoules).

Indications cliniques :

- a. *Indication récalcifiante* : Rachitisme, Retard de consolidation des fractures, Carie dentaire, Tuberculose pulmonaire, ganglionnaire ou chirurgicale. Grossesse.
 - b. *Indication antihémorragique* : Hémoptysies, Hématémèses, Hématuries, Hémorragies obstétricales, Troubles hémogéniques (purpuras, etc.).
 - c. *Indication de résorption* : Pleurésies, Ascites, Œdèmes des néphrétiques. Diarrhées des tuberculeux.
 - d. *Indication antichoc* : Etats de sensibilisation ou d'anaphylaxie spontanés (urticaire, prurit, asthme, etc.). Etats de sensibilisation thérapeutique consécutifs aux diverses chimiothérapies (arsenic, bismuth, or).
 - e. *Indication spasmo-sédative* : Asthénie, Tétanie, Spasmophilie, Eclampsie obstétricale. Etats spasmodiques viscéraux. Maladie de Basedow. Troubles du système nerveux.
- Indication antirhumatismale* : Polyarthrites chroniques.

Posologie :

En solution : 2 fois par jour, avant chacun des 2 principaux repas, dans un peu d'eau sucrée.

	Enfants : au-dessous de 12 ans.	Adultes :
Indication récalcifiante	II gouttes par année d'âge.	XL gouttes
— antirhumatismale ..	VIII gouttes par année d'âge.	XL —
— antihémorragique ..	XX à LXXV gouttes.	CXX —
— antichoc	L à C gouttes.	CXX —
— spasma-sédative		
Deux fois par jour, avant les repas.		
Comprimés de 15 mgr. d'acétylglycocoollate de Ca	1 comprimé.	2 ou 3 comprimés.
Ampoules de 5 cc. ou 10 cc. à 10 % pour injections intraveineuses	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. ou 10 cc. tous les 2 jours.
(Aspirer un peu de sang dans la seringue et injecter très lentement.)		
Ampoules de 5 cc. ou 10 cc. à 10 % pour injections intramusculaires.	1 ampoule de 5 cc. tous les 3 jours.	1 ampoule de 5 cc. ou 10 cc. tous les 2 jours.

Ce tableau de posologie est donné à titre indicatif et d'après nos essais cliniques, le médecin traitant étant seul qualifié pour la prescription des doses, qui peuvent varier suivant les malades.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FRANCOPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté adhésif à l'oxyde de zinc.

Avantages. — Adhérence parfaite. Ne sèche pas, ne poisse pas. Garantie de conservation minima 2 ans.

Indications. — Fixation des pansements.

Dimensions. — 1 m. sur 1-2-3-4-5-10-18 cm. de larg. — 5 m. sur 1 1/4, 2 1/2 3 3/4, 5, 6 1/4, 7 1/2, 10 cm. de largeur, sur cretonne rose ou blanche ; uni ou perforé, ou sur tissu élastique. Réduction de 50 p. 100 au Corps médical.

A. KRAUS, Pharmacien de 1^{re} classe
Fournisseur des Hôpitaux, du Service de Santé, de la Croix-Rouge.

37, rue Godot-de-Mauroy — PARIS.

Usine à Courbevoie.

(Tél. : Opéra 24-54.)

FRANLAXOL

Granulé mucilagineux, évacuant, non irritant, non putrescible, non digestible.

Composé formé d'un mucilage de lin associé à divers mucilages végétaux purs, spécialement choisis. Il possède la propriété d'augmenter considérablement de volume dès qu'il est placé dans un milieu liquide. Dans le milieu intestinal, il forme une masse volumineuse, onctueuse, égale à environ cinquante fois son volume primitif, qui facilite la libération de l'intestin sans fatiguer sa musculature.

Indications. — A prescrire dans toutes les constipations atoniques ou spasmodiques, dans toutes les stases cœcales ou cœco-ascendantes, sigmoïdiennes ou rectales.

Mode d'emploi. — Mettre le granulé à sec dans la bouche et avaler à l'aide d'une gorgée de liquide.

Adultes : une ou deux cuillerées à café après les repas et suivant les indications du médecin.

Enfants : une cuillerée à café après les repas.

Prix : 18 fr. 15 la boîte de 200 gr. net.

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. : Opéra 54-58.)

FREINOLUTÉINE VOGEin

Chaque comprimé renferme 0,05 de Corps jaune privé de sa folliculine et des hormones excitatrices pour ne laisser subsister que ses effets inhibiteurs et freinateurs et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Son rôle est de déclencher le mécanisme régulateur de la fonction menstruelle. Elle diminue les hémorragies utérines d'origine ovarienne, notamment les ménorragies de la puberté. Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.

Son action n'est pas brusque et se fait surtout sentir au cours des règles qui suivent l'administration du médicament.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas 5 à 6 jours avant l'époque présumée des menstrues.

Le flacon : 18 fr. 35. — L. N. C. n° 745-7.

Laboratoires VOGEin

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).
(Tél. : Danton 83-24.)

FRÉNASMA

Eupnéique phyto-hormonique.

Composition. — Éphédrine, Dionine, Pulmine, Surrénine, Spartéine, Lobélie.

Forme. — Comprimés dragéifiés rigoureusement dosés.

Indications. — Asthme bronchique, Bronchites chroniques, Dyspnées, Emphysèmes, Sclérose pulmonaire, Toux spasmodiques, Rhumes des foies, Rhinites spasmodiques, Etats allergiques (urticaire, migraine). Accidents sériques et anaphylactiques.

Posologie. — Sans contre-indications : 3 à 4 comprimés par jour et plus.

Enfants à partir de 5 ans : 1 à 3 comprimés.

Prix : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-2.

Laboratoires du FRÉNASMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).
(Tél. : Roquette 76-24.)

FRÉNITAN

Vagotonique-hypotenseur.

Composition. — Chlorhydrate de triméthyl-amino - éthyluréthane, acide adénosine-phosphorique.

Indications. — Hypertension d'origine rénale, surrénalienne, de la ménopause ; Hypovagotonie, Angor pectoris, Tachycardie, Spasmes vasculaires.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par jour, ou plus, sans jamais dépasser 5 comprimés.

Présentation. — La boîte de 21 comprimés :
18 fr. 40.

Échantillons.

Laboratoires du Dr F. DEBAT
60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Méthode

Composition : — extrait de jus de citron
marmelade de sucre et de corps gras

Gouttes : — 1 solution

Préparée à l'usage de l'adulte

isotopique, indolore, et sans saveur

bonne et agréable et facile à avaler

De corps gras, sans saveur
ou

ou sans saveur, et sans saveur
physiologique et sans saveur
naturelle, et sans saveur, et sans saveur
en fait la médication isotopique et sans
physiologique et sans saveur, et sans saveur

de la même nature, et sans saveur
de la même nature, et sans saveur

FRÉNOVEX

Traitement des hémorragies utérines.

Médication préventive et curative.

Thérapeutique d'urgence.

Composition. — Extraits totaux de glande mammaire lactante et de corps jaune frais (procédé Biosymplex).

Gouttes. — Solution hydro-alcoolique : 1 cc. (40 gouttes) correspond à 1 gr. 5 de glande mammaire lactante et à 0 gr. 08 de corps jaune frais.

Dragées à croquer. — 1 dragée = 5 gouttes.

Ampoules injectables. — Solution aqueuse isotonique, indolore : 1 cc. correspond à 2 gr. de glande mammaire lactante fraîche.

Mode d'action. — L'extrait mammaire, en augmentant la tonicité utérine, ferme les vaisseaux sanguins béants. Il décongestionne l'endomètre et freine l'hypersécrétion folliculaire de l'ovaire (Cherry, Lendle, Aurisicchio).

Le corps jaune possède une action antifolliculinaire spécifique et stimule la sécrétion lutéinique.

Avantages. — Frénovex agit très rapidement par voie buccale. Son action purement physiologique et durable, son *innocuité absolue, même à doses élevées et répétées*, en font la médication étiologique et symptomatique de la plupart des hémorragies utérines.

Indications. — *Frénovex* est la médication de choix dans les : Ménométrorragies de la puberté et de la ménopause, Polyménorrhées, Hyperménorrhées, Métrites

hémorragiques, Hémorragies par polype et fibrome sous-muqueux, Hémorragies du post-partum et du post-abortum, Menaces d'avortement, Hyperfolliculinie et ses conséquences, Mastodynies.

Posologie :

Doses d'entretien ou préventives : Faire prendre, pendant les 20 jours qui précèdent les règles : XX à XL gouttes par jour (4 à 8 dragées) (1 ampoule tous les 3 jours).

Doses d'attaque pendant les hémorragies : 100 à 200 gouttes par jour (1 ampoule tous les jours).

Doses d'urgence (hémorragies graves) : 1-6 cuillerées à café par jour (1 à 3 ampoules par jour).

Sauf en cas d'urgence, répartir la dose quotidienne en 2 à 3 prises, et absorber les gouttes pures, sur un morceau de sucre ou diluées dans un peu d'eau, 1/2 heure avant les repas.

En cas d'urgence, faire absorber une cuillerée à café pure, et si possible à jeun, au besoin toutes les 1/2 heures.

Bien croquer les dragées.

Les ampoules de *Frénovex* seront injectées par voie sous-cutanée, seules ou en auto-hémocrinothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-5.

Prix : Gouttes : 18 fr. 55. Dragées : 18 fr. 55.
Ampoules : 31 fr. 80.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS
(XIV^e).

(Tél. : Alésia 28-51.)

FUCOSINE

Traitement efficace de la Constipation habituelle.

Composition. — Agar-agar, extrait de rhamnées.

Propriétés. — Mucilagineux, émollient, cholagogue ; véritable aliment du constipé ; innocuité absolue.

Formes et Posologie :

Paillettes. 1 à 3 cuillerées à café.

Poudre... 1 à 3 mesures.

Cachets .. 1 à 3 cachets.

A chaque repas régulièrement.

Indications. — Constipation habituelle, quelle qu'en soit l'origine.

Prix : 13 fr. 50 la boîte.

Laboratoire National de Contrôle 95-2 95-3 et 95-4.

Laboratoire L. PROTHIÈRE

55, rue Auguste-Comte — LYON.

(Tél. : Franklin .07-04.)

FUCUS GMET

Composition. — Extrait total, sans alcool, du *Fucus vesiculosus*. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Par son iode naturel régularise la sécrétion thyroïdienne et combat l'obésité.

Indications. — Obésité, Scrofule Arthritisme.

Posologie. — De 1 à 8 cuillerées à café par jour, *progressivement* dans eau ou vin blanc sec de préférence.

Pour traitement prolongé conseiller le flacon géant (500 cc.) 58 francs.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien.

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.)

FUCUSOL

Composition. — A base d'algues marines (Fucus vesiculosus et fucus serratus).

Indications. — Traitement végétal absolument sans danger de l'obésité et de l'embonpoint selon la méthode de Duchesne-Duparcq.

Ne contient ni nitrophénols, ni extrait thyroïdien.

Mode d'emploi. — 4 à 6 pilules par jour. 2 à 3 cuillerées à café de granulés par jour.

Boîte de 60 pilules.

Boîte de 200 pilules.

Granulés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les Nos :
Pilules 590-16. Granulés 590-26.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS

(Tél. : Archives 44-59.)

FUROPLAST

Enregistré au Laboratoire national sous n° 540-18.

Traitement des Furoncles par l'emplâtre de Vigo phéniqué.

Emplâtre caoutchouté (même masse adhésive que l'Albuplast) maintenant une rondelle de Vigo phéniqué ou — pour être employé quand le furoncle a crevé — un emplâtre au dermatol.

Avantages. — Permet le traitement des furoncles, soit par le docteur, soit par le malade lui-même, si celui-ci doit reprendre ses occupations ou ses déplacements avant achèvement du traitement.

Un *Furoplast élastique* (*Hermoplast*, enregistré sous n° 540-19) est particulièrement indiqué dans le cas de furoncles intéressant les parties du corps où un pansement rigide pourrait difficilement se maintenir.

Présentations :

Boîte ronde méta l: 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Boîte carton : 3 emplâtres Vigo, 3 compresses dermatol.

Elastique (*Hermoplast*) : 2 emplâtres Vigo, 2 compresses dermatol.

Anciens Établissements F. VIGIER et Cie, Jean HUERRE et Cie

9, rue de la Gare — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pereire 57-41.)

GADUAMINE

La GADUAMINE est un extrait opothérapique de foies frais de morue renfermant, outre les parties hydro-solubles de la glande vivante, la totalité de l'insaponifiable de l'huile. LA GADUAMINE se caractérise plus spécialement par ses *procédés scientifiques* de fabrication qui en font un produit sans goût ni odeur désagréable, et privé de tous produits de décomposition plus ou moins nocifs.

Action. — La GADUAMINE agit :

Par les principes hydrosolubles du foie, comme anti-anémique et antitoxique.

Par les vitamines naturelles A et D, comme stimulant de la croissance et fixateur du calcium.

Principales indications. — *Anémies :* anémies pernicieuses, toxiques, post-hémorragiques, infantile ; chlorose. *Etats d'infection chronique :* Adénites, scrofules, lymphatisme, prétuberculose et tuberculose. *Avitaminoses :* Rachitisme, allaitement, suites de couche, croissance.

Mode d'emploi. — *Enfants :* X à XL gouttes. *Adultes :* XL à LX gouttes. A prendre en 2 fois, avant les principaux repas, dans un liquide quelconque (eau sucrée, tisane, bouillon, vin, etc.).

Durée moyenne du flacon : 28 jours.

Prix : 15 francs.

L. N. C. N° 994-7.

Laboratoires RENARD et C^{ie}
35, rue de Paris — CLICHY (Seine).
(Tél. : Pereire 14-08.)

GADUASE

Tonique et stimulant général d'action rapide et durable. Succédané classique et agréable (sirop framboisé) de l'huile de foie de morue.

Composition :

Hypophosphites de sodium et de calcium (stabilisés par la glycérine), toniques nervins, antirachitiques et reminéralisateurs, stimulants de la nutrition.

Méthylarsinate disodique (0,015 par cuillerée à soupe), reconstituant des tissus nerveux et sanguins.

Iode (en combinaison tannique parfaitement stable et inaltérable), régulateur du métabolisme et anti-infectieux de premier ordre.

Convient à tous les âges.

La GADUASE active les échanges, réveille les fonctions, prévient et fait cesser rapidement les carences organiques. Ni incompatibilité, ni contre-indication.

Indications. — Anémie, Anorexie, Lymphatisme, Asthénie, Déminéralisations, Convalescences et toutes les insuffisances fonctionnelles.

Posologie. — Pure ou dans un peu d'eau, avant ou après les repas.

Nourrissons : 1/2 à 1 cuillerée à café *pro die*.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Adolescents et adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Flacon (210 cc. environ) : 11 fr. 70.

Grand flacon (400 cc. environ) : 19 francs.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

GAÏACAMPHRE

Présentation :

Quatre formes : *Ampoules, Comprimés, Sirop, Suppositoires.*

1° *Ampoules* de 2 et 5 cc.

Solution aqueuse de camphre (camphosulfonate) et de Gaïacol (glycéryl gaïacol) indolore, de résorption rapide, non toxique.

Formule des ampoules :

Ether monoglycérique du gaïacol..... 0 gr. 05

Camphosulfonate de sodium 0 gr. 17

Eau distillée q. s. pour 1 cc.

Correspondant à 0 gr. 10 de camphre et 0 gr. 05 de gaïacol par cc.

2° *Suppositoires* : adultes et enfants.

3° *Comprimés* :

Présentés en enrobage se dissolvant en milieu intestinal seulement.

Formule des comprimés :

Dionine 0 gr. 005

Glycéryl gaïacol..... 0 gr. 10

Camphosulfonate..... 0 gr. 05

Alcoolature de racine d'aconit... III gouttes.

4° *Sirop* : formule du sirop :

Glycéryl gaïacol 1 gr.

Camphosulfonate 0 gr. 2

Teinture d'Aconit 0 gr. 5

Dionine 0 gr. 06

Eau de Laurier-cerise..... 4 gr. 5

Eau distillée et sucre q. s. p. 100 cc.

Indications. — Toutes affections bronchiques ou pulmonaires aiguës, toutes suppurations chroniques pulmonaires.

Préventif des complications pulmonaires d'origine médicale ou chirurgicale.

Prix :

Ampoules : 22 fr. 90 la boîte de 10 ampoules de 2 cc.

22 fr. 90 la boîte de 7 — de 5 cc.

Comprimés : 14 fr. 05 la boîte de 30 comprimés.

Sirop : 14 fr. (5 le flacon).

Suppositoires : la boîte 16 fr. 65.

Nous préparons aussi le **Gaïacamphre** sous toutes ses formes avec Ephédrine.

Mode d'emploi :

Ampoules : Adultes, de 1 à 4 par jour ; Enfants, 1 par jour ou tous les 2 jours.

Comprimés : Adultes, 3 à 6 par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 1 à 3 par jour suivant l'âge.

Sirop : Adultes, 4 à 5 cuillerées à soupe par jour ; Enfants, au-dessus de 5 ans, 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Suppositoires : un le soir de préférence.

Laboratoires PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES. (Tél. : 923.)

GAÏACOLINE

Solution balsamique, expectorante et sédative pour toutes les affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques à action décongestive, résolutive et antiseptique des états inflammatoires de l'appareil respiratoire.

Composition :

Gaïacolsulfonate de Potasse.....	1 gr. 20
Ephédrine chlorhydrate.....	0 gr. 12
Diméthyl oxyquinizine.....	0 gr. 90
Ether benzylbenzoïque.....	0 gr. 20
Ether benzyl-cinnamique.....	0 gr. 20
Caféine.....	0 gr. 20
Sirop de Codéine.....	50 gr.
Elixir de framboise.....	47 gr. 18

Gaïacoline est une solution stable, de goût agréable, non toxique, sans risques d'intolérances ;

Elle réalise : la sédation de la toux opiniâtre ; la modification des sécrétions bronchiques ; l'antisepsie des voies respiratoires ; la défense de l'organisme débilisé.

Infections grippales : à toutes périodes et sous toutes formes.

Affections broncho-pulmonaires Rhumes, Catarrhes, Asthme, Emphysème, Laryngites, Pharyngites Bronchites aiguës et chroniques. **Pleurésies, Pneumonies spécifiques et aspécifiques :** Coqueluche, Rougeole.

Posologie. Adultes : De deux à quatre cuillerées à soupe par jour.

Enfants : De deux à quatre cuillerées à café par jour.

À prendre loin des repas.

Prix : Le flacon de 300 grammes : 25 francs.

Produits Biochimiques ROSSO

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e.) (Tél. Dor. : 56-38.)

GAÏARSENAN DUCATTE

Remède de la grippe et de ses complications.

Solution aqueuse de cacodylate de gaïacol chimiquement pur et de strychnine.

Deux formes : Boîte de 12 ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées, — Flacon de 40 dragées de 0 gr. 25 pour médication interne.

Action thérapeutique et usage. — Prescrit dans la grippe et ses complications, dans les formes aiguës (broncho-pulmonaire ; gastro-intestinale ou nerveuse), dans la convalescence même après disparition complète des symptômes généraux (neurasthénie post-grippale).

Posologie et Mode d'emploi :

Ampoules : Une à deux injections sous-cutanées par jour selon la gravité de l'infection.

Dragées : Deux à trois dragées par jour selon le cas.

L'emploi du *Gaïarsenan Ducatte* n'exclut pas les autres médications symptomatiques ni l'observation des règles d'hygiène et de prophylaxie. Les injections pratiquées dans la région fessière avec les précautions d'usage seront faites très lentement, ce qui les rend indolores.

Chez l'enfant au-dessous de quinze ans la grippe se différencie peu d'une bronchite vulgaire.

Prix : 20 fr. 50.

Enreg. au L. N. C. M. n° 240-5 à 240-6.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS. (Tél. Opéra 68-80.)

GALABACTÉINE

La Galabactéine est une culture de bactéries lactiques sélectionnées en milieu protéino-lactosérique.

Forme. — Présentée en tubes scellés de 10 cc.

Indications. — Toutes infections intestinales et autres intoxications d'origine digestive, métrites, vaginites, pansement des plaies.

Mode d'emploi. — 1° Prendre le contenu de 2 tubes, le matin, à jeun, dans une tasse d'eau sucrée ;

2° *Enfants* jusqu'à 3 ans : 1 tube dans de l'eau sucrée par la bouche ou en petit lavement ;

3° En pansement lorsqu'il s'agit d'une infection externe.

Laboratoires LUCINIA

154 bis, rue de Breteuil — MARSEILLE.

(Tél. : Dragon 12-55.)

GALACTOGÈNE CHALVET

Composition. — Extrait stabilisé de graine de Brosme, plante tropicale, contenant la Vitamine F qui agit de façon remarquable sur les glandes mammaires. Véritable catalyseur, il augmente la sécrétion lactée et la qualité nutritive du lait.

Action rapide. — La montée du lait s'effectue souvent dès le lendemain de la 1^{re} absorption et va s'établissant de mieux en mieux, si bien qu'on est parfois obligé de diminuer les doses au bout de quelques jours.

Administration. — Facile, le traitement peut être prolongé sans inconvénient aussi longtemps que devra durer l'allaitement.

Résultats. — Très heureux pour l'enfant, dont il favorise le développement, et pour la mère, qui, grâce à lui, loin de s'affaiblir, se fortifiera en allaitant.

Mode d'emploi. — XV gouttes dans un peu de liquide (eau, lait, café, etc.), 2 à 3 fois par jour aux repas.

Prix du flacon : 18 francs (correspondant à plus de 20 jours d'un usage quotidien).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1408-2.

Laboratoire LATOUR, Pharmacien de 1^{re} classe
AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône).

GALACTOGIL

Extrait titré maltosé phosphaté de Galéga.
Granulé à base d'extrait de malt, extrait de galéga stabilisé, phosphate tricalcique, cumin, fenouil.

Indications :

Allaitement. — Insuffisance lactée. — Montée laiteuse tardive. — Reprise de l'allaitement. — Nourrissons déficients.

Mode d'emploi :

Trois fois par jour, 1 ou 2 cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de tisane et persister à donner le sein avec régularité.

La boîte simple : 16 fr. 50.

La boîte triple : 42 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.

VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILIPPE, Pharmacien de 1^{re} classe.

GALAPHOS

L'allaitement maternel, à condition qu'il soit *riche* et *abondant*, constitue le régime alimentaire par excellence du nourrisson.

Composition :

Mamelline 1 gr. ; Placentine 1 gr. ; Extrait de Galéga 8 gr. ; Cannelle pulvérisée 1 gr. ; Fenouil pulvérisé 1 gr. ; Nucléinate de manganèse 0 gr. 50 ; Hexa-inosito-phosphate de Ca et Mg. 4 gr. ;

Excipient... Q. S. p. 100 grammes.

Mode d'action. — Association opo-phyto-chimiothérapique, le *Galaphos* a une action polyvalente.

Galactogène par les extraits opo et phytothérapiques.

Reminéralisante et reconstituante par la présence des ions P, Ca, Mg et Mn.

Indications. — Insuffisance lactée sous toutes ses formes, déficiences organiques consécutives à la grossesse, la maternité et l'allaitement, Asthénies, etc... Aucune contre-indication.

Posologie. — Trois à quatre cuillerées à café par jour à la fin des repas.

Présentation et Prix :

Granulé : le flacon de 100 grammes : 19 fr. 65; pour 10 à 12 jours de traitement.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1578-1.

Laboratoire du GALAPHOS

P. Wilson-Carli, Pharmacien de 1^{re} Classe.

92, r. Camille-Pelletan, 2, r. d'Amiens — MARSEILLE. (T. : N. 04-09.)

GALFORM LAMBIOTTE FRÈRES

Pastilles à l'Aldéhyde formique.

Propriétés thérapeutiques. — Réalisent l'asepsie du rhino-pharynx sous une forme commode, agréable et inoffensive ; au fur et à mesure qu'elles se dissolvent dans la bouche, leur principe formolé se dégage à l'état naissant, communiquant à la salive ses actives propriétés germicides.

Indications. — 1° Prophylaxie des maladies infectieuses ; 2° Remède curatif des angines, amygdalites, stomatites, rhino-pharyngites, laryngites ; 3° Hygiène de la voix.

Mode d'emploi. — 1 pastille 4 à 5 fois par jour et, au besoin toutes les heures ou 1/2 heures. La laisser fondre lentement dans la bouche.

Prix : 7 fr. 15.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20 rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

GAMBÉOL

Adopté par le Ministère de la Santé Publique.

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable (Proto-Gambier).

Mode d'action. — Agit en se dissociant en mercure métal et oxyde de mercure à l'état colloïdal sans formation de sublimé.

Indications. — Syphilis acquise et héréditaire de l'adulte et de l'enfant à toutes les périodes. Oxyurases. Insuffisances hépatiques.

Formes et posologie :

1° Cachets à 1 cgr., 2 ou 3 chaque jour (10 jours de trait.).
Prix : 24 francs.

2° Cartouches de pommade blanche pour frictions à 50 %.
Prix : 24 francs.

Adultes : 1 chaque jour (8 jours de traitement).

Enfants : Fractions suivant l'âge (15 jours env de trait.

3° Suppositoires adultes à 10 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 24 francs (12 jours de traitement).

Suppositoires enfants à 5 cgr., 1 chaque jour.

Prix : 22 francs (12 jours de traitement).

RÉFÉRENCES : Thèses des Docteurs Dugué, Bouilloux, Rouzaud.

Spécialités Roger BELLON

J. GAUTIER, Pharmacien.

Laboratoire du Gambéol — 42, rue Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

GAMOSTYL

Thérapeutique des maladies Infectieuses par colloïdes hydrophobes.

Indications. — États infectieux, Fièvre typhoïde, Grippe.

Composition. — Or colloïdal, Argent colloïdal, Rhodium colloïdal, Quinine colloïdale.

Posologie. — Injections intramusculaires.

Adultes : 1 collampoule par jour.

États aigus : 2 collampoules par jour.

Enfants : à partir de 5 ans : 1 cc.
de 2 à 5 ans : $\frac{1}{2}$ cc.

Prix : 26 francs la boîte de 6 ampoules.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE
(Seine).

GANDERMA

Pommade renfermant les principes actifs de l'eau d'Alibour associés au principe actif du Gambéol et à l'oxyde de zinc.

Formule:

Protochlorure de mercure léger et dissociable	5 gr.
Sulfate de cuivre anhydre pulv.....	0 gr. 50
Sulfate de zinc pur pulv.....	1 gr.
Oxyde de zinc pur pulv.....	18 gr.
Excipient (Lanoline et Vaseline)....	75 gr. 50

Indications. — Toutes affections et infections cutanées d'origine inflammatoire ou microbienne. Acnés, Dartres, Echantymas, Eczémas, Erythèmes polymorphes, Furoncles, Herpès, **Impétigo**, Intertrigos, Pityriasis, Prurits, Psoriasis, Pyodermites et toutes infections.

Présentation. — En tubes étain imprimés.

Prix : Le tube : 15 francs au public.

Spécialités Roger BELLON

J. GAUTIER, Pharmacien.

Laboratoire du GAMBÉOL — 42, rue Émile-Deschane
Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.
COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.),

GARDÉNAL

Phényl-éthyl-malonylurée.

Hypnotique et sédatif du système nerveux.

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, Etats anxieux, etc. Antispasmodique (méthode des doses réfractées). Angor, migraine, prurits entérocolites, dysménorrhée.

Présentations :

Comprimés à 0 gr. 10 (tubes de 20)	7 fr. 30
— à 0 gr. 05 (tubes de 30)	7 fr. 30
— à 0 gr. 01 (tubes de 80)	6 fr. 25

Doses par 24 heures :

Adultes : 0 gr. 05 à 0 gr. 30.

Enfants : 0 gr. 02 à 0 gr. 10.

Gardénal injectable : ampoules dosées à 0 gr. 04 ou 0 gr. 20 de gardénal (boîtes de 5 ampoules de 1 cc.).

Strychno-gardénal : dragées dosées à gardénal 0 gr. 05. Sulf. de Strychnine 0 gr. 0005 (Fl. de 40 dragées). Dragées dosées à gardénal 0 gr. 10 et sulf. de Strychnine 0 gr. 001 (Fl. de 30 dragées). Thyro-gardénal (ass. de gardénal et d'extrait thyroïdien).

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GARÉPHÉDRINE

Comprimés.

(Anciennement **GARDÉPHÉDRINE**)

Chl. Ephédrine naturelle 3 cgr.

Phényléthylmalonylurée..... 1 cgr.

Action. — L'addition de ce sédatif à très faible dose évite les troubles parfois provoqués par l'éphédrine dans les cas d'asthme nerveux (palpitations, tremblements, insomnies).

Indications. — Spécifique de la crise, Asthme essentiel, Asthme nerveux, Asthme infantile, Emphysème, Asthme rebelle, Accès avec insomnie, Rhume des foins, Etats dyspnéiques, Etats allergiques, Hypotension, Toux spasmodique, Vertige de Ménières.

Posologie. — Un comprimé avant ou au début de la crise. Répéter après une demi-heure si nécessaire.

De 8 à 14 ans : 1/2 comprimé.

De 2 à 8 ans : 1/4 de comprimé.

Voir également : **Diuréphédrine, Ephédrasmine et Bronchasmine**

Échantillons et Littérature sur demande.

Prix : 16 francs le tube de 20 comprimés.

Laboratoires **F. SAUGIER**

DOLE (Jura).

GARGARISME DU MONT-DORE DU D^r SALYS

A base de Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications. — Toutes affections de la bouche et de la gorge.

Propriétés. — Antiseptique buccal très actif, mais non toxique, non caustique, parce que ne coagulant pas les albumines.

Mode d'emploi. — En gargarisme une cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau tiède. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient. Il peut s'employer pur en badigeonnage comme collutoire.

Prix : 10 fr. 70

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

GARGYL

Collutoire, Gargarisme.

Composition. — Guimauve, Mauve, Coca, Salicylate de soude, Résorcine, Phénosalyl, excipient Glycérine.

Propriétés. — Antiseptique, émollient, sédatif.

Indications. — Toutes les affections de la gorge et de la bouche. Amygdalites, Angines, Abscesses, Stomatites, Gingivites.

Mode d'emploi :

Pur. — En badigeonnage comme collutoire, toutes les 3 heures.

Dilué. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie tiède pour gargarismes. De goût très agréable.

Prix : 7 fr. 50.

Durée moyenne de traitement : 2 jours.

Laboratoires R. CHEMINEAU
Docteur en Pharmacie, ancien interne des
Hôpitaux de Paris.
VOUVRAY (Indre-et-Loire). (Tél. : 30.)

GASMANYL

Agent régulateur des Fonctions digestives.

Composition :

Carbonate de chaux	7
Hydrate de magnésie	5
Bicarbonate de soude	3
<i>Génatropine</i>	0,004
Excipient sucré et aromatisé pour 100 grammes.	

Forme. — Granulé.

Indications. — Toutes les insuffisances gastriques.
Stimulant des fonctions digestives. Calmant des douleurs stomacales.

Doses :

1 à 3 cuillerées à café par jour après les repas ou au moment des crises douloureuses.

Prix. — 15 fr. 30.

Enregistré au laboratoire national de Contrôle sous le n° 1107-3.

E. VERDON

Docteur en pharmacie

CELLES-SUR-BELLE (Deux-Sèvres).

(Tél. : 8.)

GASMAR LEGENDRE

(Comprimés dragéifiés à croquer.)

Composition. — A base de ferments digestifs frais, associés aux sels chimiquement purs de sodium (Bourget), de magnésium, de bismuth, et à la noix vomique (amer excito-moteur).

Indications. — Véritable *spécifique-digestif* complet.
Dyspepsies, **gastralgies**, gastrites, insuffisances gastriques, Insomnie gastrique, etc.

Avantages. — Pas de toxicité, ne constipe pas, s'élimine bien. Pas d'accoutumance.

Posologie et mode d'emploi :

Après les repas ou au moment des douleurs.

Adultes : 3 à 10 comprimés par 24 heures.

Enfants : (à partir de 5 ans) demi-dose.

Prix au public : 16 fr. 25 (20 jours de traitement).

Laboratoires LEGENDRE

Section DS — HOUILLES (S.-et-O.).

Dépôt général pour la vente en gros :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1045-3.

GASTÉRYL

Poudre antigastralgique.

Indications. — Aigreurs, Brûlures d'estomac, Névroses digestives, Aérophagie, États préulcéreux, etc.

Formule. — Poudres de ciguë 0 gr. 05, de Belladone 0 gr. 10, de Camomille 0 gr. 10, de Condurango 0 gr. 10, de Romarin 0 gr. 10, Peroxyde de magnésium 5 gr., Gélose, Carbonate de bismuth, Carbonate de chaux, Carbonate de magnésie aa 10 gr., Kaolin colloïdal 30 gr., Excipient aromatisé (vanille). Q. S. p. 100 gr. de poudre.

Doses et emploi. — *Comme pansement de l'estomac* : 1 cuillerée à soupe une demi-heure avant les repas, délayée dans un peu d'eau tiède.

Comme calmant et anti-acide : 1 cuillerée à café au moment des douleurs.

Prix : 20 fr. 80 la boîte de 100 gr.

Enregistré au L. N. C., n° 1676-15.

Laboratoire G. CALMELS

AUTERIVE (Haute-Garonne).

GASTRÉPATINE

Sulfate, citrate, phosphate, bicarbonate de soude, Sels rigoureusement anhydres.

En faisant dissoudre 2 paquets dans une bouteille d'Eau d'Evian, on réalise la solution de Bourget.

Prescrire un verre à bordeaux le matin à jeun.

La solution est d'absorption facile.

Indications. — Insuffisances glandulaires du tube digestif ; prescription courante dans la thérapeutique du foie, de l'estomac, de l'intestin : hyperchlorhydrie, insuffisance hépatique, dyspepsie, entérites, etc. Contribue au traitement des dermatoses et intoxications intestinales.

Prix : 6 francs.

Dépôt O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS.

Laboratoires B. C. L.

M. BERGER

29, faubourg Bourgogne — ORLÉANS.

GASTRHÉMA

Méthode de Castle.

Composition. — Extrait de muqueuse d'antre pylorique de porc (opothérapie gastrique anti-anémique).

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc. rigoureusement dosées, d'une saveur agréable, contenant toutes les hormones de l'organe frais.

Indications. — Toutes les Anémies, Asthénies, Anorexies, Hémorragies, Déficiences organiques, Convalescences, Dyspepsies, Hypochlorhydrie, Hypopepsie, Hémogénie.

Sans contre-indications.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour dans un liquide froid, avant les repas.

La boîte de 8 ampoules : 22 francs.

Admis à l'Assistance publique de Paris.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-1.

Laboratoire du GASTRHÉMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX°).

(Tél. : Roquette 76-24.)

GASTRICINE DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait opothérapique, liquide, de muqueuses fraîches, d'estomacs de porcs et de caillottes de veaux.

Renferme tous les éléments naturels du suc gastrique organique, ses ferments lab. pepsine, et toutes les zymases enlevées à la muqueuse gastrique.

Indications. — Affections organiques de l'estomac. Cas de souffrance de l'organe (insuffisance gastrique par excès ou par défaut). Anémie pernicieuse, anémies en général (méthode de Castle).

Mode d'emploi. — A un 1/2 verre d'eau ajouter 1 cuillerée à café de GASTRICINE.

Prendre une gorgée de temps en temps pendant le repas.

Doses. — 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 20 fr. 15.

Unité de vente : traitement de 8 à 10 jours.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle 146-1.

GASTROBELLONE

Pansement gastrique belladone.

Composition. — Poudre à base de Kaolin, Gélase et extrait de belladone.

Propriétés. — Le *Kaolin*, pansement gastrique par excellence, calme efficacement les douleurs provoquées par l'irritation de la muqueuse stomacale.

La *Belladone* vient ajouter son action bienfaisante sur les spasmes douloureux gastro-intestinaux et la *Gélase*, augmentant le volume du bol fécal, accélère le transit intestinal.

Indications. — *Manifestations douloureuses de l'hyperchlorhydrie* (crampes, brûlures). Coliques. Diarrhées.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café de poudre avec un peu d'eau avant, pendant ou après les repas, selon les indications du médecin.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires ROUSSEAU

Docteur en pharmacie,

49, rue du Château-d'Eau — PARIS (X°).

GASTROCALCINE

**Affections de l'estomac, Dyspepsies,
Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Dilatation
de l'Estomac, Ulcères.**

GASTROCALCINE GRANULÉE

1 cuillerée à café contient environ :	
Carbonate de chaux.....	0 gr. 40
— de magnésie	0 gr. 20
Bicarbonate de soude	0 gr. 20
Sucre anisé, Q. S. pour.....	5 gr.

Par cuillerée à café après les repas et au moment des crises.

Flacon de 40 à 50 cuillerées à café.

GASTROCALCINE BISMUTHÉE

Par dose moyenne (une mesure).

Carbonate de bismuth	2 gr. 50
— de magnésie	0 gr. 30
— de chaux	0 gr. 30
Bicarbonate de soude	0 gr. 25
Kaolin	5 gr.
Bromure de sodium	0 gr. 25
Codéine	0 gr. 005
Extrait de jusquiame	0 gr. 02
Sucre	6 gr.
Essence d'anis Q. S. p. aromatiser.	

Une mesure ou 1/2 mesure selon les cas ou les besoins. 1, 2 ou 3 fois par jour au maximum après les repas ou au moment des douleurs, délayée dans 1/3 ou 1/2 verre d'eau environ.

Laboratoire OBERLIN

**J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,**

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

GASTROCITRINE

Maladies de l'Estomac et de l'Intestin.

Forme. — Granulé fondant, agréablement parfumé au citron.

Composition :

Sulfate de soude	10 p. 100
Phosphate de soude	10 —
Carbonate acide de Sodium	15 —
Citrate Neutre de Sodium	15 —

Indications. — Dans tous les troubles gastro-intestinaux se traduisant par :

- 1° Langue saburale et mauvaise haleine au réveil. Vertiges.
- 2° Somnolence après les repas. Migraines.
- 3° Démangeaisons. Urticaire.
- 4° Alternatives de diarrhée et de constipation.
- 5° Intoxications alimentaires. Congestion du foie.
- 6° Inaptitude au travail.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café bien pleines dans un verre d'eau le matin à jeun, et au besoin dans la journée.

Enfants : 1 cuillerée à café rase.

Nota. — Pour obtenir meilleur effet et bien meilleur goût, il est recommandé de faire dissoudre le granulé dans un verre d'eau.

Durée moyenne du traitement : 10 jours.

Prix de vente au public : 15 francs.

Laboratoire de la **GASTROCITRINE**
LUC-SUR-ORBIEU (Aude). (Tél. : 6.)

GASTROCLEAN

Maladies de l'Estomac, du Foie, des Intestins.

Préconisé par tous les spécialistes de l'estomac, des intestins et du foie.

Gastroclean est le remède spécifique et souverain des Dyspepsies, des Affections gastro-intestinales, de la congestion hépatique et des infections biliaires et auto-intoxications.

Gastroclean neutralise l'hyperacidité gastrique, calme les douleurs stomacales et régularise la digestion.

Dose et mode d'emploi.

(Sans autre indication du Médecin.)

Une à deux cuillerées à café le matin à jeun dans un demi-verre d'eau de Châtel-Guyon.

(Durée du traitement de l'unité 10 à 12 jours.)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Ar. 63-27.
En vente chez tous les Droguistes et Pharmaciens.

Gastro-Entéro PECTINE-GALLIER

Modificateur de la Flore Intestinale par agglutination des microbes pathogènes.

Indications. — Toutes affections gastro-intestinales des nourrissons des enfants et des adultes.

Mode d'action. — Agit à la fois par sa grande capacité de gonflement, d'où action sur le péristaltisme intestinal, son pouvoir agglutinant remarquable vis-à-vis des bactéries de la flore intestinale pathogène, son pouvoir d'adsorption considérable, son action désintoxicante, son action hémostatique.

Forme liquide : Solution colloïdale, visqueuse et inaltérable de Pectine pure de pommes titrée à 8 % de principes pectiques : flacons de 125 cc. et 250 cc.

Forme poudre : légèrement sucrée, titrant 16 % de principes pectiques : boîtes de 60 gr. et 120 gr.

Posologie : Voie buccale — voie rectale.

AGE	PAR DOSE.	
Jusqu'à 2 semaines	1/2 cuillerée à café.	Doses à répéter 3 à 4 fois par jour.
De 2 semaines à 1 mois.....	1 cuillerée à café.	
De 1 mois à 4 mois.....	2 cuillerées à café.	
De 4 mois à un an.....	1 cuillerée à soupe.	
Au-dessus de 1 an.....	1 à 2 cuillerées à soupe.	
Adultes.....	2 à 3 cuillerées à soupe.	

Prix : Forme liquide	Flac. de 125 cc : 18 fr.
	Flac. de 250 cc : 32 fr.
Forme poudre	Bte de 60 gr. : 18 fr.
	Bte de 120 gr. : 32 fr.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e)
(Tél. Suffren 46-57.)

GASTRONALDINE

Estomac, Foie, Intestin.

Forme. — Paquets.

Formule. — Hépatine, Rénine, Gastérine, Belladone, Kaolin, Carbonate de Magnésie, Carbonate de Chaux, Carbonate acide de Sodium.

Produits opothérapiques en milieu alcalin bien dosé.

Indications. — Aérophagie, Hyperchlorhydrie, Hyper-sécrétion gastrique, Pyrosis, Brûlures d'estomac, Troubles gastriques d'origine alimentaire ou nerveuse, Ulcération de l'estomac et du duodénum, Insuffisance motrice de l'estomac, Maux de tête, Insomnie, Congestion du foie et des reins.

Mode d'emploi. — Suivant avis du docteur, 2 à 4 paquets par jour au milieu, à la fin ou entre les repas.

Prix : 15 fr. 90 la boîte de 28 paquets.

La demi-boîte 10 fr. 10.

Laboratoires M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e).

(Tél. Trudaine 54-69.)

GASTRONIGER

Thérapeutique Rationnelle de toutes les lésions de la muqueuse gastro-intestinale.

Composition. — Charbon animal pur, kaolin. Excipient : Q. S.

Indications : 1^o Principales.

a) Les ulcères gastriques et duodénaux.

Le *Gastroniger* ne prétend pas guérir les ulcères relevant de la thérapeutique uniquement chirurgicale : ulcères calleux, ulcères térébrants, ulcères sténosants, mais, dans tous ces cas particuliers, son rôle calmant, anti-acide et désinfectant, le désigne comme traitement pré-opératoire ou post-opératoire (en particulier chez les gastro-entérostomisés hyperacides).

Par contre, dans tous les ulcères relevant du traitement médical, le *Gastroniger* peut amener la guérison et éviter l'intervention chirurgicale.

b) Les duodénites, les douleurs tardives.

c) Les gastrites hyperacides, les brûlures, le pyrosis, les régurgitations

d) Les spasmes pyloriques.

2^o Secondaires. Aérophagie, vomissements.

Infections intestinales, aérocolie, colites, diarrhées, vertiges d'origine digestive. Intoxications.

Posologie. — Sauf indication particulière du médecin traitant, le *Gastroniger* se prescrit de la façon suivante :

1^o — *Affections gastro-duodénales* : un seul paquet délayé dans 1/3 de verre d'eau, pris le plus tard possible (une heure 1/2 au moins) après le repas du soir.

2^o — *Affections intestinales* : même posologie ou prise du paquet en deux fois à la fin ou dans l'intervalle des repas.

Enregistré au I. N. C. M. sous le n^o 1479-2.

La boîte de 10 sachets : Prix : 17 fr. 40.

Laboratoire L. COUVERT, Pharmacien de 1^{re} classe
11, rue de Mogador, Paris (IX^e) (Tri. 22-01.)

GASTROPANSEMENT

du D^r ZIZINE

Pansement polyvalent à base de charbon activé, réalisant la protection intégrale de la muqueuse gastrique.

Forme. — Paquets.

Composition. — Charbon polyvalent activé, très adhésif et d'un grand pouvoir d'adsorption, Kaolin purifié, Carbonate de bismuth, Carbonate de magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement des ulcères gastriques et des gastropathies douloureuses.

Indications. — Hyperchlorhydrie.
Gastrites.
Spasmes du pylore.
Atonie gastrique.
Dyspepsies réflexes.
Ulcères.

Posologie. — Prendre le matin à jeun, et au besoin le soir, le contenu d'un paquet délayé dans un peu d'eau.

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie, Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

GASTROPATHYL

Médication alcalino-bismuthée spécifique de
toutes les Gastropathies

Forme : Granulé soluble aromatisé à l'anis.

Composition :

Carbonate de Bismuth.....	2 gr. 50
Carbonate de Chaux	15 gr.
Carbonate de Magnésie.	10 gr.
Carbonate acide de Sodium.....	7 gr. 50
Excipient	q. s. p. 100 gr.

Propriétés thérapeutiques : Le Gastropathyl est le spécifique le plus efficace de toutes les gastropathies douloureuses. Il combat l'acidité et régularise les fonctions digestives. Ne contenant aucun toxique, il est absolument inoffensif et il ne constipe pas. De plus l'adjonction de certains éléments neutres (carbonates de bismuth, de chaux, de magnésie) en fait un véritable pansement de la muqueuse gastrique.

Indications. — Digestions pénibles, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Pyrosis, Gastrites (états préulcéreux) et toutes gastralgies.

Posologie. — Une à deux cuillerées à café après les repas, à renouveler au moment des crises douloureuses. (Croquer ou délayer dans un peu d'eau.)

Prix : La boîte, 21 fr. (Toutes Pharmacies.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments
sous le n° 1907-2

Les Laboratoires « MÉDICIA »

7, Impasse de la Sous-Préfecture, 7. — ROANNE (Loire).

GASTROPEPTYL

Formes pharmaceutiques. — 1° Granulé ; 2° Comprimés. (150 gr. granulé environ ou 50 comprimés.)

Composition. — Peroxyde de magnésie, Carbonate de magnésie, Carbonate de calcium, Deuto-carbonate de soude (saturants formule Robin), Papaine et Diastase (ferments végétaux).

Propriétés et avantages. — Calme les douleurs gastriques et facilite la digestion. Il neutralise les acides de fermentation et agit en même temps sur la musculature gastrique en amorçant l'action des glandes stomacales.

Indications. — Dyspepsies gastriques et duodénales, pesanteurs, acidités, brûlures, aigreurs.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café de granulé ou 3 comprimés avant, pendant ou après le repas, dans un peu d'eau, mais de préférence après les repas.

Prescription. — 1 boîte granulé ou 1 boîte comprimés Gastropeptyl.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

GASTRO-SÉDATIF-ATCIA

Formule :

Citrate de soude	6,57
Bicarbonate de soude.....	6,57
Carbonate de chaux	26,28
Carbonate de magnésie.....	26,28
Hexaméthylènetétramine.....	0,85
Phényléthylmalonylurée.....	0,34
Essence de menthe	0,21
Sucre Q. S. p.....	100 gr.

Le *Gastro-Sédatif-Atcia* se prend à dose d'une, au besoin deux cuillerées à café, délayées dans un quart de verre d'eau, après chacun des deux principaux repas. En cas de troubles persistants, cette dose peut être renouvelée à tout moment du jour et de la nuit.

Indications. — Toutes affections stomacales : Ulcérations stomacales, Gastralgies, Gastrites, Hyperacidité, Fermentations, Dyspepsie nerveuse, Dyspepsie hypersthénique, Hyperchlorhydrie, Troubles du sympathique d'origine gastro-hépatique :

a. Palpitations, Arythmies.

b. Douleurs avec lenteurs digestives.

c. Anxiété d'origine digestive, Insomnies.

Prix : 15 fr. 30.

Laboratoires COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

GASTROSEDYL

Composition :

Teinture de belladone stabilisée Dausse...	46 gr.
Teinture de jusquiame stabilisée Dausse ..	20 —
Liqueur ammoniacale anisée.....	20 —
Bromure de sodium	13 —
Phosphate de codéine.....	1 —

Pour 100 grammes.

Indications. — Hypersécrétion-Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Ulcères.

Posologie. — X à XL gouttes dans un peu d'eau sucrée après les repas et au moment des brûlures.

Dose. — XL gouttes correspondent à 1/10 de mgr. d'Atropine, à 1 cgr. de Phosphate de codéine et à 10 cgr. de NaBr.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1877-2.

Laboratoires J. LANDRIER

COULANGES-SUR-YONNE (Yonne).

GASTRO-SODINE

Composition : par cuiller à café.

	Normale.	B. Bromurée.	C. Citratée.	S. Sulfatée.
Bic. de soude sursaturé	0,80	0,80	0,80	0,20
Phosphate de soude.	0,40	0,40	0,40	0,40
Sulfate de soude..	0,20	0,20	0,20	0,80
Bromure de Sodium.		0,20		
Citrate de soude...			0,40	
Sels desséchés chimiquement purs.				

Propriétés et indications. — Gastro-entérites simples, gastro-entérites neuro-arthritiques, gastro-entérohépatites, Troubles circulatoires, Hypertension, Viscosité sanguine.

Forme. — Granulé.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuiller à café le matin dans un verre d'eau de préférence chaude.
Dose supplémentaire sur avis du médecin.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e). — (Tél. : Ségur 69-13.)

GASTROZYMASE

Composition. — Ferments gastriques naturels.

Indications. — En plus du pouvoir de substitution utilisable en cas d'hypo-pepsie ou d'apepsie, le système des ferments gastriques (zymases), rassemblés dans la GASTROZYMASE, a la propriété de stimuler les fonctions digestives déficientes et de les régulariser, défendant ainsi l'intestin contre l'envahissement des germes ou toxines pathogènes. Les troubles gastriques, qu'ils proviennent d'hypo- ou d'hyperchlorhydrie, d'hypo ou d'hyperpepsie.

Forme. — Comprimés effervescents.

Posologie. — Comme médicament de substitution ou régulateur gastrique : 2 à 3 comprimés dissous dans l'eau au milieu du repas.

Comme stimulant gastrique : 1 à 2 comprimés dissous dans l'eau, 1 heure avant chaque repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

GATRAN

Composition. — Le GATRAN désigne soit un *Savon* liquide médicamenteux, soit un *Baume* soluble dans l'eau, à base de Goudron de Norvège et de Ricinoléate de soude.

Le *Savon* Cadique et le *Baume* Cadique contiennent en plus de l'Huile de Cade.

Indications. — Pityriasis simplex, Eczéma séborrhéique, Séborrhée, Calvitie séborrhéique.

Desquamations pelliculaires, Psoriasis, Acné Séborrhée huileuse de la poitrine et du dos.

Mode d'emploi. — En principe, applications chaque soir sur le cuir chevelu de *Baume*; le matin, lavage au *Savon*.

Le savonnage quotidien au GATRAN est recommandé, à titre préventif contre toutes les affections séborrhéiques.

Présentation. — *Baume* : flacon de 90 cc.

Savon : flacon de 500 cc.

Prix de vente :

Le flacon de *Baume* GATRAN : 18 fr. 25.

Le flacon de *Savon* GATRAN : 30 francs.

L. N. C. n° 463-12.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND
14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt : **Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND**
54, Chaussée-d'Antin — PARIS

GAUROL

**Nouveau sel phosphoré, calcique et magnésien
entièrement assimilable.**

Présentation. — 3 Formes: Ampoules injectables de
1 cc. — Comprimés. — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique général de
l'organisme. — Reminéralisateur. — Recalcifiant.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anémie,
Convalescence, Croissance, Tuberculose, Grossesse,
Allaitement, Affections dentaires, Rachitisme,
Troubles de l'ossification, Lymphatisme, Consoli-
dation des fractures.

Mode d'emploi. — 1 ampoule injectable par jour ;
1 à 3 comprimés par jour ; 1 à 3 cuillerées à café de
granulé par jour.

Enr. L. N. C. M. n^{os} 43-1 à 43-3.

GAUROL INTRAVEINEUX

Présentation. — Ampoules de 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique
puissant, Recalcifiant, Reminéralisant.

N'est pas caustique comme le Chlorure de Calcium.

Indications thérapeutiques.

En Médecine :

Hémorragies et Anémies qui en résultent.

Epanchements des séreuses.

Tuberculose pulmonaire (Traitement symptoma-
tique de l'asthénie, de l'anorexie, de l'amaigris-
sement).

En Chirurgie :

Hémorragies : à titre curatif et à titre préventif.
Consolidation des fractures.

Tuberculoses osseuses ou articulaires.

Mode d'emploi. — 1 ampoule tous les 2 jours. In-
jecter 10 cc. en cas d'urgence.

Enr. L. N. C. M. n^o 43-7.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUQ

30, rue Armand-Silvestre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

GELIDERM

Toutes les affections de l'épiderme.
Composition :

Acide salicylique	} aa 1 gr.
Résorcine	
Chloral	
Acide phénique	

Excipient liquide spécial pour 100 grammes.

Forme : Liquide.

Indications. — Usage externe ; Eczema, Impétigo, Herpès, Pityriasis, Affections parasitaires, Piqûres d'insectes, etc.

Mode d'emploi :

3 applications par 24 heures avec un tampon de gaze.

Prix. — 16 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1311-1.

Laboratoire GELIA

16, rue Saint-Yon — La ROCHELLE.

(Tél. : n° 2265.)

GÉLOBARINE

Sulfate de baryum crémeux.

Préparation dénuée de toute action irritante ou toxique, très opaque, de bonne conservation.

Exploration radiologique du tube digestif.

Mode d'emploi. — Le contenu d'un flacon (200 gr.) constitue la dose habituelle pour un repas ou un lavement opaque. La Gélobarine peut s'employer pure ou incorporée à un excipient (chocolat par exemple).

Prix de vente du flacon de 200 g. : 10 fr. 60.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GÉLOGASTRINE LICARDY

Granulé ou tablettes.

A base de Gélose, Gélatine et Kaolin purifié.

Réalisation pratique de la thérapeutique par le pansement gastrique à l'exclusion de tous narcotiques, alcalins ou astringents.

Posologie. — *Traitement des douleurs de l'estomac :* 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, au moment des crises douloureuses et à n'importe quelle heure de la journée.

Traitement de l'Hyperchlorhydrie et de l'Ulcère gastrique : 1/2 cuillerée à soupe de granulé, ou 2 tablettes, le matin à jeun, le soir avant de se coucher et 1/2 heure avant chacun des principaux repas.

Prix : 19 fr. 10.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s.-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

GÉLOK

Tablettes.

Pansement gastrique complet (absorbant, protecteur, neutralisant) :

Formule :

Gélose.....	0,10
Grénétine	0,10
Magnésie hydratée	0,25
Kaolin purifié colloïdal.....	0,25
— Excipient menthé, Q. S. p. 1 tablette de 3 grammes équivalant à une cuillerée à café de poudre.	

Tablettes Gélok belladonnées même formule + V gouttes de teinture de belladone par tablette.

Présentation. — En étuis de poche de 11 tablettes ;
4 étuis de gélok simple ;
1 étui de gélok belladonné ;
par boîte : 17 francs.

C'est le parfait

**traitement ambulatoire
des hyperchlorhydriques.
Laboratoire LEURQUIN
DREUX**

GÉLOTANIN CHOAY

Nature. — Tannate de gélatine.

Poudre blanche, inodore, insipide, insoluble dans l'estomac, dissociable dans l'intestin en ses éléments antidiarrhéiques : tanin et gélatine.

Indications. — Toutes diarrhées non infectieuses. Aucune contre-indication.

Formes pharmaceutiques et posologie :

- 1° Pour *nourrissons et jeunes enfants* : Paquets de 25 cgr. : 1/2 à 3 paquets par jour en suspension dans du lait ou tout autre liquide tiède, mais non pas chaud.
- 2° Pour *adultes* : Cachets dosés à 50 cgr. : 4 à 8 par jour.

Boîte de 20 paquets.

Boîte de 24 cachets.

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

GÉLOTUBE 29

Le **GÉLOTUBE 29** contient la pommade prophylactique antivénérienne au cyanure de mercure suivant la formule du D^r GAUDUCHEAU.

Cyanure de mercure.....	0 gr. 125
Thymol	1 gr. 250
Calomel	25 gr.
Lanoline	50 gr.
Vaseline et huile de vaseline.....	24 gr.

Cette pommade est destinée à préserver de la Syphilis et de la Blennorrhagie l'homme qui vient de s'y exposer. Elle est logée dans un petit tube pointu à paroi de gélatine, renfermant une dose et permettant d'introduire une partie du contenu à l'entrée de l'urètre et de distribuer le reste sur les muqueuses externes.

Le **GÉLOTUBE 29** est accompagné d'un mode d'emploi rédigé par le D^r GAUDUCHEAU donnant tous les détails utiles pour accomplir correctement cette mesure d'hygiène. (Voir *Revue d'hygiène*, de 1919 à 1933.)

Prix : Boîte de 6 : 11 fr. 75.

Laboratoire du GÉLOTUBE 29

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

GELS GASTRIQUES BEAUFILS

Pansement adsorbant du tube digestif
(Enregistré au Laboratoire de contrôle : 1950-1)

Composition. — Association à la classique gélose-gélatine de Gels siliciques et silico-aluminiques colloïdaux (polysilicates colloïdaux) à haut pouvoir recouvrant et adsorbant. 12 sachets de 8 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Grande *capacité de recouvrement* pour les muqueuses, et grand *pouvoir adsorbant* (action physico-chimique) vis-à-vis des acides minéraux et organiques de fermentation, des toxines, etc.

Indications. — Inflammations et ulcérations des muqueuses digestives. (Ulcères, érosions intestinales, Gastrites, entérites, colites). Hyperchlorhydrie, hyperacidités. Fermentations, putréfactions.

Mode d'emploi. — 1 paquet de Gels gastriques dans un demi-verre d'eau chaude ou une demi-tasse d'infusion chaude au gré du malade.

Prix au public. — 21 fr.

Laboratoires des GELS MÉDICAUX

Jean BEAUFILS, Pharmacien

Ex-interne, médaille d'or des hôpitaux de Paris, Licencié ès-sciences.
8, quai du Châtelet. — ORLEANS
(Tél. : 44-13.)

GÉNACIDE

Composition. — Granulé acigène contenant pour 100 gr. :

Phosphate bi-ammonique 12 gr. 75

Chlorure ammonique 5 gr.

Ac. phosphorique officinal.... 1 gr. 35

Cinq grammes représentant comme coefficient d'acidité en $\frac{N}{10}$ 150 cc.

Indications. — Alcalose (détectée par le *Papier Réactif Génacide* donnant le pH). Colibacillose, Asthénie.

Forme. — Granulé.

Dose. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e)

(Tél. : Suf. 36-59.)

GÉNATROPINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Dyspepsie hyperacide. Douleurs intestinales. Sueurs des tuberculeux, Entérite muco-membraneuse.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.
Granules au 1/2 mgr. Ampoules à 2 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour ou quatre à dix granules par jour. Dose injectable de deux à six milligrammes.

Le flacon ou la boîte : 21 fr. 40.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNÉCARMINE

Association de Phényléthylmalonylurée. Formine. Eséridine salicylate. Charbon animal et végétal.

Formule. — 1 cuillerée à café de granulé contient : Phényléthylmalonylurée 0 gr. 02, Salicylate Eséridine 0 gr. 001, Charbon animal 0 gr. 50, Charbon végétal 1 gr., Formine 0 gr. 15.

Présentation. — Granulé fondant. Cachets. Dragées.

Indications. — *Troubles digestifs sympathicotoniques.* Entéro-colites, atonie gastro-intestinale, constipation chronique par atonie et leurs conséquences.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café ou cachets avant les repas.

Prix : Boîte modèle courant : 17 fr. 70. (Durée moyenne : 7 jours.) — Flacon Cure : 41 fr. 60.

Laboratoire R. THIRODE

Pharmacien de 1^{re} classe

de la Faculté de Nancy,

Ex-Préparateur et Lauréat de Chimie,

33, Grande-Rue — BESANÇON

(Tél. : 30-37.)

GÉNÉSÉRINE

Polonovski et Nitzberg
Salicylate de Gènesérine.

Formes. — Granules et dragées au 1/2 mgr. Gouttes (Solution au millième). Ampoules à 2 mgr.

Indications. — Traitement du syndrome solaire et en particulier des dyspepsies hypochlorhydriques nerveuses. Excitant des sécrétions et de la motilité du tube digestif. Spécifique des troubles sympathiques.

Mode d'emploi. — La dose moyenne est de quatre à six dragées ou granules par jour. Si l'on prescrit les gouttes, on en donnera XX avant chaque repas, LX par jour. Les injections sous-cutanées sont surtout indiquées dans les cas de crises douloureuses intenses contre l'angoisse et l'insomnie persistante des dyspeptiques.

Injecter une ampoule tous les jours pendant les cinq premiers jours, puis une ampoule tous les deux jours.

Le flacon ou la boîte. Prix au public : 21 fr. 40

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

LABORATOIRE AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GENHYOSCYAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Etats spasmodiques en pathologie digestive. Chorée. Tremblement mercuriel et de causes diverses. Delirium tremens. Sueur des tuberculeux.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 milligr.
Granules au 1/2 milligr. Ampoules à 2 milligr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à six granules par jour, ou injecter une ampoule par jour.

Prix au public : le flacon ou la boîte,
21 fr. 40.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien
4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOMORPHINE

Polonovski et Nitzberg.

Formes. — Comprimés dosés à 2 centigrammes. Ampoules à 4 et à 10 centigrammes.

Indications:

La douleur : Coliques hépatiques, coliques néphrétiques, douleur des cancéreux, crise gastrique du tabès, douleurs de l'ulcère et de l'entéro-colite, angine de poitrine, fractures, douleurs post-opératoires, migraines, névralgies, Dyspnée, asthme, anxiété, angoisse, agitations, délire, insomnies, cure de démorphinisation.

Mode d'emploi. — 4 centigrammes de Génomorphine correspondent à 1 centigramme de morphine.

Comprimés : 2 à 4 par jour. — **Ampoules :** 1 à 2 par jour.

Prix : La boîte de 7 ampoules de 4 cgr., 28 fr. 05.

Le flacon de 15 comprimés de 2 cgr., 28 fr. 05.

La boîte de 12 ampoules de 10 cgr. pour cure de démorphinisation, 102 francs.

Chaque unité grand modèle correspond à un traitement de 7 à 10 jours, à dose journalière maximum.

Laboratoire des Produits Amido

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65).

GÉNOSCOPOLAMINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications.

ÉTATS PARKINSONIENS, Paralysie agitante, Syndromes post-encéphalitiques, Anesthésie chirurgicale.

Formes. — Gouttes : XX gouttes = 1 mgr.

Granules au 1/2 mgr.

Ampoules dosées à 3 mgr. et à 1 mgr.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes 2 fois par jour. Quatre à 10 granules par jour. Anesthésie chirurgicale : 4 granules la veille de l'opération.

Trois quarts d'heure avant l'opération, 1 ampoule de Génoscopolamine à 3 mgr. suivie de l'injection de 1 cgr. 1/2 de morphine.

Prix au public : Le flacon : 26 fr. 50.

La boîte d'ampoules : 34 fr. 70.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTHÉNIQUES

Ampoules, Granules. Gouttes.

Cacodylate de Génomstrychnine et de Gènesérine
Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Asthénies, Dépression nerveuse, Neurasthénie, Psychasthénie, Surmenage intellectuel, Asthénie intellectuelle et physique des vieillards, Convalescence des maladies graves, Asthénie cardiovasculaire des infections, Asthénie de la croissance, de la grossesse, de la lactation, des anémiés.

Formes. — Ampoules de 2 cc. Granules. Gouttes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes ou 2 ou 3 granules aux trois principaux repas.

Ampoules. — Injecter une ampoule tous les jours pendant dix jours.

Prix au public : 23 fr. 95.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges. — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉNOSTRYCHNINE

Polonovski et Nitzberg.

Indications. — Système nerveux, Paralysies diphtériques, Paralysies bulbaires, Cœur et circulation, Alcoolisme, Asthénie, Neurasthénie, Affections oculaires.

Formes. — *Gouttes* : XXX gouttes = 5 milligr.
Granules à 0 gr. 002. *Ampoules* à 0,01.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes deux fois par jour. Quatre à dix granules par jour.

Dose injectable : une ampoule par jour.

Le flacon ou la boîte : 18 fr. 60.

Chaque unité correspond à 10 jours de traitement à dose journalière maximum.

Laboratoire AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 41-65.)

GÉO-BARYUM

Sulfate de Baryte précipité pour examens radiologiques.

POUDRE, PÂTE, EMULSION

Le *GÉO-BARYUM POUDRE* est d'une conservation indéfinie sans risques d'altération ; il donne une émulsion homogène et stable et d'une opacité parfaite.

Prix de vente :

Poudre.	Boîte de 150 gr.	La boîte	10 fr.
—	—	200 gr.....	11 —
—	—	400 gr	17 —
Pâte.	Flacon de 200 gr.	Le flacon.....	10 —
—	—	400 gr	12 —
Emulsion.	Flacon de 400 gr.	Le flacon.....	12 —

Pour Hôpitaux, etc., présentation en boîtes, flacons ou pots de grès de contenances plus grandes et à des prix spéciaux.

Etabliss^{ts} GÉO GIGNOUX S. A.

Usine et bureaux à SAVIGNY-SUR-ORGE (S.-et-O.).
(Tél. : Savigny 5.)

GERMALPE

Médicament Aliment Vitamines.

A. B. E. P. Naturelles.

Teneur élevée en phosphore et en magnésium métal.
Germalpe est tiré exclusivement du bon blé des Alpes.

Se méfier des contrefaçons.

Avis important. — **Ne pas faire cuire.**

Tous les cas de déficience organique. Troubles du métabolisme calcique-magnésien. Toutes les dépressions. Neurasthénie, Anémies diverses, Amaigrissement suspect, Faiblesse musculaire, Asthénies, Convalescences, Epuisement nerveux, Allaitement, Surmenage, Excès, Xérophthalmie, Rachitisme, Tuberculose.

Action directe, efficacité contrôlable en quelques jours.

Germalpe se prend 2 fois par jour délayé dans un peu de liquide.

Du huitième mois au sevrage..... 1 gr. par biberon

Du sevrage à deux ans..... 2 gr. par biberon

De 2 ans à 10 ans..... 1 cuillerée à café

deux fois par jour.

Section de Thérapie végétale

Laboratoire BONNET

à LARAGNE (Hautes-Alpes).

GERMIDOR

Germe de blé pur, stabilisé.

Composition :

Vitamines : A (de développement, anti-infectieuse).
B¹, B², B³ (antinévritique, d'utilisation nutritive et cellulaire).

E (de reproduction).

P (d'intégrité dermique).

Phosphates calco-magnésiens directement assimilables, - fer, cuivre, lécithines.

Propriétés. — Facteur de stimulation physiologique générale, récalcifiant, neurotonique, laxatif.

Indications. — Tous les cas où il faut relever l'état général de façon atoxique : carences vitaminiques graves ou frustes, précarences, déficiences organiques, troubles de la croissance, asthénie, surmenage physique et intellectuel, convalescences, notamment à la suite des maladies infectieuses, états pré-tuberculeux et tuberculeux, adénopathies, grossesse, allaitement. Certains troubles des fonctions digestives, constipation (action laxative sans accoutumance), anorexie, colites.

Germidor doit être administré au cours des régimes alimentaires trop stricts (colitiques, hépatiques, cardio-rénaux) ; chez les diabétiques, *Germidor* augmente la tolérance aux hydrates de carbone.

Posologie :

a) *Germidor* entier.

Enfants : 1 cuillerée à café à 1 cuillerée à dessert 2 fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à soupe 1 à 2 fois par jour.

b) *Germidor* pulvérisé. (Chaque boîte contient une mesure pour 1/2 gramme.)

Du 6^e mois au sevrage : 1/2 gramme par biberon 3 à 4 fois par jour.

Enfants : 2 gr. (1/2 cuillerée à café) à 4 gr. (1 cuillerée à café) 2 fois par jour.

Adultes : 1 cuillerée à dessert (6 gr.) 1 à 2 fois par jour.

Germidor « pulvérisé » convient seul aux nourrissons. Il a l'avantage, pour tous, de disparaître mieux que « l'entier » dans boissons et aliments auxquels il est incorporé.

Germidor se mélange simplement aux aliments ou boissons sans cuisson.

Prix :

Germidor entier :

19 francs la boîte P. M. (250 grammes environ).

40 francs la boîte G. M. (1 kg. environ) familiale.

Germidor pulvérisé :

12 francs la boîte B. B., essais et nourrissons (125 gr. environ).

19 francs la boîte P. M. (250 grammes environ).

40 francs la boîte G. M. (1 kilo environ) familiale.

Toutes pharmacies.

Enregistré au L. N. C.

Laboratoires du GERMIDOR

GRASSE (Alpes-Maritimes).

GERMINOL

Présentation. — Pastilles en étuis métal (17 fr. 85).

Principes actifs. — Inositolphosphate de chaux et de magnésie, phosphate de manganèse, protoxalate de fer, huile de foie de morue concentrée.

Indications. — Anémies de toutes origines, Retard de croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Amaigrissement, Dépression nerveuse.

Mode d'emploi. — a. *Enfants* : 3 pastilles par jour absorbées dans une gorgée d'eau, ou dans de la confiture, du miel, de la marmelade ou dans le potage.

b. *Adultes* : 6 pastilles par jour absorbées comme ci-dessus.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-46.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV°).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

GERMOLYSINE

Alcoolature aromatisée d'*Allium Sativum* obtenue par procédé spécial.

Indications. — Toutes les affections microbiennes, et particulièrement les affections *staphylococciques* et *streptococciques*, spécifique par excellence de la *Furonculose*.

Posologie. — Comme *bactéricide* :

Enfants : jusqu'à 7 ans, V à XV gouttes trois fois par jour.

Enfants : de plus de 7 ans, XX gouttes trois fois par jour.

Adultes : XX à XXX gouttes trois fois par jour, dans un peu de lait ou d'eau, au milieu des repas.

Traitement. — 1 à 2 flacons, suivant les cas.

Contenance. — 30 cc. Durée : 20 jours environ.

Prix public : 16 fr. 80.

L. N. C., n° 1157-1.

Envoi littérature détaillée et échantillon sur demande.

Laboratoire R. BEURTON

10 et 12, boulevard de la Villette — PARIS (XIX°).
(Tél. : Nord 75-61.)

GERMOSE

Gouttes à base de Fluoroforme stabilisé dans des extraits végétaux.
Non toxique. Goût agréable.

Indications. — Employée contre la Coqueluche, dont elle arrête très rapidement l'évolution et évite les complications si graves.

Calme rapidement la Toux (sans en excepter la Toux sèche émetisante des tuberculeux), la Toux spasmodique, quinteuse, les crises d'asthme, les Toux opiniâtres.

Hâte la guérison des affections des voies respiratoires : Bronchites, Trachéo-Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Gripes pulmonaires, etc.

Propriétés. — Microbicide, antiseptique des voies respiratoires, puissant antispasmodique, sédatif. Non toxique. Sans action nuisible sur le tube digestif, ce qui en facilite l'emploi même chez les nourrissons.

Forme. — Gouttes concentrées : 1 gr. (XLVI gouttes) contient 1/10 de centimètre cube de fluoroforme stabilisé.

Doses habituelles dans les 24 heures : jusqu'à 1 an, 4 fois X gouttes ; de 1 à 3 ans, 4 et 6 fois XV gouttes ; de 3 à 12 ans, 4 et 6 fois XXX gouttes ; au-dessus, 4 et 6 fois XL gouttes.

Aucune contre-indication.

Prix : 13 fr. 50.

Laboratoires **LEBEAULT**

BESINS et C^{ie}, Pharmaciens

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

GESTORMONE

Hormone synthétique du corps jaune.

Indications. — Avortements à répétition, Certaines stérilités, Dysménorrhées, Ménorragies, Troubles de la ménopause.

Présentation. — Solution huileuse dosée à 5 ou 10 mgr. par cc.

Boîtes de 3 ampoules de 5 mgr. **Prix : 76 fr. 50.**

Boîtes de 3 ampoules de 10 mgr. **Prix : 137 fr. 70.**

Posologie. — En général, faire les injections dans la deuxième moitié de la période intermenstruelle. Les doses à employer varient selon les cas de 5 à 10 mgr. par jour.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires.

GESTORAL : comprimés actifs par voie buccale.

Tube de 10 comprimés de 5 mgr. ; 40 francs.

de 25 comprimés de 5 mgr. ; 85 francs.

de 50 comprimés de 5 mgr. ; 150 francs.

de 25 comprimés de 10 mgrs. **Prix : 150 francs.**

Posologie. — De 2 à 40 mgr. par jour.

Laboratoire pour la Diffusion des Produits synthétiques,

Léonce **GODEAU**, Pharmacien,

73, rue Dutot — PARIS (XV^e).

GLANDEX PHOSCALCIQUE

Forme. — Granulé.

Formule. — Ergostérine irradiée, Parathyroïdine, Thymusine, Splénine, Hépatine, Surrénine, Gluconate de Chaux, Poudre d'os frais, Moelle osseuse, Acide anhydroxyméthylène diphosphorique (sel phospho-organique).

Indications. — Surmenage, Faiblesse générale, Neurasthénie, Déminéralisation, Prétuberculose, Carence calcique.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.
Enfants : 2 cuillerées à café.

Prix : 21 fr. 20.

Autres GLANDEX :

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Glandex Orchitique, Thyro-Ovarien.
Ovarien, Pluriglandulaire M. et F.,
Thyroïdien, Entéroglandex.

Laboratoires M. A. ROUX

58, rue de Maubeuge — PARIS.
(Tél. : Trudaine 54-69.)

GLANDIMBINE LAFRAN

Indications. — Impuissance génitale précoce ou sénile. Dépression morale ou physique.

Composition. — Yohimbine, 0,005 ; Cérébrine, 0,10 ; Orchitine, 0,15 pour un comprimé dragéifié.

Posologie. — (Pour adultes seulement).
Un comprimé le matin, un à midi, un le soir au repas et un au coucher, si nécessaire.
Avaler avec un peu d'eau ou autre liquide.

Littérature et échantillons aux docteurs seulement.

Prix : 30 francs.

Laboratoires LAFRAN

8, rue de Prague — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 36-78.)

GLANDOCALCYL

Récalcifiant. — Réminéralisateur.

Composition. — Surrénales, fluorure et formiate calciques, carbonate et phosphoglycérate de chaux et de manganèse, diphosphate tricalcique et poudre d'os frais.

Indications. — Débilité, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, rachitisme, troubles de la croissance, carie dentaire, fractures, maladies des os, lymphatisme, adénites, hérédité et pré-tuberculose.

Formes. — Pour *adultes* : cachets ; pour *enfants* : granulé.

Doses. — 2 ou 3 cachets par jour aux repas. 1 ou 2 cuillerées à café deux fois par jour suivant l'âge de l'enfant. Faire dissoudre dans un peu d'eau ou mieux le croquer comme un bonbon.

Prix : *Cachets*. 15 fr. 60 : *Granulé*. 17 fr. 20

Enreg. au L. N. C. M. sous les n^{os} 219-4 et 219-5.

Laboratoire Moderne
d'Opothérapie et Biologie médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

GLÉFINA

Puissant reconstituant général de **savoir agréable**.
Parfaitement toléré et assimilé *en toutes saisons*.

Composition. — A base d'extrait d'huile de foie de morue, d'extrait de malt et d'hypophosphites associés.

Propriétés. — Reconstituant énergique et d'action durable, remplace l'huile de foie de morue dans toutes ses indications.

Est parfaitement digéré, toléré et assimilé l'été comme l'hiver.

Indications. — Toutes déficiences légères ou profondes, anémies, lymphatisme, tuberculose et pré-tuberculose, convalescences post-opératoires, post-gravidiques, etc...

Posologie :

Enfants : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.
6 à 10 — : 2 à 3 — à dessert —
11 à 15 — : 2 — à soupe —

Adultes : 3 — — —

Gléfina est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 689-4.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLÉFINA,
348, rue Saint-Honoré — PARIS.

GLÉSOL

**Médication Antistaphylococcique
Complexe colloïdal organo-métallique.**

Description. — Capsules glutinisées contenant :
Étain colloïdal, Levurine extractive, Soufre colloïdal,
Ferments lactiques.

En flacon de 50 capsules.

Action thérapeutique. — L'*étain colloïdal* est un puissant antistaphylococcique, très bien toléré ; la *levurine extractive* agit comme anti-infectieux polyvalent et par les Vitamines B antiglycémiques ; le *soufre colloïdal* modifie les réactions cutanées et renforce l'action de l'étain ; les *ferments lactiques* s'opposent aux fermentations putrides.

Indications. — Furoncles, anthrax, abcès, phlegmons, acné, folliculite, orgelets, sycosis, et toutes les affections dues aux staphylocoques.

Doses :

Adultes : 8 à 12 capsules par jour, et doses doubles si nécessaire.

Enfants : Doses proportionnelles selon l'âge.

Prix : 28 fr. 60 pour 3 à 7 jours de traitement.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

GLOBEXINE

Conception nouvelle de l'opothérapie hématique spécifique. Extrait aqueux total du globule sanguin privé de ses albumines, directement et complètement assimilable.

Jamais d'anaphylaxie.

Propriétés thérapeutiques. — Régénération globulaire intensive.

Indications. — Anémies, croissance, grossesse, états infectieux, hémorragies de toute nature. Convalescences.

Forme. — Ampoules buvables 10 cc. et sirop à l'orange.

Dose moyenne :

Doses et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules ou cuillères à dessert de sirop par jour. — *Enfants :* 1/2 dose.
Prix de la boîte de 10 ampoules de 10 cc. ou du flacon de 210 cc. de sirop : 18 fr. 50.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien
21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

GLOBALOFER « ROCHE »

Composition. — Chaque comprimé contient :

ℓ-Tryptophane	2 mg. 50
Monochlorhydrate de ℓ-histidine.....	5 mg. 00
Globine	16 mg. 00
Globine ferrique	66 mg. 00
Globine cuprique	3 mg. 30
Globine manganique	6 mg. 60
Excipient : Q. S. pour un comprimé de 15 centigr.	

Action. — Thérapeutique équilibrée et totale de l'anémie, représente une *véritable révolution hématologique*, car, pour la première fois, l'hématopoïèse est, grâce à lui, placée sur son véritable terrain : celui du métabolisme (travaux des prof. Fontès et Thivolle).

Indications thérapeutiques. — Toutes les anémies par spoliation sanguine, par hémolyse, par carence martiale. Anémie du paludisme, des infections, des parasitoses intestinales. Anémie du nourrisson, du donneur de sang, etc. *Toutes les indications du fer* (chlorose, puberté, grossesse, allaitement, diarrhées chroniques, etc.): *Toutes les indications de l'acidaminothérapie* (inappétence, maigreur, déficiences organiques, ulcères gastro-duodénaux, etc.).

Aucune contre-indication.

Avantages. — Les comprimés de Globinofer « Roche » sont inaltérables, sans aucune odeur et sans aucune saveur ; ils sont toujours admirablement supportés par le tube digestif et ils permettent, sans aucun inconvénient, un traitement intensif et prolongé.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 comprimés par jour dans du lait.

Enfants : 2 comprimés 2 fois par jour dans de l'eau.

Adultes : 2 comprimés ingérés tels quels au moment des 3 repas.

Comprimés. — Flacon de 60.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-80.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 91-10.)

GLOBIRON

Composition. — Granulé sucré contenant, par cuillère à café

Extrait mou hépato-gastro-pylorique correspondant

à 1 cc. d'Hémopylore Buvable..... 0 gr. 15

Protosulfate de fer..... 0 gr. 25

Caséinate de cuivre..... 0 gr. 0025

Nucléinate de manganèse..... 0 gr. 00125

Propriétés. — Par l'Hémopylore qu'il contient, c'est un régénérateur globulaire agissant à la fois sur le sang circulant et sur les fonctions hémapoétiques.

Par son association fer, cuivre, manganèse, il complète l'action de l'Hémopylore dans tous les cas de carence martiale, en particulier dans les anémies hypochromes; le manganèse intervenant comme catalyseur.

Le *Globiron* constitue une synergie antianémique de grande valeur.

Mode d'administration. — L'action du *Globiron* est plus grande quand il est dissout dans un liquide physiologique que quand il est dissout dans l'eau. C'est pourquoi il est préférable de le croquer, la salive constituant un excellent solvant physiologique, plutôt que de le prendre avec de l'eau.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillérées à café par jour un quart d'heure avant les principaux repas.

Enfants : 1 à 3 cuillérées à café dans les mêmes conditions.

Spécialités Roger BELLON.

J. GAUTIER, pharmacien

Laboratoire du GAMBÉOL — 42, rue Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine) — (Tél. : Déf. 17-67.)

GLOBULES FUMOUBE

Iodure de Potassium.

Globules à enrobage de gluten, insoluble dans l'estomac et à excipient résineux, graduellement soluble dans l'intestin, supprimant les phénomènes d'intolérance de l'estomac et de l'organisme.

Doses. — Les *Globules Fumouze* à l'iodure de potassium sont préparés sous deux formes :

Globules Fumouze KI à 0 gr. 25 par globule.

Globules Fumouze KI à 0 gr. 10 par globule.

Indications. — Les *Globules Fumouze* iodure de potassium sont prescrits dans toutes les maladies où l'emploi de l'iodure est indiqué.

Prix : 20 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente :
de 1 à 3 semaines.

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

GLOBULES RÉBAUD

Composition.

Éphédrine chlorhydrate	0 gr. 15.
Arrhénal	0 gr. 03
Iodure de caféine bromuré	7 gr. 20
Extrait sec polygala	0 gr. 12
— — lobélia	0 gr. 03
— — crataegus	0 gr. 12
— mou d'opium	0 gr. 03
— — belladone	0 gr. 03

pour 30 globules.

Même composition pour la liqueur Rébaud, destinée aux malades ne pouvant avaler les pilules.

Doses. — Deux globules ou XL gouttes, trois fois par jour : avant les repas de midi ou du soir et deux heures après le dîner.

Indications. — Les **Globules Rébaud** suppriment peu à peu les crises d'asthme, l'emphysème, les dyspnées, bronchites chroniques.

Prix : 18 francs.

Pharmacie ARDOIN

33, boulevard Dubouchage — NICE (A.-M.).

GLOBULES ROMON

Médication rationnelle de l'Impuissance.

Deux formes. — Globules glutinisés et ampoules injectables.

Composition. — Extraits orchitique, prostatique et de moelle épinière joints à la strychnine, à l'yohimbine et au phosphore de zinc pur.

Propriétés. — Puissant stimulant du système nerveux et du système génital. Tonique général.

Indications. — Asthénie, Sénilité précoce, Dépression physique et intellectuelle, Impuissance.

Posologie :

Globules : 4 à 6 par jour.

Ampoules : Une injection tous les deux jours.

Le flacon de 40 globules : 30 fr. 60.

La boîte de 10 ampoules : 51 francs.

Laboratoires ROMON

11 ter, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

GLOTTYL

Composition. — Association d'Erysimum, Euphorbia pilulifera, Coca, Drosera, faibles doses de Belladone et d'Aconit.

Formes pharmaceutiques. — Gouttes et Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionne la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique, fluidifie et favorise les sécrétions. Eclaircit la voix, arrête la toux, calme la dyspnée.

Indications. — Laryngites aiguës et chroniques, Trachéites, Bronchites, Coqueluches, Toux coqueluchoïdes, Toux spasmodiques et réflexes.

Posologie. — Gouttes : *Jeunes enfants* : X gouttes par année d'âge et par jour (en plusieurs prises).

Enfants : XX à XXX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour

Adultes : XL à LX gouttes chaque fois, 4 à 6 fois par jour, dans un peu d'eau ou de tisane.

Dragées : *Enfants* : 3 à 6 dragées par jour.

Adultes : 6 à 12 dragées par jour.

Durée moyenne des unités de vente :
4 à 6 jours.

Prix : 15 fr. 30.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

GLOXINES

Protéinothérapie spécifique des cancers.

Méthode du D^r Rubens-Duval.

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines spécifiques extraites de tissus néoplasiques par la méthode et sous le contrôle scientifique du D^r Rubens-Duval, et diluées en solution physiologique.

Propriétés. — Elles renforcent les réactions de l'organisme contre le cancer, dans la mesure où ces réactions, tant locales que générales, existent et peuvent être développées.

Elles améliorent l'état général des malades et exercent à la longue une action locale sur les cellules cancéreuses qu'elles ramènent vers une évolution normale.

Indications. — Les Gloxines préparent et complètent les interventions chirurgicales et les traitements radiothérapiques, dont elles diminuent les risques de récurrence et de métastase.

Elles ne sont à employer seules que lorsque tout traitement local est contre-indiqué.

Posologie. — En moyenne 2 ampoules par jour, à 12 heures d'intervalle. Boire 1/2 heure avant le repas, le contenu d'une ampoule dilué dans un peu d'eau.

Dans les cas à évolution rapide ou comme traitement pré-opératoire, il peut être donné sans inconvénient 3 et même 4 ampoules par 24 heures.

Durée du traitement. — Il doit être prolongé sans interruption tant que la guérison ne peut être considérée comme acquise. La continuité du traitement et sa longue durée sont les conditions nécessaires de son efficacité.

Choix des Gloxines. — Employer les GLOXINES extraites d'une tumeur de même variété que celle qu'il s'agit de traiter (voir liste ci-contre).

Pour le traitement des métastases, utiliser les GLOXINES se rapportant au type primitif de la tumeur.

Dans tous les cas où les GLOXINES spécifiques ne peuvent être utilisées, employer les GLOXINES POLYVALENTES (Voir ci-dessous).

LES GLOXINES POLYVALENTES

Présentation. — (Voir ci-contre.)

Composition. — Protéines extraites de tumeurs de types très variés, diluées à parties égales en solution physiologique.

Indications. — Elles sont à employer lorsqu'on ne sait quelles GLOXINES spécifiques prescrire. L'expérience montre que les malades bénéficient de l'extrait qui leur convient et n'éprouvent aucun effet des autres extraits.

Posologie et durée du traitement. — Identiques à celles des GLOXINES. Elles peuvent être également employées en traitement continu et longtemps prolongé.

LISTE DES GLOXINES

O. C. P. Dépositaire général.

- N° 1. *Épithéliomas épidermoïdes* (bouche, langue, lèvres et orifices naturels).
 - N° 2. *Estomac* (cancers épithéliaux).
 - N° 3. *Gros intestin, rectum* (épithélioma cylindrique).
 - N° 4. *Ovaire* (épithélioma wolffien).
 - N° 5. *Ovaire* (épithélioma germinatif).
 - N° 6. *Peau* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes cornés).
 - N° 7. *Peau* (épithélioma basocellulaire).
 - N° 8. *Prostate* (adénomes et épithéliomas).
 - N° 9. *Sein* (épithélioma type ordinaire).
 - N° 10. *Thyroïde* (épithélioma).
 - N° 11. *Utérus-col* (épithéliomas à cellules cylindriques et basocellulaires).
 - N° 12. *Utérus-col* (épithéliomas spinocellulaires ou épidermoïdes).
 - N° 13. *Utérus-corps* (épithéliomas à cellules cylindriques).
 - N° 14. *Chondrosarcome*.
 - N° 15. *Vessie* (épithélioma).
 - N° 16. *Vésicule biliaire* (épithélioma).
 - N° 17. *Rein* (épithélioma à cellules claires).
 - N° 18. *Lymphocytome*.
 - N° 19. *Sarcomes* (à petites cellules et à cellules polymorphes).
 - N° 20. *Testicule* (séminome).
- A. *Leiomyome malin*.
 - B. *Parotide* (tumeur mixte).
 - D. *Ovaire* (séminome).
 - E. *Ovaire* (sarcome provenant des cellules à lutéine).
 - G. *Fibrosarcome*.
 - H. *Maladie de Hodgkin*.
 - K. *Sein* (sarcome).
 - L. *Sein* (épithélioma à grosses cellules).
 - M. *Sein* (épithélioma à cellules cylindriques).
 - N. *Testicule* (épithélioma wolffien).
 - O. *Nævome achromique*.
 - P. *Nævome mélanique*.

LES GLOXINES ET

LES GLOXINES POLYVALENTES

sont présentées sous deux conditionnements :

Boîte de 20 ampoules buvables d'un centicube. 25 fr.

Boîte de 60 ampoules buvables d'un centicube. 67 fr. 60

Laboratoire des GLOXINES

6 bis, rue Campagne-Première — PARIS (XIV°).

(Tél. : Odéon 93-94.)

GLUCALCIUM

Ampoules et Granulé.

Solution Isotonique à 10 p. 100 de *Gluconate de calcium pur*. *Chimiothérapie intégrale de l'ion calcium* par Injections intramusculaires et intraveineuses.

Le *Glucalcium* est un sel organique de Calcium très pur qui possède toutes les propriétés de l'ion Ca et permet l'administration de fortes doses de calcium sans intolérances ni réactions locales ou générales.

Dans toutes les affections du système neuro-végétatif, Maladies anaphylactiques, Tuberculose, Hémorragies, Hémophilie, Décalcifications et dans la médication antichoc.

Posologie :

Traitement d'entretien : 1 ampoule de 10 cc. tous les jours.

A doses massives : 1 à 3 ampoules de 10 cc. tous les jours.

Enfants : 5 cc. tous les jours ou tous les deux jours.

Médication antichoc : Injections mixtes dans la même seringue.

Complètement indolore et ne *donnant lieu à aucun phénomène hémoclasique.*

Composition du Glucalcium granulé « per os » :

Gluconate de calcium	10 gr. 00	Parathyroïdes	0 gr. 01
Inosite-hexaphosphate de chaux et de magnésie.....	4 gr. 00	Hypophyse totale.....	0 gr. 10
Ergostérine irradiée (vitamines D) pure		Surrénales	0 gr. 50
40 m U. S. I. au gr.	0 gr. 005	Thymus	0 gr. 20
		Extrait fluide de Kola .	0 gr. 10
		Extrait fluide de Panax	
		Ginseng	0 gr. 10

Par ses composants Calco-fixatifs créés pour répondre aux plus strictes exigences de la thérapie de minéralisation, le *Glucalcium* est indiqué dans :

Faiblesse générale, Lymphatisme, Asthénie, Surmenage, Prétuberculose, Tuberculose, Déminéralisation, Phosphaturie, Carie dentaire, Croissance, Fractures, Ossifications, Allaitement, Rachitisme, Dentition, Grossesse.

L'administration du *Glucalcium* par voie buccale est entièrement assimilée.

Posologie :

Adultes : 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 6 ampoules de 5 cc. : 22 francs ; 5 ampoules de 10 cc. : 25 francs.
Granulé : la boîte : 24 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1814-13 et 14.

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS.

(Tél. : Dor. 56-38.

GLUCAMONIX

Composition. — Gluconate d'ammonium ($C^6H^{11}O^7$) NH^4 .

Indications. — Acidification des urines et du sang. Infection urinaire, cicatrisation des lésions rénales. Cystites incrustées, Affections apyrétiques des bronches, Dyspnées, Pneumonies après la crise, Gastrites accompagnant les maladies bronchiques, Névralgies, myalgies, sciatiques. Tétanies rebelles.

Présentation :

Comprimés à 0 gr. 40 : boîte de 40 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules (injectables intramusculaires ou intraveineuses et buvables).

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour. — 2 injections par semaine.

Laboratoire du GLUCAMONIX

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOBIOCALCIUM ROSSO

Voir Calcium Rosso.

Chimiothérapie organo-calcique par injections intramusculaires et intraveineuses

Agréé par le Conseil supérieur de Santé du ministère de la Marine, expérimentation faite au Centre de Phtisiothérapie de l'hôpital militaire de Rochefort.

Enregistré au L. N. C. M.

Fournisseurs des sanatorium et hôpitaux.

Produits Biochimiques ROSSO

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).
(Tél. Dor. 56-38).

GLUCOCHAUX

Composition :

Gluconate de chaux pur	20 gr.
Inosito phosphate de chaux et Magnésie.	1 —
Formiate de chaux, Hypophosphite de chaux et Magnésie	1 —
Excipient sucré et aromatisé pour	100 —

Formes. — *Granulé et cachets.*

Indications. — Calcifiant organique puissant, indiqué dans tous les cas de déminéralisation et de dénutrition.

Grossesse et allaitement.

Croissance et ossification.

Phosphaturie et carie dentaire.

Fractures, Asthénie et Convalescence.

Doses : *Enfants :* 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 cuillerées à soupe ou 2 à 3 cachets par jour.

Prix :

Granulé : 17 francs ; cachets : la boîte de 24 : 17 fr. 85.
Durée du flacon : 8 jours environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1284-1.

A. MIRONNEAU, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres) — (Tél. : 18.

GLUCOCITHINE

Composition :

Gluconate de calcium.....	10 gr.
Lécithine d'œufs	2 —
Pour 100 grammes granulé.	

Présentation. — Granulés simples.

Indications. — Asthénie, anorexie, surmenage, épuisement nerveux, impuissance fonctionnelle, sénilité, rachitisme, états pré tuberculeux, tuberculose, phosphaturie, diabète, etc.

Posologie. — Granulés :

Adultes : 2 cuillerées à café pendant le repas.

Enfants : 1 cuillerée à café pendant le repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café délayée dans du lait tiède.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-11.

Laboratoire de la GLUCOCITHINE

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCO-CYANURE

Association originale de Gluconate de calcium et de Cyanure de mercure. Le meilleur traitement mercuriel.

Indications. — Toutes les indications du Cyanure de mercure et du Gluconate de calcium (voir rubrique *Calcio-Dynamyl*). Le *Gluco-Cyanure* supprime beaucoup d'inconvénients du Cyanure de mercure, et surtout la fatigue qui, très souvent, accompagne ce traitement.

Formes. — Ampoules intraveineuses de 4 cc., contenant 1 cgr. de Cyanure de mercure et 20 cgr. de Gluconate de calcium.

Posologie. — Une injection intraveineuse quotidienne ou tous les deux jours selon l'avis du médecin.

Laboratoire du Gluco-Cyanure

J.-B. DUPEYROUX, pharmacien
Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,
95, rue Lecourbe — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 27-13.)

GLUCONYL

Composition. — Gluconate de calcium ($\text{C}^6 \text{H}^{11} \text{O}^7$)² Ca.

Indications. — Toutes les indications du calcium soluble découlant de ses propriétés recalciifiantes, anti-hémorragique, diurétique, déchloration, antiphlogistique, équilibrante du système vago-sympathique

Présentation :

Solution à 10 % concentration :

- 1^o Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 2^o — 5 cc. : boîte de 10 ampoules.
- 3^o — 10 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 4^o — 10 cc. : boîte de 10 ampoules.

Solution à 20 % concentration

- 1^o Ampoule de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.
- 2^o — 10 cc. : — 6 ampoules.
- 1^o Cachets simples : boîte de 18 cachets.
- 2^o — à la vitamine D : boîte de 18 cachets.
- 1^o Granulés simples : boîte de 125 grammes.
- 2^o — à la vitamine D : boîte de 125 grammes.
- 3^o — ergostérinés irradiés : boîte de 125 grammes.

Posologie :

Ampoules : 5 à 10 cc. par jour (intramusculaire ou intraveineux).

Granulés : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Cachets : 1 à 4 cachets par jour.

Enfants : 1/2 doses.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 933-3, 4, 5, 6, 7.

Laboratoire du GLUCONYL

L. CHAUVIN, Pharmacien, 3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e)

GLUCOSALYL

Puissantt mntite^o d'attaque du Rhumatisme arr culaire aigu.

Composition. — Chaque ampoule de 10 cc. contient : Salicylate de Soude, 1 gr. ; glucose anhydre, 1 gr. ; thiosinamine, 0 gr. 04.

Indications. — 1^o Rhumatisme articulaire aigu et à forme extra-articulaire. Manifestations cardiaques et oculaires rhumatismales ; 2^o Maladies nerveuses, Encéphalite léthargique, Poliomyélite, Sclérose en plaques ; 3^o Syndromes mentaux fébriles ; 4^o Maladies infectieuses.

Posologie. — Injections strictement intraveineuses. Aiguille de 7/10 courte. 1 à 4 ampoules par jour pendant 4 à 5 jours.

Important. — Toujours associer à la médication salicylée intraveineuse la médication salicylée *per os*, soit sous forme Entérosalicyl (Salicylate de Soude pur en capsules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin), soit sous forme Sulfosalyl (Polysalicylates, Soufre et Calcium, associés à l'opothérapie à dose minime).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-17.

**Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale
SAREIN**

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

GLUCOSIUM

Composition. — Gluconate de magnésium ($C^6 H^{11} O_7$)²Mg.

Indications. — Sédatif du système nerveux. Antispasmodique (spasmes des voies digestives et biliaires). Désensibilisant. Laxatif doux sans accoutumance. Infection intestinale. Douleurs angineuses. Varices, Prophylaxie des proliférations cellulaires.

Présentation :

Cachets de 1 gr. : la boîte de 20 cachets.

Ampoules 5 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : la boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Posologie :

1 à 2 cachets par jour pendant les repas.

2 à 3 injections par semaine.

Pour les ampoules, l'association du Gluconate de Calcium avec le Gluconate de Magnésium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUCOSIUM

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUCOXYL NACHER

Antidiabétique nouveau par voie buccale.

Composition. — Tasi, plante de la République Argentine, dont l'alcaloïde Morrénine (Arata) augmente la sécrétion des cellules endocrines et par ses vitamines B2 et B3 favorise puissamment le métabolisme des glucides, Formiate de Quinine, Codéine, Arséniate de soude, Carbonate de lithine (Lab. National contrôle 1027-1).

Propriétés thérapeutiques. — Disparition des céto-acidoses, rétablissement du pH normal du sang et de la glycémie, maintien de la réserve alcaline, suppression de la glycosurie, reprise de l'activité physique et intellectuelle, augmentation de la tolérance hydrocarbonée.

Indications. — Diabète (bénin ou grave), Diabète infantile, Grossesse diabétique (peut s'associer à la médication insuliniennne).

Avantages. — Traitement commode. Résultats contrôlables. Pas d'intolérance. Pas de contre-indication.

Mode d'emploi. — Deux cachets par jour, avant les repas, midi et soir.

Prix : Boîte cure 20 jours : 34 francs (40 cachets).

Demi-boîte : 19 — (20 —)

Laboratoire NACHER,

Pharmacien licencié ès-sciences,

71, boulevard Carnot — TOULOUSE.

GLUQUINIX

Composition. — Gluconate de quinine ($C^{18}H^{21}O^7$)² quinine.

Indications. — Toutes les indications de la quinine avec action renforcée et tolérance parfaite. Paludisme, pneumonie, bronchite, coqueluche, grippe, fièvre récurrente. Rhumatisme aigu, névralgies, pyémie, infection puerpérale. Fièvre typhoïde, dysenterie amibienne, Asthme nerveux, pemphigus, dermatite exfoliatrice. Fièvre des tuberculeux. Infections pulmonaires post-opératoires.

Présentation :

Comprimés à 0,25 : boîte de 20 comprimés.

Ampoules de 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

— 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson sucrée).

Suppositoires à 0,10. Bébè : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,20. Enfant : boîte de 10 suppositoires.

— à 0,50. Adulte : boîte de 10 suppositoires.

Posologie :

La posologie sera calculée en tenant compte de la correspondance suivante :

50 centigrammes de gluconate de quinine correspondent à 37 centigrammes de chlorhydrate de quinine représentant 30 centigrammes de quinine base.

N. B. — a. Les injections de GLUQUINIX ne solèroient pas les veines.

b. L'association avec le gluconate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du GLUQUINIX

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

GLUTHIONAL

Troubles du métabolisme soufré.

Etats arthritiques. — Insuffisances hépatiques.

Formule :

Méthinetriéthioglycolate de Magnésium.....	0 gr. 10
Extrait biliaire dépigmenté et décholestériné.....	0 gr. 05
Extrait de levure de bière.....	0 gr. 002
Dextrose.....	0 gr. 05
Excipient, Q. S. pour un comprimé glutinisé enrobé, terminé à.....	0 gr. 50

Avantages. — Par sa teneur soufrée importante (27 p. 100 environ d'un soufre organique non oxydé et particulièrement assimilable), ce médicament permet une véritable recharge en soufre de la cellule hépatique, des tissus et des humeurs. Aucune toxicité.

Indications. — *Etats arthritiques*, rhumatismes chroniques.

Maladies du foie et des voies biliaires. Insuffisance hépatique sous toutes ses formes, Angiocholites et cholécystites, Lithiase biliaire, Dyspepsies et troubles intestinaux secondaires aux troubles hépatiques, Troubles auto-toxiques et états allergiques.

Adjuvant du traitement arsenical et mercuriel, Dermatoses d'intolérance, Catarrhes chroniques des voies respiratoires.

Posologie. — 2, 4 ou 6 comprimés par jour avant les principaux repas.

Laboratoires CADUCIA

Y. JUND, Docteur en Pharmacie,

78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 33-78.)

GLUTINETTES D'ASPIRINE

Composition. — Comprimés glutinisés dosés à 0,25 d'Aspirine.

Avantages. — Suppriment les causes d'irritation possibles de l'estomac avec les cachets et les comprimés, les **Glutinottes d'Aspirine** traversant l'estomac et ne se dissolvant que dans le milieu alcalin du duodénum.

Tolérance gastrique absolue. Rapidité d'action, facilité d'absorption.

Indications. — Toutes celles de l'Aspirine : névralgies, migraines, affections rhumatismales, grippe, fièvre, etc...

Mode d'emploi. — 1 à 12 dans les 24 heures avant les repas ou dans leur intervalle, dans de l'eau, ou en les déglutissant en même temps qu'un peu de salive.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS.

GLUTISALYL

Comprimés glutinisés de 1 gr. de salicylate de soude.

Avantages. — Facilité de posologie, plus de dégoût à l'absorption, plus de troubles gastriques, la désintégration du comprimé se faisant dans l'intestin.

Mode d'emploi. — Les comprimés doivent être avalés sans être croqués.

Prendre dans la journée une cuillerée à café de bicarbonate de soude.

Indications. — Celles du salicylate de soude.

Prix :

50 comp. dont 50 grammes de produit actif : 21 fr.

GLUTISALYL INFANTILE (Comprimés glutinisés de 0 gr. 50 de salicylate de soude).

GLUTIPOLYSALYL (Comprimés glutinisés d'un gram. de salicylate de soude, potasse et chaux).

J. BARAIGÉ, Docteur en Médecine

Pharmacien de 1^{re} Classe.

24, rue Paul-Bert. — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 21-22.)

GLYCARSOL

Composition. — Glycéro-Phosphate de Soude, de Manganèse, de Fer ; Triiodure d'arsenic 0 gr 65 %; Organes frais (moelle rouge osseuse, rate, thymus, muqueuse intestinale). Tolérance absolue, assimilation parfaite.

Sa préparation demande environ deux mois.

Indications. — Anémies, Lymphatisme, Convalescence, Inappétence ; Adénopathie, Tuberculose, Paludisme, etc.

Posologie. — Commencer par 1 goutte matin et soir pour atteindre de :

	6	à 18 mois	4 gouttes	2 le matin	2 le soir.
<i>Enfants :</i>	18	— 3 ans	10	— 5	— 5
	3 ans à	6	— 16	— 8	— 8
	6	— 10	— 20	— 10	— 10
	8	— 11	— 26	— 13	— 13
	11	— 16	— 30	— 15	— 15
<i>Adultes :</i>			40	— 20	— 20

Dans un peu de lait, d'eau sucrée ou non.

Continuer la dose maximum pendant 7 jours et diminuer de 11 gouttes par jour (1 le matin, 1 le soir) pour descendre à 1 goutte le matin, 1 le soir. Cesser 15 jours et recommencer.

Prix du flacon de 30 cc. : 15 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. n° 1837-2.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

GLYCÉROPHOSPHATE ROBIN

Comprimés effervescents dosés à 0,15 centigr. par unité.

Granulé dosé à 0,125 centigr. par cuiller-mesure.

Ampoules injectables dosées à 0,20 centigr. par ampoule de 2 cc.

Dosés et mode d'emploi. — 2 cuillerées de Granulé ou 4 comprimés 2 fois par jour dans un peu d'eau ; ampoules, 2 cc. 3 fois par semaine.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur physiologique. Ne fatigue pas l'estomac. Son emploi continu ne présente aucun inconvénient.

Indications. — Dans tous les cas de déminéralisation phosphorée et d'asthénie nerveuse.

Prix :

Comprimés : 15 fr. 90. — *Granulé* : 14 fr. 90.

Ampoules : 17 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

GLYCOCARPINE

Éléments actifs. — Nitrate de pillocarpine (2 mmgr. par pilule) ou par X gouttes, associé à de faibles doses d'arnica et de cimicifuga, et à 0,02 de caféine.

A. — Médication vaso-dilatatrice.

Céphalées et vertiges des artérioscléreux, Hypertension artérielle et ses conséquences, Troubles congestifs de la ménopause et de la puberté. Maladie de Raynaud, Claudication intermittente par spasme artériel, Angor par spasme des coronaires, Glaucome, Mouches volantes, Bourdonnements d'origine circulatoire (seulement).

B. — Troubles vago-sympathiques.

Insuffisance du vague, Freinage du sympathique, Asthme, Coqueluche, Basedow fruste, Pelade.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 pilules ou XX gouttes au début des trois repas.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Échantillons sur demande :

C. DALIN, pharmacien de 1^{re} classe

49, quai Saint-Vincent — LYON (1^{er}).

(Tél. : B. 36-32.)

GLYCOCURE

Forme. — Pilules.

Composition. — Géranium Robert, Jambul, Noyer sauvage, Gentiane, Pyrole ombellée.

Indications. — Diabète, Glycosuries.

Posologie. — 3 pilules le matin, 3 pilules à midi, 3 pilules le soir à prendre avant les repas.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale
du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.**

GLYCO-M.

Composition. — Benzoate, Salicylate, Bicarbonate et Borate de soude, formant avec le Thymol une solution de Thymolate de soude (dose à 4 p. 100). Glycérine à 30° C. P. 17 p. 100. Menthol 0,04 p. 100. Essence de Gaultheria. Pinus et Eucalyptol, 0,06 p. 100.

Propriétés particulières. — Antiseptique, analgésique, alcalin et exosmotique, non toxique, non irritant, et non caustique. Par ses qualités désodorisantes, est d'une valeur incontestable dans l'ozène et la fétidité buccale.

Indications. — Dans le traitement des affections et infections de toutes les muqueuses. **Pharyngite, angine et laryngite** : 1 partie pour 2 d'eau chaude, en gargarismes ou pulvérisations. **Catarrhe, coryza, rhumes, fièvre des foins et végétations adénoïdes** : Une partie pour 3 d'eau chaude en lavages nasals au moyen de la pipette Kanar. **Gynécologie** : injections à 5 p. 100. Le soir en tampons saturés de GLYCO-M. pure à garder toute la nuit.

Gencives spongieuses et maladies buccales. — En bains de bouche prolongés, pure, en brassant toutes les parties de la bouche (pendant un quart d'heure). Au coucher, en tampon saturé, inséré entre les lèvres et la gencive, et à conserver toute la nuit.

A efficacité égale, l'antiseptique alcalin l'emporte sur l'antiseptique acide :

Par ses propriétés qui lui sont toutes particulières, la « GLYCO-M. » attire à travers les tissus les sécrétions congestionnées et enflammées, active la circulation du sang et rétablit rapidement un état normal. Par sa réaction alcaline, elle s'harmonise avec les tissus traités, de sorte qu'elle n'irrite pas.

LA GLYCO-M. est un antiseptique alcalin non toxique et non irritant. Sa formule, basée sur la composition saline du sang, est approuvée par le Corps Médical, et c'est lui seul qui a appris au public sa valeur dans le traitement de toutes les muqueuses.

La pipette KANAR : 7 francs.

Le flacon de 100 grammes : 7 francs (modèle de poche).

Le flacon de 200 grammes : 12 fr. (modèle stilli-goutte).

Le flacon de 500 grammes : 20 francs (demi-litre.)

Le bocal de 3 litres : 90 francs (modèle familial.)

Prix spécial aux Médecins : le bocal 45 francs.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges Miquel, Pharmacien de 1^{re} Classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 16-85.)

GLYCOSTHÈNE

Solution de Glycocolle à 2 p. 100.

**Toutes les
MALADIES du MUSCLE**

Myasthénies — Myalgies — Courbatures

**Tonifie la fibre MUSCULAIRE
Répare les tissus MUSCULAIRES
Détend les spasmes MUSCULAIRES
Calme les algies MUSCULAIRES**

1 à 2 ampoules par jour, en injections
intramusculaires.

Laboratoire du MYORAL,
5, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}).

GLYCO-THYMOLINE

Selon la formule de KRESS et OWEN Co.

Traitement des affections de toutes les muqueuses.

Composition :

Borate de Soude.....	2 040
Thymol.....	0 037
Menthol.....	0 037
Benzoate de Soude.....	2 040
Bicarbonate de Soude.....	2 040
Cajeputol.....	0 075
Salicylate de Soude.....	0 090
Huile de Pin.....	0 037
Huile de Bouleau.....	0 030
Glycérine, Colorant, alcool, eau distillée	93, 574
	<hr/> 100 000

Avantages. — La Glyco-Thymoline est une solution dont la formule a été scientifiquement étudiée et dont l'alcalinité et la composition saline ont été mises en harmonie avec l'alcalinité même du sang et des sécrétions muqueuses, ce qui lui permet de n'apporter aucun trouble dans l'équilibre humoral et de n'altérer en rien la vitalité des tissus.

Action thérapeutique. — Par son alcalinité et son pouvoir exosmotique la Glyco-Thymoline provoque un appel des sécrétions muqueuses et vide les culs-de-sac glandulaires de leur contenu vicié, rétablissant ainsi le fonctionnement physiologique des glandes congestionnées. Elle est dépourvue de toute toxicité, ne coagule pas les albumines, et ne produit aucune action irritante.

Indications. — *Voies digestives* : Catarrhe gastrique et intestinal, Fermentations,

Flatulence, Embarras gastrique, Maladies infectieuses, Entérite, Parasites intestinaux, Dysenterie.

Cavité buccale : Stomatite, Aphtes, Gingivite, Pyorrhée alvéolaire, Fluxion dentaire.

Pharynx et gorge : Angines, Pharyngite, Laryngite, Affections des voies respiratoires.

Voies nasales : Coryza aigu ou chronique, Rhinite, Rhume des Foins, Végétations adénoïdes, Sinusite.

Yeux : Conjonctivite, Blépharite ciliaire, Kératite, Granulations des paupières, Trachome, Ectropion.

Maladies de la peau : Erysipèle, Furunculose, Anthrax, Acné, Eczéma, Zona, Ulcères variqueux, Brûlures.

Rectum et région anale : Prurit anal et eczéma local, Hémorroïdes, Prostatite.

Gynécologie et Obstétrique : Pertes blanches, Vaginite, Ulcérations du col, Métrites, Salpingites, Suites de couches.

Pies de toute nature.

Mode d'emploi. — a) Usage externe : à utiliser pure ou diluée dans 1 à 10 parties d'eau.

b) Usage interne : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau.

Prix :

100 grs.	7 fr. 65.
250 grs.	15 fr. 30.
500 grs.	25 fr. 50.
Modèle Hôpital	102 francs.

(Taxe d'armement comprise).

Remise spéciale au Corps médical.

Établissements WEBER

A. GUILLAUME, Pharmacien

76-78, rue Dareau — PARIS (XIV^e).

GLYPHÉRANOL

Désinfectant du rhino-pharynx et des voies respiratoires en général.

Composition et forme. — 1° *Formule forte* : glycérol antiseptique soluble dans l'eau à toute température.

En onction : absorbable par voie cutanée.

Essence de lavande.....	0,30	Essence d'Eucalyptus.....	3,50
— de Cèdre.....	0,30	Menthol.....	1,50
— de Pin.....	0,50	Essence de Térébenthine....	1,00
— de niaouli.....	0,50	Glycéré spécial.....	Q. S. p. 100

2° *Formule faible* : glycérol antiseptique immédiatement soluble au contact de la muqueuse nasale (jamais d'obstruction du sinus).

Terpineol.....	0,30	Chl ^{te} d'Éphédrine.....	0,35
Essence de Cèdre.....	0,20	Résorcine.....	0,20
— de Pin.....	0,20	Chl ^{te} d'amyléine.....	0,20
Eucalyptol.....	2,00	Campbre du Japon.....	1,00

Glycéré spécial Q. S. p. 100.

Indications thérapeutiques. — Coryza forme aiguë — Rhino-pharyngite — Sinusites — Céphalées d'origine nasale — Rhume des foins — Bronchites — Ganglions infectés.

Posologie. Mode d'Emploi. — 1° *Formule forte* : a) inhalation : mettre la grosseur d'une noisette dans un inhalateur avec de l'eau chaude et respirer les vapeurs. b) onguent : faire une application sur le thorax ou les ganglions et recouvrir de coton hydrophile. 2° *Formule faible* : mettre dans chaque narine la valeur d'un grain de blé plusieurs fois par jour.

Présentation. — Glyphéranol « Coffret » contient les 2 formules. Prix public 17 fr. 50. Formule forte. Prix public 13 fr. 50

Formule faible. Prix public 8 fr. 50.

Laboratoire PRIGNIAU

52, Rue des Cinq-Diamants — PARIS (XIII^e) — (Tél. : Gob. 90-79.)
Inscrit au L. N. C. M. Formule forte n° 1117-4, Formule faible n° 1117-3.

GMET

(Extraits Gmet.)

Extraits végétaux liquides concentrés sans alcool, ni sucre, ni éther, par le procédé spécial Gimbert, qui permet d'obtenir une extraction complète sans altérer la plante.

Correspondent tous à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Se prescrivent tous : en moyenne de 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau, après ou entre les repas ou un peu avant.

Le Diurétique Gmet est prescrit par cuillerées à soupe.

Voir également :

Antiobé.	Kola Gmet.
Boldo Gmet.	Oliviasé.
Composé Gmet.	Piscidia Gmet.
Cratægus Gmet.	Quindynol.
Frêne Gmet.	Quinquina Gmet.
Fucus Gmet.	Sauge Gmet.
Gui Gmet.	Ulmaire Gmet.
Hamamélis Gmet.	Valériane Gmet.
Hydrastis Gmet.	Viburnum Gmet.
Jugland Gmet.	Diurétique Gmet.
	Extrait Hamyd.

Littérature sur chaque produit et Échantillons sur demande adressée au :

Laboratoire GMET

27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).

Dr A. LOROT, Pharmacien,
Enregistrés au Laboratoire National de
Contrôle sous les n^{os} 1259-1 à 1259-21.

GOMENOL

Nom et Marque déposés.

Essence de *Melaleuca viridiflora* sélectionnée.

GOMENOLÉO et Produits au GOMENOL

Propriétés. — Innocuité absolue, haut pouvoir antiseptique, rapidement diffusible, grand calmant, désodorisant, vivificateur des tissus et action modificatrice, hémostatique, toni-cardiaque.

Action thérapeutique et usages. — A l'intérieur, convient spécialement aux affections chroniques des voies respiratoires (bronchites, tuberculose, etc.) et des voies urinaires (cystites, urétrites, etc.). En injections intramusculaires indolores (aiguilles fines) ou intraveineuses. Imprégnation gomenolée dans toutes infections locales ou généralisées (septicémie, etc.). Immunisation préventive.

A l'extérieur, en inhalations et pulvérisations : coryzas, laryngites, bronchites, etc.

Pansements chirurgicaux : brûlures, plaies septiques, ulcères.

Multiples indications, nombreuses formes correspondant aux diverses applications :

Rhino-pharynx. — Gomenol-Rhino, Gomenoléo-Nasal, Vaseline Gomenolée, Gomenol pur en inhalations.

Gorge. — Gomenol-Pâtes, Gomenol-Sirop, Gomenoléo 10 p. 100 en injections trachéales.

Bronches, poumons. — Gomenol-Capsules, Gomenoléo en injections intrapleurales (10 et 20 p. 100), intrabronchiques (20 p. 100) et intramusculaires (33 p. 100), Gomenoléo-éther.

Intestin. — Gomenol soluble, Gomenoléo 10 p. 100 et 20 p. 100 en lavements profonds, Gomenol-Rectal, Gomenol-Glutinules.

Rein, vessie. — Gomenol-Glutinules, Gomenoléo 20 p. 100 et 33 p. 100 en instillations. Lavages, eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble).

Plaies, brûlures. — Gomenol-Onguent, Gomenoléo 20 p. 100 et 33 p. 100 en pansements, Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble) pour lavages et pansements humides.

Gynécologie. — Eau Gomenolée (avec Gomenol-Soluble), Gomenovules, Gomenoléo (pansements), Gomenol pur (attouchements), Gomenol-Savon.

Grande chirurgie. — Gomenol pur ou Gomenol-Rubéo (champ opératoire), Gomenoléo (Imprégnation gomenolée).

Les Produits sont inaltérables.

Présentations populaires :

Gomenoléo, petit flacon.

Gomenoléo-Nasal, tube canule.

Vaseline Gomenolée Prevet, tube canule.

Laboratoire du GOMENOL

François PREVET, docteur en Pharmacie

48, rue des Petites-Écuries — PARIS (X^e). (Tél.: Provence 34-31.)

GONACRINE

Chlorure de 3-6 di-amino-10
méthyl-acridinium (sel neutre).

Antiseptique puissant très diffusible, peu toxique, non irritant. Action élective à l'égard du Gonocoque.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Septicémies, Méningites, Méli-tococcoses, Erythème noueux.

Présentations : boîtes de 10 ampoules à 2 % : 29 fr.
— 3 — 2 % : 11 fr. 70.
— 6 — 0,5 % : 11 fr. 70.

Posologie et mode d'emploi. — Lavages de l'urètre : solutions extemporanées de 1/8.000 à 1/1000. Injections intraveineuses : ampoules de solution à 0,50 p. 100 et à 2 p. 100.

Pastilles de Gonaorine (boîtes de 40 pastilles), dosées à 0 g. 003 par pastille, destinées au traitement des stomatites infectieuses ou médicamenteuses, gingivites, amygdalites. Prévention des infections à porte d'entrée bucco-pharyngée. Désinfection post-opératoire.

Prix de la boîte de 40 pastilles : 6 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

GONAGONE

Vaccin antitoxique et antimicrobien, adopté par les hôpitaux de Paris et de l'armée.

Stock-vaccin polymicrobien renfermant :

Corps microbiens + Lysat microbien + Anatoxine.

Indications. — Toutes les infections génito-urinales de l'homme et de la femme.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les 3 ou 4 jours, de 1/4 de cc. à 2 cc. progressivement.

Ovules au Gonagone pour pansements vaginaux (Modèle spécial pour enfants).

Prix : 6 ampoules ; 32 fr. 65 ; 6 ovules : 21 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. n° 514-99 et 111.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

GONO-VACLYDUN ET GONARTHRI VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

GONO-VACLYDUN

Composition. — Gonocoques, Entérocoques, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Urétrites, Complications de la blennorrhagie : Epididymite, Prostatite, etc.

Posologie. — En injections sous-cutanées, 3/4 de centimètre cube le 1^{er} jour, ensuite injections quotidiennes de 1 centimètre cube jusqu'à 12 injections, puis 1 cc. tous les 2 jours.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 centimètre cube.

GONARTHRI-VACLYDUN

Lysat de gonocoques.

Lysat-vaccin riche en antigène, exclusivement destiné au traitement de toutes les formes du rhumatisme spécifiquement déterminé.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XXII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

GOSSYPIOL MAURIN

**Régulateur menstruel sédatif des règles
douloureuses.**

Complexe spécialisé des douleurs « ovo-utérines », le Gossypiol donne un triple effet : antinévralgique, anesthésique, antispasmodique qu'aucun analgésique général ne peut réaliser.

Gossypium-Piscidia à 20 mgr., Cimicifuga, Gelsémium Viburnum à 10 mgr., Aconit 23 mgr., Belladone 2 mgr. Digitale 8 mgr., Ch. quinine 10 mgr., Ch. morphine 1 mgr. 3, Ch. cocaïne 1 mgr. 1.

Seize dragées en 4 jours pendant 3 menstrues à 24 jours d'intervalle ordonnent la périodicité (2 matin et soir).

En deux jours au moment présumé des règles déterminent l'écoulement cataménial et calment toutes douleurs (4 le matin et 4 le soir).

Prix : 15 fr. 10.

N^o d'enregistrement : 327-6.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY

102 bis, r. de l'Aigle, LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 29-93.)

GOTIRA

Composition. — Pâte à base d'extrait de plantes (*Rosa Centifolia*, *Hypericum perforatum*, *Malva Sylvestris*, *Chenopodium*), incorporé à un excipient approprié. Ne contient aucun produit chimique, caustique ou toxique. Odeur agréable. Ne tache pas.

Indications thérapeutiques. — Antiseptique et cicatrisant. *Toutes plaies et irritations de la peau*: Acné, Eczéma, Gourme, Herpès, Urticaire, Prurits, Dartres, Crevasses, Engelures, Furoncles, Blépharites, Blessures, Brûlures, Plaies, Ulcères variqueux, Eschares, Hémorroïdes, Prurit vulvaire, Touchers, etc.

Mode d'emploi. — Étendre une petite quantité, plusieurs fois par jour, masser légèrement jusqu'à l'absorption, puis laisser une légère couche en surface. Pour les plaies (ulcères variqueux, eschares), combler la cavité avec Gotira, en étendre autour de la plaie, puis recouvrir d'un pansement sec de gaze et bander.

En pots et tubes.

Enregistré au L. N. de G. des M. sous le N° 1818-1.

Laboratoires RICHOU

G. GUÉNAIRE, Pharmacien

39, rue Taitbout — PARIS (IX^e). (Tél. : Trin. 46-12.)

GOUDROLINE

Composition. — Ce produit est extrait du goudron de houille.

Propriétés. — Agent réducteur doué de propriétés kératoplastiques, il ramollit la couche cornée épaisse et diminue la formation des squames qui entravent la vitalité des cellules de Malpighi et la circulation lymphatique.

Il est fortement astringent, et son action décongestionnante s'exerce tant superficiellement que par pénétration.

Il possède la propriété de faire disparaître rapidement des éruptions prurigineuses tenaces et de modérer le prurit d'une façon durable en agissant sur les terminaisons nerveuses.

Indications. — La Goudroline peut être employée dans tous les états desquamatifs de la peau, et notamment dans toutes affections prurigineuses de l'adulte (eczémas non suintants, parakératose psoriasiforme de Brocq, eczématides, eczémas séborrhéiques.)

Posologie. — La Goudroline peut être utilisée pure ou incorporée à la pommade à l'oxyde de zinc.

Prix. — Le bidon de 125 gr. : 6 fr. 35

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

GOUTTES ANTISPASMODIQUES ADOL

Composition. — Alcaloïdes totaux de la Belladone, de la jusquiame, de la *salsepareille rouge*, Bromure d'ammonium, Gardénal.

Action thérapeutique. — Synergie médicamenteuse à faibles doses, sous forme liquide. Spécialement aérophagie, vomissements incoercibles, spasmes intestinaux, etc., etc.
Sans contre-indication.

Indications. — Le spasme sous toutes ses modalités.

Mode d'emploi. — XXV à XXX gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée, de préférence avant les repas ou 2 heures après.

Prix : 20 fr. 20 le flacon. Pour 20 jours de traitement.

Laboratoires ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe.

78, cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

GOUTTES BERNAMONT

Les *Gouttes Bernamont* (Hamamélis, Marron d'Inde, Noix vomique, Viburnum) complètent le traitement local par la *Pommade Bernamont* dans le cas d'ulcères variqueux et favorisent toujours l'amélioration de tous les troubles de la circulation veineuse.

Indications. — Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Phlébites, etc.

Mode d'emploi. — On les utilise à la dose de XX gouttes dans 1/2 verre d'eau à chacun des principaux repas.

Prix : Le flacon pour un mois, 13 fr. 50.

Littérature et Échantillons.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-1.

Laboratoires BERNAMONT

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS

(Tél. : 0-23_Nevers.)

GOUTTES B. O. P.

Hypotensives et diurétiques.

Composition. — Pour 100 gr :

Extrait stabilisé de Olea Europea, 15 gr.

Extrait spécial de Betula alba, 85 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Hypotensives et diurétiques — sans accoutumance — ne contiennent aucun produit toxique.

Indications. — Hypertension, artério-sclérose, urémie, hydropisie, insuffisance rénale, œdèmes cardiaux-rénaux.

Posologie. — X à XX gouttes plusieurs fois par jour.

L'absence de toxicité permet des doses très supérieures à cette moyenne.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1810-1.

Prix au public : 18 fr.

Laboratoires PROCHAM

M. G. PROVENCE, Pharmacien

8, boulevard de Cessole — NICE.

(Tél. : 837-70.)

GOUTTES BRONCHOPHILES ANDRÉ

Composition :

Codéine	0 cgr. 50
Bromoforme	3 cgr. 10
Chloroforme	2 cgr.
Gaïacol.....	2 cgr. 60
Eucalyptol	1 cgr.
Terpinol	5 cgr. 20

Pour une capsule.

Indications. — Toutes affections pulmonaires, toux, bronchites aiguës et chroniques, emphyseme, asthme, gripes.

Posologie. — 2 à 6 capsules par jour.

Prix : 12 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments : 556-6.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

GOUTTES D'ORARGOL-AMICROS

Complexe colloïdal électrique or et argent.

Anti-infectieux général.

L'Orargol (gouttes solution au 1/1 000), par la voie buccale, est un traitement simple et actif des maladies infectieuses ; il agit synergiquement avec toute autre thérapeutique, telle que vaccinothérapie, etc...

L'Orargol est le traitement idéal des maladies infectieuses infantiles.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses, surtout chez l'enfant ; troubles infectieux d'origine intestinale, grippe, etc...

Prescrire. — Gouttes d'*Orargol* : 1 flacon.

Posologie. — XX à C gouttes par jour, dans une boisson quelconque. Ces doses peuvent être doublées si cela est nécessaire.

Pour les adultes : 1 cuillerée à café, 2 fois par jour.

Prix : flacon de 60 gr. : 23 francs.

Laboratoire AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS

GOUTTES ERYL

Traitement *per os* des affections de la muqueuse laryngo-trachéo-bronchique.

Composition. — Synergie phytothérapique complète (Euphorbe, Coca, Rubus fruticosus, Aconit Napel, Belladone, Roses de Provins), à base d'Erysimum (Herbe aux Chantres).

Action thérapeutique. — Analgésique, décongestive, Antispasmodique et tonifiante (action élective sur les cordes vocales).

Indications. — Toux quinteuses, rebelles, coqueluchoïdes. Laryngites, trachéites, grippe, coqueluche, bronchites.

Mode d'emploi :

Adultes : XXXV à LX gouttes ; 5 à 6 fois par jour.

Enfants : V à XV gouttes ; 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau ou d'infusion.

Durée du traitement : 10 à 30 jours.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

GOUTTES HYPOTENSIVES FRAISSE

Composition :

Extrait de Viscum Album.. 0 gr. 05

Nitrite de Soude 0 gr. 01

pour 1 cc.

Indications. — Hypotenseur.

Artériosclérose, Hypertension artérielle, Hémoptysies.

Formes. — Gouttes (flacon de 24 cc.) ; Ampoules (boîte de 12 ampoules de 1 cc.).

Posologie. — Gouttes : XX à XXV gouttes avant les repas. Ampoules : 1 ampoule tous les 2 jours dans le tissu musculaire.

Prix : GOUTTES, le flacon : 16 fr. 30 ; AMPOULES, la boîte : 19 fr. 50 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-6.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

GOUTTES IONISÉES A

Propriétés. — Diminuent l'alcalinité des humeurs qu'elles acidifient, augmentent l'activité physiologique générale, combattent l'auto-intoxication en amplifiant l'oxydation.

Composition. — Phosphate et chlorure d'ammonium, Chlorure de sodium et Acide Phosphorique.

Indications. — Etat d'asthénie, Alcalose et les troubles liés au déséquilibre acide-base, Collibacillose, Dermatoses, Lithiase Rénale, Insuffisance hépatique.

Présentation. — Flacon de 40 gr. Durée : 25 jours.

Posologie. — XV à XXX gouttes matin et soir avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Prix : 20 francs.

Enregistré au L. N. C., n° 1734-2.

Laboratoires BIOS

10, rue Vineuse — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 57-44.)

GOUTTES LECONTE

Composition. — Orthoformiate d'éthyle, Codéine, Teintures de Grindélia, Polygala, Aconit, Drosera, Belladone, Bryone.

Indications. — Toux spasmodiques, Grippe, Trachéite, Coqueluche.

Posologie :

Adultes : LX gouttes 5 à 6 fois par jour.

16 à 20 ans : XLV à L gouttes 5 fois par jour.

12 à 16 — : XXV à XL — 4 —

6 à 12 — : XV à XXV — 4 —

2 à 5 — : X à XII — 3 —

Échantillons sur demande.

Prix : 17 fr. 35.

Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

GOUTTES LINOBER

Indications. — Toux nerveuse, Trachéite, Pharyngite, Laryngite, Asthme, Coqueluche, Toux quinteuse des vieillards.

Formule :

β-dichloroéthane ...	0 gr. 02
Propanone.	} aa q. s. pour L gouttes.
Teinture de grindelia	
Teinture de drosera.	
Essence de menthe.	q. s. pour aromatiser.

Posologie :

Administrer 3 fois par 24 heures : à chaque fois :					Total pour 24 heures :	
Enfants de 1 an à 2 ans	de 6 à 7	gouttes	de 18 à 21	gouttes		
— 2 — à 3 —	de 9 à 10	—	de 27 à 30	—		
— 3 — à 4 —	de 12 à 15	—	de 36 à 45	—		
— 4 — à 7 —	de 20 à 25	—	de 60 à 75	—		
— 7 — à 14 —	de 25 à 30	—	de 75 à 90	—		
Au-dessus de 14 —	de 40 à 50	—	de 120 à 150	—		
Adultes	de 60 à 70	—	de 180 à 210	—		

Il s'agit de doses moyennes qui peuvent être augmentées ou même doublées sans aucun inconvénient, les gouttes Linober ne contenant aucune substance toxique.

Seules contre-indications : Diabète, Acétonurie.

Mode d'emploi. — Les Gouttes Linober doivent être prises de préférence en dehors des repas.

On peut les absorber directement sur 1 ou 2 morceaux de sucre ou, mieux, diluées dans un peu de liquide, sucré ou non (eau, infusions, etc...).

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

GOUTTES MAGALO

Composition. — Solution de chlorure de magnésium pur à 50 p. 100 superactivé par un sel de manganèse.

Mode d'action. — Médicament d'équilibre minéral, tonique, cholagogue ; de goût agréable, bien supporté par l'estomac ; la plus économique de toutes les préparations similaires.

Indications. — Affections du foie et de l'estomac, **asthénies**, verrues, cancer.

Prix : 15 fr. 90.

Durée : 25 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 34-68.)

GOUTTES MALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée, dans un solvant hydroglycériné.

Avantages. — Calmant certain et rapide de toutes les toux. Véritable spécifique de la Coqueluche. Non toxique, même pour les nourrissons. Goût agréable.

Indications. — Coqueluche, toutes les toux.

Posologie :

Doses minima :

Nourrissons : avant 6 mois, III gouttes toutes les 3 heures.

De 6 mois à 1 an : III gouttes toutes les 2 heures.

Enfants : de 1 à 2 ans : VI gouttes toutes les 2 heures.

— — 2 à 4 ans : IX — — —

— — 4 à 6 ans : XII — — —

— — 6 à 10 ans : XV — — —

Adultes : XX à XXX gouttes toutes les 2 heures.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

Dans les *bronchites*, *toux nocturnes*, donner une potion expectorante dans la journée et le soir une seule dose massive de Gouttes Malone (XL à LXXX gouttes, chez les adultes, XV à XL gouttes chez les enfants suivant les résultats obtenus).

Prix : 16 fr. 75.

Laboratoires du MALONE

J. VINCENT, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure). Tél. : 18.

GOUTTES NÉVROSTHÉNIQUES FRAISSE

Composition :

Glycérophosphate de Soude 0 gr. 10
Cacodylate de Strychnine 1/2 mill.
pour 1 cc.

Indications. — Dynamogénique puissant, active la phagocytose.

Asthénie, Neurasthénie, Adynamie.

Forme. — Gouttes (flacon de 24 cc.).

XXV gouttes par jour dans un peu d'eau avant les repas.

Prix : le flacon : 16 fr. 30 (15 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-5.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

GOUTTES NICAN

(Sans sucre.)

Composition. — Bromoforme et Codéine purs, Aconit, Belladone, Drosera, Grindélia, Benzoate de Soude, Eau de Laurier-cerise.

(IV Gouttes = I goutte de Bromoforme *stabilisé*)

Caractéristiques. — Association synergique des principes médicamenteux reconnus les plus efficaces de la toux spasmodique, ramenés par un procédé spécial à un très faible volume et parfaitement dissous. La présentation par gouttes permet la précision du dosage clinique et fractionné à tous les âges, assure la continuité du traitement, et garantit contre les accidents dus à l'insolubilité du bromoforme.

Effet rapide et persistant, souvent surprenant. Tolérance parfaite.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général ; Coqueluche, Grippe, Toux des Tuberculeux, Asthme, Toux laryngées, Adénopathie trachéo-bronchique, Coryza, Toux rebelles. Hoquet persistant, Dysménorrhée, etc.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans une tasse de liquide tiède, eau, grog, ou lait (enfants) qu'on agitera en ajoutant les gouttes.

L'emploi, avec une tasse de lait tiède sucré, supprime en majeure partie le goût du bromoforme désagréable à certains malades.

Doses moyennes par jour en 4 fois : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Adultes : CCXL gouttes.} \\ \text{Enfants : XII gouttes par année d'âge.} \end{array} \right.$

Calme et repos immédiats, et dans les toux grippales, iugulation souvent en quelques heures.

Dans la COQUELUCHE, doses fractionnées et croissantes.

Médication permettant l'emploi du bromoforme chez les enfants en bas âge.

Doses initiales : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Adultes : CXX gouttes.} \\ \text{Enfants : VIII gouttes par année d'âge.} \end{array} \right.$

A prendre en 3-4 fois par jour, après une quinte. Augmenter progressivement pendant les huit premiers jours.

Consulter la posologie détaillée par âge, dans la notice jointe au flacon.

N. B. — En cas de recrudescence des quintes ou de somnolence accentuée, cas excessivement rares, interrompre le traitement pendant 24 heures. Puis continuer la progression ascendante, si nécessaire.

Voir **COMPRIMÉS NICAN** à base de Chlorhydrate d'Ethylmorphine (Dionine N. D.) 0,01 et benzoate de soude.

Laboratoires CANTIN, à PALAISEAU (S.-et-O.).

GOUTTES PHOSPHOSTHÉNIQUES DAUSSE

Administration de la strychnine, par voie gastrique, à doses progressives, en association avec l'acide phosphorique officinal.

XX gouttes renferment :

1 milligramme de sulfate de strychnine ;

III gouttes d'acide phosphorique officinal.

2 cgr. d'extrait de quina ;

2 cgr. d'extrait de Coca.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, adynamie des convalescents, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Posologie. — Débuter par X gouttes à chacun des deux principaux repas et progresser chaque jour de V gouttes. On suspendra le traitement à l'apparition des symptômes de saturation. On peut atteindre progressivement des doses de C et même CC gouttes par repas. *Éviter tout arrêt dans l'administration progressive du médicament.*

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

Gouttes PILKA

(Pilka Golaz ou Thymipin.)

Composition. — Les gouttes *Pilka* sont essentiellement composées des dialysés de Thym, Grassette et Drosera (absolument sans danger pour les nourrissons).

Propriétés. — Action élective spéciale due aux constituants des plantes entrant dans cette préparation.

Indications. — A recommander dans la *coqueluche* et les *toux convulsives* des enfants et des adultes, ainsi que les *toux des tuberculeux* et les *affections des bronches* en général : bronchite, pneumonie, asthme.

Mode d'emploi. — On donne 2 à 3 fois par jour : aux *nourrissons* I à V gouttes ; aux *enfants*, V à X gouttes, et aux *adultes*, X à XXX gouttes dans un peu d'eau ou tisane.

Produit ZYMA

Dépôt général : **Laboratoires LOBRU**

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

GOUTTES SAP

Médication symptomatique de la Coqueluche.
Toux nerveuse, Asthme, Trachéite.

Formule. — Aconit, belladone, jusquiame, digitale, lobélie, drosera, grindelia, eucalyptus, thym, québraco, associé au bromoforme dissous et à la Créosote de hêtre (sans Codéine).

Avantages :

1° Action antispasmodique et anticatarrhale énergique (diminution très rapide des quintes) ;

2° Pouvoir antiseptique et bactéricide puissant ;

3° Action dynamogénique secondaire de la créosote ;

4° Absolument inoffensif, même chez les tout-petits.

Doses. — Toutes les 2 heures, dans une cuillerée de lait ou d'eau sucrée :

Enfants	{	Au-dessus de 1 an	II gouttes
		De 1 à 2 ans	III —
		De 2 à 3 ans	IV —

Au-dessus I goutte en plus par année d'âge.

Adultes : XX gouttes 5 fois par jour.

Echantillons sur demande.

Le flacon : 16 fr. 50.

Paul AUGIER, Pharmacien

Ex-interne des hôpitaux de Paris,

2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 09-04.)

GOUTTES TRINA

Solution titrée de citrate trisodique pur officinal.

Les GOUTTES TRINA offrent au médecin une solution de citrate trisodique titrée et stable.

Sa forme liquide et sa concentration permettent un emploi facile et en même temps rigoureusement précis, particulièrement chez les nourrissons.

X gouttes correspondent à 0 gr. 20

C — = 5 cc. correspondent à 2 gr.

Action digestive. — Contre les vomissements des nourrissons, V à X gouttes 4 fois par jour avant le biberon ou la tétée.

Action anticoagulante. — Phlébites, thrombo-artérites, pleurésies, etc...

XXX à LX gouttes, 2 à 3 fois par jour.

Action antiacide. — Dans les dyspepsies.

Selon indications médicales.

Flacon avec compte-gouttes spécial : 16 fr. 50.

N° 1746-1 du Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Préparateur : Robert GRAY, Pharmacien

MONTMIRAIL (Marne). (Tél. : 3.)

GOUTTOLYSINE

Sans colchique. Sans produits chimiques.

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Rhumatisme articulaire et complications cardiaques, Goutte (accès ou maladie constitutionnelle), Sciatique, Lumbago, Maladie de Bouillaud.

Composition. — A base d'extraits de Bruyère, Hieble, Barbiflore, Ulmaire.

Innocuité absolue sur l'estomac, le Foie et les Reins. Aucune contre-indication.

Liquueur agréable à absorber. Le flacon de 250 gr.: 17 fr. 80.

Posologie. — Une cuillerée à soupe matin, midi et soir.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 971.

Laboratoire ALPHA

MONTREUX-LE-CHATEAU (Haut-Rhin).

GRAINS DE VALS

Composition végétale et opothérapique.

Podophyllin 0,01.

Cascara et Bourdaine (extrait) à 0,025,

Belladone (extrait), 0,01.

Bile 0,02, Erep sine 0,01, Entérokinase 0,01.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif régulateur de l'intestin ne donnant pas de coliques, pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, embarras gastrique ; les grains de Vals décongestionnent le foie et la vésicule biliaire.

Pas de contre-indications.

Laboratoire H. NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

LES GRANIONS

Diastases métalliques de synthèse.

Procédé E. FOUARD, docteur ès sciences.

Propriétés essentiellement nouvelles.

1° Conservation indéfinie sans altération de l'état colloïdal et des propriétés thérapeutiques.

2° Suppression de la réaction du choc.

Communications : Académie des sciences, 7 février 1927,

Congrès de Lyon (avancement des sciences), 1926.

Granions			La boîte
As	Paludisme, Tuberculoses, dermatoses, anémie, dénutrition, etc. Anorexie, Rachitisme.	Ampoules de 2 cc. voie buccale, inject. intramusculaires et intraveineuses.	21. »
Argent simple et double	Infections générales, Angines locales. Septicémie, furunculose, fièvre puerpérale, grippe, sinusites, mastoidites, etc.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses. Ampoules argent doubles de 5 cc.	23.35 21. »
Cuivre	Cancer, angiocholites, cholécystites.	Ampoules de 2 cc. voie buccale.	21. »
Bismuth	Syphilis.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses.	23.35
Mercure	Syphilis.	id.	21. »
Iode	Hypertension, rhumatismes, syphilis, artério-sclérose.	En ampoules de 2 cc. pour injections, en solution pour voie buccale.	21. » 16.30
Soufre	Sciatique, acné, rhumatismes.	En flacon : voie buccale.	29.15
Or simple et double	Tuberculose, infections générales, locales. Rhumatismes.	Ampoules de 2 cc. injections intramusculaires et intraveineuses.	29.15
Osmium	Cancer.	Ampoules de 2 cc. injections	29.15
Magné- sium	Cancer.	intraveineuses, intramusculaires, voie buccale.	21. »
Uranium	Cancer.		29.15

M. L. BARBAN, Docteur en pharmacie

61, rue Gaston-Lauriau — Montreuil (Seine).

Dépôt général : Laboratoires DALET

24, avenue Mathurin-Moreau

PARIS (XIX^e).

Littérature et Échantillons sur demande.

GRANUCHOL

Granulé soluble, agréable au goût.

Formule. — Sulfate de Magnésie, 250 gr. ; Hyposulfite de Soude, 35 gr. ; Bromure de Potassium, 50 gr. ; Peptones (viande, white, lait, œufs), 80 gr. ; Orthosiphon Stamineus, 5 gr. ; sucre parfumé au citron : Q. S. p. 1 000.

Cholagogue complet (cholécystokinétique et cholérétique) *désensibilisant, calmant total, sans affinité végétative spéciale.*

Indication. — Hépatisme sous toutes ses formes, dans toutes ses complications.

Prix : 18 fr. 85.

Laboratoires de GRANUCHOL

S. LALLEMAND et Cie, Pharmaciens
42, rue de Paris — PANTIN (Seine).

GRANULÉ CABASSON

Reconstituant biologique rationnel.

Composition. — *Aucun élément toxique. Aucune contre-indication :* Gluconate de Chaux, Phosphate bicalcique, Glycéro de soude, Nucléinate de fer et manganèse : tous ces éléments minéralisants en présence de traces de chlorure de magnésium qui intervient comme agent fixateur.

Extrait de Kola correctif des états d'asthénie cardiaque.

Propriétés thérapeutiques. — Apporte aux organismes jeunes les principaux éléments constitutifs du squelette, du muscle et du milieu sanguin, sous la forme la plus assimilable et la plus agréable. Complète cette action minéralisatrice par des éléments stomachiques qui excitent l'appétit et stimulent le cœur.

Action nettement recalcifiante. Favorise l'assimilation.

Indications :

- 1° Croissance et toutes maladies osseuses.
- 2° Grossesse et allaitement.
- 3° Surmenage physique et intellectuel : convalescences, inappétence.
- 4° Débilités congénitales.

Posologie. — Granulé à croquer.

1 cuillerée à café avant ou après chacun des 2 principaux repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoire des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, pharmacien,
183, rue de Rome — MARSEILLE.

GRANULÉ EDGÈS

Laxatif-désensibilisant.

Composition. — Hydrate de magnésie, lactose, citrate de soude, hyposulfite de magnésium.

Forme. — Granulé fondant, immédiatement soluble, d'un goût très agréable.

Propriétés. — Laxatif par tous ses éléments, désensibilisant par son hyposulfite de magnésium. Excite doucement les fonctions intestinales et biliaires.

Avantages. — Facile et agréable à prendre. Action douce, toujours certaine. Ne provoque jamais de colique, pas plus que de congestion ou d'irritation hépatobiliaire.

Indications. — Constipation, Congestion du foie, Insuffisance biliaire, Manifestations anaphylactiques, troubles gastro-hépatiques.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 13 fr. 90.

Laboratoires STELVIA

Georges BLAQUE,

Docteur en pharmacie, Licencié ès Sciences,
59, rue Boissière — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Kléber 88-70.)

GRANULÉ SALICYLÉ DAUSSE

Teneur :

Salicylate de soude..... 0 gr. 60

Bicarbonate de soude..... 0 gr. 20

Par cuillerée à café.

Propriétés et indications thérapeutiques. —

Rhumatisme articulaire aigu, franc, fébrile, seule affection où le salicylate ait une action médicamenteuse certaine.

Posologie. — 4 à 6 cuillerées à café par jour ou davantage sur indication du médecin.

Le Salicylate de soude s'éliminant rapidement, il y a intérêt à administrer le Granulé Salicylé par doses fractionnées, prises toutes les 3 heures, de manière à maintenir l'organisme en état d'imprégnation salicylée continue.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS.

(Tél. : Turbigo 63-40.)

GRANULES CHANTEAUD

(Anciennement Granules dosimétriques.)

Composition :

Granules au milligramme, centigramme, etc., de toute la gamme des produits chimiques, alcaloïdes et glucosides les plus fréquemment employés en thérapeutique.

Présentation :

Flacons de 50 Granules ou boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 Granules.

Doses et mode d'emploi :

A définir et à indiquer par le médecin suivant chaque cas particulier.

Prix de vente, boîte de 200 granules : 12 fr. 75 (taxe comprise).

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

CHAMBOURCY (Seine et Oise).

GRANULÉS DE BOURGET

Présentation. — En boîte métal (15 francs).

Principes actifs. — Sulfate de soude, Phosphate de soude, Bicarbonate de soude, Citrate de soude.

Indications. — Dyspepsie, Aérophagie, Insuffisance hépatique, Constipation, Météorisme et flatulences, Douleurs, Spasmes, Hyperacidité, Vomissements, Affections du foie.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café pour un demi-verre d'eau le matin à jeun ou après les repas, ou au moment des douleurs

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-19.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin, — PARIS (IV^e.)

(Tél. : Turbigo 40-83.)

GRANULES DES VOSGES

Composition. — Aconit, Drosera, feuilles Belladone, Cte Thébaïque et Dioninum.

Indications. — TOUX, Picotements et Mucosités de la Gorge, Rhumes de cerveau, GRIPPE.

Médicament indispensable aux personnes qui, parlant beaucoup, se fatiguent et ont besoin d'un bon tonique des Bronches : Professeurs, Médecins, Avocats, Chanteurs.

Les « Granules des Vosges » sont d'une activité rapide et certaine et, étant d'un petit volume, il est toujours facile d'en avoir sur soi.

Posologie. — 2 granules le matin vers 9 heures, 2 l'après-midi vers 5 heures, 3 le soir en se couchant.

Ne pas en donner aux enfants au-dessous de 6 ans.

Prix : Le flacon de 50 granules : 11 fr. 45.

Laboratoire G. BERNHARD.

11, rue Lafayette — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 07-86.)

GRANULOCHRYSINE LUMIÈRE

Granulothérapie Chimio-active

La Granulochrysine est une suspension d'aurothioéthane-sulfonate de calcium dans le sérum physiologique.

La solubilité de ce sel est fort réduite, et il a ce caractère particulier qu'injecté par voie intraveineuse il réalise tout ensemble une *granulothérapie indifférente*, comme celle qu'on réalise par exemple avec le carbone, et une *granulothérapie chimio-active* spécifique du médicament aurique injecté.

C'est, somme toute, une association de la chimio-thérapie aurique et de la thérapeutique par corps étrangers introduits dans le torrent circulatoire.

Présenté en ampoules de 5 cmo. contenant chacune 10 centigrs d'aurothioéthane sulfonate de calcium, dont 1,5 milligr. sont dissous et 98,5 milligr. sont en suspension sous forme de grains.

Le diamètre moyen de ces grains est d'environ 1/750^e de millimètre.

Action complexe. — Solubilité dans le sérum sanguin = 0,02 pour mille.

La Granulochrysine Lumière, dont l'innocuité est assurée, établit la **Granulothérapie Chimio-Active** par opposition à la *Granulothérapie indifférente* existant jusqu'à ce jour.

La Granulochrysine Lumière trouve ses indications dans *tous les syndromes infectieux*.

Injectons intraveineuses (une ampoule de 5 cmo.) par séries d'importance variable, mais pouvant atteindre, voire dépasser, 50 injections.

Se vend en boîte de 10 ampoules.

On obtient des résultats optima par des injections quotidiennes.

Innocuité immédiate, pas de dangers secondaires qui pourraient résulter d'un blocage histologique prolongé.

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON

GRAVIDOSTYL

Composition. — Sérum frais de jument gravide.

Indications. — Thérapeutique biologique polyhormonale :

Chez la femme : des insuffisances ovariennes légères.
Hypoménorrhées, Oligoménorrhées, Troubles de la puberté et de la ménopause, Troubles de la grossesse états nauséux, vomissements incoercibles.

Chez l'enfant : des déficiences hormonales complexes.
Prématurés, Nourrissons débiles et hypotrophiques, Retard de croissance du squelette, Paresse intellectuelle, Nervosisme.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 2 ampoules par jour en ingestion ou en lavement. Dans les cas graves : 2 ampoules en injection hypodermique.

Prix : 28 fr. 05.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. Littré 68-22, 23 et 24.)

GRIPPO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur L. DUCHON

Pour administration par voie buccale (Non injectable).

Composition. — Le Grippe-Vaclydun est un Lysat-vaccin polymicrobien. Hormis l'absence du bacille diphtérique, sa formule est la même que celle du *Broncho-Vaclydun*.

Indications. — Le Grippe-Vaclydun est destiné au traitement des infections trachéobronchiques communes et en particulier de la grippe saisonnière, en dehors de leurs complications.

Posologie. — Le Grippe-Vaclydun doit être utilisé exclusivement par voie buccale.

En principe, quel que soit l'âge, la dose est d'une à deux ampoules par jour. Verser le contenu dans un demi-verre d'eau sucrée ou aromatisée au gré du malade.

Cette solution ainsi préparée sera utilisée au plus tard dans la demi-journée.

L'administration se fera :

Chez les *enfants* : en trois fois, une demi-heure avant les repas.

Chez l'*adulte* : en totalité, de préférence à jeun ou une demi-heure avant les repas. Au besoin prendre 2 ampoules par jour.

Présentation. — Le Grippe-Vaclydun est présenté en boîtes de 10 ampoules de 2 cc. de vaccin à ingérer.

Prix : 27 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e). (Tél. : Carnot 78-11.)

GUARAPHOS

Fortifiant. Reconstituant. Apéritif.

Composition. — 1 comprimé contient : Cuarana ext., Inositolhexaphosphates de chaux et de magnésie, Glycérophosphates de chaux et de magnésie, Théobroma cacao sucré.

Propriétés. — Régénérateur des tissus musculaires, nerveux et osseux. Tonique général physique et intellectuel, non toxique.

Indications. — Tous les cas de dépression, de surmenage et de fatigue physiques et intellectuels, Anémies, anorexie, lymphatisme, grippe, convalescences, pré tuberculose, croissance, grossesse et allaitement.

Avantages. — Action tonifiante (sans contre-indications) du Guarana associée à l'action reconstituante des phosphates sous forme assimilable. Action synergique, puissante et rapide. Toxicité nulle.

Forme. — Comprimés chocolatisés agréables au goût.

Posologie. — *Dose moyenne :* Croquer 2 comprimés avant chacun des 2 principaux repas. Boire ensuite un peu d'eau ou de vin.

Laboratoire LOBRU

Louis BRUN, pharmacien.

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

GUBLINE

Formule exactement adaptée à l'**hyperacidité gastrique avec rétention biliaire et constipation.** Bismuth, Magnésie, Phosphate, Charbon suractivé.

Particularités. — Poudre 6 fois tamisée. Pureté chimique. *Sans goût, ni odeur d'officine.* Absence de carbonate et kaolin. Sature l'excès d'acidité sans produire d'alcalinisation déminéralisante.

Chimisme. — En présence d'acides divers de l'estomac, se transforme en $MgCl^2 \cdot 6H^2O$ (chlorure de magnésium à l'état naissant), en CO^2 , chlorure de calcium, acétates de magnésium et de calcium.

Doses. — 1/2 à 1 cuillerée à café avec un peu d'eau à la fin des deux repas.

Prix : 15 fr. 65.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS
(Prov. 20 20.)

GUÉTHURAL

Formes. — Ampoules, Tablettes, Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant modificateur des sécrétions bronchiques, ni caustique, ni irritant. Calme la toux.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections pulmonaires à hypersécrétions. Bronchites, Bronchorrhées. Catarrhes, Grippe, etc.

Mode d'emploi :

Ampoules (Solution aqueuse) : Cas aigus : 1 ampoule tous les jours ; Cas chroniques : 3 à 4 ampoules par semaine.

Tablettes : 6 à 8 tablettes par jour.

Granulé : 3 à 4 cuillerées à café, prises dans l'intervalle des repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 43-6, 43-8, 43-9.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUCC

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. Défense 09-71.)

GUI GMET

Liquide sans alcool ni éther.

Composition. — Extrait total du *Viscum album* sous forme liquide ; mieux assimilable que les pilules. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Régulateur cardiaque et artériel, Hypotenseur, Diurétique, Vaso-dilatateur.

Indications. — Hypertensions, Cardiopathies artérielles, Artério-sclérose, Anévrysmes, Hémoptysies, Hémorragies, Eclampsie (dans la grossesse fait baisser l'albuminurie).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, 1 ou 2 fois par jour, entre les repas.

Le flacon pour 1 mois. 135 cc. : 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

GUIGOZ (Lait en Poudre)

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse), est livré sous trois formes : Lait complet ; Lait demi-écrémé ; Lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, **conserve indiscutablement toutes ses vitamines** et dispense de l'adjonction de jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons.* — Diététique idéale des bébés privés partiellement ou totalement du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes: Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : { **Babeurre GUIGOZ.** Lait dextrosé-malté GUIGOZ.
Ravix (lait irradié). Lait déchloruré GUIGOZ.

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

GUIMELINDE

(Gouttes hypotensives.)

Composition. — Extraits fluides de gui, d'aubépine, d'hamamélis et de marrons d'Inde associés au nitrite de soude.

Propriétés. — Hypotenseur, par action centrale sur les vaso-dilatateurs, action due au gui, à l'aubépine et au nitrite de soude rendu stable par un procédé spécial.

Indications. — Artériosclérose, Hypertension artérielle, Etats congestifs, Vertiges, Bourdonnements, Troubles de la circulation du sang. Toutes affections du système veineux, Phlébites, Varices, Hémorroïdes.

Posologie. — XX gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau, avant le repas. Ces XX gouttes contiennent 1 cgr. de nitrite de soude et correspondent à 0 gr. 10 de plantes sèches.

Laboratoire de la GUIMELINDE

A. VERGER, Pharmacien
ANCENIS (Loire-Inférieure).

GUILOSE

Hypotenseur végétal aux principes actifs du *Viscum album*.

Forme et dosage. — Pilules dosées à 0 gr. 05.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour entre les repas, par périodes de dix jours.

Indications. — Artériosclérose, hémoptysie, goutte, troubles de la ménopause, néphrosclérose.

Prix. — L'étui de 60 pilules : 11 fr. 50.
L. N. C. n° 1207-5.

Échantillons et vente en gros :

Laboratoire PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON

Dr A. IMBERT, Pharmacien

(Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire pour Paris : **E. MOREAU, Ph¹^{er}**

13, rue des Nonnains-d'Hyères.

(Tél. : Turbigo 87-05.)

GYNAICÉOL

1° Forme liquide :

Pour une cuillerée à soupe de 15 gr. :

Formol	0 gr. 90
Naphtol B.....	0 gr. 01
Soluté savonneux neutre à la dose d'une cuillerée à soupe dans 1 ou 2 litres d'eau bouillie.	

2° Forme poudre :

<i>Sachet bleu :</i>	{ Helmitol	1 gr. 50
	{ Acide borique.....	3 gr. 50
<i>Sachet blanc :</i>	{ Persulfate de potas-	
	{ sium	2 gr.
	{ Carbonate de soude.	1 gr. 50
	{ Borate de soude..	1 gr. 50
	{ Essence de géra-	
	{ nium Q. S.	

Mode d'emploi : dissoudre en même temps dans 1 ou 2 litres d'eau le contenu d'un sachet bleu et d'un sachet blanc, donnant à la dissolution :

Formol à l'état naissant.....	0 gr. 25
Oxygène à l'état naissant calculé en H ² O ²	8 gr. 50
La boîte contient 12 sachets bleus et 12 sachets blancs.	

Indications. — *Maladies des femmes, métrites, leucorrhée. Hygiène intime.*

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON

**Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris**

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

GYNARSOL

Poudre antiseptique spécialement créée pour l'hygiène intime de la femme et le traitement des affections génitales.

Composition :

Stovarsol	0 gr. 01
Nitrate de Potasse	0 gr. 01
Chlorate de Potasse	0 gr. 10
Chloramine T.....	0 gr. 05
Bicarbonate de Soude Q. S. ...	7 gr.

Indications. — Hygiène journalière de la femme, Leucorrhée, Vaginite, Métrite, Salpingite.

Mode d'emploi. — Pour injections vaginales, un sachet par litre d'eau.

Pour lavages externes, un sachet pour 2 litres d'eau.

La boîte de 30 sachets : 10 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-32.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 39-44.)

GYNÉCO-VACLYDUN

Lysat-vaccin du Docteur DUOHON

Composition. — Entérocoques, Diplocoques de NEISSER, Colibacilles, Streptocoques et Staphylocoques.

Indications. — Infections communes des organes génito-urinaires, Métrites aiguës, Métrites chroniques, même anciennes, Complications annexielles ou péri-utérines.

Posologie. — En injections sous-cutanées quotidiennes de 1 cc. pour débiter, passer progressivement à la dose de 2 cc. Réduire à 2 cc. tous les 2 jours lorsque l'amélioration clinique sera très franche.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 2 cc.

Prix : 27 francs

VACLYDOVULES

Ovules à base de Gynéco-Vaclydun.

Prix : La boîte de huit ovules : 20 francs.

Laboratoire pharmaceutique OORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (Carnot 78-11.)

GYNEPTA

Composition. — Di-hydro-folliculine ; Méthylarsinate de Manganèse ; Florure de Sodium ; Elixir de jus de Raisin.

Propriétés. — Hormone ovarienne assimilable par voie buccale grâce à un traitement spécial par un élément catalyseur d'hydrogénation. Son action est renforcée par les éléments organiques et minéraux qui lui sont associés et par la richesse du véhicule choisi en diastases et vitamines.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance de la fonction ovarienne : puberté, aménorrhée, dysménorrhée, ménopause et les troubles associés : migraines, palpitations, etc.

Présentation et prix. — *Elixir*, le flacon : 20 francs.

Posologie. — *Adultes* : un verre à Bordeaux avant chaque repas. *Fillettes* : demi-dose.

L. N. C. M. : N° 1142-3.

L'action physiologique du Gynepta a été officiellement reconnue par le Laboratoire National d'Analyse physiologique de la Faculté de Pharmacie de Paris.

Laborat^{res} BOURDOU, FRONTIGNAN (Hérault) Tél. : 21.

GYNERGÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Tartrate d'Ergotamine, alcaloïde cristallisé isolé de l'ergot de seigle. Produit pur, exactement dosable.

Formes. — Ampoules : 1 cc. d'une solution à 1/2 pour mille de tartrate d'ergotamine ; injections intramusculaires et sous-cutanées. — Solution à 1 p. 1 000. — Dragées à 1 mgr. de tartrate d'ergotamine.

Propriétés thérapeutiques. — Hémostatique utérin et sédatif électif du sympathique. Effets constants.

Indications. — Toutes hémorragies utérines (atonie utérine, cancer et fibrome). — Les sympathicotomies, migraines, tachycardies, accidents sériques, atonie gastrique, le Basedow.

Posologie. — 1/4 de cc. à 1 cc. à la fois ; XV à XXX gouttes ou 1 à 2 comprimés, 2 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

GYNOCALCION

Forme M. — Traitement rationnel des troubles de la *Ménopause* naturelle, chirurgicale ou radiothérapique chez la femme, de l'aménorrhée, de la sclérose utérine.

Forme P. — Traitement des accidents de la *Puberté* chez la jeune fille.

Propriétés. — Agit sur le tonus du système vago-sympathique par son lactate de calcium et de manganèse ; agit par son phosphore sur l'élément douleur ; supplée à la déficience glandulaire par ses extraits opothérapiques (extraits ovarien et orchitique).

Le *Gynocalcion P* agit en outre par son Hypophyse (*hormone gonadotrope*) sur le développement général et le fonctionnement ovarien de la jeune fille.

Doses. — *Gynocalcion M.* — 9 à 12 dragées par jour, huit à dix jours par mois. Dans les formes rebelles, et surtout dans les ménopauses chirurgicales, deux séries par mois séparées par un repos de huit jours.

Gynocalcion P. — 9 à 12 dragées par 24 heures en séries de dix jours par mois.

Effet rapide. Tolérance parfaite.

Prix : 25 francs.

Échantillons, Littérature :

LABORATOIRES CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS. (Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

GYNÆSTRYL

Thérapeutique hormonale de la femme.

Voie buccale : A l'état de Di-Hydro-Folliculine.

1° *Solution hydro-alcoolique* :

a) Flacon de 10 cc. contenant 1/10 de mgr. d'hormone par cc. (L gouttes).

b) Flacon de 20 cc. contenant 1/10 de mgr. d'hormone par cc. (L gouttes).

2° *Comprimés dosés* à 1/40 de mgr. d'hormone :

a) Boîte de 40 comprimés.

b) Boîte de 80 comprimés.

Le *Gynæstryl* doit être administré en 3 ou 4 prises, à n'importe quel moment de la journée.

Prix :

Flacon ou boîte de comprimés (petit modèle) : **22 fr. 25.**

Flacon ou boîte de comprimés (grand modèle) : **39 fr. 80.**

Voie percutanée : *Ecto-Gynæstryl* (alcoolat et pommade).

Tube de pommade : **28 fr. 55.**

Flacon de solution : **40 fr. 80.**

Voir *Benzo-Gynæstryl* et *Benzo-Gynæstryl 5*.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (IV°).

(Tél. : Littré 58-43.)

GYNO-GOUTTES ISCOVESCO

Définition :

Solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant **la totalité des hormones** spécifiques de l'ovaire.

1 cc. correspond à 10 gr. d'ovaire frais.

Posologie :

XV à XX gouttes par jour (selon les indications du médecin) dans un peu d'eau en dehors de la période cataméniale

Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
Tél. : Alésia 04-39.

GYNO-LACTOSMOSE

Injection vaginale iso-acide pH : 4,5.

Formes :

Une *poudre* désinfectante : bacilles lactiques sur lactose.
Un *liquide* physiologique : glucose et acide lactique.

Emploi.

UNE MESURE DE POUDRE, UNE MESURE DE LIQUIDE PAR LITRE D'EAU. Verser dans le bœck : la dissolution est immédiate. Injection de 1 litre prise lentement et sans pression.

Le *liquide*, solution concentrée, ne doit jamais être employé pur.

Les échantillons ne contenant pas de mesure, utiliser une cuiller à café.

Action.

L'emploi d'antiseptiques dans le vagin est contre-indiqué : Pourquoi détruire la flore normale ? L'emploi d'alcalins est antiphiysiologique : Pourquoi saturer une acidité protectrice ?

Gyno-lactosmose, solution physiologique et biologique au même dosage d'acide lactique pH : 4,5 que le vagin, remplace les antiseptiques et les alcalins.

Gyno-lactosmose désodorise, tarit la leucorrhée, décongestionne la muqueuse, régénère la flore et l'acidité normales, reconstitue l'état physiologique du vagin sain.

Indications. — Toutes leucorrhées, Vaginites, métrites, infections gynécologiques, vaginites séniles, prurit vulvaire. Troubles menstruels. Suites de couches d'électro-coagulation, de blennorragie. Néos.

Préparation et suites opératoires.

<i>Petit modèle</i> (15 injections).....	20 fr.
<i>Modèle moyen</i> (22 injections).....	25 —
<i>Grand modèle</i> (50 injections).....	38 —
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 768.	

OVULE au LACTOSMOSE ou Bouillie Lactique.
(Voir à Ovules.)

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE (Eure).
Bureaux 26, boulevard des Batignolles — PARIS
(Tél. : Marcadet 21-14.)

GYNOMÉTINE

Comprimés.

Composition. — Polyoxyméthylène et Perborate de soude, Alun, dans mélange alcalin effervescent.

Posologie. — 1 à 2 comprimés par litre d'eau pour injections vaginales.

Indications. — Antiseptique gynécologique, Métrites, Leucorrhées, etc.

Prix : 15 fr 50 la boîte de 30 comprimés.

Laboratoire RICHER
Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

GYNOPLIX

Composition. — *Stovarsol* (nom déposé) et hydrates de carbone.

Forme. — *Pansement vaginal sec* (comprimés friables renfermant chacun 0 gr. 25 de stovarsol).

Propriétés. — Modificateur du milieu, empêche la prolifération parasitaire, rétablit l'état normal des muqueuses : Favorise la production d'acide lactique.

Réussit dans les cas où les antiseptiques plus ou]moins irritants ont échoué.

Indications. — *Pertes blanches de toutes origines*, entre autres : leucorrhée due à des troubles généraux ; leucorrhée due à des irritations ou infections ; leucorrhée de la grossesse, et, électivement, *vaginites à trichomonas*.

Mode d'emploi. — Chaque jour, après toilette de la région, introduire profondément dans le vagin — de préférence le soir au coucher — un ou deux comprimés de *Gynoplax*.

Utiliser deux comprimés ou plus au début, diminuer le nombre de comprimés et espacer les applications dès qu'une amélioration est constatée.

Boîte de 20 comprimés.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
« **THERAPLIX** »

98, rue de Sèvres, PARIS (VII^e).
Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

GYPSOL

Antiseptique général, ni irritant, ni toxique pour l'usage externe et désodorisant par dégagement d'oxygène et d'aldéhyde formique à l'état naissant.

Forme. — Comprimés.

Ovules (Gypsovules).

Composition :

Comprimés : borate de soude, trioxyméthylène, acide benzoïque, thymol.

Ovules : essence thym, glycérine.

Indications. — Affections gynécologiques, leucorrhées, métrites, salpingites, lavage des plaies, pansements antiseptiques, angines.

Posologie. — *Comprimés* :

Pansements humides, lavage des plaies, gargarismes : un comprimé pour 1 litre d'eau.

Injectons vaginales : un comprimé pour 2 litres.

Nota : Avoir soin de faire dissoudre dans l'eau chaude.

Ovules : un le soir au coucher.

Prix. — Comprimés : 9 fr. 40.

Ovules : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

HALIFLÉTOL

Composition. — Huile de foie de flétan pure, titrée, extra-riche.

Avantages. — La plus forte teneur naturelle en vitamines A et D.

100 fois plus active que l'huile de foie de morue. Digestibilité parfaite. Goût agréable.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (rachitisme, croissance, anémie, toutes déficiences).

Posologie. { *Bébés* : I goutte 2 fois par jour.
Enfants de 3 à 14 ans : III gouttes avant chaque repas.
Adultes : IV ou V gouttes avant chaque repas.

A prendre dans un quartier d'orange, un peu de bière, ou autrement.

Présentation et prix :

17 fr. 85 le flacon de 6 cc. (durée minimum : 15 jours).

Laboratoires du D^r NARODETZKI

19, boulevard Bonne-Nouvelle — Paris (2^e).
 (Tél. : Louvre 35-36.)

HALIVITE

Vitamines Seclo.

Huile naturelle de Flétan (Halibut) titrée biologiquement, contenant : Vitamine A, 60.000 unités internationales ; Vitamine D, 3 000 unités internationales (par gramme).

Présentation. — Dragées et gouttes. Permettent l'absorption des Vitamines A et D à haute dose, sous un faible volume. Faciles à prendre, surtout sous la forme dragées, ne provoquent aucun dégoût ni troubles digestifs.

Indications. — Avitaminoses diverses, Débilité générale, Rachitisme, Prétuberculose, Lymphatisme, Xérophtalmie, Troubles de la croissance, Dentition, Grossesse, Allaitement, Convalescence, Surmenage.

Posologie :

Adultes : 2 à 5 dragées ou XV à XX gouttes par jour.

Enfants : I à 2 dragées ou VI à XIII gouttes par jour.

Nourrissons : II à III gouttes par jour.

Prix : Le flacon compte-gouttes de 5 cc : 20 francs. La boîte de 30 dragées : 20 francs.

Laboratoires SECLO

J.-P. Pinta, Pharmacien,

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Wagram 62-71.)

HAMAMÉLINE ROYA

Principe actif aromatique de

l'Hamamelis virginica, en solution aqueuse.

Obtenue directement de la plante, contient en dilution convenable (20 cgr. p. cuill. à soupe) l'Huile Essentielle aromatique, véritable principe actif de la plante, à l'exclusion de l'extractif, inerte au point de vue vasculaire.

Propriétés. — Vaso-constricteur, Tonique des fibres lisses, Sédatif vasculaire, Stimulant circulatoire.

Indications. — Toutes les dilatations, congestions et inflammations veineuses (Varices, varicocèles, hémorroïdes, phlébites aiguës et anciennes). Troubles circulatoires utérins (Ménorragies, Dysménorrhée, Accidents congestifs de la Ménopause).

Dose. — Par cuill. à soupe : 2 à 4 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix : 21 fr. 75.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

21, rue de Madrid, Paris (VIII^e). (Tél. : Lab. 08-00.)

HAMAMÉLIODE

Combinaison stable et définie de l'iode métalloïdique aux principes totaux de l'*Hamamelis virginica*.

Indications. — Maladies du système vasculaire.

Varices, Phlébite.

Hémorroïdes.

Troubles congestifs de la Ménopause.

Artério-sclérose.

Rhumatisme chronique.

1^o Gouttes concentrées. — De XXX à LX gouttes par 24 heures. Dans certains cas d'hémorroïdes enflammées C et même jusqu'à CL gouttes *pro die*, ce qui procure un soulagement immédiat ; revenir à la dose d'entretien de LX gouttes par jour.

2^o Élixir (Préparation très agréable au goût). 2 à 3 cuillerées à soupe dans les 24 heures, de préférence à la fin des repas.

Laboratoire OBERLIN

J. Tinardon,

Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris,
17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

HAMAMÉLIS GMET

Composition. — Extrait total et sans alcool de l'*Hamamelis Virginica*. Correspond à 2 gr. de plante fraîche par cuillerée à café.

Propriétés. — Vaso-constricteur, décongestif d'autant plus puissant que la préparation est sans alcool. Plus actif que les cachets de poudre et les comprimés. Bien préférable aux extraits alcoolisés (teintures, élixirs, etc.).

Indications. — Tous les troubles congestifs ou veineux.

Posologie. — 1 cuillère à café dans un peu d'eau froide (fibromes et hémorragies jusqu'à 6 ou 8 cuillères à café *pro die*).

Prix : Le flacon pour 1 mois : 20 fr. 05 ; le flacon géant 500 cc. : 58 francs.

Laboratoires GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, Faubourg Montmartre — PARIS (IX°).
(Tél. : Provence 43-10.)

HAMAMELIS GRANDVAL

Forme et Composition. — Gouttes renfermant sous le plus petit volume l'activité complète de la feuille d'*Hamamelis* traitée de façon à fournir un produit soluble dans l'eau, possédant l'arome tout spécial de la plante et d'une activité incomparable dans tous les cas de :

Indications. — Varices. — Hémorroïdes. — Ulcères variqueux. — Métrites. — Accidents du retour d'âge. — Hémorragies. — Œdème chronique. — Congestions, etc., etc.

Dose. — XXX à XL gouttes avant chaque repas, 2 ou 3 fois par jour. — Dans les cas aigus, on pourra doubler la dose sans inconvénient pendant quelques jours.

Le 1/2 flacon : 6 fr. 50. — Le flacon : 12 francs.
(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12-14, rue Féry — REIMS.
(Tél. : 31-63.)

HARLÉDINE

Capsules Glutinisées.

Formule :

Boldine	un demi-milligr.
Extrait de bile	0,03
Huile de Haarlem vraie	0,18

Propriétés. — Antiseptique et décongestif des voies hépato-biliaires et rénales. Cholagogue.

Indications. — Lithiase biliaire, ictères, cholécystites, coliques hépatiques, coliques néphrétiques, entérites muco-membraneuses, Constipation, Goutte et rhumatisme chronique.

Doses. — Affections aiguës : 2 à 4 comprimés par jour.

Affections chroniques : 1 à 3 capsules par jour (à prendre au moment des repas).

La boîte de 40 capsules : 17 fr. 40.

Laboratoire L. COUVERT

11, rue de Mogador — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 22-01.)

HARLEM PHILIPPE (Pilules.)

Kérat-Harlem.

Pilules Kératinisées à l'huile de Harlem vraie, pure et d'origine. Dose : 0 gr. 15 par pilule. Leur Kératinisation, d'après les procédés du D^r H. Philippe, évite les fatigues d'estomac, les renvois désagréables, le mauvais goût, occasionnés ordinairement par le goût spécial de l'Huile de Harlem.

Indications. — Affection du foie, lithiases biliaires ou rénales, ictère, coliques hépatiques ou néphrétiques, pyélo-néphrites, goutte, arthritisme, asthme hépatique, etc.

Posologie. — 1 à 2 pilules par jour au cours des repas ou avant de se coucher.

4 à 6 pilules dans les cas aigus.

Prix : 17 francs.

(Prière indiquer pilules Philippe Harlem).

Produits du D^r Henri PHILIPPE

36, Quai Fulchiron — LYON.

HÉBÉOL

Produit français.

Composition. — Emulsion colloïdale à base d'huile de paraffine (49 p. 100) et Agar-Agar (51 p. 100).

Propriétés. — L'action de la paraffine colloïdale se produit dans la profondeur du bol fécal et le ramollit, se mêle au mucus intestinal en augmentant sa viscosité et son action.

Rétablit la fonction intestinale. Sans irritation, sans suintement. Ne contient ni sucre, ni alcool, ni phénol-phtaléine, ni gomme.

Indications. — Constipation par spasme ou atonie, constipation post-opératoire. Coliques hépatiques ou néphrétiques. Auto-intoxications. Appendicite chronique. Hémorroïdes. Femmes enceintes. Recommandé aux vieillards et aux enfants.

Prix. Flacon 210 cc. : 15 francs ; de 90 cc. : 8 fr. 50.

Posologie. — *Adultes* : Début de cure : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour ; dose d'entretien : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : début de cure : 2 à 3 cuillerées à dessert. Dose d'entretien : 1 cuillerée à dessert. Dans de l'eau, de préférence au repas avant le dessert.

M. REINHOLD, Pharmacien,

20, rue de Rivoli — PARIS (IV°).

Tél. : Arch. 61-62.

HECTARGYRE

(Sel mercuriel de l'Hectine.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis, Paludisme.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules

Posologie :

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours.

Ampoule B : tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès Sciences, Pharmacien de 1^{re} classe.

12, rue du Chemin-Vert,

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23 34, 2 lignes groupées.)

HECTINE

(Benzo-sulfone-paraminophényl-arsinate de soude.

Spécifique de la Syphilis et succédané du cacodylate de soude.

Indications. — Syphilis, Paludisme, Fièvre des Foins, Tuberculos., Anémie, Asthénie, Etats dépressifs, Eczéma des nourrissons.

Formes. — Ampoules A, Ampoules B, Gouttes, Pilules.

Posologie:

Adultes : forme injectable. *Ampoule A* : tous les jours. *Ampoule B* : tous les deux jours. 15 ampoules pour une cure. — *Per os* : 2 pilules par jour pendant 15 jours ou LX gouttes par jour les 4 premiers jours, ensuite LXXX gouttes pendant 15 jours.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

HÉDÉRYL

Composition. — Pommade au lierre grim-pant.

Propriétés. — Fibrolysant, décongestif, analgésique.

Indications. — Cellulite, arthralgies, ar-thrites, névralgies.

Posologie et mode d'emploi. — En fric-tions et massages, puis onctions sur la région douloureuse. Recouvrir ensuite d'une feuille d'ouate.

Prix : 16 francs le tube de 55 grammes, pour une durée moyenne de 12 jours de traitement.

Laboratoire LETTRY

69, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).

Tél. : Littré 13-37.

HÉDOPEPTOL

Composition. — Citrate monosodique, hexaméthylène, tétramine, charbon animal.

Propriétés. — Antiseptique gastro-intestinal, urinaire et biliaire.

Indications. — Fermentations gastro-intestinales, dyspepsie, aérophagie, entérite, diarrhée, colibacillose, appendicite chronique, insuffisance hépatique, cholécystite et angiocholécystite, infections des voies urinaires, auto-intoxication et ses conséquences.

Présentation et prix. — Granulé homogène fondant.

La boîte de 80 grammes : 15 fr. 60.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café une demi-heure après les deux repas, midi et soir, avec un peu d'eau.

L'Hédopeptol existe également sous forme de pastilles.

Laboratoires SAUNIER

35, avenue de Versailles — PARIS (XVI^e).

Tél. : Jasmin 29-56.

HÉDUSOL

Tonique. Reconstituant.

Elixir au vin de Muscat, d'un goût agréable.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des médicaments sous le n^o 957-1.

Composition :

Phosphate de soude	1 gr.
Méthylarsinate de soude	10 cgr.
Extrait fluide de Kola.....	2 gr. 5
Extrait fluide de Quinquina.....	1 gr. 25
Teinture de Gentiane.....	VI gouttes.
Teinture Noix Vomique.....	XII —
Teinture de Cannelle.....	VI —
Teinture de Vanille.....	XII —
Vin de Muscat	Q. S. p. 100 gr.

Indications. — Surmenage. Faiblesse générale. Anémie. Asthénies. Neurasthénie. Troubles de Nutrition et de Menstruation. Affections des Bronches. Convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe midi et soir.

De 12 à 15 ans : 1 cuillerée à dessert midi et soir.

De 8 à 12 ans : 1 cuillerée à café midi et soir.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien, 47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

HÉLÉNINE DE KORAB

Composition :

Hélénine cristallisée	0,01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005

La codéine augmente l'action de l'hélénine et la prolonge (Renon).

Indications. — Toutes les toux qu'elle calme, toutes les expectorations qu'elle tarit, congestion du larynx qu'elle décongestionne.

Grippe, bronchite, asthme, coqueluche, toux spasmodiques.

N. B. — Pour les cas de bacillose, il est recommandé d'employer la formule créosotée :

Hélénine cristallisée	0 gr. 01
Chlorhydrate de morphine.....	5/10 de mg.
Codéine	0,005
Créosote de Hêtre	0,02

Posologie. — 6 à 8 globules par 24 heures.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 710-1.

Laboratoire R. BOUYSSOU

CHAMBOIS (Orne).

HÉLÉNINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Hélénine Houdé. — Principe actif cristallisé de l'aunée. Les travaux récents (D^r Lefèvre, D^r S. Schmidt) ont montré la nécessité d'utiliser l'Hélénine pure, sans association d'opiacés qui contrarient l'expectoration.

Propriétés. — Béchique, expectorant et décongestionnant. Calmant des toux rebelles (D^{rs} Delore et Coudert). Cholérétique direct. Amer apéritif et tonique.

Indications. — Bronchites chroniques. Toux quinteuses des tuberculeux. Coqueluche. Poussées de rétention avec congestion et fièvre, dans les formes ulcéreuses chroniques de la tuberculose pulmonaire. Insuffisance hépatique. Leucorrhées.

Doses. — Toux, Leucorrhées : 6 à 10 granules par jour (et même plus avant ou entre les repas.

Poussées congestives avec rétention : 6 à 8 granules à doses réfractées dans la soirée, 8 à 10 pendant les jours suivants pendant quelques jours.

Comme fluidifiant et expectorant d'entretien, 2 ou 3 granules par jour avant le repas de midi.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 40-58.)

HELGUEROL

Traitement Phytothérapique des troubles de la Circulation
et de la Nutrition.

Forme : Élixir.

Composition. — Synergie phytothérapique hypotensive à base de :
Ail et Oignon, Romarin, Raifort, Cannelle, Safran, Badiane, Capillaire.

Indications. — *Troubles de la circulation*, Hypertension, Artério-sclérose, Insuffisance cardiaque, Etats congestifs, Varices et Ulcères variqueux, Œdèmes, Hémorroïdes, Règles (formation et ménopause), Aménorrhée, Dysménorrhée.

Troubles hépatiques et vésiculaires, Ictères, Auto-intoxications, Dermatoses, Migraines, Constipation, Obésité.

Maladies des reins et de la vessie : Anuries, Dysuries, Pyuries.

Arthritisme : Rhumatismes, Goutte, etc.

Troubles des voies respiratoires : Emphyseme, Asthme, Bronchites chroniques.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe le matin à jeun 20 jours par mois. Durée moyenne du traitement : 3 mois.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires H. YVRARD
17, rue Soufflot — PARIS.
(Tél. : Odéon 56-67.)

HÉMAGÈNE TAILLEUR

Règle les règles et supprime la douleur.

Forme. — Dragées.

Composition. — Trois sédatifs : Phénacétine, Acide acétyl-salicylique, Menthol.

Un vaso-dilatateur : Méthylnonylcétone.

Deux régulateurs : Hypophyse et Ovaire total.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant immédiat des douleurs les plus vives de la dysménorrhée, régulateur du flux sanguin.

Indications et posologie :

1° *Dysménorrhée* : 2 dragées dès l'apparition des douleurs ; 1/2 heure après : 2 autres. Maximum : 8.

2° *Aménorrhée et ménopause* : 4 à 6 dragées par jour.

3° *Coliques post-partum, tranchées utérines* : 2 dragées par heure. Maximum : 10.

Petit flacon de 12 dragées : 9 fr. 50.

Grand flacon de 30 dragées : 18 francs.

L. N. C. n° 479-3

Laboratoire P. SEVENET

38, rue de Ponthieu — PARIS (VIII°).

(Tél. : Bal. 56-91.)

HÉMAGÉNINE GIRAUD

Médication iodo-arsenicale
phosphorée-strychnique.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 30 à 40 gouttes par jour.

Enfants : 2 gouttes par année d'âge et par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Lymphatisme. Adénopathie, Rachitisme, Anémie. Toutes maladies consomptives. Convalescences. Tous états ganglionnaires, [tous états infectieux. **Asthme.**

Prix : 16 francs.

Laboratoire CHATELUT

65, rue Louis-Blanc
PARIS (X^e)

HÉMATOÉTHYROÏDINE CARRION

Composition. — Sang d'animaux éthyroïdés mélangé à parties égales avec de la glycérine chimiquement pure, ou desséché.

Formes. — Liquide. Comprimés et cachets dosés à 0,50 et correspondant à une cuillerée à café du produit liquide.

Indications. — Goitre exophtalmique, Hyperthyroïdie, Troubles d'excitation nerveuse. Insomnie, Hémophilie, Troubles de la ménopause.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café par jour avant les repas ou 2 à 6 comprimés au moment des repas.

Insomnies : un comprimé au repas du soir.

Présentation et prix. — Le flacon de 120 cc. : 33 fr. 95. L'étui de 24 comprimés : 21 fr. 20.

La boîte de 24 cachets : 21 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. n° 514-35-45-124.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉMATO-IODINE

États lymphatiques et anémiques,
Adénites chroniques.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges

PARIS (IV^e).

HÉMÉDONINE

Solution d'Hématoporphyrine pure selon la formule de Nencki.

Indications. — États de dépression et de fatigue, Vagotonie, États anxieux, Migraines, Stimulant général d'une innocuité absolue.

Présentations. — Deux formes :

Ampoules de 1 cc. et 2 cc. contenant 0 gr. 002 mgr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Gouttes : flacon de 20 cc. contenant 0 gr. 005 milligr. d'Hématoporphyrine pure par cc.

Emploi. — Ampoules, en injections intramusculaires profondes uniquement.

Se vend en boîte de 10 ampoules 1 cc. : 26 fr. 70

10 ampoules 2 cc. : 42 fr. 65.

1 flacon gouttes : 53 fr. 30.

Laboratoire C. GIREL

J. LACOUR, Pharmacien

19, rue Godot-de-Mauroy — PARIS (9^e).

(Tél. : Opéra 76-24.)

HÉMOANTITOXINE « SOFOS »

de l'Institut du P^r E. Maragliano.

Composition. — Sang de bœufs immunisés contre la tuberculose, contenant 20 p. 100 d'antitoxine Maragliano..... 25 p. 100
 Alcool..... 14 —
 Glycérine..... 10 —
 Eau aromatique..... 51 —

Indications. — Reconstituant spécifique du sang. Remède contre le rachitisme et la scrofuleuse. Préventif immunisant dans la prébacillose. Traitement spécifique de la tuberculose.

Formes et Posologie. — *Simple : adultes* : une cuillerée à potage quatre fois par jour (avant les repas).

Enfants : une cuillerée à café quatre fois par jour (avant les repas).

Triple : mêmes doses (s'emploie dans les périodes fébriles). Se prend pure ou mélangée avec de l'eau alcaline ou avec du sirop.

Prix : 25 fr. 50.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1207-1 et 1207-2.

Laboratoire PERRIN, 11, quai Saint-Clair, LYON.

D^r A. IMBERT, Pharmacien — (Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire pour Paris : E. MOREAU, Pharmacien
 13, rue des Nonnains-d'Hyères — (Tél. : Turbigo 87-05.)

HÉMOCALCINE

Composition. — A base d'extrait de foie intégral inaltérable et métaux ferments, associés à la magnésie et au calcium à l'état de glycérophosphates avec 1/2 mmgr. de strychnine ; sans arsénicaux intolérés, sans vitamines périssables.

Propriétés thérapeutiques. — Donne un PH favorable à la fixation phospho-minérale. N'entraîne pas de constipation.

Indications. — Anémie, Asthénie, Puberté, Déminéralisation, Dépressions nerveuses et toxiques.

Formes et mode d'emploi. — 30 petits cachets. Un cachet par jour de 8 à 15 ans avant le repas.

2 à 3 cachets par jour pour les adultes avant le repas.

En cas de contre-indication, formuler : HÉMOCALCINE sans strychnine. Prix : 18 francs.

Ne contient pas de notice intérieure.

Vous rappelle ANTISUCE et ARTHRIDENT

Enregistré au L. N. C.

Laboratoire FERCOQ, Licencié des sciences
 LA VARENNE-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 03-97.)

HÉMOCALCIOPECTINE

L'Hémostatique rationnel.

Solution antihémorragique de Pectine
et de Chlorure de Calcium.

Inaltérable. Non toxique. Non anaphylactisante.

Indications thérapeutiques. — Toutes les hémorragies, Epistaxis, Hémoptysies, Hémorragies gastriques et intestinales, rénales, vésicales, utérines, Hémophilie, Hémorragies opératoires et post-opératoires.

Présentation. — Ampoules buvables de 10 cc. Boîtes de 3 et 6 ampoules.

Mode d'emploi. — De 1 à 6 ampoules par 24 heures dans de l'eau sucrée ou un jus de citron.

Boîte de 6 ampoules. Prix : 28 fr. 60.

Boîte de 3 ampoules. Prix : 17 fr. 20.

Pharmacie J. ROBERT

J. BOUDIER, Successeur

Pharmacien de 1^{re} classe

Ex-préparateur à la Faculté de Médecine

37, rue de Bourgogne — PARIS.

(Tél. : Invalides 39-19.)

HÉMODROME

(Phytothérapie Intégrale.)

Forme. — Liquide à prendre par gouttes.

Composition. — Anémone, Cupressus, Marron d'Inde, Berberis, Thlaspi, Thuya, Souci.

Propriétés thérapeutiques. — Action supérieure à l'hamamélis et similaires. Ne contient aucun produit chimique. Assimilation plus rapide de par sa forme liquide que les produits pris en pilules ou en comprimés.

Indications. — Toutes affections du système veineux : varices, ménopause, règles irrégulières.

Posologie. — XV à XX gouttes 3 à 4 fois par jour dans un peu d'eau.

Prix : 10 fr. 70.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e.)

(Tél. : Élysées 17-46.)

HÉMODUCTYL

Pilules ou Solution.

Extraits d'hamamelis, cupressus, marron d'Inde stabilisé, boldo et condurango associés aux extraits de gui et d'aubépine.

Dose moyenne. — 2 pilules, 1 cuillerée à café de solution, matin, midi et soir, avant les repas.

Indications. — Ménopause, Dysménorrhées douloureuses, Varices et Hémorroïdes, Hypertension, Bourdonnements d'oreilles.

Pilules. Prix : 17 fr. 85.

Solution. Prix : 17 fr. 85.

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon — NEUILLY-s-SEINE
(Tél. : Maillot 17-75.)

HÉMOFLUIDOL

(Dragées)

Fluidifie le sang.

Chaque dragée contient :

Silicate de soude..... 0 gr. 05

Citrate de soude 0 gr. 15

Artériosclérose

Hypertension

Troubles circulatoires

Deux dragées matin et soir avant le repas.

Durée du flacon : 15 jours.

Prix : 20 francs.

Laboratoire LÉONARDON

Docteur en Pharmacie, ANGERS.

Dépositaire général : O. C. P. Paris.

HÉMOGÉNOL DAUSSE

Sérum hémopoïétique de cheval.

Formes. — Ampoules d'Hémogénol contenant 10 cc. de sérum liquide.

Sirop d'Hémogénol à base de sérum hémopoïétique.

Dragées d'Hémogénol contenant chacune 0 gr. 15 de sérum hémopoïétique desséché, enrobé dans le gluten.

Indications. — Tous les états d'*adynamie* et toutes les *cachexies*. Puissant stimulant de l'hémopoïèse, particulièrement indiqué dans le traitement des *anémies*. Hémostatique énergique, recommandé dans les affections hémorragiques et l'hémophilie.

Mode d'emploi. — Ampoules d'Hémogénol. — 1 à 3 ampoules par jour, prises par la bouche, dans un peu d'eau sucrée ou en lavement.

Dragées d'Hémogénol. — Avaler, sans croquer, 4 à 6 dragées par jour.

Sirop d'Hémogénol. — Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour. — Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). — (Tél. : Turbigo 63-40).

HÉMOGLOBINE DESCHIENS

OPOTHÉRAPIE HÉMATIQUE TOTALE

Médication rationnelle des syndromes anémiques.

Nature. — Le sirop de DESCHIENS à l'Hémoglobine, contient :

- 1° Une hémoglobine physiologique, préparée à froid, sans traumatisme histologique, physique ou chimique ;
- 2° Les substances minimales globulaires intactes ;
- 3° Les substances minimales du plasma non altérées.

Action :

- 1° Apport d'hémoglobine (fer globulaire).
- 2° Stimulation des organes hémopoïétiques (Hémocytopoïétines).
- 3° Action tonique par les substances minimales : globulaires et plasmatiques.

Indications. — Anémies, Chlorose, Déchéances organiques, Tuberculose, Convalescences, Grossesses, Suites de couches.

Posologie. — Une cuillerée à potage à la fin des deux principaux repas. Doubler dans les cas graves. Pas de contre-indications.

Prix : 21 fr. 50.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉMOLUCYL

Médication citratée combinée à l'Hamamélis et à l'Hydrastis.

Granulé soluble.

Formule :

Extrait d'hydrastis	0,25
Extrait d'hamamélis	1,25
Citrate monosodique	5,00
Citrate trisodique	5,00
Excipient aromatisé, Q. S. pour	100

Indications. — *Hyperviscosité sanguine, Hypertension. Stases veineuses, Varices, Œdèmes chroniques-post-phlébitiques, Troubles de la ménopause.*

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, trois fois par jour, avant les repas (se conformer aux indications du médecin).

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire de l'HÉMOLUCYL

R. MASSOL, Pharmacien de 1^{re} classe

54, avenue de la Bourdonnais — PARIS (VII^e).

(Tél. : Inv. 55-59.)

HÉMOLUOL

Phytothérapie toni-veineuse.

Liquide. Comprimés.

Composition. — *Éléments activés par synergie* ; Thlaspi (Capsella Bursa Pastoris), Berberis, Hamamelis, Quinquina, Viburnum prunifolium, Anémone pulsatille, Marron d'Inde.

Extraits de choix, combinés judicieusement sans perte de substances actives, en un *liquide* et en *comprimés*.

Décongestif, tonique veineux, stimulant des vaso-moteurs centraux, sédatif de l'appareil utéro-ovarien.

Indications. — Troubles des fonctions menstruelles. Aménorrhées, dysménorrhée douloureuse, ménopause naturelle et opératoire.

Insuffisances veineuses. — Varices, hémorroïdes, Phlébites, etc.

Liquide. — Prendre 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Comprimés. — Avaler deux comprimés au début de chacun des trois repas, 15 jours par mois.

Le liquide et les comprimés ont la même valeur thérapeutique, les mêmes indications et peuvent être employés indifféremment.

Le flacon ou la boîte de 50 comprimés.

Prix : 16 fr. 40.

Laboratoires SUBSTANTIA

M. GUÉROULT, Docteur en Pharmacie

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

HÉMOPANBILINE

Forme. — Comprimés et Solution.

Définition. — L'*Hémopanbiline*, application de la méthode modifiée de Whipple, est une *Panbiline* (voir *Panbiline*) à laquelle est ajouté l'*Extrait Hépatique* spécial, avec toute son *efficacité hémopoïétique*, mais d'où sont exclus les albuminoïdes et les lipoides, source de mécomptes.

Composition. — *Panbiline* (Opothérapies hépatique et biliaire associées aux Chologo-Cholérétiques) *Extrait hémopoïétique de Foie*. Hémoglobine et Citrate de fer ammoniacal.

Indications. — Médication hépatique des *Anémies*, *Chlorose*, *Convalescence*, *Elats de déchéance*, *Ictère hémolytique*.

Dose. — 2 à 4 cuillerées à café, ou 10 à 20 *Comprimés d'Hémopanbiline* par jour à prendre avant les repas.

Enfants : demi-dose.

N° d'Enreg. au L. N. C. : 469-5-2, et 469-6.

Prix au public :

20 fr. 30 le flacon d'Hémopanbiline liquide.

18 fr. la boîte de 100 *Comprimés d'Hémopanbiline*.

Laboratoires du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

HÉMOPAUSINE

Composition. — Liqueur à base d'Hydrastis, Viburnum, Hamamelis, Capsicum, Seneçon, Chlorure de calcium, Gentiane, Ecorce d'oranges amères.

Action. — Vaso-constriction veineuse, décongestive, hémostatique, circulatoire.

Indications. — Troubles de la ménopause et de la puberté, varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites, règles douloureuses.

Mode d'emploi. — Adultes : 1 à 3 verres à liqueur. Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour, avant les repas.

Prix : Le flacon de 220 cc., 13 fr. 05.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-1.

Laboratoire de l'HÉMOPAUSINE

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44.)

HÉMOPECTAL

(Médication antihémorragique.)

Sième pharmaceutique et composition. — Boîte de 3 flacons-ampoules de formule :

Solution de pectine fraîche et stabilisée à 2 p. 100	10
Chlorhydrophosphate de calcium	0,50
Solution titrée de genêt.....	0,20

(Pour 1 ampoule.) — Boîte de 3 ampoules.

Avantages. — Produit très actif, s'employant par voie *buccale* ; pas de contre-indication, pas de toxicité, même pour le très jeune enfant, pas d'accidents sérieux, pas désagréable à absorber.

Indications thérapeutiques. — Toutes hémorragies (métrorragies, hémoptysies, hémorragies post-opératoires). A prescrire à titre *préventif* avant et après toute intervention sanglante.

Mode d'emploi. — 3 (enfants) à 6 (adolescents et adultes) flacons-ampoules par jour dans un peu d'eau sucrée ou gazeuse.

Prescription. — 1 boîte ampoules Hémopectal Falvy.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

HÉMO-PHAGOSTHYL

Phagosthyl ferrugineux.

(Pour adultes.)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Fer colloïdal	2 centigr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Chloro-Anémie, Anémies de toute origine, Asthénie, Troubles de la puberté, Douleurs périodiques, Surmenage, Convalescences, Leucémies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours au niveau de la cuisse ou de la fesse.

Boîtes de 12 amp. de 5 cc. Prix au public : 22 fr. 90.

Hémo-Phagosthyl Infantile : 12 ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-2.

Laboratoires Biologiques André PARIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).
(Tél. : Ségur 55-12.)

HÉMOPLASE LUMIÈRE

Opothérapie sanguine totale.

Toutes les déchéances organiques qu'elle qu'en soit l'origine.

Constitution. — Extrait protoplasmique de globules sanguins d'animaux réfractaires à la tuberculose contient : Hémoglobine dont l'activité oxydase est maxima, sérum sanguin, lipoides des globules rouges, lipoides et ferments des leucocytes.

Indications. — Toutes anémies

1° Toxiques d'origine exogène ou endogène :

2° Infectieuses (convalescences, tuberculose)

3° Par spoliation sanguine (hémorragies) ;

4° Par cachexie néo-plasique.

L'Hémoplasme Lumière fait du sang, stimule toutes fonctions organiques, lutte contre les infections et contre les intoxications.

Procédé le plus efficace de cure de tous états cachectiques. Stimule les défenses anti-toxique, anti-toxinique, anti-microbienne par suractivation hémopoïétique.

Doses courantes. — L'Hémoplasme Lumière peut être administrée par voie buccale, sous forme de granulés, de cachets et de dragées.

Granulés..... de 2 à 6 cuil. à café par jour.

Cachets..... de 4 à 6 par jour.

Dragées..... de 6 à 10 —

Chez les enfants, employer de préférence la forme en granulés : une à 4 cuillérées à café par jour.

Ampoules. — Pour l'administration par voie intramusculaire :

Adultes : 2 ou 3 ampoules de 10 cc. par semaine ;

Enfants : 2 à 10 cc. deux fois par semaine ;

Laboratoires LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

HÉMOPTYSOL

Composition. — Association synergique de tartre stibié, d'Hélénine et de Phénylethylmalonylurée.

Formule :

Tartre stibié	0 gr. 015
Phénylethylmalonylurée.....	0 gr. 02
Hélénine pure.....	0 gr. 03
Excipient	Q. S. P.

Un comprimé de 0 gr. 20.

Propriétés et indications. — Traitement des Hémoptysies légères par les médications sédatives et nauséuses.

Dans les Hémoptysies graves, en association avec l'hémorragine.

Mode d'emploi. — 2 comprimés toutes les 4 à 8 heures.

Boîte de 20 comprimés.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

HÉMOPYLORE

Buvable et injectable.

Références :

- 1° Thèse Mouras, Paris 1937 ;
- 2° Thèse Lombard, Nancy 1938 ;
- 3° Prof. Ch. Aubertin, *Traitement des anémies graves par le foie*, 1938 ;
- 4° Professeur Ch. Aubertin et Mme Hector, *Bulletin de la Société médicale des Hôpitaux*, 14 novembre 1938, p. 1 617 ;
- 5° Fiches Namain, février 1939.
- 6° Prof. Ch. Aubertin, *L'Europe médicale*, mars 1939 ;
- 7° Thèse Graveron, Paris 1939.

Composition. — Solutés des principes anti-anémiques, d'acides aminés : tryptophane, histidine et de sels métalliques assimilables, fer et cuivre obtenus à l'aide d'une méthode scientifique nouvelle de la combinaison du foie frais de jeunes bovins et de la muqueuse prépylorique fraîche de porc.

1 cc. d'Hémopylore buvable correspond à 10 grammes d'organes frais.

1 cc. d'Hémopylore injectable correspond à 100 grammes d'organes frais.

Présentations. — *Hémopylore buvable* : ampoules de 2 cc. Boîte de 12 et de 30 ampoules.

Ampoules de 5 cc. Boîtes de 10 et de 30 ampoules.

Hémopylore injectable : ampoules de 2 cc. Boîtes de 5 et de 20 ampoules.

Ampoules de 5 cc. Boîtes de 3 et de 12 ampoules.

Indications thérapeutiques. — Toutes anémies. Tous états hémorragiques et déficiences globulaires. Asthénies. Anorexie. Amaigrissement. Toutes convalescences.

Posologie et modes d'emploi :

Hémopylore buvable : Se prend au début des repas, pur ou dans un peu d'eau ordinaire ou gazeuse.

Enfants : 2 à 4 ampoules de 2 cc. par jour.

Adultes : 2 à 6 ampoules de 5 cc. par jour.

Comme traitement de sécurité, diminuer les doses, poursuivre l'emploi pendant plusieurs mois.

Hémopylore injectable. — Injections intramusculaires quotidiennes ; ou périodiques.

Traitement d'attaque : Adultes, 5 cc. Enfants, 2 cc.

1 à 4 ampoules par jour jusqu'à apparition de la crise réticulocytaire ; ensuite diminuer les doses.

Traitement d'entretien : à instituer quand la numération globulaire est voisine de la normale, avec *Hémopylore buvable* ou *Globiron*.

1 ampoule de 2 cc. ou de 5 cc. par jour.

Traitement de sécurité : à réaliser avec l'*Hémopylore buvable*.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Adultes : 1 à 3 ampoules de 5 cc. par jour.

Spécialités Roger BELLON

J. GAUTIER, Pharmacien.

Laboratoire du Gambéol — 42, rue Émile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Défense 17-67.)

HEMOREX

Traitement rationnel et complet
des hémorroïdes.

Formes. — Suppositoires, Pommade et Gouttes.

Suppositoires et Pommade. — A base de paraminobenzoate d'Ethyle, analgésique puissant et sans danger, de sous-gallate de bismuth et d'oxyde de zinc, cicatrisants et antiseptiques extrêmement actifs, combinés en un excipient spécial antiseptiques'opposant à l'infection microbienne et empêchant en outre toutes les irritations de contact.

Indications. — Hémorroïdes, rectites, fissures, états inflammatoires de la muqueuse anale, prostatite. Le prurit anal est rapidement supprimé par la pommade.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire matin et soir. Application simultanée de la pommade sur la muqueuse externe.

Gouttes Hémorex. Composées d'alcoolatures et de teintures stabilisées de plantes sélectionnées et réputées pour leur action spécifique sur les troubles veineux circulatoires (Marrons d'Inde, Hamamélis, Viburnum, Cupressus, Anémone).

Propriétés. — Combattent l'atonie de la paroi vasculaire par leur action vaso-constrictrice énergique. Stimulant Ovarien. Sédatif utérin.

Indications. — Varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorroïdes, troubles de la Ménopause, dysménorrhée, aménorrhée.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée avant les repas (20 jours par mois).

Prix : Suppositoires : 15 fr. 50.

Pommade et Gouttes : 14 francs.

Enregistré au L. N. C. M., sous les n^{os} 1266-1, 2 et 4.

Laboratoires HEMOREX

R. PAULY, Pharmacien

9, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET

(Tél. : Pér. 43-22.)

HÉMORRAGINE

Compositions. — Solution aqueuse stérile de Rouge Congo médicinale purifié à 1 p. 100.

Propriétés. — Provoque l'hémostase spontanée par modification de la formule du sang et de sa teneur en fibrinogène.

Indications. — Hémorragies de toute nature : Digestives, Pulmonaires, Gynécologiques, Urinaires, Traumatiques, etc., Hémophilie.

Mode d'emploi. — Injections intraveineuses, 1 ampoule de 10 cc. toutes les 8 heures.

Boîte de 6 ampoules.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

HÉMORROÏDINE GOUTTES

Composition. — Hamamelis, hydrastis, intrait de marron d'Inde.

Propriétés. — Régulateur de l'insuffisance veineuse et de ses conséquences.

Indications — L'« Hémorroïdine gouttes » est une préparation rationnelle applicable au traitement des hémorroïdes, avant tout, mais dont peuvent bénéficier d'autres manifestations veineuses, à savoir : *varices, varicocèles, ulcères variqueux, œdèmes phlébitiques.*

Mode d'emploi. — XV gouttes matin, midi et soir, avant les repas, dans un peu d'eau.

Prix : 13 francs.

**Laboratoires KERFYSER
DUNKERQUE.**

HÉMORROÏDINE POMMADE

Composition. — Adrénaline, paraforme, intrait de marrons d'Inde.

Propriétés. — Spécifique par excellence des hémorroïdes externes et internes, fissures, prurit anal, fistules.

Indications. — Arrête les hémorragies, calme les douleurs, décongestionne.

Mode d'emploi. — Faire une application de la pommade matin et soir et après les garde-robes.

Prix : 12 francs.

Laboratoires **KERFYSER**
DUNKERQUE.

HÉMORROÏDINE SUPPOSITOIRES

Composition. — Adrénaline-paraforme-intrait de marron d'Inde stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, analgésiques, calmants.

Indications. — Hémorroïdes internes, fissures, prurit anal, fistules.

Mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires par jour, soit le matin au lever, soit le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

Prix : 15 fr. 60.

Laboratoires **KERFYSER**
DUNKERQUE.

HÉMOSAMINE

(Utéramine)

Composition. — Solution au centième de chlorhydrate de para-oxyphényléthylamine présentée en ampoules de 1 cc., pour injections, et en flacons de 10 cc., pour l'usage interne.

Propriétés. — *Hémostatique, cardio-tonique et utéromotrice.* Remplace ergotines et extraits pituitaires aux effets inconstants.

Indications. — *Obstétrique et gynécologie.* Post-partum (hémorragies et atonies utérines), placenta prævia, ménorragies, métrorragies, dysménorrhées, ménopause. *Médecine interne.* Hémophilie, hémoptysie, épistaxis, hémorragies intestinales, choc, collapsus, hémorragies en nappes.

Mode d'emploi. — On utilisera pour les injections hypodermiques (avant-bras ou cuisse) ou intramusculaires (muscle fessier), 1 à 3 cc. et jusqu'à 5 cc. selon les cas. Pour l'usage interne XX à XXX gouttes, trois fois par jour. Pour l'usage externe : En tampons ou pansements imbibés de solution pure ou diluée au 1/5 avec de l'eau stérilisée ou bouillie.

Produit ZYMA

Dépôt général : Laboratoires LOBRU,
92, rue Bobillot — PARIS (XVIII^e).

HÉMOSTATIQUE COUDERT

Composition. — Tubes scellés de 20 cc. contenant 0 gr. 10 d'émulsine en solution stabilisée.

Propriétés. — Puissant hémostatique, coagulant, tonique, sans toxicité, sans action sur la tension artérielle et la viscosité sanguine.

Indications. — Hémorragies de l'appareil digestif, des affections gynécologiques (fibrome, cancer, métrite), des affections urinaires (rein, vessie, prostate), tuberculeuses, lithiasiques ou néoplasiques. Hémoptysies.

Accidents hémorragiques dus à l'hyporésistance globulaire (anémie, affections du foie, purpuras hémorragiques).

Préventif et curatif de toutes les réactions sériques d'origines pathologiques, alimentaires ou médicamenteuses (hémorragie intestinale de la fièvre typhoïde, paludisme, réactions sériques, idiosyncrasies médicamenteuses ou alimentaires, urticaire). Spécifique de l'hémophilie, Hémogénie, hémorragies dues à des altérations de la crase sanguine (période de ménopause, règles abondantes, épistaxis rebelles).

Doit être employé dans toute opération chirurgicale susceptible d'entraîner une grosse perte sanguine (ablation des amygdales, végétations adénoïdes), en obstétrique et en stomatologie, prostatectomie (avulsion dentaire).

Pesologie :

Curatif : 1 à 8 ampoules par jour suivant la gravité des cas.

Préventif : 1 ampoule la veille, 1 ou 2 ampoules 1 ou 2 heures avant l'opération.

Pour les hémophiles, faire suivre un traitement de 2 ampoules par jour avant l'opération et vérifier les résultats obtenus en faisant un examen du sang (temps de saignement et de coagulation).

Le produit doit être pris dans un liquide froid, pur, ou aromatisé avec du jus d'orange ou de citron.

Présentation et prix :

Boîtes de 3 ampoules de 20 cc. : 24 francs.

Boîtes de 6 ampoules de 20 cc. : 40 francs.

Boîtes de 12 ampoules de 20 cc. : 70 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 453-1.

Laboratoires COUDERT A. I. H. P.

13, rue Antoine-Vollon — PARIS (XII^e).

(Tél. Diderot 59-72.)

HÉMOSTATIQUE ERCÉ

Composition. — Suspension lipo-colloïdale et stérile de Thrombase (fibrin-ferment).

Propriétés. — Hémostatique et coagulant énergique (1 cc. de suspension coagule en 20 secondes 20 cc. de sang).

Applications. — Localement et *per os*. (Il ne doit jamais être utilisé en injections.) L'ingestion *per os* réduit d'une façon appréciable le temps de coagulation du sang (hémophile).

Indications. — *Médecine* : Toutes hémorragies de pratique courante, Epistaxis, Hémorragies utérines, Hématémèses, etc.

Chirurgie de l'abdomen. Chirurgie osseuse, gynécologique et urinaire. Prostatectomies, Chirurgie esthétique. Préparation des opérés.

Oto-rhino-laryngologie : Epistaxis rebelles, ablations d'amygdales ou végétations, Préparation des opérés.

Stomatologie et odontologie : Toutes hémorragies buccales ou dentaires.

Mode d'emploi. — *Localement* : 1° *Surfaces saignantes* : Applications au moyen d'un tampon de coton stérile. Si l'écoulement est violent, faire une légère pression. — 2° *Organes creux* : tamponner au moyen de mèches imbibées d'Hémostatique Ercé.

Per os : 10 à 20 cc, quotidiennement, pendant 3 ou 4 jours.

Formes et prix. — Boîtes de 3 ampoules de 2 cc. : 13 fr. 25

6 ampoules de 5 cc. : 19 fr. 40 ;

Enregistré au L. N. C. n° 507-69.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e).

(Tél. : Inv. 20-60.)

HÉMOSTATIQUE GOY

Formule :

Extrait fluide de seigle ergoté	4
Chlorure de calcium pur	8
Acide citrique	0 50
Sirop d'orties grièche	20
Excipient	67 50

Indications. — Epistaxis, Hématémèse, Hémoptysies, Métrorragies.

Toutes hémorragies (capillaires, cérébrales, pulmonaires, post-opératoires).

Avantage. — La saveur désagréable de l'ergot de seigle et du chlorure de calcium est complètement masquée par l'excipient spécial.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à café toutes les heures.

Prix : 16 fr. 60.

Durée : 10 jours environ.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 34-68.)

HÉMOSTÉRINE IRRADIÉE

Traitement des troubles du Métabolisme calcique
et des Avitaminoses D.

Composition. Vitamine D cristallisée (dosée à 40 millions d'unités standard internationales au gramme), Hémoglobine, sels de chaux, le fer, de manganèse, de fluor.

Soumise à un triple contrôle : chimique, spectrophotométrique et physiologique, l'HEMOSTERINE IRRADIÉE donne toute garantie au point de vue de l'activité de son irradiation et de sa conservation (pratiquement illimitée). Innocuité absolue.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant facteur de reconstitution du taux du calcium et du phosphore sanguin ; recalcifant osseux, antirachitique, fortifiant, reconstituant globulaire, antianémique.

Indications. — Rachitisme infantile, anémies, fractures, tétanie, caries dentaires, retard de la dentition, décalcification (grossesse, allaitement, tuberculose et pré-tuberculose). **Reconstituant physiologique**

Trois formes : Granulés. — Ampoules buvables de 5 cc. (boîtes de 8, 16, 32 ampoules). — Sirop.

Posologie et mode d'emploi. — *Enfants :* Au-dessous d'un an : une demi-cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 1 à 3 ans : une cuillerée à café, délayée dans du lait ou de l'eau.

De 3 à 8 ans : deux cuillerées à café, soit en nature, soit délayées.

De 8 à 12 ans : trois cuillerées à café par jour ou une ampoule sans alcool. Pour le sirop même doses que le granulé.

Adultes : Deux cuillerées à soupe par jour, de préférence au moment des repas ou deux ampoules.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en pharmacie.

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

HÉMOSTRA « ROCHE »

Composition. — Solution de tryptophane et d'histidine. Thérapeutique biochimique nouvelle des anémies graves (Fontès et Thivolle).

Propriétés. — Apporte directement à l'organisme en proportions rationnellement dosées les principes actifs du foie sans provoquer de dégoût, détermine l'élévation immédiate du taux de l'hémoglobine et du nombre des globules rouges.

Indications. — Toutes les Anémies graves, biernériennes, leucémiques, néoplasiques, tous les états de Déficience organique, Convalescences difficiles, Inappétence, Maladies consomptives, Ulcères, Angine de poitrine, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Voie intramusculaire ou sous-cutanée :* 1 ampoule de 5 cm³. ou de 2,5 cm³. suivant les cas tous les jours.

Voie intradermique : 1 amp. de 1 cm³. tous les jours pendant 21 jours.

Ampoules 5 cm³., 2 cm³. 5, 1 cm³. : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-13.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Arch. 91-10.)

HÉMOSTYL

Composition. — Sérum frais de cheval recueilli sur l'animal en pleine crise de régénération sanguine.

Indications. — Tonique polyhormonal, Hémopoïétique, Hémostatique.

Formes :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.

2° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc.

3° Sirop, flacon de 300 gr.

Posologie. — *Anémie*: 1 ou 2 ampoules par jour en ingestion ou lavement, ou 2 à 3 cuillerées à potage de sirop. — *Enfant*: demi-dose.

Hémorragies : ingestion ou lavement de 3 ampoules ; application locale.

Hémorragies graves : injection sous-cutanée de 30 cc.

Prix : La boîte : 25 fr.

Le coffret : 68 fr 35.

Le flacon de sirop : 25 fr.

Laboratoires du Dr ROUSSEL,
97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HÉMOTAL

Complexe opo-organo minéral granulé, association synergique de toniques organiques et de produits opothérapiques.

Indications. — Spécifique des maladies de la nutrition. Anémie, neurasthénie, tuberculose, surmenage, débilité générale, croissance.

Posologie. — *Adultes*. — Laisser fondre dans la bouche 2 cuillerées à café de granulé au début des repas.

Enfants : 1 cuillerée par repas.

Prix : 16 francs.

Forme Elixir : 20 francs.

Le double flacon : 36 francs.

Elixir.		Granulés.	
Arrhénal.....	0,07	Hémoglobine cristallisée..	5 gr.
Acide nucléinique	0,20	Glycérophosphate de	
		chaux	5,00
Hémoglobine	5,—	Poudre orchitique.....	0,50
Glycérophosphate de chaux.	5,—	Thyroïdine poudre.....	0,20
Suc orchitique	2,—	Méthylarsinate disodique.	0,20
Fluorure de sodium	0,01	Fluorure de sodium.....	0,10
Alcool à 90°.....	20,—	Pour.....	100 gr.
Suc thyroïdien	2,—		
Glycérine	10,—		
Excipient aromatique. Q. S.			
pour.....	100 gr.		

Laboratoires UNIS-SPÈS
14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

HÉMOVÉINE

Comprimés.

Composition. — 1° Extraits secs de Marron d'Inde, d'Hamamélis, de Viburnum, de Cupressus. 2° Poudres d'organe à sécrétion interne : ovaire, thyroïde, hypophyse, surrénale.

Action. — Pharmacodynamique multiple : Vasoconstriction et diminution progressive du calibre de la veine, disparition du spasme vasculaire et de la douleur consécutive, sédation utérine, régulation des règles, réapparition rapide du potentiel d'énergie tout en empêchant l'hypertension.

Fait merveille dans tous les cas de stase veineuse.

Indications. — Maladies veineuses en général : Varices, Ulcères variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles congestifs de la fonction ovarienne : Dysménorrhée, Métrorragie, Troubles de la Ménopause, Troubles de la circulation générale.

Mode d'emploi. — 6 dragées par jour à raison de 2 avant chacun des trois repas.

Prix : 18 francs.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. Méd. sous le n° 718-4.

Laboratoires BRICHARD et fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

HÉMYPNAL

CIBA

Trichloro-butyl-alcool.

Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone.

Diallylmalonylurée, Ethyl-morphine.

ANALGÉSIQUE PELVIEN.

Très peu toxique, utilisable pour toutes les douleurs du pelvis.

Suppositoires.

Obstétrique. — Accouchements douloureux (rigidité du col, hypertonie utérine).

Gynécologie. — Dilatations, curetages, pansements douloureux, crises dysménorrhéiques.

Urologie. — Explorations sur le rein, la prostate, l'urètre, la vessie, béniqués, etc.

Chirurgie. — Remplace la morphine après les interventions.

Doses. — 1 à 4 suppositoires par 24 heures.

Formuler. — Boîte de 3 suppositoires.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

HÉPACRINE

Du Dr Debat.

Extrait désalbuminé et délipéidé de foie.

Deux formes : buvable et injectable.

Indications. — Les anémies graves, les hémorragies, les anémies post-opératoires, les anémies des paludéens, les insuffisances hépatiques.

La forme injectable est appliquée, de préférence, dans les cas d'intolérance gastrique et d'hépatorésistance ou ceux très graves, exigeant une action immédiate.

Posologie :

Adultes : 1 à 3 amp. buvables ou 1 à 2 injectables par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules de 3 cc. par jour, ou une ampoule injectable.

Présentation :

Boîte de 6 amp. de 12 cc. (1 amp. = 100 gr. d'organe) 25 fr. 45.
Boîte de 18 amp. de 12 cc 67 fr. 90.
— 12 — de 3 cc. (1 amp. = 25 gr. d'organe). 17 francs.
— 10 — injectables de 2 cc (1 amp. = 10 gr. d'organe; activité de 300 gr. de foie *per os*). 33 fr. 95.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII°).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

HÉPADRAINASE

Médicament réalisant un drainage puissant des voies biliaires.

Composition :

- I. Sulfate de Magnésie pur anhydre.
- II. Peptones d'œuf, de viande, de poissons.
- III. Cholate de Soude.

Indications. — Toutes affections atoniques des voies biliaires et en particulier : Cholécystite, Cholécystatonie, Congestion hépatique, Insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : le matin à jeun, dans 1/2 verre d'eau, 1 à 3 cuillerées à café d'Hépadrainase.

Enfants : à partir de 3 ans, 1/4 à 1 cuillerée à café.

Prix : La boîte de 130 grammes. 18 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-2.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 39-44)

HÉPADROPS

Drainage Hépatobiliaire.

Association nouvelle d'Alcoolatures de plantes fraîches exotiques et de Vitamine B₁.

Indications. — Troubles de l'excrétion biliaire : Cholécystites subaiguës et chroniques, Ictères, Engorgement des voies biliaires, Congestion de la vésicule et troubles réflexes, Angiocholites, Troubles fonctionnels de la cellule hépatique, Diathèse arthritique, Congestion du foie, Asthme à épine irritative hépatique, Migraine, Urticaire, Prurits, Rétention azotée, Hypercholestérolémie, Hypovitaminose B et ses retentissements d'ordre hépatique : Constipation par atonie-facteur d'auto-intoxication, Troubles du métabolisme des glucides (diabète), Arthrite, Rhumatisme articulaire.

Formule. — Vitamine B₁, 0 mgr. 4 ; Alcoolature Veronica Virginica, 1 gr. ; Alcoolature Ptelea Trifoliata, 1 gr. ; Tinct. Combretum raimbaultii, 40 gr. ; Alcool à 40° Q. S. pour 100 gr.

Posologie. — X à XX gouttes 2 fois par jour, à distance des repas, de préférence 1/2 heure avant.

Dose moyenne pouvant être portée à XXX gouttes par prise. Dans les cas aigus : V à X gouttes 3 à 4 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1965-2.

Laboratoires KERCKOVE

Place Charles-Roussel — TOURCOING.

HÉPAFLORINE

(Dragées vertes hépatonéphrotropes.)

Priorité. — La barbiflore (orthosiphon stamineus) a été introduite dans la pharmacopée courante par « Angla » en 1934.

Composition. — Barbiflore totale, Cynara scolymus et extrait total hépatique.

Propriétés. — Diurétique hépatotonique, décholestérinisant, antilithiasique et protéolytique assurant une normalisation progressive des métabolismes déviés et une parfaite épuration de l'organisme.

Indications. — Toutes affections hépatiques ou hépatorénales et les syndromes associés. Cirrhoses, Œdèmes et Ascite, Azotémie, Uricémie, Chlorurémie, Cholestérolémie en excès, Athérome, Hypertension, Lithiases, Arthritisme, Suites d'infections aiguës, Maladies coloniciales, etc.

Posologie. — 3 à 9 dragées aux repas, en moyenne 6 par jour.

Étui de 60 dragées.

Bibliographie et Échantillons à volonté.

**PRODUITS SPÉCIALISÉS « ANGLA »
MONTE-CARLO**

« La Barbiflore en thérapeutique. »

HÉPAFLUOL

Composition. — Peptone préparée par Witte, sulfate de soude et de magnésie, poudre de réglisse.

Propriétés. — Cholagogue, eupeptique, laxatif, stomachique, désensibilisation.

Indications. — Insuffisances hépatiques, constipation, dermatoses, eczémas, urticaire, asthme, hypertension, gastralgies.

Forme. — Poudre.

Doses. — Comme Cholagogue : une à trois cuillérées à café le matin à jeun.

Comme Désensibilisateur : une demi-cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Prix : 16 fr. 65. Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 60-55.)

HÉPAGLYCÉROL CARRION

Extrait de foie très concentré (méthode de Whipple).

Composition. — Extrait concentré de foie frais additionné de son volume de glycérine.

Forme. — Tubes scellés de 10 cc. correspondant chacune à 125 grammes de foie frais.

Indications. — Anémie pernicieuse.

Posologie et mode d'emploi. — Par *voie buccale* seulement. 1 à 3 tubes scellés par jour dilués, au gré du malade, dans une boisson quelconque ou dans un aliment en purée.

Présentation et prix :

La boîte de 12 tubes scellés de 10 cc. : 69 francs.

La boîte de 6 tubes scellés de 10 cc. : 39 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. n° 514-36.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HEPAGYL

Composition. — Extrait de foie frais stabilisé.
Chaque ampoule de 10 cc. correspond à 100 gr. de foie frais.

Indications. — Anémies graves, Anémies secondaires consécutives au Paludisme, à la Tuberculose et aux Maladies infectieuses, Insuffisances hépatiques.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 3 ampoules par jour.
Enfants : 1 ampoule par jour.

A prendre exclusivement par voie buccale dans un peu d'eau froide, avant les repas.

Prix : 23 fr. 45.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HÉPALOMEL VÉDÉ

Affections hépatiques.

1^o *Comprimés verts* stimulants des fonctions biliaires
(Extrait mou total d'artichaut, extrait d'iris versicolor, extrait de combrétum, extrait de boldo).

2^o *Comprimés jaunes* complémentaires, antiseptie et action crypto-toxique.

(Palmitate de soude, bile de bœuf dépigmentée et desséchée, calomel.)

Les 12 premiers jours : 3 comprimés verts par jour.

Les 6 derniers jours : 2 comprimés jaunes par jour.

Prix de la boîte : 23 fr. 55 pour un traitement de 18 jours.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).
(Tél. : Roquette 97-46 et 97-47.)

Usine : 10, rue Petit — PARIS (XIX^e).

HÉPAMINE MAUCHANT

Ampoules buvables et sirop.

Composition. — Extrait de foie frais associé au tryptophane et à l'histidine, sous forme d'ampoules buvables et de sirop.

Mode d'action. — L'HÉPAMINE MAUCHANT réunit dans une même préparation l'action hémopoïétique de l'extrait de foie à l'action hématogène de l'histidine et du tryptophane.

Avantages. — Procédé de fabrication absolument nouveau (congélation fractionnée à très basse température). Conservation intégrale des propriétés curatives.

Indications. — Anémie grave, anémie secondaire accompagnant diverses affections, insuffisance hépatique.

Posologie :

Adultes : ampoules 1 à 3 par jour Sirop. 2 à 6 cuillerées.

Enfants : ampoule 1 — — Sirop 1 à 3 cuil. à soupe.

Prix : { la boîte de 6 ampoules de 15 cc.
26 fr. 25 { le flacon de sirop de 300 gr.
66 fr. 30. le coffret de 18 ampoules.

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie
GENNEVILLIERS (Seine).

HÉPAMULT

Extrait du Foie.

Réalisation pratique des méthodes de Whipple et de Castle sous une forme nouvelle, solide (granulé dragéifié) qui permet un emploi facile et un prix de revient moindre. 20 grammes d'Héпамult équivalent très sensiblement, quant à leur action antianémique, à 500 gr. de foie frais. C'est donc la dose quotidienne d'un traitement très énergique, permettant cependant aux fonctions digestives des malades de s'accommoder simultanément de la ration alimentaire que le médecin peut, d'autre part, juger utile.

Doses. — 10 ou 20 gr. par jour (2 ou 4 cuillères, mesure incluse dans la boîte).

Emploi. — Au milieu ou à la fin d'un ou des repas. Ne pas mâcher (amertume). Avaler soit avec une gorgée de liquide, soit mélangé à un peu de potage, purée, confiture, etc.

Prix : 21 fr. 75. la boîte pour 5 à 10 jours.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.
21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 08-00.)

HÉPANÈME CARRION

Médication des anémies en général.

Composition. — Association d'extrait concentré de foie, de protoxalate de fer et de phosphate de soude.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Posologie et mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés : 23 fr. 35.

Enregistré au L. N. C. 514-37.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré

PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

HÉPANOVA

Extrait sec hydrosoluble désalbuminé de foie de veau et de rate.

Traitement des diverses anémies.

Troubles de croissance, Rachitisme, Neurasthénie, Convalescence, Suites d'opérations et de gripes.

10 ampoules buvables de 5 cc. Prix : 36 fr.

Chaque ampoule correspond à :

50 grammes de Foie de Veau,

0 gr. 30 de Rate fraîche.

Mode d'emploi. — Une ampoule avant chaque repas à prendre dans un peu d'eau sucrée.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1573.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en pharmacie.

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

HÉPAPHOS

Reconstituant général.

Composition et forme. — Granulé fondant à base de : Extrait de Foie, Protoxalate de fer, Phosphore végétal, Vitamines.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant âge et indications du médecin.

Indications thérapeutiques. — Anémies légères, Convalescences, Troubles de croissance, Surmenage, Déminéralisation.

Aucune contre-indication.

Prix : 21 fr. 30 (traitement d'une semaine).
Si Anémies graves, prescrire HÉPATROL.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73 et 74.)

HÉPARÉGULINE WANDER

Régulateur des fonctions hépatiques, stimule le foie, draine la bile.

Composition. — Sulfate de magnésie desséché, citrate trisodique, peptones polyvalentes purifiées, extrait d'artichaut désalbuminé, extrait de boldo. Sucre aromatisé.

Forme — Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Cholérétique. — Stimule la cellule hépatique, active la sécrétion biliaire, réveille les fonctions glyco-génique, antitoxique, uropoïétique du foie.

Cholagogue. — Provoque l'excrétion biliaire, draine les voies intestinales.

Indications thérapeutiques. — Affections hépato-biliaires. — Congestion du foie et de la vésicule biliaire, insuffisance hépatique, cholémie, lithiase biliaire, cholécystites médicales, ictères.

Affections intestinales. — Nausées, constipation, entéro-colite.

Troubles généraux. — Céphalées, migraines, vertiges, urticaire, maladies des pays chauds.

Mode d'emploi. — Le matin à jeun, 20 minutes avant le petit déjeuner dans un demi-verre d'eau tiède.

Dose curative (10 à 15 jours) : 2 à 4 cuillerées à café.

Dose d'entretien (2 à 3 mois) : 1 à 2 cuillerées à café pendant 3 à 4 jours, puis repos 2 à 3 jours, ensuite reprendre la cure.

Enfants (au-dessus de 3 ans) : 1/4 à 1 cuillerée à café suivant l'âge.

Durée moyenne du traitement : 3 semaines.

P. BASTIEN, Pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine). — (Téléphone : Tremblay 09-73, 09-79.)

HÉPARTICHAUT INFANTILE

Granulé.

Extrait mou d'artichaut	2 gr.
Poudre de foie.....	2 gr.
Citrate de soude	5 gr.
Citrate d'hexaméthylène-tétramine.....	0 gr. 50
Manne.....	5 gr.
Excipient Q. S. pour.....	100 gr.

De 1/2 cuillerée à café à 3 cuillerées à soupe par jour (de 3 mois à 15 ans)
avant les repas :

HÉPARTICHAUT ADULTES

Dragées.

Extrait sec d'artichaut	0 gr. 05
Poudre de foie.....	0 gr. 10
Bile.....	0 gr. 05

De 1 à 6 dragées par jour avant les repas. par dragée

Indications. — Toutes les insuffisances hépatiques, Ictères, Cholémies familiales, Disfonctionnement hépatique consécutif aux maladies infectieuses et aux intoxications, Constipation d'origine hépatique et ses conséquences : Migraines, Dermatoses, etc...

4. Laboratoire R. COUDERT

Ex-interne des Hôpitaux de Paris et des Asiles de la Seine,
19, avenue Payret-Dortail, PLESSIS-ROBINSON (Seine).
(Tél. : Sceaux 1306.)

HÉPASEL

Rééducateur de l'intestin, aucune accoutumance.

Forme. — Poudre dans un tube, goût agréable.

Composition. — Sulfate de soude 2 gr., 25, Bicarbonate de Na 3 gr., Phosphate de Na 2 gr., Citrate de Na 1 gr., Extraits de Cynara, de muqueuse intestinale, excipient q. s. pour un tube.

Indications. — Constipation; insuffisance hépatique; lithiase biliaire; toutes infections intestinales; dyspepsie; migraines; rhumatismes; obésité; dermatoses: acné, eczéma; anaphylaxies, etc.

Posologie. — Tous les 2 jours, le matin, à jeun, le contenu d'un tube à dissoudre dans un demi-verre d'eau tiède sucrée ou non.

Prix de la boîte de 12 tubes; 15 fr. 60.

Enr. au L. N. C. M. n° 1837-3.

Laboratoire LORMEAU

27, rue Planchat — PARIS (XX^e).

HÉPASMAN

Extrait de foie frais préparé selon la méthode de Whipple associé au phosphore et à l'arsenic.

Asthénies. Dépressions. Etats ganglionnaires.

Boîte de 10 ampoules buvables.

Adultes : 2 ampoules par jour 1/4 d'heure avant les repas dans un peu d'eau sucrée.

Enfants : A partir de 1 an, 1 ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée à boire en 2 fois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1750-1.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.)

HÉPATHÉMO DESCHIENS

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.

Méthode de Whipple. Technique de Minot et Murphy.

Indications. — Syndromes anémiques, Anémies pernicieuses. Asthénies. Insuffisance hépatique.

Formes thérapeutiques. — Ampoules buvables non injectables, Sirop.

Présentation. — *Ampoules* : 1 ampoule de 10 cc. correspond à 125 gr. de foie de veau frais. 1 ampoule de 3 cc. correspond à 38 gr. de foie de veau frais.

Prix. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 37 fr. 50.

Coffret de 18 ampoules : 100 fr.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 30 fr.

Sirop : 1 cuillerée à soupe correspond à 24 gr. de foie de veau frais.

Prix du flacon de sirop de 275 cc. 32 fr.

En raison de sa concentration élevée l'HÉPATHÉMO DESCHIENS constitue une médication relativement peu onéreuse.

Posologie. — *Adultes* : Anémies graves : 3 ampoules de 10 cc. par jour. Anémies moyennes : 1 à 2 ampoules de 10 cc. par jour ou 2 à 4 cuillerées à soupe de Sirop. Anémies légères : 1 ampoule par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe de Sirop. Insuffisance hépatique : 1 à 3 amp. de 3 cc.

Enfants : Sirop de préférence ou 2 à 3 ampoules de 3 cc. par jour.

Mode d'emploi. — Les ampoules ou le sirop seront absorbés dans un liquide non alcoolique tiède, de préférence à la fin des deux principaux repas.

Laboratoires DESCHIENS

9, rue Paul-Baudry — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Élysées 40-26.)

HÉPATICALCION GRÉMY

Composition. — Chlorure de calcium associé à l'extrait de foie de veau frais, assurant ainsi la production de fibrinogène nécessaire à la coagulation sanguine et la compensation des troubles d'origine vasculaire de la crase sanguine.

Deux préparations en une seule.

Indications. — Prophylaxie opératoire. Hémostase pré et post-opératoire. Hémorragies capillaires, soit post-opératoires, soit médicales, relevant d'un vice de coagulation. Tonification de l'organisme après le choc opératoire. Diurétique. Recalcifiant.

Forme et posologie. — Gouttes.

Enfants jusqu'à 2 ans. V gouttes.

— 9 ans XXV —

Au-dessus de 9 ans et adultes. L —

3 fois par jour.

Prix : le flacon, 18 fr. 35.

Enregistré L. N. C., n° 508-69.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 48-43.)

HÉPATIC-EFA DU D^r LECACHEUX

Ampoules buvables et cachets combinés.

SYNERGIE VÉGÉTALE ATOXIQUE

Utilisant les propriétés pharmacodynamiques remarquables d'un élément thérapeutique nouveau :

LA CHÉLIDOÏNE

Action Cholérétique intense, triple de celle de l'artichaut
Action cholécysto-sédative élective par abaissement du tonus vésiculaire. (Cf. prof. Loeper, A. Lemaire, H. Dany : « La méthode stigmométrique dans l'étude de certains cholérétiques », *Progrès médical*, n° 34, 1932.)

Composition. — Extraits spéciaux de plantes fraîches stabilisées : Eclaire (ou Chélidoïne), Fenouil, Artichaut (Efa).

Propriétés. — Active directement la sécrétion hépatique. Apaise électivement le spasme vésiculaire. Facilite, par ces deux actions conjuguées, le drainage médical de la vésicule. Sédatif profond et régulateur physiologique atoxique.

Indications. — Stase, Rétention, Lithiase biliaire, Insuffisance hépatique constitutionnelle ou acquise et toutes ses manifestations secondaires, spécialement : Migraines, Eczéma.

Formes pharmaceutiques :

Boîte de 12 ampoules buvables et 12 cachets. 37 fr. 10
Boîte d'essai, 6 ampoules buv. et 6 cachets... 20 fr. 70

Posologie. — 1 cachet au réveil avec 1/2 verre d'eau.
1/4 d'heure après prendre le contenu d'une ampoule dans un peu d'eau.

Tolérance absolue.

Laboratoire HÉPATIC EFA du D^r LECACHEUX

A. CHIQUEL, Pharmacien

5 bis, rue de Crimée — PARIS (XIX^e).

HÉPATICOL

Granulés fondants.

Composition :

Extrait mou de romarin	1 gr.
— de sauge	0 gr. 50
— de mélisse	0 gr. 50
— de boldo	1 gr.
— de combretum	1 gr.
— de Podophyllum	0 gr. 05
Sulfate de Magnésie	28 gr.
Salicylate de soude	1 gr. 50
Urotropine	0 gr. 70
Peptone de fibrine	1 gr. 00
— de gélatine	1 gr.
— de viande	1 gr.
Sucre aromatisé	q. s. pr. 100 gr.

Indications. — Excitation de la cellule hépatique. Drainage médical des voies biliaires. Antisepsie hépatique rénale et intestinale. Anaphylactique.

Posologie. — 2 cuillerées à café (ou 10 gr.) le matin à jeun dans 1/2 verre d'eau tiède. 1 cuillerée à café pour les enfants à partir de 5 ans.

Prix : 19 fr. 25.

L. N. C. M. n° 1208-1.

Laboratoires Olivéol et Hépaticol ÉTIÉVANT

ED. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône). Tél. : 140-38.

HÉPATISMINE

Suppléance et stimulation de toutes les fonctions du foie par synergie physiologique.

Composition. — Extraits : biliaire, 0,10 ; hépatique, 0,01 ; pancréatique, 0,01 ; duodénal, 0,01 ; boldo, 0,005, évonimine, 0,005 ; podophylline, 0,005 ; oléate de soude, 0,05 ; urotropine, 0,05, en comprimés glutinifiés dragéifiés.

Cholagogue, excitant des fonctions hépatique, vésiculaire, pancréatique et intestinale. Antisepsie biliaire et urinaire. Prophylaxie des maladies dites par ralentissement de la nutrition.

Indications. — Hépatisme, cholémies familiales, insuffisances hépatique et biliaire, constipation, goutte, arthritisme, dermatoses, asthme uricémique, glycosurie, pléthore abdominale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés à chaque repas.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 40 comprimés.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

HÉPATO-5

Le meilleur agent de drainage du foie et des voies biliaires.

Sans aucune contre-indication.

Composition :

Peptone de viande	8 gr.
Sulfate de magnésie.....	20 —
Sulfate de soude.....	5 —
Hyposulfite de magnésie	5 —
Extrait de boldo	2 —
Pour 100 grammes de granulé.	

5 indications principales :

- 1° *Troubles hépatiques proprement dits* : Engorgement du foie et de la vésicule, ictères, cirrhoses.
- 2° *Troubles anaphylactiques* : Migraine, urticaire, eczémas, vertiges.
- 3° *Troubles dyspeptiques réflexes* ; Hyperchlorhydrie par insuffisance biliaire, aérophagie, rougeurs de la face après les repas.
- 4° *Troubles intestinaux* : Constipation, alternative de diarrhée et de constipation, aérocolie.
- 5° *Troubles nerveux fonctionnels* (le plus souvent d'origine hépatique) ; Émotivité, angoisse, tremblements.

Posologie : De 1 à 3 cuillerées à café dans un quart de verre d'eau tiède, le matin à jeun. 15 jours par mois.

Enfants : 1/2 dose.

Présentation. — Granulé extrêmement friable et soluble, agréable au goût, en boîtes métalliques contenant la quantité suffisante pour un traitement de 12 à 15 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1969-1.

Prix : 21 francs.

Laboratoire C. ROYANNAIS

17, rue Bodin — LYON (I^{er}).

Envoi d'échantillons médicaux sur demande.

(Tél. : Burdeau 13-66.)

HÉPATOCARNINE LEFRANCO

Synergie hépatocarnée.

Composition. — Association de la méthode de Whipple et de la Zomothérapie. (Extrait de Foie de Veau Frais et Suc Musculaire de bœuf cru, à haute concentration.) Action synergique des principes musculaires et hépatiques.

Propriétés. — Antianémique par le foie de veau frais, reconstituant général par le suc musculaire cru.

Indications. — Toutes les anémies, pernicieuses, primitives ou secondaires, médicales ou chirurgicales, anémie infantile, lymphadénie, anémie rachitique, anémie des tuberculeux, toutes déficiences permanentes ou transitoires de l'organisme.

Présentation. — Coffret de 20 ampoules buvables de 10 cc. Boîte de 10 ampoules de 10 cc. Présentation spéciale pour enfants.

Posologie. — 2 à 3 ampoules par jour avant les repas dans 1/2 verre d'eau froide, naturelle ou gazeuse.

- a. *Traitement d'attaque* : 3 ampoules par jour pendant 15 jours.
- b. *Traitement d'intensité moyenne* : 2 ampoules par jour pendant 10 jours. A renouveler après 10 jours d'interruption.
- c. *Traitement d'entretien* : 3 fois par semaine pendant 1 mois, 2 ampoules par jour.

Remarque. — L'Hépatocarnine peut être employée chez le nourrisson en la mélangeant au lait du biberon (au-dessous de 40°), à la dose de 1 à 2 ampoules.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, av. de Metz. - ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52.)

HÉPATOCURCUMINE

Composition :

Poudre de Curcuma Xanthorriza	0,15
Hyposulfite de Magnésium.....	0,05
Oléate de Sodium	0,05

Pour 1 comprimé dragéifié.

Propriétés. — Cholérétique, antispasmodique, cholérolytique et cholagogue par les constituants du Curcuma. Antianaphylactique par l'hyposulfite de Mg, la faible dose d'oléate de Na permettant de compléter le nettoyage vésiculaire sans action brutale.

Indications. — Insuffisance hépatique, ictère, cholécystites, angiocholites, lithiase biliaire, constipation d'origine hépatique, urticaire.

Mode d'emploi. — *Dose normale* : 3 à 5 comprimés par jour.

Affections aiguës : dépasser largement ces doses.

Cure d'entretien : 2 à 3 comprimés par jour d'une façon prolongée.

Enregistré au L. C. M. sous le n° 1887-1.

Laboratoires de l'Hépatocurcumine

G. ROZÉ, Pharmacien,

16, rond-point de la Station — LE RAÏNCY (S.-et-O.).

HÉPATOCURE

Comprimés.

Indications. — Toutes insuffisances hépatiques et biliaires, Hypercholestérolémie, Hyperviscosité sanguine, Aérophagie, Maladies hépatiques des pays chauds, etc.

Formule. — Crème de tartre 0 gr. 25, Benzoate de soude 0 gr. 05, Citrate de soude 0 gr. 075, Phosphate de soude 0 gr. 025, Bicarbonate de soude 0 gr. 05, Peroxyde de magnésium 0 gr. 05, Calomel 0 gr. 000166, Urotropine 0 gr. 005, Extrait de genièvre 0 gr. 00375, de Boldo, d'Artichaut, de Cresson, de Raifort, de Pissenlit 0 gr. 00225, de Chélidoine 0 gr. 0005 pour 1 comprimé.

Doses et emploi. — Varie suivant le cas à traiter. En général 2 comprimés le matin à jeun et 2 comprimés 1 heure ou une demi-heure avant les repas, délayés dans un peu d'eau chaude.

Ce produit sera utilisé avec profit en association avec le médicament spécifique (par exemple, dans le cas particulier de l'aérophagie, emploi simultané d'*Entéro-cuprol* et d'*Hépatocure*).

Prix : 18 fr. 75 la boîte de 48 comprimés.

Enreg. au L. N. C. M., n° 1676-1.

Laboratoire G. CALMELS
AUTERIVE (Haute-Garonne)

HÉPATODIAGNOSE

Composition. — Galactose chimiquement pur.

Propriétés et indications :

Ce produit est utilisé pour l'exploration fonctionnelle du foie par la galactosurie provoquée (méthode de Bauer mise au point par divers auteurs français).

Posologie. — Technique du procédé et de l'analyse sur demande.

Prix :

La dose de 40 grammes : 21 fr. 20.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

HÉPATODIASE

Composition :

Opothérapie gastro-intestinale associée aux ferments. En comprimés dragéifiés à base de diastase, pepsine, duodénium, orchitine, chlorure de magnésium, bromure de calcium et noix vomique.

Indications :

Traitement rationnel de toutes les affections du tube digestif. Dyspepsie nerveuse, entérite muco-membraneuse, aérophagie. Décongestif du foie.

Posologie :

Avaler sans croquer deux comprimés après chaque repas.

Prix : 16 francs.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

HÉPATOGENES CHARVOZ

Composition. — Extraits biliaires, 0,10 ; Boldine cristallisée, 0,005 ; Extraits de Buxus, 0,03 ; Combretus, 0,02 ; Rhamnus, 0,05 ; Calomel, 0,0001.

Indications. — Affections hépato-biliaires et syndromes associés, *Constipation*.

Posologie. — 2 pilules avant chaque repas.

Prix : Le tube de 50 pilules : 15 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 80-2.

Laboratoires CHARVOZ

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV^e).

HÉPATOGENINE

Composition. — Extraits d'artichaut, boldo, bourdaine, noyer.

Indications thérapeutiques. — Traitement des affections hépato-biliaires et des constipations, Migraines, Dermatoses, Troubles digestifs d'origine hépatique, Ictères.

Mode d'emploi. — 3 à 6 pilules par jour.

Présentation. — Pilules (60 par étui).

Prix : 22 fr. 50.

Laboratoires BOIVERT

MONTGUYON (Charente-Inférieure).

HÉPATOglobine

Composition. — Extrait spécial de foie frais hypophysé.

Chaque ampoule correspond à 100 gr. de foie frais endolysé au sérum de cheval, renforcé par l'addition de :

Hémoglobine	0,30
Extrait d'hypophyse totale	0,05

Forme. — Ampoules buvables de goût agréable.

Indications. — Anémies, Tuberculose, Surmenage, Convalescences.

Doses. — Une à deux ampoules par jour.

Prix : 23 fr. 50 la boîte de six ampoules.

Durée de la boîte : 3 à 6 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1003-8.

Laboratoires CH. VERGELOT

6, rue de Navarin — PARIS.

(Tél. : Trudaine 10-88.)

HÉPATOMAGNÉSION

Toutes affections biliaires, hépatiques et digestives.

Peptone sèche de viande..	4,00	Extrait mou de Boldo.....	0,10
— — de gélatine..	2,00	— — de camomille.	0,10
— — de witte....	3,00	— — de condurango	0,10
Sulfate de magnésie	20,00	— — de maté.....	0,10
Hyposulfite de magnésium.	7,00	— — de noyer.....	0,10
Excipient sucré aromatisé q. s. pour 100 gr.			

Indications. — Maladies du foie et des voies biliaires. Congestion hépatique et de la vésicule, lithiase biliaire, ictère, cholecystite chronique, troubles divers d'origine hépatobiliaire, inappétence, nausées, constipation, urticaire, prurit, certaines dermatoses.

Forme. — *Granulé* et *Comprimés* dragéifiés.

La composition des comprimés d'Hépatomagnésion est semblable à celle de l'Hépatomagnésion « Granulé ». La dose de 4 comprimés correspond exactement à une cuillerée à café de granulé.

Posologie. — *Granulé.* — *Adultes* : le matin, à jeun, dans un demi-verre d'eau légèrement chaude ; 1 à 2 cuillerées à café suivant les indications du médecin.

Enfants : Un quart à une cuillerée à café selon l'âge.

Comprimés. — De 2 à 8 dragées par jour selon les indications du médecin, le matin à jeun, ou une heure avant les repas, de préférence avec un demi-verre d'eau.

Prix au public : 18 fr. 55.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1079.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion.

A. Chatain, D^r en ph^{ie}, Ex-Int. en ph^{ie} des Hôp. de Lyon.

Dépôt général : 57, r. Pierre-Corneille — LYON. (Tél. : Lalande 41-81.)

HÉPATONIA

Présentation :

En tubes de verre scellés de 10 cc., par boîtes de 6 tubes (35 fr. 70), 10 tubes (51 fr.) et 30 tubes (137 fr. 70).

En tubes de verre scellés de 7 cc. et 5 cc., par boîtes de 10 (40 fr. 80) et 30 tubes (117 fr. 30).

En tubes de verres cellés de 2 cc., par boîte de 12 tubes (22 fr. 40).

Principes actifs. — Extrait de roie de veau, Extrait de rate de veau fraîche, Extrait muqueuse gastrique de porc, extrait de glandes surrénales fraîches, Autolysat épuré de levure de bière, Nucléinate de soude.

Indications. — Anémies de toutes origines (Méthode de Wipple) ; Dyspepsies à régime carencé (féculents, pâtes), Neurasthénie, Asthénies de toute origine et particulièrement dans la convalescence des fièvres graves (typhoïde, typhus, rhumatisme articulaire aigu, dysphétrie, grippe).

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 tubes de 10 cc., 2 à 3 de 7 cc., 2 à 4 de 5 cc. par jour, au début des repas, dans un peu de vin de liqueur, dans le potage, ou suivant les indications du médecin traitant.

Enfants : 1 à 3 tubes de 2 cc. suivant l'âge.

Se fait également sous forme de Granulés.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-11.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 40-83.)

HÉPATOSODINE

Comprimés. Granulé.

Médication alcaline polyvalente associée au benzoate de soude et à l'hexaméthylène tétramine.

Action. — Sur l'estomac, le foie, le sang, l'intestin.

Indications. — Insuffisance hépatorénale sous toutes ses formes. Angiocholécystites chroniques ou subaiguës, congestion hépatique, lithiase biliaire, ictère, hypotonie gastrique avec retard à l'évacuation, désintoxication pré ou post-opératoire.

Doses et mode d'emploi :

Troubles gastriques : $\frac{1}{2}$ à 1 cuillerée à café de granulé dans un verre d'eau pure ou minérale, ou 4 à 10 comprimés absorbés avec quelques gorgées d'eau pure ou minérale, le matin à jeun et le soir 1 heure avant le repas.

Troubles hépatiques : $\frac{1}{2}$ cuillerée à café de granulé ou 4 comprimés pris de la même façon, mais seulement le matin au réveil.

Constipations par insuffisance biliaire : 1 à 3 cuillerées à café de granulé ou 8 à 16 comprimés pris de la même façon, mais seulement le matin au réveil.

Indications diverses : Syndrome entéro-rénal, auto-intoxications, colibacillose, désintoxications pré et post-opératoires.

Dose moyenne : $\frac{1}{2}$ à 1 cuillerée à café de granulé ou 4 à 10 comprimés absorbés de la même façon, soit le matin à jeun au réveil, soit midi et soir, une heure avant les repas, suivant indications du médecin.

Prix :

Granulé : Le flacon : 17 francs.

La boîte triple dose : 38 fr. 20.

Comprimés : Le flacon : 18 fr. 35.

Le flacon triple dose : 43 fr.

**Société Industrielle de Thérapeutique
Scientifique Appliquée.**

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

[et DURET et RÉMY réunis]

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

HÉPATOSTIMULINE MANOR

Composition. — Hyposulfite de Magnésie, Urotropine et Salicylate de soude en dragées glutinisées.

Propriétés. — C'est le meilleur désinfectant vésiculaire, l'antianaphylactique le plus complet. Véritable *aliment soufre*, complètement assimilable, il stimule les fonctions digestives et de nutrition ; c'est en même temps un anti-arthritique de grande valeur.

Indications. — 1° *Foie, vésicule et intestin* : toutes les manifestations de l'Hépatisme et surtout la Cholécystite chronique, les Lithiases, Ictères, Colites, Toxémies, Constipation, Diarrhées, Pituites, Céphalées, Anorexies, etc.

2° *Dermatoses récidivantes et prurigineuses.*

3° *Rhumatismes et troubles de la nutrition* : Goutte, Lithiases, Arthrites, Obésité des arthritiques, etc...

Doses. — 2 à 5 dragées, vers 10 et 17 heures ou avant les repas.

Remarque. — Dans de nombreux cas, il sera utile ou nécessaire de faire en même temps du drainage biliaire avec la *Chronicystine*. (Voir ce mot.)

Prix : le grand flacon pour 20 à 30 jours, 20 francs.
Enreg. au L. N. C. M. sous le n° 1671-2.

Laboratoires MANOR
SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (S.-et-L.).

HÉPATOSUC

Composition. — Nutriment synergique à base d'organes frais (foie et rate de génisses sacrifiées le matin même) et de sucs végétaux hépatotropes (carottes et oignons frais).

Indications. — Toutes déficiences organiques (anémies même graves, insuffisances hépatiques et spléniques) et troubles nerveux consécutifs (amnésie, hallucinations), action antitoxique vis-à-vis des traitements spécifiques (antisypilitiques, sulfamides, produits radio-actifs) et désensibilisatrice d'où son heureuse association au sérum de cheval (voir *Traitement Complet Nutriment*).

Posologie et forme pharmaceutique. — Ampoules buvables de 10 cc. (boîtes de 6 et coffrets de 18 ampoules).

Mode d'emploi. — 2 ampoules par jour pour les adultes, moitié dose pour les enfants, à absorber dans un demi-verre d'eau froide, sucrée de préférence, à jeun ou quelques heures après le repas en cas de digestion difficile.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1826-1.

Prix de vente au public :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 19 fr. 10.

Coffret de 18 ampoules de 10 cc. : 51 francs.

NOTA. — Voir *Traitement Complet Nutriment*.

Laboratoire des NUTRIMENTS

34, rue Pigalle — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 18-18.)

HÉPATOVEINE LEBROT

Comprimés F et M.

Médication hépatique et vasoconstrictive en association endocrinienne.

Action. — Nouvelle thérapeutique des affections veineuses et des troubles circulatoires liés au Disfonctionnement Foie-Circulation-Porte, au Déséquilibre neuro-endocrinien, à l'Insuffisance de la circulation périphérique et de retour, à l'Hypotonie de la tunique musculaire veineuse et veinulaire.

Formule. — Hépatine, Sels biliaires, Boldo, Noix vomique, Marron d'Inde, Iode organique, Extrait pancréatique, Hormone folliculaire (Form. F), Extrait androïque (Form. M), complexe pluriglandulaire.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Phlébites, Cyanoses, Syndrome de Raynaud, Troubles de la Menstruation et de la Ménopause. Insuffisance ovaro-hépatique. Suites d'Ovariectomie, Obésité.

Mode d'emploi. — 1, 2, 3 comprimés matin, midi et soir avant les repas. Prescrire à dose faible s'il y a hypotension, et à dose forte s'il y a hypertension. Interrompre pendant les règles.

Prix : La boîte de 50 comprimés : 22 fr. 50.

Laboratoire de Contrôle n° 2008-2 et 3.

Dépôt : Les Laboratoires BIO-BOURGOGNE

J. LEBROT, pharmacien

24, avenue Albert-1^{er} — DIJON. (Téléph. : 21-06.)

HÉPATOXANE

1° COMPRIMÉS

Composition. — Curcuma xanthorriza 0 gr. 20 par unité.

Actions pharmacodynamiques. — Cholérétique puissant, cholagogue non brutal, antispasmodique et antiseptique des voies biliaires, décholestérinant.

Indications. — a. Lithiase biliaire, Cholécystites et Péri-cholécystites, Angiocholites, Coliques hépatiques et vésiculaires, ictères, Maladies tropicales du foie, Cellulite et Cholestérolémie.

Insuffisances hépatiques : Congestions, Stases intestinales, Cirrhoses, Urticaires, Migraines, etc.

Avantages. — 1° Activité nette sans porter atteinte à l'intégrité de la cellule hépatique ;

2° absence de toute toxicité ;

3° pas d'accoutumance.

Posologie. — *Dans les crises aiguës* : 1 à 2 comprimés toutes les 3 heures.

Dans les troubles hépato-biliaires : 1 à 3 comprimés le soir

2° GRANULÉ

Composition. — Curcuma xanthorriza, hyposulfite de magnésium, citrate de Na et complexe opothérapique à doses très faibles.

Actions pharmacodynamiques. — Comme pour les comprimés en plus : désensibilisant énergique et neutralisant gastrique.

Indications. — Comme pour les comprimés ; en plus Anaphylaxies (Urticaire, Eczéma, Œdème de Quincke) et Affections gastriques.

Posologie. — *Dans les crises aiguës* : 1 à 2 cuillerées à café toutes les 3 heures.

Dans les troubles hépatiques et digestifs : 1 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

Dans les anaphylaxies : 1 à 2 cuillerées à café avant les 2 principaux repas.

Enfants : 1/2 dose.

N. B. — Suivre le traitement 10 jours sur 15 au début puis 10 jours par mois.

Laboratoires d'ACTITHÉRAPIE

Blaise FROSSARD, Pharmacien

91, rue de Monceau — PARIS (8°).

HÉPATROL BUvable

Extrait hydrosoluble de foie de veau frais.
Méthode de Whipple.

Sans contre-indication. *Adultes et enfants.*

Indications. — Toutes anémies, asthénies.
insuffisances hépatiques.

Formes thérapeutiques. — Ampoules bu-
vables non injectables.

Présentation. — Ampoules de 10 cc. =
125 gr. de foie de veau frais.

Boîtes de 6 ampoules : 48 francs.

Coffret de 18 ampoules : 128 francs.

Ampoules de 5 cc. — 1 ampoule = 62 gr. 50
de foie de veau frais.

Boîte de 8 ampoules : 32 francs.

Ampoules de 2 cc. — 1 ampoule = 25 gr. de
foie de veau frais.

Boîte de 12 ampoules : 26 fr. 50.

(En raison de son activité incomparable
l'HÉPATROL est le meilleur marché de
tous les extraits de foie).

Posologie. — *Anémies graves* : Ampoules de
10 cc. associées ou non à l'HÉPATROL
injectable.

Anémies moyennes : Ampoules de 5 cc.

*Anémies légères de l'adulte, insuffisances hépa-
tiques, toutes anémies de l'enfance* : Am-
poules de 2 cc.

Mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour
à prendre dans un liquide quelconque au
début des repas.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPATROL INJECTABLE

Extrait de foie de veau frais entièrement déprotéiné ayant conservé toutes les hormones hépatiques de l'organe frais.

Indications. — Anémies graves et cas d'intolérance absolue au traitement *per os*. Permet démarrage rapide.

Mode d'emploi. — Par voie intramusculaire, injecter chaque jour 1 à 4 cc. jusqu'à démarrage et disparition de l'intolérance, puis associer l'HÉPATROL buvable.

En raison de la purification très poussée de l'Hépatrol injectable, ces doses peuvent être très largement dépassées sans crainte d'intolérance.

Présentation :

Ampoules de 2 cc. — Activité égale à celle de 250 gr. de foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 96 francs.

Boîte de 6 ampoules : 48 francs.

Ampoules de 1 cc. — Activité égale à celle de 125 gr. foie de veau *per os*.

Boîte de 12 ampoules : 53 fr. 30.

Boîte de 6 ampoules : 26 fr. 65.

Voir communications :

Société Médicale Hôpitaux, 19 mai 1930 (Aubertin).

Presse Médicale, 20 septembre 1930 (Achard).

Société Dermatologique, janvier 1931 (Pinard).

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

HÉPAVITA

Hépatothérapie suractivée : foie de veau, rate et rein (avec la surrénale), Glandes fraîches avec les acides aminés générateurs de l'hématopoïèse : histidine, tryptophane.

Indications. — Anémies graves, post-opératoires, et hémorragiques, pré-tuberculose, Débilité générale, convalescence, chlorose, surmenage, amaigrissement, neurasthénie, troubles de la formation, suites de la tuberculose, du paludisme et des maladies infectieuses. Insuffisance hépatique, Faiblesses, Anorexie, Asthénies, Carences, Hypoglobulie, anémies hypochrome et avec abaissement de l'indice colorimétrique (anisocytose, microcytose et poikilocytose).

Action. — Enrichissement du sang en globules rouges et augmentation du taux de l'hémoglobine, rôle antianémique, antihémorragique, antitoxinique.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules de 10 cc. avant les deux repas dans un demi-verre d'eau pure ou gazeuse, de vin, ou avec une cuillerée de potage ou jus de citron. *Enfants* : 1 ampoule de 5 cc.

2 Présentations. — Ampoules buvables de 10 cc. et 5 cc.

Prix de vente : 22 fr. Coffret de 24 amp. de 10 cc. : 72 francs.

Coffret de 30 ampoules de 5 cc. : 60 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 598.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoires M. DE RIVE

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX°).

HÉPAX

Liquide.

Composition :

Artichaut extrait mou.....	12 gr.
Polypode ext. fluide.....	10 gr.
Orthosiphon ext. fluide.....	10 gr.
Boldo ext. fluide.....	10 gr.
Combretum ext. fluide.....	10 gr.
Adonis vernalis ext. fluide.....	5 gr.
Peptone polyvalente.....	2 gr.
Chlorure de magnésium.....	1 gr.
Excip. arom.	q. s. p. 100 gr.

Indications : Intoxications et troubles généraux d'origines :

Digestive : anorexie, dyspepsies, constipation.

Hépatique : insuffisance, congestion, ictères.

Rénale et alimentaire : insuffisance de diurèse, excès d'urée sanguine.

Dermatoses : prurits, urticaire, anaphylaxie.

Doses. — *Adultes* : De 30 à 50 gouttes, trois fois par jour avant les repas, dans un peu d'eau sucrée, non sucrée ou dans une infusion.

Enfants : Une goutte par année d'âge avant les 3 repas.

Composé d'extraits végétaux sélectionnés, hyperactifs, HEPAX est cholagogue, diurétique, antitoxique.

Inscrit au Labor. National de Contrôle N° 742-13.

Laboratoires P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie,

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV°)

HEPBI

Hépatrol-Bismuth.

Composition. — La première réalisation de l'association bismuth + extrait de foie en solution aqueuse.

1 ampoule 2 cc. = Bi 4 centigr. + 30 gr. foie de veau frais.

Propriétés. — Pas d'asthénie bismuthique ni de phénomènes d'intolérance, pas de réaction locale ni d'accumulation, résorption immédiate. Action rapide, évite toute complication rénale. Donne une grande souplesse au traitement, possibilité de rapprocher les séries.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes.

Formes. — *Adultes*: Ampoules de 2 cc.

(Boîtes de 12 : 42 fr. 50)

Enfants: Ampoules de 1 cc.

(Boîtes de 12 : 26 fr. 50)

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

HÉPENTÉRYL

Spécifique rationnel des Affections hépatiques et intestinales.

Composition. — Boldine, pilocarpine, podophylline, extrait de belladone, calomel, ipéca, bioxyde de manganèse, hyposulfite magnésie, hypophyse, polypeptones, ext. bile de bœuf.

Présentation. — *Dragées* glutinisées de 0 gr. 40.

Posologie. — *Adultes*: 3 à 6 par jour pendant les repas. Avaler sans croquer.

Enfants à partir de 6 ans: 2 par jour. Traitement 15 jours.

Prix de vente public: 20 fr. 40.

Laboratoires BOUCLY

Grande-Place — LOUVROIL (Nord). (Tél.: 28.)

HEPTYL BOURDOU**TONIQUE VIVANT****Composition :**

Glycérophosphate de soude.....	0 gr. 25
Iode Métalloïdique.....	0 gr. 01
Fluorure de sodium.....	0 gr. 01
Chlorure de Manganèse.....	0 gr. 03
Chlorure de Magnésium	0 gr. 03
Matéine (caféine de Maté).....	0 gr. 10
Glucose de raisin.....	8 gr.
Muscat.....	Q. S. pour un verre à madère.

Propriétés. — Stimulant physiologique des diverses fonctions de l'organisme ; tonique du système nerveux et du système circulatoire ; excitant de la nutrition, riche en vitamines B, C et D, l'*Heptyl* favorise l'élimination des déchets et active les sécrétions gastriques et intestinales.

Indications. — Asthénie, Déminéralisation, Anémie. Tous les états où la stimulation des systèmes nerveux, circulatoire, hépatique, urinaire, etc., est nécessaire : convalescence, dyspepsies, obésité, grippe, etc.

Posologie. — Dose avant chaque repas : *Adultes* : 1 verre à Bordeaux. *Enfants* : demi-dose.

Prix au public : 20 francs le flacon de 500 cc.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle sous le n° 1142-1.

Laboratoires BOURDOU,

FRONTIGNAN (Hérault).

(Tél. : 21.)

HERGENOL

Indications. — Coqueluche, Toux spasmodiques et bacillaires, Asthme.

Composition. — Essences naturelles balsamiques et carbures halogènes, antispasmodiques.

Forme. — Produit volatil, usage externe.

Emploi. — Verser XXX gouttes sur un carré de flanelle. A maintenir en permanence à proximité des voies respiratoires.

Doses. — *Bébés et enfants* : renouveler 2 à 3 fois au cours des 24 heures.

Adultes : 3 à 4 fois suivant besoin.

Prix : le flacon stilligoutte : 15 fr. 60.

Durée moyenne : 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

HERMOPHÉNYL LUMIÈRE

Antisypilitique, Cholagogue, Antiseptique externe.

Constitution. — Mercure phénol-disulfonate de sodium représente 40 p. 100 de mercure métallique.

Propriétés. — Elimination rapide, sans aucune réaction nocive sur le rein. Son hypotoxiciété permet à chaque injection intramusculaire d'administrer 5 fois plus d'Hg métallique qu'avec le cyanure.

Indications et doses.

1° *Syphilis* : Accidents primaires, secondaires et tertiaires.

a) Par voie sous-cutanée : injections intra musculaires ou dans le tissu cellulaire). 10 à 20 centigr. par injection. Une injection tous les 2 ou 3 jours.

Boîte d'ampoules d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE, 10 centigr. par cc. titrée à 5 centigr.

b) Par voie stomacale : de 20 à 30 centigr. par jour d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE en dragées.

Flacon de dragées d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

2° *Antisepsie.*

a) Chirurgie : Antisepsie des surfaces et des cavités purulentes, lavages des mains et des instruments, solution de 1 à 10 p. 1 000.

Antisepsie des voies génito-urinaires : Blennorrhagies, injections urétrales, instillations et grands lavages uretraux ou vésicaux, solutions 1 p. 100 et 1 p. 200.

Cystites. Lavages vésicaux, solution à 7 p. 1 000.

Formuler. — Selon le cas :

Boîte de comprimés d'HERMOPHÉNYL LUMIÈRE.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

HEVOGLAN

Régulateur de la circulation veineuse.

Ménopause, Hémorroïdes, Varices, *Ulcères variqueux* (pour ce dernier cas, appliquer en même temps sur la plaie la pommade *Hévoglanol*).

Forme. — Liquide.

Composition. — Parathyroïde, iode en composition organique, marron d'Inde stabilisé, hamamélis, cupressus, condurango, citrate trisodique.

Posologie. — Une cuillerée à café au début des repas de midi et du soir dans 1/4 de verre d'eau.

Durée de chaque flacon : 12 jours.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires A. BLANO
BARCELONNE-DU-GERS (Gers).
 (Tél. : 4.)

HEXORCÈNE

Hexylrésoroiné.

Antiseptique urinaire polyvalent, particulièrement actif contre le colibacille.

Indications. — Infections aiguës et chroniques de l'appareil urinaire : pyélites, pyélonéphrites gravidi-ques, cystites, urétrites, prostatites, infections secondaires de la tuberculose des voies urinaires.

Présentations :

Prix de vente :

Boîtes de 100 capsules.....	58 fr. 50
— 30 capsules.....	23 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Deux capsules dosées à 0 g. 15, trois fois par jour.

Augmenter progressivement la dose jusqu'à 4 capsules par prise, soit 12 au total.

Poursuivre le traitement au moins 15 jours après l'obtention de la première culture stérile d'urine.

Les capsules doivent être prises à la fin d'un repas.

Société Parisienne d'Expansion chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

HEXOTAL

Antiseptique urinaire et hépato-rénal.

Composition. — Citroléate d'Hexaméthylènetétramine ; Santalol pur et gluten.

Avantages. — Stabilisation de l'urotropine sous une forme combinée et indécomposable par le chimisme gastrique. Production de composés formolés dans l'appareil urinaire seulement. Pas de troubles concomitants. Jamais d'hématurie. Antisepsie de surface et de profondeur (Santalol). Histogénèse puissante. Action urisolvante. Tolérance indéfinie.

Emploi et doses. — *Cas aigus* : 6-12-15 globules par jour, à doses filées.

Cas chroniques : 6-8-10 globules par jour.

Indications. — Cystites, Prostatites, Gonococcies, Bactériuries, Pyélites, Pyélonéphrites, Colibacilloses, etc. Phosphaturies, Urines ammoniacales, Coliques hépatiques et néphrétiques, Cholécystites, Diatése urique. — Echantillons. Littérature.

Dépôt — Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS

Prix : (60 globules) 20 fr. 40.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS

(Tél. : Gobelins 00-70.)

HIGADOSE

Médication synergique des affections hépatiques, des voies biliaires et rénales.

Composition. — Huile de Harlem pure, Bile dépigmentée et décholestérinée, Oléate de Soude anhydre, chimiquement pur.

Présentation. — Forme capsules (ne se dissociant que dans l'intestin).

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Ictère, Coliques hépatiques, Lithiase biliaire, Cirrhoses atrophiques, Congestion du foie, Coliques néphrétiques, Lithiase rénale, Pyélonéphrites, Cystites, Goutte, Gravelle, Rhumatisme chronique.

Posologie. — *Traitement d'entretien* : 2 à 3 capsules par jour.

Traitement des affections aiguës : 6 à 8 capsules par jour.
(Aucune contre-indication. Innocuité absolue.)

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 14-12.)

HIPPOHÉMO

Composition. — Sérum normal de cheval prélevé en période de régénération globulaire.

Autorisation de fabrication et de vente. — Décret n° 101 du 25 février 1939.

Indications. — Anémies à leurs différents stades, Surmenage et Asthénie, Rôle protecteur vis-à-vis des infections et des intoxications par effet trophophylaxique, Action inhibitrice interne et externe contre les états précancéreux, Suites opératoires, Traumatismes, Brûlures, etc.

Posologie et formes pharmaceutiques :

1° *Ampoules exclusivement buvables de 10 cc. de sérum normal glyciné au dixième de son volume (boîtes de 6 et coffret de 18).*

2 par jour, dans un peu d'eau sucrée froide, de préférence à jeun ou une demi-heure au moins avant les repas.

Demi-dose pour les enfants.

Les doses peuvent être doublées sans inconvénient en cas d'hémorragie.

S'utilise également en lavement convenablement dilué dans l'eau tiède, ou pur et en applications locales (compresses).

2° *Sirop renfermant le quart de son poids de sérum, aromatisé à l'écorce d'orange amère.*

Doses : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour pour les adultes et à café pour les enfants.

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 1826-2 et 1826-3.

Prix de vente au public :

Boîtes de 6 ampoules de 10 cc. : 19 fr. 10.

Coffret de 18 ampoules de 10 cc. : 51 francs.

Sirop (le flacon de 210 cc.) : 19 fr. 10.

NOTA. — Voir *Traitement Complet Nutriments*.

Laboratoire des NUTRIMENTS

34, rue Pigalle — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 18-18.)

HIRUDINASE

Association Iode, Citrate de Soude,
Extraits Hirudiniques.

Synergie médicamenteuse active.

Composition et mode d'action. — Iode : décongestif.
Citrate de soude : fluidifiant. Extraits hirudiniques :
anticoagulants.

Indications. — Tous les troubles circulatoires d'origine :

1° *Veineuse* : varices, varicocèles, œdèmes et ulcères variqueux, hémorroïdes ; Prophylaxie et traitement des phlébites médicales, obstétricales, chirurgicales ;

2° *Sanguine* : hypercoagulabilité sanguine, stases viscérales, congestions passives ;

3° *Endocrinienne* : troubles de la Puberté, de la Ménopause, Aménorrhées, Dysménorrhées, troubles thyroïdiens.

Forme. — Dragées.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, par prises de 2 dragées au moment des repas.

Prix : 21 fr. 75.

Laboratoires ANA

M. VIENNE, Pharmacien

18, av. Daumesnil, PARIS (XII^e). — (Tél. : Did. 16-49).

HISTA (Histamine BEYTOUT)

Composition. — HISTA (HISTAMINE BEYTOUT) est la 3 imidazole-éthylamine, qui provient de la décarboxylation de l'histidine.

L'histamine présente dans l'organisme, en particulier dans le foie, les poumons et le sang, peut apparaître sous l'influence des causes les plus variées. En particulier toute irritation de la peau (rayons ultra-violet, rayons X, bains chauds) fait naître de l'histamine au point d'application.

Histamine et Histidine. — L'histidine qui a pu être utilisée dans le traitement de la douleur n'a pas de pouvoir analgésique *propre*. Il semble actuellement démontré que la valeur analgésique attribuée à l'histidine revient en réalité à l'histamine.

Propriétés. — L'histamine « transmetteur chimique » est surtout remarquable par son *action analgésique importante et constante*. C'est aussi un stimulant de la fibre lisse et un vaso-dilatateur des capillaires et des artéioles.

Réactions histaminiques. — Elles sont de 2 ordres:

1° *Réaction locale*, ou « triade de Lewis », caractérisée par l'apparition au point d'injection des 3 manifestations successives : rougeur locale, aréole rouge de 3 à 7 centimètres, papule urticarienne oedémateuse 2 à 3 minutes après.

2° *Réaction générale* : bouffées de chaleur, congestion du visage, légère céphalée disparaissant au bout de quelques minutes. On peut en éviter l'apparition en faisant coucher le malade pour l'injection et en le laissant allongé 1/4 d'heure après l'injection.

Antagonistes. — L'adrénaline et la tyramine sont des antagonistes de l'histamine.

HISTA INJECTABLE

Présentation et composition. — Ampoules de 1 cc. contenant 0.0005 de bichlorhydrate d'histamine, en solution stable, inaltérable pour injections intradermiques.

Indications. — Rhumatismes chroniques, musculaires et articulaires, Arthralgies, Arthrites, Coxarthries.
Névralgies (sciatiques, intercostales, faciales), Névrites.
Myalgies, Lumbago, Torticollis.
Plexalgies, Zonas.

Contre-indications. — Rhumatismes infectieux aigus et poussées évolutives des rhumatismes infectieux.
Déséquilibres tensionnels importants.

Posologie. — 1 cc. par jour en injections intradermiques, *loco dolenti*,

Résultats. — En 3 à 5 jours, sédation des phénomènes douloureux, de la contracture et de l'impotence fonctionnelle.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 21 fr. 40.

La seringue spéciale HISTA : 8 fr. 50.

L'étui de 2 aiguilles spéciales HISTA : 3 fr. 75

HISTA LINIMENT

Pour usage externe, aussi actif que Hista injectable, qui reste de maniement exclusivement médical.

Présentation et composition. — Ampoules de 5 cc. pour usage externe, contenant 0,01 de bichlorhydrate d'histamine en milieu alcoolique.

Indications. — Toutes les indications de Hista injectable. Rhumatismes chroniques, arthralgies, névralgies, myalgies, zonas.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 ampoules par jour en griffages loco dolenti ou en HISTA-punctures.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules : 26 fr. 50.

HISTA DIMILLI

Composition. — Solution d'HISTA au DixMILLième, en ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées ou intradermiques.

1 cc. de la solution d'*Hista Dimilli* renferme 0,0001 de bichlorhydrate d'histamine.

Indications. — Ulcères de l'estomac et du duodénum.

Crise ulcéreuse, Gastrites.

Toutes allergies, Asthme, Rhume des foins.

Urticaire, Sensibilisations, Intolérances alimentaires.

Posologie et mode d'emploi :

1° *Ulcères-Gastrites* : 1 cc. par jour, en injection sous-cutanée, au bras ou à la cuisse. Série de 10 injections. Repos de 8 jours. Nouvelle série si nécessaire. (Les injections peuvent également être faites par voie intradermique, au creux épigastrique.)

2° *Comme désensibilisant* : doses progressives : 1/5 de cc. le 1^{er} jour. Augmenter de 1/5 de cc. par jour jusqu'au 5^e jour.

Du 5^e au 10^e jour : 1 cc. par jour.

Résultats. — *Sédation de la douleur* entre la première et la troisième injection, suivie d'une disparition totale des douleurs et des signes associés de l'ulcère, en même temps qu'on constate une reprise importante de l'état général.

Les autres signes de la crise ulcéreuse disparaissent successivement au cours de la série d'injections d'*Hista Dimilli*.

Prix : 24 fr. 50 pour un traitement de 10 jours.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

HISTACLARTYL

La première Histamine indolore sans anesthésique.

Indications. — Spécifique remarquablement efficace du symptôme douleur :

Dose normale. — Rhumatismes, Myalgies, Névralgies, Algies post-traumatiques, Entorses et leurs séquelles, Douleurs zonateuses et post-zonateuses, Prurits, Prurit anal, Prévention des accidents col-lapsus opératoire.

Doses faibles. — Anaphylaxie, Asthme, Urticaire, Œdème de Quincke, Migraine, Crises douloureuses de l'ulcus gastro-duodénal.

Contre-indications. — Poussées évolutives des Rhumatismes infec-tieux, Hypertension et Hypotension artérielles graves.

Composition. — *Dose normale* : Bichlorhydrate d'histamine : 1/2 mgr. pour 1 cc. Excipient sans anesthésique : Q. S.

Doses faibles : Dixième de mgr. (1/10 mgr. p. 1 cc.) : ampoules roses.
Centième de mgr. (1/100 mgr. p. 1 cc.) : ampoules bleues.

(Spécifier seulement le taux des doses faibles sur l'ordonnance.)

Mode d'emploi. — Injections intradermiques. Injections profondes. Par séance : 1/2 à 2 cc., dose normale. *Tâter la susceptibilité du sujet avant d'injecter la dose totale.* Injections sous-cutanées : doses faibles.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 1 cc. avec 1 aiguille Clartyl pour injections intradermiques : 25 fr.

Accessoires. — Trousse Clartyl comportant 1 seringue spéciale pour intradermiques et 3 aiguilles inoxydables Clartyl : 20 fr.

POMMADE HISTACLARTYL

Dosée à 2 p. 100 bichlorhydrate d'histamine.

Très active, provoque les mêmes réactions locales que les intradermiques.

Mêmes indications que par la voie intradermique.

Application de l'histamine par ionisation.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau et au savon la région à traiter, la passer ensuite à l'alcool ou à l'éther, appliquer la pommade en couche mince en la faisant absorber par un léger massage. Pour obtenir une action plus violente, frictionner au gant de crin avant l'application.

Présentation. — Pot de 10 grammes : 22 fr.

CLARTYL, « Le Laboratoire de l'Histamine ».

BAPAUME, Pharmacien,

85, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE.

(Tél. : Maillot 10-06.)

HISTALGINE

Histamine naturelle en solution isotonique à pH 7 stabilisé, pour injections intradermiques indolores.

Employable également en ionisation et en scarifications.

Composition. — Chaque ampoule de 1 cc. contient : 0 gr. 0005 de bichlorhydrate d'histamine en solution glucosée.

Propriétés thérapeutiques. — Action double : analgésique, sédation très rapide de la douleur ; curative, augmentation considérable de la circulation sanguine. Néof ormation et Vaso-dilatation capillaire. Métabolisme cellulaire exalté.

Indications :

- 1° Rhumatismes chroniques, d'origine glandulaire ou traumatique. Arthroses.
- Rhumatismes chroniques d'origine infectieuse. Arthrites.
- 2° Algies. Myalgies. Névralgies. Sciatique.
- 3° Traumatismes. Luxations. Foulures. Entorses, etc.
- 4° Maladies de sensibilité : Asthme, Migraines, etc.
- 5° Maladies neurovasculaires : Artérites, Pelade, Ulcères variqueux.
- 6° Douleurs dentaires.

Posologie. — Consulter la littérature qui accompagne chaque boîte. Utiliser de préférence une seringue de 1 cc. Aiguille courte de 4/10°.

Piqûres intradermiques. 1/2 à 1 goutte aux points douloureux.

Chaque piqûre fait apparaître la Triade réactionnelle de Lewis. 1/2 à 1 ampoule par jour pendant 3 à 10 jours.

Ionisation. 1 ampoule pour 10 gr. d'eau distillée.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-18.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN.

14, avenue Perriehont — PARIS (XVI^e). (Tél. : Jasmin 00-37.)

HISTAMYL

Composition. — Bi-chlorhydrate d'Histamine pur.

Présentations et indications. — En ampoules de 1 cc. à 1/2 mmgr. pour 1 cc. pour injections intra-dermiques disséminées « loco dolenti » à raison d'une goutte à chaque piqûre (6 à 20 pour une séance), en tubes de *baume* pénétrant à 0 gr. 50 p. 100 en applications-massages quotidiens le soir au coucher ; sous ces deux formes, action remarquable contre les algies rhumatismales, névralgies, sciatique, torticolis, lumbago ; en intra-dermiques : III à VI gouttes contre le prurit anal ou vulvaire, VI à X gouttes contre douleurs post-zonateuses.

Pour désensibilisation : *Histamyl D* : boîte de 12 ampoules de 2 cc.

(1^{re} série) : depuis le millionième de mmgr. jusqu'au centième, et.

2^{me} série : 12 ampoules au centième : en sous-cutanées ou intradermiques : asthme, urticaire, migraine, chocs anaphylactiques, ulcères gastro-duodénaux.

Les solutions injectables sont parfaitement indolores ; en intradermiques et avec le Baume, réaction locale normale dite de Lewis (rougeur et démangeaisons fugaces). Réaction générale rare avec la solution au 1/2 mmgr. et tout à fait exceptionnelle avec l'Histamyl « D ».

Prix : la boîte 6 amp. 1 cc. à 1/2 mmgr. : 16 fr. 95 ; le tube de Baume : 19 francs ; Histamyl D, chaque série : 25 fr. 50.

Laboratoires J. PLÉ

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

HISTOCHROME (D. O. M. F.)

Formule du Dr Grelault, de Vineuil (Loir-et-Cher).

Composition. — Dibrom-oxy-mercure-fluorescéine pure, en solution stabilisée pour usage de collyre.

Propriétés. — Puissant antiseptique oculaire, par imprégnation cellulaire profonde.

Indications. — A. *médicales* : toutes affections externes des yeux, toutes conjonctivites, kératites. Conjonctivite de piscine, ophtalmie des nouveau-nés, antiseptie du trachome.

B. *Chirurgicales* : préparation et suites opératoires ophtalmologiques, voies lacrymales.

Forme et posologie. — *Collyre* : II à III gouttes dans les culs de sac conjonctivaux, imprégnation du champ opératoire.

Laboratoires **DOLADILLE**

à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
(Tél. 69.)

HISTOCOLLYRE (H. M. T.)

Formule du Dr Grelault, de Vineuil (Loir-et-Cher).

Composition. — Hexaméthylène tétramine chimiquement pure, stabilisée pour usage de collyre.

Propriétés. — Grande diffusibilité dans les milieux oculaires, action ophtalmotrope, résorption des encombrements tissulaires du vitré, des membranes profondes et du tissu cristallinien.

Indications. — Prophylaxie et traitement de la cataracte, des corps flottants, des affections du pôle postérieur de l'œil et des affections virusiennes à porte d'entrée oculaire.

Posologie. — II à III gouttes 3 fois par jour.

Laboratoires **DOLADILLE**

à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher).
(Tél. 69.)

HISTOGÉNOL

(Médication arsénio-phosphorée organique.)

Puissant reconstituant général.

Indications. — Tuberculose, Bronchites, Lymphatisme, Scrofule, Neurasthénie, etc.

Formes. — Elixir, Granulé, Ampoules, Comprimés, Concentré.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe d'élixir ou une mesure de granulé au milieu de chaque repas, ou 2 comprimés matin et soir, ou une ampoule par jour.

Enfants : Moitié doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,
12. rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine).

HISTOGERMA

Reconstituant physiologique. Stimulant de la nutrition.

Composition. — Comprimés dragéifiés à base de lécithine, quinium, nucléinate de soude, extraits opothérapiques (Hypophysaire, parathyroïdien, etc.).

Propriétés. — Tonifie la cellule nerveuse, accélère les échanges nutritifs, augmente le poids du corps et le nombre des hématies.

Indications. — Asthénie, neurasthénie, dépression nerveuse, surmenage physique ou intellectuel, convalescence pénible, prébacillose, bacillose, grossesse, lactation, affections du cerveau et de la moelle.

Posologie :

10 à 15 ans..... 2 à 3 comprimés par jour.

Adultes..... 3 à 6 comprimés par jour.

Tube de 60 comprimés : 19 fr. 90.

Laboratoires ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

HISTOSMOSE (H. M. T.)

Formule du Dr Grelault, de Vineuil (Loir-et-Cher).

Composition. — Hexaméthylène tétramine chimiquement pure, en solution stabilisée pour usage ophtalmologique.

Propriétés. — Voie *Histocollyré*.

Deux présentations. — A. *Histosmose concentrations I, II, III*, pour bains oculaires, X à XV gouttes et au delà dans une ceillère de 10 cc., sous le contrôle du médecin ophtalmologiste.

B. *Histosmose injectable* aux pôles antérieur et postérieur du globe oculaire.

Emploi réservé au médecin ophtalmologiste.

Indications. — Toutes affections graves des milieux oculaires, du pôle postérieur, du segment antérieur, Résorption des masses molles traumatiques ou post-opératoires, Taies et pannus cornéens.

Laboratoires DOLADILLE

à SAINT-AIGNAN-SUR-CHER (Loir-et-Cher).

(Tél. 69.)

HISTROPA

**Traitement physiologique
des spasmes douloureux de l'appareil digestif
et des coéligies.**

Composition. — Solution injectable de Bromhydrate d'Histidine associé en proportions physiologiquement calculées aux Bromhydrates d'Atropine et de Scopolamine, en milieu isotonique.

Présentation. — Ampoules de 2 cc.

Action. — Calme les algies provoquées par les lésions ulcéreuses ou les inflammations du tube digestif; favorise leur cicatrisation; calme et fait céder les spasmes viscéraux.

Indications. — a. Tous les *spasmes* et toutes les *douleurs* du tube digestif et des viscères : œsophage, cardia, estomac, région pyloro-duodénale, intestin grêle, côlons (typhlocolites, entéro-colites, sigmoïdites, diverticulites, rectocolites, etc.); rectum et région anale, appareil urinaire (plexalgies lombaires, rénales, urétrales ou vésicales), appareil biliaire (vésicule et voies biliaires), coéligies, coliques hépatiques et coliques pancréatiques, séquelles d'opérations.

b. Toutes les *ulcérations* du tube digestif voient leur cicatrisation accélérée quand on associe les injections intradermiques d'*Histropa* au régime et au traitement local par le poudrage.

c. Enfin, tous les *déséquilibres* du système nerveux vago-sympathique, les cercles vicieux douloureux, les « douleurs-souvenirs » des divers viscères, solarite, vagotonie et aérophagie, douleurs des plexus abdominaux, coéligies, coenestopathies diverses.

Contre-indications. — Cardiopathies, aortite, hyperthyroïdie, maladie de Basedow.

Posologie. — Injections intradermiques et sous-cutanées.

Dose moyenne : 1/2 à 1 cc. par jour ou tous les 2 jours.

Dose maxima : 1 ampoule matin et soir en cas de grande crise.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose selon l'âge.

Prix :

La boîte de 4 ampoules : 26 fr. 50.

— de 12 — : 63 fr. 65.

**Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique
Appliquée**

**Laboratoires du Dr Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

HOLOS

Opothérapie osseuse.

Nature. — Extrait opothérapique d'os vivants, renfermant périoste, corps osseux, éléments actifs (non gras) de la moelle retiré à température physiologique d'os de bœufs et de veaux pris directement à l'abattoir sur des animaux encore chauds.

Indications. — Reminéralisation du terrain tuberculeux : Prétuberculose, tuberculoses osseuse et pulmonaire. Rachitisme et tous les troubles de l'ostéogénèse. Phosphaturie. Grossesse. Allaitement. Convalescence. Dentition. Fractures et en général dans tous les cas où s'impose une promptre reconstitution du terrain organique par des éléments phosphatés et fluorés réellement assimilables.

Posologie. — Une petite cuiller-mesure, bien pleine (1 gr.), à chaque repas, mêlée aux aliments (aucun goût). Chez les très jeunes enfants, se contenter d'une 1/2 mesure.

Prix : 12 fr. 80

Littérature — Échantillons.

DESCHIENS, Docteur en pharmacie.

9, rue Paul-Baudry — Paris (8^e). — (Tél. : Ellysées 40-26.)

HOLOSPLÉNINE

Extrait de rate injectable
Délipeïdé et désalbuminé.

Indications. — Anémies, Amaigrissements, Tuberculose, Eczémas chroniques, Erythodermie arsénobenzolique, Pemphigus, Lichen ruber acuminosus, Pityriasis rubra de Hebra, Prurigo simplex, Urticaires récidivantes, Éruption miliaire, Eczéma rebelle, Prurit anal, vulvaire, périnéal, Lichen plan, Psoriasis.

Forme et composition :

Boîte de 6 ampoules de 1 cc. chaque cc. = 30 grs de rate fraîche. Prix : 32 fr. 65.
— 6 — de 1 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche. Prix : 23 fr. 95.

Tube de 6 cc. chaque cc. = 15 grs de rate fraîche.
Prix : 21 fr. 95.

Conduite du traitement. — Série de 12 à 15 injections de 1 cc. sous-cutanées ou intramusculaires comme suit : 1 injection les 1^{er} et 2^e jours, pas d'injection les 3^e et 4^e jours, ensuite injection tous les 2 jours. L'injection est indolore. Pour les eczémas, ne pas hésiter à injecter les doses fortes : 2 à 3 cc. (c'est-à-dire 30 à 45 gr. de rate) ainsi que dans les dermatoses rebelles.

L. N. C. nos 234-32, 234-22.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, r. de la Procession, PARIS XV^e (Tél. : Suffren 07-70.)

HOLOVARINE

Forme et composition. — Cachets ou dragées dosés à 0 gr. 10 et 0 gr. 20 de poudre d'ovaire intégral. Odeur agréable. Assimilation facile.

Avantages. — Desséchée par un procédé nouveau qui par sa rapidité, permet à l'organe de conserver toutes ses propriétés. Contient tous les principes actifs de l'ovaire.

Indications. — Toutes les insuffisances ovariennes : troubles de la puberté, de la ménopause, de la menstruation, de la grossesse, de la sécrétion lactée, stérilité, obésité.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 20 par jour.

Adolescentes : 1 à 2 cachets ou dragées à 0 gr. 10 par jour. Cures successives de 5 à 10 jours.

La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 20, 16 fr. 30. La boîte de 24 cachets ou dragées à 0 gr. 10, 11 fr. 20.

L. N. C. nos 234-10-3, 234-10-1.

Laboratoire de L'ENDOPANCRINE

48, r. de la Procession, PARIS (XV^e). (Suffren 07-70.)

HOPOGAMYL

Composition :

Amylase.....	0,03
Pepsine.....	0,005
Peroxyde Magnésium.....	0,07
Carbonate Magnésie.....	0,07
Bioxyde Manganèse.....	0,15

Pour une tablette aromatisée légèrement à la menthe.

Indications. — *Affections gastro-intestinales, Chlorose.* Mauvaises digestions, algueurs, fermentations intestinales, entérites, diarrhées rebelles, auto-intoxications.

Présentation. — Tablettes aromatisées *légèrement* à l'essence de menthe.

Posologie. — Sucrer lentement 6 à 8 tablettes par jour après les repas ou à distance des repas suivant avis du médecin.

Échantillon médical sur demande.

Laboratoire de l'HOPOGAMYL

52, place de l'Hôtel-de-Ville — BEAUVAIS (Oise).

L. PLOUCHART, pharmacien.

HOPOGAN BOCQUILLON

Composé organo-minéral à base de Peroxyde de Magnésium et de charbon activé, dégageant de l'Oxygène naissant au contact des muqueuses.

Propriétés. — Désinfection et désintoxication du tube digestif avec revivification de l'organisme dans chacune de ses fonctions cellulaires.

Pansement interne de la muqueuse stomacale ou intestinale. Propriétés anti-cancéreuses de l'ion magnésium.

Formes. — **HOPOGAN CACHETS** pour digestions douloureuses, mauvaise haleine, intoxications de toute nature (2 à 4 cachets par jour).

Prix : la boîte de 30 cachets : 16 francs.

HOPOGAN PILULES GLUTINISÉES pour action localisée dans l'intestin : entérite, diarrhées (2 à 6 pilules par jour).

Prix : le flacon de 40 pilules : 12 fr. 80.

HOPOGAN PRISE-BÉBÉ contre les diarrhées vertes des nourrissons (1 à 3 paquets par jour).

Prix : la boîte de 20 paquets : 10 fr. 65.

Laboratoires DERNIS

12, rue Lamartine — PARIS.

(Tél. : Trudaine 09-64.)

HORDÉNOL

A base d'Hordenine Beytout.

Indications. — Médication héroïque des diarrhées de toutes origines, toutes natures et toutes intensités.

Diarrhées des adultes, diarrhées infantiles, diarrhées des nourrissons, diarrhées des tuberculeux. Traitement des entérites.

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 3 ampoules par jour, en injections sous-cutanées.

Enfants et nourrissons : 3 à 4 de cc. par jour, le reste de l'ampoule administré par voie buccale.

(Thèse Dr. Germain. Paris 1939.)

Les ampoules peuvent également être administrées par voie buccale, quand les injections sont impossibles.

Composition	{	Sulfate d'hordenine	0,125
		Vanadate de soude	0,002
		Triméthylxanthine.....	0,002
		Eau distillée.....	Q. S. P. 2 cc.

Présentation et Prix. — Boîte de 6 ampoules : 27 francs.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

HORMANTOXONE

Composition. — Extrait contenant intégralement et sous forme stable le principe antitoxique du foie, purifié, concentré et titré biologiquement.

Formes. — Globoïdes pour adultes. Granulés pour enfants. Suppositoires pour jeunes enfants et anorexiques.

Propriétés. — *Supplée* la fonction antitoxique du foie quand elle est déficiente ; la *stimule* quand elle est perturbée.

Indications :

I. *Insuffisance de la fonction antitoxique* du foie, cirrhoses, ictères, hépatisme, lithiasé biliaire.

II. *Auto et hétéro-intoxications* (urémie, intoxications alimentaires et microbiennes, toxicomanies, éthylisme, intoxications médicamenteuses, urobilinémie). Toxémie gravidique, vomissements incoercibles de la grossesse, pré éclampsie.

III. *Toxi-infections* (adjuvant des sérothérapies spécifiques). Psychoses infectieuses, soins pré et post-opératoires. Cholécystites et péricholécystites.

IV. *Anaphylaxies. Intolérances alimentaires* : Asthme, urticaire, migraines, accidents sériques, strophulus et fièvre des foins.

V. *Dermatoses* : Eczémas, prurits, érythèmes, œdème de Quincke.

VI. *Oliguries.*

VII. *Indications diverses* (Diabète, albuminurie, rhumatismes chroniques).

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau avant chacun des 3 repas :

Cas aigus : 2 à 3 globoïdes.

Cas moyens : 1 à 2 globoïdes.

Cure d'entretien : 1 globoïde.

Jeunes enfants ne pouvant pas absorber les globoïdes : 1 cuillerée à café de granulés avalée avec un peu d'eau avant chaque repas ou bien un suppositoire le soir.

Anorexiques : 1 ou 2 suppositoires.

Prix :

Le flacon de 36 globoïdes (8 jours) : 21 fr. 80.

La boîte de granulés (8 jours) : 21 fr. 80.

La boîte de suppositoires (8 jours) : 17 fr. 45.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

HORMIADYNE

Composition par dragée :

Silicate de Soude pur	0,10
Extrait stabilisé de Gui	0,05
De Muguet	0,015
Extrait sec de Cascara	0,015
Bile desséchée	0,035
Thyroidine	0,0025
Poudre de poumon	0,02
Poudre de surrénales	0,0125

Forme. — Dragées à noyau mou.

Indications. — Médication hypotensive polyvalente, Artério-sclérose, Hypertension, Troubles cardio-vasculaires et toutes complications.

Doses. — 2 à 6 dragées par jour.

Prix : 17 fr. 85 la boîte de 50 dragées.

Durée de la boîte : 15 à 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1082-4.

A. MIRONNEAU, Pharmacien
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
 (Tél. : 18.)

HORMOBILINE

Laxatif opothérapique.

Médicament héroïque et rationnel de la **CONSTIPATION** et des affections chroniques du gros intestin.

Composition. — Hormones cæco-appendiculaires et extraits biliaires sélectionnés.

Indications. — Constipation, colopathies, séquelles d'appendicectomie, entéro-colite muco-membraneuse, insuffisances biliaires, ictères, cholémies.

Avantages. — Ne provoque ni dégoût ni accoutumance, est facilement absorbable et ne présente aucune contre-indication.

Posologie. — *Forme liquide* : 1 à 3 cuillerées à café, diluées dans un peu d'eau naturelle ou gazeuse (Saint-Galmier ou Couzan) avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Clystère : 4 cuillerées à café pour un litre d'eau bouillie.

Forme pilulaire : 2 à 4 pilules avant le repas du soir ou au moment du coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-1 et 586-2.

Prix : 16 fr. 10

Échantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOCLINE

Chlorhydrate de Choline.

Traitement des États Tuberculeux.

Propriétés thérapeutiques. — Le chlorhydrate de choline agit sur le métabolisme du cholestérol, excite les surrénales aux propriétés antitoxiques puissantes et opère ainsi une transformation du terrain biologique se manifestant par un relèvement de l'état clinique général.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose à tous les stades d'évolution, aussi bien dans les formes médicales que dans les formes chirurgicales. Amaigrissements, Asthénies, Anorexies rebelles.

Adjuvant précieux des cures hygiéno-diététiques, Abaissement de la température, diminution des signes fonctionnels, engraissement rapide.

Innocuité absolue. Tolérance parfaite ; aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — Une injection sous-cutanée tous les deux jours. Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. dosées à 2 cgr. de chlorhydrate de choline.

Prix : 25 fr. 50.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte 90 — PARIS.)

HORMOCRINOL « F » et « M »

Une conception nouvelle dans la thérapeutique antiobèse.

L'Hormocrinol, en dehors de ses effets sur l'oxydation des graisses et des mucines, réalise la plus efficace cure de diurèse agissant favorablement sur les troubles du métabolisme de l'eau.

Extraits glandulaires totaux obtenus par dessiccation dans le vide à basse température des organes frais.

Posologie. — Prescrire HORMOCRINOL « F » chez la femme, et HORMOCRINOL « M » chez l'homme et chez la femme.

6 à 8 comprimés par jour à prendre en deux ou trois fois.

Prix au public : 26 francs.

N^o d'enregistrement. Hormocrinol « M » 327-7.

— — — Hormocrinol « F » 327-8.

Laboratoires JAMMES de GOLBERY

102 bis, r. de l'Aigle, LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 29-93.)

HORMODAUSSÉ

(Hormonothérapie totale.)

Composition. — Hormones de jeune taureau, de génisse et de jeune bovidé en pleine croissance, associées à un extrait hépatique (méthode de Whipple), à l'hémoglobine et aux diverses albumines globulaires.

Propriétés thérapeutiques. — Il apporte aux organismes affaiblis tous les produits endocriniens qui circulent dans les vaisseaux des animaux jeunes et vigoureux, ainsi que les stimulants de l'hémopoïèse et les matériaux de la régénération des hématies.

Indications. — Toutes les déchéances organiques et les déficits endocriniens, les convalescences, les anémies et les retards de croissance.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à soupe par jour, 30 minutes avant les repas, dans un peu d'eau.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour, dans un peu d'eau.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

HORMOFLAVÉINE

Composition :

Hormone spécifique du corps jaune, physiologiquement titrée.

Indications thérapeutiques et posologie :

Aménorrhée, hypoménorrhée (1 injection quotidienne, de préférence du 14^e au 21^e jour de la période intermenstruelle) ; **ménorragies, métrorragies** (1 ou 2 injections tous les jours dans la semaine précédant les règles, ou au cours même de l'hémorragie) ; **stérilité d'origine hormonale** (1 injection quotidienne du 14^e au 28^e jour de la période intermenstruelle). L'Hormoflavéine est spécialement indiquée à partir du 14^e jour après les règles (1 injection quotidienne) chez les femmes qui ont déjà fait un ou plusieurs **avortements**, pour leur permettre de mener à bien une nouvelle grossesse.

Présentation et mode d'emploi :

Deux titrages (solution huileuse) : Hormoflavéine A (boîtes de 6 ampoules titrées à 1/6 u. i. par ampoule) ; Hormoflavéine B (boîtes de 1 ampoule titrée à 1 u. i.). Injection sous-cutanée profonde, ou intramusculaire).

Prix : Boîte de 6 ampoules A : 58 fr. 35

Boîte de 1 ampoule B : 58 fr. 35.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e). (Tél. : Danton 08-11.)

HORMOLÉOL

Opothérapie entéro-hépatique.

Composition. — Extraits biliaires dépigmentés et décholestérinés, Hormones intestinales, Agar-Agar.

Propriétés thérapeutiques. — L'action synergique des éléments composants de l'HORMOLÉOL réalise une médication opothérapique assurant le maximum de résultat :

1° Intestins : Dans toutes les Constipations où il y a déficience du rythme moteur de l'intestin (insuffisance motrice) et déficience de l'activité glandulaire (insuffisance sécrétoire). Dans les entérites d'origine diverses (muco-membraneuse, paludéenne, etc.).

2° Foie : Par les extraits biliaires qui entrent dans sa composition, l'HORMOLÉOL est employé utilement dans le traitement des affections de l'appareil biliaire (arrêt, insuffisance ou perversion de la bile,

Avantageusement recommandé dans :

Lithiase biliaire, Insuffisance biliaire, Ictère, Cholémie familiale.

Avantages. — Laxatif doux, non irritant, ne provoquant ni colique ni accoutumance. Sans contre-indication.

Posologie. — A prendre de préférence avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 3 dragées par jour.

Enfants : de 6 à 15 ans : 1/2 à 1 dragée par jour.

Laboratoire de l'HORMOLÉOL

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 14-12.)

HORMOLUTÉINE VOGUEIN

Chaque comprimé contient 0,05 d'Hormone folliculaire, titrée à 5 U. I., et 0,005 d'extrait thyroïdien.

Action physiologique. — Cet ensemble provoque le stimulus qui déclenche le flux menstruel, supprime les douleurs des règles et les rend plus régulières et plus faciles.

Indications. — On l'emploiera dans tous les cas d'hypo-ovarie où il sera nécessaire de provoquer l'arrivée du flux menstruel, et dans les malaises généraux résultant d'un flux peu abondant, dans l'aménorrhée, la chlorose.

C'est le spécifique de l'insuffisance ovarienne dans la puberté.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, pendant la semaine devant précéder le flux menstruel.

Prix : Le flacon 18 fr. 35. — L. N. C. n° 745-10.

Laboratoires VOGUEIN

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).

(Tél. : Danton 83-24.)

HORMONE GONADOTROPE DU D^r ROUSSEL

Composition. — Hormone extraite du sérum de jument gravide.

Propriétés. — Commande dans les deux sexes le développement et les fonctions des glandes génitales.

Indications. — *Chez l'homme*: Cryptorchidie, certaines impuissances.

Chez la femme: Aménorrhée, hypoménorrhée.

Dans les deux sexes: Stérilité, retards de la puberté, Syndrome adiposo-génital.

Formes. — 1^o Boîte de 6 ampoules titrées à 40 Unités-rat Evans (environ 400 unités-souris) et 6 ampoules de solvant à mélanger extemporanément.

2^o Boîte de 2 ampoules de poudre d'hormone et 2 ampoules de solvant.

Posologie. — Série de 6, 12, 18 injections selon les cas (par voie sous-cutanée ou intramusculaire). Repos de quinze jours entre deux séries.

Prix: Boîte de 6 amp. : 63 fr. 65 ; boîte de 2 amp. : 23 fr. 45.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

HORMONES HYPOPHYSAIRES

BYLA

Les Établissements Byla présentent, les premiers en France, la série des hormones hypophysaires, **réellement et exclusivement extraites de la glande hypophyse**, en ampoules injectables, physiologiquement titrées.

HORMONES DU LOBE ANTÉRIEUR

Gonadormone, stimule la maturation folliculaire et la spermatogenèse. Son origine hypophysaire la différencie de tous les extraits gonadotropes précédemment utilisés.

Thyrormone, régularise le fonctionnement thyroïdien.

Lactormone, provoque ou augmente la sécrétion lactée.

Somatormone, stimule la croissance.

HORMONES DES LOBES POSTÉRIEUR ET INTERMÉDIAIRE

Ocytormone, Action ocytotique (inertie utérine).

Leïormone, action myocinétique sur les fibres lisses à l'exception de celles de l'utérus (atonies gastrique, intestinale, vésiculaire, etc.). Anti-hémorragique par action sur les fibres lisses vasculaires. Action antipolyurique (diabète insipide).

Neurormone, traitement des migraines hypophysaires.

Pituilobine, hormone post-hypophysaire totale.

Gonadormone : 1 ampoule 2 cc. = 10 unités (boîtes de 6 ampoules).

Thyormone : 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-cobaye (boîtes de 6 ampoules).

Lactormone : 1 ampoule 2 cc. = 100 unités-pigeon (boîtes de 3 ampoules).

Somatormone : 1 ampoule 1 cc. = 100 unités-rat (boîtes de 6 ampoules).

Ocytormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Leïormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Neurormone : 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Pituilobine : 0⁵ 1 ampoule 1 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules);

0¹⁰ 1 ampoule 1 cc. = 10 unités internat. (boîtes de 3 ampoules);

B 1 ampoule 1 cc. = 40 unités internat. (boîtes de 2 ampoules);

E 1 ampoule 15 cc. = 5 unités internat. (boîtes de 3 ampoules).

Littérature sur demande aux

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée
Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

HORMOPLASMINE LEFRANCO

Complexe Hormo-zomique.

Composition. — 1. — Extrait de lobe antérieur de l'hypophyse, 2. — Extrait total de rate fraîche, 3. — Suc musculaire concentré de jeunes taureaux.

Propriétés. — Spécifique des troubles de la croissance et des insuffisances glandulaires par la rate et l'hypophyse.

Reconstituant général par le suc musculaire.

Indications. — Retard du développement ; Formation difficile ; Parésie, nonchalance ; Asthénie ; Rachitisme ; Scrofule ; Dermatoses d'origine auto ou hétérotoxique (eczéma, prurigo, urticaire).

Présentation et posologie. — 10 ampoules buvables de 10 cc.

Chaque ampoule doit être diluée dans un demi-verre d'eau froide naturelle ou gazeuse.

Nourrissons : 1 ampoule par jour mélangée au lait du biberon.

Enfants : 1 ampoule avant les 2 principaux repas.

Adultes : 2 à 4 ampoules.

Laboratoires LEFRANCO

36 à 46, avenue de Metz. — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Nord 19-52).

HORMOSTHÉNYL

Sirop Hémopoïétique.

Tonique reconstituant.

Hépatothérapie histaminique, Hémopoïétique, Neurotrophique, pour le traitement de tous les états anémiques, Déficiences organiques et fonctionnelles de toutes origines.

Active le Métabolisme général. Stimule l'histogénèse et la fonction régénératrice.

Composition :

Extrait hépatique	2 gr. 920
Histamine (B. Imidazol-éthylamine) .	0 gr. 006
Citrate de fer ammoniacal rouge	1 gr. 670
Sulfate de Manganèse	1 gr. 200
Glycérophosphate de sodium 100/100..	1 gr. 750
Triméthylxanthine	0 gr. 200
Extrait de condurango	2 gr. 500
Solution hydro-alcool sucrée.....	89 gr. 754

Indications. — Anémies, Chloroses, Asthénies, Dépressions nerveuses, Défaillances constitutionnelles, Neurasthénies, Convalescences, Anorexie, Troubles de croissance des adolescents.

Posologie :

Adultes et adolescents : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour pendant ou après les principaux repas.

Thérapeutique Biochimique nouvelle des anémies par supplémentation de l'organisme en acides aminés hématogènes. Apporte directement à l'organisme, en proportions rationnellement dosées, les principes actifs du foie et réactive immédiatement les processus de l'hématopoïèse.

Prix : Le flacon de 300 gr. : 25 francs.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Biochimiques ROSSO

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e)

(Tél. : Dor. 56-38.)

HORMOVARINE BYLA

Adoptée par les Hôpitaux de Paris.

(En ampoules injectables, gouttes, comprimés et ovules.)

Composition. — Extrait ovarien, titré en folliculine.

Propriétés thérapeutiques. — L'HORMOVARINE BYLA remplace la sécrétion interne de l'ovaire.

Indications. — Tous les cas d'hypofonctionnement ovarien, aménorrhées, hypoménorrhées, dysménorrhées, hypoplasie utérine, troubles de la ménopause, ovariectomie, stérilité, obésité, etc.

Mode d'emploi. — Une ampoule tous les jours, en injection lente, intra-musculaire, ou XV à LXXX gouttes, ou 2 à 3 comprimés quotidiens, ou un ovule le soir en se couchant.

L'Hormovarine doit se prescrire de préférence par séries de 6 à 10 jours dans la période qui précède immédiatement la date présumée des règles.

N. B. — Les ampoules d'Hormovarine sont toujours préparées en partant de l'hormone ovarienne intégrale, tandis que nous avons adopté la folliculine cristallisée comme base de nos 3 autres préparations. (Voir aussi Benzoate de di-hydro-Folliculine Byla, amp. à 1 000, 10.000 et 50 000 unités.)

Prix :

Ampoules : 58 fr. 35. — *Comprimés* 21 fr. 20. — *Ovules* : 27 fr. 55. —

Gouttes 22 fr. 30.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e). (Tél. : Danton 08-11.)

HORMOVEINYL F.-M.

Hormothérapie glandulaire pour le traitement du déséquilibre artério-veineux et des sécrétions glandulaires internes.

L'Hormoveinyl contient des Hormones de l'hypophyse, de la parathyroïde et des surrénales, des glandes germinatrices (ovariennes pour la femme, testiculaires pour l'homme), et des extraits purement végétaux qui renforcent l'action des hormones et qui ont la plus intense influence sur la circulation artério-veineuse.

Le traitement redonne au malade un équilibre progressif hormonal total, un bien-être immédiat, et provoque la disparition complète de toutes les déficiences glandulaires.

Composition. — Chaque dragée contient :

Parathyroïde ...	0 gr. 001	Surrénales	0 gr. 004
Pancréas	0 gr. 090	Hypophyse L.P	0 gr. 001
Hamamélis	0 gr. 025	Capsicum	0 gr. 002
Sénéçon.....	0 gr. 002	Marron d'Inde.	0 gr. 025
Valériane	0 gr. 015	Noix vomique.	0 gr. 006

Pour la femme (F), Ovaire, 0 gr. 040.

Pour l'homme (M), Orchitine, 0 gr. 040.

Indications et posologie :

Chez la femme : Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhée douloureuse, insuffisante ou retardée, Ménopause, Retour d'âge, Vapeurs, Migraine, Insuffisance veineuse, Congestion sanguine, Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Acrocyanose, etc.

Chez l'homme : Déséquilibre organique d'origine sympathique, Insuffisance de sécrétion de la thyroïde, parathyroïde et des glandes génitales. Trouble du système circulatoire : Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Varicocèles, Hypotension veineuse, Phlébite, etc.

De 3 à 6 dragées par jour (pour la femme, interrompre pendant la période des menstruations.)

Prix : 22 francs le flacon.

Enregistré au L. N. C. M., n° 1814-10-11.

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS.

(Tél. : Dor. 56-38.)

HORMOVITOL

Puissant tonique et reconstituant cellulaire.

Élixir de goût très agréable à base d'extraits androïques totaux, d'extraits cérébro-médullaires et de nucléines.

Indications. — Asthénie, Amaigrissement, Troubles nerveux, Dépression intellectuelle, Neurasthénie, Convalescence médicale ou chirurgicale, Troubles glandulaires, Surmenage, Phosphaturie.

Doses :

Adultes : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : de 5 à 10 ans, 1 cuillerée à café ; de 10 à 15 ans, 1 cuillerée à dessert.

Prix : Le flacon de 250 cc. 19 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-3.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc. — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 39-44)

Formes simples	0.05
Hypophyse totale	0.10
Mamelle	0.15
	0.10

Formes simples: 0.05
 Hypophyse totale: 0.10
 Mamelle: 0.15
 Boite de distribution: 0.10
 Boite de distribution: 0.10
 Boite de distribution: 0.10

HORMUCLASES

Opothérapie du Docteur Roussel.

Toute leur préparation est effectuée en moins de 4 heures.

La dessiccation est obtenue en 40 minutes, à 0°, par des procédés brevetés.

Les organes frais et les poudres sont constamment maintenus, au cours de la fabrication, à température basse et à l'abri de l'air.

La mise en cachets est opérée mécaniquement, sous gaz inerte (azote).

Les cachets sont livrés dans des tubes de verre, scellés après obtention d'un vide parfait.

Cachets :

Formes simples :

Hypophyse totale	0,05
Mamelle.....	0,10
Orchitine	0,10
Ovaire.....	0,10
Surrénale.....	0,10
Thymus	0,10
Thyroïde	0,025
Thyroïde	0,002

Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.

Boîte de 36 cachets : prix au public : 21 fr. 75.

Extraits injectables :

Formes simples. — Ampoules de 2 cc. dont le titre en principe actif correspond en organe frais à :

Cœur, 2 gr. ; Corps jaune, 2 gr. ; Cortico-surrénale, 0,50 ; Hypophyse totale, 1 gr. ; Antéhypophyse, 0,50 ; Mamelle, 1 gr. ; Orchitine, 2 gr. ; Ovaire, 2 gr. ; Pancréas, 5 gr. ; Parathyroïde, 0,10 ; Rein, 2 gr. ; Surrénale, 0,50 ; Thymus, 1 gr. ; Thyroïde, 0,50 ; Ampoules de rate de 2 cc. correspondant à

10 gr. d'organe frais ; Ampoules de rate de 5 cc. correspondant à 25 gr. d'organe frais.

Formes associées. — Toutes les combinaisons d'organes permettant la poly-opothérapie.

Boîte d'ampoules d'extraits injectables :

Prix au public : 21 fr. 75.

Complexes d'Hormuclases. — Pour toutes prescriptions comportant des dosages particuliers ou des combinaisons d'organes différents des formes standard, s'adresser à

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

HORMUTER

Extraits utérins sélectionnés.

Formes :

Comprimés : Étui de 40 comprimés : 22 fr. 50.

(2 à 6 comprimés par jour pendant les 10 jours qui précèdent les règles.)

Ampoules injectables : 6 ampoules de 2 cc. : 22 fr. 50.

(1 ampoule tous les 2 jours pendant les 12 jours qui précèdent les règles.)

Indications : Troubles de la ménopause chirurgicale, Dysménorrhées.

Laboratoires FOURNIER Frères.

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

HUILE CAMPHRÉE MANGANÉSÉE

« MÉTÈRE »

Indications :

Toutes les indications de l'huile camphrée.
Anti-infectieux puissant contre septicémies, gripes, encéphalites, poliomyélites. Furunculose, Lymphangites, Phlegmons. Toutes les maladies infectieuses. Adjuvant précieux des sérothérapies spécifiques. Médicament leucogène.

Composition :

Huile camphrée au 1/10^e contenant 0,15 mgr. de Manganèse colloïdal par cc.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires. Dans les cas bénins faire une injection tous les jours ou tous les 2 jours. Dans les cas graves on peut faire une piqûre toutes les 3 heures pendant 3 jours consécutifs.

Laboratoire MÉTÈRE

24, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Mollitor 03-91.)

HUILE DE FOIE DE MORUE

**Médicinale Suractivée
Rhône-Poulenc.**

2 000 unités internationales Vitamine A,
500 unités internationales Vitamine D,
par centimètre cube.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue avec l'avantage d'une posologie réduite, parfaitement supportée.

Arrêt du développement statural et pondéral.
Lymphatisme, adénopathies, convalescences.

Présentation : Flacons de 125 cm³. Prix de vente : 17 fr. 50.

Posologie (par 24 heures) :

Première année : XXX gouttes à 1/2 cuillerée à café.

Enfants : A partir d'un an et suivant l'âge : 1/2 à 1 cuillerée à café.

Adolescents et adultes : 1 à 2 cuillerées à café.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Uaines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

HUILE D'HAARLEM VÉRITABLE

G. de Koning Tilly,

Trois siècles d'existence.

Produit de la Société de la véritable Huile
de Haarlem.

Achterstraat 8, 8^A, 8^B, Haarlem (Hollande).

Présentation et prix :

1^o *Gouttes* : le flacon de 10 cc. : 3 fr.

2^o *Capsules* : la boîte de 36 capsules : 5 fr. 40 ;
la boîte de 108 capsules : 15 fr. 20.

Indications : Multiples, consacrées par
l'expérience de plusieurs siècles.

Usage interne : Affections et Infections des
divers appareils.

a. *Hépatique* : Congestions et Insuffisances
du foie, Angiocholites, Angiocholécystites,
Lithiases, Ictères, Chocs anaphylactiques,
Rhumatismes et tous états uricémiques.

b. *Urinaire* : Lithiases, Cystites, Pyélo-
néphrites, Colibacilluries.

c. *Pulmonaire* : Bronchites, Bronchorrée,
Asthme.

Usage externe : Alopécies, brûlures, plaies,
piqûres d'insectes, contusions, engelures,
crevasses, furoncles.

Posologie et mode d'emploi :

Usage interne : X gouttes ou une capsule
3 fois par jour.

Usage externe : en applications légères.

Enregistrés au Laboratoire National de Con-
trôle sous les n^{os} 650-4 (*gouttes*) et 650-5
(*capsules*).

Pour la France, Colonies, Pays de protec-
torat, Espagne, Roumanie, Italie :

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS

(Tél. : Provence 49-77.)

HUILE IODÉE FINIKOFF

CALCIUM INTRAVEINEUX FINIKOFF

Méthode du D^r A. FINIKOFF

pour le traitement des Tuberculoses chirurgicales.

Indications. — Tuberculoses osseuses, articulaires, ganglionnaires, séreuses et cutanées.

Contre-indications. — Tuberculose pulmonaire, tuberculoses viscérales avec dégénérescence amyloïde du foie et du rein, cachexie et septicémie bacillaires, méningites bacillaires.

Forme. — *Huile iodée* à préparer extemporanément : une ampoule d'huile spéciale, une ampoule d'iode en solution au 1/10 en injections intramusculaires.

Chlature de calcium pour injections intraveineuses. Ces injections ne sont à pratiquer que chez les malades robustes ayant une intégrité viscérale totale.

Remplacer ces injections par la Tricalcine injectable ou *per os* chez tous les autres malades.

Doses et mode d'emploi. — Un prospectus indiquant la posologie accompagne chaque boîte. Il est envoyé sur demande au Corps médical.

Prix de la boîte de	6 ampoules huile.	} 25 fr.
— —	6 — iode.	
— —	12 — calcium.	25 fr.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS. (Tél. : Trinité 29-29.)

HUILORHINE

Composition :

Camphre, eucalyptol, résorcine, essences aromatiques et antiseptiques (essence de menthe, etc.);
véhicule : huile d'olive neutralisée et stérilisée
sans éphédrine.

Propriétés :

Antiseptique et tonique des voies respiratoires supérieures.

Indications :

Toutes affections du rhino-pharynx, coryza, rhinites, sinusites, végétations adénoïdes, désinfectant pré et post-opératoire, prophylaxie des maladies infectieuses.

Posologie et mode d'emploi :

Instillations nasales : V à VI gouttes dans chaque narine matin et soir. Pulvérisations matin et soir.

Enregistré au L. N. C. n° 2027-1.

Laboratoires Yves OHABROL

29, avenue d'Orléans — PARIS (XIV°).

(Tél. : Gobelins 25-85.)

HUMORO-STABILINE

DU
DOCTEUR L. DELALBRE

PRÉPARATION
OPOTHÉRAPIQUE ET PHYTOTHÉRAPIQUE
non toxique
STABILISATRICE DES HUMEURS
pour
MÉDICATION ANTI-CHOC
curative et préventive
DANS LES MALADIES D'INTOLÉRANCE.

PRÉSENTÉE sous 2 formes : PILULES et GRANULÉ

- COMPOSITION -

PILULES		GRANULÉ	
Peptone de viande.....	0 gr. 20	Peptone de viande.....	4 gr.
Extrait de Valériane.....	0 gr. 10	Extrait de Valériane.....	2 gr.
Extrait de Muguet.....	0 gr. 05	Extrait de Muguet.....	1 gr.
pour une pilule.		pour 100 gr.	
Excipient spécialement étudié. Enrobage soluble dans l'eau.		Stimulant aromatique... q. s. Excipient : Sucre surfin.	

INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES de désensibilisation

1. — **CHOC ANAPHYLACTIQUES :**
Urticaire. — Eczéma. — Névralgies. — Coryza. — Asthme, etc.
2. — **INFECTIONS INTESTINALES (pH modifié) :**
Colibacillose. — Enterite. — Entérococolite, etc.
3. — **DYSTONIES VAGO-SYMPATHIQUES :**
Troubles respiratoires, circulatoires, digestifs, sécrétoires, etc.
4. — **PERTURBATIONS NERVEUSES :** Neurasthénie, etc.
5. — **DÉSORDRES CARDIAQUES :** Palpitations, etc.

AUCUNE CONTRE-INDICATION

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

L'Humoro-Stabiline se prend toujours 1 heure au moins avant les repas.

Les pilules s'avalent avec un peu d'eau ou bien à sec.

On peut aussi les ingérer écrasées et mélangées à de la confiture.

Le granulé se croque ou se donne dissous dans un peu d'eau ou de lait.

DOSES MOYENNES POUR 24 HEURES

PILULES

ADULTES : 3 pilules à la fois
1 heure avant chacun des deux
principaux repas.

ADOLESCENTS : 2/3 des doses
ci-dessus.

ENFANTS : 1/3 de ces doses.

Ces doses répétées tous les jours pendant 2 ou 3 mois consécutifs.

Pour la durée du traitement, se conformer aux indications du Médecin.

GRANULÉ

ENFANTS : 1 bonne cuillerée à
café 1 heure avant chacun des
deux principaux repas.

NOURRISSONS : 1/2 cuillerée
à café 1 heure avant l'une des
tétés, matin et soir.

PRIX AU PUBLIC

Le flacon de 60 pilules : 25 fr. 50. La boîte de 100 gr. granulé : 23 fr. 45.

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

2, rue Claude Mathat — ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11.)

HUPNOSAL ADRIAN

Composition. — Diéthylbarbiturate acide de sodium.

Propriétés. — Hypnotique. Anti-nervin. Modificateur du système sympathique. Sédatif nervin.

Indications. — Insomnie. Troubles nerveux de toute nature.

Avantages. — Tolérance absolue. Sédatif sans opium ni morphine.

Présentation :

a. *Dragées* dosées à 25 cgr.

b. *Elixir* dosé à 25 cgr. par cuillerée à soupe.

c. *Cachets* dosés à 25 cgr.

d. *Ampoules* dosées à 20 cgr.

Posologie :

Dragées : 1 à 2 le soir.

Elixir : 1 à 2 cuillerées à soupe le soir.

Cachets ou *Ampoules* : 1 à 2 le soir.

Prix : *Dragées* : 15 fr. 95 la boîte ; *Elixir* : 19 fr. 15 le flacon ; *Cachets* : 15 fr. 95 la boîte ; *Ampoules* : 15 fr. 95 la boîte.

Enregistré au L. N. C. n° 523-9 (dragées).

Société Française de Produits Pharmaceutiques
Ano^l ADRIAN et Cie.

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

HYDRALIN

Antiseptique gynécologique.

Composition. — Perborate de soude, Borate de soude, Bicarbonate de soude, Essences aromatiques.

Propriétés. — Est une source d'oxygène naissant. Donne une solution dialytique alcaline. Exalte le pouvoir défensif des muqueuses. Evite la pullulation des germes pathogènes. Dissout les sécrétions et les mucosités.

Indications. — Leucorrhées, métrites, vaginites. Antiseptique idéal pour les soins intimes et hygiéniques de la femme.

Présentation. — Sachets de poudre agréablement parfumée et immédiatement soluble.

Mode d'emploi. — Prescrire, pour une injection chaude, un sachet pour 1 litre d'eau.

La boîte de 30 sachets : 12 fr. 50.

Traitement unité : 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-2.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

HYDRASTINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 mmgr. d'Hydrastine.

Alcaloïde principal de l'*Hydrastis canadensis*, exempt de Berbérine.

Propriétés. — Détermine la contraction du muscle utérin. Vaso-constrictrice et hypertensive. Accroît le tonus gastrique et intestinal. Sympathicolytique.

Indications :

a. **Essentielles :** Toutes les métrorragies ; ménorragies par congestion utérine primitive (Siredey). Kystes de l'ovaire, métrites hémorragiques. Hémorragies de la ménopause.

Aucune contre-indication.

b. **Secondaires :** Epistaxis. Hémorragies hémorroïdaires. Hémoptysies. Dyspepsies atoniques. Insuffisance hépatique de la ménopause.

Présentation. — Granules à 2 mmgr.

Posologie et mode d'emploi. — 6 à 15 granules par jour en 2 ou 3 fois avant les repas, pendant 8 à 10 jours avant la date présumée des règles, ou dès le début de l'hémorragie. Ces doses peuvent être largement dépassées.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

HYDRASTIS GMET

Composition. — Extrait total liquide et sans alcool de l'*Hydrastis canadensis*.

Propriétés. — Décongestif, hémostatique, laxatif (par son action sur le foie).

Indications. — Hémorragies, Fibromes, Métrorragies, Congestions pelviennes, Hémorroïdes, Constipation.

Posologie. — De 1 à 3 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

La moins onéreuse des préparations d'hydrastis.

Le flacon de 135 cc. : 25 fr. 50.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,

27, rue du Faubourg-Montmartre

PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 43-10.)

HYDRATE DE MAGNÉSIE ADRIAN

Composition :

Hydrate de magnésie pur, légèrement sucré et menthé.

Propriétés :

Alcalin, saturant de l'acidité gastrique, anti-fermentescible, eupeptique, laxatif.

Indications :

Hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, dyspepsie, constipation.

Présentation. — Comprimés dosés à 25 cg.

Posologie :

2 à 4 comprimés une heure avant le repas, renouveler après le repas si nécessaire.

Prix : 12 fr. 80 le flacon.

Enregistré au L. N. C. n° 523-35.

**Société Française de Produits pharmaceutiques
Ancⁱ ADRIAN et Oie**

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

HYDRORRHÉOL

Nouvelle formule. Même posologie.

Composition :

Doses minima d'amorçage, non toxiques, de teinture de belladone (1 goutte par cachet); carbamate d'éthyle et phénylsemicarbazide.

Propriétés :

Antispasmodique et antisécrétoire.
Modérateur de l'excitation vago-tonique.
Désensibilisateur.

Indications :

Hydrorrhée nasale, Rhinite spasmodique, Éternuement paroxystique, Rhume des foins, Hay-fever, Grippe au début.

Posologie :

En cas de crise : 1 cachet d'heure en heure;
4 cachets en moyenne.

En saison et en période de crises : 2 cachets
par jour pendant 8 jours.

Présentation et prix :

Boîte de 20 cachets : 13 fr. 55.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

Tél. : Dorian 57-79.

HYDROXYDASE

Antitoxine naturelle vivante, eau minérale naturelle du Breuil et du Broc (Puy-de-Dôme).

Composition. — *Eau minérale naturelle* chlorurée, bicarbonatée sodique, magnésienne et ferrugineuse ; jusqu'ici *unique en hydro-minéralogie*, donne des réactions oxydasiques.

Mode d'action. — Grâce à ses nombreux colloïdes naturels, elle fixe l'oxygène intérieur et le rétrocède aux toxines et déchets de l'organisme, les brûle, les détruit et les élimine. Augmente le pouvoir d'oxydation du système endocrinien, et supplée aux sécrétions des glandes déficientes.

Indications. — Intoxications endogènes (rhumatismes, goutte, diabète, eczéma, obésité, etc.).

Intoxications exogènes (convalescences difficiles, arthritismes, uricémie, indicanurie, urobilinurie).

Mode d'emploi. — Cure normale : un verre le matin à jeun et un verre une heure avant chaque repas pendant 20 jours (souvent renforcée par des injections sous-cutanées ou intramusculaires).

L'Hydroxydase, embouteillée au griffon sans contact avec l'air, doit être consommée aussitôt débouchée.

Caissettes de 20 petites bouteilles — de 10 petites bouteilles

Boîtes de 10 ampoules de 10 cc. :

Source Marie-Christine du Breuil-sur-Couze déclarée d'intérêt public par décret du 2 septembre 1934.

Compagnie de l'HYDROXYDASE

Siège social, 10, rue Blanche — PARIS. (Tél. : Pigalle 83-15 et 83-16.)

HYGIOCHOLINE

Agréable au goût.

Formule établie d'après les enseignements de M. le Dr HENRI LECLERC, ex-président de la Société de Thérapeutique.

Composition. — Extrait aqueux, sans alcool et sans sucre.

Une cuillerée à café contient :

Taraxacum.....	0 gr. 15
Polypode	0 gr. 15
Bourdain.....	0 gr. 15

Propriétés. — Cholagogue puissant. Stimulant antiseptique du foie et de la vésicule biliaire.

Indications. — Tous les troubles hépatiques. Congestion du foie et de la vésicule. Insuffisance hépatique. Lithiase biliaire, Cirrhoses, Cholécystite, Maladies des pays chauds, Constipation.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les repas de midi et du soir.

Échantillons et littérature à la disposition de MM. les Docteurs.

Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale
SOPHYTA

61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).

J. LOISEAU, Pharmacien

(Tél. : Lab. 16-15.)

HYGIODINE

Composition. — Par cuillerée à soupe :

Iode métallique 0,030

Iodure de potassium..... 0,007

Bi-iodure de Hg..... 0,006

Méthylarsinate de soude .. 0,024

Indications. — Traitement discret et complémentaire antisyphilitique.

Aucune mention mercurielle ni spécifique sur le conditionnement.

Forme. — Elixir à base de vin iodotannique.

Posologie. — Une cuillerée à soupe dans un verre à liqueur avant chaque repas.

Voir composition.

Prix. 17 fr. 10 le flacon (8 à 10 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. n° 568.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

Deux formes. — **Élixir Hymel** (Hydrargyre et Miel), comportant un excipient spécial à base de miel, qui lui procure un goût très agréable et une tolérance parfaite pour l'estomac.

Suppositoires Hymel, préparés entièrement à froid, au mercure vif : 2 dosages :

Adultes.

Enfants et Nourrissons. (Calibre très réduit.)

Voir : **Élixir Hymel**,

Suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS.

HYOL

Médication inhalante, d'odeur agréable, d'efficacité certaine.

Composition. — Menthol cristallisé 1,7453. Gaïacol liquide 0,4363. Essence de thym 2,6178. Essence de lavande 1,3961. Essence de pin de Norvège 1,7452. Teinture de benjoin 13,0890. Teinture d'eucalyptus 13,0890. Teinture d'aconit (racine) 13,0890. Eau de laurier-cerise 4,3630. Teinture d'érismum 4,3630. Essence de romarin 0,4363. Alcool à 80° 43,63. Pour 100 grammes. Les plantes aromatiques sont traitées par distillation.

Présentation. — En solution.

Indications. — Angine. Asthme. Bronchite. Coqueluche. Coryza. Emphysème pulmonaire. Enrouement. Grippe. Laryngite. Otite. Sinusite. Toux spasmodique.

Propriétés. — Aseptise les muqueuses jusqu'aux alvéoles pulmonaires, régularise rapidement les sécrétions, tarit l'expectoration.

Posologie et mode d'emploi. — *En inhalations* : Une cuillerée à café dans un verre d'eau très chaude. Respirer l'émanation pendant 8 à 10 minutes, 4 fois par jour. (Laryngite, bronchite, coryza, catarrhe du nez, coqueluche, otite suppurée.)

En évaporation à froid : Une cuillerée à café dans une soucoupe matin et soir. Laisser évaporer dans la chambre du malade. (Rougeole, coqueluche, scarlatine, bronchite, grippe.)

En pulvérisations : Une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau bouillie. Pulvériser dans le fond de la gorge 4 ou 5 fois par jour. (Angine, pharyngite, abcès, etc.)

En gargarismes : XV gouttes dans un demi-verre d'eau bouillie tiède, 4 fois par jour. (Toutes les affections de la gorge.)

Prix : 17 francs.

R. CUNIASSE, Pharmacien.

6, Place des Ternes — PARIS (XVII^e) (Tél. : Wag. 39-93.)

HYOSCYAMINE HOUDÉ

Granules titrés à 1 mmgr. et à 1/4 de mmgr.

Hyoscyamine Houdé. — Alcaloïde pur cristallisé extrait de l'*Hyoscyamus niger*.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique et anticonvulsivante, d'un emploi très répandu dans le traitement des séquelles de l'encéphalite léthargique, où elle donne des résultats surprenants.

Produit stable, d'action certaine et constante dans le parkinsonisme et la vagotonie. Arrête les tremblements séniles, le hoquet épidémique. Traitement de la chorée infantile, de l'épilepsie, des troubles de la démarche, etc...

Produit *absolument inoffensif* si l'on respecte la posologie, détaillée dans le conditionnement des flacons.

Doses et mode d'emploi. — 1 à 4 granules *pro die*, les prendre avant les repas. Pas d'accumulation.

S'arrêter en cas de vision brouillée.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

HYOSTINAL

Composition. — Extrait végétal en gouttes pour le traitement des séquelles de l'encéphalite et du parkinsonisme.

Propriétés. — Constitue à la fois un traitement général anti-infectieux et symptomatique. Tonifie les muscles, ceux des membres surtout, influence la respiration en la régularisant et atténue la salivation. A la suite du traitement, la rigidité musculaire diminue, l'insomnie et la sialorrhée disparaissent progressivement.

Posologie. — *Matin* : de V à X gouttes du flacon n° 1.
Après-midi : de V à X gouttes du flacon n° 2.

Ensuite augmenter d'une goutte par jour de chaque flacon sans jamais dépasser 50 gouttes de chaque flacon. Dans les cas très graves où la rigidité musculaire, le tremblement et la salivation persistent, on peut quelquefois avoir recours à l'*Hyostinal* type fort.

Présentation : en boîtes de 2 flacons, type normal ou type fort.

Enregistré au L. N. C. n° 1369-5/1 et 5/2.

Laboratoire du Docteur Ch. DENSMORE

25, r. D'agorno - PARIS (XII^e). (Tél.: Dorian 56-71 et 72.)
Fournisseur des Hôpitaux et des Grands Réseaux de
Chemins de fer.

HYPALÈNE

Comprimés et Suppositoires.

Composition. — Combinaison de l'acide Cyclopentenyl-allylbarbiturique avec le Phényl-diméthyl-diméthylamino-pyrazolone.

Action. — Analgésique, Sédatif, Hypnogène, Antispasmodique.

Indications. — Traitement de toutes les insomnies nerveuses, algies diverses, angoisse pré-opératoire, douleurs post-opératoires, spasmes douloureux du pylore.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés divisibles permettant de graduer les doses. Suppositoires de grosseur moyenne permettant leur usage aux adolescents et aux adultes et enveloppés dans une enveloppe de matière plastique hermétique.

Posologie des Comprimés (dosés à 0,15 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 comprimés le soir au moment de se coucher, une heure ou deux après le repas.

Algies diverses : 1 à 4 comprimés dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse, Nervosisme : 1 à 2 comprimés par 24 heures ou quelques minutes avant les interventions chirurgicales, les examens médicaux douloureux, les soins dentaires.

Dose maximum par 24 heures : 6 comprimés.

Posologie des Suppositoires (dosés à 0,20 ctgr.).

Insomnies : 1 à 2 suppositoires en se couchant.

Algies diverses : 1 à 2 suppositoires dans les 24 heures au moment des douleurs.

Angoisse pré-opératoire : 1 ou 2 suppositoires la veille de l'intervention, 1 suppositoire une heure avant l'intervention.

Etats anxieux : 1 suppositoire par 24 heures.

Dose maximum par 24 heures : 4 suppositoires.

Adolescents : administrer la moitié des doses pour adultes (Comprimés et Suppositoires).

Prix :

Comprimés. Le flacon 15 francs.

— Les 50 plaquettes de 2 comp. 108 fr. 75

— Les 10 plaquettes de 2 comp. 21 fr. 80

Suppositoires. La boîte de 6..... 15 fr. 50

— — de 18..... 33 fr. »

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Usine : 15, rue des Champs, ASNIÈRES.

Dépôt : 127, bd Saint-Michel — PARIS (V°).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPALÈNE - MAL DE MER

(Traitement préventif et curatif du Mal de mer.)

Comprimés et suppositoires en une boîte mixte.

Composition. — Combinaison de l'acide cyclopentényl-allylbarbiturique avec le phényl-diméthyl-diméthylaminopyrazolone.

Action. — Grâce à son action élective sur l'ensemble du système nerveux et spécialement sur le système nerveux vago-sympathique, *évite* l'ensemble des troubles causés par le Mal de mer, d'avion, de chemin de fer ou d'auto, qui peuvent aller des simples nausées aux vomissements incoercibles, s'il est absorbé préventivement, ou les guérit si on a laissé ces troubles s'installer.

Posologie et mode d'emploi. — *A titre préventif :* trois Comprimés (ou un Suppositoire) la veille du départ en bateau, ou dès la montée en avion, chemin de fer, auto. Huit à dix heures après, renouveler la même dose.

A titre curatif : Si on a laissé le mal de mer s'installer, mettre un suppositoire et au besoin le renouveler au bout de 2 à 4 heures. Si nécessaire, renouveler le traitement le lendemain. Lorsque les vomissements ont cessé, prendre à la moindre nausée un à trois comprimés.

Pour enfants de 8 à 14 ans : prendre la moitié des doses.

Nota. — Les suppositoires ont été créés pour les sujets qui se sont laissés surprendre par le mal de mer et qui ne garderaient pas les comprimés absorbés, en raison des vomissements.

Prix. — La boîte de 15 comprimés et 4 suppositoires : 21 fr. 80.

Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND

Usine : 15, rue des Champs, ASNIÈRES.

Dépôt : 127, bd Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPALÈNE OBSTÉTRICAL

(Analgésie obstétricale.)

Comprimés et Suppositoires en 1 boîte mixte.

Composition. — Association de l'acide cyclopenténylallylbarbiturique avec son sel d'Ephédrine, la Belladone et un anesthésique local qui favorise la rétention du suppositoire.

Action. — Action analgésiante générale, légèrement hypnogène qui met la parturiente au calme tout en lui permettant d'aider activement le travail. Les contractions sont renforcées, régularisées et plus rapprochées. Il n'y a pas lieu de craindre un ralentissement du travail, au contraire. Les délivrances sont normales et se font sans incident.

Mode d'administration et doses. — Il faut éviter de donner des doses massives, non pas à cause de la toxicité du produit aux doses indiquées, mais uniquement parce qu'il est mieux de les espacer afin de provoquer et d'entretenir pendant toute la durée du travail une analgésie suffisante, en n'allant pas jusqu'à l'analgésie totale. *L'Hypalène obstétrical* n'a pas été créé pour la réaliser.

Ces remarques importantes étant faites : Attendre le commencement de la dilatation et, dès qu'elle a atteint le diamètre d'une pièce de 5 francs au moins, commencer par introduire un suppositoire dans le rectum. Si l'intestin a été débarrassé par un lavement évacuateur préalable, avant le début des douleurs, l'action est plus rapide, mais cette précaution n'est pas indispensable.

20 à 30 minutes après ce premier suppositoire, les effets commencent à se faire sentir : diminution de la douleur, régularisation et renforcement des contractions.

Si ce premier suppositoire était expulsé, il faudrait faire prendre un comprimé dans une petite tasse de tisane chaude sucrée.

Après cette première dose (suppositoire ou comprimé), il faut se baser sur la marche du travail et l'état d'analgésie et de conscience de la parturiente pour administrer d'autres doses (suppositoires ou comprimés), mais on peut sans danger donner un comprimé ou un autre suppositoire une heure après le premier.

L'absorption des médicaments étant plus rapide par voie stomacale que par voie rectale, on peut agir plus ou moins rapidement en utilisant un ou deux comprimés avant d'administrer le deuxième suppositoire si toutefois celui-ci est nécessaire.

Ne pas dépasser pour un accouchement et dans les 24 heures, chez une femme de poids moyen, 2 suppositoires et 5 comprimés pris en les espaçant. Donner la préférence aux suppositoires lorsqu'ils sont bien tolérés.

Un suppositoire d'*Hypalène obstétrical* calme très rapidement les tranchées utérines, mais elles sont très rares en raison de l'action analgésiante de l'*Hypalène obstétrical* utilisé pendant l'accouchement.

Prix. — La boîte de 5 comprimés et 2 suppositoires : 16 francs.

Laboratoires du D^r Pierre ROLLAND

Usine : 15, rue des Champs — ASNIÈRES;

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V^e).

(Tél. Odéon 22-01.)

HYPERCHLORHYDAL

Formule. — 100 gr. d'Hyperchlorhydal contiennent 50 gr. de Trisilicate de magnésie.

Indications thérapeutiques. — Hyperchlorhydrie, Gastrite, Dyspepsie, Ulcères de l'estomac, Fermentation, Intoxication intestinale.

Avantages. — Thérapeutique continue. Propriétés absorbantes et protectrices très élevées. Produit neutre, se transforme par HCl stomacal en silice gélatineuse.

Posologie. — Une 1/2 à 2 cuillerées à café une heure ou deux après les repas, ou selon l'avis du médecin.

Prix : 24 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1977-3.

Laboratoires HENRI BIRNIE SCOTT

5 bis, rue Marius-Aufan — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Galv. 52-79.)

HYPERSAN

Médication hypotensive et diurétique.

Composition. — Association d'extraits fluides de Gui, Cratægus, Stigmates de maïs et Cascara.

Action. — Le gui diminue la tension par action vasomotrice périphérique et action excitante sur la sécrétion rénale (Chevalier, Gaultier). Selon Leclerc, le Cratægus équilibre la pression sanguine en diminuant l'éréthisme vasculaire.

Indication. — L'hypertension sous toutes ses formes.

Doses. — 30 à 50 gouttes, 3 fois par jour.
90 à 100 — le soir au coucher.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.
12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

HYPER-SÉRUM NAO

Sérum sulfaté chloruré sodique, légèrement hypertonique, avec adjonction de traces de glycoollate de cuivre.

Injections hypodermiques absolument indolores de 2 cc., 5 cc. ou 10 cc.

Indications. — 1° *Athrepsie, anémie des nourrissons* et tous les états qui y conduisent : vomissements, mauvais régime, diarrhée, dénutrition dans les maladies infectieuses, etc...

2° *Asthénie des adultes* : asthénie des hépatiques, asthénie des surmenés, asthénie à la suite des maladies infectieuses, asthénie des cancéreux, etc...

Posologie. — *Nourrissons* : 2 ampoules de 2 cc. ; 2 ampoules de 5 cc. par jour comme traitement d'attaque dans l'athrepsie, les vomissements répétés, la gastro-entérite aiguë.

1 ampoule de 2 cc. ou 1 ampoule de 5 cc. par jour pendant 15 jours dans les anémies et les gastro-entérites chroniques du nourrisson.

Adultes : 1 injection quotidienne de 10 cc. pendant 12 à 15 jours ; arrêter 6 jours et reprendre.

Présentation :

Boîte de 10 ampoules de	2 cc	14 fr.
— 10 —	5 cc	18 fr. 20
— 10 —	10 cc	21 fr. 30

Laboratoires du D^r RENAUD

E. RENAUD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine

2, place de la Duchesse-Anne — NANTES

HYPIODE

Composition. — Hyposulfite de Magnésium, Iodure de Sodium. En ampoules de 10 cc. et 20 cc. **M** (étiquette bleue), pour injections intramusculaires ; **V** (étiquette rouge) pour injections intraveineuses.

Indications. — Dans les troubles liés à l'instabilité humorale. Algies de toutes sortes (Sciaticques, lumbagos, radiculalgies, etc.). Migraines, rhume spasmodique, urticaire, eczémas, etc. Séquelles d'encéphalite, états anxieux.

Formes. — Boîtes de 5 ampoules de 10 cc., prix : 23 fr. 45. Boîtes de 5 ampoules de 20 cc., prix : 29 fr. 35.

Posologie. — Injecter par voie intraveineuse ou intramusculaire 10 à 40 cc. par jour, pendant 10 jours consécutifs.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault, COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 18-33.)

HYPNO-NERVINE

Régulateur et stabilisateur du système neuro-végétatif.

Présentation. — Forme dragées.

Indications. — États sympathicotoniques et vagotoniques, Syndromes solaires, Érethisme cardiaque, Psychasthénie, Angoisse, Insomnies, Anxiété, Émotivité, Irritabilité, Mal de mer, Troubles de la puberté et de la ménopause, Gastralgies nerveuses, Cure de désintoxication. Maximum d'activité. Aucune contre-indication.

Composition :

Extrait de Valériane stabilisé.	0 gr. 10
Extrait de Crataegus stabilisé.	0 gr. 05
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 015
Gardénal	0 gr. 02
Pour 1 dragée.	

Posologie. — 2 à 3 dragées par jour. Cure pouvant être prolongée sans inconvénient.

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roq. 14-12.)

HYPOCARBONE

Charbon animal	0 gr. 10
Charbon végétal	0 gr. 10
Hyposulfite de soude anhydre	0 gr. 50
Benzonaphtol.....	0 gr. 10
Soufre précipité	0 gr. 05
Carbonate de chaux	0 gr. 35
pour un cachet	

Indications et Posologie :

Affections intestinales et intoxications alimentaires :
Fermentations, Constipation, Digestions lentes et difficiles.

Aérophagie.

Un cachet après chacun des 3 repas avec un verre d'eau diurétique.

Dermatoses et maladies de la peau : Eczémas, Herpès, Urticaires, Prurits, Démangeaisons.

Un cachet avant chacun des 3 repas.

Prix au public : la boîte de 30 cachets : 19 fr. 10.
Enregistré au L. N. C. M : N° 1613-1.

Laboratoire de l'HYPOCARBONE

131, boulevard Raspail — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 34-53.)

HYPOCHOLATE

des professeurs **G. CARRIÈRE** et **E. GÉRARD**.

Traitement de l'Hypertension artérielle.

Composition. — En ampoules de 2 cc., contenant 0 gr. 02 de CHOLALATÉ de SOUDE, chimiquement pur pour 1 cc. En suppositoires à 0 gr. 10. Il est employé avec succès égal en petits lavements dans la capsule rectale de 5 ou 10 cc. à la poire ou à la main, en utilisant le contenu d'une ampoule de 5 cc.

Indications. — Hypertension intermittente, Hypertension par pléthore, Hypertension intermédiaire entre pléthore et sclérose.

Posologie. — Injecter le contenu d'une ampoule profondément sous la peau, tous les jours au début. Puis, lorsqu'un abaissement suffisant a été obtenu, injecter seulement deux fois par semaine et même une seule fois le contenu d'une ampoule, ce qui parfoi s suffit pour maintenir l'abaissement de tension obtenu. Puis, au bout d'un temps variable, cesser le traitement, pour le reprendre plus tard s'il y a lieu.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

HYPOPHÉDRINE

Éphédrine végétale française corrigée.

Composition :

Ephédrine végétale	0 gr. 03
Hypophyse totale	0 gr. 03
Ext. de Lobélie	0 gr. 01

Par dragée.

Indications. — Rhume des foins, Asthme, Bronchites emphysémateuses. Tous états dyspnéiques.

Avantages. — Ne provoque ni tachycardie, ni troubles urinaires, ni insomnie.

Fosologie. — 3 à 4 dragées par 24 heures.

L'étui de 25 dragées : 22 francs.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e)

(Tél. : Littré 54-07.)

HYPOSTRONTIUM TORAUDE

Hyposulfite de strontium pur en solution à 20 p. 100 répartie en ampoules de 3 cc.

Intramusculaires.

(Et éventuellement buvables ou intraveineuses.)

Indications. — Dermatoses récidivantes, Intolérances, Intoxications, Anaphylaxies, Lithiases, Ictères, Etats spasmodiques, Inflammations des muqueuses, Manifestations arthritiques.

Avantages. — “ *Hyposulfène intramusculaire* ” bien supporté. Très actif (16,2 p. 100 de S neutre, 44 p. 100 de strontium). Forme commode pour nourrissons et enfants. (Buvable.) Action antispasmodique supérieure à celle de l'hyposulfite de soude. Aucune toxicité.

Dose. — Le contenu d'une ampoule 2 à 4 fois par semaine en injection intramusculaire Intraveineuse : 2 à 3 par semaine. Buvable : une par jour au déjeuner. *Nourrissons* : 1/2 à 1 ampoule mêlée au biberon ou aux bouillies.

Prix : La boîte de 10 ampoules : 26 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 535-46.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

HYPOSULFÈNE

“ Soufre soluble ”. — “ Aliment soufré ”.

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'Hyposulfite de Na chimiquement pur, sec, stabilisé, correspondant à 0 gr. 32 d'Hyposulfite cristallisé.

Doses. — 4 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des trois repas.

Indications. — Dermatoses récidivantes : Eczéma, Strophulus, Prurits, Urticaires, etc. Intolérances alimentaires, Ictère, Acné, Séborrhée, etc. Indications du soufre. Insuffisance hépatique. Bronchites.

Action. — Très grande activité réductrice et sulfurante due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 65 pilules glutinisées : 17 fr. 50.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

La boîte de 10 ampoules : 28 fr. 50.

Pour les intramusculaires, voir *HYPOSTRONTIUM*.

Enreg. au Lab. de Cont. sous les n°s 535-34 et 35.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°). (Odéon 73-92.)

HYPOTAN

COMPRIMÉS

Dérivés de la choline hypotenseurs par voie digestive (Bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et présentés sous la forme de comprimés.

Propriétés. — Synergie hypotensive par dilatation artériolaire et sédation des spasmes. L'Hypotan améliore la circulation périphérique et réalise une véritable prophylaxie des accidents graves de l'hypertension. Il excite en outre la musculature lisse.

Indications. — Hypertension, spasmes vasculaires (même sans hypertension rencontrés souvent à la ménopause). Cure complémentaire de l'Acécoline; hypovagotonie.

4 à 6 comprimés par jour avant les repas.

Innocuité absolue, tolérance parfaite.

Boîte de 44 compr. Prix : 20 francs.

AMPOULES INJECTABLES

Une ampoule de 1 cc. correspond à 2 cgr. de bromure de méthylacétylcholine (synonyme bromure d'acétyl - β - méthylcholine).

Propriétés. — 1° Hypotenseur 200 fois plus puissant à doses égales que l'Acécoline.

2° Artério-dilatateur d'effet très prolongé.

3° Excito-sécréteur et excito-moteur de l'appareil digestif.

Effets accessoires. — 1° Chez certains sujets : chute tensionnelle et bouffée vaso-motrice importantes.

Abondance des sueurs et des sécrétions digestives.

2° Chez les asthmatiques, effet broncho-constricteur.

L'atropine (1/4 ou 1/2 milligramme) inhibe l'action de l'Hypotan.

Indications. — Hypertensions rebelles et paroxystiques. Médicament d'urgence dans les coliques de plomb, l'état de mal épileptique, l'éclampsie, les troubles de la ponction lombaire, l'iléus paralytique, les tachycardies paroxystiques.

Contre-indications. — Asthme et ses équivalents.

Posologie. — Dose normale : 2 cgr. par voie sous-cutanée. Tâter la susceptibilité du sujet avec une 1/2 ampoule.

Boîte de 6 amp. Prix : 22 francs.

L'HYPOTAN ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX°).

Tél. Trinité 44-31. Télégr. Chevrematte-90 — Paris).

HYPOTAN-PAPAVÉRINE

Composition. — Dérivés de la choline (bromure de méthylacétylcholine, bromure de bromocholine) associés à une faible dose de chloral et au phénylglycolate de papavérine.

Propriétés. — Les dérivés de la choline dilatent les artères par voie nerveuse. La papavérine atteint le même but par action directe sur le muscle artériel.

La somme de ces deux actions est un effet antispasmodique vasculaire complet.

Indications. — Hypertension, Nervosisme des hypertendus, Spasmes vasculaires.

Cure complémentaire de l'Acécoline-Papavérine.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour avant les repas, 15 jours par mois.

L'Hypotan-Papavérine ne doit pas être prescrit en même temps que de l'atropine ou des préparations belladonnées qui empêchent complètement la manifestation de ses effets vasculaires.

Boîte de 44 comprimés : 21 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

HYPOTENSA

Comprimés hypotensifs.

Présentation. — En pilulier bakélite de 50 comprimés (25 fr. 50).

Principes actifs. — Extrait d'aubépine, Extrait de gui, Teinture de strophanthus au 1/10^e, Valérianate d'iso-amyle.

Indications. — Hypertension artérielle, Troubles circulatoires, Palpitations, Spasmes, Artériosclérose, Angoisses, Angines de poitrine, Anévrismes, Lésions athéromateuses, Hémoptysies.

Mode d'emploi. — 2 comprimés 2 à 3 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n^o 900-51.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

HYPOTENSEUR VALE

Composition. — Silicate de magnésie, cratægus oxyacantha, borotartrate de potasse.

Présentation. — Granulé chocolaté.

Indications. — Artériosclérose, hypertension, vertiges, carence siliceuse et magnésienne.

Posologie et mode d'emploi. — Une cuillère à café matin et soir (au lever et au coucher).

Prix. — 16 fr. 30, (Taxe d'armement comprise) la boîte de 120 grammes pour un traitement de 15 jours.

Laboratoire F. GUILBERT

Place d'Armes — HESDIN (Pas-de-Calais).
(Tél. : Hesdin 182.)

HYPOTENSOL

Spécifique de l'Hypertension essentielle.

L'HYPOTENSOL condense, sous la forme la plus réduite et la plus active, les meilleurs agents hypotenseurs qui, administrés isolément, n'ont qu'une action restreinte et de peu de durée.

Composition. — *Benzoate de Benzyle*, antispasmodique par son action sur les muscles lisses, *Gui*, agissant sur les muscles striés des artères et sur le système vasomoteur, *Ail* antiseptique et vaso-dilatateur, *Scille* diurétique et tonicardiaque éprouvé.

Indications. — L'HYPOTENSOL spécifique de l'Hypertension essentielle ou solitaire, qu'on observe si souvent chez les sujets atteignant ou dépassant la quarantaine, est conseillé également avec succès constants dans les hypertensions diathésiques, affections artérielles ou veineuses sans crainte d'incompatibilité avec les agents médicamenteux nécessités par la diathèse, comme les médications mercurielles ou iodurées.

Posologie. — Dose initiale : X gouttes deux fois par jour dans un peu d'eau matin et soir, augmenter jusqu'à XL gouttes par jour sans dépasser cette dose, concurremment avec tous médicaments et régimes que comporte la diathèse.

Durée du flacon, à XX gouttes par jour : environ 20 jours.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoire des LICES

38, rue des Lices — ANGERS (M.-et-L.). (Tél. : 32-30.)

HYPO-THIORINE

Hyposulfite de soude pur.

Deux formes :

- 1° *Comprimés* glutinisés et dragéifiés, dosés à 0 gr. 50 d'hyposulfite Na desséché.
- 2° *Ampoules* de 10 cc. à 20 % (injection intraveineuse).

Indications :

Médication anti-choc. — Phénomènes anaphylactiques de toutes natures. Intolérance arsenicale, bismuthique ou aurique. Erythrodermies toxiques et médicamenteuses.

Médication antirhumatismale. — Rhumatismes chroniques, déformants et ankylosants.

Arthropathies gonococciques, Erythème noueux.

Médication dermatologique. — Dermatoses séborrhéiques, Séborrhées, Acné, Furoncles, Anthrax, Eczémas, Psoriasis, Prurits divers.

Médication hépato-intestinale. — Insuffisance hépatique. Ictère. Constipation.

Médication respiratoire. — Dans tous les cas où le soufre est indiqué l'hypo-thiorine réalisera sans dangers et sans fatigue pour l'organisme l'apport de soufre nécessaire.

Dose et mode d'emploi :

- 1° *Comprimés* : avaler sans croquer 2 à 6 comprimés par jour aux repas.
- 2° *Ampoules* : cas graves — 1 injection intraveineuse chaque jour ou à jour passé, dans l'intervalle 2 à 6 comprimés par jour.

50 Comp. : 14 fr. 45 — 10 Amp. : 29 fr. 35 — 1 Amp. : 4 fr. 30. — 5 Amp. : 16 fr.

Echantillons et littérature sur demande.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Ph¹°, 39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

I. A. M.

Iodo-méthyl-Arsinate de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Composé organique, réalisant sous une forme optima l'action synergique de :

L'ion iode histotrope, leucopoïétique, lymphagogue.

L'ion arsenic stimulant de la nutrition et agent d'épargne.

L'ion manganèse vecteur d'oxygène, facteur capital d'oxydation cellulaire (*Thèse de Bordeaux 1928*).

Indications. — *Lymphatisme*. Affections ganglionnaires, Anorexies, Etats anémiques, Asthénies, Etats de dépression, Asthme, Convalescences.

Posologie. — *Gouttes « I. A. M. » (adultes)*, XV à XX gouttes matin et soir.

Gouttes « I. A. M. » (enfants), 1 goutte par année d'âge matin et soir.

Sirop « I. A. M. » (enfants), 1 cuillerée matin et soir.

Littérature et échantillons
Docteur LAVOUÉ — RENNES.

IDONIL

Complexe organique (bloton) extrait du poisson frais, ne renfermant ni huile, ni graisse, ni protéines.

Indications. — Toutes celles de l'huile de foie de morue (lécithines, alcools supérieurs).

Toutes celles des nucléines pures de la totalité du poisson, Soit : anémies (syphilitique, paludéenne, post-opératoire), neurasthénie, déficiences organiques, fatigue et surmenage physique et intellectuel, lymphatisme, enfants débiles, arriérés, retardés, rachitiques, etc...

Action. — Intégralement assimilable, si l'intestin n'est pas colmaté. Aucune contre-indication.

Doses moyennes :

Comprimés : 3 à 4 aux repas, au début, puis 4 par jour.

Granulé (enfants) : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Présentation :

Comprimés, en boîte de 40, une semaine : 22 fr. 90.

Granulé, en boîte carton, une semaine : 11 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. sous nos 1039-12 et 13.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

IFRANOL

Composition. — Quinine, arsenic, strychnine, manganèse, extrait cortico-surrénal, boldo, évonimine, scammonée.

Propriétés. — *Spécifique des pyrexies* par la quinine ; *reconstituant, stimulant et tonique* par la strychnine, l'arsenic et le manganèse ; *cardio-tonique* par l'extrait cortico-surrénal.

Indications. — Maladies infectieuses (*grippe* et angines grippales en particulier), convalescence et prophylaxie de la grippe.

Formes. — *Dragées* : 0 gr. 10 de quinine par dragée.

Suppositoires (Suppo-Ifranol) : 0 gr. 20 de quinine par suppositoire

Posologie et mode d'emploi :

Grippe aiguë. — *Adultes* : six dragées ou trois suppositoires par jour.
Enfants : de 1/2 à 2 suppositoires 1/2, ou de 1 à 5 dragées, suivant l'âge.

Convalescence. — *Adultes* : 2 ou 3 dragées, ou 1 suppositoire par jour, pendant une dizaine de jours au moins.

Enfants : de 1/4 à 1 suppositoire, ou 1 à 2 dragées, suivant l'âge.

Prophylaxie. — Une dragée par jour.

Flacon de 30 dragées. — Boîte de 10 suppositoires.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

IMIDO « ROCHE »

Composition. — Solution injectable de bichlorhydrate d'Histamine dosée à 1 milligramme par cm³.

Propriétés. — Détermine une sécrétion abondante du suc gastrique permettant la réalisation pratique de l'épreuve de l'Histamine ; détermine également réactions locales et générales, ainsi qu'une action rapide sur les douleurs.

Indications. — Particulièrement utile pour poser le diagnostic des ulcères et des cancers gastriques.

Utilisé également dans toutes les applications thérapeutiques de l'Histamine : arthrites rhumatismales, dyspnées asthmatiformes, rhume des foins, etc.

Posologie. — Une seule ampoule en injection sous-cutanée (épreuve de l'Histamine). 1/4 à 1/2 ampoule en inj. intradermique ou scarifications.

Boîte de 6 ampoules de 1 cm³.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-15.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél. : Archives 91-10.)

IMINASTHME

Médication abortive de la crise d'asthme.

Un seul comprimé d'IMINASTHME pris dès l'apparition des signes avant-coureurs de la crise d'asthme la fait avorter presque à coup sûr sans danger pour le malade.

Composition :

Agaricine	0,005
Théophylline	0,10
Papavérine	0,02
Caféine	0,10

Thérapeutique. — Grâce à la double association Agaricine-Théophylline et Caféine-Papavérine, l'IMINASTHME a une toxicité beaucoup moindre que celle de ses composants, ce qui permet de le laisser en permanence aux mains du malade. Il agit rationnellement sur l'équilibre vago-sympathique.

En aucun cas, l'IMINASTHME ne peut être nuisible, ou contrecarrer un traitement général, car :

- 1° Il ne produit aucun effet secondaire ;
- 2° Il ménage la circulation (ni éphédrine, ni adrénaline).
- 3° Il ne provoque pas d'accoutumance (absence de barbituriques et d'analgésiques).

Posologie. — Dès les premiers symptômes faisant craindre à l'asthmatique une crise (toux, expectoration rare et gluante, etc.), prendre un comprimé d'IMINASTHME avec un peu d'eau.

Si le malade prévoit une crise nocturne, il doit prendre un comprimé, le soir en se couchant, et deux comprimés si les crises se déclarent habituellement à la fin de la nuit.

La boîte de 10 comprimés : 14 fr. 50

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vigtrât — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

IMMUNICORPS MARY LAURENT

Immunothérapie physico-chimique

(Complexe Carbono-Iodo-Magnésien.)

Traitement des maladies infectieuses, aiguës ou chroniques, par voie buccale.

Indications :

Grippes, Angines, Pneumonies, Otites, Rhumatismes, Septicémies, etc., assurent la fixation et la collection du pus : Furunculose, Anthrax.

Dose d'attaque :

50 gouttes 2 fois par jour.

Dose d'entretien :

30 gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau. Dépourvus de toute toxicité, pas de contre-indication.

Littérature et Échantillons :

**Laboratoire Docteur H. FERRÉ
L. MOREAU, Pharmacien.**

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

IMMUNIDERM GRÉMY

Pommade Vaccin.

Pommade vaccinnante réalisant l'association du bouillon vaccin concentré et du Bactériophage.

Bouillon vaccin concentré	9,09
Bactériophage staphylo	2,70
Lanoline, vaseline aa.....	9,09
Sulf. double d'oxyquinoléine et de potasse	0,015

Pour un tube de 30 grammes.

Indications :

Furunculose, Anthrax, Sycosis, Prurit, Ulcères variqueux, Plaies et brûlures infectées et toutes dermatoses.

Posologie :

Appliquer sur la partie infectée une couche de pommade, qu'il sera utile de protéger par une feuille imperméable fixée au moyen de leucoplaste.

Prix : 14 fr. 30.

Enregistré L. N. C., n° 608-69.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 48-43.)

IMMUNIPÉROS

Vaccination par voie buccale.

Composition. — Bouillons vaccins à très forte teneur microbienne, renfermant antivirüs et corps bactériens.

Indications :

N° 10. *Antistaphylococcique* : Furunculose, Anthrax et toutes staphylococcies.

N° 11. *Intestinal* : Infections intestinales aiguës ou chroniques, Entérites, Colites, Appendicites, Cholécystites, Infections biliaires.

N° 15. *Dermatologie* : Eczéma, Psoriasis, Prurits, Dermatoses.

N° 22. *Typhoïde* : Vaccination préventive, Traitement curatif des états typhiques et paratyphiques.

Posologie. — 1 ampoule le matin à jeun, 1 ampoule le soir, loin du repas.

Prix : La boîte de 10 ampoules de 5 cc. : 22 fr. 45.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n° 608-40, 61, 41, 42.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX°).

(Tél. : Trinité 48-43.)

NOTES ON THE HISTORY OF THE

the following are the names of the
the following are the names of the

the following are the names of the

the following are the names of the

the following are the names of the

the following are the names of the

the following are the names of the

IMMUNIZOLS GRÉMY

Enregistrés au L. N. C.

I. IMMUNIPEROS (Voir à ce nom.)

Vaccination par voie buccale.

II. IMMUNIZOLS GRÉMY INJECTABLES

Composition. — Émulsions microbiennes polyvalentes, mono ou polymicrobiennes.

Indications :

- N° 10. *Furonculose*: Furonculose, Anthrax, Sycosis, Ostéomyélite et toutes Staphylococcies.
- N° 11. *Entérite-Appendicite*: Infections intestinales aiguës et chroniques.
- N° 13. *Asthme*: Asthme essentiel, Asthme des foins, Asthme intestinal.
- N° 15. *Eczéma-Psoriasis*: toutes Dermatoses.
- N° 16. *Bronchites*: Bronchites chroniques.
- N° 17. *Rhumatismes*: Rhumatismes chroniques, articulaires, aigus et subaigus.
- N° 18. *Urétrites*: Urétrites aiguës, subaiguës et chroniques.
- N° 19. *Acné*: Acnés juvénile, pustuleux, nécrotique.
- N° 23. *Grippe*: Infections pulmonaires aiguës, Grippe et complications.
- N° 31. *Abcès*: Abcès chauds, Panaris, Phlegmons, Plaies infectées.
- N° 40. *Cystites*: Cystites, Pyélonéphrites.
- N° 41. *Métrites, Salpingites*.
- N° 50. *Otitis-Sinusites*.

Posologie. — Injections sous-cutanées à doses progressivement croissantes, espacées de deux à trois jours.

Cure vaccinale. — 10 injections.

Prix :

- Ampoules de 2 cc., la boîte de 5 : 28 fr. 05.
- Ampoules de 2 cc., la boîte de 1 : 6 fr. 65.
- Ampoules de 1 cc., la boîte de 2 : 9 fr. 20.

III. IMMUNIZOLS COMPRIMÉS

Composition. — Corps microbiens tués par la chaleur, desséchés et incorporés à une masse de compression.

Indications :

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| N° 10. <i>Furonculose</i> . | N° 18. <i>Urétrites</i> . |
| N° 11. <i>Entérite-Appendicite</i> . | N° 31. <i>Abcès</i> . |
| N° 13. <i>Asthme</i> . | N° 40. <i>Cystites</i> . |
| N° 15. <i>Eczéma-Psoriasis</i> . | N° 41. <i>Métrites-Salpingites</i> . |

Posologie. — 2 pilules de bile le matin à jeun sauf enfants de moins de 5 ans).

5 à 12 comprimés par jour, selon l'âge, en 2 ou 3 fois, loin des repas.

Prix : Le flacon de 50 comprimés et 10 pilules de bile : 22 fr. 45.

IV. IMMUNIZOLS BOUILLONS-VACCINS

Composition. — Antivirus provenant de cultures mono- ou polymicrobiennes polyvalentes.

Indications :

N° 10. *Furonculose.*

N° 36. *Brûlures.*

N° 31. *Abcès.*

N° 41. *Métrites-Salpingites*

N° 35. *Ulcères variqueux.*

N° 50. *Otites-Sinusites.*

Posologie. — Pansements, lavages, instillations, mèches, vaporisations.

Aucune contre-indication.

Prix : La boîte de 3 ampoules de 10 cc. : 22 fr. 45.

Le n° 50 « Otites-Sinusites » existe également en boîte de 5 ampoules de 5 cc., au prix de 22 francs. Prescrire : « Immunizol Bouillon-Vaccin 50 Vapo ».

V. HIBÉVÉ

Bouillon-vaccin concentré polyvalent, à diluer pour obtenir un demi-litre de bouillon-vaccin normal.

Prix : 51 francs.

VI. OVULES VACCIN

Composition. — Filtrats de cultures en bouillon peptoné.

Indications. — Métrites et Salpingites aiguës, subaiguës ou chroniques, vaginites.

Prix : La boîte de 6 ovules : 22 fr. 45.

VII. COLLYRE GRÉMY

A l'Immunizol Bouillon-vaccin.

Prix : La boîte de 10 pipettes compte-gouttes : 25 fr. 50.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 48-43.

IMMUNOVACCIN ANTIRHUMATISMAL

Composition. — Bacille d'Achalme + entérocoques.

Forme injectable. — 5 séries (I, II, III, IV, V) à doses croissantes.

Débuter par la série II pour le Rhumatisme articulaire aigu et la Chorée.

Débuter par la série I pour le Rhumatisme viscéral, subaigu ou chronique.

Indications. — Toutes les formes cliniques de l'infection rhumatismale : Rhumatisme articulaire aigu, subaigu, myoarticulaire, chronique, Endocardite, Myocardite, Péricardite, Pleurésie rhumatismale, Sciatique, Névrites, Névralgies rhumatismales, Chorée, Thyroïdites, Arthritisme, Dermatoses streptococciques.

Forme à ingérer. — Ampoules de 5 cc. Une ampoule par jour.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique ne pouvant pas être traité par la forme injectable. Manifestations douloureuses gastro-intestinales, hépatiques, rénales des arthritiques ; Hypertension, Insuffisance cardiaque, syndromes angineux liés à l'Arthritisme.

Prix. — La boîte : 33 francs.

Laboratoire des IMMUNOVACCINS

8, avenue des Sources — NICE.

IMPÉTIGOL

Présentation. — Pommade en tube. Poids brut : 60 gr. environ.

Composition. — I complexe minéral : Iode-Cuivre associé à I complexe phytothérapique : Calendula — Hypericum — Thymus.

Composition en grammes p. 100 :

Protolodure de cuivre	5 gr.
Huile de millepertuis	12 gr.
Teinture mère de souci	4 gr.
Huile essentielle de thym.....	4 gr.
Lanoline	40 gr.
Vaseline	35 gr.

Indications :

Dermatologie :

Streptococcies cutanées. Impétigo, Intertrigos, Dermatoses croûteuses et squameuses, Dermatoses à forme circinée, à forme nummulaire, Eczéma rétro-auriculaire, Sporotrichoses, Tricophytoses, Folliculites staphylococciques, Acne pustuleuse, Ecthyma, Suppurations récentes ou anciennes, Ulcères variqueux non eczématisés, Plaies infectées rebelles.

Gynécologie. — Ulcérations du col de la métrite cervicale.

Mode d'emploi. — En applications ou en frictions suivies d'applications.

Prix au public. Le tube : 12 fr. 75.

Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 1501-2.

Laboratoires JAUFFRET : NÉOBIOL-IMPÉTIGOL

Vanves, près PARIS

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-Interne des Hôpitaux

Correspondance et Bureaux : 181, av. Victor Hugo, CLAMART (Seine.)
(Tél. : Michelet 04-71.)

INAVA

Pâte dentaire immunisante.

Bleue au Pyodarsénol.

Hygiène quotidienne

(*Fusé-strepto-vaccin gingival Inava B
associé au Sulfarsénol.*)

Antipyorrhéique. — Antispirillaire.

Pour prévenir et traiter :

*La suppuration des gencives, la carie dentaire
le déchaussement des dents.*

Et toutes *Gingivites, Stomatites et Pyorrhée.*

Tube ord. : 7 fr. 40 — Tube g. mod. : 9 fr. 30.

Enregistré L. N. C. M. n° 760-12

Laboratoire INAVA,

E. GUIGNIER, pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

INDHAMÉLINE LEJEUNE PLURIGLANDULAIRE

Association d'extraits opothérapiques et végétaux.

Composition :

Principes végétaux de l'Indhaméline Lejeune
simple associés aux sucs glandulaires de : Hypo-
physe, ovaire, surrénale et thyroïde.

Indications :

Cette forme de l'Indhaméline Lejeune est plus
particulièrement indiquée dans les troubles de
la ménopause et de la puberté, dans les métrites,
salpingites non suppurées, ovarites chroniques,
sclérose utérine, etc.

Mode d'emploi :

XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant
chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 18 fr. 85.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 47-00.)

INDHAMÉLINE LEJEUNE SIMPLE

(Médication exclusivement végétale.)

Composition. — Principes actifs d'Hamamélis, marron d'Inde, condurango viburnum, anémone, séneçon, piscidia (Alcaloïdes et principes vitaux de la plante fraîche stabilisée).

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la circulation générale, Décongestif par vaso-constriction périphérique. Analgésique par action sur les terminaisons nerveuses sensibles. Tonivasculaire et sédatif utérin précieux dans la dysménorrhée. Décongestionnant ovarien, régulateur des menstrues.

Indications. — Troubles circulatoires, ménopause, varices, hémorroïdes.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes dans un peu d'eau avant chaque repas (20 jours par mois).

Prix : 15 fr. 30.

LABORATOIRES A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél.: Dorian 47-00.)

INERTYL CHARVOZ

Composition. — Kaolin colloïdal, Mucilage d'algues marines, Hémicellulose, Charbon activé, Hydrate de magnésie, Carbonate de bismuth, Bioxyde de Manganèse, Benzo-naphtol, Lactose.

Indications. — Intoxications gastro-intestinales, Entérites, Colites, Diarrhées, Aérophagie, Flatulence.

Formes. — Cachets. Comprimés. Granulé.

Posologie :

Enfants : Comprimés : 1/2 à 2 par jour. Granulé : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : Cachets : 1 après chaque repas. Comprimés : 2 après chaque repas. Granulé : 2 à 3 cuillerées à café avant chaque repas.

Prix : Les trois formes : 17 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 80-3, 80-5, 80-6.

Laboratoires CHARVOZ

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV^e).

INFANGYL CARLIER

Composition :

Thiocol, antipyrine, tolu.....	ââ	0 gr. 02
Benz. de Na, Eau de laurier-cerise	ââ	0 gr. 04
Teinture de Drosera		0 gr. 08
Sirop de Desessartz pour 1 cuillerée à café.		

Indications. — Traitement des affections des voies respiratoires des *enfants*, toux, bronchites, trachéo-bronchites, coqueluches, laryngites aiguës et striduleuses.

Propriétés. — Expectorant puissant, Calmant de la toux, Laxatif léger.

Posologie. — 4 cuillerées à café avant 5 ans (nourrissons : demi-dose), 4 cuillerées à dessert après 5 ans.

Prix : 13 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1226-2.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires René CARLIER

43, rue de Gréteil, JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 26-58 et 26-59.)

INFRA-ROUGE

1° Plaies et ulcérations atones, Infections cutanées et sous-cutanées.

2° Troubles circulatoires (œdèmes, cellulite, stase veineuse, troubles de la circulation artérielle, engorgements ganglionnaires).

3° Rhumatismes chroniques, Arthralgies et myalgies.

4° Douleurs abdominales : entéro-colite, périviscérités, séquelles douloureuses post-opératoires, Affections douloureuses du foie, de la vésicule biliaire, des organes génitaux.

5° Névralgies et Névrites.

Appareils en location sur ordonnance médicale.

Livraison rapide par :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).

(Tél. : Littré 90-13.)

INHALANTYL

Définition. — *Inhalantyl* se présente sous forme de comprimés prompts à se désagréger, à base d'essences balsamiques extraites de zestes de fruits. Il ne contient ni alcool, ni menthol.

Originalité. — Sa nouveauté et sa raison d'être sont de deux ordres :

- 1° Nous avons fait appel à un groupe d'essences puissamment antiseptiques, utilisées pour la première fois d'une façon systématique pour la désinfection des voies aériennes supérieures, nous voulons dire les *essences de zestes d'agrumes*, dont les travaux poursuivis dans divers laboratoires de la Faculté de pharmacie de Lyon et des thèses soutenues depuis lors ont montré l'action remarquable contre les microbes habituels des voies aériennes supérieures : méningocoque, streptocoque, staphylocoque, Læffler, etc. Des stations expérimentales italiennes, installées pour la plupart en Calabre, ont apporté mêmes résultats probants (notre laboratoire avait déjà mis ces essences sur le plan supérieur qu'elles méritent en les utilisant pour l'huile balsamique qu'il a dénommée *Balsamorphinol* et qui a fait ses preuves).
- 2° Pour garder les essences pures dans les comprimés, nous utilisons un excipient-support *inerte* dont les mailles ou trabécules maintiennent les essences *prisonnières à l'état de fines gouttelettes*. Le comprimé jeté dans l'eau chaude se dissocie immédiatement : les essences subtiles sont libérées et happées par les voies respiratoires avec la vapeur d'eau ; le support devenu inutile se dépose au fond du bol. Ainsi sont maintenues en captivité, sans altération, des particules aussi subtiles et évanescences que celles des essences pour être libérées au moment opportun.

Action. — Les essences balsamiques utilisées agissent de manière élective contre les agents microbiens des fosses nasales, du rhinopharynx, du larynx, de la trachée et des bronches. Elles se dégagent d'emblée (et continûment durant cinq à six minutes), gagnent avec la vapeur d'eau chaude l'ensemble des cavités aériennes et de leurs annexes (sinus, trompe d'Eustache) jusqu'aux alvéoles pulmonaires, décongestionnant et aseptisant toutes les muqueuses de l'arbre respiratoire.

Indications. — *Toutes les affections inflammatoires, banales ou grippales, parties du nez et du rhino-pharynx et tombant sur la gorge ou les bronches ; toutes celles aussi qui touchent d'emblée le larynx et les voies respiratoires inférieures, c'est-à-dire : coryzas, sinusites, rhinopharyngites, pharyngites, angines, — laryngites, enrouement, aphonie, toux, — trachéites, bronchites, affections grippales avec ou sans complications.*

Mode d'emploi. — Trois inhalations par jour en moyenne (matin, midi et soir), de cinq minutes chacune, préparées en faisant dissoudre dans un bol d'eau bouillante, ou dans un inhalateur, 1 à 2 comprimés. Respirer les vapeurs alternativement par le nez et par la bouche.

Nota. — Le dépôt qui, après inhalation, reste au fond du bol est sans valeur. Il est constitué par l'excipient qui servait de support aux essences balsamiques.

Prix : boîte de deux tubes de comprimés, 15 fr. 85.

Laboratoire FIDES, R. VOUZELLAUD, docteur en pharmacie.
14, rue de la Comète — PARIS (VII^e). — Tél. : Invalides 64-13.

INHALATION-GARGARISME

« VOCALDOP »

Composition. — Perborate et salicylate de soude, eucalyptol, menthol.

La poudre VOCALDOP réunit en une seule prescription médicale synthétisant la thérapeutique externe naso-pharyngienne :

une **inhalation** et un **gargarisme**.

1 cuillerée à		Inhalation
café de	+ H ² O	Respiration nasale
Poudre	chaude =	et gargarisme.
<i>Vocaldop</i> .		Bain buccal.

L'Inhalation-Gargarisme *Vocaldop* remplace avantageusement les solutions alcooliques et les teintures (benjoin, eucalyptus, tolu). En effet, les vapeurs éthyliques sont nocives pour la Voix, l'alcool « fixe » les tissus des organes phonateurs. (*Thèse de Doctorat 1924.*)

Prix : 9 fr. 55.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 57-79.)

INHALATION LANCOSME

Composition. — Essences naturelles à pouvoir antiseptique élevé (girofle, citron, thym, etc.) associées à la créosote de hêtre pure.

Présentation. — Liquide.

Propriétés. — Aseptise la muqueuse de l'arbre trachéobronchique et des alvéoles pulmonaires, diminue les sécrétions et l'expectoration.

Indications. — Coryza. Rhinite. Ozène. Laryngites aiguë et chronique. Trachéite. Bronchite aiguë. Emphysème pulmonaire. Grippe. Tuberculose pulmonaire.

Contre-Indications. — Tuberculose aiguë à forme éréthique avec tachycardie et dans les formes congestives et fébriles avec hémoptysies.

Emploi. — Avec un inhalateur : verser la valeur de 2 à 3 compte-gouttes, goutte à goutte, dans l'eau chaude, mais non bouillante ; deux à trois inhalations par jour.

Prix : 13 fr. 75.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Élysées 17-46.)

INHALO BOL

Cornet pour inhalations
(en papier parcheminé).

Simple,

pratique,

bon marché.

Indications thérapeutiques :

Toutes affections bronchiques ou rhinolaryngologiques nécessitant une inhalation.

Prix : 6 fr. 25.

Laboratoire de l'INHALO-BOL

32, rue de l'Ouest — PARIS

P. TAVERNIER, Docteur en pharmacie.

INHALO-PAST

Gargarisme sec en tablettes.

Composition. — Alcoolature de racines d'Aconit, chl-te d'Amyléine, borate de soude, chlorate de Potassium, *chlorhydrate de Diamino-Acridine*. Eucalyptol, Menthol, Soufre colloïdal, Terpène.

Indications thérapeutiques. — Affections de la gorge, angines, amygdalites, laryngites, pharyngites, enrouements. Infections de la bouche : Stomatites, Gingivites.

Posologie. — 8 à 15 tablettes par jour pour adultes ; 4 à 8 tablettes par jour pour enfants.

Laisser fondre lentement la tablette sans la croquer.

Prix : 8 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 742-10.

Laboratoire P. TAVERNIER

Docteur en Pharmacie,

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV^e).

INHALOPHÉDRINE

Pour Inhalations

Composition :

Ephédrine	0,10
Menthol.....	0,20
Goménol.....	1,00
Essence de pin sylvestre	1,00
Essence de Thym	1,00
Eucalyptol.....	1,00
Teinture d'Eucalyptus.....	20,00
Teinture de benjoin	20,00
Eau de laurier-cerise.....	5,00
Elhanol à 90°..... Q. S. pour 100 gr.	

Indications. — Asthme, Bronchite, Coryza, Grippe, Laryngite, Toux spasmodique, Sinusite.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un bol d'eau bouillante en inhalations, 2 à 3 fois par jour.

R. DUNESME, Pharmacien,

4 et 6, rue Ordener — PARIS (XVIII^e).

Tél. : NOR. 68-53.

INHALO-SEL

Composition. — Comprimés pour inhalations à base de menthol et d'essences volatiles (pin, niaouli, eucalyptus).

Avantages thérapeutiques. — Peu de menthol, pas d'alcool, donc pas d'irritation.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, rhino-pharyngites, sinusites.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 comprimés dans un demi-bol d'eau bouillante en inhalation.

Prix : 7 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 742-2.

Laboratoire P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie.

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV^e).

INHALO-THIORINE

Hydrogène sulfuré naissant.

Forme. — Comprimés pour inhalations (hydrogène sulfuré à l'état naissant, essence de Niaouli et Terpinol).

Propriétés. — L'INHALO-THIORINE permet de réaliser à domicile la cure sulfureuse externe par inhalation d'Hydrogène sulfuré à l'état naissant.

Dans les affections des voies respiratoires, c'est le complément de la cure interne de Sulfo-Thiorine.

Indications. — Rhinites, Sinusites, Pharyngites, Trachéites, Enrouements, Laryngites chroniques, Catarrhes, Bronchites.

Mode d'emploi. — Un comprimé dans un bol d'eau bouillante pour inhalation de 4 à 5 minutes.
2 à 3 inhalations par jour.

30 comprimés. Prix : 14 fr. 70.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 820-04.)

INHALOXYL

Comprimés pour inhalations. Permet une inhalation complètement exempte d'alcool et pauvre en vapeur d'eau, sans menthol.

Composition. — Les essences ont été choisies en s'inspirant des travaux de Morel et Rochaix sur le pouvoir antiseptique de chacune d'elles vis-à-vis des différentes bactéries pathogènes.

Mode d'emploi. — Dans un demi-bol d'eau tiède, mettre 1 ou 2 comprimés et respirer les gaz qui se dégagent entraînant les vapeurs antiseptiques.

Indications. — Coryza, laryngites, trachéites, bronchites aiguës et chroniques.

Se fait aussi en huile pour instillations et pulvérisations.

Prix : comprimés : 12 fr. Huile : 13 fr. 50.

Laboratoires WARIN

5, r. François-Ponsard — PARIS (XVI^e). Aut. 71-98

INHESS

Inhalations sèches, sans vapeur d'eau.

Composition. — Essences balsamiques débarrassées des éléments toxiques ou irritants et composants d'essences qui les diluent et en renforcent l'action.

Indications. — Coryza, Rhinites, Adénoïdites, Trachéo-Bronchites descendantes.

Préventif des complications pulmonaires : Grippe, Rougeole, Coqueluche, Emphyseme et Sclérose pulmonaire.

Soins pré et post-opératoires.

Laryngites aiguës, Toux et Douleurs laryngées des tuberculeux, Toux spasmodiques.

Posologie. — 3 à 6 inhalations par jour.

L. CHAUVIN, Pharmacien,
3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

INJECTION DÉSENSIBILISANTE FRAISSE

Composition :

Hyposulfite de Soude	0 gr. 10
Hyposulfite de Magnésie	0 gr. 40
Soluté de glucose isotonique	5 cc.

Indications. — Troubles anaphylactiques, Eczéma, Furunculose, Prurit.

Forme. — En ampoules de 5 cc. (boîte de 6 ampoules).

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

Prix : Boîte de 6 ampoules. : 19 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-15.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

INJECTION IMMUNISANTE FRAISSE

Composition :

Cinnamate de Benzyle	0 gr. 05
Cholestérine	0 gr. 05
Camphre.....	0 gr. 05
Huile d'olive.....	2 cc.

Indications. — Tuberculose primaire et autres états d'infection.

Forme. — En ampoules de 2 cc. (boîte de 12 ampoules).

Posologie. — 1 ampoule tous les jours dans le tissu musculaire.

Prix : boîte de 12 ampoules : 19 fr. 90 (12 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-2.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

INOCRININES

Extraits non glycerinés de glandes fraîches en ampoules buvables, non injectables. Toute la gamme endocrinienne.

Formules simples :

0 Epiphysine.....	0 gr. 02	4 Hypophysine ant...	0 gr. 10'
1 Thyroïdine.....	0 gr. 025	5 Hypophysine tot..	0 gr. 10
2 Ovarine.....	0 gr. 10	6 Surrénine.....	0 gr. 10
3 Orchitine.....	0 gr. 10	7 Thymusine.....	0 gr. 50

Formules associées :

8 Thyroïdine.....	0 gr. 025	13 Thyroïdine.....	0 gr. 025
Hypophysine ant..	0 gr. 10	Hypophysine ant....	0 gr. 10
9 Hypophysine ant..	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine.....	0 gr. 10	14 Thyroïdine.....	0 gr. 025
10 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Hypophysine ant..	0 gr. 10
Orchitine.....	0 gr. 10	Ovarine.....	0 gr. 10
11 Hypophysine ant...	0 gr. 10	Surrénine.....	0 gr. 10
Surrénine.....	0 gr. 10	15 Thyroïdine.....	0 gr. 025
12 Thyroïdine.....	0 gr. 025	Hypophysine ant..	0 gr. 10
Hypophysine ant...	0 gr. 10	Orchitine.....	0 gr. 10
Ovarine.....	0 gr. 10	Surrénine.....	0 gr. 10

Formuler : ampoules buvables d'Inocrinines, formule n° 00. 1 boîte.

Doses et mode d'emploi. — Une à deux ampoules par jour 1/2 heure avant les repas.

La boîte de 10 ampoules : 29 fr. 30.

Lab. contrôle : n° 9, 909-3; n° 12, 909-4; n° 14, 909-5.

Laboratoires des INOCRININES

4, route du Médoc — BORDEAUX-BOUSCAT (Gironde).

INOLAXINE

Granulé mucilagineux végétal, naturel, pur, sans adjonction d'aucun produit laxatif chimique.

Propriétés. — L'*Inolaxine* absorbe 40 fois son volume d'eau. Elle augmente le bol intestinal et lui donne une consistance moelleuse. Elle favorise les mouvements péristaltiques et facilite l'acheminement des matières fécales. Elle agit mécaniquement et ne détermine pas d'accoutumance.

Indications. — Constipation, atonie intestinale.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas. Mettre à sec sur la langue, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

Présentation. — En boîte petit modèle à 14 fr. 85. Boîte grand modèle (contenance quadruple), 47 fr. 75.

Échantillons

Laboratoires du D^r DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS.

Tél. : Lab: 72-73 (4 lignes groupées):

INOLÈNE

Solution concentrée de Coaltar désodorisé.

Propriétés. — Antiseptique puissant. Décongestionnant, cicatrisant rapide. Innocuité absolue. Réaction alcaline.

Indications. — Gingivites, stomatites, pharyngites, amygdalites, angines, abcès. Soins de la gorge et du nez. Gynécologie. Ulcérations du col. Pansements des plaies.

Mode d'emploi.

Lavages : 2 à 3 cuillerées à café par litre d'eau.

Gargarismes : *Bains de bouche* : XX à XXX gouttes dans un verre d'eau chaude.

Badigeonnages : pur ou au demi.

Inhalations.

Dentifrice : X à XX gouttes dans un verre d'eau.

Prix : le flacon, 18 fr. 50.

SPÉCIALITÉS INOLÈNE

Inolène simple : Soins des muqueuses et des plaies. (Voir ci-dessus.)

Inolène vaseline (Nasolène) : Antisepsie des fosses nasales.

Inolène thymolé : Antisepsie générale. (Injections, pansements 2 à 3 cuill. à café par litre d'eau.)

Inolène ovules : Gynécologie.

Inolène pommade et Inolène poudre : Dermatologie. Prurits. Plaies.

Enreg. au L. C. M. sous le n° 563.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, Pharmacien.

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 25-51.)

INORÉNOL

Extrait désalbuminé et délipodé de rein.

Indications. — Albuminurie, Urémie, Uricémie, Arthritisme, Néphrites aiguës ou chroniques, Rhumatismes.

Résultats. — Augmentation de la diurèse et de l'élimination des chlorures, de l'acide urique et de l'urée ; abaissement de la concentration de l'albumine urinaire.

Posologie. — 1 à 2 ampoules buvables ou injectables par jour, ou 2 à 6 dragées à jeun ou loin des repas, pendant des cures de 12 jours, alternées avec des périodes de repos de 10 jours.

Présentation :

La boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc. : 33 fr. 95.

La boîte de 10 ampoules injectables de 2 cc. : 29 fr. 70.

L'étui de 40 dragées : 18 fr. 40.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

INOSEPTA

Pommade à base de bouillon-vaccin, de streptocoques, staphylocoques, b. pyocyaniques.

Pyodermites, Furoncles, Acné, Impétigo, toutes lésions cutanées infectées.

Prix : Le tube : 17 fr. Le 1/2 tube : 9 fr. 55.

FILTRAT INOSEPTA

Présentation en ampoules du même bouillon-filtrat, pour pansements locaux.

Prix : La boîte de 6 amp. 10 cc. : 25 fr. 45.

INOSEPTA AURICULAIRE

Traitement des furunculoses du conduit auditif, otites, mastoidites, etc...

Prix : La boîte de 10 amp. de 2 cc. : 21 fr. 20.

INOSEPTA OPHTALMIQUE

Pommade contre les blépharites, conjonctivites, orgelets, dacryocystites, toutes affections oculaires.

Prix : Le tube : 11 fr. 70.

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches

151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Échantillons : 60, rue de Monceau — Paris (VIII^e).

(Tél. : Laborde 72-73.)

INOTYOL

Pommade adoucissante, réductrice et cicatrisante.
Traitement de toutes les affections cutanées ou irritations de la peau : eczémas, ulcères, prurits, érythèmes, rougeurs des nouveau-nés.

POUDRE INOTYOL

Toilette des bébés, prévention des rougeurs, en poudrage sur la pommade pour en augmenter l'adhérence.

Présentation :

Pommade INOTYOL : le 1/2 tube, 7 fr. 15.

le tube, 12 fr. 25 ; le quadruple tube, 29 fr. 60.

Poudre INOTYOL. La boîte poudreuse : 7 fr. 15.

Laboratoires du D^r DEBAT

60, rue Monceau — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

INSTITUT PASTEUR

SÉRUMS

Prix
de vente
au Public

Antidiphthérique

3 000 unités. 10 cc. liquide	7. »	10. »
5 000 unités. 10 cc. —	10.50	15. »
10 000 unités. 10 cc. —	24.50	35. »

Antidiphthérique purifié

(Dose préventive), 1 000 unités.....	7. »	10. »
(Pour traitement), 5 000 unités.....	14. »	20. »

Antitétanique :

3 000 unités In ^{les} 10 cc. liquide....	7. »	10. »
20 000 unités In ^{les} 10 cc. (p ^r trait)..	35. »	50. »

Antitétanique purifié

Dose préventive) 3 000 unités Int.	10.50	15. »
(Pour traitement), 10 000 unités Int.	28. »	40. »
Antistreptococcique , 10 cc. liquide .	7. »	10. »
Antiméningococcique , 10 cc. liq ...	7. »	10. »
Antidysentérique , 10 cc. liquide ...	7. »	10. »
Anticolibacillaire , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antivenimeux , 10 cc. liquide	14. »	20. »
Antivenimeux en flacon auto-injec- teur	21. »	30. »
Anticharbonneux , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antipesteux , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Antipneumococcique , 20 cc. liquide	14. »	20. »

Anti-gangréneux :

Antiperfringens , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Antisporogenes , 20 cc. liquide.....	14. »	20. »
Antioœdématisans , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antivibrion-septique , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antihistolitique , 10 cc. liquide	7. »	10. »
Antigangréneux Polyvalent , 20 cc. liquide.	14. »	20. »
Antipéritonite , 20 cc. liquide	14. »	20. »
Antipollomyélitique , 10 cc. liquide .	17.50	25. »
Les sérums desséchés en flacon de 1 gr. correspondant à 10 cc. liquide.....	10.50	15. »

VACCINS

Prix
de vente
au Public

Antidiphthérique

(Anatoxine), boîte 3 ampoules.....	10.50	15. »
(Anatoxine), flacon 10 cc	10.50	15. »

Antitétanique

(Anatoxine), boîte 3 ampoules.....	10.50	15. »
(Anatoxine), flacon 10 cc.....	10.50	15. »

Antistaphylococcique

(Anatoxine), boîte 5 ampoules.....	17.50	25. »
------------------------------------	-------	-------

Antidiphthérique-Antityphoïdique,

3 ampoules	14. »	20. »
Flacon 10 cc	14. »	20. »

Antidiphthérique-Antitétanique,

3 ampoules.....	14. »	20. »
Flacon 10 cc	14. »	20. »

Anti-Diphthérique-Tétanique-Typhoïdique

Boîte 3 ampoules	17.50	25. »
Flacon 10 cc.....	17.50	25. »

Antistaphylococcique

(Furunculose), 6 ampoules.....	17.50	25. »
(Ostéomyélite), boîte 6 ampoules....	17.50	25. »

Antigonococcique , boîte 6 ampoules	17.50	25. »
--	-------	-------

Tétra-vaccin Antipyogène, boîte 6 ampoules	17.50	25. »
--	-------	-------

Antipneumococcique , boîte 6 amp .	17.50	25. »
---	-------	-------

Anticholérique , boîte 2 ampoules...	5.60	8. »
---	------	------

Antityphoïdique , boîte 3 ampoules ..	10.50	15. »
--	-------	-------

Antipesteux , flacon 10 cc	10.50	15. »
---	-------	-------

Extrait d'antigène tuberculeux

Dilué, 10 ampoules	21. »	30. »
Pur, 10 ampoules	24.50	35. »

Tuberculine brute , 1 cc	7. »	10. »
---------------------------------------	------	-------

Tuberculine au 1/100, 1 cc	2. »	3. »
---	------	------

Institut PASTEUR

36, rue du Docteur-Roux — PARIS.

(Adr. télégr. : Serpasteur Paris. Tél. : Ségur 07-95.

INSULANOL

Composition. — Pommade à l'Insuline.

Propriétés. — Agit en applications locales par l'Insuline qu'elle renferme, que les malades soient ou non diabétiques.

Indications. — Ulcères variqueux, Prurits de toute nature, Hémorroïdes, Plaies fistuleuses, Brûlures, Plaies atones.

Forme. — Tube de 35 gr. environ.

Posologie. — En onctions épaisses sur les parties malades. Recouvrir les plaies d'un pansement aseptique.

Prix : 18 fr. 55.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

INSULINE

Voir **ENDOPANCRINE**

Voir **POUDRE ET POMMADE
D'INSULINE PHYLOZE**

**Laboratoire
de l'Endopancrine**

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 07-70.)

INSULINE BUCCALE FORNET

(Pilules d'Insuline.)

Pour éviter toute confusion avec les solutés injectables d'Insuline, l'Insuline Buccale Fornet s'appellera désormais :

PANSULINE

Voir ce mot.

INSULINE CHOAY

Insuline cristallisée standard.

Nature. — Hormone hypoglycémiante extraite des îlots endocriniens du pancréas.

Indications. — Diabète grave avec dénutrition. Complications du diabète, même léger. Acidose diabétique ou non diabétique. Cures d'engraissement.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, parfois intraveineuses (coma diabétique).

Posologie. — Très variable suivant l'indication. Cas d'un diabète moyen : 20 à 40 unités par jour, en deux fois, avant les principaux repas.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules de 1 cc. = 10 unités internationales.
1 cc. = 20 unités internationales.
1 cc. = 40 unités internationales.

Flacons de 5 cc. = 100 unités internationales (20 u. i. par cc.).
5 cc. = 200 unités internationales (40 u. i. par cc.).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

INSULINE « LEO »

Décret n° 65 du 8 juillet 1931.

Indications. — Diabète, cures d'engraissement et toutes autres applications de l'Insuline.

Forme. — Ampoules de 5 cc. contenant 100 u. i. (1 cc. — 20 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 200 u. i.
(1 cc. — 40 u. i.)

Ampoules de 5 cc. contenant 400 u. i.
(1 cc. — 80 u. i.)

Prix: courants.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, suivant l'indication du médecin.

L'Insuline « Léo » ne contient aucun antiseptique, sa stérilité est absolue, les injections en sont indolores, son activité est constante grâce à sa teneur régulière en u. i., et elle conserve toute son efficacité pendant deux ans.

INSULINE RETARD « LÉO »

INSULINE PROTAMINÉE

Décret n° 94 du 19 juin 1937.

Boîtes de : 5 ampoules 200 u. i. en 5 cc.
(1 cc. — 40 u. i.)

et 1 ampoule de solution complémentaire.

LA SERINGUE SPÉCIALE « LÉO »

grâce à ses deux graduations permet de mesurer la dose exacte d'insuline directement en unités.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire et Pharmacien Garant pour la France et Colonies.

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

INSULINE « NOVO »

Décret d'autorisation n° 75 du 4 août 1933.

Indications. — Diabète, Cures d'engraissement.

Forme. — *Ampoules* de 5 cc. contenant 100 U. I. (soit 20 U. I. pour 1 cc.). Prix : 15 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-50.

Ampoules de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 29 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-51.

Ampoules de 5 cc. contenant 400 U. I. (soit 80 U. I. pour 1 cc.). Prix : 58 fr. 35.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-52.

Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :

10 flacons de 5 cc., chacun de 100 U. I.

Prix : 73 fr.

10 flacons de 5 cc., chacun de 200 U. I.

Prix : 140 fr.

Mode d'emploi. — En injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

L'Insuline NOVO est recommandée pour sa grande pureté et son action constante. Elle ne provoque ni irritations, ni intoxications ; elle est de plus d'une conservation parfaite, sans adjonction d'aucun antiseptique.

INSULINE-ZINC-PROTAMINE-NOVO

Décret d'autorisation n° 98 du 4 juillet 1938.

Complexe insoluble dont la dissociation lente dans l'organisme retarde l'action hypoglycémiante de l'insuline libérée.

Forme. — Flacons de 5 cc. contenant 200 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.).

Prix : 40 fr. 80.

Flacons de 10 cc. contenant 400 U. I. (soit 40 U. I. pour 1 cc.). Prix : 76 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-48.

Emballages pour cliniques et hôpitaux, soit :

5 flacons de 10 cc., chacun 400 U. I.

Prix : 180 francs.

Laboratoires du Docteur H. MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS

(Tél. : Archives 39-44.)

INSULINE - ZINC - PROTAMINE CHOAY

Insuline à action prolongée.

Nature. — Complexe unissant l'insuline cristallisée au Zinc et à la Protamine, présenté en suspension colloïdale amenée au pH des tissus.

Indication. — *Diabète.*

Mode d'emploi. — Après agitation du flacon, pour rendre homogène la suspension, injection sous-cutanée profonde, six heures environ avant le repas le plus chargé en féculents.

Posologie. — Après tâtonnement, la dose s'établit environ aux 2/3 de la dose d'insuline ordinaire.

Le caractère plus durable et plus étalé de l'action permet généralement de réduire le nombre des injections.

Forme pharmaceutique :

Flacon de 5 cc. = 200 unités internationales (40 u. i. par cc.).

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

INSULYL

Composition. — Solution d'insuline pure.

Propriétés. — Abaisse la glycémie. Permet l'utilisation des hydrates de carbone ingérés.

Indications. — a. *Diabète et ses complications.*

b. *Traitement Insuline-sucre :* Cure d'engraissement ; Insuffisance hépatique ; Cirrhoses ; Insuffisance cardiaque : Arythmie, Asystolie ; Métorrhagies, Ménorrhagies, Dysménorrhée.

c. *Médicament de choc :* Asthme, Urticaire, Schizophrénie.

Formes :

1^o Boîte de 10 ampoules de 1 cc. à 20 unités par ampoule.

2^o Boîte de 5 ampoules de 1 cc. à 40 unités par ampoule.

3^o Tube de 5 cc. à 20 unités par cc.

4^o Tube de 5 cc. à 40 unités par cc.

Posologie. — En moyenne 20 unités en injection intramusculaire avant chaque repas. Associer la cure diététique à la cure d'Insulyl.

Prix : Ampoules : 30 fr. 60. Tube à 20 U. I. : 16 fr. 30. Tube à 40 U. I. : 30 fr. 60.

INSULYL-RETARD

(Voir ce mot.)

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littre 68-22, 23 et 24.)

INSULYL-RETARD

Composition. — Insuline, Protamine, Zinc.

Propriétés. — Action hypoglycémiant retardée, continue et prolongée.

Indications. — Chaque fois que l'état du diabétique réclame plusieurs injections d'insuline par jour, ou lorsque la glycémie reste élevée, malgré un traitement correct. Diabète infantile. Diabète avec hyperthyroïdie.

Forme. — Tube de 200 unités, dosées à 40 unités par cc.

Prix : 40 fr. 80.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23, 24.)

INTESTARSOL

Granulés.

Réalise le complexe à la fois cicatrisant et parasiticide de la muqueuse intestinale.

Composition :

Acide Oxyacétylaminophényl arsinique	0,50
Charbon animal spécial	10
Charbon de peuplier	10
Magnésie anglaise	5

Excipient aromatisé... Q. S. P. 100 grammes.

Indications. — Diarrhées, colites et entéro-colites, gastro-entérites, entérites tuberculeuses, fermentations, flatulences, toutes intoxications et colibacilloses paravitoses (oxyures, ascarides).

Posologie. — 2 à 4 cuillères à dessert par jour suivant le cas, délayées dans un peu d'eau et de préférence assez loin des repas.

Présentation et Prix. — 17 fr. 35 (taxe comprise) la boîte de 120 grammes de granulé fondant.

Laboratoires H. CALAS

162, rue de l'Hay — GENTILLY (Seine).

(Tél. : Alésia 19-02.)

INTESTO

(Granulés)

Présentation. — En tube métal (17 fr. 85).

Principes actifs. — Charbon végétal pulvérisé, Kaolin, Sous-nitrate de bismuth, Bicarbonate de soude.

Indications. — Entérites, Colites, Stases intestinales et tous états toxi-infectieux d'origine intestinale, Diarrhées des adultes et des nourrissons, Fermentations intestinales, Météorisme ou ballonnement et gaz.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à potage une demi-heure avant les repas ou le matin à jeun.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café.

Peut être croqué ou délayé dans l'eau.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-30.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

INTRAIT DE DIGITALE DAUSSE

Préparation de Digitale conservant intacts tous les principes actifs de la feuille fraîche. (Stabilisation par le procédé Perrot et Goris.)

Toni-cardiaque à zone maniable très étendue.

Formes. — Solution d'Intrait de Digitale à prendre par gouttes; correspondant comme posologie à la solution officinale de digitaline à 1 p. 1 000.

Ampoules d'Intrait pour injections hypodermiques ou intraveineuses.

Chaque ampoule contient 2 cc. de solution et chaque centimètre cube correspond à 25 milligrammes d'Intrait de Digitale.

Granules d'Intrait de Digitale à 0 gr. 01, colorés en rose.

Posologie. — *Dose d'entretien cardio-tonique*: Granules à 1 centg. : 1 ou 2 par jour. — Solution d'Intrait : V à VII gouttes par jour en moyenne. Pendant une quinzaine.

Doses sédatives: Granules à 1 centg. : 3 à 5 par jour. — Solution d'Intrait : XV à XX gouttes par jour, pendant 3 à 4 jours avec intervalle de 10 à 12 jours.

Ampoules: 1/2 ou 1 ampoule.

Dose antiasystolique:

Solution "Intrait" : L à LV gouttes, en 3 prises, pendant une journée seulement.

Ampoules: 2 ampoules en une seule fois par voie hypodermique.

Une ampoule par voie intraveineuse.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS. (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE MARRON D'INDE DAUSSE

Préparation conservant intacts les principes actifs de la semence fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*). Vaso-constricteur veineux spécifique des *Hémorroïdes*, *Varices*, *Phlébites*.

Forme. — *Solution d'Intrait de marron d'Inde* : X gouttes = 0 gr. 01 d'Intrait.

Mode d'emploi. — *Usage interne* : *Solution d'Intrait de marron d'Inde Dausse*. V gouttes matin et soir.

INTRAIT DE STROPHANTHUS

Préparation de *Strophanthus gratus* conservant intacts tous les principes actifs de la semence fraîche. (Stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*.) Toni-cardiaque puissant.

Formes. — *Solution d'Intrait de Strophanthus* : X gouttes renferment un milligr. d'Intrait.

Ampoules d'Intrait de Strophanthus dosées à un milligr. d'Intrait par cc.

Indications. — Dans tous les cas d'insuffisance cardiaque, chez les cardiaques vrais, chez les cardiorénaux et toutes les fois que la Digitale ne réussit pas.

Posologie. — **SOLUTION D'INTRAIT** : *Dose d'entretien cardio-tonique* : V gouttes par jour pendant 15 jours.

Dose antiasthénique. — XX à XXX gouttes en une fois.

AMPOULES D'INTRAIT. — Exclusivement par *voie intramusculaire* : 1/2 à 1 ampoule, en cas de collapsus cardiaque imminent.

INTRAIT DE VALÉRIANE DAUSSE

Antispasmodique
sédatif du système nerveux.

Préparation dépourvue d'odeur et conservant intacts les principes actifs de la racine fraîche (stabilisation par le procédé *Perrot-Goris*).

Forme. — *Solution d'Intrait de Valériane Dausse*.

Indications. — *Insomnie* d'origine nerveuse due à un éréthisme sensoriel ou cérébral.

Nervosisme, *irritabilité nerveuse*, *affections spasmodiques*, *dermatoses prurigineuses*, *chorée*, *tics*, *convulsions infantiles*.

Posologie. — *Solution d'Intrait de Valériane* : 2 à 3 cuillerées à café par jour. Doubler la dose si nécessaire.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRAIT DE PASSIFLORE COMPOSÉ

Préparation d'intrait de Passiflore associé à l'intrait de Valériane, à l'Aubépine et au Gelsemium Dausse titré physiologiquement.

Propriétés. — Calmant de l'excitation cérébrale. Antispasmodique, Modérateur de l'éréthisme cardiaque, Sédatif nervin.

Indications. — Affections spasmodiques ; palpitations cardiaques réflexes ; états anxieux ; insomnie d'origine nerveuse.

Posologie et mode d'emploi. — Régulateur du système nerveux ; 1 à 2 cuillerées à café avant chacun des 2 principaux repas.

Calmant des insomnies nerveuses :

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café le soir au coucher.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

INTRA-REIPAR

Composition. — Solution d'acide salicylique injectable par voie intraveineuse.

Indications. — Toutes les indications de la médication salicylée : Rhumatisme articulaire aigu, particulièrement les formes graves ou à localisations viscérales, Névralgies et leurs séquelles, Sclérose en plaques, Parkinsonisme.

Avantages. — Action rapide et sûre. Aucune réaction soit locale, soit générale. Aucun des inconvénients du salicylate de soude par voie buccale (troubles gastriques, acidose) ou par voie intraveineuse (sclérose, etc...).

Aucune contre-indication.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc. :
22 fr. 45.

Prix spéciaux pour propharmaciens, cabinets médicaux, Hôpitaux et Cliniques.

Échantillons sur demande.

LES LABORATOIRES DRAPIER
RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

IODALOSE GALBRUN

Gouttes titrées renfermant 5 cgr. d'iode par cc.
Première combinaison directe de l'iode avec la
peptone. Communication au XIII^e Congrès inter-
national de médecine de Paris (1900).

Remplace Iode et Iodures dans toutes leurs appli-
cations internes, sans iodisme.

Arthritisme. — Goutte. — Rhumatisme.
— **Artério-sclérose. — Maladies du cœur**
et des vaisseaux. — Affections glandulaires.
— **Rachitisme. — Goitre. — Fibrome. —**
Syphilis. — Obésité.

Pour les adultes : XX à LX gouttes par jour.

Pour les enfants : V à XX gouttes par jour.

Prix de vente au public : 18 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. N^o 33 1.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer — St-MANDÉ (Seine).
(Tél. : Daumesnil 10-38.)

IODAMÉLIS LOGEAIS

GOUTTES

Formule. — Préparation basée sur la combinaison d'iodo-iodure de potassium et d'hamamélidine donnant naissance à un iodotanin complexe, dont le dédoublement lent et progressif permet l'utilisation totale de l'iode ingéré.

Propriétés :

Stimulant de la circulation artérielle et veineuse.

Sclérolisant efficace, vasodilatateur et hypotenseur, eupnéique.

Stimulant des glandes endocrines, du tissu lymphoïde et du métabolisme basal.

Indications :

Maladies de la circulation artério-veineuse : artério-sclérose, hypertension, pléthore des hypervisqueux, cyanose, jambes en poteau, varices, hémorroïdes, etc.

Maladies de la nutrition : lymphatisme, scrofule, adénopathies, obésité, maladie de Basedow, rhumatisme chronique, goutte chronique, asthme, emphyseme, bronchite chronique, etc...

Maladies gynécologiques : troubles de la puberté et de la ménopause, métrites chroniques, etc...

Posologie. — L gouttes d'Iodamélis contiennent : 0,03 d'iode, 0,20 d'iodure de potassium et 0,20 d'hamamélidine.

Doses : De XX à L gouttes par jour aux deux principaux repas, dans un peu d'eau (Vichy de préférence).

Tolérance parfaite. Pas d'iodisme.

Prix : Un flacon (1 mois de traitement) : 21 francs.

IODAMÉLIS COMPRIMÉS

Comprimés glutinisés et enrobés contenant chacun 0 gr. 10 d'iodotanin de l'Iodamélis, sous forme d'un *extrait sec, neutre et sans iode libre*, reproduisant exactement la composition de l'Iodamélis « gouttes ».

Six comprimés équivalent à L gouttes d'Iodamélis.

Prix : l'étui de 50 comprimés : 21 francs.

Doses. — De 2 à 6 comprimés par jour.

(Voir Opo-Iodamélis.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle

Gouttes : n° 602-2.

Comprimés : n° 602-7:

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
 (Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

IODAMOL MICHEL

Composition :

Combinaison d'iode et de glucose titrée de telle façon que V gouttes représentent 1 cgr. d'iode métallique chimiquement pur entièrement combiné au glucose. XX gouttes correspondent à 1 gr. d'alcalin.

Indications :

Tuberculose infantile, lymphatisme, végétations adénoïdes, poussées ganglionnaires, adénopathies trachéo-bronchiques, sclérose artérielle ou veineuse, maladies du cœur et des vaisseaux, arythmies, néphrites chroniques, varices, syphilis acquise ou héréditaire, mycoses cutanées.

Présentation et prix :

Le flacon : 15 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : X à XL gouttes par jour.

Enfants : V à XV gouttes par jour.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 38-31.)

IODARPHOS

Composition. — Combinaison de Glycérophosphate de soude, méthylarsinate de soude. Iodure d'arsenic, chlorure de manganèse en solution.

Forme. — A prendre en gouttes.

Mode d'emploi :

Enfants : II à X gouttes avant les 2 repas.

Adolescents : X à XV gouttes avant les 2 repas.

Adultes : XV à XX gouttes avant les 2 repas.

Propriétés. — Traitement des affections ganglionnaires, Rachitisme, Anémie, Scrofulose, Lymphatisme, Bronchite chronique, Asthme.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments n° 403-46.

Pharmacie LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XI°).

IODARSENIC GUIRAUD OU GOUTTES PAIDOPHILES

du Docteur Guiraud

Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-1.

Formule. — Solution stable au centième (procédé spécial) de triiodure d'arsenic, chimiquement pur, dans l'eau distillée.

Indications. — Tous engorgements ganglionnaires, Lymphatisme Rachitisme, Scrofule, Emphysème, Asthme, Bronchites à répétition, Adénopathie, Trachéo-bronchite, Adénites en général, Kératites phlycténulaires, Affections de la peau (Eczémas, Impetigo, Psoriasis, Urticaire...). Enfin, toutes les fois que la médication iodée ou iodurée est mal supportée.

Posologie. — Enf. de 6 mois à 2 ans II à X gouttes par jour.

— 2 ans à 8 ans IV à XX —

— 8 ans à 15 ans IV à XXX —

Adultes X à XL —

à prendre en se conformant à la notice jointe à chaque flacon, dans un peu d'eau, ou de lait sucré, au moment des deux principaux repas.

Présentation. — Flacon compte-gouttes 35 gr. — Prix : 17 francs.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire de l'IODARSENIC GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Marcadet 37-98.)

IODASCLÉRINE

Combinaison organique d'Iode directement assimilable par voie digestive sans dommage pour l'estomac.

Formule. — Iode 3 — INa, IK, BrNa, chimiquement purs, à à 1 gr. substratum peptoné 94 gr., soit 0,05 par 1 cc.

Champ d'action. — 1^o Affections cardio-vasculaires, aortites, douleurs angineuses, hypertension chronique, artériosclérose, phlébosclérose, hémorroïdes.

2^o Goitre exophtalmique, arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, obésité, maladies de la ménopause, etc.

3^o Lymphatisme, adénopathies, scrofule, etc.

4^o Bronchites chroniques, asthme, emphysème, etc.

5^o Maladies spécifiques, héréditaires et acquises, infections, mycoses, etc.

Dans l'intervalle des médications toni-cardiaques, l'Iodasclérine est le traitement de fond des scléroses vasculaires et viscérales (une seule contre-indication commune à toutes les préparations iodées : l'œdème du poulmon).

Par son action sur les glandes endocrines et la nutrition, l'Iodasclérine est le spécifique de la goutte, de l'obésité, du rhumatisme chronique. Dans le lymphatisme, les affections chroniques des voies respiratoires, dans les vieilles affections syphilitiques et mycosiques, l'Iodasclérine est antiscclérosante, antiseptique et résolutive.

Dose. — Adultes de X à L gouttes dans un peu d'eau au milieu des repas. Enfants de IV à X gouttes suivant l'âge.

Prix : 21 fr. le flacon.

Produits SANOVA

Lab. TACHOT, 103, rue St-Lazare — PARIS (IX^e). (Tél. : Tri. 04-49.)

IODASEPTINE CORTIAL

Composition. — (Iodobenzométhylformine) contenant 42 p. 100 d'iode : soluble dans l'eau, dialysable, injectable, sans réaction locale ou générale. Tolérance sans réserve.

Propriétés thérapeutiques. — Dérivées de la nature de ses composants : iode et antiseptiques (Formol de l'Hexaméthylène tétramine et groupe Phényl des corps benzolés). Antiseptique général des infections chroniques ou parasitaires : Rhumatismes, Tuberculose (jamais d'hémoptysie). Adénopathies, Paludisme, Spirilliose, Puissant tonique du cœur.

Prép. pharm. Posologie. — *Ampoules* : A. 2 cc., B. 5 cc., C., 10 cc., par voie intraveineuse ou intramusculaire indolore.

Rhumatismes chroniques (doses fortes) : 5 à 20 et même 25 cc. *pro die*.

Tuberculose (doses faibles) : 2 à 5 cc.

Gouttes : XXX à C par jour (*enfants* : XX à L).

Prix : *Ampoules* A, 2 cc. : 21 francs. — *Ampoules* B, 5 cc. : 28 fr. 50. — *Ampoules* C, 10 cc. : 42 francs — *Gouttes*, le flacon, 19 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

IODASEPTINE SALICYLÉE

Dans les rhumatismes aigus et subaigus, dans les formes évolutives du rhumatisme chronique, l'*Iodaseptine salicylée* joint à l'effet Iodaseptine l'action salicylée. Supplée le traitement salicylé à haute dose, souvent mal supporté, et qui ne peut être continué longtemps.

Présentation:

Ampoules de 5 et de 10 cc. contenant :

Ampoules de 5 cc.	{	Iodaseptine	5 cc.
		Salicylate de soude pur	0 gr. 50
Ampoules de 10 cc.	{	Iodaseptine	10 cc.
		Salicylate de soude pur.....	1 gramme.

Solution à ingérer : XXX gouttes correspondent à 0 gr. 30 de salicylate de soude.

Doses. — *Injections intraveineuses*, exceptionnellement intramusculaires profondes : 1 à 2 ampoules de 5 ou de 10 cc. par 24 heures (à injecter matin et soir).

En ingestion : L à C gouttes par 24 heures en deux fois au début du repas.

Ce traitement parfaitement toléré peut être prolongé longtemps.

Prix :

Ampoules de 5 cc. : la boîte de 10 ampoules : 30 fr.

Ampoules de 10 cc. : la boîte de 4 et 10 ampoules : 19 et 44 fr.

Solution à ingérer. Le flacon de 60 cc. : 21 fr.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique. — PARIS (Tél. : Suffren 53-70.)

IODASSIUM

Solution iodo-iodurée (Lugol stabilisé).

1 p. 100 d'Iode — 2 p. 100 d'Iodure de Potassium.

Préparé avec iode et iodure de K chimiquement purs; stabilisé en solution spéciale, l'iodassium réduit au minimum les possibilités d'iodisme.

Propriétés thérapeutiques. — Excitant du tissu lymphoïde. Régulateur thyroïdien. Antimycosique. Toutes affections ganglionnaires, adénopathies, lymphatisme, scrofule, etc. Goitre, insuffisance thyroïdienne, troubles circulatoires, obésité, Scléroses viscérales, artério-sclérose, Lichen.

L'iodassium peut être associé au staprolysat pour le traitement vaccino-iodé des affections neurotropes, avec troubles trophiques ou paralytiques dominant.

Posologie :

Adultes : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : X à L gouttes 2 fois par jour.

1 cuillerée à café = LXX gouttes = 0,05 iode; 0,10 KI (Mélanger à l'eau, au vin, au lait et absorber au début des repas.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 535-58.

Prix : 16 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne, PARIS (V°). (Tél. : Odéon 73-92.)

IODAUBÉPINE

Établi sur des bases scientifiques contrôlées par une longue expérimentation chimique, l'iodaubépine constitue à l'heure présente le remède qui donne les résultats les plus heureux dans les maladies dues à l'altération des cellules et des humeurs de l'organisme.

Par sa composition (association du Cratægus et de l'iode combiné avec la peptone), à laquelle sont dues ses propriétés toniques, sédatives et vaso-dilatatrices, l'iodaubépine en même temps qu'il active les échanges de notre économie, en facilite l'élimination des toxines. Son emploi est particulièrement indiqué dans les Maladies du Cœur et des Vaisseaux, l'Artério-Sclérose, l'Angine de Poitrine, l'Asthme et l'Emphysème, la Néphrite interstitielle et l'Obésité, le Goitre et les diverses affections glandulaires.

Doses (sauf avis spécial du Médecin).

Adultes : XX à XXV gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

Enfants : V à X gouttes 3 fois par jour.

(Durée du traitement de l'unité : 15 à 18 jours.)

Dépôt principal :

Laboratoires ADLER

36, r. des Francs-Bourgeois — PARIS — Tél. : Arch. 63-27

Détail dans toutes les pharmacies.

IODE COLLOÏDAL ROZÉ

Composition et présentation. — Dragées dosées à 3 cgr. d'iode colloïdal Rozé.

Avantages. — Équivaut thérapeutiquement à 30 cgr. d'ioduré alcalin, sans en avoir les inconvénients.

Indications. — Scrofule, adénites, adénopathies générales, rachitisme, goitre, goutte, rhumatisme chronique, artériosclérose, arthritisme, obésité, hypertension, asthme, emphysème pulmonaire, bronchites, sclérose du tympan, maladies du fond de l'œil, début de cataracte entérites, fièvre typhoïde, amygdalites, angines, diphtérie, grippe, etc., etc.

Posologie. — 6 à 10 dragées par 24 heures.

Prix : 14 fr. 60.

Trois autres formes :

1° **Pommade à l'Iode Colloïdal Rozé à 10 % :** 13 fr. 50 ;

(en application sur toutes plaies et inflammations ganglionnaires)

2° **Ovules à l'Iode Colloïdal Rozé ou Colloviodes,** renfermant 2 gr. d'Iode Colloïdal par ovule : 18 fr. 75.

3° **Ophthalmiade, pommade au 1/10° :** 13 fr. 50. (Collyre gras).

Laboratoire de Biologie Appliquée

GASTON ROZE

Docteur en Pharmacie

2, allées de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise).

IODÉINE MONTAGU

(Iodhydrate de Codéine).

Propriétés. — Action calmante de la toux, régularisateur du rythme respiratoire, anti-dyspnéique, facilite l'expectoration.

Indications. — Toux, Emphysème, Asthme.

Formes pharmaceutiques :

Sirop. — 0,03 cgr. d'Iodéine par cuillerée à soupe. 19 fr. 50.

Dose : 1 à 3 cuillerées par jour.

Gouttes. — X gouttes = 0,01 cgr. d'Iodéine crist. 19 fr. 50.

Dose : X à XL gouttes, 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Pilules. — 0,01 cgr. d'Iodéine par pilule. 15 fr. 50.

Dose : 4 à 8 pilules par jour.

Ampoules (0,02 cgr.) : 2 à 3 par jour 19 fr. 50.

Laboratoire MONTAGU

10, rue de La Barouillère — PARIS (6°)

(Tél. : Suf. 36-59.)

IODEX

Toutes les propriétés thérapeutiques de l'iode libre, aucun des inconvénients de la teinture d'iode.

Iodex simple.

Pommade renfermant 5 p. 100 d'iode éminemment absorbable. Excellent résolutif exempt d'iodures alcalins et de substances irritantes. Principales indications: adénopathies, oreillons, goîtres, impétigos, trichophyties, furoncles, traumatismes.

Iodex au Salicylate de Méthyle

Iodex combiné à 5 p. 100 de salicylate de méthyle. Analgésique et résolutif. Préconisé dans les douleurs articulaires, rhumatismes, lumbagos, pleurites, points de côté, névrites, entorses.

Iodex liquide.

Formule non irritante d'iode à 2 p. 100 pour la médication externe. Efficacité et sécurité en oto-rhino-laryngologie (pulvérisations ou badigeonnages), en gynécologie (tamponnements vaginaux, instillations intra-utérines), et en chirurgie (pansements des plaies opératoires, brûlures).

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 78-1, 78-2, 78-3.

Laboratoires RISSA

46, rue Claude-Lorrain — LILLE.

IODHÉMA

Iodo - alcoylate - méthyle - benzyle d'hexaméthylène tétramine, en solution aqueuse (43 p. 100 d'iode assimilable).

Indications :

Toutes les formes du rhumatisme chronique.

Formes :

- 1° Ampoules de 5 cc. (18 fr. 70) et de 10 cc. (35 fr. 35), 1 ou 2 par jour (veines et tissus), en boîtes de 10 ;
- 2° Flacons (35 fr. 35) (voie enterale ou digestive), 1 ou 2 cuillerées à café par jour dans de l'eau sucrée entre les repas.

Mêmes présentations pour :

- 1° *Iodhéma M* (Méthyle pur) indiqué dans la goutte aiguë et chronique 16 fr. 65 et (32 fr. 25) ;
- 2° *Iodhéma B* (Benzyle pur) utilisé dans les infections urinaires et hépatiques (23 fr. 90) et (39 fr. 50).

Établissements GALLINA

4, rue Candolle — PARIS (V^e).

IODIFORMINE

Composition. — Solution titrée d'iodométhylate d'hexaméthylène-tétramine (42 p. 100 d'iode).

Indications. — Antiseptique général des infections chroniques et parasitaires. Toutes les indications de l'iode. Rhumatismes. Sciatiques. Adénopathies. Troubles circulatoires.

Préparations pharmaceutiques :

- Ampoules de 5 cc. (Boîte de 10 amp.).
- Ampoules de 10 cc. (Boîte de 10 amp.).
- Gouttes.

Posologie :

Ampoules : Par voie intramusculaire ou intra-veineuse, 1 injection tous les jours ou tous les 2 jours.

Gouttes : De L à C gouttes par jour en 2 fois.

Prix : 19 francs.

Laboratoires HENRI FRILLEY

94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

IODINJECTOL JAMMES

Médication iodée Intensive Indolore.

Composition. — Iodure de formine benzo-sodique : 20 cgs. par ampoule de 3 cc.

Indications. — Celles de l'iode et des iodures.

IODINJECTOL salicylé (Iodinjectol + 20 cgs. de salicylate de soude).

Action rapide et énergique sur les crises aiguës de tous rhumatismes. Sciatiques.

Une injection intramusculaire ou intraveineuse par jour.

IODINJECTOL gouttes : LX à C gouttes par jour.

Prix au public :

Ampoules : 26 francs. Gouttes : 18 fr. 70
N° d'enreg. 603-2 (Iodinjectol) ; N° d'enreg. 603-3
(Iodinjectol salicylé).

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 51-85.)

IDO-BISMUTHATE DE QUININE FRAISSE

Composition :

Iodo-Bismuthate de Quinine.....	0 gr. 20
Huile d'olive	4 cc.

Indications. — Toutes les formes de la Syphilis.

Forme. — En ampoules de 4 cc. (boîte de 6 ampoules).

Posologie. — 1 ampoule tous les 3 jours dans le tissu musculaire.

Prix : Boîte de 6 ampoules : 19 fr. 90 (18 à 20 jours de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-3.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

IODOCAINE

Traitement des douleurs de toutes natures par les injections anesthésiantes locales.

Composition. — Chlorhydrate d'éthocaïne (novocaïne), 0,05 cgr., Caféine, 0,05, Iodure de sodium, 0,10, Sérum physiologique, 10cc.

Indications. — Rhumatisme chronique, névralgies, sciatique, lumbago, douleurs musculaires, cellulite, etc.

Technique. — Injecter tous les deux jours une ou deux ampoules au point maximum de la douleur repéré par la palpation.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

VINCENT, Pharmacien

14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

IODOCALCIUM

La forme moderne du Sirop Iodotannique.

2 formes : Sirop, Gouttes.

Composition. — Une cuill. à café d'Iodocalcium Sirop ou XX gouttes Iodocalcium Gouttes renferment :

<i>Gluconate de calcium</i>	0 gr. 10
<i>Chlorure de calcium</i>	0 gr. 10
<i>Iode en combinaison organique</i>	0 gr. 01

Indications. — Toutes celles de l'iode et du calcium. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, pré tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

Posologie :

Enfants au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café de sirop ou X à XX gouttes de la forme gouttes, 2 fois par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert de sirop ou XX à XL gouttes 2 fois par jour, au début des deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Les gouttes doivent être prises dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — Paris (XIV^e).

IODOCITRANE

Nouveau corps original

IODE — ALBUMINE

Associé au CITRATE DE SOUDE.

Tolérance parfaite du tube digestif.

Aucun accident d'iodisme.

Protection contre toute oxydation du produit depuis la préparation jusqu'à sa désintégration dans l'intestin.

Indications thérapeutiques. — *Hypertension artérielle, Artériosclérose, Hyperviscosité sanguine, Troubles artériels et veineux, Varices, Hémorroïdes, Congestions de la Ménopause, Rhumatismes, Obésité. Maladies de l'appareil respiratoire : Sclérose pulmonaire, Emphysème, Etats congestifs.*

Formes. — Pilules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin. Chaque pilule correspond à VIII gouttes de teinture d'iode et contient 0 gr. 10 de citrate de soude.

Posologie. — Dose moyenne : 2 pilules à avaler au début des repas 2 à 3 fois par jour.

Prix. — La boîte de 80 pilules : 16 fr. (traitement de 20 jours). La triple boîte de 240 pilules : 42 fr.

Laboratoire des PRODUITS SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, Pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. Trinité 29-29.)

IODOCITROL

Médicament unique par sa composition et son dosage, d'efficacité certaine dans toutes les maladies de la circulation.

COMPOSITION. — Triple association d'iode organique, de citrate monosodique (obtenu en partant du jus de citron frais) et d'extrait d'hamamélis (de la plante fraîche stabilisée).

INDICATIONS. — Tous les troubles circulatoires, hyperviscosité sanguine, hypertension, vertiges, scléroses. Rhumatisme chronique, obésité, pléthore et intoxications. **L'Iodocitrol maintient jeune.** Aucune contre-indication.

PRÉSENTATION. — Forme liquide et forme comprimés.

Liquide. — Une cuillerée à café par jour, au repas de midi seulement, dans un demi-verre d'eau sucrée (0 gr. 20 d'iode ; 1 gr. Citr. de Na ; 0 gr. 10 Extrait hamamélis par cuillerée à café).

Comprimés. — 4 à 6 par jour, en deux fois, aux repas de midi et du soir (0 gr. 02 d'iode ; 0 gr. 10 Citr. de Na ; 0 gr. 025 Extrait hamamélis par comprimé).

Prix de vente, liquide ou comprimés : 21 fr. 40.

Le liquide ou les comprimés permettent un traitement de 20 jours.

Laboratoires CODY

BRIVE-LA-GAILLARDE (Corrèze).

(Tél. 31.)

IODOGÉNOL PÉPIN

Peptone iodée spéciale.

Remplace Iode et Iodures sans Iodisme.

Propriétés. — Très grande proportion d'iode substitué (25 %) :

Absence d'acide iodhydrique libre.

Grande stabilité des iodures organiques.

Saveur agréable. Tolérance absolue.

Indications. — Artériosclérose. Hypertension. Arthritisme, etc...

Posologie. — XL à LX gouttes par jour, en deux fois, dans un peu d'eau, au début des deux principaux repas.

L. N. C. M. n° 43-5.

Laboratoires PÉPIN ET LEBOUÇQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 09-71.)

IODOLIPINE

Traitement de fond de l'hypertension artérielle.

Forme. — Capsules d'huile iodée composée.

Composition :

Iode pur combiné à l'huile	0,09
Diméthylxanthine	0,10
Extrait de gui	0,05
Extrait de bardane	0,05

Pour une capsule.

Propriétés. — Vaso-dilatateur, vaso-trophique et antiscleureux. Diurétique. Hypotenseur.

Indications. — Présclérose, Aortites, Artérites, Artériosclérose, Traitement préventif des scléroses viscérales : Myocardite chronique, Angine de poitrine, Sclérose rénale, Sclérose cérébrale.

Posologie. — 1 capsule 2 à 3 fois par jour au moment des repas, pendant 10 jours par mois.

Prix : 22 fr. 45 le tube.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

iodo-magnésium

Du D^r J.-P. CLARY.

Composition. — MgI^2 chimiquement pur, complètement et définitivement stabilisé par un procédé nouveau.

Indications. — Toutes celles des composés iodurés halogénés et iodés organiques. Plus actif et mieux toléré. Toutes celles du magnésium, dont l'importance thérapeutique grandit tous les jours.

Posologie. — X à XXX gouttes, suivant avis du médecin, dans un peu d'eau, avant les deux principaux repas, 10 jours consécutifs par mois.

Le flacon : 18 francs.

Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS.

IODOMAÏSINE

Globules.

Combinaison directe de l'Iode et d'une *Albumine d'origine strictement végétale*.

Propriétés particulières. — Absence d'albumoses ou de peptones d'origine animale. Aucune toxicité. Tolérance absolue même à hautes doses. Suppression complète de l'iodisme. Aucune désagrégation dans l'estomac. Action directe par solubilité uniquement intestinale.

Indications. — Maladies infectieuses, tuberculose, affections parasitaires, syphilis, affections cardio-vasculaires, artériosclérose, arthritisme, obésité, carence organique d'iode, tumeurs, insuffisance thyroïdienne, goîtres, asthme, emphysème, engorgements ganglionnaires, lymphatisme, rhumatisme, goutte. Puissant adjuvant des médications reminéralisantes et endocriniennes.

Posologie. — Quatre globules correspondent comme effet thérapeutique à un gramme d'iodure alcalin. *Enfants* : 4 à 6 globules par jour. *Adultes* : 6 à 10 globules et au delà par jour en deux fois avant les repas.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 10 à 15 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-3.

IODOMAÏSINE

Pommade.

Iodomaisine incorporée à un excipient spécial totalement exempt de vaseline ou de lanoline inabsorbables.

Propriétés particulières. — Pénétration intradermique complète. Teneur élevée en principe iodé actif. Absence de toxicité. Suppression de l'iodisme et de l'irritation locale. Efficacité 15 à 20 fois plus grande qu'une pommade iodée ou iodurée au même titre. Aucune coloration des téguments.

Indications. — Adénites, engorgements glandulaires, goîtres, sporothricoses, arthrites, lymphangites, ostéites, dermatoses sèches, eczémas secs, psoriasis, affections rhino-pharyngiennes. Toutes affections justiciables d'un traitement iodé ou ioduré local.

Mode d'emploi. — Frictions (ou onctions) matin et soir sur la région choisie pendant deux ou trois minutes jusqu'à absorption complète. Aucun pansement consécutif.

L'*Iodomaisine pommade* est présentée en tube. Une section de deux centimètres de longueur sortant du tube correspond à un centigramme d'iode complètement assimilable.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National N° 218-4.

IODONE ROBIN

Combinaison physiologique d'iode et de peptone trypsique.

Gouttes : XX gouttes correspondent comme effet thérapeutique à 1 gr. d'iodure de potassium.

Comprimés : 1 correspond à X gouttes d'Iodure.

Doses et mode d'emploi. — X à C gouttes à prendre en 2 fois aux repas dans un peu de boisson. Comprimés : 2 à 10 par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Dépuratif, reconstituant assimilable, non toxique, tolérance parfaite, jamais d'iodisme.

Indications. — Maladies par ralentissement de la nutrition, artériosclérose, obésité, polysarcie, dégénérescence graisseuse, intoxications chroniques, asthme, emphyseme, rhumatisme, arthritisme, goutte, tertiarisme, prétuberculose.

Prix : Gouttes 19 fr. 15. Comprimés : 18 fr. 05.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

IODONESYL

(Gouttes)

Complexe organo-iodo-magnésien.

Formule. — 10 p. 100 Iode métalloïdique dynamisé par la présence de réducteurs hydrocarbonés et du magnésium.

Action. — L'iode sous cette forme élective, administrée à dose élevée sans iodisme, stimule l'activité du tissu lymphoïde, réalise l'atténuation directe *in vivo* des toxines microbiennes.

Son action est alors analogue à celle d'un vaccin d'une valence strictement adéquate. Résultats cliniques surprenants.

Indications. — Toutes les indications de l'iode, en particulier *infections aiguës*, Grippe, Angines, Pneumonie, Phlegmon de la gorge, Rhumatismes, Dermatoses.

Pesologie. — Doses d'attaque pour infections aiguës : deux cuillerées à café à 2 heures l'une de l'autre, puis XXX gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée.

Prix : 21 fr. 20.

Laboratoires REVEL

34, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 13-38)

IODONUCLÉOL

Iode organique soluble (orthoïodobenzoate de soude).

Forme. — Gouttes.

Odeur et saveur agréables. Pas de manifestations d'iodisme.

Indications. — Hypertension, Artériosclérose, Emphysème, Asthme, Obésité, Adénites, etc.

Doses. — XX gouttes avant chaque repas dans un peu d'eau, 2 ou 3 fois par jour.

Prix : 15 fr. 25.

Laboratoire MAUCHANT

à GENNEVILLIERS (Seine)

(Tél. : Grésillons 05-21.)

IODOPAN (GOUTTES)

(Procédé Silvo)

Admis dans les Hôpitaux de Paris

Composition. — Nouvelle combinaison de l'iode avec une peptone spéciale.

L'iode n'est libéré que dans l'intestin, d'où impossibilité absolue de troubles gastriques et d'iodisme.

Indications. — Toutes les indications de l'iode et des iodures.

Doses. — XX gouttes agissent comme 1 gr. d'iodure alcalin.

Enfants : V à XV gouttes par 24 heures après les repas.

Adultes : XX à LX gouttes et plus après les repas.

Prix : 17 fr. 70 pour 1 mois de traitement.

Dépôt chez tous les Grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien.

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

IODORGANINE MERCIER

Enregistrée au Laboratoire National du Contrôle des Médicaments sous les numéros 1051-4-1 et 1052-4-2.

IODORGANINE formule n° 1

Traitement. — 6 boîtes.

Prix. — La boîte pour 11 jours de traitement : 18 fr. 50.

La boîte pour 66 jours de traitement : 92 fr. 50.

IODORGANINE formule n° 2.

Traitement. — 6 boîtes.

Prix. — La boîte pour 11 jours de traitement : 27 fr. 50.

Laboratoires MERCIER

41, route de Turin — NICE.

IODOSTEM

Résolutif énergique

Association de l'iode métalloïdique et du tanin aux éléments salins et hydro-carbonés du jus de raisin frais concentré.

Composition :

Jus de raisin frais	49,50
Iode métalloïdique.....	0,10
Tanin	0,90
Sucre.....	45,00
Solution glycinée	4,50
pour 100 grammes.	

Avantages. — Combinaison iodée de haute stabilité qui bénéficie à la fois des propriétés toni-musculaires du tanin, des propriétés diurétiques du jus de raisin et du pouvoir dissimulateur de ces deux éléments à l'égard de l'iode. Tolérance parfaite du tube digestif. Pas d'iodisme. Pas de constipation. Saveur agréable.

Indications. — Tous les cas de lymphatisme, Goitre, Affections glandulaires, Rachitisme, Scrofuleuse, Bronchite aiguë et chronique. Écoulements d'oreilles, Végétations adénoïdes, Hypertrophie des amygdales, Asthme, Emphysème.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants au-dessus de 10 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; au-dessous de 10 ans : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

(De préférence au moment des repas, pur ou dans un peu d'eau.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 537-2.

G. BRIENS, Docteur en pharmacie

20 et 22, rue de la République. — LYON (Rhône).

IODOSULFÈNE

Iodosulfothérapie à haute dose.

Composition : 21,4 p. 100 d'Iode.

22,4 p. 100 de Soufre.

38,6 p. 100 de Strontium.

Indications. — *Rhumatismes* : Scléroses viscérales, articulaires, artérielles. Tous états douloureux d'origine musculaire ou nerveuse. Hypertension. Adjuvant au traitement des syndromes *douloureux* par le stagnolysat.

Présentation. — *Pilules* glutinisées sphériques et *ampoules* de 3 cc. en injections *intramusculaires*, indolores, bien tolérées.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour.

2 à 3 ampoules par semaine.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 535-47.

Prix : 60 pilules : 18 fr. ; 10 ampoules : 27 fr.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne, 22 — PARIS (V^e).

IODOTENSYL DUBOIS

Dragées.

Composition. — Pour une dragée :

Di-iodhydrate de Spartéine	5 cgr.
Benzoate de Benzyle	10 —
Extrait de Bourdaine	3 —
Excipient	10 —

Indications. — Hypertension, Artério-sclérose, Asthme, Angine de poitrine et Spasmes divers.

Troubles fonctionnels de l'âge critique chez les deux sexes.

Forme. — Dragées.

Posologie.

Adultes : 3 à 5 dragées par jour, de préférence avant les repas.

Enfants : 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

Durée de traitement : 10 jours.

Prix : 17 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-7.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

16, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Car. 45-62.)

iodo-THYROÏDINE CATILLON

Forme. — Tablettes de Catillon à 0,25 de Corps Thyroïde, titré, stérilisé.

Indications. — Obésité, Goitre, Myxœdème, Dermatoses.

Doses. — 1 à 2 contre Myxœdème ; 2 à 8 contre Obésité, Goitre, Herpétisme, Ostéogénèse.

Le flacon de 45 comprimés.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin, PARIS (III^e).

iodoveine LEDUC

(Gouttes.)

Composition. — L'*Iodoveine Leduc* est une combinaison stable et concentrée. Un centimètre cube représente : 0,015 milligrammes d'Iode ; 0,020 milligrammes d'Extrait Fluide d'*Hydrastis* ; 0,30 centigrammes d'Extrait Fluide d'*Hamamelis* ; 0,12 centigrammes d'Extrait Fluide de Marron d'Inde ; 0,12 centigrammes d'Extrait Fluide de *Viburnum*.

Combinaison stable de l'iode métalloïdique aux vasoconstricteurs classiques : *hamamelis*, *marron d'inde*, *viburnum*, *hydrastis*

Formule classique mais remarquablement complète. L'extrait fluide d'*hydrastis*, le plus actif de ces extraits végétaux, et qui fait cependant défaut dans beaucoup de préparations similaires, s'y trouve stabilisé par un procédé spécial minutieusement mis au point.

Indications. — Les gouttes d'*Iodoveine Leduc* luttent avec efficacité contre toutes les affections des veines : Varices, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Phlébites.

L'*Iodoveine* est aussi un véritable trésor thérapeutique contre les troubles de la circulation et notamment au moment de la ménopause.

Posologie. — V gouttes à midi et V le soir au début du repas. Augmenter de II gouttes par repas pour arriver à L gouttes par jour. Diminuer ensuite pour arriver insensiblement à V gouttes par repas.

Formule du professeur SICARD

L. CASTERAN, Pharmacien,
152, Côte-Pavée — TOULOUSE.

IODULANE

(Anc^t Iode Tulasne).

Iode organique en pilules

Nouvelle préparation stable et inaltérable contenant une forte proportion d'iode actif libéré seulement dans l'intestin et permettant un traitement iodé actif et prolongé sans le moindre symptôme d'intolérance ni la moindre fatigue.

Formule. — Chaque pilule contient 2 cgr. 1/2 d'iode métalloïdique entièrement assimilable. Une pilule = 20 gouttes de teinture d'iode.

Avantages. — Les pilules d'*Iodulane* glutinisées ne sont dissoutes que dans l'intestin, d'où protection de l'estomac et efficacité supérieure. La combinaison très stable ne libère l'iode que lentement dans l'organisme, évitant ainsi tout accident d'iodisme.

Indications. — Toutes celles de l'iode et des iodures : ARTERIO-SCLEROSE, HYPERTENSION, EMPHYÈME, LYMPHATISME, GOUTTE, RHUMATISME, OBÉSITÉ, BASEDOW, SYPHILIS, TUBERCULOSE, etc...

N. B. — L'*Iodulane* s'est montré particulièrement actif dans les *Troubles de la Cinquantaine* et l'*Obésité*. Traitement facilité par la forme pilulaire.

Doses moyennes. — De 2 à 6 pilules par jour, au début des repas. Pour les enfants 1/2 doses.

Prix. Le tube : 15 francs.

Laboratoires BOUILLET

48, boulevard des Batignolles — PARIS. (Tél. : Marcadet 82-01.)

IODURASE

Description. — Capsules glutinisées contenant :

Iodure de potassium pur..... 0 gr. 50

Levurine extractive 0 gr. 10

Par flacons de 36 capsules.

Action thérapeutique. — La même que celle de l'iodure, mais sans iodisme, grâce à l'action spécifique de la levurine et à l'enrobage qui ne libère l'iodure que dans le milieu alcalin de l'intestin. Dosage rigoureux, conservation indéfinie et facilité d'absorption.

Indications. — 1 à 6 capsules par jour dans l'artériosclérose, l'asthme, l'emphyème, l'arthritisme, la syphilis, le goitre, l'obésité, le saturnisme.

Prix : 34 fr. 30 pour 6 à 36 jours de traitement.

Laboratoires Oh. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

IODURE D'AMIDON LUMIÈRE

Antiseptique énergique dépourvu de toute action irritante et de toute toxicité.

Propriétés. — Pouvoir antiseptique élevé, réalise une antiseptie douce et continue, due à sa faculté de dégager lentement, au contact des sécrétions humérales, de l'iode à l'état naissant.

Infections gastro-intestinales (Dyspepsies, Entérites, Entéro-Colites, Flatulences, Diarrhées, Dysenterie). Traitement iodé.

Formule. — 1 flacon pilules Iodure d'amidon Lumière.

Dose. — *Adultes* : 6 à 12 pilules par jour.

Usages externes. — *Pansements et chirurgie* : La Pâte et la Poudre possèdent un pouvoir antiseptique prolongé, par dégagement lent de l'iode à l'état naissant.

Pansement Lumière : L'usage combiné de l'Iodure d'Amidon Lumière (pâte et poudre) et *Tulle gras* Lumière constitue un pansement dit Pansement Lumière, adopté par beaucoup de chirurgiens, l'Iodure d'Amidon Lumière entretient un état prolongé d'antiseptie. On obtient ainsi des cicatrisations d'une rapidité surprenante.

Formuler. — 1 tube de Pâte Iodure d'Amidon Lumière. 1 flacon de Poudre Iodure d'Amidon Lumière.

LABORATOIRES LUMIÈRE

45, rue Villon — LYON.

IODURES CROS

Chimiquement purs.

En pilules solubles dans l'intestin.

Trois formes :

Iodure de potassium (pilules à 0 gr. 25 de KI pur).

Iodure de sodium (pilules à 0 gr. 25 de NaI pur).

Bi-iodure (pilules à 0 gr. 20 de KI pur associé à 0 gr. 005 de HgI²).

Indications. — *Toutes celles de l'iode et des iodures* : Artériosclérose, Accidents spécifiques primaires, secondaires et tertiaires, Emphyseme, Goutte, Hypertension, Lymphatisme, Maladie de Basedow, Obésité, Rhumatismes, Troubles circulatoires.

Avantages. — Grâce à l'enrobage spécial CROS, l'iodure conserve jusqu'à l'intestin son intégrité moléculaire. Traitement facilité par la forme pilulaire. Pas de gastrite médicamenteuse, pas d'iodisme.

Posologie. — 2 à 8 pilules et plus par jour pour l'iodure de potassium et de sodium. Moitié de ces doses pour le bi-iodure. (A prendre au milieu des repas.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 199-1, 2, 3.

Laboratoire des IODURES CROS

G. BROCHON, Pharmacien,

202 bis, avenue Jean-Jaurès — CLAMART (Seine).

(Tél. : Mic. 00-62.)

IODURES PACHAUT

chimiquement purs

Tubes dosés d'Iodure de potassium ou de sodium à faire dissoudre au moment de l'emploi. Conservation parfaite. Absolument sans iodates, et par conséquent sans iodisme.

Présentation. — Tubes dosés à 0 gr. 25, 0 gr. 50, 1 gr., 2 gr. et 3 gr. d'iodure de potassium ou de sodium.

Prix : La boîte de 20 tubes à 0 gr. 25 : 13 fr. ; à 0 gr. 50 : 18 fr. 20 ; à 1 gr. et 2 gr. : 26 fr. ; à 3 gr. : 39 francs.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

IOGLOTT

Comprimés violets et blancs dégageant 3 mgr. d'Iode Naissant par couple de comprimés.

Indications. — Angines, Asepsie pré et post-opératoire, Prophylaxie des maladies épidémiques. Avulsions dentaires septiques. Gastrites infectieuses. Lymphatisme.

Mode d'emploi. — Mettre dans la bouche, 4 à 5 fois par jour et le soir au coucher, un comprimé violet et un comprimé blanc et laisser fondre lentement.

La boîte pour 15 jours de traitement : 10 fr. 15.
Adresse télégr. : Gaipharmcy, Alger.

Enregistré au L. N. C. N° 1113-1.

CHARLES ROCHE, * * * , Pharmacien

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Lyon, Ex-pharmacien major de l'armée; Ex-chef de travaux de chimie,
2, rue Michelet — ALGER.

Tél. : 348-00.

Dépôt général : Office Commercial
Pharmaceutique, Paris.

IOGUINE DELBA

Médication hypotensive.

Composition. — Combinaison d'iode avec la peptone et l'extrait de Gui d'Aubépine stabilisé.

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de l'Hypertension et de l'Artériosclérose chez tous les sujets et à tous les stades de la maladie.

Tolérance parfaite et sans mauvais goût.
Pas d'Iodisme.

Posologie. — XX gouttes avant les repas, avec de l'eau.

Prix : 17 fr. 50 le flacon pour un traitement d'un mois.

Laboratoire de l'Ioguine DELBA
F. DELCAMBRE

ISSOUDUN — (Indre.) Tél. 109.
Enregistré au L. N. C. sous le n° 1181.1.

IONYL

Médication bio-énergétique complète.

Composition. — Complexes phospho-marins, Acide phosphorique physiologique, Magnésium et Manganèse glycéro-phosphoriques activés et vitalisés par solution et combinaison en milieu marin.

Action thérapeutique et indications :

- 1° Stimulant, réparateur et neurotonique (Surmenage physique et intellectuel, Asthénies, Dépressions fonctionnelles, Usure sénile).
- 2° Oxydant et modificateur de la nutrition (Troubles alcalosiques, Arthritisme, Phosphaturie, Scléroses, Anoxémie).

Action immédiate. — Innocuité absolue.

Posologie. — XX gouttes (dose moyenne) au milieu des deux principaux repas, en dilution dans un verre de boisson quelconque.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires " LA BIOMARINE "
DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

IO-SALYL

Dragées glutinisées, contenant 0 gr. 45 de salicylate de soude et 0 gr. 05 d'iodure de potassium purs.

Dissociées et assimilées seulement dans le milieu intestinal. Aucune action sur la muqueuse gastrique. L'association de l'iodure, en petite quantité, et du salicylate donne à cette formule le maximum d'activité.

Indications. — *Toutes les diathèses rhumatismales.*

Posologie. — Celle du salicylate, en tenant compte que chaque dragée contient 0 gr. 50 de produits actifs.

Mode d'emploi. — Avaler les dragées sans les briser, par une ou par deux, avec un 1/2 verre d'eau, ou mieux de tisane diurétique.

Prix : 18 fr. 50 la boîte de 44 dragées.

Enregistré aux Lab. Nat. Cont. sous le n° 955-2.

Laboratoires du NÉVRALGOL

E. CORNAUD, Pharmacien — LA ROCHELLE.
Anc. Pharmacien-Chimiste en chef de la Marine.

IPALCAL

Propriétés. — Médication alcaline polyvalente. S'emploie avec succès dans les différentes manifestations de l'insuffisance hépatique de l'enfant et de l'adulte.

Indications. — Nausées, constipation, migraines, vertiges, céphalées, urticaires, troubles digestifs, perte d'appétit et, en résumé, tous les troubles consécutifs à une déficience hépatique plus ou moins accusée.

Présentation. — En boîte de 30 paquets.

Composition :

Ipéca pulvérisé	0,01	Citrate de soude.....	0,10
Benzoate de soude.....	0,10	Sulfate de soude anhydre....	0,20
Bicarbonate de soude...	0,10	Phosphate de soude anhydre.	0,30

Mode d'emploi. — Suivant les indications du médecin. En général pendant 10 à 15 jours.

Enfants : 1 paquet le matin à jeun dans un verre à bordeaux d'eau tiède un quart d'heure avant le premier déjeuner.

Adultes : 1 à 2 paquets.

Prix : 12 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1761-1.

Laboratoire de l'IPALCAL

6, avenue des Docteurs-Foix — SALIES-DE-BÉARN (Basses-Pyrénées)
(Tél. : 87.)

IPÉCOPAN

Association des alcaloïdes actifs de l'Ipécacuanha et des Alcaloïdes actifs de l'opium à l'état pur et en proportion constante.

N'est pas au tableau B.

Propriétés. — Sédatif de la toux et expectorant.

Indications. — Traitement de la Toux et des phénomènes congestifs et sécrétoires au cours des affections trachéo-bronchiques : Rhumes, Trachéites, Bronchites, Grippe, Refroidissements, Toux des tuberculeux.

Formes et posologie :

Dragées : 1 dragée toutes les deux heures ou 2 dragées trois à quatre fois par jour.

Gouttes : XXX, 2 à 4 fois par jour.

Enfants : 1 goutte par année d'âge, 3 fois par jour.

Sirop : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : 1/2 à 3 cuillerées à café par jour, selon l'âge.

L'Ipécopan ne se prend pas à jeun.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

IRÉLINE GONNON

Composition. — Cachets dosés à 0 gr. 71, à savoir : 0 gr. 53 d'Iréline proprement dit (combinaison fixe cristallisable de pyramidon, analgésine, phénacétine), 0 gr. 13 de sulfate de quinine, 0 gr. 05 de caféine.

Indications. — Spécifique des douleurs violentes et rebelles, névralgies, maux de tête, rages de dents, migraines, crises de rhumatisme, fièvres, grippe, influenza, douleurs périodiques, accès de goutte, etc...

Posologie. — 1, 2 ou 3 cachets par jour.

Toujours toléré par l'estomac, pas de vertiges.

(Pour 8 jours de traitement environ.)

Prix public : 10 fr. 50.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

IRRASTÉRINE

Vitamine D. cristallisée.

Adoptée par les Hôpitaux.

Solution — Chocolatés.

Composition. — Vitamine D. cristallisée, en solution dans l'huile d'olive, sans aucune addition de cholestérine.

Propriétés thérapeutiques. — Véritable catalyseur du calcium et du phosphore, l'Irrastérine peut être considérée comme la médication spécifique du rachitisme et de tous les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Indications. — Traitement spécifique du rachitisme, de la tétanie et de tous les états spasmophiles. Troubles de l'ossification, Caries dentaires, Ostéomalacie, Pré-tuberculose et tous états de déminéralisation.

Dose et mode d'emplol. — *Solution huileuse* (0 milligr. 5 de vitamine D cristallisée par cc.) Jusqu'à un an : X gouttes ; de 1 à 10 ans : XX gouttes ; *adolescents, adultes* : XXX gouttes.

Chocolatés (1 chocolat = 0 milligr. 1 de vitamine D cristallisée) : 1 à 3 par jour.

Prix : *Solution* : 19 fr. 10. — *Chocolatés* : 21 fr. 20.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV^e). (Danton 08-11.)

ISCAUTOXÈNE GRANULÉ ÉON

Auto-défense. Désintoxication.

Composition. — Soufre purifié lavé et hyposulfite de Mg. Extraits d'Iris versicolor, de Boldo, de Romarin. Alcalins classiques (Citrates, Bicarbonate et Sulfate de Na).

Propriétés. — Stimulant tonique de la fonction hépato-digestive et protéopexique. Destruction des poisons intestinaux. Neutralise les putréfactions acides. Assure et augmente la réserve alcaline. Agit par réveil ou renforcement de mécanismes défensifs naturels.

Indications. — Traitement des **Insuffisances hépatiques**, des **Auto-intoxications** et de leurs conséquences.

Dyspepsie, Subictère, Langue chargée ou gercée, Cholémie, Séquelles d'affections coloniales, Lassitude hépatique, *Nausées, Fermentations intestinales*, etc..., Arthritisme.

Toutes auto-intoxications. Vertiges, Migraines, Troubles visuels. Toutes **Dermatoses** dites **Réactions cutanées** en rapport avec un système hépato-digestif insuffisant ou surmené : **Acné, Eczémas, Erythèmes, Herpès, Prurits, Urticaires, Furunculose**, etc...

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café, 1/2 heure avant les repas. Demi-dose pour les enfants.

Prix : 20 fr. 40 (taxe armement comprise)

Laboratoire ÉON, à DINAN.

Enregistré au L. N. C. M.

ISOGEV

Antiseptique des muqueuses de la bouche et du pharynx.

Forme. — Poudre soluble en sachets.

Composition. — Acétylamino-oxyphényl-arsinate de Na, Cuivre colloïdal, Borate de soude.

Indications. — Gingivites, Stomatites, Pyorrhées, Maux de gorge, Pharyngites, et Angines.

Mode d'emploi. — 1 sachet par verre d'eau bouillie chaude en bains de bouche ou gargarismes : 4 à 5 fois par jour.

Prix :

Grand modèle..... 18 fr.

Petit modèle 10 fr.

Laboratoires GEV

26, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 32-88.)

ISONAL

N-Méthyl-Ethyl-Phényl-Malonylurée.

Barbiturique sans aucune toxicité. Convient à tous les nerveux, n'entrave en rien la capacité de travail.

Indications. — Dépression nerveuse. Etats anxieux. Angoisse et palpitations. Insomnie. Surmenage. Nervosisme. Névroses et troubles convulsifs.

Présentations :

Tube de 20 comprimés titrés à 0,10

Tube de 30 comprimés titrés à 0,05

Tube de 60 comprimés titrés à 0,01

Prix au public : 9 fr. 30.

Boîte de 6 ampoules titrées à 0 gr. 10 (voie intramusculaire).

Prix au public : 21 fr. 20.

Posologie. — Dans les cas d'éréthisme nerveux : administrer 10 à 20 cgr. par jour, en 8 ou 10 prises.

Chez les enfants : 2 cgr. par année d'âge, en doses réfractées.

Chez les nourrissons, la dose quotidienne correspond à 0 gr. 01 par semestre d'âge.

Dans les troubles convulsifs des adultes et l'épilepsie, le traitement d'attaque nécessite des doses importantes variant de 0 gr. 30 à 0 gr. 80 par jour. Pour le traitement d'entretien, on pourra les réduire en les répartissant en plusieurs prises.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e). (Tél. : Littré 58-43.)

ISORGANE LAURIAT

AIL

Cachets de 0,25.

Dose normale. — 1 cachet 2 ou 3 fois par jour.

Indications. — Traitement de l'Hypertension, des Rhumatismes, des Vers intestinaux, des Bronchites fétides, etc...

Boîte de 20 cachets. Public : 35 francs.

(Voir à Opothérapie Lauriat.)

Laboratoires LAURIAT

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél. : Charlebourg 23-78.)

ISO-SELS

Granulés effervescents.

(Remplaçant les anciens comprimés solubles.)

Médication *alcalino-sodique* du type Bourget, renforcée par les *chlorures de magnésium* et d'*ammonium*.

Propriétés. — Stimulent les sécrétions du foie. Corrigent les dyspepsies hypo- et hypersthéniques. Combattent les fermentations entérocoliques. Assurent l'équilibre acido-basique des humeurs.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire. Gastrite chronique. Fermentation intestinale. Colibacillose. Migraines. Asthénie. Dermatoses d'origine digestive, Insuffisance digestive. Déséquilibre acido-basique.

Posologie. — *Adultes*: 1 à 3 cuillerées à café ou 1 à 3 comprimés 1 à 3 fois par jour, à jeun, au coucher, ou au cours de la journée dans un peu d'eau de préférence minérale (Châtel-Guyon, Evian, Vittel, suivant les cas).

Enfants et Nourrissons: 1/4 ou 1/2 dose dans un peu d'eau sucrée ou dans le biberon.

Durée de la cure : 15 à 20 jours consécutifs.

Spécialité légale de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien ex-interne des hôpitaux de Paris,
8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e). (Tél. : Etoile 09-63.)

ISOTANIN

Composition. — L'*Isotantin* est une solution aqueuse de Tanin spécialement purifié et stabilisé, additionnée de Chlorure de Sodium et présentée en ampoules stérilisées.

Indications. — Traitement des brûlures par tannage.

Cette méthode a pour avantages de diminuer la gravité de la brûlure par neutralisation des poisons formés à sa surface, de réaliser une protection complète de la plaie, de supprimer la douleur et de provoquer une cicatrisation très rapide.

L'*Isotantin* est également présenté sous la dénomination *Isotantin « G »*, en association avec un antiseptique, le Violet de Gentiane, pour brûlures profondes et très souillées.

Mode d'emploi. — L'*Isotantin* et l'*Isotantin « G »* s'emploient en pansements ou pulvérisations après dilution dans l'eau bouillie. Les solutions initiales ayant une concentration de 25 % pourront être amenées ainsi à 15, 5, 2 % suivant les nécessités.

Présentation. — *Isotantin* ou *Isotantin « G »* : Boîte 1 ampoule de 10 cc. Boîte 5 ampoules de 10 cc.

Enregistré au L N C M sous les numéros :

Isotantin 590-30. *Isotantin « G »* 590-31.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 44-59.)

ISOTONYL BOURET

(Poudre de Lausanne.)

Action. — L'Estomac dilue ou concentre son contenu de façon à lui faire atteindre toujours le point cryoscopique de 0,38 nécessaire pour que le chyme franchisse le pylore.

L'*Isotonyl Bouret* aide l'estomac à remplir cette condition. Il stimule la fonction sécrétrice des glandes gastriques, neutralise le suc gastrique hyperacide, assure l'évacuation gastrique.

Formes et mode d'emploi.

Paquets, 1 pour 1 litre. Discoïdes, 2 pour 1 verre.

Adultes : 1 à 3 verres par jour.

Enfants : 1/2 verre à 2 verres à bordeaux par jour.

Après les repas, au moment des douleurs ou pesanteurs et le matin à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner.

Prix au public : Paquets : 14 fr. 90.

Discoïdes : 15 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 16.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue La Fayette — PARIS (IX^e). (Trud. 27-44.)

IXIUM

Composition. — Solution isotonique de Thorium X (exempte de radio thorium et de corps radioactifs à vie longue).

Propriétés. — Antirhumatismal et action sur les organes hémopoïétiques : — stimulante à doses faibles, — destructrice à très fortes doses.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. en verre spécial.

Indications et mode d'emploi. — *Spondylose, rhumatismes chroniques, névrites, iritis, psoriasis* (particulièrement psoriasis arthropathique) : 8 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 50 à 150 ou 180 microgrammes.

Anémie : 8 à 10 injections hebdomadaires, dosées à 25, 50, puis 75 microgr.

Leucémies, maladie de Hodgkin, polyglobulies : 5 à 10 injections hebdomadaires, à doses progressives, de 100 à 350 microgr. en principe.

Observations. — N'employer l'*Ixium* qu'en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses.

Les séries peuvent être renouvelées après un repos de 2 mois ; surveiller la formule sanguine en cas de séries répétées ou de doses fortes

N.-B. — L'*Ixium*, préparé toutes les semaines, est expédié le mardi ; les dosages sont prévus normalement pour utilisation, en France, le mercredi.

THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

JABOSULFÈNE

JABOrandi + hypoSULFite

« Le désensibilisant de choix ». Modifie le « terrain » et régularise l'équilibre neuro-végétatif.

Pilules glutinisées à 0 gr. 25 d'hyposulfite de Na chimiquement pur et 0 gr. 02 de poudre de feuilles de Jaborandi stabilisée.

Doses. — 2 à 12 pilules glutinisées par jour au milieu des 3 repas. Dose usuelle : 4 à 6 par jour.

Indications. — Toutes manifestations anaphylactiques : Urticaire, Œdème de Quincke, Prurits, Dermatoses récidivantes, Asthme, Migraine, Rhume des foins. Toutes insuffisances hépatiques.

Action. — Très grande activité due à la glutinisation qui évite la destruction de l'hyposulfite dans l'estomac et permet son action en nature au contact de l'épithélium intestinal.

La boîte de 65 pilules glutinisées : 18 fr. 50.

Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

La boîte de 10 ampoules : 29 fr. 50.

Pour les intramusculaires, voir *HYPOSTRONTIUM*.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 535-32 et 33.

Laboratoires TORAUDE

22, r. de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Tél. : Odéon 73-92.)

J. B. S. BELLAS

Traitement des maladies tumorales.

Etats cancéreux et précancéreux

Organothérapie Bellas.

Présentation :

Comprimés (boîtes de 50 comprimés).

Suppositoires (boîtes de 12 suppositoires).

Pommade (tube de 100 gr.).

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique et Extrait de rate.

Indications. — *Cancers et affections susceptibles de devenir cancéreuses.*

1° *Traitement préventif.* — Toutes affections aiguës ou chroniques (ulcères internes, fibromes, métrites, prostatites, ulcérations persistantes de la peau, etc.), susceptibles de devenir cancéreuses.

2° *Tumeurs malignes.* — Traitement adjuvant de la Chirurgie, Curiethérapie et Radiothérapie : Traitement préparatoire des cas qui, en raison de l'état général ou local, ne sont pas indiqués pour une intervention chirurgicale immédiate ; traitement post-opératoire pour éviter les risques de récidives et métastases ; traitement des cas réfractaires, ou devenus réfractaires aux rayons ; augmentation de la tolérance des malades aux rayons.

3° *Traitement des cas inopérables.* — Traitement freinant la croissance de la masse tumorale et des ganglions ; relève l'état général et moral, supprime les douleurs et assure souvent une survie appréciable.

Posologie :

Comprimés : dose moyenne : 3 à 6 comprimés par jour à prendre en 3 fois, 1/2 heure avant les repas. Dose d'attaque : 9 à 12 comprimés par jour pendant 8 à 10 jours.

Suppositoires : 3 suppositoires par jour.

Les comprimés constituent la base du traitement, qui est cependant plus actif si l'on fait en même temps le traitement avec suppositoires.

Si, pour une raison quelconque, le malade ne peut pas prendre les comprimés, ce traitement peut être remplacé par le traitement aux suppositoires (6 par jour).

Pommade : Application en couche épaisse sur de la gaze comme pansement pour les ulcères de la peau et en tampon pour les tumeurs rectales.

Durée du traitement : 3 à 7 mois.

Pour permettre de garder le secret du diagnostic, aucune littérature ou indication n'accompagne les produits.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Méd., n° 167-16.

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser :

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, place Intérieure-Saint-Michel — TOULOUSE
(Tél. : 213-06.)

JÉCOBIASE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule.	Adulte.	Infantile.
Sulfate de soude cristallisé	1 gr.	0,50
Citrate trisodique.....	0,25	0,125
Bicarbonate de soude bicristallisé .	0,05	0,025
Chlorure de magnésium anhydre...	0,50	0,25
Excipient spécial	qs p. 8 cc.	qs p. 8 cc.

Indications. — Toutes les manifestations de l'insuffisance hépatique (migraines, nausées, vertiges, etc.). Les infections biliaires (ictères, lithiasse biliaire, cholécystites).

Les congestions du foie.

Les asthénies dont la cause est liée à des toxi-infections d'ordre digestif.

La constipation sous toutes ses formes.

Posologie. — Une ampoule le matin à jeun dans un verre d'eau. Après une semaine de repos, reprendre une nouvelle série de 10 ou 20 ampoules suivant le cas.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 21 francs.

Laboratoires de la JÉCOBIASE
Dr R. PIONNEAU, Pharmacien
 VAYRES (Gironde).

JÉCOBOLDINE

(Gouttes de saveur agréable.)

Stimulant des fonctions hépatiques et apaisement des phénomènes douloureux résultant de l'irritation des voies biliaires et de la glande hépatique.

Formule :

Teinture de Belladone	20
— de Boldo.....	30
— d'Ipéca.....	30
— d'Artichaut	20
Pour 100 cc.	

Posologie. — V à XXX gouttes par 24 heures dans un peu d'eau au début des repas, en 2 ou 3 fois.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL, pharmacien de 1^{re} classe.
 8, rue Fleury — OULLINS (Rhône).

JÉCOL

L'auxiliaire physiologique du foie.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 223-2 et 223-10.

La déficience du foie étant la cause initiale de nombreux états morbides, l'effort thérapeutique doit porter sur la cellule hépatique qu'il convient de stimuler afin d'en rétablir le délicat fonctionnement.

Par son action progressive et douce, le Jécol se classe au premier rang des médicaments destinés à traiter l'hépatisme sous toutes ses formes :

Congestion et Insuffisance du foie, Gastro-entérite, Entérite muco-membraneuse, Auto-intoxication, Colibacillose, etc.

A. Formule.

Combretum (Extrait spécialisé de Kinkélibah)	3 centigr.
Boldo (Extrait aqueux)	2 1/2 centigr.
Evonymine (Codex).....	1 centigr.

Pour 1 cachet ou XX gouttes.

B. Forme.

1^o **Cachets** minuscules, faciles à avaler, forme la plus simple pour administration aux adultes.

2^o **Gouttes.** Posologie encore plus souple que le cachet, plus agréable aux enfants et aux adultes qui n'aiment pas avaler de cachet.

C. Posologie.

1 ou 2 cachets ou XX à LX gouttes à la fin de chaque principal repas.

Enfants : prescrire 1 goutte par année d'âge, dose à répéter 2 à 4 fois par jour.

Cette dose pourra être augmentée ou diminuée chaque semaine, suivant les résultats constatés, par le médecin traitant, chez le malade.

D. Boîte de 30 cachets	19 fr.
Flacon compte-gouttes.....	19 —

Laboratoire JÉCOL
COURBEVOIE (Seine).

JECOLAXINE

Cachets.

Traitement de la constipation en particulier d'origine hépatique.

Formule :

Poudre de Belladone.....	0,01
— Bourdaine	0,10
— Cascara	0,10
— Agar-Agar	0,10
Bile desséchée et purifiée....	0,01
Pour 1 cachet.	

Posologie. — 1 à 2 cachets au repas du soir provoqueront une selle le lendemain matin.

Interrompre un jour sur deux.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL, pharmacien de 1^{re} classe,
8, rue Fleury — OULLINS (Rhône).

JÉCOPEPTOL

Indications. — Toutes affections gastro-hépatiques.
Calme immédiatement. Effet durable par usage régulier.

Composition. — Association de 2 formules : l'une *gastrique* : poudre magnésio-bismuthée, avec adjonction de silice absorbante. L'autre *hépatique* : cholagogue et désinfectante des voies biliaires.

Forme. — Poudre d'une extrême finesse, sans toxique, d'un goût excellent, d'un prix modique.

Posologie. — 1 cuillerée à soupe de poudre dans un verre d'eau après les principaux repas.

Prix de la boîte

pour un traitement d'une semaine : 16 fr. 50.

L. GUÉRET, Pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des médicaments sous le n° 1248-1.

JECOSEDYL

(Gouttes de saveur agréable.)

Sédatif de tous phénomènes douloureux du foie et des voies biliaires.

Formule :

Teinture de Belladone	10
— de Boldo	40
— de Jusquiame	10
— de Combretum	40
Pour 100 cc,	

Posologie. — *Type* : V à X gouttes dans un peu d'eau par 24 heures, prises en 2 ou 3 fois au début des repas.

Cas aigus : jusqu'à XXX gouttes par 24 heures.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. MALAVAL, pharmacien de 1^{re} classe,
8, rue Fleury — OULLINS (Rhône).

JEMALT WANDER

A base d'huile de foie de morue et d'extrait de malt, sous forme de paillettes.

Composition. — Huile de foie de morue, 30 p. 100 ;
Extrait de malt, 64 p. 100 ; Cacao, 6 p. 100 ;
Essences aromatiques, Q. S.

Indications. — Le Jemalt réalise la médication à l'huile de foie de morue enrichie des éléments nutritifs et digestifs (diastases) de l'Extrait de malt. Anémie en général. Croissance des enfants.

Doses. — Enfants jusqu'à 2 ans, 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Enfants plus âgés, adolescents et adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Se prend le matin, le soir, ou entre les repas tel que (il fond rapidement dans la bouche), ou dilué dans du lait tiède ou dans une infusion.

Durée moyenne de consommation : 15 jours:

P. BASTIEN, pharmacien.

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

JUGLAND GMET

Extrait total, sans alcool ni sucre, des feuilles de noyer. Sous forme liquide, plus actif que les pilules.

Propriétés :

Toni-dépuratif, anti - diabétique, reminéralisant
(Fixateur des phosphates de chaux).

Indications :

Anémie, lymphatisme, adénopathies, rachitisme, ostéomalacie, acné juvénile.

Diabète et ses complications. Tuberculose.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour. Enfants : demi-dose.
Dans le diabète : dose doublée.

Le flacon de 135 cc : 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Dr. A. LOROT, Pharmacien,
27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.
(Tél. : Provence 43-10.)

JUGLANE

Composition. — Principe actif du noyer sauvage.

Indications. — Toutes les formes du diabète et ses complications : acidose, acétonémie, en particulier les diabètes gras, arthritiques, hépatiques. Aucune contre-indication, tolérance parfaite, innocuité absolue, aucune incompatibilité.

Mode d'emploi. — 3 à 4 pilules avant chacun des trois repas. Cette dose peut être doublée sans inconvénient. Continuer progressivement le traitement jusqu'à complète disparition du sucre dans les urines.

Prix : 16 francs la boîte de 150 pilules. Conservation indéfinie en lieu sec.

L. N. C. n° 257-1.

Produits Euthérapiques

Camille OONS, Anc. Int. des Hôpitaux de Lyon
12, rue des Écoles — CHAMBÉRY (Savoie).
(Tél. : 0-23.)

JUGLANREGINE ANDRÉ

Iodotannique phosphaté à base de feuilles de noyer, fraîches et sèches.

Indications. — Lymphatisme, tuberculose, reminéralisation, anorexie, états asthéniques, convalescence, hypothyroïdie, diabète.

Présentation. — Élixir très agréable au goût.

Dose. — 2 à 3 cuillerées (à bouche ou café, suivant âge) par jour.

Prix en France : le grand flacon : 18 fr. 50.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments : 556-1.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

JURANOL

Huile sulfurée naturelle du Jura.

Huile d'origine animale fossile, très riche en soufre organique, extraite d'une roche du massif montagneux du Jura. Réalise un Ichtyol suractivé et incolore.

Réparateur puissant des tissus, décongestif, calmant, antiseptique léger, antiprurigineux, ni irritant ni toxique. Ne tachant pas.

POMMADE à 10 p. 100.

Indications. — Plaies, Brûlures, Ulcères, Dermatoses (acné, eczéma, impétigo, etc...), Engelures, Crevasses, Coups de soleil, Périphlébites, Varices, Hémorroïdes.

Mode d'emploi. — Pansements, onctions, massages.

Présentation. — Tube de 30 gr. : 9 francs.

LIQUIDE à 10 p. 100.

Indications. — Chirurgie (plaies infectées, fractures ouvertes, ostéomyélites, abcès, phlegmons, lymphangites), Urologie (cystites, urétrites), Gynécologie, Dermatologie, Séborrhée, Rhinites.

Mode d'emploi. — Compresses, injections dans les drains ou trajets fistuleux, instillations, tampons vaginaux, pulvérisations.

Présentation. — Flacon de 60 gr. : 14 francs.

OVULES à 3 p. 100.

Indications. — Leucorrhées, vaginites, métrites, congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 1 ovule le soir au coucher.

Présentation. — Boîtes de 6 ovules : 17 fr. 50.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS (VI°).
(Tél. : Ségur 02-79.)

JUS DE RAISIN QUOTIDIEN

Composition :

Pur jus de raisin frais, sans alcool, ayant conservé la *saveur délicate* et le *fruité* du raisin frais. Préparé avec les meilleurs raisins de l'Anjou, pasteurisé à température modérée, renferme intégralement toutes les vitamines, albumines, corps azotés. Maintenu dans le vide dans sa bouteille, ce qui évite toute oxydation. Ni antiseptique, ni acide sulfureux.

Indications :

Auto-intoxications, Diverses manifestations de l'arthritisme, Insuffisance hépato-rénale, Pyrexies, Maladies de carence, Régulateur de l'équilibre acido-basique des humeurs, Hygiène alimentaire.

Mode d'emploi :

Pur ou mélangé d'eau à table, ou un verre à bordeaux avant chaque repas.

Prix : 11 francs la bouteille de 75 centilitres.

Henri CHARTIER — SAUMUR. — (Tél. : 416.)

KALMANGOR

Application nouvelle de la Yohimbine.

Composition. — Dragées à noyau mou contenant chacune :

Chlorh. de Yohimbine.....	0,002
Trinitrine à 1 p. 100.....	2 gouttes.
Phényl-éthyl-malonylurée	0,015
Extrait de Cratægus	0,05

Indications. — Activité immédiate dans les crises d'angine de poitrine grâce aux vasodilatateurs Yohimbine, Trinitrine et aux sédatifs.

Médication sympathicolytique générale.

Posologie. — 4 à 6 dragées par 24 heures à croquer au moment des crises.

Prix : Le flacon de 50 dragées : 22 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

KANEURON

Nouvelle forme créée en 1933.

Modérateur des perturbations vago-sympathiques et psycho-affectives.

Présentation. — Gouttes, solution 1/25.

Composition. — Paullinia, Cratægus, Passiflore, Phényléthylmalonylurée.

Indications. — Spasmes, Vertiges, Anxiétés, Angoisses. Insomnies, États Parkinsoniens, Émotivité, Syndrome solaire, Énurésie.

Propriétés thérapeutiques. — La phényléthylmalonylurée sodique en solution permet une posologie plus souple, Très vite assimilé, il peut être prescrit à dose « filée » progressive, dégressive. Il autorise la dose optimum et son fractionnement par le malade. Les extraits de Cratægus et de Passiflore renforcent son action. Le Paullinia combat l'action dépressive que peut occasionner la phényléthylmalonylurée.

Prescription. — Kaneuron : 1 flacon. Durée moyenne : 20 jours.

Posologie. — X à XXX gouttes 3 fois par jour.

X gouttes = 0,01 de phényléthylmalonylurée.

Le flacon 30 grammes (1 200 gouttes), durée moyenne 1 mois.

Bibliographie : *Annales Médico-Psychologiques*, 22-12-1938. Doses filées en sympathologie juin 1937.

Enregistré L. N. C.

**Laboratoire d'Applications
Biologiques LABIOLA
P. CORDONNIER, Pharmacien,
52, rue de Cambrai — LILLE.**

KAOBROL

DEUX FORMES : Poudre. Tablettes.

DEUX FORMULES : Simple. Belladonné.

KAOBROL simple : Kaolin colloïdal. -- Bromure de Sodium (20 à 25 cgr. par cuillerée à café). Carbonate de Chaux et de Magnésie.

KAOBROL belladonné : Kaobrol simple + Poudre de Belladone titrée (IV gouttes de teinture par cuillerée à café).

Poudre homogène, adhésive et absorbante, très agréable au goût, sucrée et aromatisée à la menthe.

Indications. — Toutes les dyspepsies, plus spécialement hyperchlorhydriques et nerveuses. Troubles digestifs de la femme enceinte. Gastro-entérites. Aérophagie.

Sédatif puissant de toutes douleurs gastriques.

Posologie. — Une cuillerée à café ou 2 tablettes après les repas et au moment des crises douloureuses.

Prix : 15 francs.

Littératures et échantillons
à Messieurs les Docteurs.

Laboratoires J. LAROSE, pharmacien.
54, rue de Paris — CHARENTON (Seine).
(Tél. : Entrepôt 01-41.)

KAO CARBO

Présentation. — Tubes aluminium de 30 comprimés. (15 fr. 30.)

Principes actifs. — Carbonate de chaux, kaolin, sous-nitrate de bismuth, magnésie calcinée, bi-carbonate de soude, extrait de belladone, ess. d'anis.

Indications. — Affections gastro-intestinales, Gastrites aiguës ou chroniques, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Pyrosis (brûlures et aigreurs de l'estomac), Aérophagie, Météorisme, Flatulence (gaz), Entérocologie, Entérite, Diarrhée.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour dans le courant des repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-44.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

KAOLINASE

Pansements gastriques parfaits,
les moins coûteux.

Composition. — Silicate d'alumine naturel, stérilisé, finement porphyrisé, en poudre fine très adhésive : 10 grammes par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie, Gastrites, Gastralgies, Ulcères de l'estomac et du duodénum, Colites, Fermentations.

Posologie. — 1 à 2 paquets délayés dans un verre d'eau le matin à jeun.

Renouveler 1/2 ou 1 paquet dans la journée si nécessaire, au moment des douleurs.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 14 fr. 30.

KAOLINASE BELLADONÉE

Composition. — Kaolinase simple, 10 gr. Teinture de belladone : 10 gouttes par paquet.

Indications. — Hyperchlorhydrie grave, Gastropathies rebelles, Ulcères graves ou aggravés de spasmes, Spasmes gastro-intestinaux, Vomissements, Toux émétisante des tuberculeux.

Posologie. — Un paquet délayé dans un verre d'eau le matin à jeun. Renouveler dans la journée si nécessaire.

Présentation et prix. — Boîte de 20 paquets de 10 grammes : 16 fr. 30.

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

KATOX INTRA

(Cobratoxine nouvelle)

Composition. — Venin de cobra suractivé et non choquant, obtenu par suppression de protéines hétérogènes et freinatrices et s'employant à des doses toujours très faibles.

Indications. — L'Algie rebelle quelle qu'en soit l'origine et l'ancienneté ; en particulier toutes localisations douloureuses : névralgies, névrites, hyperesthésies.

Technique et posologie. — Injections quotidiennes et fractionnées dans l'épaisseur du derme.

Les doses injectées ne provoquent aucune réaction focale ou générale et sont absolument inoffensives même chez les enfants.

Présentation. — En boîte de six ampoules de 1 cc. contenant une aiguille intradermique inoxydable. Titré à 1/10 U. S. par 1/2 cc.

Prix : 25 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

KAVIASE

Pilules, Suppositoires, Ovules.

PILULES (2 formules).

1° *Pilules Kaviase.*

Ext. Kawa	0,10	} par pilule.
Uroformine	0,02	

6 à 8 par jour, 16 fr. 65 le flacon de 50 pilules.

2° *Pilules Kaviase au bleu de méthylène.*

Ext. Kava.....	0,10
Bleu de méthylène.....	0,01

6 à 8 par jour, 16 fr. 65 le flacon de 50 pilules.

Indications. — *Le symptôme douleur dans la sphère génito-urinaire.* Cystites, Urétrites, Prostatites, Orchites, Métrites, Salpingites, Colibacilloses.

SUPPOSITOIRES et POMMADE

Toutes les algies ano-rectales et pelviennes.

Indications. — Congestion prostatique et utéro-ovarienne, Hémorroïdes, Règles douloureuses, Prurit anal, Rectites, etc.

Composition :

Ext. Kawa	0,30
Ext. jusquiame.....	0,03
Stovaïne	0,005

16 fr. 65 la boîte de 10 suppositoires.

OVULES

Toutes les affections gynécologiques douloureuses : décongestif et sédatif.

Laboratoires de la KAVIASE

22, rue Lalande — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Suffren 71-02.)

KÉFIROGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation *domestique* du Kéfir.

Composition. — Ferments sélectionnés, fournis par des *cultures pures* des agents de la fermentation kéfirique. Préparation liquide glycinée.

Indications. — Le Kéfirogène permet la fabrication du Kéfir, lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — Chaque dose (une ampoule) est ajoutée à 250 cc. environ de lait bouilli, puis refroidi. Après un séjour de 24 heures, à 25 degrés, on a le Kéfir n° 1 ; au bout de 48 heures, le Kéfir n° 2 (le plus souvent utilisé), et, au bout de 72 heures, le Kéfir n° 3. Une étuve simple facilite cet emploi du ferment (renseignements sur demande).

Présentation et prix. — La boîte de 12 ampoules : 10 fr. 85.

Laboratoires **CARRION et LAGNEL**

3, 5 et 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

KÉLÉDOL ET SUPPO-KÉLÉDOL

Composition :

Chlorhydrate de Morphine..... 1 centigramme.
Bromhydrate de Scopolamine ... 1/4 de milligramme.
Par ampoule de 1 cc., par suppositoire ou 2 comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Tous les emplois de la morphine sans les inconvénients : action hypnotique et sédatrice plus forte, pas d'effets toxiques sur la circulation et la respiration, beaucoup moins d'accoutumance.

Indications. — Douleur, Cancer, Sciatique, Anxiété, Agitation, Anesthésie pré-chirurgicale, Accouchement.

Posologie. — Ampoules, suppositoires ou comprimés
1 à 4 par 24 heures.

Présentation pharmaceutique et prix :

12 ampoules : 16 fr. — 6 ampoules : 8 fr.
10 suppos. Kélédol : 22 fr. — 5 suppos. Kélédol : 12 fr.
14 comprimés : 10 francs.

D. RAQUET, Pharmacien Supérieur,

Licencié ès Sciences.

114, rue Solférino — LILLE.

KÉNOL

Compensateur intestinal.

Extrait duodénal total	0 gr. 045
— biliaire total purifié.....	0 gr. 045
— Gladiolus ceruleus	0 gr. 019
— Evony. atropur.....	0 gr. 019
Mag. de soufre purifié.....	0 gr. 035

Pour un comprimé-dragée.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre des sécrétions intestinales. Agit sur le péristaltisme. Action antiseptique puissante.

Indications. — Constipation, Affections hépatiques, Cholécystites, Dermatoses, Auto-intoxication.

Doses. — 1 à 3 dragées au repas du soir ou 1 à 2 à chaque repas. Avaler sans croquer. Action évacuante douce, activité constante. Pas d'accoutumance.

Prix au public : 10 fr. 85.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

KÉPHÉDRYL

à base d'Éphédrine naturelle

Deux formules :

1° Képhrédyl.

Éphédrine naturelle.....	1	p. 100.
Eucalyptol.....	0,50	—
Camphre	0,30	—
Excipient	Q. s.	98,20 —

2° Képhédryl Bébé.

Solution faible pour petits enfants et nourrissons.

Éphédrine naturelle.....	0,50	p. 100.
Eucalyptol	0,50	—
Excipient	Q. s.	91 —

Indications. — Toutes affections rhinopharyngées : Coryzas inflammatoires ou spasmodiques, Catarrhe naso-pharyngien, Rhume des foins, Sinusites, Otites, Asthme.

C'est un merveilleux traitement abortif du rhume de cerveau.

Posologie. — 5 à 10 gouttes dans chaque narine, 4 ou 5 fois par jour.

Présentation. — La capsule compte-gouttes formant bouchon permet l'emploi du Képhédryl dans les meilleures conditions d'asepsie.

Prix : 14 fr. 75.

C'est un remède efficace et économique.

Laboratoires du KÉPHÉDRYL

Guy-Élle Mantout, pharmacien,
1, rue Auber — PARIS (IX^e).

KERALAX

Mucilage d'origine végétale infermentescible
et inassimilable.

Formules :

1^o Keralax.

Mucilage.....	80 p.	100
Ext. Rhamnus Frangula	3 p.	100
Exc.....	Q. S. pour.	100 gr.

2^o Keralax simple.

Mucilage.....	80 p.	100
Exc.....	Q. S. pour.	100 gr.

Le Kéralax renferme le % de mucilage pur le plus élevé (80 p. 100), ce qui lui assure l'action mécanique la plus efficace.

Indications. — Traitement physiologique de la Constipation, Rééducation de l'intestin, Auto-Intoxications, Stimulant des mouvements péristaltiques.

Posologie. — Une ou deux cuillerées à café midi et soir ou le soir seulement, selon les besoins du traitement.

Pas de contre-indication.

Présentation et mode d'emploi.

Granulés de goût agréable et d'absorption facile. Placer le contenu de la cuiller sur la langue et l'avaler *sans mâcher* avec quelques gorgées de liquide.

Prix : 16 fr. 85 la grande boîte.

— 45 fr. 90 la boîte triple.

Ce prix correspond à un coût journalier très modique et le moins élevé de tous les mucilages.

Laboratoires du KERALAX

Guy ÉLIE-MANTOUT, Pharmacien,
1, rue Auber — PARIS (IX^e).

KERASALICYL

Pilules *kératinisées* suivant le procédé du Dr Henri Philippe, ne se dissolvant que dans l'intestin et permettant l'absorption des fortes doses de salicylate sans intolérance ni fatigue d'estomac.

Salicylate de soude chimiquement pur dosé à 0 gr. 50 ou 0 gr. 25.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatisme infectieux, rhumatisme chronique, goutte, sciatique, névralgies, coliques hépatiques, fièvres infectieuses, infections urinaires, état infectieux.

Posologie. — 8 à 20 pilules à 0 gr. 50 par jour, soit 4 à 10 grammes, à déterminer par le prescripteur. Dose double p^r les pilules à 0 gr. 25. Étui de 60 pilules à 0 gr. 50 ou de 80 pilules à 0 gr. 25 : 17 francs.

Produits du Dr HENRI-PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

KIDOLINE

Huile adrénalinée au millième.

Indications.

- 1° Coryza aigu du nourrisson chez lequel la kidoline permet l'alimentation en rétablissant en partie la perméabilité nasale.
- 2° Adénoïdite aiguë de l'enfance : décongestionne puissamment les muqueuses, modifie la nature des sécrétions et permet l'usage *utile* de sels argentiques qui sans cela pénètrent trop insuffisamment.
- 3° Accès de faux croup.
- 4° Rhinites aiguës avec menace de sinusite.

Mode d'emploi.

Chez les nourrissons, instiller à la fois II à III gouttes dans chaque narine 5 minutes avant la tétée.

Chez l'enfant : 4 fois par jour instiller IV à V gouttes. Tolérance parfaite. Aucune contre-indication.

Flacon de 20 cc.

Prix : 17 francs.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e).
(Tél. Suffren 46-57.)

KIDOPHÉDRINE

Association Éphédrine-Adrénaline en solution huileuse.

Indications. — Rhinites et adénoïdites aiguës, Rhinites congestives, Sinusites aiguës fronto-maxillaires, Otites, Mastoïdites, Rhinites spasmodiques, Rhume des foins, Trachéites, Coqueluche.

Mode d'emploi :

Oto-rhino-laryngologie : en instillations nasales, IV à V gouttes dans chaque narine, 5 à 6 fois par jour.

Rhume des foins, rhinites spasmodiques. — Instillations nasales 5 à 6 fois par jour et au moment où la crise s'annonce par un chatouillement du nez ou de la gorge.

Coqueluche. — Instillations fréquentes et répétées, à raison de II gouttes dans chaque narine toutes les 2 heures.

Flacon de 20 cc. : 17 francs.

Flacon de 10 cc. : 11 francs.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e).
(Tél.: Suffren 46-57.)

KINALDYNE

Élixir fortifiant

Indications. — Surmenage, Anémie, Paludisme, Convalescence, Inappétence, Neurasthénie, Prophylaxie de la grippe et ses suites.

Forme. — Élixir faiblement alcoolisé de goût très agréable.

Composition. — Tous les principes actifs des quinquinas.

Mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur 1/4 d'heure avant les repas.
(Le flacon pour 10 jours de traitement.)

Prix : 20 francs.

Laboratoires GAMEL

2, place de la Salamandre — NIMES.

KINÉCHOL

Composition. — Granulé soluble de goût agréable à base de sulfate de magnésie desséché, peptone de fibrine, extrait de boldo, hyposulfite de magnésie.

Indications. — Affections du foie et de la vésicule biliaire (calculs et coliques hépatiques).

Troubles digestifs d'origine hépatique : Vomissements, Pesanteurs, Constipation, Diarrhée d'origine hépatique. Manifestations hépatiques : Migraines, Urticaires, Nausées, Prurit.

Contre-Indications. — Cholécystites aiguës et dysenterie.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café dans un demi-verre d'eau tiède, le matin à jeun. Se coucher ensuite 20 minutes sur le côté droit.

Prix : 19 fr. 50

Enregistré au L. N. C. n° 399-1.

Laboratoire du KINÉCHOL

GENEVET, Docteur en Pharmacie

29, rue des Marchands — AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : 2-75.)

KINECTINE

(Combinaison d'Hectine et d'Éphédrine.)

Spécifique de la Fièvre des Foins, de la grippe et du Coryza.

Indications. — Fièvre des foins, Coryza aigu, grippe, asthme, emphysème.

Forme. — Comprimés.

Posologie :

Adultes : 3 à 5 comprimés par jour.

Enfants : Moitié dose.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de médecine

Docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23 34, 2 lignes groupées.)

KLUCHOL REMEAUD

à base de Benzoate d'Anéthol Solubilisé.

Forme. — Sirop d'un goût très agréable, bien accepté des enfants. — Non toxique.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique puissant, calmant et curatif de la coqueluche, des toux coqueluchoïdes ou nerveuses, asthme, etc...

Posologie. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à soupe par jour.

Enfants.

Moins d'un an 2 à 4 cuill. à café par jour.

1 à 5 ans 4 à 8 — —

5 à 10 ans 5 à 10 — —

Au-dessus de 10 ans 8 à 10 — —

Nota.

L'innocuité absolue permet d'augmenter progressivement, et même de doubler les doses ci-dessus, jusqu'à l'obtention rapide de l'effet désiré.

Prix : 20 fr. 15.

LABORATOIRE REMEAUD

38, avenue J.-Baptiste-Clément — Boulogne-sur-Seine.

(Téléphone : Molitor 04-59.)

Dépôt général O. C. P.

71, rue du Temple — PARIS

KODOS

Composition. — Mélange effervescent de sels de potasse, de lithine, de magnésie, de soude avec de l'eurotropine.

Propriétés thérapeutiques. — Elimine les déchets de la combustion vitale, Assouplit les artères, Combat la sclérose des tissus, Décongestionne le foie et les reins, Désinfecte les urines.

Indications. — Cure d'amaigrissement, Congestion du foie, Lithiase rénale, Affections de la peau, Prurit, Pyélonéphrite, Cystite, Prostatisme, Arthritisme, Rhumatisme, Troubles urinaires, Asthme et Emphysème, et surtout Cholémie.

Mode d'emploi. — Une pellette de poudre chaque matin, à jeun, au lever, dans une eau très peu calcaire (de préférence l'eau minérale des Abatilles) ou une pellette un quart d'heure avant chaque repas.

Prix : 22 fr. 40.

Laboratoire des **ABATILLES**

Route du Moulleau — ARCACHON.

KOLA GRANULÉE ASTIER

Composition. — Tous les principes actifs de la noix fraîche : caféine, théobromine, combinaisons tanno-caféiniques, kolacatéchine, rouge de Kola.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur du cœur. Excitant musculaire. Reconstituant du système nerveux. Tonique général des forces intellectuelles et physiques.

Indications. — Neurasthénie, adynamie cardiaque, troubles fonctionnels cardiaques, grippe, convalescences, asthénie, surmenage physique et intellectuel. Entraînement à tous les sports.

Posologie. — Dose moyenne : 2 cuill. à café par jour.

Prix : 15 fr. 30.

Se vend également en dragées très faciles à emporter en déplacement, voyages, sports.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

KOLA MONAVON

Présentation et composition :	<u>Prix public.</u>
<i>Élixir</i> (26°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à liqueur (30 cc.).....	20 fr. 75
<i>Vin</i> (18°) : 0 gr. 30 extrait de kola par verre à bordeaux (75 cc.).....	20 fr. 75
<i>Granulée</i> : dosée à 6 p. 100 d'extrait de kola.	15 fr. »
<i>Pastilles</i> : 0 gr. 035 extrait de kola par pastille.	10 fr. »

L'Extrait de Kola rentrant dans la composition de la Kola Monavon renferme tous les principes actifs de la noix de kola fraîche : Caféine libre et combinée, théobromine, kolatine et rouge de kola, qui, sous l'influence des liquides digestifs, se dédouble en glucose, kolatannin et caféine à l'état naissant.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne sans égal. Agent de conservation et d'augmentation des forces musculaires et nerveuses. Régulateur de la circulation. Stimulant du système cérébrospinal. En un mot : Excitant tonique général.

Indications. — Œdèmes, anasarques et la plupart des troubles fonctionnels du cœur, migraine, céphalalgie, névralgie d'origine circulatoire, neurasthénie, surmenage, asthénie grippale, convalescences, dyspepsie, diarrhées chroniques et diarrhées des pays chauds.

Posologie :

Élixir : 1 à 2 verres à liqueur par jour, avant ou après les repas.

Vin : 1 à 2 verres à bordeaux par jour.

Granulée : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pure, dans du café, du thé ou de l'eau.

Pastilles : 10 à 15 par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Élixir : 12 jours. — *Vin* : 8 jours. — *Granulée* : 8 jours. —

Pastilles : 4 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

KOLA-STHÉNYL

Elixir aux vins généreux de France et principes actifs en association très stable : *Noix fraîches de Kola*, coca, quinquina, noix vomique, Phosphate de Manganèse, arrhénal, associés à l'Acide orthophosphorique (1 partie); Phosphate acide de soude (2 parties selon les proportions de la formule de Joulie).

Propriétés-indications. — *Tonique musculaire, Tonique cardiaque, Tonique antigrippal. Reconstituant des Forces physiques et cérébrales,* remarquable par la *sûreté* et la *rapidité* de son action, dans : *Toutes les déficiences organiques, toutes les Convalescences :* médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Flacon de 155 cc.

Posologie. — D'un goût liquoreux très agréable, le Kola-Sthényl se prend pur ou dilué dans eau ou vin, à la dose de 1 à 2 cuillerées à café, avant, pendant ou après les principaux repas.

Enfants : 1/2 dose.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1244-11.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine.

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 01-35)

KOLATINÉS

Tonique sédatif.

Kola nature, *non caféinée* grâce au traitement sur place (A. O. F.) de l'amande vivante, avant l'oxydation diastasique destructrice de la *Kolatine* et productrice de caféine. La poudre soluble ainsi obtenue n'a, de ce fait, aucun rapport avec les kolas caféiques provenant des noix du commerce simplement séchées à l'air. Stimule beaucoup mieux que le café et *n'énervé pas*.

Indications particulières. — Asthénies du matin, des *hépatiques*, des surmenés, des insomniaques ; des enfants lymphatiques, anorexiques, adénoïdiens.

Dépression mentale, sous toutes ses formes, à toutes ses intensités, quelle qu'en soit l'origine.

Déficience sexuelle masculine, avec anxiété, dépression morale, impuissance psychique.

Stimulant inoffensif chez les neuro-végétatifs privés de café, thé, le matin, à midi, au goûter ou même le soir.

Élimine l'impression de fatigue éprouvée lors de certains régimes restrictifs : obèses, hépatiques, *diabétiques* (sucrer à la saccharine).

Intérêt de mordançage dans les thérapeutiques stimulatrices thyroïdienne, surrénale, orchitique, cérébrale.

Innocuité complète vis-à-vis du sommeil. Aucune contre-indication. Ni accumulation, ni accoutumance.

Utilisation de choix. — Dans l'eau sucrée très chaude, le lait ou les déjeuners, *après dissolution complète*. 1/2 à 4 sachets par jour, moyenne 1 à 2.

En vue de l'effort physique ou intellectuel chez les sujets bien portants (épreuves sportives ou scéniques, examens, concours, discours) : 1/2 heure avant l'action.

Boîte P. M., 10 sachets (14 fr. 75). Boîte G. M., 30 sachets (41 fr. 15).

Sté des Produits et Procédés CHALAS

75, rue Jacques-Dulud,
NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

KOUMYL

Concentrat de bacilles lactiques vivants en gouttes.

Le Koumyl est une suspension concentrée de ferments lactiques, stabilisée par un milieu qui suspend la vie du bacille sans la détruire.

Avantages :

1^o Maniement pratique.

Quelques gouttes versées au moyen du compte-gouttes dans un peu de lait ou d'eau.

2^o Ne contient ni caséine, ni matières grasses, ni peptones, ni sucre. N'est pas un milieu de culture favorable auxensemencements accidentels.

3^o Ne renferme pas d'acide lactique.

4^o Pas de saveur désagréable.

5^o Conservation pratiquement illimitée.

6^o Traitement peu onéreux.

Indications :

Toutes les affections intestinales, aussi bien chez l'adulte que chez le nouveau-né (gastro-entérites, auto-intoxications, etc.), ainsi que les dermatoses et migraines dérivées.

Le Koumyl étant d'une innocuité absolue peut être administré dès la naissance.

Posologie :

Nourrissons : I à V gouttes trois fois par jour.

Enfants : X gouttes trois fois par jour.

Adultes : XV à XX gouttes trois fois par jour. Entre les repas dans un liquide froid ou à peine tiède. Agiter fortement avant l'usage.

Prix : 18 fr. 80

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

KYMOSINE ROGIER

A base de Ferment lab et sucre de lait purifiés. — Poudre blanche.

Rend le lait de vache absolument digestible, facilite la digestion du lait de femme chez le nouveau-né.

Dose. — Une cuillerée-mesure dans 200 cc. de lait bouilli revenu à 40°.

Une pincée dans une cuillerée à café d'eau avant chaque tétée.

Le flacon : 15 fr. 75.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

LAB-LACTO-FERMENT- MIALHE

Digestion du lait.

Indications. — Diarrhées vertes des nourrissons.

Dans tous les cas de mauvaise digestion du lait.

Troubles gastro-intestinaux du régime lacté.

Toutes les fois que le malade a besoin d'absorber une forte quantité de lait.

Doses. — *Pour adultes et enfants* : une cuiller-mesure par verre de lait.

Nourrissons : une demi-cuiller-mesure par biberon ou par tétée.

Mode d'emploi. — Mettre la dose indiquée dans 2 cuillerées d'eau. Quand l'effervescence est terminée, ajouter le lait, froid ou tiède.

Le liquide trop chaud détruirait le ferment.

Conservation : cinq années.

Flacon de 130 grammes. Prix : 21 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

(Tél. : Richelieu 35-10.)

LACCODERMES

verniss souples, solubles à l'eau.

TRAITEMENT

de toutes les affections de la peau.

« **A chaque dermatose son médicament** ».

Les Laccodermes, verniss souples, ne tachent pas, ne graissent pas, n'ont aucun des inconvénients des pommades.

Ils dispensent de tout pansement

ECZÉMAS (suintants) : Laccoderme au goudron de houille à 5% — 10% — 20%.

DERMATOSES LÉGÈRES (Erythèmes) : Laccoderme à l'oxyde de zinc.

DERMATOSES INFECTÉES (Impétigo) : Laccoderme à l'ichtyol.

DERMATOSES PRURIGINEUSES (Névrodermites) : Laccoderme au chl. d'amyléine (Stovaine N. D.) ou à l'ichtyol-stovaine.

DERMATOSES SÈCHES : Laccoderme au soufre. — Laccoderme sulfocadique.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et C^{ie}, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01.)

LACHÉSINE

Extrait du venin
du *Trigonocephalus lachesis*.

Forme. — Comprimés solubles dans l'eau.

Mode d'emploi. — Deux à quatre comprimés par jour en dehors des repas. Résultat rapide.

Indications. — *Troubles de la ménopause naturelle ou chirurgicale.* (Bouffées de chaleur, sueurs, vertiges, congestion céphalique, dyspepsie, mélancolie, etc.)
S'abstenir pendant les règles.

Prix : 14 francs le tube de 40 comprimés.

Laboratoire RENAUD

2, rue Pierre-Demours — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 23-82.)

LACPININE

Forme. — Liquide blanc laiteux.

Composition. — Émulsion d'essence de pin naturelle.
Essence de pin 20,00 pour 100 gr.

Indications. — Pour vaporisation, douches vaginales, bains de siège contre hémorroïdes, bains complets en cas de neurasthénie.

Mode d'emploi. — Lavages et douches vaginales : 1 à 3 cuillerées à café par 1 à 2 litres d'eau.

Vaporisation et désodorisation des locaux : 5 cuillerées à soupe par litre.

Frictions : pure ou diluée de moitié.

Pour un bain complet ou partiel, la Lacpinine s'emploie à raison de 1 cuillerée à soupe pour 100 litres d'eau.

Prix.	{	Flacon de	60 gr. :	7 fr. 05
		—	150 gr. :	16 fr. 25
		—	750 gr. :	54 fr. 35
		—	1 000 gr. :	65 fr. 25

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-7.

Laboratoires FISCH et C^{ie}, S. à r. l.
Mer Rouge — MULHOUSE (Haut-Rhin).
Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Trudaine 92-52.)

LAC-SER

Composition. — Lactosérum desséché.

Propriétés. — Provoque dans l'intestin des fermentations acides qui s'opposent aux putréfactions albuminoïdes toxiques. A, en outre, une action diurétique et cholagogue.

Indications. — Auto-intoxications intestinales, entérites des nourrissons, affections hépatiques, Pansements (bactériothérapie).

Formes et posologie. — Paquets : 5 gr. de lactosérum desséché par paquet correspondant à 100 grammes de lactosérum liquide.

Dose : 3 à 4 paquets par jour dans un liquide (300 à 400 grammes).

Prix : 19 fr. 50 (boîte de 30 paquets).

Laboratoire MONTAGU

10, rue de la Barouillère — PARIS (6^e)

(Tél. : Suf. 36-59.)

LACTACYD

**Pâte dermatologique soluble et sans corps gras
à base de lacto-sérum.**

Iso-acide de l'épiderme.

pH : 5,2.

Acidifiante, Vitaminée.

Composition. — Lacto-sérum 45 %, acidifié par fermentation lactique. Bacilles lactiques. Vitamines A et D : huile de fétan en émulsion inoxydable 10 %.

Lacto-sérum : élément physiologique de régénération cellulaire.

Acidité lactique : condition de l'équilibre physico-chimique.

Bacilles lactiques : agents de désinfection anaseptique.

Vitamines A et D, facteurs d'activité biologique.

Excipient nouveau ionisé absorbé par l'épiderme, ne graisse pas.

Hydrophile, ne fait pas de macération, disparaît à l'eau.

Emulsif, dissout la séborrhée, les graisses. Nettoie.

Onctueux, plus doux qu'une pommade et parfum agréable.

Principe. — La peau est acide pH : 5,2. Cette acidité, facteur essentielle de kératinisation, protège contre les influences extérieures et contre les microbes. La thérapeutique doit régénérer l'acidité naturelle et s'exercer à pH : 5,2, niveau auquel s'établissent les échanges, les phénomènes vitaux, l'auto-défense.

Remarque. — Les acides de synthèse libèrent des ions H et OH, mais aussi des ions caustiques. Seul convient l'acide lactique, acide naturel de la peau et des muqueuses.

Indications :

Lactacyd remplace les pommades et s'emploie comme elles.

Favoriser la pénétration par massage léger, surtout sur démangeaisons.

Dermatoses exogènes. — (L'acidité, facteur essentiel de kératinisation.)

Physiques : Brûlure 1^{re} et 2^e degrés, coup de soleil, érythème radiologique, gerçures par intempérie. Froidure, engelure. Plaies légères. Traumas.

Tous les Intertrigos, Erythèmes, ampoules, escarres.

Cicatrisation au stade épidermique, cicat. fragiles, chéloïdes, ulcères.

Chimiques : Gerçures et crevassés. Eczéma localisé, dermatoses professionnelles. Rougeurs fessières des nourrissons (selles acides : test).

Crevasses du sein.

Démangeaison et prurit. — (La démangeaison ne se calme qu'en milieu acide. Darier.) Lésions de grattage, prurigo, strophulus, hémorroïdes, prurit anal et vulvaire.

Dermatoses parasitaires et microbiennes. — (Microbes et parasites disparaissent à pH : 5,5.) Mycoses et levurides, dyshidrose Pyodermites, furoncles, dermatoses coloniales.

Dermatoses par séborrhée (dysfonctions apocrines). — Les acnés. Kérose, pityriasis, dartres. Maladies du cuir chevelu.

Quand le savon est l'ennemi, *Lactacyd* sert d'agent de nettoyage. Enduire un tampon d'ouate (ou enduire directement), frotter longuement le visage, la peau, le cuir chevelu. Essuyer à sec ou rincer à l'eau.

Inscrit au L. N. C. M., N° 768-6.

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE (Eure).

Bureaux : 26, boulevard des Batignolles — PARIS

(Tél. : Marcadet 21-14.)

LACTAGOL

Poudre.

Nature. — Protéine galactogénique extraite par procédé spécial de la graine de cotonnier, Phosphoprotéides, Phosphates organiques assimilables.

Mode d'emploi. — Poudre agréable à prendre : 3 à 6 cuillerées à café par jour avant ou après les repas, délayée dans un liquide froid ou tiède. Ne pas chauffer.

Propriétés thérapeutiques. — Accroissement de la sécrétion lactée, enrichissement du lait en principes actifs : beurre, caséine, sels, etc.

Indications. — Agalactie, Hypogalactie, Allaitement maternel insuffisant au point de vue qualités du lait, Fatigues de l'allaitement.

Prix : La boîte entière : 17 fr. 65.

Pour un traitement de 10 à 20 jours.

(La demi-boîte : 10 fr. 40).

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-6.

LACTARIS

DÉSINFECTION INTENSIVE DE L'INTESTIN

Bactériothérapie polyvalente nouvelle

par précipité massif de cultures anaérobies facultatives.

ACIDOPHILES ET LACTIQUES STABILISÉES

Effet. — Hyperactif et toujours identique.

Présentation. — Ampoules de 6 cc. à sucer, pur, avec chalumeaux stérilisés inclus dans la boîte.

Richesse microbienne. — Env. 5 milliards de bactéries acidophiles et lactiques en symbiose, par ampoule.

Indications. — Toutes diarrhées, entérites, hyperintoxication intestinale. *Colibacillose*.

Dose moyenne. — *Adultes, enfants* : 2 ampoules par jour, 1/4 d'heure avant petit déjeuner et repas du soir.

Nourrissons : 1 ampoule, mélangée au biberon.

Prix : 26 fr. 50 la boîte de 18 ampoules (cure de 9 jours).

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS. (Prov. 20-20.)

LACTAVINAIGRE

Lacticithérapie.

Fabrication Bourgeois et Cl^e, à Ballaigues, maison fondée en 1790.

Composition. — Produit biologique de fermentation acétique et lactique, 100 p. 100 lactique, sans aucune adjonction de substances chimiques, stabilisé suivant un procédé spécial, conservation illimitée. A base :

- 1^o De babeurre, petit-lait et sérum de lait décaisés, condensés et concentrés.
- 2^o D'un ensemble de sels minér. (phosphates, chlorures, sulfates), etc....
- 3^o De vitamines.

Saveur agréable et aromatique ne rappelant en rien l'origine.

Propriétés. — Anti-toxique par son *acide lactique naturel libre et actif* (0 gr. 23 par cuillerée).

Non-agressivité et tamponnage de l'acide acétique par les sels minéraux du lait (5/6 gr. par lit.) prouvés par l'indice incontestable du pH ionique 3,40 (pH du jus de citron 2,30, des vinaigres 2,40/2,70).

Indications. — *Lactavinaigre remplace les vinaigres et jus de citron, dont il ne présente aucun des inconvénients.*

Lactavinaigre est aussi un adjuvant très rationnel comblant une lacune dans la thérapeutique des affections suivantes :

Désintoxication générale : toutes affections gastro-intestinales.

Hyperacidité, hyperchlorhydrie, dyspepsie, colibacillose.

Désensibilisation : dermatose, urticaire, eczéma.

Hypertension, diabète.

Mode d'emploi. — Au goût de chacun (à saveur égale acidité moindre) env. une 1/2 cuill. à soupe par personne avec les aliments (salade, crudités, mets divers assaisonnés), en remplace le vinaigre ou jus de citron.

Présentation — La bouteille de 75 cl. : 16. fr. 75.

Laboratoire du LACTAVINAIGRE

34, rue de Trévise — PARIS (IX^e). (Téléph. : Prov, 72-49.)

LACTÉOL-COMPRIMÉS

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés : 2 600 000 000 pour un comprimé.

Propriétés. — Il réalise une épuration biologique de l'intestin, empêche la putréfaction intestinale. Il fait disparaître les causes d'irritation locale et les troubles généraux d'auto-intoxication.

Indications. — *Enfants, adultes.*

Entérites, désinfection intestinale, Diarrhées, infection et auto-intoxication intestinales, Gastro-entérites des nouveau-nés et nourrissons.

Présentation. — Il se présente sous forme de comprimés enfermés dans un tube de verre (9 comprimés par tube).

Mode d'emploi. — 6 à 9 comprimés par jour dans un verre d'eau avant les repas.

Nourrissons : 3 à 6 comprimés par jour délayés dans un peu d'eau bouillie et sucrée (*avant les tétées*). Innocuité absolue.

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

LACTÉOL-LIQUIDE

Composition. — Culture de bacilles lactiques tyndallisés : environ 53 000 000 pour 1 cc.

Propriétés. — Il lutte contre les troubles intestinaux qui sont la règle dans les maladies infectieuses, et, en empêchant la putréfaction intestinale, il limite la production des toxines qui aggravent l'état général. (Produit tyndallisé.)

Indications. — *Enfants, adultes.*

Il est employé pour le traitement intensif. Entérites, Colites et tous les troubles d'intoxication et d'infection intestinales.

Présentation. — Le *Lactéol-liquide* est présenté en ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — 2 ou 3 ampoules par jour dans un verre d'eau sucrée avant les repas, ou mieux dans de l'eau lactosée avec une cuillerée à café de lactose.

Nourrissons : 1 ampoule dans un peu d'eau bouillie et sucrée (*avant les tétées*).

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

LACTÉOL-OVULES

Composition :

Glycérine	8 gr. 10
Bacilles lactiques.....	0 gr. 20
Pour un ovule.	

Propriétés. — Les ovules au *Lactéol* ont une action émolliente, décongestionnante et antiseptique. Les ferments lactiques exercent une concurrence vitale vis-à-vis des pathogènes et rétablissent la réaction de défense.

Indications. — Soins hygiéniques, Action curative : Vulvo-vaginites, Leucorrhées, Métrites, Ulcérations et tous les états inflammatoires.

Présentation. — Boîtes de 8 ovules enveloppés chacun dans un papier paraffiné.

Mode d'emploi. — Prendre la position horizontale, mouiller l'ovule et l'introduire profondément. Se gar-
nir à cause de suintement.

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

LACTÉOL-PANSEMENT

Composition. — Culture de bacilles lactiques tyndallisés : environ 50 000 000 pour 1 cc.

Propriétés. — Dès les premiers pansements : atténuation de la douleur, désodorisation. La plaie manifeste une activité de défense et une vitalité inaccoutumée : exsudats abondants, phagocytose intense ; elle se déterge, se nettoie, les éléments sphacelés sont éliminés et la multiplication cellulaire entraîne une réparation et une cicatrisation sensiblement plus rapides et plus correctes qu'avec les pansements habituels.

Indications. — Enfants, adultes.

Traitement des plaies, Brûlures, Eczéma, Ulcères, Phlegmons, Prostatites, Anthrax, Panaris.

Gynécologie : pertes blanches, métrites, ulcérations du col et tous les états inflammatoires.

Présentation. — Il est présenté en ampoules de 10 cc.

Mode d'emploi. — Il est important que les cellules de la plaie soient en contact avec le produit. S'il y a lieu, bien nettoyer la plaie à l'eau bouillie, *sans antiseptique*, l'arroser ensuite de *Lactéol-Pansement* et la recouvrir avec une compresse imbibée largement.

Gynécologie : pansements avec des tampons ou des mèches imbibés de *Lactéol-Pansement*, ou instillation dans la position couchée (2 ou 3 cc.).

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

LACTÉOL-SUPPOSITOIRES

Composition :

Glycérine 1 gr. 15

Bacilles lactiques 0 gr. 08

Pour un suppositoire.

Propriétés. — Action sédative, désinfectante et décongestionnante.

Indications. — *Enfants, adultes.*

Constipation chez les adultes et les nourrissons.

Hémorroïdes, rectites, états inflammatoires.

Présentation. — Boîte de 8 suppositoires, enveloppés chacun dans du papier gras.

Mode d'emploi. — Pour faciliter l'introduction, tremper le *Lactéol-Suppositoires* dans l'eau froide.

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e)

LACTIFÈRE CARRION

Composition :

Émulsion de *bacilles lactiques* sélectionnés, à 60 millions par cc., soit 300 millions par tube scellé.

Forme :

Tubes scellés de 5 cc.

Indications :

Auto-intoxications intestinales, Entérites, Constipation.

Posologie et mode d'emploi :

1 à 4 tubes scellés par jour, *per os*, dans un peu d'eau sucrée, avant les repas.

Présentation et prix :

La boîte de 12 tubes scellés : 21 fr. 75.

Durée de conservation (date indiquée sur les boîtes) : 150 jours.

Enregistré au L. N. C. n° 514-39.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTIPHAGE

Bacille lactique et bactériophage.

Boîte de 12 ampoules buvables de 10 cc.

Toutes affections intestinales.

Le *Lactiphage* est une émulsion saturée de bacille de Huppe en milieu approprié, toujours à l'état vivant, et dont la vitalité et l'activité sont de durée illimitée. A l'action des ferments lactiques, il joint celle des bactériophages polyvalents. Cette formule, entièrement nouvelle, affirme sa supériorité dans tous les cas d'infection intestinale (Shiga, Flexner, Eberth, Para A et B, Goertner, etc.). Le *Lactiphage* signale son efficacité par une sensation d'euphorie immédiate et tout à fait impressionnante.

Indications thérapeutiques. — Entérites, Entéro-Colites, Colibacilloses, Dysenteries (Shiga, Hiss, Russel, Flexner), Typhoïdes, Para A et B, Tuberculose intestinale, Diarrhées de types variés (séniles, infantiles, etc.), Appendicites chroniques, Constipation, Flatulence, Fermentations putrides et dans tous les cas où la fonction intestinale est troublée.

Posologie. — S'emploie par voie buccale, de une à deux ampoules par jour, pures ou diluées dans un peu d'eau tiède.

Aucune contre-indication, même chez les enfants.

Produits Biochimiques Rosso

Laboratoire CLÉVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor. 56-38.)

LACTOBACILLINE

Comprimés de ferments lactiques
sélectionnés.

Dose et mode d'emploi. — 3 à 9 comprimés par jour, avant ou après les repas. Aucun inconvénient à augmenter ces doses.

Propriétés thérapeutiques. — Remplacement de la flore intestinale nocive par une flore bienfaisante et modification du milieu entéral.

Indications. — Auto-intoxication intestinale, Entérites, Diarrhées, Dermatoses.
Prix : 12 francs (8 à 10 jours de traitement).

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice

NANTERRE (Seine). (Tél. : Galv. 86-17.)

LACTOBYL

Composition :

Sels biliaires	0,05
Poudre de glandes intestinales.....	0,02
Charbon poreux.....	0,02
Ferments lactiques	0,05
Poudre de laminaria flexicaulis.....	0,05

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Rééducateur intestinal.

Indications. — Toutes les modalités de la constipation.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par 2 comprimés par jour avant les repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. Aut. 81-45, lignes groupées.)

LACTOCALCINE

Comprimés.

Composition :

Ferments lactiques spéciaux..... 0,25

Excipient..... Q. S. pour 1 comprimé.

Propriétés. — Thérapeutique lactique intensive sans déminéralisation : entérites aiguës ou chroniques, intoxications intestinales.

Particularités. — Conservation presque infinie. Désintégration et développement des ferments lactiques seulement dans l'intestin.

Doses :

Nourrissons : 1 à 2 comprimés par jour.

Enfants : 4 à 6 comprimés par jour.

Adultes : 8 à 10 comprimés par jour.

Prix : 15 fr. 30.

Laboratoires LEOONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

LACTOCHOL

Composition. — Ferments lactiques. Sels biliaires.

Forme. — Comprimés et granulés (enfants et nourrissons).

Propriétés thérapeutiques. — Infections intestinales, entérites (Adultes et nourrissons), Insuffisance biliaire.

Dose et mode d'emploi (*Comprimés et Granulés*) :

Adultes : 4 à 12 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour avant les repas dans de l'eau sucrée (avaler sans mâcher).

Enfants : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café et plus par jour dans miel, confiture, avant les repas.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café de granulé avant une tétée, ou un biberon, matin et soir.

Laboratoires LOBIOA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

LACTOLAXINE FYDAU

Ferments lactiques laxatifs.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, sels biliaires, agar-agar, ph-phthaléine.

Forme. — Comprimés.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif et cholagogue. Supprime la constipation, les intoxications gastro-intestinales, les fermentations putrides, rétablit les fonctions normales de l'intestin et du foie sans la moindre irritation.

Doses. — 1 à 2 comprimés pour adultes pris le soir avec un peu d'eau.

Enfants : 1/2 comprimé suffit.

Se vend par boîtes de 6 tubes de 6 comprimés.

Prix au public : 14 fr. 55.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-1.

Laboratoires Biologiques

André PÂRIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV°).
(Tél. : Ségur 55-12.)

LACTOPROTÉIDE CARRION

Composition. — Lait homogénéisé pour injections hypodermiques ou intramusculaires.

Forme. — Ampoules de 2, 5 et 10 cc.

Indications et Posologie. — Les indications sont, dans l'ensemble, celles de la Protéinothérapie :

Infections de nature diverse : générale (gripes, fièvre puerpérale, etc.) ou localisées (suppuration, pyodermites, etc.).

Une injection intramusculaire (jusqu'à 10 cc.) le plus tôt possible, la répéter après 2 à 5 jours.

Anémies : 5 à 10 cc. tous les 5 jours.

Affections oculaires : 5 cc. tous les 2 jours.

Intolérance des enfants au lait de vache : 5 à 10 cc., puis réinjecter par doses progressives : 1/2 cc., puis 2 cc. une heure après, enfin 5 à 10 cc. une heure plus tard.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 11 fr. 70

— de 6 — de 5 cc. : 17 fr. 50

— de 6 — de 10 cc. : 20 fr. 15

Enregistré au L. N. C. n° 514-40.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTOSÉRUM CARRION-LAGNEL

Action thérapeutique. — Epuration organique dans les affections du rein, de l'appareil digestif et du système circulatoire. Restauration tissulaire au niveau des plaies.

Indications. — Néphrite, Urémie, Hypertension, Ictères et congestions hépatiques, Dyspepsies gastro-intestinales, Entérites, Colites, Cardiopathies, Artériosclérose, Pansement des plaies et brûlures.

Mode d'emploi. — En général, 200 cc. (soit le contenu d'un flacon) à jeun en deux ou trois fois. Des prises espacées peuvent être également prescrites. Il est loisible de sucrer ou d'aromatiser le Lactosérum.

Pour les pansements, imbiber les compresses ou les mèches, ou pratiquer des instillations.

Présentation et prix. — Le flacon 5 fr. 45. — La boîte de 4 flacons : 21 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. n° 514-125.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

LACTO-SÉRUM LAVRIL

Cure de désintoxication et diurèse.

Un flacon pris à jeun, en trois fois, à 20 minutes d'intervalle, pendant 4 ou 8 jours.

Diète jusqu'à midi. Régime sans laitage. Sucrer ou aromatiser à volonté (café, citron, rhum). Alcaliniser en cas d'aigreurs.

Indications. — Troubles hépatiques, cardio-rénaux, intestinaux. Intoxications, azotémie, hypertension. Entérite, colibacillose. Déséquilibres. Troubles humoraux, eczéma. Convalescence.

DIÈTE (fiévreux, opérés.)

Grande cure (de 960 cc.) : 120 cc. toutes les 2 heures. Sucrer, aromatiser, augmenter les doses à volonté. *Reminéralisation. Réhydratation. Pas de perte de poids.* Remplace les tisanes : Diète des fiévreux, Typhiques, Grands malades Préparation opératoire, Diète des opérés.

ENFANTS

Troubles d'assimilation : mélanger 30 % Lacto-sérum par biberon. *Gastro-entérites, diète :* Lacto-sérum pur toutes les 2 heures. Remplacer le lait ou l'eau en volume.

Réalimenter par mélanges très progressifs de lacto-sérum et de lait.

Cette diète peut être prolongée 8 jours sans perte de poids.

Lacto-sérum *Lavril* arrête la Gastro-entérite la plus grave.

Prix : Boîte de 4 flacons : 29 fr. 50. Flacon Grande Cure : 19 fr. 50.

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE

Bureau : 26, boulevard des Batignolles — PARIS.

(Tél. : Marcadet 21-14.)

Adopté par l'Assistance publique. N° d'inscription : 768-1.

LACTOSMOSE

(Pansement Anaseptique des plaies (BOUILLIE LACTIQUE).

UNE POUDRE (bacilles lactiques) désinfectante.

UN LIQUIDE (lacto-sérum isotonique) cicatrisant.

Toutes les indications des antiseptiques : Désinfection plus puissante et sans oxydation des tissus. Nettoyage extraordinaire, par autolyse. Activité biologique. Cicatrisation régulière en couches profondes.

Poudre et sérum réunis sur la plaie. Processus facultatif.
Ni dosage, ni précaution, ni contre-indication (sauf greffe).

Plaies externes : Saupoudrer directement, appliquer une compresse de sérum. Changer ce pansement une fois par jour, puis espacer. Poudre et liquide peuvent être employés séparément. Poudre : plaies légères, pansements d'urgence. Liquide : plaies saines. Sur plaies très douloureuses, commencer par Lacto-sérum pur ou dilué à 50 % d'eau. La poudre est ensuite bien tolérée.

Pansement vaginal : Imbiber la mèche, puis saupoudrer celle-ci.

Instillation vésicale : Mélanger Lacto-sérum avec 10 % de poudre. Instillations quotidiennes de 15 à 30 cc. Vessie douloureuse : 5 cc. L.-S.

Indications : Brûlures, Cicatrisation des plaies profondes, Exérèse, Plaies périnéales, Vagin, Seins, Rectum, Gynécologie, Accouchement, Plaies suppurantes et gangrènes (app. supp.), Plaies atones. Ulcères.

Présentations :

Type courant : 8 pansements (ampoules de 15 cc.) et poudre.. 24 fr. 50

Grand modèle : 8 pansements (flacons de 60 cc.) et poudre.... 30 fr.

Poudre Lactosmose : 1 flacon de 40 cc. de poudre..... 13 fr. 50

Laboratoires LAVRIL - PACY-SUR-EURE (Eure).

Bureaux : 26, bd des Batignolles - PARIS. (Tél. : Marc. 21-14.)

Adopté par l'Ass. Pub. — N° d'inscrip. L. N. 768-2.

LACTOSODINE

Composition et propriétés thérapeutiques. —

La *Lactosodine* renferme :

- 1° Des bacilles lactiques sélectionnés : *Bacillus lacticus* de Pasteur (le plus grand producteur d'acide lactique) ; *Bacille bulgare*.
- 2° Des sels de chaux assimilables qui neutralisent l'action déminéralisante de l'acide lactique.
- 3° Du citrate de soude dont l'action eupeptique et le pouvoir antiémétisant ne sont plus à discuter.

Présentation :

- 1° *Comprimés* : agréablement aromatisés, se dissolvant parfaitement dans un peu d'eau ou de lait tièdes ;
- 2° *Ampoules ingérables* de 5 cc. n'ayant ni odeur ni saveur désagréables.

Vitalité et conservation des B. L. — Ensemencer, avec 2 gr. 50 de poudre de comprimés, 20 cc. de bouillon de touraillons, peptonisé et lactosé : au 4^e jour, à la température de 37°, l'analyse donne 5 gr. 65 d'acide lactique. Avec des comprimés datant de 6 mois : 5 gr. 60, donc pratiquement la même quantité.

Les ampoules contiennent environ un milliard de B. L. par cc., leur activité est pratiquement la même pendant un an.

Indications. — Toutes affections gastro-intestinales de l'adulte comme du nouveau-né.

Dermatoses d'origine digestive.

Dans les gingivites et les stomatites : on obtiendra une désinfection buccale rapide en suçant, toutes les heures, un ou deux comprimés de *Lactosodine*.

En gynécologie, on utilisera comme désinfectant et désodorisant des tampons imbibés du liquide des ampoules.

Posologie :

Nourritssons : 1 à 3 comprimés par jour, dissous dans le lait tiède du biberon ; dans les cas graves d'entérite, la dose pourra être sans crainte augmentée, la *Lactosodine* étant tout à fait inoffensive, ou les comprimés pourront être remplacés par une demi-ampoule.

Enfants : de 3 à 10 ans : 4 à 6 comprimés ou une ampoule par jour, avant le repas.

Adultes : de 4 à 10 comprimés ou de 2 à 3 ampoules par jour, avant le repas.

Mode d'emploi. — Sucrer les comprimés ou les faire dissoudre dans un peu d'eau tiède sucrée.

Verser le contenu des ampoules dans un verre d'eau sucrée ou lactosée.

La *Lactosodine* assure l'antiseptie du tube digestif sans déminéralisation.

Prix : Comprimés : 18 francs. Ampoules : 19 francs.

Laboratoires de l'UROÏDINE

17 bis, rue Juge — PARIS (XV^e).

Tél. Suffren 41-22.

LAITANCYL

Reconstituant général sans équivalent ni similaire.
Deux formules :

1° *Laitancyl simple*, comprimés dragéifiés de laitances de harengs, très riches en phosphore, desséchées dans le vide et à froid, sans goût ni odeur.

Leur action est renforcée par de l'huile de germe de blé (vitamine E), de l'Huile de flétan (Vitamine D), de la Cérébrine et de l'inositophosphate de chaux et de magnésie.

2° *Laitancyl méthylarsiné*, même formule additionnée d'arrhéнал (0,008) et de fenugrec désodorisé et dés-huillé.

Propriétés. — Le *Laitancyl* est un reconstituant général de tout premier ordre et un excellent aliment phosphoré.

Indications. — Anorexie, amaigrissement, surmenage physique et intellectuel, asthénie post-grippale, rachitisme, toutes adynamies et débilités.

Posologie :

Adultes : 4 à 5 comprimés par jour.

Enfants (à partir de 7 ans), 3 comprimés.

Prix : 20 francs le flacon de 80 comprimés.

Laboratoire du Laitancyl: R. PANIER
MALO-LES-BAINS (Nord).

LAIT CALCIQUE ZIZINE

Lait sec, partiellement écrémé et décaséiné.

Forme. — Poudre.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment de transition pour la reprise du régime lacté. Alimentation des nourrissons dyspeptiques et eczémateux.

Indications. — Chez les vomisseurs, les diarrhéiques, les dyspeptiques, les eczémateux, les nouveau-nés privés du sein et dans tous les cas d'intolérance lactée.

Mode d'emploi. — Pour préparer un biberon, ajouter à 100 cc. d'eau bouillie à peine tiède et sucrée à 5 p. 100 2 mesures de lait calcique sec. Agiter pour dissoudre.

Pour une quantité supérieure, verser une mesure par 50 cc. d'eau supplémentaire.

Pour la préparation des décoctions farineuses, l'eau bouillie peut être remplacée par une quantité égale de décoction de riz ou d'orge, sucrée ou non, suivant les indications du médecin.

Les bouillies au LAIT CALCIQUE sont préparées avec 50 cc. de bouillie tiède pour une mesure de LAIT CALCIQUE ZIZINE.

Valeur calorique du lait ainsi reconstitué :
685 calories environ.

Prix : 10 fr.

Laboratoires du Dr. ZIZINE

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

LAIT DARDELET (MODIFIÉ)

pour Nourrissons.

Lait humanisé n° 1 (Système Backauss modernisé).
Semblable par sa composition et sa structure au lait de femme. Ne contient ni eau surajoutée, ni antiseptique. Allaitement de tous les nourrissons, et spécialement des intolérants au lait, des prématurés, etc.

Lait humanisé n° 2. Même préparation que le précédent, mais composition intermédiaire entre le n° 1 et le lait de vache. Tous mes produits sont homogénéisés et donnent un coagulum semblable à celui du lait de femme. Conservation sous le vide.

Babeurre Dardelet (Voir rubrique *Babeurre*).

Mode d'emploi. — Pour tous mes produits, faire tiédir au bain-marie et donner pur ; mêmes doses que le lait maternel.

Prix. — En bouteilles (départ usine) 1/4 de litre : 3 francs.
Caisses de 25 ou 50 bouteilles.

Maison ouverte tous les jours, même le Dimanche.
Fournitures gratuites aux Hôpitaux.

J. DARDELET, Maison fondée en 1922.

BONNARD (Yonne) — (Tél. : 4.)

La Maison est à la disposition des Docteurs désirant entreprendre la *Maternisation* à leurs gouttes de lait.

LAIT DÉCHLORURÉ GUIGOZ

(Concentré à 2 1/2 pour 1, stérilisé non sucré.)

L'extraction du chlorure de sodium est obtenue par dialyse. Ce lait, qui conserve la saveur agréable d'un bon lait naturel, est un précieux agent thérapeutique *diurétique* et *déchlorurant*.

Après reconstitution, sa teneur, exprimée en Cl Na, est réduite à 0 gr. 023 par 100 cc., soit au huitième du lait complet.

Indications. — Toutes rétentions chlorurées : Néphrites, Ascites, Hypertension avec insuffisance rénale, Hyperchlorhydrie, Albuminuries, Néphropathies gravidiques, Accélération de l'accouchement.

Mode d'emploi. — La dilution normale, mais non obligatoire — notamment pour les hypertendus, — est de une fois et demie son poids, soit pour une boîte de 500 gr. dans 750 gr. d'eau bouillie.

Les aromates permis par le régime peuvent lui être ajoutés. Ne jamais tolérer l'ingestion d'aucun aliment, quel qu'il soit, pendant la digestion du produit.

Voir :

Lait en poudre *Guigoz* ; Lait Dextrosé Malté *Guigoz* ; Babeurre *Guigoz* ; *Ravix* (Lait *Guigoz* irradié).

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAIT DE MAGNÉSIE BEYTOUT LACTOMA

Composition. — Hydroxyde de Magnésie porté à une division extrême comparable à l'état colloïdal. Stabilité parfaite.

Indications et Posologie. — Toutes constipations, Constipation des enfants, constipation des vieillards, constipation des femmes enceintes : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Comme anti-acide : Aphtes, Stomatites, Gingivites, Pyrosis, Hyperchlorhydrie, 1 à 2 cuillerées à café diluées dans l'eau, après chaque repas.

Enfants : demi-doses.

Avantages. — Aucune contre-indication. Ne provoque pas de coliques. Ne congestionne pas le petit bassin. Goût agréable. (Jus de citron facultatif.)

Présentation et Prix :

Triple flacon 360 cc 20 fr. 40.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

LAIT DE MAGNÉSIE PHILLIPS

Combinaison chimique définie de magnésie et d'eau (hydroxyde de magnésium) ne contenant aucun excipient destiné à maintenir la magnésie en suspension.

Propriétés thérapeutiques. — Anti-acide, Sédatif gastrique, Laxatif.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies acides et nerveuses, Eructations, États bilieux, Constipation, Coliques, Diarrhées d'origine dyspeptique.

Posologie. — *Anti-acide.* Adultes. — D'une cuillerée à café à une cuillerée à soupe dans un verre d'eau froide, 2 heures après les repas. Enfants : 1/2 à une cuillerée à café. Nourrissons : X à XX gouttes suivant l'âge.

Laxatif. Adultes. — D'une à quatre cuillerées à soupe dans un verre d'eau ou de limonade, une heure et demie avant le petit déjeuner du matin. Enfants : de une à deux cuillerées à café. Bébés : une demie à une cuillerée à café, suivant l'âge.

Anti-acide buccal. — Après s'être brossé les dents, bien se rincer la bouche avec une cuillerée à soupe de Lait de Magnésie Phillips. Il se forme sur les dents et les gencives une pellicule alcaline qui dure plusieurs heures et les protège contre les attaques de l'acide.

Présentation : flacon de 120 cc., triple-flacon de 360 cc. environ.

Échantillons et Littérature sur demande à

O. O. P.

108, rue de Picpus — PARIS (XII^e).

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

Préparé avec le lait de la Gruyère (Suisse), est livré sous 3 formes : Lait complet, lait demi-écrémé, lait complètement écrémé.

Traité par un procédé tout à fait spécial, dans le vide, à une température de 50°, conserve indiscutablement toutes ses vitamines et dispense de l'adjonction du jus de fruits. C'est un lait vivant. Par sa coagulation légère, facilement fragmentable, par son extrême digestibilité, il se rapproche du lait maternel.

Indications. — *Pour nourrissons* : Diététique idéale des bébés privés, partiellement ou totalement, du lait maternel. Athrepsie, dyspepsies, diarrhées, coliques, gastro-entérites, hypotrophies, réalimentation, vomissements.

Pour les adultes : Intolérances lactées. Affections du foie et de l'estomac. Alimentation post-opératoire. Suralimentation.

Dose. — Une partie (en poids) de lait GUIGOZ pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de lait GUIGOZ pour 45 à 50 gr. d'eau. Ne pas ajouter de sucre.

Voir : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Babeurre GUIGOZ.} \\ \text{Lait dextrosé-malté GUIGOZ.} \\ \text{Lait déchloruré GUIGOZ.} \\ \text{Ravix (lait irradié).} \end{array} \right.$

Littérature et Échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, r. Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e). — (Tél. : Wag. 66-76 et 77.,

LAIT EN POUDRE GUIGOZ

(Dextrosé-malté.)

Identique au Lait en poudre Guigoz, $\frac{1}{2}$ écrémé, mais sans adjonction de saccharose, ce dernier étant remplacé par « Dextrose et Maltose ».

Indications. — *Pour nourrissons* : Intolérance au saccharose, Constipation, Fermentation intestinale, Eczéma.

Doses. — Une partie (en poids) de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 6 parties d'eau tiède bouillie, soit environ une cuillerée à soupe de Lait Guigoz (dextrosé-malté) pour 45 à 50 gr. d'eau.

Voir : $\left\{ \begin{array}{l} \text{Lait en poudre GUIGOZ.} \\ \text{Babeurre GUIGOZ.} \\ \text{Lait déchloruré GUIGOZ.} \\ \text{Ravix (lait irradié).} \end{array} \right.$

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

LAIT MONT BLANC

LAIT CONCENTRÉ SUCRÉ

Composition moyenne :

Eau.....	74.00 %
Matières grasses (beurre).....	10.20 %
Matières protéiques et azotées (caséine, albumine).....	9.80 %
Lactose (sucre de lait).....	13.40 %
Saccharose (sucre cristallisé).....	40.75 %
Cendres.....	1.85 %

Calories : environ 350 par 100 gr.

100.00 %

Principales indications. — *En alimentation infantile* : C'est l'aliment idéal des nourrissons normaux privés de lait maternel, ainsi que de tous ceux atteints de troubles de la digestion ou de la nutrition, d'arrêt de croissance et de rachitisme, et d'une façon générale aux prématurés, débiles et intolérants aux autres laits.

Chez les *grands enfants et les adultes*, il est recommandé en cas d'entérite, de dyspepsie, de tuberculose intestinale ou pulmonaire, ainsi que dans les régimes de suralimentation.

Posologie et mode d'emploi. — Pour la reconstitution d'un lait normal, se reporter aux indications figurant sur l'étiquette des boîtes.

Vente. — Pharmacies, herboristeries et maisons d'alimentation.

LAIT CONCENTRÉ NON SUCRÉ HOMOGÉNÉISÉ

Composition moyenne :

Eau.....	72. » %
Matières grasses (beurre).....	8. » %
Matières protéiques et azotées (caséine, albumine).....	8. » %
Lactose (sucre de lait).....	10.50 %
Cendres.....	1.50 %

Total... 100. » %

Principales indications. — *En allaitement mixte ou artificiel*, en cas d'intolérance pour le lait sucré. Chez les *enfants et les adultes* lorsque le lait frais fait défaut ou est de qualité médiocre.

Posologie et mode d'emploi. — Pour la reconstitution d'un lait normal, se reporter aux indications.

Ce lait étant stérilisé, il ne faut pas le faire bouillir.

Vente. — Maisons d'alimentation.

LAIT NATUREL HOMOGÉNÉISÉ STÉRILISÉ

Caractéristiques et avantages. — *Pur*, donc sans adjonctions, *entier*, donc non écrémé, *naturel*, donc liquide et non concentré, ce lait est simplement *homogénéisé* pour en augmenter la digestibilité, puis *stérilisé* pour en assurer la conservation.

Composition moyenne :

Eau.....	87.40 %
Matières grasses (beurre).....	3.65 %
Matières protéiques et azotées (caséine, albumine).....	3.60 %
Lactose (sucre de lait).....	4.65 %
Cendres.....	0.70 %

Total.... 100. » %

Principales indications. — Chez les *nourrissons* débiles ou prématurés, à ceux qui ont une tendance à la constipation, aux vomissements, ou qui sont prédisposés à l'eczéma.

Chez les *enfants plus âgés et les adultes* : en dermatologie, pour les cures de désintoxication, le traitement de l'eczéma, etc... ; en gastro-entérologie étant donnée son assimilation facile due à l'homogénéisation ; chez les *malades atteints de cancer d'estomac, de sténose ou spasmes du pyllore*, etc., pour lesquels il constitue un aliment complet se comportant exactement comme un liquide qui ne coagule pas.

Posologie et mode d'emploi. — Etant liquide, entier et non concentré, il se dose comme du lait de vache ordinaire. Au point de vue conservation, il se comporte comme du lait concentré non sucré. **Eviter l'ébullition et réchauffer simplement au bain-marie. Jus de fruits** comme pour le lait concentré non sucré.

Vente. — Pharmacies et herboristeries.

Echantillons, littérature et prix sur demande.

Compagnie Générale du Lait, RUMILLY (Haute-Savoie).

LAITS CARRION

Préparés, aussitôt après la traite, à la laiterie Carrion d'Avesnes-en-Bray (Normandie).

Lait alimentaire : homogénéisé et stérilisé.

Lait demi-dégraissé : homogénéisé et stérilisé.

Diluer ces deux laits avec de l'eau bouillie, jusqu'au huitième mois.

Lait humanisé, homogénéisé et stérilisé.

Lait écrémé, centrifugé et stérilisé.

Babeurre acide et babeurre doux.

Bouillies au babeurre, maltées et autres, sur demande.

Laits fermentés Carrion-Lagnel. — *Kéfir* et *Yohourth* (livraison dans Paris et Neuilly).

Pour leur fabrication domestique, voir « Kéfirogène » et « Yohourthogène ».

Présentation et prix :

Lait alimentaire, demi-dégraissé ou humanisé : la bouteille de 200 grammes : 1 fr. 75 ;
la bouteille de 400 grammes : 3 francs.

Lait écrémé : la bouteille de 400 grammes : 2 fr. 50.

Babeurres : le flacon de 250 cc. : 3 francs.

Bouillies au babeurre : le flacon de 250 cc. : 5 francs.

Kéfir : le flacon de 200 cc. : 2 fr. 50.

Yohourth : 1 fr. 50 et 2 fr. 50 suivant modèle.

Laboratoires CARRION-LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott
PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 40-30.)

LAMBARÈNE

Composition : Extrait sec de racines de *Tabernanthe Manni*, dosé à 0 gr. 20 d'extrait par comprimé, 0 gr. 12 par suppositoire « Adultes », 0 gr. 10 par dragée kératinisée, 0 gr. 04 par suppositoire « Enfants ».

Action thérapeutique : Stimulant neuro-musculaire, excite les combustions cellulaires et efface la fatigue. Action toujours prolongée et non suivie de dépression.

Indications : Dépressions et asthénies physiques et intellectuelles, convalescences de maladies et d'opérations, maladies infectieuses, intoxications, sédentarité et cellulites, effort physique ou intellectuel anormal à fournir par un sujet sain.

Doses et mode d'emploi : *Comprimés* (à laisser fondre dans la bouche), 2 à 4 par jour. *Suppositoires* « Adultes et Enfants », 1 à 3 par jour. *Dragées* kératinisées (à avaler), 4 à 8 par jour.

Pas de contre-indications (sauf hyperthyroïdie). *Peut être administré aux hyperlendus.*

Recommandations importantes : Faire prendre les comprimés avant les repas du matin et de midi, et éviter d'employer les suppositoires le soir. Par contre les dragées kératinisées, en raison de leur action moins immédiate, peuvent être données le soir (par exemple 3 au coucher et 3 dans la matinée).

Éviter d'absorber une boisson alcoolique *en même temps* que le *Lam-barène* ou immédiatement après.

Prix : Boîte de 20 comprimés	25 fr. 50
Boîte de 10 comprimés	15 fr. 30
Boîte de 40 dragées kératinisées	25 fr. 50
Boîte de 10 suppositoires « Adultes »	22 fr. 45
Boîte de 10 suppositoires « Enfants »	18 fr. 35

Laboratoires du LAMBARÈNE

5 bis, rue de Berri — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Elysées : 41-85.)

LANCERYL

Composition. — Formule de Lancereaux :

Digitale Standard	} 25 0,05.
Scille	
Scammonée	

Avantages. — Composants stabilisés et titrés **physiologiquement**. Complexe préparé à l'abri de toute humidité conservant une valeur thérapeutique constante.

Action. — Toni-cardiaque, diurétique albuminurique et azoturique. stimulant hépatique.

Indications. — Cardiopathies subaiguës et chroniques, œdèmes périphériques, rétention chlorurée et azotémique, cirrhoses, congestions du foie et toutes affections hépatiques.

Posologie. — 3 à 5 pilules par jour pendant 10 jours. Arrêter 5 jours et recommencer. Dose pouvant être modifiée au gré du médecin traitant, car LANCERYL est de prescription uniquement médicale.

LANCERYL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1009-1.

Prix : 21 fr. 20 (Taxe d'armement comprise).

Laboratoires E. MOREAU, Pharmacien

13, rue des Nonnains-d'Hyères — PARIS.

(Tél. Turbigo 87-05.)

LANSOYL

Huile de paraffine chimiquement pure exempte de substances cancérogènes, très visqueuse et de densité très élevée. Sans goût ni odeur.

Forme gelée. — 90 p. 100 de Lansoyl liquide et 10 p. 100 de sucres de fruits et d'agar-agar. Goût, odeur et aspect d'une véritable gelée de fruits. Parfait pour enfants, vieillards et personnes à estomac délicat.

Propriétés thérapeutiques. — Lubrifie l'intestin, le décongestionne, régularise ses fonctions.

Indications. — Constipation chronique, inflammation, Entéro-colite, Flatulences, Coliques, et en général toutes les affections ayant pour cause la constipation.

Doses. — *Adultes* : 2 cuillerées à café matin et soir. *Enfants* : une cuillerée à café matin et soir. Augmenter ou diminuer légèrement suivant l'âge de l'enfant.

Prix :

Liquide G. M. (20 jours de traitement).....	23 fr. 85
— P. M. (10 — —).....	14 fr. 30
Gelée (12 — —).....	16 fr. 85

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jaenin — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 39-70.)

LANTOL

Anti-infectieux omnivalent.

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de rhodium (Procédé Couturieux); en ampoules de 3 cc. par boîtes de 4 ampoules.

Action thérapeutique. — Colloïde isotonique, non toxique et indolore. Provoque la baisse de la température, une sensation de bien-être notable et une *hyperleucocytose intense et durable*, suivie de la destruction des agents infectieux localisés ou disséminés dans l'organisme.

Indications. — 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses, dans toutes les septicémies, gripes, pneumonies, péritonites, scarlatines, typhoïdes et tous états infectieux hyperthermiques.

Enfants : Une à deux ampoules par jour en *injection* ou en *lavement* à conserver.

Prix : 34 fr. 30 pour 1 à 8 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

Tél. : Carnot 18-75.

LARISTINE « ROCHE »

Composition. — Solution isotonique neutre et stérilisée à 4 p. 100 de chlorhydrate d'histidine.

Propriétés. — Traitement biochimique de la maladie ulcéreuse gastro-duodénale d'après les travaux des professeurs A.-G. Weiss et E. Aron, qui ont mis en évidence l'action anti-ulcéreuse remarquable de l'histidine. Régression rapide sans régime strict de tous les symptômes, douleurs, hémorragies, vomissements, susceptibilité gastrique. Reprise immédiate de l'état général.

Indications. — Ulcère gastro-duodéal sous toutes ses formes, Préparation à l'intervention, Consolidation des résultats opératoires et aussi Angor, Asthme, Epigastralgies, Rhume des foins, etc.

Posologie et modes d'emploi. — 1 ampoule de 1 cm³. = 0,04 monochlorhydrate d'histidine ; 1 ampoule 5 cm³. = 0,20 monochlorhydrate d'histidine. Une injection quotidienne intramusculaire ou sous-cutanée d'une ampoule de 5 cm³. ou intradermique d'une ampoule de 1 cm³. pendant trois semaines environ.

Aucune toxicité. Pas de contre-indication.

Présentation. — Ampoules de 5 cm³. et 1 cm³. : boîtes de 6.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-65.

**Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE
et Cie**

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

LAROSAN « ROCHE »

Composition. — Caséine-Calcium. Spécifique de la diarrhée infantile.

Propriétés. — Alcalinisation du milieu intestinal, suppression du petit lait, apport minimum de sucre, taux élevé de caséine.

Indications. — Diarrhées infantiles et troubles dyspeptiques des nourrissons (diarrhée simple, lentérique verte, infectieuse, cholériforme, diarrhées de dentition, de sevrage, athrepsie, etc.). Diarrhées toxiques des enfants et des adultes, Etats dyspeptiques des adultes, Ulcère de l'estomac, etc.

Posologie et modes d'emploi. — On prépare des mélanges : eau bouillie, lait, Larosan, contenant 2 cuillerées à soupe et plus de Larosan « Roche » par litre. L'administration de ces mélanges et la conduite de la cure sont variables selon les cas. Poudre : boîte de 100 g.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-20.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). (Tél.: Arch. 91-10.)

LAROSCORBINE « ROCHE »

Soutien Indispensable de l'organisme carencé.

Composition. — Acide *l*-ascorbique. Vitamine C synthétique cristallisée.

Propriétés. — Favorise tous les phénomènes d'oxydo-réduction au cours des divers processus biologiques. Action anti-infectieuse et anti-toxique très nette. Joue un rôle évident de désensibilisateur (allergies).

Indications. — Décalcification des os et des dents, Altération des vaisseaux, Troubles de la nutrition au cours de la grossesse, Anémie et troubles de la croissance des nourrissons, Diathèses hémorragiques, Maladie des capsules surrénales et pigments cutanés, Hémorragies du vitré, Rétinite pigmentaire, Scorbut infantile, Anaphylaxie, etc.

La fréquence de l'hypovitaminose C a pu être constatée par un simple test et par une méthode simplifiée de titration qui repose sur la réduction, par la vitamine C, du *dichlorophénol-indophénol* qui est transformé en leuco-dérivé incolore.

Posologie et modes d'emploi. — *Comprimés* à 50 mg. d'acide *l*-ascorbique, 1 à 4 par jour. — *Ampoules de 2 cm³* à 100 mg. d'acide *l*-ascorbique, 1 à 2 par jour, sous-cutanées ou endoveineuses. — *Ampoules de 5 cm³* à 500 mg. d'acide ascorbique (dosage fort), 1 par jour, et plus, sous-cutanées ou endoveineuses.

Ampoules de 2 cm³ : boîte de 6 ; *Ampoules de 5 cm³* : boîte de 3 ; *Comprimés* : tube de 20.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N^{os} 504-71 (comprimés), 504-72 (ampoules de 2 cm³) et 504-89 (ampoules de 5 cm³).

Produits F. HOFFMANN-ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

LASAL

Spécifique des maladies des voies respiratoires et de leurs convalescences.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et en même temps reconstituant par l'association d'un tonique (Glefina) (voir ce mot). Bonne saveur, ne provoque pas d'intolérance.

Composition. — Ortosulfogalacolate de potassium, sirop de sève de pin, de goudron, de baume de tolu, associés à une partie de Glefina reconstituant (voir ce mot).

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires et particulièrement leurs convalescences, bronchite chronique, rougeole, coqueluche, tuberculose, grippe, etc.

Posologie:

Enfants : 3 à 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

— 6 à 10 ans : 2 à 3 — à dessert par jour.

— 11 à 15 ans : 2 — à soupe par jour.

Adultes : 3 cuillerées à soupe par jour.

LASAL est enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le numéro 689-12.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Laboratoire du GLEFINA,

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

LAURÉNOL MÉDICINAL

Chloro-aluminate de zinc sulfo-cuprique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, désodorisant, ni toxique, ni caustique.

Indications. — En chirurgie, gynécologie, obstétrique, brûlures, dermatologie, hygiène, médecine générale.

Mode d'emplol. — Pansements, injections vaginales. Puissance antiseptique absolue (solution 3 p. 100).

Doses. — Suivant les indications.

Le litre : 10 fr. 40. — Le demi-litre : 6 fr. 50.

Formes actives. — SAVON LAURÉNOL (antisepsie, toilette). — SAVON DENTIFRICE au Laurénol (asepsie buccale, 24 h.). — OVULES au LAURENOL (métrites, vaginites, pertes, etc.). — POMMADE au LAURENOL (affections de la peau).

LAURENOL N° 2, désinfectant, sans odeur ni mercure.

Savon Laurénol 4 fr. 20. — Savon dentifrice : 6 fr. 25.

Laurénol n° 2 :

Le litre : 6 fr. 25. — Le demi-litre : 4 fr. 20.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LAXAMALT

50 % huile de paraffine, 50 % extrait de Malt.
Poudre cristalline d'un goût très agréable.

Posologie :

Nourrissons : 1 cuillerée à dessert administrée le soir dans le dernier biberon ou dans un peu d'eau bouillie.

Enfants : 2 cuillerées à soupe par jour avant ou après les repas ou le matin à jeun et le soir avant de se coucher.

Adultes : 3 ou 4 cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Laxatif physiologique dépourvu de toute action irritante sur l'intestin.

Particulièrement indiqué chez les entéritiques, les nourrissons, les femmes enceintes et les opérés.

Prix : 17 fr. 85.

Laboratoires LICARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.

(Tél. : Maillot 17-75.)

LAXASEPTOL

Trois présentations :

GRANULÉ SIMPLE

GRANULÉ ■ILIE pour enfants.

Constipation. Antiseptique intestinal léger. Insuffisance hépatique. Intoxications alimentaires. Affection à point de départ intestinal.

Posologie. — 1 à 2 ans : 1/2 cuillerée à café le soir ;
 2 à 5 ans : 1 cuill. à café ; 5 à 12 ans : 2 cuill. à café.

DRAGÉES pour les adultes.

Laxatif non irritant. Constipation chronique ou passagère. Rééducation de l'intestin. Laxatif de choix pendant la grossesse.

Posologie. — De 1 à 3 dragées le soir au coucher.

Formule. — Diacétyllsatine avec ou sans bile.

Ne contient pas de Phénolphtaléine.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-3-4-5.

Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BÉTHUNE
 (Pas-de-Calais).

LAXATIFS MIRATON CHATEL-GUYON

PASTILLES MIRATON CHATEL-GUYON. —

Laxatif hydrominéral aux sels de la source Miraton Châtel-Guyon, stimulant idéal du péristaltisme intestinal, non irritant.

Dose. — 1 à 2 pastilles, le soir au coucher.

Prix : la boîte 8 francs.

Pour un traitement de 20 à 30 jours.

GRAINS MIRATON CHATEL-GUYON. —

Sels de la Source Miraton Châtel-Guyon associés à l'extrait total des glandes intestinales, à l'extrait biliaire et aux ferments lactiques. Régulateur physiologique de l'intestin, non irritant, sans accoutumance.

Dose. — 1 à 2 grains au repas du soir.

Prix : le flacon 9 fr. 10

Pour un traitement de 30 à 50 jours.

Enregistré au Laboratoire National n° 218-7 (grains
n° 218-8 (pastilles).

Littérature et échantillons :

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

LAX - HORMONE « LIPO »

Composition. — A base de Vitamine B₁ et d'Hormones intestinales.

Propriétés et indications. — Traitement opothérapique de la constipation. Tonifie la musculature du tube digestif. Stimule physiologiquement le fonctionnement intestinal.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cachets par jour.

Boîte de 30 cachets de 1 gr.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

LAXIOR

Rééducateur de l'Intestin.

Indications. — Traitement complet de la constipation sous toutes ses formes : Atonie intestinale, Entéro-colite, Spasme intestinal, Insuffisance biliaire.

Composition. — Agar-agar pulv., Cascara sans amertume, Ferments lactiques sélectionnés sur culture, Hépatine pure, Entérokinase, Magnésie calcinée.

Propriétés. — A pour but de rééduquer l'intestin ; ce n'est donc pas un purgatif ni un simple laxatif d'action mécanique ou drastique. Son emploi est indiqué dans tous les cas de constipation chronique et son action est douce, sans accoutumance ni douleurs.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cachets par jour, le matin au lever et le soir au coucher.

Prix. — La boîte de 40 cachets : 18 francs.
Littérature et échantillon sur demande aux

Laboratoires PILLIER

8, 10, rue Masséna — NICE (A.-M.)

LAXIRIS

Forme. — Comprimés dragéifiés et glutinisés.

Composition. — Oléate de soude, extrait de bile dépigmentée et décholestérinée.

Indications thérapeutiques. — Constipation, insuffisance hépatique, ictères, congestion du foie, lithiase biliaire, cirrhoses, constipation, colites.

Ni coliques, ni irritation, ni accoutumance.

Contre-indications : suspendre usage pendant les crises de coliques hépatiques.

Posologie. — *Doses préventives :* 2 dragées après le repas de midi.

Doses moyennes : 2 dragées après le repas de midi, 2 après le repas du soir.

Prix : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

LAXOFCO

Lactosérum frais, stérile de lait OFCO.

Chaque flacon contient 40 cc. de Lactosérum frais, stérile, préparé à partir de Lait OFCO, provenant d'étables soumises au Contrôle officiel (décret du 15 novembre 1927), exempt de toxine tuberculeuse.

Indications. — Traitement physiologique de l'insuffisance hépatique et de la constipation. Cholagogue. Constipation des accouchées.

Posologie. — 1 flacon, sans dilution, tiède ou froid, à jeun, 1/2 heure avant le petit déjeuner. Suivant les réactions constatées, fixer pour le lendemain 2 flacons à 1/2 heure d'intervalle, ou seulement 1 flacon.
Enfants : 1/2 dose.

Prix : La cure de 7 flacons de 40 cc. : 24 fr. 50.

M. GUILBAUD, Pharmacien

25, avenue Michelet — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Clignancourt 04-31.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1833.

LAXOPEPTINE GIRARD

Ferments de céréales contenant leurs Vitamines.
Citrate de soude, Eupeptiques, poudre agréable à prendre.

Mode d'emploi. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café par jour dans lait ou eau bouillie.

Enfants : doubler ou tripler les dosés.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des fonctions digestives, antiseptique intestinal, laxatif idéal des nourrissons et jeunes enfants.

Indications. — Ballonnements, Gastro-entérites, Maladies infectieuses ou fébriles d'origine digestive, Vomissements du nourrisson et de l'adulte, Constipation infantile.

Prix : le flacon 12 fr. 80.

Pour un traitement de un mois environ.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-4.

LAXO-PSYLLIUM LANDON

Composition. — Semences sélectionnées de psyllium noir, associées à l'extrait fluide de cascara, sagrada désamérisé à la dose de 0 gr. 05 d'extrait de cascara pour une cuillerée à café de Psyllium.

Propriétés. — Régulateur intestinal d'action doucement laxative.

Indications. — Constipation. Formes non irritables de la stase intestinale chronique.

Posologie. — Une, deux ou trois cuillerées à café à chaque repas. Peut être associé utilement à l'huile de paraffine.

Mode d'emploi. — A prendre de préférence au début du repas, avec un quart ou un 1/2 verre d'eau.

Prix au public : 22 francs la boîte.

Laboratoire Central de CHATEL-GUYON

M. LANDON, Pharmacien

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme).

LAXO-THIORINE

Désintoxicant. Désensibilisant. Laxatif.

Soufre, Hyposulfites Na et Mg, Extraits biliaires, Pancréatine, Extraits d'Artichaut, de Boldo, Aloïne, Poudre de Belladone.

Indications. — Auto-intoxication par stase intestinale. Accidents anaphylactiques, Insuffisance hépatique, Migraines, Dermatoses, Acné, Urticaire, Eczéma, Constipation.

1 à 4 comprimés par jour.

Boîte de 50 : 13 francs.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE,

J. DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

LÉCIFLÉTONE

Première application française de la synergie Huile de flétan + Phosphatides de l'œuf titrant :

Vitamine A	= 10 000 U. I.	} par gramme.
Vitamine D	= 2 500 U. I.	
Lécithine de l'œuf	= 0 gr. 04	

Indications. — Carences, Précarences, Convalescences, Tuberculose, Maladies infantiles.

Posologie.

Nourrissons : II à IV gouttes.

Enfants : V à X gouttes.

Adultes : XV à XXV gouttes aux repas.

Prix : 25 francs.

Documentation. Echantillons.

Laboratoire JOUENNE

234, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

LÉCITHINE VACHERON

Granulé dosé à 0 gr. 10 de lécithine par cuillerée à café.

Propriétés thérapeutiques. — Elle accélère les échanges nutritifs, accroît les forces, augmente très rapidement le poids du corps et le nombre des globules rouges du sang, tonifie la cellule nerveuse.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, affections du cerveau et de la moelle; Chlorose, diabète, rachitisme; Convalescences longues et pénibles.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 17 francs.

Produits GONNON

J. et O. CONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

LEMONAÏ

Granulé stable très agréable.

Composition. — Chaque cuillerée à café contient :

Citrates trisodique et monosodique .. 0 gr. 50

Iodure de Sodium 0 gr. 05

Granulé sucre friable spécial stable. Q. S.

Propriétés. — Antivisqueux, Fluidifiant de la circulation sanguine, Antipléthorique, Décongestif, Cholagogue.

Indications. — Troubles de la circulation artérielle et veineuse, tous états congestifs, hyperviscosité, hypertension, arthritisme et ses séquelles.

Présentation et prix. — La boîte de granulés : 18 francs.

Posologie. — *Traitement classique* : 1 cuillerée à café avant les deux principaux repas.

Traitement d'attaque : 1 et même 2 cuillerées à café le matin à jeun avec un jus de fruit ou un verre d'eau minérale. En plus 1 cuillerée à café avant la collation du soir.

Enregistré L. N. C. : n° 1483-1.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires biochimiques de l'Est

J.-H. FRECHIN

Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur,
LURE (Haute-Saône).

LENADRYL

(Huile rhinologique)

Composition. — Antiseptiques végétaux, camphre, eucalyptol, terpinéol, en solution huileuse spéciale adrénalino-éphédrinée (formes lévogyres).

Propriétés. — Synergie lénifiante, vaso-constrictive, décongestive et antispasmodique. Bactéricide, analgésique, cicatrisant. Ni caustique, ni toxique. Ne dessèche pas la muqueuse.

Indications. — Coryzas aigus et chroniques, rhumes des foins, sinusites, ozène, trachéites, laryngites ; inflammations et infections du rhino-pharynx, asthme.

Mode d'emploi. — **Formes :**

Flacon compte-gouttes spécial : X à XII gouttes matin et soir dans chaque narine, la tête penchée en arrière et du côté de la narine traitée.

Capsules nasales :

Adultes et auto-injections : 1 capsule dans chaque narine.

Enfants : une demi-capsule dans chaque narine, 3 à 5 fois par jour.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

LENIBAR Granulé

Nouveau pansement du tube digestif à grand pouvoir couvrant.

Principes actifs. — Sulfate de baryte précipité, oxyde et peroxyde de Zn et charbons activés.

Indications. — Douleurs gastro-intestinales (traitement usuel), Entérites, Hyperchlorhydrie, Fermentations.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

Le matin à jeun, une demi-heure avant les repas et au moment des douleurs.

Croquer ou avaler avec un demi-verre d'eau.

Prix : 16 fr. 35 la boîte de 100 grammes.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

LENIBAR Poudre

Nouveau pansement du tube digestif à grand pouvoir couvrant.

Principes actifs. — Sulfate de baryte précipité, oxyde de titane.

Indications. — Ulcères gastro-duodénaux (traitement intensif), Crises aiguës d'hyperchlorhydrie, Spasmes, Colites.

Doses et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 3 sachets par jour.

Enfants : 1/2 sachet à 1 sachet 1/2 par jour.

Le matin à jeun, une demi-heure avant les repas et au moment des douleurs, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède, jamais chaude.

Prix :

25 fr. la boîte-portefeuille 16 sachets.

70 fr. la boîte grand modèle 50 sachets.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

LENIENTOL

Composition. — Seule préparation présentant sous la *forme liquide* l'association médicamenteuse : phényléthylmalonylurée et tartrate borico-potassique. — Sans bromure.

Indications. — Mal Comitial, Epilepsie, Crises nerveuses, Insomnies, Angoisse, Spasmes divers, Chorée, Troubles névropathiques en général, etc.

Deux formes :

Lenientol adultes. — Prix : 23 francs.

Une cuillerée à soupe contient :

Phényléthylmalonylurée ..	0,05 cgr.	} 1 flac. dure env. 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,50 cgr.	

Lenientol infantile. Prix : 16 fr. 50.

Une cuillerée à café contient :

Phényléthylmalonylurée....	0,01 cgr.	} 1 flac. dure 20 jours.
Tartrate borico-potassique.	0,10 cgr.	

Enregistré au L. N. C. n° 2003-1 et 2003-2.

Laboratoire DEMOULIN

27, rue Brézin — PARIS (XIV^e). — (Tél. : Ségur 76-90.)
et Grossistes.

LÉNIFÉDRINE (Huileuse).

Composition. — Huile antiseptique à l'Oléate d'Ephédrine. Solution *faible* à 0 gr. 50 % et solution *forte* à 1 gr. %.

Indications. — Affections des voies respiratoires supérieures : Coryzas spasmodiques, Rhinites arthritiques, Sinusites.

Présentation. — Se vend :

- 1° En flacons compte-gouttes brevetés ;
- 2° En flacons ordinaires pour pulvérisations ;
- 3° En rhino-capsules pour auto-injections nasales ;
- 4° En vaseline.

Prix :

Flacon compte-gouttes.....	16 fr. 30
— ordinaire.....	15 fr. 30
Rhino-capsules	13 fr. 10
Vaseline.....	13 fr. 10

LÉNIFÉDRINE (Aqueuse).

Composition. — Solution aqueuse de Camphorate d'Ephédrine et de Para-oxy-benzoate de méthyl.

Solution *faible* à 0 gr. 50 % et solution *forte* à 1 gr. %.

Indications. — Coryzas spasmodiques, Asthme, Sinusites.

Présentation. — Flacon compte-gouttes breveté.

Prix : 16 francs.

L. GAILLARD, Pharmacien,
26, rue Pétrelle — PARIS (IX^e).

LÉNIFORME

Composition. — Huile à 2, à 5 et à 10 % d'Essences végétales antiseptiques.

Indications. — Coryza, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites.

Présentation. — Se vend

1° en *Flacons compte-gouttes*.

2° en *Flacons ordinaires* pour pulvérisations.

3° en *Rhino-Capsules* pour auto-injections nasales.

4° en *Vaseline*.

Prix :

Flacon compte-gouttes	13 fr. 10
Flacon ordinaire	15 fr.
Rhino-Capsules	11 fr. 80
Vaseline	10 fr. 80

L. E. V. A. — L. GAILLARD, Pharmacien

26, rue Péterelle — PARIS (IX^e).

LÉNIOR BONNET

LÉNIOR A L'OXYDE DE ZINC.

Composition. — Oxyde de zinc, Amidon, Lanoline, Vaseline. Ce produit est une pâte poreuse et non une pommade occlusive.

Indications. — Toutes démangeaisons, Rougeurs, Eczémas sous toutes ses formes. Crevasses et ulcère du sein. Herpes, Erythème fessier.

Emploi. — Étaler en couche mince, recouvrir d'une toile.

LÉNIOR AU COALTAR.

Composition. — Coaltar lavé, oxyde de zinc, Lanoline, Vaseline. Propriétés décongestionnantes, desséchantes et antiprurigineuses très puissantes.

Indications. — Eczémas vésiculeux, amorphes, papulo-vésiculeux, séborrhéiques. Eczéma des nourrissons.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir.

LÉNIOR AU SULFATE DE CUIVRE.

Composition. — Vaseline, Sulfate de cuivre, Sulfate de zinc, Soufre précipité, Oxyde de zinc, Lanoline.

Indications. — Impétigo chronique et rebelle; Streptococcies cutanées; Pyodermites.

Emploi. — Étendre en couche mince matin et soir, après avoir fait tomber les croûtes.

Prix : Tube géant : 7 fr. 80.

Laboratoires du STÉAROL

5, rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

LENISERUM DU D^r MOITY

Sirop, Comprimés.

Sirop pectoral au Thiocol bromoformé et à la Dionine.
Désinfection des poumons par voie sanguine. Spécifique de la Bronchite chronique. Sédatif de la Toux. Antibacillaire.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillères à soupe ou 3 à 5 comprimés par jour, pris purs ou avec une infusion pectorale.

Enfants à partir de 5 ans : 3 à 5 cuillères à café ou 1 à 2 comprimés par jour, de préférence entre les repas.

Diffusion strictement médicale.

Prix : 17 francs le flacon de 250 cc. ou le tube de 25 comprimés.

Laboratoires du Docteur J. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie, ex-Interne des Hôpitaux de Paris.

199, boulevard Bineau — NEUILLY — PARIS.

LÉOTAMINE

Pommade à base d'Insuline « Leo » et de Vitamines A et D.

Indications. — Assure la cicatrisation des plaies de guérison difficile chez les personnes anémiques, asthéniques, hémophiles et principalement chez les diabétiques. Brûlures.

Forme. — Tube de 15 et 30 grammes.

Mode d'emploi. — Application directe sur la plaie ; couvrir la plaie d'un pansement aseptique.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX.
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et colonies :

Jean DEDIEU, pharmacien
39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

LEPTAB

Évacuant intestinal, spécifique du péristaltisme.

Comprimé à base de : résine pure de jalap, résine de scammonée, scille, badiane, sans action drastique.

Action. — Synergie médicamenteuse, évacue rapidement le contenu septique de l'intestin, assure la disparition du *Colmatage du grêle*.

Indications. — Toutes affections de l'appareil digestif, avec retard du transit, et leurs conséquences : constipation, ballonnement, aérophagie, migraines, névralgies, affections cutanées, acné, eczéma, urticaire, etc.

Présentation. — Deux modèles sous boîte aluminium 11 fr. 45 (8 jours) ; 31 fr. 20 (1 mois). Enregistré au L. N. C. sous le n° 1039-3.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

LEPTOL

Les 1^{ers} comprimés laxatifs français à base de Leptandrine (extrait du Rhizome de *Leptandra Virginica*, Amérique Nord).

Rééducateur de la fonction
Hépto-Intestinale.

Ne contient pas de Phénolphthaléine.

Laxatif doux mais actif. . { pas de coliques.
pas d'irritation.
aucune toxicité.

Peut être donné en période de grossesse et d'allaitement.

1/2 à 2 comprimés le soir au dîner.

Augmenter ou diminuer la dose suivant effet.

Laboratoires du LEPTOL

333, rue Vaugirard, PARIS-XV^e-Vau. 44-73.

LÉTHALGOL

Suppositoire analgésique, spasmolytique, décongestionnant.

Composition. — Ether trichlorbutyl-salicylique (sédatif), Phényl-Diméthyl-Diméthylamino-Pyrazolone (analgésique) ; Acétotartrate d'aluminium (antiphlogistique).

Avantages particuliers. — Plage posologique étendue ; tolérance parfaite ; restreint l'utilisation des narcotiques ; peut être employé en pédiatrie.

Indications. — Toutes dystonies douloureuses segmentaires ou diffuses. Algies de tractus génital, péri-génital et gastro-intestinal. Accouchements laborieux. Algo-spasmes de la ménopause. Douleurs cataméniales et prostatiques. Coliques hépatiques et néphrétiques. Spasmes vésiculaires. Ulcus. Algies cancéreuses. Otalgies. Névralgies diverses, etc.

Posologie :

Adultes : 1 et jusqu'à 3 suppositoires consécutifs, à répéter une ou plusieurs fois si nécessaire.

Enfants : 1 à 3 par jour, suivant l'âge (au-dessus de deux ans seulement).

Boîtes de 6	11 francs
— de 12	20 francs

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1492-2.

Littérature et échantillons.

Laboratoire GEWA

32, rue Assalit — NICE (Alpes-Maritimes). (Tél. : 814-61.)

LEUCAGINE

TOPIQUE UTÉRIN.

CRAYONS SOLUBLES

pour la cavité utérine.

Présentation. — Crayons stérilisés à base d'organate d'argent et de bromure de radium, dosés à 1, 3, 5 et 10 micros, à introduire dans le corps utérin à l'aide de pinces ou de notre porte-pansement.

Indications. — Métrites, Affections du collet du corps : 2 applications par semaine (Consulter la Notice).

N. B. — Utiliser pour l'application l'appareil « Porte-pansement » spécial.

La *Leucagine* se prépare également sous forme d'ovules. (1 par jour.)

Le crayon à 1 micro : 13 fr. ; à 3 micros : 20 fr.
à 5 micros : 27 fr. 50 ; à 10 micros : 38 fr.

La boîte de 5 ovules : 33 francs.

Enregistré au Lab. de Contrôle sous le n° 535-5.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 73-92.)

LEVULINYL

Composition — Levulinate de calcium ($C^5H^7O^5$)² Ca.

Indications. — *Toutes les indications du Gluconate de Calcium avec action renforcée.*

Récalcifiant intensif. Hémostatique. Œdèmes. Diarrhées aiguës et chroniques. Diarrhées des tuberculeux. Diabète. Affections graves du foie. Antichoc comme solvant des principaux sels métalliques (sels d'or arsenicaux, etc...), dont il empêche les accidents d'intoxication.

Présentation :

Cachets à 0,50 : boîte de 24 cachets.

Ampoules 5 cc. : boîte de 6 ampoules.

Ampoules 10 cc. : boîte de 6 ampoules.

(Solutions à 10 p. 100 et à 15 p. 100.)

Ampoules injectables et buvables (dans ce dernier cas, verser le contenu de l'ampoule dans une boisson bien sucrée).

Posologie. — 1 à 2 cachets par jour pendant les repas. — 2 à 4 injections par semaine.

Le Levulinate de calcium provoque une sensation de chaleur passagère après l'injection intraveineuse.

Laboratoire du LEVULINYL

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

LEVURINE EXTRACTIVE

Description. — *Comprimés* de 0 gr. 30 d'extrait sec de levure de bière en flacons de 50 comprimés.

Action thérapeutique. — Contient sous un poids 35 fois moindre tous les principes actifs de la levure fraîche, en particulier les vitamines et les corps anti-infectieux, auxquels celle-ci doit son activité, car ils agissent comme vaccin polyvalent vis-à-vis des microbes et surtout des staphylocoques. Conservation parfaite et facilité d'absorption.

Indications. — 4 à 12 comprimés par jour dans les abcès, anthrax, acné, eczéma, furoncles, herpès, phlegmons et toutes affections de la peau.

Prix : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Oh. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

LICHÉNOSE DUCLOY

Acide fumaro-proto-cétrarique pur.

Médicament de la nausée et des vomissements nauséux.

Forme. — Tabloïdes de 1 cgr. dragéifiées.

Doses. — 3 à 6 par jour en moyenne. On peut doubler cette dose en cas de besoin.

Mode d'emploi. — A avaler avec une gorgée d'eau, 10 minutes avant les repas.

Indications. — *Toutes les nausées*, mal d'auto, de chemin de fer, de bateau, d'avion, de théâtre, etc. Nausées *d'origine psychique* (émotions, dégoûts), *d'origine auriculaire* (vertiges), *d'origine digestive*, *pharyngée, gastrique, duodénale, vésiculaire, colique, affections utérines, grossesse.*

Contre-indications. — Aucune. Médicament atoxique.

Prix : 13 francs.

Laboratoires DUCLOY et Cie.
ARQUES (Pas-de-Calais).

LIMOL CHURCHILL

Hypophosphite de chaux : 0 gr. 20 par dose.

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation de chaux et de phosphore au minimum d'oxydation et, de ce fait, complètement assimilable, Recalcifiant idéal.

Indications. — Recalcification, phosphaturie, tuberculose, asthénie, bronchites, rachitisme, dentition, allaitement.

Mode d'emploi — *Adultes* :

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Ampoules 3 cc. pour injections intraveineuses chaque deux jours.

Enfants : Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indication du médecin traitant.

Exiger la signature du docteur Churchill.

3 formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 60.

PRODUIT FRANÇAIS

Enregistré au L. N. C. n° 225-1.

Laboratoire des Produits du Dr CHURCHILL

P. DESCHAMPS, pharmacien

92, avenue Saint-Mandé — PARIS (XII^e). (Tél. : Diderot 74-02.)

LIMONADE GODFRIN

Limonade purgative concentrée
au *Citrate basique de Magnésie*.

Avantages. — Seule limonade liquide au citrate basique de Magnésie susceptible de conservation.

De saveur agréable, elle ne possède aucun arrière-goût médicamenteux et n'occasionne ni nausées ni coliques.

Formes. — Flacon pour *adultes* de 100 cc. ; flacon pour *enfants* de 50 cc.

Mode d'emploi. — Vu sa concentration, elle ne doit pas être prescrite pure, mais étendue d'une à deux fois son volume d'eau. A dose réduite (1 cuillerée à café ou à soupe, suivant le cas, dans un demi-verre d'eau) elle constitue un parfait laxatif salin.

Prix au public : flacon pour *adultes* : 7 francs ; flacon pour *enfants* : 5 francs.

Enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 704-1 et 704-2.

Laboratoires P. GODFRIN

5, avenue Watteau — NOGENT-SUR-MARNE (Seine).
(Tél. : Tremblay 04-48.)

LIPAUROL

Solution huileuse de Campho-Dithio-Carbonate double d'Or et de Sodium.

Indications. — Tuberculose pulmonaire ; Tuberculose ganglionnaire suppurée ou non ; Tuberculose pleurale ; Tuberculoses cutanées diverses ; Rhumatismes poly-articulaires chroniques.

Mode d'emploi. — Faire chaque semaine 2 injections intramusculaires de 1 ampoule de 1 ou 2 cc.

Durée du traitement. — 3, 4, 5 mois, selon les cas.

Présentation. — En boîtes de 3, de 6 ou de 12 ampoules de 1 ou 2 cc. (1 cc. correspond à 3 cg. or métal).

Prix de vente au public :

La boîte de 3 ampoules de 1 cc....	24 fr. 50
La boîte de 3 ampoules de 2 cc....	38 fr. 50
La boîte de 6 ampoules de 1 cc....	44 fr. 50
La boîte de 6 ampoules de 2 cc....	74 fr.
La boîte de 12 ampoules de 1 cc...	81 fr. 50
La boîte de 12 ampoules de 2 cc...	130 fr.

L. N. C. 463-9.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin, PARIS.

LIPIODOL LAFAY

Huile d'œillette iodée à 40 p. 100 contenant 54 cgr. d'iode par cc.

EMPLOIS EN THÉRAPEUTIQUE

1° *Action générale* : Le Lipiodol permet, grâce à son élimination progressive, de réaliser une imprégnation iodée de longue durée et d'intensité constante au moyen de prescriptions discontinues. Il en résulte une efficacité plus grande et l'absence de risques d'accidents d'iodisme.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Rhumatisme, Lymphatisme, Asthme, Syphilis tertiaire, Mycoses.

Voie buccale : 8 à 20 jours par mois — 2 à 5 unités par 24 heures.

Voie intramusculaire : 10 à 20 cc. par mois en 2 à 10 injections.

(Voir ci-dessous Lipiodol « F » fluide.)

2° *Action locale* : Injections : Sciatique, Lumbago, Algies diverses, etc.

Pommade : Adénopathies, Plaies atones, Plaies infectées, Escarres, Staphylococcie, Erysipèle, Erythrasma.

EMPLOIS EN RADIOLOGIE

Lipiodo-diagnostic de Sicard et Forestier : Exploration du Système nerveux, des Voies respiratoires, de l'appareil génital de l'homme et de la femme, des Voies biliaires, des Abscès, Fistules, etc.

(Voir ci-dessous Lipiodol « F » fluide.)

Présentations :

Voie buccale. — Capsules : 1 cap. = 20 cgr. d'iode 2 à 4 par 24 heure

Flacons de 50 et 25. **Prix** : 25 fr. 50 et 14 fr. 30.

Emulsion : 1 c. à café = 20 cgr. d'iode 2 à 5 par 24 heures.

Flacons de 250 et 125 gr. **Prix** : 28 fr. 85 et 15 fr. 30.

Comprimés chocolatisés : 1 com. = 4 cgr. d'iode, 2 à 5 par 24 heures.

Boîtes de 50. **Prix** : 15 fr. 30.

Usage externe. — Pommade : Tube de 25 gr. **Prix** : 15 fr. 30.

Injection. — Ampoules de Lipiodol à 40 p. 100 (Lipiodol descendant).

Prix :

8 de 2 cc	29 fr.
4 de 5 cc	32 fr. 15
1 de 10 cc	14 fr. 30
1 de 20 cc	28 fr. 55

Le Lipiodol Lafay existe à des concentrations en iode inférieures :

Lipiodol à 20 p. 100, Lipiodol à 10 p. 100 (Ascendant). Mêmes présentations.

LIPIODOL " F " FLUIDE

Esters éthyliques des acides gras de l'huile d'œillette, iodés à 40 p. 100 (52 cgr. d'iode par cc.).

6 fois plus fluide que le *Lipiodol Lafay*, le *Lipiodol « F »* s'injecte à la seringue et pénètre dans les fins trajets à explorer avec une facilité plus grande.

Indications. — Mêmes indications thérapeutiques et radiologiques que celles du *Lipiodol Lafay*. Il est cependant préférable de ne pas l'utiliser pour l'exploration des espaces sous-arachnoïdiens.

Présentations. — Ampoules de *Lipiodol « F » fluide* à 40 p. 100.

Prix :

8 de 2 cc	35 fr. 70
4 de 5 cc	37 fr. 75
1 de 10 cc	18 fr. 85
1 de 20 cc	35 fr. 70

Laboratoires A. GUERBET et C^{ie}

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Montmartre 22-56.)

LIPOCÉRÉBRINE CHEVRETIN

Extrait éthéré de substance cérébrale.

Ampoules de 2 cc. contenant 0 gr. 20 d'extrait.

Dragées dosées à 0 gr. 05 d'extrait.

Propriétés thérapeutiques. — Agit par ses phosphatides, lipoïdes et antitoxines. Contient 50 p. 100 de lécithines (soit 2 p. 100 de phosphore actif) et 25 p. 100 de cholestérine. Antitoxique, Sédatif, Anticonvulsivant, Tonique.

Indications. — *États dépressifs du système nerveux, Neurasthénie, Anémie cérébrale, Convalescences, Hystérie, Psychoses.*

Doses. — Une injection sous-cutanée de 2 cc. tous les jours pendant 12 jours ou 2 dragées avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.

La boîte de 12 amp. Prix : 24 francs.

La boîte de 60 dragées. Prix : 17 fr. 50.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél.: Trinité 44-31. Télégr.: Chevrematte-90 Paris.)

LIPOCRINYL

Hormonothérapie ambo-sexuelle par les lipoïdes orchitiques totaux d'animaux jeunes.

Composition. — Lipoïdes orchitiques totaux : 0 gr. 10 (correspondant à 0 gr. 80 de glande fraîche) pour une pilule.

Propriétés thérapeutiques. — Rétablit l'équilibre hormonal altéré par manque ou insuffisance de sécrétions endocriniennes. Activités s'exerçant indifféremment sur les deux sexes. (Travaux du Professeur Ch. Champy.)

Indications. — *Chez l'homme : Hypertrophie de la prostate et ses troubles urinaires, Retards de la puberté, Présénescence, Impuissance, Déclin génital. Chez la femme : Troubles nerveux dépressifs liés à la ménopause et à la puberté. Chez les deux sexes : Neurasthénie d'origine sexuelle, et tous syndromes d'insuffisance endocrinienne.*

Posologie. — 6 à 12 pilules par jour réparties en 3 prises dans l'intervalle des principaux repas. Pour les enfants, doses réduites de moitié. Durée du traitement : 20 jours par mois, pendant trois mois.

Prix : le flacon de 100 pilules : 35 francs.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

LIPOIODINE

Dilodobrassidate d'éthyle

CIBA

IODE ORGANIQUEMENT COMBINÉ.

La Lipoiodine (41 p. cent d'iode) remplace avantageusement les iodures et iodiques à dose moindre, avec une tolérance meilleure et sans accidents d'iodisme.

Indications. — Celle de l'iode et des iodures : Artériosclérose, Hypertension artérielle, Angine de poitrine, Affections des voies respiratoires, Rhumatisme chronique, Obésité, Goitre, Scrofule, Adénopathies, Syphilis, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 6 comprimés par jour, une ampoule tous les 2 jours. — *Enfants* : 1/2 à 3 comprimés (aux repas principaux).

Formuler. — Tube de 20 comprimés.

Boîte de 6 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

LIPOLYSINE

Amalgissant sûr et sans danger.

Deux formules { Lipolysine féminine.
Lipolysine masculine.

Composition :

Formule féminine :	Formule masculine :	
Thyroïde.....	0,05	—
Thymus	0,02	—
Ovaire	0,02	Testicule 0,02
Hypophyse (lobe antérieur).....	0,025	—

La Lipolysine est le médicament spécifique de l'obésité endogène, elle n'a aucune contre-indication.

Présentation. — Comprimés.

Mode d'emploi. — 2 comprimés par jour.

Le comprimé doit être avalé avec un demi-verre d'eau 10 minutes avant le repas.

Le flacon de 40 comprimés : 30 fr. 60

Enr. au L. N. C. M. sous les N^{os} 1059-13-1 et 1059-13-2.

Laboratoires du Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44)

LIPOSEPTINE

Antitoxine polyvalente du Professeur G. Lemoine.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycètes. Possède les propriétés curatives, des vaccins les plus actifs.

Indications. — Toutes les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — Faire l'injection d'une ampoule sous la peau, chaque jour : matin et soir dans les cas graves. L'injection ne provoque ni choc ni réaction locale. Innocuité absolue.

La Liposeptine se présente également sous la forme de petites pilules, pour ingestion par voie buccale. Complètent et renforcent l'action des injections. Dose moyenne : 4 petites pilules par jour.

Boîte de 5 ampoules.

Tube de 50 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous les numéros :

Ampoules 590-7. Pilules 590-21.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSEPTOL

Composition. — Pâte anti-infectieuse, à base de Liposeptine du Professeur G. Lemoine, et de lipoïdes.

Indications. — Traitement très rapide des plaies atones, des brûlures et des ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Etendre la pâte sur un morceau de gaze de la dimension de la surface malade, recouvrir d'un morceau de gaze plus grand, maintenir le tout par une bande ou fixer simplement les bords par des languettes de Leucoplaste.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-22.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 44-59.)

LIPOSPLENINE DU D^r GROG

Opothérapie splénique spécifique (Soula).

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Références scientifiques propres
à la Liposplénine du D^r Grog :

Communications : Académie de médecine :
18 janvier 1927 ; 18 juillet 1928.

Société de Biologie : 22 décembre 1928,
16 février 1929, 21 décembre 1929.

XX^e Congrès de médecine de Montpellier :
18 septembre 1929.

II^e Congrès du Paludisme : Alger, 19-21 mai
1930.

Société de Thérapeutique, Paris : 12 octobre
1930, 8 février 1933.

Société d'Hématologie, Paris : 3 février 1932.

Société de Pédiatrie, Paris : 18 juin 1935.

Société de médecine infantile de Bordeaux
et du Sud-Ouest : 20 octobre 1935.

Thèses : D^r E. Cauquil, *Rate et Rachitisme*
(1928) ; D^r Fau, *Action des Extraits*
Lipidiques d'organes (1928) ; D^r Radji,
Contribution au traitement des Anémies avec
splénomégalie (1929).

Composition. — 1^o Lipides insaponifiables
contenus dans la pulpe splénique, dont le
cholestérol, extraits par un procédé spé-
cialement établi par le P^r L.-C. Soula ;
2^o l'Insaponifiable X partiellement soluble.

Indications. — 1^o *Médication spécifique* :

a. Anémies (quelles qu'en soient la cause et
la nature, sauf les anémies de Biermer).

b. Amaigrissements graves et persistants.

c. Anémies et déminéralisations en cours de
grossesse ou après un accouchement pénible.
Points névralgiques dorsaux.

d. Retards de croissance, débilité infantile,
tous états rachitiques, lymphatisme, démi-
néralisations, *troubles douloureux dentaires*
du nourrisson, eczéma du nourrisson.

Surmenage, Convalescence, Dépression ner-
veuse, Neurasthénie, Faiblesse et fatigue

générale, Inappétence, tous états de déchéance organique.

2° *Puissant modificateur du terrain dans : Prétuberculose, Tuberculose pulmonaire, osseuse et viscérale.*

Présentations. — 1° *Comprimés* dosés à 3 centigr. de principes actifs. Six à huit par jour, en deux fois, *au milieu* de chacun des deux principaux repas. Ne pas croquer les comprimés, les avaler avec une gorgée d'eau. Par séries de 80 (soit une boîte : 10 à 12 jours de traitement, 22 fr.), séparées par un repos de trois jours.

2° *Ampoules* de un cc. titrées à 2 centigr. de principes actifs. Une injection *sous-cutanée, indolore*, tous les deux jours. Repos de six jours après la huitième injection ; puis reprendre et continuer le traitement selon ce rythme jusqu'à la guérison ou une amélioration nettement consolidée.
(La boîte de huit ampoules : 25 francs.)

3° *Sirop*, dosé à 8 cgr. de principes actifs par cuillerée à café. *Enfants* : 2 cuillerées à café par jour ; *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à café par jour. *A prendre dans l'intervalle des repas.* (Prix : 22 francs pour 12 jours de traitement.)

4° *Gouttes*, titrées à 5 p. 100 de principes actifs. Jusqu'à un an : XXX gouttes par jour, en trois prises ; de un à deux ans : XL gouttes, toujours en trois prises dans la journée. Au-dessus de deux ans, recourir au sirop. (Prix : 22 francs pour 15 à 20 jours de traitement.)

Laboratoire des LIPIDES

Jean OLIVE, pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-94.)

LIPOVITA (Granulé)

Vitamines liposolubles.

Formule :

Carotène (Vitamine A): 4 000 unités internationales.
Ergostérol irradié (Vitamine D): 40 000 unités internationales pour 100 grammes. Goût très agréable.

Indications. — Troubles de croissance, Rachitisme, Déperdition de chaux et de phosphate, Carie des dents, Etats ganglionnaires.

Doses :

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour en deux fois.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Adolescents et adultes : 3 à 4 cuillerées à café par jour.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoire MAUOHANT

à GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grésillons 05-21.)

LIQUIDIX

Formule :

Sulfate de Cuivre	1 gr. 2174
Sulfate de Zinc.....	0 gr. 1492
Camphre.....	0 gr. 3141
Safran	0 gr. 1492
Alcool à 60°	19 gr. 1355
pour 100 gr.	

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 322-2.

Indications thérapeutiques. — Toutes dermatoses.

Mode d'emploi. — Simple application, pur ou étendu d'eau. Le mode d'emploi qui accompagne chaque flacon est très détaillé.

Livré en flacon de 250 cc.

Prix : 16 fr. 75.

Toutes Pharmacies et Pharmacie DELAPRÉE
MORTAGNE-SUR-SÈVRE (Vendée).

LITA

Cuniculi-sérum Iodobenzométhylé.

Composition. — Mélange de sérum de lapin ayant reçu des doses croissantes de tuberculine (1 partie) et d'Iodoseptine (2 parties).

Présentation. — Se présente sous forme d'ampoules de 3 cc. qui peuvent être injectées par voie intramusculaire ou exceptionnellement intraveineuse.

Mode d'emploi. Doses. — Deux injections par semaine par série de 20 injections. Ne pas arrêter le traitement après amélioration passagère, continuer jusqu'à guérison.

Les injections seront faites de préférence *intramusculaires profondes*. Chez l'enfant, on commencera par 1 cc. pour la première injection, 2 cc. pour la seconde, 3 cc. pour la troisième.

Indications. — *Chez l'adulte* : Toutes formes de Tuberculose pulmonaire à toutes les périodes. Tuberculoses viscérales. Tuberculose des séreuses. *Pas de choc, pas d'intolérance, pas d'accidents* (hémoptysies ou autres).

Chez l'enfant : Prétuberculose, formes ganglio-pulmonaires du premier âge.

Prix : Boîte de : 6 ampoules : 80 francs.

4 ampoules : 57 francs. — 2 ampoules : 28 fr. 50.

Laboratoires OORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

LIVARTIL

Le stimulant d'élection des parenchymes hépatique et pancréatique.

Composition :

Extrait *total* de feuilles *fraîches* d'*artichaut* de Macau
(350 gr. de feuilles fraîches d'artichaut).

Combretum	7,50
Boldo.....	7,50
Adonis Vernalis	0,25
Jaborandi	0,05
Formiates de Calcium et de Magnésium	5,00
pour 100 grammes de Livartil.	

Propriétés :

L'Artichaut stimule les fonctions hépatique (notamment la fonction antitoxique (1) et pancréatique, augmente la diurèse, élimine la cholestérine et l'urée.

Boldo et Combretum : cholagogues et cholofluidifiants classiques.

Adonis : toni-cardiaque et diurétique direct et indirect.

Jaborandi stimule la musculature lisse du tube digestif par son action parasympathicotonique.

Formiates de Calcium et de Magnésium, diurétiques azoturiques, renforcent en outre le pouvoir diurétique propre de l'artichaut.

Avantages.

1° L'extrait **total** liquide de feuilles **fraîches** d'**artichaut de Macau** procure des succès thérapeutiques bien supérieurs à ceux qu'on obtient avec les « principes » partiels préparés à partir de la plante desséchée ou avec l'extrait sec.

2° Absolument atoxique.

3° Effet rapide, mais durable.

Indications. — A. Hépatiques.

1° Toutes **Insuffisances hépatiques**, aiguës, sub-aiguës et chroniques, légères ou graves. Cholémie familiale. Ictères catarrhal et infectieux. Hépatites aiguës et chroniques. Congestion du foie. Gros foie douloureux des paludéens, des alcooliques, des gros mangeurs. Lithiase biliaire. Coliques hépatiques et vésiculaires. Cirrhoses. Surcharge et Dégénérescence graisseuse du foie (2). Cholécystites, Angiocholites, Angiocholécystites, Séquelles des cholécystectomies. Atteinte hépatique au cours des maladies infectieuses, Foie grippal.

(1) O. GAUDIN Docteur ès-Sciences: *Bulletin de la Soc. de Thérap.* 8 février 1939.

(2) H. PÉRICAUD et LAPORTE : *L'Envahissement graisseux du foie.*

2° Toutes les conséquences de l'insuffisance hépatique et pancréatique : dyspepsie hépatique avec douleurs tardives. Constipation. Hémorroïdes. État saburral des voies digestives. Anorexie des hépatiques. Nausées. Somnolence post-prandiale. Urticaire. Migraines. Manifestations anaphylactiques d'intolérance digestive. Auto-intoxication. Intolérance aux arsénobenzènes et aux sels d'or. Dermatoses d'origine hépatique. Prurits. Asthme hépatique.

B. Rénales :

Oliguries. Ascites. Insuffisance rénale. Rétention azotée. Azotémie d'alarme. **Brightisme**, Mouches volantes. Bourdonnements d'oreilles. Fourmillements des extrémités. Prurit. Crampes. Doigt mort. Céphalées des brightiques.

C. Sanguines et circulatoires :

Hypercholestérolémie. Athérome artériel. Hypertension et ses troubles subjectifs.

Posologie et mode d'emploi :

Traitement d'attaque. — 80 gouttes 3 fois par jour, aux repas, dans le premier verre de boisson. (Penser à une exonération intestinale abondante possible due à l'augmentation de la cholérèse.)

Traitement d'entretien. — 30 à 80 gouttes 2 à 3 fois par jour.

Enfants jusqu'à 5 ans : III à V gouttes par année d'âge 2 à 3 fois par jour.

Remarque. — Le **Livartil** étant dénué de toute toxicité, les doses ci-dessus peuvent être augmentées si besoin.

Prix : 20 fr. 80 pour un traitement moyen de 15 à 18 jours.

Enregistré au L. N. C. 1863-1:

Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine),

Docteur en Pharmacie,
86, rue du Pas-Saint-Georges,
BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 86-258.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

LOBÉLIANE LALEUF

Composition. — Préparation exclusivement végétale à base de Lobélie, Valériane stabilisée, Aubépine, de goût et odeur agréables, dénuée de toxicité, exempte de toute addition de produits chimiques.

Propriétés et indications. — Antispasmodique puissant, agissant sur le système neuro-végétatif.

Médicament de choix des affections spasmodiques, névropathiques, névroses et insomnies.

Formes. — *Liquide et comprimés.*

(2 comprimés correspondant à 1 cuillerée à café de LOBÉLIANE liquide.)

Posologie et mode d'emploi :

Dose calmante : 2 à 3 cuillerées à café — 4 à 6 comprimés par jour.

Dose hypnotique : 1 ou 2 cuillerées à café — 2 à 4 comprimés, après le repas du soir.

La LOBÉLIANE se prend avec un peu d'eau ou, mieux, avec une infusion de tilleul ou de verveine.

Durée moyenne des unités de vente : 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon ou l'étui de 50 comprimés : 17 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

LOBÉLINE BRUNEAU

Médicament spécifique de toutes les paralysies des centres respiratoires.

Composition. — Solution rigoureusement titrée de chlorhydrate de Lobéline chimiquement pur. (Conservation indéfinie.)

Indications. — Tous les états asphyxiques : En chirurgie (syncopes anesthésiques). — En obstétrique (asphyxie des nouveau-nés). — En médecine générale (troubles respiratoires à la suite de pneumonie, broncho-pneumonie, etc., empoisonnements, électrocution, submersion).

Posologie et mode d'emploi.

Chez l'adulte : en injection sous-cutanée ou intramusculaire 0 gr. 010 par dose. On peut sans aucun danger répéter les injections toutes les 10 ou 15 minutes.

Doses maxima : 0 gr. 02 par dose. 0 gr. 10 par 24 heures.

En injection intraveineuse : 0 gr. 003 à 0 gr. 010 par dose. Cette injection doit être pratiquée très lentement. On peut faire immédiatement après une injection intramusculaire ou sous-cutanée de 0 gr. 010. Chez l'enfant : en injection sous-cutanée ou intramusculaire exclusivement :

Chez le nouveau-né et pendant les 4 premiers mois 0 gr. 003 par dose,

A partir de 4 mois 0 gr. 005 —

A partir de 1 an 0 gr. 010 —

Présentation. — Boîtes de 2-6 ampoules titrées exclusivement à 0 gr. 003 et 0 gr. 010.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

17, rue de Berri — Paris (VIII^e).

(Tél. : Elysées 61-46.) — Adresse télégr. : Labomédical-Paris.

LOBÉLINE « SANDOZ »

Composition. — Chlorhydrate de lobéline pur. Alcaloïde principal de la *lobelia inflata*, totalement exempt d'alcaloïdes secondaires et d'impuretés toxiques.

Avantages. — Pureté chimique. Actions physiologique et thérapeutique toujours identiques. Solution stable dosée rigoureusement. Titre constant.

Indications. — Asphyxie bleue des nouveau-nés, laryngite striduleuse, asthme, broncho-pneumonie, toutes asphyxies accidentelles et médico-chirurgicales.

Posologie et présentation. — Boîtes de 3 ampoules, dosées à 0 gr. 003 et à 0 gr. 01. 1 ampoule à la fois, à répéter si nécessaire.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

LOGAPHOS

Composition. — Acide monoéthylphosphorique. Noix vomique totale.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Toutes asthénies, Tonique stomacal, Rephosphorant de la cellule cérébrale.

Dose. — XX gouttes avant les 2 repas dans un peu d'eau.

Traitement : 15 jours.

Prix : 18 fr.

Laboratoires

L. BOIZE et G. ALLIOT

9, avenue Jean-Jaurès — LYON
(Tél. : Parmentier 31-29.)

Compte chèques postaux : Lyon n° 134-34.

LORAGA

Traitement rationnel de la constipation.

Composition :

Émulsion parfaitement homogène et stable d'Huile de paraffine *spécialement traitée*, remarquablement pure et de haute viscosité, d'Agar-agar et de Phénolphthaléine *chimiquement pure*. Ne contient ni alcool, ni sucre, ni saccharine, ni alcalins.

Indications :

Toutes formes de constipations, auto-intoxications, constipation post-opératoire. Très indiqué chez les constipés par atonie intestinale, les malades obligés de garder le lit, les femmes enceintes et les vieillards.

Action physiologique :

Pénètre et ramollit le bol fécal tout en facilitant son évacuation. Stimule doucement et sans irritation le péristaltisme du gros intestin.

Ne trouble nullement les fonctions de la digestion. Ne cause ni nausées, ni coliques. Absence complète de suintement par l'anus. Aucune accoutumance.

Dose et mode d'emploi :

De goût agréable, naturel, le Loraga est miscible à tous liquides : lait, eau sucrée ou non, infusions, potages.

Adultes : Commencer par une cuillerée à café, le soir, au moment du coucher, et augmenter jusqu'à 1 cuillerée à soupe (1 à 3 cuillerées à café) ou plus ; si c'est nécessaire, répéter la dose le matin en se levant.

Enfants : D'une 1/2 à 2 cuillerées à café ou plus, suivant l'âge et selon l'avis du médecin.

Pour les cas de constipation bénigne et pour les enfants, voir **Molagar**.

Prix : 13 fr. le flacon P. M.

19 fr. le flacon M. M.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-2.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

LOTION BLANCHE R. P.

De La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et sélénisés de La Roche-Posay associés aux oxydes de titane.

Propriétés et indications. — Calme, décongestionne, antiseptise et cicatrise ; lésions suintantes, en général ; eczémas, eczématides aigus ou infectés, intertrigo, prurits anogénitaux.

Mode d'emploi. — S'applique en couche mince par badigeon. Au renouvellement du pansement, nettoyer à l'eau chaude additionnée de sels de bain R. P. de La Roche-Posay. (Deux à six sachets suivant la quantité.)

Dès l'assèchement, panser avec le Cérat inaltérable R. P. et ensuite avec le Cold-Cream naturel R. P. Poudrer ensuite largement avec la poudre dermique R. P.

Présentation et prix :

Lotion blanche R. P. de La Roche-Posay. Le flacon....	16 francs.
Sels de bain R. P. La boîte de 30 sachets.....	12 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	10 fr. 50
Cold-Cream naturel R. P. Le tube	11 fr. 00
Poudre dermique R. P. La boîte	12 fr.

Laboratoires des PRODUITS DERMQUES R. P.

LA ROCHE-POSAY (Vienne).

LOTION PY

Au Soufre dissous associé.

Composition. — Soufre, Houblon, Hamamelis, en solution éthylénique.

Propriétés. — Dissout les graisses et apporte au derme le soufre indispensable et *actif*.

Avantages. — Rigoureusement *ininflam-mable, non irritante, non toxique* ; odeur agréable.

Indications. — Tous les *états séborrhéiques* ; Alopecies ; toutes les formes d'*Acnés* : Comédons, Pityriasis ; Erythrasma ; anti-septique et parasiticide puissant.

Mode d'emploi :

Séborrhée. — Savonner la tête le soir avec un savon au goudron et rincer à l'eau tiède ; bien sécher, puis appliquer la lotion avec un tampon de coton hydrophile.

Acné. — Même traitement, mais utiliser un savon au naphтол soufré.

Alopecies. — Frictionner le cuir chevelu tous les soirs, en écartant les cheveux par mèches et en massant avec les pouces. Eviter de faire couler le produit dans les yeux.

Dans le traitement de la *séborrhée*, il peut y avoir un « picotement » dû au contact du produit avec de légères érosions produites par le grattage ; cette sensation disparaît au bout de quelques applications.

Prescrire : LOTION PY : 1 flacon.

Prix : 22 fr. 95.

Laboratoire PY

58, boul. Richard-Wallace — PUTEAUX
(Seine).

(Tél. : Lon. 01-13.)

LOTUSÉDINE

Médication phytothérapique des déséquilibres neuro-végétatifs et des Insomnies nerveuses.

Composition :

Alcoolature d'Anémone	22 gr. 60
Extrait stabilisé de Lotus	3 gr. 33
— de Gattilier	3 gr. 33
— de Cratægus.....	6 gr. 66
— fluide de Belladone.....	0 gr. 60
Eau de laitue	Q. S. pour 100 gr.

Indications :

- 1° **États névropathiques**; états anxieux; hyperémotivité, hyperexcitabilité, nervosisme, irritabilité, crises de dépression, modifications du caractère.
- 2° **États spasmodiques gastro-intestinaux**; aérophagie aérocolie; syndrome solaire; troubles dyspeptiques post-prandiaux d'origine nerveuse.
- 3° **Érétisme cardio-vasculaire**, palpitations, tachycardie, fausse angine de poitrine et troubles circulatoires nerveux: vertiges, bourdonnements.
- 4° **Troubles nerveux de la vie génitale**: émotivité, nervosisme, règles douloureuses, bouffées de chaleur, vertiges, bourdonnements, etc...
- 5° **Toutes insomnies** provoquées par le surmenage physique, le surmenage intellectuel et moral, les soucis, les chagrins, la nervosité.

Posologie et mode d'emploi :

- 1° *Sédatif et équilibrant neuro-sympathique.* — Dose moyenne: 50 à 100 gouttes, 2 fois par jour, dans une tisane chaude, après les deux principaux repas.
 - 2° *Insomnies nerveuses.* — Dose moyenne: 1/2 à 2 cuill. à café le soir, dans une tisane chaude, en une seule fois.
- Enfants à partir de 5 ans*: V gouttes par année d'âge et par jour.

Remarque. — La Lotusédine, étant d'une atoxicité absolue, peut être donnée sans inconvénients aux enfants, aux vieillards, aux femmes enceintes. Les doses moyennes peuvent être notablement augmentées sans aucun danger.

Prix : 20 francs (3 semaines de traitement environ).

Enregistré au L. N. C. n° 1863-2.

Laboratoires Roger FOSSE (Livartil-Lotusédine)

Docteur en Pharmacie,

86, rue du Pas-Saint-Georges — BORDEAUX (Gironde).
(Tél. : 86-258.)

Sur demande, les Laboratoires Roger FOSSE adresseront à MM. les Docteurs un échantillonnage aussi copieux que nécessaire pour leurs expérimentations.

LUBRIGEL

Gelée lubrifiante soluble dans l'eau.

Convient pour tous les instruments de chirurgie. N'irrite pas les muqueuses les plus sensibles.

Pas de littérature, mais un échantillon sur demande à la

Pharmacie ARDOIN

33, boulevard Dubouchage — NICE.

Prix au public : 10 francs.

LUBROKAL

Composition. — 0,60 de brome (ionisé) ; 0,04 de phényl-éthyl-barbiturate de sodium.

Indications. — Epilepsie essentielle et symptomatique, insomnie nerveuse (sous forme de cure médicamenteuse), états d'angoisse, neurasthénie, hystérie, chorée, terreurs nocturnes, à titre préventif contre la migraine et la migraine ophtalmique.

Mode d'action. — L'action simultanée sur les centres corticaux (brome) et les centres mésencéphaliques (acide barbiturique) permet, avec un dosage très réduit, de calmer le système nerveux presque tout entier.

Dosage. — Prendre toujours les comprimés dissous dans l'eau. Epilepsie bénigne : 1 à 2 comprimés ; cas moyens : 3 fois par jour 1 comprimé ; cas graves : jusqu'à 3 fois par jour 2 comprimés. Posologie pour les enfants à fixer suivant leur poids.

Présentation :

Tube de 20 comprimés : 16 fr. 15.

Laboratoires RECRESA

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

LUDIN

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Formes. — *Granules, Gouttes, Sirop.*

Composition :

1 cuillerée à soupe de sirop	} — 1 cgr. Hg. + 1 millgr. As.
ou 3 granules	
ou XX gouttes	

Sans IODURE, sans Alcool.

Doses moyennes :

Sirop :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : par cuillerées à café.

Granules :

Adultes : 8 à 12 granules par jour.

Adolescents : 4 à 8 granules par jour.

Enfants : 2 à 3 granules par jour.

Gouttes :

Adultes : XX gouttes.

Adolescents : X à XV gouttes.

Enfants : V à X gouttes.

Nourrissons : I à II gouttes.

} 2 à 4 fois par jour.

Nota. — Prendre ces doses de préférence pendant les repas.

Propriétés thérapeutiques. — Tolérance parfaite, sécurité absolue. Beaucoup plus actif que le bismuth sans en présenter les inconvénients (stomatites, etc...). Activité égale à celle des arséno-benzols sans en avoir la toxicité.

Indications thérapeutiques. — Enfants hérédos, Prophylaxie pendant la grossesse, Traitement d'épreuve, Syphilis larvée, Dysenterie amibienne relevant des Hématozoaires, Eczémas, Dermatoses, etc., etc...

Les gouttes ou le Sirop Ludin peuvent être prescrits sans inconvénient aux nourrissons en diluant soit dans de l'eau, soit dans du sirop de sucre ou même dans le lait des biberons.

Les granules sont sans sucre.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 302-1, 302-2, 302-5.

Laboratoires RÈY — DIJON — Tél. : 22-12.

LUGOCALCION

Sirop de Chlorure de Calcium suractivé. Délicieux au goût.

Composition:

Solution pseudo-colloïdale de Chlorure de Calcium, incorporé par procédé spécial.

1 cuillerée à soupe contient :

Chlorure de Calcium	1 gr. 50
Adrénaline physiologique sol. 1/1000.....	DIX gouttes.
Teinture belladone	DEUX gouttes.

Seule préparation de goût réellement délicieux.

Indications et posologie :

a. Récalcifiant : Croissance, Tuberculose, Grossesse, Allaitement, Convalescence, etc.

Adultes : 1 cuillerée à soupe. *Enfants :* 1 cuillerée à café par jour.

b. Hémostatique : Hémoptysies, Gastrorragies, Epistaxis, Purpura. Menstruations abondantes, Préventif des Hémorragies post-opératoires, etc.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants :* 3 à 4 cuillerées à café par jour.

c. Antianaphylactique : Urticaire, Eruptions d'origine digestive, Prurits, Rhume des Foins, Eruptions post-sérothérapiques, Asthme.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à café. *Enfants :* 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

d. Déchlorurant, résorbant : Albuminurie, Néphrite, Pleurésie, Accidents sériques, Convulsions des nouveau-nés, Ascite, Diarrhée des Tuberculeux, Œdème malléolaire, Cellulite.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants :* 3 à 4 cuillerées à café. *Nouveau-nés :* 1/2 cuillerée à café par jour.

e. Neuro-sédatif : Etats spasmodiques, Ménopause, Basedowiens, Nervosisme, Surmenage.

Par petites doses de 1 cuillerée à café, à prendre 4 fois par jour.

f. Tensio-régulateur artériel : Hyper et Hypotension, 2 à 4 cuillerées à café par jour.

g. Thérapeutique oculaire : Glaucome, rétinites, Choroidites, spasmes oculaires, Décollements de la rétine, Cataracte, Hémorragies de la rétine, etc.

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe. *Enfants :* 1 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre pur ou additionné de 2 fois son volume d'eau, avant les repas.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

LUSOFORME

Solution de formol et de ricinoléates alcalins.

Antiseptique, bactéricide et désodorisant.

Indications. — Gynécologie, Obstétrique. Hyperhydroses. Hygiène journalière, Désinfection domestique.

Formes. — Liquide et comprimés.

Posologie. — Une cuillerée à café ou un comprimé donnent avec 1 litre d'eau une solution à 1/2 p. 100.

Emploi. — *Lusoforme médical.* — Antiseptique général de 1/4 à 1 p. 100.

Lusoforme brut. — Désinfectant et désodorisant de 2 à 5 p. 100.

Prix de vente au public :

Lusoforme médical, flacons de 100, 250 et 500 gr., à 4 fr. 80, 9 fr. 60 et 15 fr. 30. La boîte de 50 compr., 10 fr. 70.

Lusoforme brut, bidons de 2, 5 et 10 kilos, à 12 fr., 11 fr. 50 et 11 fr. 25 le kilo.

Laboratoires CARTERET

15, r. d'Argenteuil — PARIS (I^{er}). (Tél.: Opéra 43-79.)

LUTOCYCLINE

Hormone du corps jaune cristallisée.

PROGESTÉRONE

CIBA

En solution huileuse injectable.

La Lutocycline, hormone du corps jaune obtenue par synthèse, exerce sur l'utérus et les ovaires une action élective dont l'application en clinique permet, soit de régulariser la sécrétion folliculaire et l'ovulation, soit de compléter et d'achever le développement de la muqueuse utérine antérieurement préparée par l'hormone folliculaire (OVOCYCLINE) : état de prénidation.

L'action physiologique de la Lutocycline a été étudiée sur l'animal par la méthode des tests (réactions de Corner-Allen et de Clauberg). Ces réactions correspondent aux modifications de la muqueuse utérine lorsque, au cours du cycle menstruel, elle passe de la phase de prolifération (action folliculaire) à la phase de nidation (action lutéinique).

La Lutocycline entraîne, en clinique, des effets thérapeutiques divers, suivant qu'il s'agit de freiner un ovaire à activité folliculaire exagérée, de favoriser une fécondation, de juguler l'avortement, de combattre certaines manifestations secondaires, telles que douleurs des seins, fibromes, insuffisance de la lactation.

L'association de la Lutocycline à l'hormone folliculaire ou œstradiol (OVOCYCLINE) est indiquée dans les cas d'hypoplasie, de stérilité et de troubles marqués de la ménopause. (Voir Ovocycline.)

La Lutocycline est présentée uniquement sous forme injectable, en ampoules de 1 cc. renfermant une solution huileuse dosée à 5 et 10 mgr. de progestérone.

Indications. — Tous les troubles ayant pour origine l'insuffisante activité du corps jaune.

Métrorragies, hyperménorrhées et polyménorrhées par hyper-folliculinie. Symptômes nerveux et psychiques qui y sont liés. Stérilité d'origine ovarienne. Avortement habituel. Grossesses fragiles. Hémorragies au cours de la grossesse.

Insuffisance de la lactation.

Syndrome d'hyperfolliculinisme : seins douloureux, mastopathies et fibromatose utérine.

Manifestations de carence lutéinique de la ménopause.

Doses. — De 2 à 10 mgr. (cas bénins) à 25 et 35 mgr. et plus (cas sévères) par semaine.

Formuler :

En boîte de 1 ampoule à 5 mgr.

— — 3 — à 5 mgr.

— — 3 — à 10 mgr.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

LUTOGYL

Progestérone cristallisée chimiquement pure, hormone du corps jaune (lutéine titrée en milligrammes).

Indications. — Ménorragies, Métorragies, Hyperménorrhées, Dysménorrhées, Aménorrhées, Hémorragies de la ménopause, Avortements, Stérilité.

Présentations :

VOIE BUCCALE

Flacon de 25 comprimés à 5 mgr. : 85 francs.

Flacon de 25 comprimés à 10 mgr. : 150 francs.

VOIE INTRAMUSCULAIRE

Boîte de 3 ampoules de 1 cc. contenant chacune 5 mgr. de progestérone (5 U. I.) : 76 fr. 50.

Boîte de 3 ampoules de 10 mgr. (10 U. I.) : 137 fr. 70.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

LYMPHIODE

Iode entièrement fixé sur un support extrait des ganglions lymphatiques.

Histotropisme électif. — Tolérance parfaite. Activité exaltée. Absence d'iodisme.

Le **LYMPHIODE** peut être pris dans n'importe quel liquide après le repas : eau bicarbonatée sucrée, vin rouge, lait, etc.

Doses :

Adultes : X à L gouttes par jour en deux fois après chaque repas.

Enfants : V à XX gouttes par jour suivant l'âge.

Ces doses peuvent d'ailleurs être largement dépassées.

Indications. — Toutes celles de la médication iodée : Affections du cœur et des vaisseaux, Hypertension, sclérose vasculaire, déficience circulatoire, etc. Affections oculaires relevant de la médication iodée : choroidite, iritis, etc. Affections respiratoires : asthme, emphysème, bronchite chronique. Affections ganglionnaires : adénites, micro-polyadénopathie des enfants. Affections de la peau : eczéma, psoriasis, tuberculides. Mycoses.

États infectieux aigus. — Syphilis tertiaire.

Prix : 17 fr. 40 le flacon de 45 cc., suffisant à un traitement de 1 à 2 mois selon les doses. — Enregistré au L. N. C. M. sous le N^o 1059-31.

Laboratoires du D^r MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

LYSACRÈME L. M. L.

Composition. — Émulsion savonneuse stable d'antivirus lysats concentrés à 70 p. 100 (d'après les travaux des Docteurs Larget, Moreau et Lamare).

Propriétés et avantages :

- 1° Le savon de constitution spéciale permet une concentration considérable des antivirus et facilite la pénétration de l'émulsion d'antivirus ;
- 2° Souches microbiennes non repiquées et fraîchement prélevées ;
- 3° Lyse par le B. Pyocyanique facilitant la concentration des antivirus ;
- 4° Aucune réaction. Aucune contre-indication.

Indications. — Suppurations aiguës ou chroniques de la peau et des muqueuses : Furoncles, Orgelets, Panaris, Anthrax, Ulcères variqueux, Pyodermites, Engelures, Brûlures, Coups de soleil, Eczéma, Conjonctivites, Blépharites. Plaies de toutes natures.

Posologie. — Deux à trois pansements par jour avec massage doux et prolongé si possible. Recouvrir avec un taffetas. Dans les cavités : une mèche imbibée de *Lysacrème L. M. L.*

Prix : 18 fr. 45 le grand tube ; 12 fr. 50 le petit tube.

Enregistré au L. N. C. n° 507-38.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

LYSAMIDE

(237 M.)

Spécifique des affections à streptocoques, à pneumocoques, à gonocoques.

Composition. — Tri (para-aminophénylsulfamide) aluminique. Pas de troubles sanguins. Très bien tolérée.

Indications. — Streptococcies, Méningococcies, Pneumococcies, Affections pulmonaires chroniques, Blennorragies aiguës et chroniques.

Formes. — Comprimés à 0 gr. 55.

Posologie. — *Adultes* : 7 à 9 comprimés en 24 heures ; 1 comprimé à la fois.

Enfants : moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT

D^r MOUNEYRAT

Professeur agrégé Faculté de Médecine

Docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis
(Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

LYSAPYRINE

(402 M.)

Traitement des affections à gonocoques, à streptocoques, à pneumocoques.

Composition. — Sulfamide pyridique : Alu-tri (para-aminophénylsulfamidopyridine). Bien tolérée. Pas de cyanose.

Indications. — Blennorrhagie et ses complications, Affections streptococciques : érysipèle, fièvre puerpérale, Pneumococcies, Méningococcies.

Formes. — Comprimés à 0 gr. 55.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 7 comprimés par jour, pendant 8 à 12 jours, selon le poids.

Ces comprimés seront avalés, par doses fractionnées, dans le courant de la journée.

Enfants : la moitié ou le tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT

D^r MOUNEYRAT

Professeur agrégé Faculté de Médecine
Docteur ès sciences, pharmacien de 1^{re} classe
12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-
GARENNE, près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

LYSARTHROL

Granulé effervescent chimio-opothérapique.

Composition. — Diastases tissulaires rénales, Uroformine, Benzoate de lithine.

Propriétés. — Anti-rhumatismal, Anti-arthritique, Solvant et éliminateur de l'acide urique, Diurétique.

Indications. — *Traitement de fond des rhumatismes chroniques*, Goutte, Gravelle, Uricémie.

Posologie. — 4 cuillerées à café par jour : au lever, au coucher et avant chaque repas, dans un peu d'eau froide.

Prix : 15 fr. 30 pour 10 jours de traitement.

Laboratoires FOULON

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).
(Tél. : Nord 76-85.)

LYSAXINS L. M. L.

Composition. — Lysats pyocyaniques, Corps microbiens formolés, Peptones polyvalentes.

Avantages. — 1° Lysats très polyvalents (souches sélectionnées). Très actifs (souches non repiquées, PH spécialement étudié) ; 2° Vaccins microbiens très efficaces, grâce à l'atténuation par la formaline ; 3° Choc peptonique à volonté.

Indications. — *Antipyogène* : suppurations dues aux pyogènes communs : Furoncles, Anthrax, etc.

Abdominal : Suppurations digestives (préventivement : avant toutes interventions sur l'abdomen).

Antineisser : Uréthrites, Orchites, Métrites, etc...

Forme. — Ampoules 2 cc.

Posologie. — *Curatif* : 1/2 cc. et augmenter ensuite jusqu'à 2 cc. Minimum 3 injections de 2 cc.

Préventif : 4 injections de 1 cc. Espacer les injections de 48 heures au minimum.

Prix : 25 fr. la boîte de 4 ampoules.

Enregistré au L. N. C. n° 507-29-1 ; n° 507-29-2 ; n° 507-29-3.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

de 10 ampoules de 100 mg
Ampoules de 100 mg
Ampoules de 100 mg

Ampoules de 100 mg

contient

LYSOCOCCINE

Sulfamide " Vraie ".

Chimiothérapie polyvalente des états infectieux.

Présentations :

Comprimés à 0 gr. 30 de para-amino-phényl-sulfamide.

Ampoules mixtes pour I. M. et I. V. Boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Ampoules pour injections intramusculaires indolores : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. (1 ampoule contient 0 gr. 50 de sulfamide). Boîtes de 5 ampoules de 5 cc. (1 ampoule contient 1 gr. 25 de sulfamide).

Ampoules pour injections intraveineuses : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. (1 ampoule contient 0 gr. 50 de sulfamide). Boîtes de 5 ampoules de 5 cc. (1 ampoule contient 1 gr. 25 de sulfamide). Boîtes de 3 ampoules de 10 cc. (1 ampoule contient 2 gr. 50 de sulfamide).

Comprimés solubles pour solution extemporanée intrarachidienne à 0 gr. 10 de sulfamide.

Indications. — Tous les états infectieux à Streptocoques, Méningocoques, Gonocoques, Pneumocoques, Staphylocoques et Colibacilles.

Posologie :

Adultes :

Comprimés : Cas bénins : 2 ou 3 comprimés matin, midi et soir. Cas graves, blennorragies aiguës : 4 comprimés 3 fois par jour, ou mieux :

Ampoules intraveineuses ou intramusculaires : 5 à 10 cc. par 24 heures, sans dépasser 20 jours de cure ininterrompue.

La *Lysococcine intraveineuse* doit être poussée très lentement, le malade étant couché (cinq minutes au moins pour une injection de 10 cc.). Ne pas brasser le produit avec le sang dans la seringue.

La *Lysococcine intramusculaire* est indolore par l'adjonction d'anesthésiques appropriés. Elle ne doit pas être utilisée en intraveineuse, en revanche elle est employée avec succès en intraséreuse.

Le malade étant couché en résolution musculaire, pousser lentement 1 ou 2 centimètres cubes de *Lysococcine intramusculaire*.

Attendre une minute que l'anesthésique agisse pour terminer l'injection avec la même lenteur.

Lorsque la quantité à injecter dépasse 5 cc., il est recommandé d'en faire la moitié dans chaque fesse.

Enfants :

Comprimés : Nourrissons, 1 à 2 comprimés ; 1 à 5 ans, 2 à 4 ; 5 à 12 ans, 3 à 7 comprimés.

Ampoules : Nourrissons, 1/2 à 2 cc. ; Enfants, de 2 à 6 cc.

Contre-indications. — Tous les sulfates alcalins sont à proscrire pendant la cure. Éviter la sulfamide lorsque les organes d'élimination et de désintoxication sont gravement lésés (foie, reins).

Lysococcine est adoptée par le Ministère de la Marine.

Laboratoires M. BORNE

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 24-30.)

LYSOSCLÉROL

Composition. — *Lysosclérol* est une composition où sont associés dans des proportions exactement établies : Benzoate de benzyle, 20 p. 100 ; Peptone iodée, 20 p. 100 ; Poudre de scille stabilisée ; Silicate de soude ; Phényléthylmalonylurée ; Extrait fluide d'aubépine ; Extrait fluide de passiflore et théobromine.

Indications. — *Lysosclérol* est le médicament idéal dans l'Hypertension et l'Artério-Sclérose.

Lysosclérol fait disparaître rapidement sous contrôle médical les Bourdonnements d'oreille, Vertiges, Crises d'angoisse, Engourdissement des membres.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 6 dragées par jour avant les repas. Se conformer toujours aux prescriptions médicales.

Résultats. — Sûrs et indiscutables après un mois de traitement et un régime approprié. Doit être pris aussi longtemps que les mesures de tension l'exigeront. Aucun danger d'accumulation.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LAFFORT

JOUÉ-LES-TOURS (Indre-et-Loire).

LYXANTHINE ASTIER

Composition. — Établie suivant une formule entièrement inédite, la Lyxanthine Astier contient 33 p. 100 de principes actifs : bitartrate de lysidine, iodopropanol-sulfonate de sodium, gluconate de calcium.

Aucun toxique ni analgésique.

Propriétés. — Puissant anti-arthritique, dissolvant de l'acide urique, régulateur de la nutrition et du métabolisme calcaire.

Indications. — Rhumatismes chroniques, goutte, convalescence de la maladie de Bouillaud, lithiases biliaires ou urinaires, névralgies et névrites d'origine rhumatismale, troubles hépatiques des arthritiques.

Posologie. — *Granulés* : 1 à 2 cuillerées à café par jour.
Comprimés : 2 à 4 par jour. Cures de 10 à 20 jours.

Prix : 19 fr. 90.

Laboratoires du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

MAGBROMYL

Solution pour adultes.

Solution de Bromure de Sodium pur, renforcé par le Chlorure de Magnésium et du CaCl^2 . Tonique et stabilisateur du Système nerveux. *MgCl^2 augmente l'activité thérapeutique des Bromures. CaCl^2 stabilise le système nerveux. Plus de torpeur, plus de dépression. Pas d'anaphrodisie.*

Indications. — Toutes celles des Bromures.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau, de tisane ou de lait sucrés.

Une cuillerée à café = 0 gr. 50 NaBr, 0 gr. 25 MgCl^2 , 0 gr. 10 CaCl^2 .

Sirop de Magbromyl (Médecine infantile) pour enfants jusqu'à 12 ans.

Doses. — 1 à 8 cuillerées à café *pro die*.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaBr, 0 gr. 10 MgCl^2 , 0 gr. 05 CaCl^2 .

Ces préparations, de goût vraiment agréable, masquent totalement la saveur désagréable des Bromures.

Traitement de 8 à 15 jours suivant les cas.

Prix : Adultes 18 fr. 70. Sirop pour enfants : 11 fr. 45. — L. N. C. n° 552-2

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

8 et 10, r. Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE (Tél. : Italie 16-91).

MAGÉCARINE

Comprimés à base de magnésie, carbonate de chaux, bicarbonate de soude et divers extraits de plantes atoxiques.

Dose et mode d'emploi. — 4 à 12 comprimés au moment des troubles.

Propriétés thérapeutiques. — Neutralisant. *Calmant du plexus solaire.*

Indications. — Acidités anormales, Hyperchlorhydrie. Dyspepsie hypersthénique.

Prix : 14 francs. (10 à 15 jours de traitement.)

Laboratoires DARRASSE

Rue Saint-Maurice — NANTERRE (Seine).

(Tél. : Galv. 86-17.)

MAGIODYL

Solution d'Iodure de Sodium chimiquement pur associé au Chlorure de Magnésium.

Seule préparation de goût vraiment agréable où la saveur insupportable des iodures est totalement masquée.

Avantages. — Le Chlorure de Magnésium augmente l'activité thérapeutique des iodures, supprime les accidents d'iodisme. Emploi facile en médecine infantile et chez les personnes délicates.

Indications. — *Hypertension*, artériosclérose, et toutes les indications des iodures.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cuillerées à café *pro die*, chaque cuillerée à café dans 1/2 verre d'eau ou de lait tiède sucrés ou non.

Dose variable suivant avis du médecin traitant.

Une cuillerée à café = 0 gr. 25 NaI + 0 gr. 25 MgCl².

Traitement de 5 à 30 jours suivant les cas.

Prix : 18 fr. 50. — L. N. C. n° 552-4

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

8 et 10, rue Jeanne-Hachette — IVRY-SUR-SEINE

(Tél. : Italie 16-91.)

MAGNELAX

Composition. — Émulsion de Magnésie et d'Huile de paraffine.

Indications. — **LAXATIF** ne contenant aucun drastique : CONSTIPATION, fermentations, acidités.

Posologie (Doses moyennes): que l'on peut augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Adultes : 1 cuillerée à soupe par jour, au repas du soir de préférence.

Enfants : 1 cuillerée à dessert par jour.

Nourrissons : 1 cuillerée à café par jour dans le lait du biberon.

Prix : 18 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

MAGNÉSIE DECHOSAL

Magnésie calcinée suractivée par un procédé nouveau de porphyrisation.

Avantages. — Conservation parfaite. Action plus que doublée, goût très agréable. Se dissout instantanément dans l'eau sans aucun grumeau.

Indications. — Toutes celles de la magnésie calcinée.

Doses. — 1/4 à 3 cuillerées à café suivant l'âge et suivant les cas.

Prix de la boîte : 13 francs.

Laboratoires DECHOSAL

Pharmaciens Spécialistes,

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine)
(Tél. : 65.)

MAGNÉSIE LANCOSME

SURACTIVÉE

Présentation. — Magnésie lourde de fabrication spéciale, ténue, inodore, insipide, se tenant en suspension parfaite dans l'eau et d'une absolue pureté. Saveur agréable. Parfaitement acceptée par tous les malades.

Indications. — Constipation, acidités gastriques, flatulences, lithiase biliaire, atonie vésiculaire ; anti-acide buccal, intoxications par acides corrosifs, arsenic, sels métalliques.

Posologie. — Prendre la magnésie dans un peu d'eau sucrée ou une infusion chaude.

Dose purgative : 2 à 3 cuillerées à café le matin à jeun.

Dose laxative : 1 cuillerée à café le soir au coucher.

Dose anti-acide : 1/4 de cuillerée à café à chacun des 2 repas.

Anti-acide buccal : 1 cuillerée à café dans 1/4 de verre d'eau pure et après brossage des dents se rincer la bouche avec ce mélange.

Contre les intoxications : après lavage de l'estomac 15 à 20 gr. dans 1/2 litre d'eau.

Prix : 13 fr. 75 (traitement de 20 jours).

LANCOSME,

71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS. (VIII.)

Tél. : Élysées 17-46.

MAGNÉSIUM HARDY

Deux formes : **Granulé-Bouillon & Sirop.**

Composition. — *Granulé-bouillon* : 1 g. 20 Chlorure de Magnésium par demi-cuillerée à café.

Sirop : 1 gr. 20 Chlorure de Magnésium par cuillerée à soupe.

Originalité. — Agrément et facilité d'absorption tant du *Sirop* aromatisé à la Groseille, que du *Granulé-Bouillon* donnant avec une tasse d'eau chaude un consommé très savoureux.

Posologie. — Une demi-cuillerée à café de *Granulé-Bouillon* par jour ou une cuillerée à soupe de *Sirop* au début d'un des repas.

Indications. — Asthénie nerveuse. Prostatisme. Vieillesse prématurée. Stimulant biologique général. Verrues et toutes proliférations. Reminéralisation. Prurits, tremblements.

Présentation :

Granulé-Bouillon : flacon pour 16 jours de traitement.

Sirop : flacon pour 14 jours de traitement.

Laboratoire National de Contrôle : nos 1.555-1 et 2.
--

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux,
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V^e). (Tél. : Gobelins 36-96.)

MAGNÉSIUM ROSSO

Solution Hypertonique de Galacto-Gluconate de Magnésium à 8 p. 100.

Chimiothérapie sédative des syndromes neuro-végétatifs par hyperminéralisation magnésienne.

Par injections intramusculaires et intraveineuses.

Le Magnésium Rosso en thérapeutique est le traitement de choix de : Troubles de déséquilibre neuro-végétatif (Emotivité, Insomnies, Hyperexcitabilité, Irritabilité, Angoisse), Troubles névropathiques, Vaso-moteurs et cardiaques par sympathicotomie, Contractures et crampes, Asthme, Saturnisme et tremblements séniles, Séquelles des maladies infectieuses et post-encéphalites avec lésions organiques (Chorées-Parkinson et sclérose en plaques). Carence sexuelle, Ménopause physiologique post-opératoire : Bouffées de chaleur, Transpiration, Aménorrhée.

Troubles complexes de femmes privées de *maternité*, aide au déclenchement du flux menstruel, favorise l'apparition et le développement des caractères sexuels post-pubertaires.

Eclampsie, Spasmophilie, Anaphylaxies, Dermatoses (prurigo, urticaire), Maladie de la prostate, Cholécystites, Angiocholites et toutes infections des voies biliaires, Lésions précancéreuses, Prophylaxie du cancer.

Posologie :

Traitement d'entretien : 10 cc. tous les jours par injections intramusculaires ou tous les 2 jours intraveineuses.

Traitement d'attaque : de 10 à 30 cc. tous les jours par injections intraveineuses ou intramusculaires.

De préférence, la dose par voie intraveineuse n'excédera pas, la première fois, 10 cc.

Présentation et prix :

Boîte de 12 amp. de 5 cc. : 35 francs.

Boîte de 6 amp. de 10 cc. : 31 fr. 80.

Boîte de 5 amp. de 20 cc. : 40 francs.

Boîtes de 6 amp. à 20 p. 100 de 10 cc. : 40 francs.

Médication intensive, Cytophyllactique, Cytotrope, Indolore, Aucune réaction.

Enregistré au L. N. C. M.

Produits Biochimiques ROSSO

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e.)

(Tél. : Dor. 56-38.)

MAGNÉSO-TUBES ROBINET

Chlorure de magnésium (plus de 50 p. 100) associé à des acides phosphoriques organiques : glycérophosphates, anhydro-oxyméthylène diphosphates de chaux et de magnésie, acide nucléinique.

Présentation. — 30 tubes d'une poudre où se trouve masqué le goût si désagréable du chlorure de magnésium.

Emplol. — Un tube deux fois par jour (aux repas), mélangé au café, au lait, au potage, à la boisson, aux purées, etc...

Posologie. — 15 jours tous les deux mois comme reminéralisant, reconstituant, préventif du cancer, etc... Presque sans arrêt, dans les cas de lésions précancéreuses, tumeurs déclarées, et après une intervention chirurgicale.

Indications. — Amélioration des troubles du système nerveux végétatif : nerfs sympathiques. Régulateur du tonus vago-sympathique et du fonctionnement defectueux des glandes endocrines. Troubles ovariens de la puberté et de la ménopause (Syndromes pluriglandulaires). Séquelles post-opératoires. Asthénie. Fatigue générale. Rhumatismes, constipations, prostatites, cholécystites, etc... Affections de la peau : acné, psoriasis, eczéma. Lutte contre les tumeurs en général. Prophylaxie du cancer. Donne une sensation de grand bien-être.

Prix : 23 francs.

Laboratoires ROBINET

MORET-SUR-LOING (Seine-et-Marne).

Terrains magnésiens et cancer, L. Robinet. — Pour la France : communication à l'Académie de médecine par M. le professeur Delbet (avril 1930). — Pour l'Alsace-Lorraine : Académie de médecine (avril 1930). — Pour l'Angleterre : Académie de médecine (juillet 1931). — Pour le Grand-Duché de Bade : Académie de médecine (juillet 1932).

Terrains magnésiens et cancer, MM. Pierre Delbet et L. Robinet (nouvelle étude). Communication Académie de médecine (mars 1934).

Suicides, tuberculose, sénilité et terrains magnésiens, communication à l'Académie de médecine (avril 1934).

MAGNÉSOVULES

Ovules au chlorure de magnésium
(0 gr. 25 par ovule) conservés suivant la

MÉTHODE SOLACTIVE

Méthode de *conception nouvelle* donnant des résultats remarquables, consistant à conserver les ovules dans un récipient de verre neutre contenant un liquide spécial.

Avantages. — Fusibilité parfaite. Activité décuplée. Asepsie. Conservation intégrale du pouvoir hygroscopique.

Indications. — Les inflammations aiguës ou chroniques de l'utérus et des annexes. Métrites, Salpingites, Ulcérations du col. Vaginites, Prurits vulvaires, etc.

Mode d'emploi. — Retirer du flacon un Magnésovule en le piquant avec la petite fourche, et l'introduire dans le canal vaginal, le soir au coucher. Se garnir ensuite au moyen d'un tampon de coton et d'une serviette périodique.

Les Magnésovules s'appliquent tous les soirs ou tous les deux soirs. Dans les cas aigus, ils peuvent être employés plusieurs fois dans la journée.

Présentés de même façon, il existe des ovules à l'Ichtyol véritable, dénommés Ovules au Sulfichtyol.

Le flacon de 6 ovules, Prix : 19 fr. 60.

Enregistrés au L.N.C. M. sous les n^{os} 1059-16 et 1059-56.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44)

MAGNOXOL

Granulé.

Formule :

Magnésiate d'Ortho-oxyquinoléine..... 5 gr.
 Charbon suractivé..... 12 gr. 50
 Belladone poudre..... 0 gr. 0625
 Sucre aromatisé Q. S. pour 100 gr. de Saccharure.

Indications. — Affections intestinales ; Colibacilloses, Diarrhées et complications, Oxyures.

Affections des voies biliaires : Cholécystites, Angiolites ; Affections urinaires.

Posologie :

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix au public : 19 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1636-2.

Laboratoires J. CORTEEL

74, rue de la Fère — SAINT-QUENTIN (Aisne).

(Tél. : 37-29.)

MAGOL CHURCHILL

(Hypophosphite de manganèse : 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Préparation assimilable de *phosphore* et de *manganèse*. Métal-Ferment grand Catalyseur, Agent et Cause de toutes les oxydations qui régissent le Substratum vital. Remplace avantageusement le Fer.

Indications. — Anémie, troubles de l'ovulation, croissance difficile insuffisances hépatique et mitrale, diabète, chlorose.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans, par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge, par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Trois formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 60.

PRODUIT FRANÇAIS

Enregistré au L. N. C. n° 225-7.

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL

P. DESCHAMPS. Pharmacien

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 74-02.)

MAGSALYL

Association Soufre-Salicylate de Soude.

Forme Solution : dosée par cuillerée à café à :

Salicylate de Soude pur 0,50

Hyposulfite de Magnésium 0,075

Plus Chlorure de Mg, Chlorure de Ca, Salicylate de K, pour établir une solution en équilibre physiologique avec les ions Na, Ca, K et Mg du plasma sanguin.

Propriétés. — Activité accrue surtout dans le traitement des affections cardiaques évolutives par l'action catalytique puissante du soufre vis-à-vis du salicylate, en milieu calcique.

Atoxique. Parfaite tolérance gastrique par l'hyposulfite de Mg, antichoc, antitoxique, cholagogue. PH = 7,4. Seule préparation de goût agréable et persistant grâce à un procédé spécial de fabrication.

Forme Comprimés glutinisés :

Composés des mêmes principes actifs, sans aucun excipient, ils se délitent et se dissolvent rapidement et complètement dans l'intestin.

A prescrire lorsqu'il y a impossibilité à employer la solution (intolérance absolue, malade en déplacement ou travaillant au dehors, etc...), la solution demeurant, à notre avis, la forme préférable.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu, rhumatismes chroniques, sciatique, lumbago, hépatisme, états infectieux.

Mode d'emploi. — 4 à 20 cuillerées à café ou comprimés par 24 heures, à diluer 2 cuillerées à café dans un verre de liquide (tisane, lait, etc.).

Traitement. — De 3 à 15 jours suivant les cas.

Prix : 20 fr. 30.

L. N. C. n° 552-3.

Laboratoire du MAGSALYL

A. ROUX, Pharmacien

8-10, rue Jeanne-Hachette

IVRY-SUR-SEINE. (Tél. : Italie 16-91.)

MAÏAS

Ampoules Maïas à l'essence de térébenthine pure.

Accouchement : En injections intra-utérines.

Émulsion Maïas à l'essence de térébenthine pure.

Gynécologie : En injections vaginales, 1/2 à 2 mesures pour 2 litres d'eau bouillie.

Savon Maïas à l'essence de bergamotte.

Lavage des mains.

Laboratoire de Thérapeutique Générale
du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.

MAISLERIASE

Biochimiothérapie par dilatation gazeuse du **D^r H. MAISLER.**

Composition. — *Oxydant*: Peroxyde d'H. benzolé et catalysé.

Spécifique: Argent en combinaison protidique en milieu hydroglycériné et fermenté.

Propriétés. — Oxydation physiologique, Pouvoir bactéricide élevé, Exaltation des pouvoirs phagocytaire et histolytique, Decongestif, Hémostatique, Antiprurigineux, Indolore, Innocuité absolue, Application facile, Séances courtes.

Indications. — Blennorragie aiguë ou chronique et ses complications, Abortives, Rectites gonococciques ou non, Hémorroïdes, Vaginites, Métrites, Vulvo-vaginites des petites filles, Leucorrhée, Prurit vulvo-vaginal et anal, Stérilité, Fissure à l'Anus.

Présentation et prix. — *Maisleriase*: une seringue Maisler et deux flacons (oxydant spécifique): 63 fr. 70.

Maisleriase F.: deux flacons (oxydant spécifique): 42 fr. 50.

Maisleriase P. M.: deux flacons (oxydant spécifique): 26 fr. 55.

Nota: Chaque boîte présente un traitement complet.

Mode d'emploi et posologie :

A. Chez l'homme: en injections urétrales, Blennorragies récentes (Abortives, aiguës), injection d'un cc. d'oxydant à canal ouvert, suivie d'une injection d'un cc. de spécifique que le malade garde 2 minutes environ. Traitement quotidien ou tous les deux jours.

Urétrites chroniques, toujours accompagnées d'infiltrations à 6 à 8 cm. du méat et à l'angle pénien, et de prostatite subaiguë dans les formes anciennes. Traiter à l'aide d'un instillateur n° 15, en gomme, à boule exploratrice. Traitement bi ou tri-hebdomadaire (4 à 12 séances).

B. Chez la femme: Leucorrhée; Injection vaginale d'une cuill. à café d'oxydant dilué dans un demi-verre d'eau bouillie froide, suivie 3 minutes après d'une injection d'une cuill. à café de spécifique dilué dans un demi-verre d'eau, à garder 3 minutes environ. Tous les deux jours (3 séances).

Vulvo-Vaginites des petites filles: Injection vaginale de 3 cc. d'oxydant dilué au 1/3, suivie d'une injection de 3 cc. de spécifique dilué au 1/3. Arroser ensuite la vulve avec 1/2 cc. d'oxydant et de spécifique purs. Traitement tous les deux jours (3 séances).

Pelvi-métrites, vaginites, vaginisme, stérilité, métrites gonococciques suraiguës: Inj. vag. de 3 cc. d'oxydant dilué dans 6 cc. d'eau 3 minutes après inj. de 3 cc. de spécifique dilué dans 6 cc. d'eau. Arroser ensuite la vulve avec solutions pures.

Hémorroïdes et fissure de l'anus: Instillation successive de quelques gouttes d'oxydant et spécifique purs au niveau de la fissure ou de l'ampoule hémorroïdale, suivie d'une injection rectale de 6 cc. d'oxydant et spécifique dilué au tiers.

Prurit anal et vulvo-vaginal: Arroser avec 1 cc. d'oxydant pur et de spécifique pur.

Métrites gonococciques subaiguës: Spéculum. Seringue de Pravaz de 10 cc. Injection de 9 cc. d'oxydant dilué au tiers, suivie 3 minutes après de 9 cc. de spécifique dilué au tiers. Application tous les deux jours.

Laboratoires de la MAISLERIASE
143, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Vaugirard 70-61.)

MAÏZENA

Présentation. — Poudre blanche, sans saveur, ni odeur, insoluble dans l'eau froide, soluble dans l'eau chaude et formant une crème onctueuse et, si la concentration est suffisante, une gelée en refroidissant.

Analyse :

Carbohydrates	87,60 %
Matières grasses.....	0,04 —
Matières azotées	0,72 —
Matières minérales	0,14 —
Humidité.....	11,50 —
	<hr/> 100 %

Indications. — Aliment léger, facilement assimilable convenant particulièrement aux enfants et aux sujets présentant des troubles digestifs.

Mode d'emploi. — Sous forme de bouillies, potages, entremets sucrés et aromatisés : 1° Délayer la *Maïzena* dans un liquide froid (lait, bouillon) pour que le mélange soit bien lisse ; 2° Verser ce mélange dans le reste du liquide en ébullition ; 3° Laisser bouillir quelques instants seulement.

Doses. — Variables suivant les mets à préparer. Pour les enfants. 1 cuillerée à soupe rase (10 grammes) pour une bouillie de 160 grammes.

Prix : 5 fr. 25 la boîte de 500 grammes,
3 francs la boîte de 250 grammes.

Société des PRODUITS DU MAÏS
29, rue de Berri — PARIS. (Tél. : Elysées 72-06.)

MALTEA MOSER CRISTALLISÉE

Extrait de Malt sec, absolument pur.

Aliment-ferment vitaminé, pour tous les âges.

Permet la liquéfaction des bouillies, ce qui en facilite l'absorption.

Indications. — Alimentation rationnelle (suralimentation et adjuvant des régimes). Saveur agréable. Assimilation parfaite.

Régulateur des fonctions digestives (entérites, entérococolites infantiles et des adultes).

Galactagogue efficace.

Préparation rapide des bouillies maltosées pour alimentation infantile.

Reconstituant général anticonstipant.

Mode d'emploi. — Se prend pure ou mélangée à toute boisson.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 3 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 francs le flacon (usage 15 jours).

MOSER et Cie S. A.

8, chemin de Montbrillant — LYON (III^e).

Tél. : Moncey 42-19.

MALT ETHEL

Malt d'orge touraillé et torréfié (succédané du café).

Le malt Ethel est composé uniquement d'orges germées (malt), touraillées et torréfiées.

Il contient tous les principes actifs et nutritifs de l'orge dans une forme facilement assimilable; il remplace le café, dont il n'a pas la nocivité.

Le Malt Ethel est très riche en vitamines et enzymes (diastases).

Il convient particulièrement :

1° A tous les débilités, anémies et aux gastro-hépatiques, dont il stimule et régularise les fonctions digestives.

2° A tous ceux auxquels l'usage du café est interdit: cardiaques, rénaux excités, nerveux, etc., car il constitue également un sédatif puissant du système nerveux.

FLORIMALT

Farine alimentaire entièrement digestible et assimilable, d'un goût exquis, sans cacao. Fa ilite la digestion du lait.

Composition : Céréales maltées 100 p. 100.

Indications : Biberons et bouillies. — Aliment diététique. — Déjeuner du matin. — Se prépare également à l'eau.

Pour tous renseignements et échantillonnage, prière de s'adresser :

USINES ETHEL S. A.

Malteries et Torréfaction de malt à SCHILTIGHEIM (Bas-Rhin),
Ou à l'Agent Général

Pierre RONCIN

132, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS (10°).

(Téléphone : Nord 32-13.)

Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

MALT FRANÇAIS DÉJARDIN

(Extrait de)

Bière de santé extrêmement concentrée additionnée de glycérophosphates.

Indications. — Les nourrices défaillantes, les dyspeptiques, les anémiques et les chlorotiques.

Aliment des faibles, des délicats, des épuisés.

Remède des arthritiques, scrofuleux et lymphatiques.

Posologie. — *Pour les adultes :* Pur, un verre à bordeaux un quart d'heure avant les repas et mélangé comme boisson, en mangeant, dans la proportion de 1 pour 3, à une eau naturelle très légèrement alcaline.

Pour les enfants : Le quart ou la moitié de ces doses.

Prix : 4 fr. 15 verre compris.

Etablissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI°).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

MALTOGIL

(Malt pailleté Progil.)

Composition. — Extrait de malt cristallin garanti pur. Reconstituant diastasique vitaminé. Renferme la totalité de la diastase du malt, du maltose, des phosphates naturels, de la lécithine, des peptones et des vitamines.

Propriétés. — Aliment très concentré de goût agréable, de digestibilité parfaite.

Indications. — Convalescents, Anémiés, Surmenés, Opérés, Dyspeptiques, Cardio-rénaux, Hépatiques.

Remplace avantageusement la bière pour nourrices.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 3 à 6 cuillerées à soupe par jour, soit tel quel, soit dans de l'eau ou dans une infusion.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour, à faire prendre de la même façon.

Bouillies maltées : Après cuisson, retirer la bouillie du feu et la laisser reposer deux ou trois minutes. Ajouter une cuillerée à café de **Maltogil** par cuillerée à soupe de farine employée et remuer. Attendre un quart d'heure, puis porter rapidement à l'ébullition. La bouillie devient fluide et parfaitement digestive.

PROGIL, Sté An. au cap. de 50.000.000 de fr.
10, quai de Serin — LYON (IV^e).

(Tél. : Burdeau 85-31.)

Laboratoires à RIS-ORANGIS (S.-et-O.)

MALTOSAN

Bouillie maltosée en poudre.

Composition. — Maltose, 30 p. 100. Dextrines, 25 p. 100. Céréales, 40 p. 100. Sels minéraux, 2 p. 100. H^2O , 3 p. 100. Diastases.

Indications. — Dyspepsie du lait de vache; combat les fermentations putrides. Désinfectant intestinal, exerce une action favorable dans le traitement de la constipation. Facilite le sevrage.

Doses. — 2 mesures par repas de 100 gr. (lait et eau). Augmenter de 1 mesure nouvelle par 50 gr. de liquide supplémentaire.

Cuire rapidement sans cesser de remuer.

Retirer du feu au premier bouillon.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MALTOSE-DEXTRINE NESTLÉ

Sucre nutritif antidiarrhéique.

Composition :

Dextrine	54,0 p. 100
Maltose	43,0 —
Chlorure de Sodium	0, 5 —
Eau	2, 5 —

Obtenu à partir d'un sirop résultant de la transformation diastasique de l'amidon pur (procédé spécial Nestlé).

100 gr. de Dexmalton = 398 calories.

Indications :

- Nourrissons bien portants* : sucrage des biberons de lait ordinaire, acidifié (Pélargon de Nestlé) ainsi que de babeurre Nestlé (Elédon simple).
- Malades, débiles, prématurés* : sucre diététique idéal, ainsi que pour le traitement des diarrhées, selles acides, dyspepsie, dystrophie, hypotrophie et troubles cutanés (eczéma, croûte de lait, etc.).

Prix : 16 francs.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

MALTOSINE DÉJARDIN

Extrait de Malt sec, atomisé, obtenu absolument pur, et contenant la totalité des ferments du grain à l'état naturel.

Indications. — Troubles de la nutrition des nourrissons et enfants, Putréfactions, Colites, Déphosphatisation des anémiés, surmenés, convalescents et vieillards.

Posologie :

Nourrissons : 3 cuillerées à café par tasse.

Bouillies maltosées : 2 à 4 cuillerées à café par litre.

Enfants : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 8 francs.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 03-04.)

MALT WANDER ou GLOMALT

(Extrait de malt sec.)

Composition. — Matières azotées 5,87 p. 100 ; Hydrates de Carbone (maltose et dextrose), 89,19 p. 100 ; Substances minérales, 1,56 p. 100 ; Acide phosphorique des substances minérales, 9 p. 100. Eau, 3,40 p. 100 ; Diastases. Vitamines.

Forme. — Paillettes.

Indications. — Aliment végétal nutritif et digestif dans les cas d'Asthénie générale, Convalescence, Dyspepsie, Entérocologie chronique par insuffisance amylolytique. Source de diastases et de vitamines B. Permet la préparation des bouillies maltosées.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

MANACINE

(Produits à l'extrait de Manaca.)

Comprimés
(Us. interne).

Pommade
(Us. externe).

Composition :

KI.....	0,048	Extr. mou de Manaca	1gr.
KBr	0,008	Huile de Chaulmoogra...	1,50
Extr. mou de Manaca	0,05	Ichtyol.....	1 gr.
— de Quinquina .	0,024	Camphre	0,40
— de Gentiane ...	0,008	Menthol	0,10
— de Marrube ...	0,004	Deutoxyde de Plomb....	0,10
— d'Agaric	0,02	Oxyde de Zinc.....	10,00
— de Passiflore....	0,004	Excipient..... Q. S. P.	100 gr.
— de Centaurée ...	0,004		

pour un comprimé.

Indications. — Maladies de la Peau (Eczéma, Psoriasis, Acné, Urticaire, etc.), Ulcères variqueux. Troubles de la circulation (Varices, Phlébites, etc.), Artériosclérose, Arthritisme, Brûlures.

Posologie.

2 comprimés matin et soir avant le repas. | Un pansement (ou une application) matin et soir suivant le cas.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de la MANACINE

83, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

MANDÉLIUM

Composition. — *Mandélium-ampoules* : ampoules buvables de 3 gr. 38 de mandélate d'ammonium. *Mandélium-poudre* : divisions de 3 gr. 38 de mandélate de calcium en granulé ou cachets de 1 gr. 12.

Propriétés. — *Bactéricide et acidifiant.*

Indications. — Infections urinaires aiguës et chroniques ; *spécifique du colibacille*. Lithiase phosphatique et oxalique. Toutes alcaloses.

Posologie. — a. Des infections urinaires : 4 ampoules ou divisions par jour, une unité immédiatement après chaque repas ou 3 cachets au cours de chacun des quatre repas.

Enfants : de moins de 6 mois à 2 ans : 2/3 de division à 1 ; de 2 à 5 ans : 1 à 2 divisions ; de 5 à 12 ans : 2 à 3 divisions ; *en quatre fois comme chez l'adulte*.

b. Des lithiases et alcaloses : la moitié ou le quart des doses précédentes.

Boîte de 12 ampoules ou divisions.

Boîte de 36 cachets.

N. B. — L'action du *Mandélium* est sûre, si l'*acidité urinaire est suffisante*.

Dès le début du traitement, il faut la mesurer plusieurs fois avec notre papier réactif ; si celui-ci reste jaune après avoir été trempé dans l'urine, l'acidité de cette dernière est suffisante (pH égal ou inférieur à 5,3) : s'il vire au gris ou au gris violacé, les urines sont insuffisamment acides.

Si le papier réactif vire au gris violacé après deux jours de traitement par le *Mandélium*, on ajoutera un acidifiant urinaire. Lorsque l'acidité nécessaire est atteinte, diminuer progressivement l'acidifiant et même les doses de *Mandélium*.

Pendant le traitement, ne pas suivre un régime alimentaire alcalinisant.

Société générale d'Applications Thérapeutiques
" THERAPLIX "

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
 (Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

MANDOCARBINE

Indications. — Antisepsie des voies biliaires, intestinales et urinaires, Fermentations intestinales, Intoxications alimentaires, Aérophagie, Entérites, Congestion du foie, Prostatites, Cystites, Colibacilloses, Constipation.

Composition. — Charbon absorbant, magnésie, poudre de feuilles de belladone, para-amino-benzène sulfamide, mandélate de calcium.

Forme. — Granulé fondant.

Prix : 18 fr. 75 la boîte pour 10 jours de traitement.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas principal, à placer sur la langue et à absorber avec une gorgée d'eau.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1248-5.

L. GUÉRET, Pharmacien
89, rue Martre — CLICHY (Seine).

MANGAÏNE

Polyoxyde de Manganèse
chimiquement pur.

Forme et Dose :

Tablettes 0,10 de Polyoxyde de Manganèse.

Propriétés thérapeutiques :

Elles constituent la préparation la plus rationnelle pour l'assimilation rapide et efficace des sels de manganèse.

Indications thérapeutiques :

Dyspepsies gastro-intestinales, Anémies.

Dose. — 4 à 6 tablettes par jour.

Prix : 13 fr. 75.

Laboratoire de la MANGAÏNE

71, rue Sainte-Anne — PARIS.

(Tél. : Richelieu 19-26.)

MANGANÉSIA

Solution permanganique arsenicale.

Traitement du Diabète.

Propriétés thérapeutiques. — Le Manganésia diminue la soif, diminue la quantité des urines et celle du sucre qu'elles contiennent, favorise les échanges nutritifs, tonifie le système nerveux, rétablit les fonctions de la peau et rend au sang son alcalinité normale.

Dose et mode d'emploi. — XX gouttes au commencement de chaque repas dans du vin.

Continuer pendant trois semaines, se reposer une semaine, puis reprendre.

En cas d'intolérance, commencer par X gouttes par repas, puis augmenter progressivement.

On doit compter dans le diabète moyen sur un traitement d'environ 3 mois.

Les diabétiques qui font usage du Manganésia peuvent s'alimenter comme en état de santé.

Prix : 18 fr. 75.

L. N. C. n° 437-3.

**Laboratoires des Produits DANNEC'H
BRUN et MARTINEAU**

64, rue des Tournelles — PARIS (III^e). (Tél.: Arch. 87-44.)
R. C. Seine 218.670.

MANGANO-PHOSPHAL

Gouttes sans aucun toxique.

Composition. — XX gouttes contiennent :

Ac. phosphorique offic. pur.....	0 gr. 35
Magnésium et polyglycéroph.....	0 gr. 60
Sels de manganèse.....	0 gr. 10
Gluconate de cuivre.....	1/4 milligr.
Phosphate de zinc.....	1/10 milligr.

En solution sans alcool et sans sucre.

Indications. — Puissant reconstituant, *sans aucun toxique*, agissant très rapidement et donnant des résultats durables. Enfants, adultes, femmes enceintes ou qui nourrissent, diabétiques, vieillards même hypertendus.

Posologie :

Enfants : 2 gouttes par jour par année d'âge dans un peu d'eau sucrée.

Adultes : XX gouttes à chacun des repas de midi et du soir, dans 1/2 verre de liquide.

Aucune contre-indication.

Prix : 17 francs 35. — Flacon gratuit sur demande :

Louis JULIEN, Docteur en Pharmacie.

105, rue de Rennes — PARIS (VI^e). — Tél.: Littré 80-76.

MARINOL

Reconstituant marin physiologique.

Inaltérable. De goût agréable.

Composition. — Eau de mer captée au large. Iodalgol (Iode organique). Phosphates calciques en solution organique. Algues marines iodifères. Méthylarsinate disodique.

Particularités. — Seul succédané naturel de l'huile de foie de morue. Permet seul l'administration de l'iode organique marin dans son véhicule normal, l'eau de mer. Tolérance absolue.

Indications. — Lymphatisme. Anorexie. Tuberculose. Anémie. Convalescences.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à soupe. *Enfants* : 2 à 3 cuillerées à dessert. — *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café.

Avant ou après les repas. Pur ou dilué.

Prix : 18 fr. 65

Laboratoires " LA BIOMARINE "

DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

MARRUBÈNE

Principes actifs végétaux du Marrube et de l'Aunée en association synergique avec la Terpène et le Benzoate de soude.

Propriétés. — Possède la triple action : *Fluidifiante, Expectorante, Aseptisante*, sur les produits d'expectoration. Facilite l'expectoration, calme la toux.

Indications. — Rhumes, Bronchites, Catarrhe des bronches, suites de Grippe, Dilatation des bronches, Tuberculose.

Mode d'emploi. — Le Marrubène se présente sous forme de cachets, de dragées, de granulés et d'élixir. Prendre chaque jour en moyenne 4 cachets, ou 6 dragées, ou 4 cuillerées à café de granulés, ou 2 à 3 cuillerées à soupe d'élixir.

Boîte de 36 cachets.

Tube de 45 dragées.

Élixir — Granulés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les numéros :

Cachets 590-10. Dragées 590-9.

Granulés 590-11. Élixir 590-18.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

MARRUBIASE

Extrait de plantes « incisives » et surtout de Marrube blanc.

Formes. — Dragées et sirop.

Propriétés. — Diarrhée rapidement jugulée sans constipation. Suppression presque immédiate du sang et des glaires. Retour à bref délai de la selle moulée quotidienne. Aucune toxicité, Pas de contre-indication.

Indications et Posologie. — *Diarrhée infantile* (nourrissons) : 1 cuillerée à café toutes les 2 heures (pure ou dans un peu d'eau sucrée).

Intoxications, dysenteries (selles nombreuses) : 2 cuillerées à soupe ou 4 dragées toutes les 2 heures.

Entérite chronique : Progressivement 2 à 5 cuillerées ou 4 à 10 dragées par jour avant les repas et au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de contrôle des Médicaments n°s 103-3 et 4.

Prix : 16 fr. 65, durée 2 à 4 jours.

COMTE, Pharmacien,

60-62, rue Saint-Guilhem — MONTPELLIER.

MARRUCOL

Composition. — Sulfogafacolates de potasse, Marrube blanc, Glycérophosphate de chaux, Méthylarsinate de soude, Noix vomique pulvérisée.

Indications. — Agit particulièrement comme Traitement d'entretien dans les Bronchites aiguës ou chroniques, Pleurésies, Pneumonies, Congestions pulmonaires, Maladie de Poitrine. Est également indiqué dans Toux, Rhume, Catarrhe, Asthme, Grippe, Crachats persistants, Anémie, Rachitisme.

Propriétés. — Antiseptique pulmonaire et modificateur de la muqueuse respiratoire. Fluidifie les sécrétions et facilite l'évacuation des mucosités filandreuses et transparentes. Calme la toux, Recalcifiant, Reminéralisant, Tonique, Excite l'appétit.

Mode d'emploi. — Un cachet matin, midi et soir, avant les repas.

La boîte de 30 cachets : 12 fr. 50.

Laboratoire COIRIER

69, avenue du Maine — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 86-76.)

MARUBOR

Sirop à base d'extrait hydroalcoolique stabilisé de Marrube Blanc.

Propriétés. — Modificateur des sécrétions bronchiques, expectorant, toni-cardiaque.

Indications. — Congestion pulmonaire, Bronchites rebelles ou chroniques, Catarrhe, Asthme, Tuberculose.

Aucune contre-indication.

Posologie. — Agréable malgré sa haute teneur en Marrube (10 gr. d'extrait stabilisé par litre), ce sirop se prescrit à la dose moyenne de 4 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 16 fr. 85.

Littérature et Échantillons au
Laboratoires du MARUBOR

1, rue d'Arras — BÉTHUNE (Pas-de-Calais).
(Tél. : 1-59.)

MATÉ DOUGLAS

au Maté du Paraguay.

Indications. — Nutritif, fortifiant, stimulant. Développe les facultés intellectuelles. Tonifie le système nerveux. Détermine une sensation de bien-être et de vigueur sans amener de dépression. ni d'inconvénient quelconque après son emploi.

Composition. — Vin : Muscat de Samos et Maté.
Prix : 22 francs.

Élixir : Crème de Cacao et Maté. Prix : 20 francs.

Granulé : Maté glycérophosphaté composé.

Prix : 14 francs.

Littérature et échantillons aux Docteurs en exercice,
sur demande adressée au Dépôt général :

**PHARMACIE ANGLAISE
DES CHAMPS-ÉLYSÉES**

62, avenue des Champs-Élysées — PARIS (VIII^e):
(Tél. : Élysées 22-52.)

MÉDICOFERMENT

Phosphates, Diastases, Vitamines.

Culture pure et active de Levure de Raisins sélectionnée, acclimatée à hautes températures et physiologiquement préparée pour l'usage thérapeutique. (R. Thirode, pharmacien.) Enregistré au L. N. C. M., n° 826-1.

Propriétés. — Désintoxication et immunisation de l'organisme par les ferments vivants et en pleine activité.

Indications. — 1° Dermatoses (Furoncles, Acné, Orgelets, Rougeurs, Eczéma, Dartres, Démangeaisons, etc.);

2° Troubles digestifs (Dyspepsie, Intestin, Diarrhée, Constipation, etc.);

3° Maladies de la nutrition (Diabète, Arthritisme, etc.);

4° Maladies infectieuses.

La dose pour une cure d'environ 3 semaines : 30 fr. 70 franco.

Mode d'emploi. — Un petit verre à liqueur avant les repas de midi et du soir dans un demi-verre d'eau sucrée avec un demi-morceau de sucre scié.

Cas rebelles : 3 verres à liqueur par jour.

Enfants 2 à 6 ans : demi-doses.

Ne pas confondre le Médicoferment avec les jus de raisins stérilisés ou autres.

Littérature et Echantillon gratuits.

Laboratoire pour la Culture des Ferments de Raisins.

G.-César BOSS, Directeur

10, rue de la Viotte — BESANÇON (Doubs).

MÉNOBIOL

Forme. — Élixir de goût agréable permettant une forte concentration des composants exclusivement végétaux.

Composition. — Extraits totaux stabilisés de : hamamelis virginica, hydrastis canadensis, marron d'Inde, gossypium sabaceum, viburnum prunifolium, piscidia erythrina, senecio vulgaris.

Indications. — *Troubles circulatoires* (congestions viscérales diverses).

Hyperhémie cérébrale : bourdonnements d'oreilles, vertiges, céphalées, névralgies faciales.

Hyperhémie des organes splanchniques (gros foie, hémorroïdes).

Hyperhémie utéro-ovarienne (névralgies ovariennes, douleurs du bas-ventre).

Troubles menstruels de la ménopause sous toutes leurs formes.

Posologie. — Une cuillerée à café au début des trois repas.

Prix : 13 fr. 55.

Établissements André HATIER

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire),

MENOSSEDINE

Composition. — Gossypium, Hamamelis, Poudre ovarienne, Pyramidon, Bromure de sodium.

Indications. — Sédatif utérin, Calme les phénomènes douloureux et malaises qui précèdent ou accompagnent les règles.

Formes. — Liquide et comprimés.

Posologie. — Au début des malaises, une cuillerée à soupe : une seconde cuillerée une demi-heure après si la première n'a pas suffi.

Trois comprimés dans un peu d'eau ; trois autres une demi-heure après si besoin.

Prix : Liquide et comprimés : 13 fr. 05 (3 ou 4 mois de traitement).

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

MENSIVAL

Médicament spécifique de la douleur menstruelle.

Forme. — Cachets de 0 gr. 50 constitués uniquement par le Diméthylpropanoate ortho-hydroxybenzoïque (Ether valérianique de la fonction oxydrique salicylique).

Propriétés thérapeutiques :

A. **Sédatif utérin** analgésique, antipyrétique et antispasmodique agissant en 20 minutes.

B. **Régulateur du flux menstruel.**

Inocuité absolue. Pas de contre-indication.

Indications. — Règles douloureuses, Dysménorrhées, Spasmes utérins, Coliques *post partum*, Névralgies utéro-ovariennes, Troubles douloureux de la ménopause, Nervosisme de l'époque menstruelle.

Posologie. — **Mode d'emploi :** 2 jours avant la date présumée des règles : 2 cachets par jour. Pendant les règles, 3 à 4 cachets par jour, avec une infusion chaude, à 3 ou 4 heures d'intervalle.

Prix : 17 fr. 50 la boîte de 24 cachets.

Laboratoires SUJAL
J. LAFARGE, Dr en pharmacie
62, rue de la Brauderie — CHATEAUXROUX (Indre).

MENSUOSÉDYL

Calmant immédiat des Douleurs menstruelles, adjuvant à tous traitements des Disménorrhées.

Composition :

Un sédatif utérin	Anémone.
Un analgésique	Pyramidon.
Un diurétique-décongestif	Théobromine.
Un antispasmodique	Valériane.
Un toni-cardiaque	Guaranine.

(Procédé spécial de conservation.)

La boîte de 12 cachets : 15 francs.

Processus de l'action.

Le flux menstruel est régularisé grâce à l'action *sédative* élective qu'exerce l'*Anémone* sur le faisceau vasomoteur du para sympathique et sur les filets de l'appareil utérin.

L'efficacité *analgésique et antinévralgique* du *Pyramidon* est connue dans le cas considéré.

Une *théobromine pure*, d'activité physiologique contrôlée, réalise une heureuse *action décongestive* sur le rein hyperémié à cette période et joue le rôle de *correctif* vis-à-vis du *pyramidon*.

La *valériane*, par action équilibrante sur le sympathique calme les symptômes nerveux et amorce l'action *sédative*.

La *Guaranine* lutte contre la *dépression cardiaque* (palpitations, vertiges, syncopes) qui complique généralement les troubles de la période menstruelle.

Sans opothérapie, le *Cachet Mensuosédyl* n'influence pas directement le rythme de l'ovulation. Il ne vise qu'à calmer l'élément douleur dans toutes ses manifestations symptomatiques et y réussit parfaitement.

Il constitue l'adjuvant, le catalyseur idéal de tous traitements de la cause d'une irrégularité fonctionnelle ovarienne et ne présente aucune contre-indication.

Mode d'emploi. — 1 cachet dès l'apparition des douleurs, 2 à 3 par 24 heures. Menstrualgies, Disménorrhées, Troubles nerveux de la vie génitale, Algies post partum.

Échantillons sur demande.

Paul AUGIER, Pharmacien

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris
2, rue des Lombards — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 09-04.)

MENTHE MITCHAM VÉDÉ

Feuilles de menthe pour infusions digestives, d'une qualité exceptionnelle et d'un arôme sans égal. Cultures médicinales modèles au château de Brailly-Cornehotte (Somme). Plants Mitcham sélectionnés à teneur élevée en huiles essentielles.

Plantation, récolte, mondage, dessiccation dans locaux spécialement aménagés. Plants entourés de tous les soins nécessaires pour favoriser l'acclimatation et éviter la dégénérescence.

Boîte pour 50 tasses : 5 fr. 30.

Boîte pour 100 tasses : 10 fr. 10.

Échantillons gratuits au Corps médical.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 97-46 et 94-47.

et Château de Brailly, - CORNEHOTTE (Somme).

MERCUROCHROME 220 H. W. D.

Formes. — Solutions aqueuses 2 p. 100, 14, -60 cc., etc.

Pommades : 30 gr., 2 et 5 p. 100.

Collyre, pommade et solution.

Ovules 2 et 5 p. 100.

Suppositoires.

Solution chirurgicale : acéto-alcoolique.

Indications. — Antiseptique général, Bactéricide tinctorial puissant, non caustique.

Usage externe : désinfection de la peau, des muqueuses.

Injectons intraveineuses : Septicémie (sel sec préparé spécialement).

THANTIS-TABLETTES : pastilles sel sodique de la monohydroxymercuri-diiodo-résorcinsulfonphtaléine. Antiseptique bucco-pharyngé extrêmement actif.

Le tube de 12 pastilles : 20 fr.

Laboratoire

du **MERCUROCHROME 220 H. W. D.**

G. GOMET, Pharmacien

25, rue Saint-Augustin — PARIS (2^e).

(Tél. : Opéra 87-23.)

MERCURO-PAST

Dermatologie - Chirurgie.

Composition. — Pâte à l'eau spéciale au mercuro-fluoren.

Propriétés. — Par l'association stable des deux meilleurs agents dermatothérapeutiques. La pâte à l'eau traditionnelle. L'antiseptique moderne de choix : le dibromooxymercurifluorescéine (marque déposée : mercuro-fluoren).

Indications. — Le *Mercurio-Past* est indiqué dans toutes les dermatoses.

Dermatologie : Eczémas, Dermatoses inflammatoires, Dermatoses parasitaires.

Chirurgie : Cicatrisant et désinfectant des plaies superficielles et anciennes. Cicatrisant des plaies superficielles infectées. Plaies chirurgicales ténantes : fistules, escharres, etc. Retard de cicatrisation.

Mode d'emploi. — Selon l'indication du médecin.

Présentation. — Tube de 80 gr. Prix public : 18 fr.

Laboratoire PRIGNIAU

52, rue des Cinq-Diamants — PARIS (XIII^e).
(Tél. : Gob. 90-79.)

MÉSOTHINE RHEMDA

Comprimés radioactifs à base de Bromure de Mésothorium, associé à la médication dialytique du Professeur HAYEM (lithine-citrate de soude-hexaméthylène tétramine).

Action. — 1^o La MÉSOTHINE augmente la solubilité de l'Acide urique et de la Cholestérine.

2^o Elle en ralentit la production en les détruisant en partie au moment de leur formation par activation des ferments uricolytiques (travaux de Sarvonat et Rebattu sur l'émanation du Radium).

Diathèse arthritique.

Indications. — Goutte, Rhumatisme, Sciatique, Hypertension, Maladies de la cinquantaine. Affections vésico-rénales et biliaires.

Posologie. — 1 à 4 comprimés, le matin à jeun, de préférence suivant l'indication du médecin.

Dans les cas de manifestations aiguës : 4 tubes de 20 comprimés. Cure préventive ou d'entretien : 1 tube tous les 3 mois.

Prix au public : tube de 20 comprimés : 15 fr. 30

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le N^o 466-1

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. : Seine 255.068 B.

MÉSOTHORIUM RHEMDA

Solution isotonique de Bromure de Mésothorium
en ampoules.

Primesol. — 1/5 de micro par centimètre cube. Boîtes de 6 ampoules de 1 cc. Traitement prolongé des états morbides peu graves : arthritisme, convalescence des maladies infectieuses, lymphatisme. Traitement d'une douzaine de jours : 1 à 3 cc. par jour.

Prix au public : 12 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-8.

Bimesol. — 1 micro par centimètre cube. Boîtes de 3 ampoules de 1 cc. Angine de poitrine, artériosclérose, hypertension, manifestations goutteuses, rhumatisme.

1 à 3 cc. par jour pendant une douzaine de jours.

Prix au public : 21 fr. 70.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-9.

Trimesol. — 2 micros par centimètre cube, 2 ampoules de 5 cc. par boîte. Utilisé pour effet rapide, infections de haute gravité. (Prompte amélioration de la formule sanguine.) Traitement palliatif et analgésique du cancer.

5 à 20 micros par jour pendant 8 jours.

Prix au public : 75 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 466-10.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914

S. MOGAN, Pharmacien

51, Rue d'Alsace, COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068 B.

MÉTACARBINE

Formine (recristallisée dans l'alcool)... 3 gr.

Charbon hyper-activé..... 15 gr.

Sucre aromatisé..... Q. S. p. 100 gr.

Propriétés. — Anti-infectieux interne, absorbant et puissant adsorbant.

Indications. — Infections biliaires, urinaires ou gastro-intestinales d'origine épidémique, parasitaire avec ou sans fermentation (entérites, entéro-colites muco-membraneuses, colites spasmodiques, colibacillooses, etc...).

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café le matin et après les 2 principaux repas. A croquer ou délayer dans un peu d'eau.

Nota. — Le pouvoir adsorbant de ce charbon a été considérablement augmenté par une préparation spéciale. Il ne ressemble en rien aux autres charbons dont la force attractive envers les toxines et les poisons ne peut être comparée à celle du charbon hyperactivé.

Prix : 15 fr. 10 la boîte de 135 gr.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire du Docteur E. AUBERT

71, rue Saint-Anne, PARIS — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France

O. C. P., Paris, et tous Grossistes.

Afrique du Nord : **PELISSARD, ALGER-CASABLANCA**

MÉTACITRINE

Citrate trisodique	6 gr. 50
Phosphate de soude.....	7 gr. 50
Sulfate de soude.....	8 gr. 50
Lactose et sucre effervescent	100 gr

Poudre granulée très effervescente.

Propriétés. — Favorise la digestion, active la sécrétion biliaire, fluidifie le sang, prévient la lithiase intestinale.

Son action (lelotonique) sur le muscle lui-même et (cholagogue) sur la sécrétion biliaire, détermine une réaction directe et indirecte sur les glandes annexes.

Indications. — Dyspepsies, gastropathies, crise hémoclasique, diathèse arthritique, stase veineuse.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun ou 1 cuillerée à café matin, midi et soir avant les repas. Dans un grand verre d'eau tiède.

Nota. — Si le Phosphate Acide de Soude dissout les calculs phospho-carbonatés, le Sel de Magnésie agit moins en dissolvant les concrétions oxalo-phosphatées qu'en empêchant leur formation.

Prix : 18 francs le flacon de 150 gr.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire du D^r E. AUBERT

71, rue Sainte-Anne, PARIS — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement Pharmaceutique et Dépôts : France.

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PELISSARD

ALGER-CASABLANCA.

MÉTACUPROL

(A base de sulfate de cuivre.)

Propriétés. — Efficacité certaine dans toutes les Staphylococcies et Streptococcies. Puissant antiseptique gynécologique et dermatologique. Ni caustique ni irritant. Peut s'employer sans eau bouillie.

Indications :

Gynécologie : Leucorrhées, Métrites, Déman-geaisons, Hygiène intime.

Dermatologie : Furonculose, Anthrax, Impé-tigo, Eczémas, Brûlures, Affections suin-tantes, Boutons.

Formes :

Comprimés effervescents de 1 gr.

Ampoules de 5 cc. pour injections intra-veineuses au 1/200^e (utiliser des aiguilles fines).

Pommade en tube. Non grasse. Soluble dans l'eau.

Posologie :

Gynécologie : 1 à 2 comprimés pour 2 litres d'eau (hygiène).

1 à 2 comprimés pour 1 litre d'eau (cas aigus).
Position couchée.

Dermatologie : 1 comprimé par litre d'eau.

Pommade : Application matin et soir.

Ampoules :

Enfants : 1/2 ampoule de 5 cc. par jour.

Adultes : 1 ampoule de 5 cc. par jour, ou 2 ampoules de 5 cc. par jour (cas graves).

Tolérance parfaite. Aucune toxicité.

Prix : Ampoules, 25 fr. 50, Pommade, 12 fr. 75, Comprimés, 12 fr. 75.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 54-52.)

MÉTAFORMINE

(GRANULÉ SOLUBLE)

Composition :

Rein (extrait total).....	3 gr.
Formine (anhydro-citrate).....	2 gr.
Pipérazine (tartrate).....	2 gr.
Lithine (citrate).....	2 gr.
Lactose et sucre. Q. S. pour.....	100 gr.

Propriétés. — Stimulant diastasique rénal, diurétique atoxique. Dialytique, anti-urique.

Indications. — Arthritisme, uricémie, goutte, gravelle, rhumatisme, migraine.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un grand verre d'eau. Le matin à jeun ou avant les repas, et le soir au coucher.

États aigus : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Prix : Grande boîte étanche : 135 gr. : 17 fr. 50.

10 jours de traitement.

Conditions spéciales au corps médical.

Nota. — La première synergie des diastases rénales associées aux diurétiques chimiques.

Il existe aussi une forme *Métaformine comprimé*, renfermant uniquement 0 gr. 50 de formine purifiée par comprimé soluble dans l'eau. —

Toutes indications des antiseptiques diffusibles.

LABORATOIRES du Docteur E. AUBERT

71, rue Sainte-Anne, PARIS (II^e) — (Richelieu 19-26.)

Approvisionnement pharmaceutique et Dépôts France :

O. C. P. PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD

ALGER-CASABLANCA.

MÉTALLOPHÉDRINE

Traitement des états congestifs, inflammatoires et infectieux de la muqueuse rhino-pharyngée et des cavités annexes.

Composition. — Association stable d'argent, de cuivre, de zinc et de chlorhydrate d'éphédrine naturelle permettant, en même temps qu'une action constrictive prolongée, une destruction complète de tous les agents microbiens du Rhinopharynx (streptocoque, staphylocoque, pneumocoque, etc.), grâce au cuivre et au zinc existant non pas sous leur forme colloïdale, mais à l'état de sulfates.

Mode d'emploi. — *Gouttes :* 1 à 3 par narine de trois à six fois par jour en instillations.

Peut être utilisé également en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur nasal en verre sans pièces métalliques. Donner deux séries de 5 à 6 coups de poire par narine, à 2 minutes d'intervalle 3 à 6 fois par jour.

Indications — Toutes rhinites, céphalées d'origine nasale, sinusites, éthmoïdites, adénoïdites, et comme préventif de la paralysie infantile (zinc).

Le flacon avec compte-gouttes : 18 fr. 35.

Laboratoire COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

MÉTASULFAMIDE

**Chimiothérapie antibactérienne
polyvalente.**

Enregistré au Lab. Nat. Contr. des Méd.
sous le n° 1017-3.

Formule (par comprimé). — Sulfanilamide 0,15, Oxyquinoléine 0,03, acide 4-oxy-3-acétylaminophénylarsinique 0,02, Bile 0,05, Hexainositophosphate de Ca et de Mg.

ACTION ANTIBACTÉRIENNE POLYVALENTE DE LA MÉTASULFAMIDE

SULFANILAMIDE	OXYQUINOLÉINE	ACIDE 4-OXY-3-ACÉTYLAMINOPHÉNYLARSINIQUE	BILE
Streptocoques Staphylocoques Méningocoques Gonocoques Colibacilles	Gonocoques Colibacilles Protozoaires	Protozoaires Pneumocoques Spirochètes	Colibacilles Pneumocoques

Posologie. — 1 comprimé par 10 kilogrammes de poids et par jour.

Le flacon renferme 40 comprimés.

Pas de toxicité.

Échantillons sur demande.

Laboratoire

de Chimiothérapie Antibactérienne

16, route d'Abbeville — AMIENS (Somme).

MÉTATITANE

Pommade et Poudre introduisant le titane en thérapeutique.

Indications. — *Prurits, Erythèmes* : Eczémas, Intertrigo, Brûlures, Coups de soleil, Engelures, Piqûres d'insectes, Erythèmes des nourrissons, Croûtes de lait, Gerçures des seins, etc.

Propriétés et Avantages. — Donne des résultats encore jamais atteints jusqu'ici par aucun autre topique (Cf. Thèse Delahaye, Tourneux, Juster, etc.).

Aucune toxicité. — Antiseptique, Epidermisant, Antiprurigineux à action durable. *Absolument aucun similaire.*

Remarque. — Les sels de titane utilisés ne se trouvent pas dans le commerce. D'ailleurs, ils sont obtenus rigoureusement purs par un procédé tout particulier.

Présentation : Grand tube. — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER
TOURS. (Tél. : 35-35, 2 lignes.)

METATONE

Tonique général.

Forme. — Liquide.

Composition. — 100 grammes contiennent :

Extrait d'embryon de froment.	1 gr. 95
Acide nucléinique.....	0 gr. 385
Glycérophosphate de Calcium...	0 gr. 775
Glycérophosphate de Potassium.	0 gr. 775
Glycérophosphate de Sodium...	0 gr. 385
Glycérophosphate de Manganèse	0 gr. 095
Glycérophosphate de Strychnine	0 gr. 0076

Propriétés. — Stimule, reconstitue et renforce le tonus nerveux, excite l'appétit et augmente la résistance aux infections.

Indications. — Débilité générale, Convalescence des maladies graves, Neurasthénie, Anémie, pendant la grossesse et la lactation, etc.

Posologie. — Une ou deux cuillerées à café trois fois par jour, après les repas.

Comme tonique stomachique, administrer avant les repas.

Prix : 25 francs.

Produit enregistré au Laboratoire
de Contrôle des Médicaments.

Parke, Davis et Co, Londres.

Concessionnaires pour la France
A. W. B. SCOTT, Pharmacien,
348, rue Saint-Honoré — PARIS.

MÉTAVACCIN

Vaccin-pommade aux antivirus. Rigoureusement stérile.

Indications. — Toutes les suppurations : Plaies, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Abscesses, Panaris, Pyodermes, Sycosis, Ulcères, Ecorchures, Brûlures, Orgelets, Blépharites. Tous pansements après accouchement.

Avantages. — 1° Activité due à l'origine des souches, directement extraites de malades et jamais repiquées ; 2° Polyvalence extrême ; 3° Essai avant mise en vente, d'où garantie d'activité ; 4° Absorption parfaite ; 5° Commodité ; 6° Aucune réaction ; 7° Innocuité absolue.

Emploi :

1. *Immunisation locale* : Bien faire pénétrer par un léger massage, si possible ; sinon, mettre sur gaze et faire pansement habituel. Renouveler deux ou trois par jour.
2. *Immunisation générale* : Dans les cas de furonculose générale ou de phlegmons avec lymphangite, il est recommandé de faire faire des frictions aux plis des aines et aux aisselles.

Présentation : Grand tube — Petit tube.

Laboratoires PAUL MÉTADIER

TOURS. (Tél. : 35-35, 2 lignes.)

MÉTREX

Extrait total d'utérus.

Actif par voie buccale.

Composition. — Extrait total d'utérus frais (procédé Biosymplex). 1 cc. de solution hydro-alcoolique (45 gouttes) correspond à 2 gr. d'organe frais.

Mode d'action. — L'importance du rôle endocrinien de l'utérus est aujourd'hui démontrée. La sécrétion interne de l'utérus est indispensable au fonctionnement normal de l'ovaire (formation des corps jaunes normaux), de la thyroïde et de l'hypophyse.

L'opothérapie utérine stimule le développement et améliore le trophisme de l'utérus hypoplasique. Chez les hystérectomisées, elle évite la sclérose de l'ovaire ou du greffon ; chez les femmes ménopausées ou castrées, elle renforce les effets de l'opothérapie ovarienne ou ambohormonale.

Indications. — Dysménorrhées essentielles, Dysménorrhées, Oligoménorrhées, Aménorrhées, Stérilité par infantilisme utérin, Hypoplasie utérine, Troubles subjectifs de la Ménopause et de la Castration.

Posologie. — Prescrire pendant la deuxième moitié du cycle menstruel : le premier mois, 10 à 25 gouttes par jour, en 2 prises. Suivant les résultats obtenus après le 1^{er} mois, maintenir la dose initiale ou la porter à 30-45 gouttes par jour. *Absorber les gouttes une demi-heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre que les malades laisseront fondre lentement dans la bouche.*

a. Dans les *dysménorrhées*, continuer le traitement le 1^{er} jour des règles.

b. En cas d'aménorrhée primaire, administrer *Métrex* pendant la 2^e et la 4^e semaine du mois, en alternant avec *Crinex* et *Flavex*, qui seront donnés respectivement la 1^{re} et la 3^e semaine.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-14.

Prix : Le flacon : 21 fr. 20.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

I, av. du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e)
(Tél. : Alésia 28-51.)

MÉTRITOLS

Thérapeutique gynécologique

COMPRIMÉS GYNÉCOLOGIQUES EFFERVESCENTS « MÉTRITOLS »

Composition. — Acide picrique, oxyquinoléine, thymol, bicarbonate, amidon, formaldéhyde. Parfum agréable des essences de labiées alpestres associées à l'essence de cèdre.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, alcalins, astringents, les MÉTRITOLS donnent des résultats certains dans les leucorrhées de toute nature et les vaginites.

Mode d'emploi. — Injections vaginales : Un comprimé dans 1 litre d'eau bouillie chaude 40 à 45°. Position couchée, bock très bas. Hygiène journalière : un comprimé dans 2 litres d'eau à la température du corps. On utilisera de préférence la canule « Métritols » à double courant, prix : 21 francs.

La boîte de 40 comprimés, prix : 18 fr. 35.

CRAYONS INTRA-UTÉRINS « MÉTRITOLS »

Composition. — Oxyquinoléine, Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine, Argent colloïdal, Chlorothymol. Parachlorométacrésol, Chloroxylénol.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Polyvalents, Cicatrisants, Décongestionnants.

Métrites chroniques endocervicales de toute origine.

Mode d'emploi. — Placer un crayon intra-utérin tous les 2 ou 3 jours. Dans l'intervalle, prescrire les ovules.

Prix : 20 fr. 40.

OVULES « MÉTRITOLS »

Composition. — Hydrargyri-hydroxi-dibromofluorescéine — Parachlorométacrésol — Chloroxylénol — Sous-gallate de Bismuth, Oxyde de titane, Essences de cèdre et de Labiées.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptiques, Calmants, Cicatrisants, Désodorisants.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les 2 ou 3 jours.

La boîte, prix : 18 fr. 35

Laboratoires LEES

Docteur Pierre ROLLAND, Directeur.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 22-01.)

MEXYL

Pâte dentifrice antispirillaire à l'arsénobenzol.

Propriétés. — Le Phénylaminarsan, arsénobenzol pentavalent, est un agent antispirillaire puissant; il présente l'avantage d'une grande stabilité et d'une très forte diffusibilité, propriétés qui en font l'agent thérapeutique de choix des spirochètoses buccales.

Indications. — Pyorrhée alvéolaire, gingivites, stomatites, noma, gangrène buccale, hygiène buccale préventive.

Mode d'emploi. — Brosser gencives et dents, faces externe et interne. Si les gencives ne supportent pas la brosse, masser avec doigt enduit de pâte.

Prix : le tube, 8 francs.

L. N. C. M. n° 574-1.

Laboratoires MEXYL

12, rue Henri-Rivière — LE PERREUX (Seine);

(Tél. : Tremblay 01-97.)

MICELLIODE

Iode colloïdal micellaire électro-positif.

Préparé à partir de foies frais.

Composition :

Iode métalloïdique libre 0 gr. 15

Glycogène extrait du foie frais .. 2 gr. 50

Pour 100 gr. de pseudo-solution aqueuse.

Soit 0 gr. 0015 (1 mgr. 1/2) d'iode libre par gr. ou cc.

Avantages. — Résultats cliniques surprenants à doses infinitésimales d'iode libre grâce à la forme colloïdale.

Jamais d'iodisme

Indications thérapeutiques. — Toutes les indications de l'Iode. Préparation de choix pour l'administration de l'iode aux Basedowiens.

Présentation :

1° *Gouttes* pour la voie buccale (flacon avec compte-gouttes).

2° *Ampoules* injectables (boîte de 10 ampoules de 2 cc.).

Posologie :

Gouttes : Doses par 24 heures à fractionner en 2 fois dans la journée.

Adultes : LX à C gouttes.

Adolescents : L à LXXX gouttes.

Enfants : XXX à L gouttes.

Nourrissons : XV à XX gouttes.

Ampoules :

Adultes : une ampoule de 2 cc.

Adolescents : 1 cc. 1/2.

Enfants : 1 cc.

Nourrissons : 1/2 cc.

Tous les 2 jours jusqu'à concurrence de 10 injections consécutives représentant une série à renouveler selon besoin.

Prix :

Gouttes : Le flacon 19 fr. 20

Ampoules de 2 cc. : La boîte de 10 19 fr. 20

Échantillons sur demande :

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

MICRANYL GRÉMY

Formule:

Peptones spéciales.....	0,15
Extrait de corps thyroïde	0,005
Extrait hépatique.....	0,15

Pour 1 comprimé.

Indications. — Migraines : arthritique, thyroïdienne, menstruelle, de la ménopause, hépatique, de la constipation.

Contre-indications. — Céphalées : des méningites, des tumeurs cérébrales, des syphilitiques.

Mode d'emploi. — Une demi-heure ou une heure avant les repas, trois comprimés de **Micranyl Grémy**.

Surveiller la constipation ; faire prendre une alimentation légère, finement coupée : purées, légumes verts. Éviter tabac, alcool et tous excitants. Les sources thermales, agissant sur le foie, l'estomac ou l'intestin, sont indiquées, ainsi que l'exercice au grand air.

Prix : 20 fr. 40.

Enregistré L. N. C., n° 608-48.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 48-43.)

MICRODERME-CRÈME

CRÈME D'ALIBOUR CICATRISANTE

Non irritant. Microbicide par le Zn et Cu ionisés. Isotonique par le $MgCl^2$. *Cicatrisant par les vitamines A et D du Flétan.*

Formule. — SO^4Cu , 0,20 ; SO^4Zn , 0, 20 ; Sérum magnésien, 40 ; ZnO , 8g ; Huile de Flétan, 2 ; Excipient enlevable à l'eau, Q. S. p. 100.

Indications. — Toutes *Pyococcies cutanées* et plaies atones. *Impétigo* (après lavage avec le *Microderme- Solution* dilué au 1/20), Orgelets, Anthrax, Dartres volantes, Eczéma et Dysidrose infectés, Ulcère de la jambe, Brûlures, *Dermite fessière des nourrissons*, Prurit, etc.

Aucune contre-indication, peut être associé à une médication iodée. Est supporté par tous épidermes et muqueuses même irrités par une médication préalable.

Le tube de 60 gr..... 14 fr. 30

MICRODERME-SOLUTION

Le flacon de 200 cc. à diluer au 1/20... 14 fr. 30.

LABORATOIRES BOUTROUX

25, rue du Général-Foy — PARIS (8°). (Laborde 08-51.)

MICROGEL

Composition. — Gelée translucide, soluble dans l'eau, de Séro-Vaccin de Leclainche et Vallée dans du sérum normal de cheval.

Propriétés — Vaccinothérapie antipyogène des infections cutanées.

Indications. — Plaies infectées, Pyodermites, Brûlures, Furoncles, Impétigo, Acné, Intertrigo.

Forme. — Tube de 30 gr. environ.

Mode d'emploi. — Après avoir lavé la plaie à l'eau bouillie, appliquer une couche de Microgel qui, en séchant, forme un vernis souple protecteur.

Prix : 19 fr. 10.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

MICROLYSE

Thérapeutique de l'Infection par Imprégnation.

**Traitement de toutes les affections à
Staphylocoques, Streptocoques et surtout action
élective sur le Colibacille et le Gonocoque.**

Travaux du professeur Louis GAUCHER.

Communication à l'Académie de médecine
du 24 janvier 1933.

Action et Composition :

Combat l'infection généralisée et les phénomènes consécutifs sur l'arbre urinaire par la coordination de deux éléments bactéricides.

SEL A. Chlorhydrate de méthyl-oxyquinoléine.
Imprègne l'organisme et lui rend ses moyens de défense.

SEL B. Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine. Se porte sur l'arbre urinaire qu'il calme et assainit.

Indications.

La plupart des états infectieux. Septicémies, Furunculose (action rapide).

Colibacilloses : Infections des voies intestinales et biliaires, Entérocrites, Cholécystites, Lithiases.

Infections urinaires. En général : Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites.

Parasites intestinaux : Vers, Amibes et autres protozoaires, souvent générateurs de colibacillose.

Gonococcies : Urétrites, Métrites, Salpingites.

Quatre formes :

Comprimés : 3 par jour, un pendant ou après chaque repas. Avaler sans croquer. Prix : 21 fr. 30.

Suppositoires pour enfants et adultes. Prix : 20 fr. 50.

Tablettes pour lavages vésicaux et vaginaux. Prix : 22 francs.

Ovules pour gynécologie. Prix : 20 francs.

Laboratoires de Physiologie et de Thérapeutique.

10, rue de Strasbourg — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 46-14.)

MICTASOL**Décongestif pelvien.****Composition.**

Comprimés. — *Malva purpurea* 0,25, Bromure de Camphre 0,02, Hexaméthylène tétramine 0,05.

Suppositoires : *Malva purpurea* 0,50, Stovaïne 0,01, Ext. de Jusquiame 0,05, Ichtyol 0,25.

Ovules : *Malva purpurea* 1,50, Ichtyol 0,50, Ext. de Jusquiame 0,05, Glycérine solidifiée Q. S.

Propriétés thérapeutiques.

Décongestif pelvien, antiseptique urinaire, sédatif génital. Tolérance parfaite. Innocuité absolue. Sans contre-indication.

Indications thérapeutiques.

Prostatisme. Rétention. Incontinence. Cystites. Séquelles de blennorragie. Néphrites. Pyélonéphrites. Métrites. Salpingites. Vaginites. Hémorroïdes.

Mode d'emploi.

Comprimés : 6 à 9 comprimés par jour, à prendre aux repas, avec un peu d'eau.

Suppositoires : 1 ou 2 par jour.

Ovules : 1 le soir au coucher.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 71-33.)

MICTASOL BLEU

Décongestif pelvien.

Composition :

<i>Malva purpurea</i>	0 gr. 25
Bleu de Méthylène....	0 gr. 02
Bromure de Camphre..	0 gr. 02
(Pour 1 comprimé.)	

Indications. — Toutes les indications du *Mictasol*, et en particulier les infections, congestions et inflammations du petit bassin s'accompagnant de douleurs.

Forme. — Comprimés.

Posologie. — Même posologie que le *Mictasol*, soit 6 à 9 comprimés par jour.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Kléber 71-33.)

MICTASOVULES

Décongestif pelvien.

Composition :

<i>Malva purpurea</i>	1 gr. 50
Ichtyol	0 gr. 50
Extrait de Jusquiame..	0 gr. 05
(Pour 1 ovule.)	

Indications. — Les *Mictasovules* complètent très utilement la cure buccale par le *Mictasol* ou le *Mictasol Bleu* dans les Métrites, Salpingites, Vaginites, Congestions utéro-ovariennes, etc.

Posologie. — 1 ovule le soir au coucher.

Laboratoires du MICTASOL

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Kléber 71-33.)

MICTAZINE

Anti-infectieux et décongestif pelvien.

Composition par comprimé :

Para-amino-phényl-sulfamide	0 gr. 30
Malva purpurea	0 gr. 15
Bromure de camphre	0 gr. 025

Propriétés thérapeutiques. — *Anti-infectieux* par la para-amino-phényl-sulfamide, spécifique contre le streptocoque, le gonocoque, le colibacille, le staphylocoque souvent associés dans les affections génito-urinaires.

Décongestif pelvien par la Malva purpurea.

Anti-spasmodique et sédatif génital par le bromure de camphre.

Action rapide, durable, sans toxicité.

Indications thérapeutiques. — Infections urinaires aiguës, Urétrites, Cystites, Prostatites, Pyélites, Pyélonéphrites, Métrites, Salpingites, Prophylaxie du post-partum et du post-abortum, Fièvre puerpérale, Prophylaxie des accidents infectieux post-opératoires en chirurgie abdominale et urinaire, Infections gonococciques, streptococciques, colibacillaires, etc.

Posologie. — *Infections urinaires à gonocoques :* Commencer le traitement par 12 comprimés par 24 heures pendant la première semaine (doses fractionnées de 1 ou 2 comprimés d'heure en heure), puis dégressivement 10 et 8 comprimés jusqu'à guérison intégrale. *Sous surveillance médicale.*

Infections urinaires à streptocoques, colibacilles, staphylocoques :

Traitement curatif des infections déclarées : Pyélonéphrites, Cystites, Infections du petit bassin, Salpingites, Métrites, Prostatites, Infections puerpérales : 12 comprimés par 24 heures (par 2 comprimés d'heure en heure). *Sous surveillance médicale.* Diminuer progressivement avec la chute de la température, l'éclaircissement des urines, la sédation des phénomènes douloureux.

Laboratoire du MICTASOL

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 71-33.)

MICTOPHILE RICHER

Antiseptique. — Diurétique. — Analgésique.
Comprimés glutinisés au bleu de Méthylène.

Composition :

Bleu de méthylène	0,02
Lactose	0,29
Extrait de belladone	0,003
— de mauve	0,05

Pour 1 comprimé glutinisé.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Cystites aiguës ou chroniques, Pyélites, Pyélonéphrites, Blenorrhagies, Prostatites, Colibacillurie.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour (de préférence avant les repas). Avaler sans croquer avec un peu d'eau.

Le flacon de 40 comprimés. Prix : 16 francs.

Laboratoire RICHER

Docteur en Pharmacie,

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien,
PARIS. (Tél. : Provence 34-87.)

MICTOSEDÀ

Comprimés.

Sédatif-décongestif génito-urinaire.

Deux formes : Bleu et Simple.

Petits comprimés lenticulaires.

Composition. — *Mictoséda bleu* : Bromure de Camphre 0,02, Benzoate de Lithine 0,10, Hexaméthylène Trétramine 0,05, Bleu de Méthylène, 0,02, Extrait de Buchu 0,01, Extrait de Jusquiame 0,01, Bimalva qualité supérieure 0,30. *Mictoséda simple* : même formule, sauf remplacement du Bleu de Méthylène par extrait d'Hamamélis 0,05.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et vésical. Prostatisme, Urétrites, Cystites, Néphrites, Bactériures, Dysménorrhées, Métrites, Vaginites, Salpingites. Rétention, Troubles nerveux urinaires, Congestion du petit bassin chez l'homme et la femme.

Mode d'emploi. — 6 à 8 comprimés par 24 heures, aux repas, avec une gorgée d'eau.

Prix : 17 fr. 20 l'étui de 50 comprimés.

(6 à 9 jours.)

Laboratoires FAURE et LAGENTE

MONTARGIS (Loiret).

(Tél. : 59.)

MICTOSEPTOL

(Antiseptique urinaire liquide.)

Composition. — Synthèse nouvelle diurétique, antiseptique et balsamique de benzoate d'Hexaméthylène-tétramine et d'*Arbutine* dans un excipient légèrement stomachique.

Indications. — Toutes les affections et infections urinaires : Lithiases, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Urétrites, Blennorrhagie à toutes ses périodes ; maladies infectieuses : Grippe, Rougeole, Scarlatine.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau ou de tisane avant ou entre les repas.

Doses. — *Adultes* : 3 à 5 cuillerées à café par jour ;
Enfants : par demi-cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 20.

Laboratoires B. O. L.

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique
71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

MICTUALINE

Antiseptique, Sédatif, Décongestif.

1^o PILULES

Collargol à 80 p. 100 argent pur	0,02
Urotropine recristallisée	0,10
Bleu de méthylène pur	0,01
Bromure de camphre.....	0,02
Extraits d'Uva ursi et seneçon.....	Q. S. p. 1 pilule

Indications :

1^o *Maladies des voies urinaires* (métrites, cystites, pyélonéphrites, prostatites, hypertrophie de la prostate, etc.).

2^o *Maladies des voies génitales* des deux sexes.

3^o *Maladies intestinales* dans leurs rapports avec le tractus génito-urinaire (syndrome entéro-rénal, colibacillose, etc.).

Posologie. — 6 à 9 pilules par jour.

Prix : 19 fr. 60

2^o SUPPOSITOIRES

Extrait Belladone	0,01
— Jusquiame	0,05
— Hamamélis	0,10
Bromure de camphre.....	0,10
Analgésine	0,40
Toutes algies : 1 à 2 par jour. —	Prix : 16 fr. 30.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Émile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

MINEPLASTINE

Pâte stabilisée à l'eau, *exempte de corps gras.*

Tous les constituants de cette pâte y compris l'excipient sont de nature minérale.

Formule :

Oxyde de zinc.....	25 gr.
Silicate de Magnésie.....	25 gr.
Silicate d'Alumine Colloïdal.....	50 gr.

Propriétés. — Le gel argile base de la *Mineplastine* possédant une tension de vapeur égale à celle de l'eau pure, la *Mineplastine* laisse sur la peau un enduit homogène, poreux, antiseptique, doué d'un pouvoir absorbant considérable et parfaitement perméable à l'air.

Indications. — Toutes dermatoses aiguës et suintantes quelle qu'en soit l'origine : Dermites aiguës ou médicamenteuses.

La *Mineplastine* réussit particulièrement bien dans le traitement des eczémas humides et de l'intertrigo. Son action contre les escarres des malades alités est remarquable.

En thérapeutique infantile. — La *Mineplastine* a de nombreuses indications, dont la plus importante est l'érythème fessier. Les eczémas et l'impétigo du nourrisson sont également justiciables de la *Mineplastine*.

Mode d'emploi. — Appliquer une couche épaisse recouverte ou non de gaze.

Enlever quotidiennement l'enduit de *Mineplastine* par simple lavage à l'eau.

La *Mineplastine* ne tache pas le linge.

Prix : le tube : 12 fr. 75.

Laboratoire MAUCHANT

GENNEVILLIERS (Seine). — (Tél : Grés. 05-21.)

MINÉRALINE

DU DOCTEUR BAUD

(Poudre antiseptique, infermentescible, strictement minérale).

Composition. — Fruit d'une longue expérience, la MINÉRALINE du Docteur BAUD réunit en proportions bien définies 7 constituants différents.

La fabrication à l'échelle industrielle de cette poudre permet seule la longue série de manipulations qui confèrent à la MINÉRALINE un degré de finesse inégalé, finesse qui lui permet de pénétrer dans les replis cutanés les plus profonds.

Indications. — Traitement externe des diverses affections cutanées : urticaire, intertrigo, eczéma, impétigo, psoriasis, prurit anal et vulvaire.

Pays chauds. — Outre son intérêt contre les coupures causées par la transpiration, la MINÉRALINE est utilement employée pour le traitement des éruptions connues sous le nom de « Hamonil » et « Bouton du Nil ».

Thérapeutique infantile. — La MINÉRALINE est la poudre à poudrer par excellence des bébés après le bain, bien supérieure au talc qui ne possède ni sa finesse, ni son adhésivité, ni ses qualités antiseptiques.

Remarque. — Pour le traitement des dermatoses infectées ou suintantes, il est préférable de faire précéder le poudrage à la MINÉRALINE d'une application de *Mineplastine* (voir ce mot).

Prix :

Boîte poudreuse : 7 fr. 65.

Boîte de réserve quintuple : 25 fr. 50.

Laboratoires MAUCHANT

GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél : Grés. 05-21.)

MINERVOL

Pommade en tube. Poudre.

Pommade. Formule : Acide benzoïque du toluol, 0 gr. 20 ; acide borique, 3 gr. ; Silicate de magnésie, 10 gr. ; Baume du Pérou, 1 gr. 50 ; Stéarate de zinc, 10 gr. ; Acide orthoxybenzoïque, 0 gr. 30 ; Méta-dioxyphénol, 0 gr. 70 ; Lanoline et essence de verveine Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Erythème fessier, rougeurs, démangeaisons, crevasses du sein et des mains, engelures, gercures, brûlures, coups de soleil, prurits, impétigo, intertrigo, et toutes dermatoses.

Poudre. Formule : Sous-gallate de Bismuth, 0 gr. 20 ; Oxyde de Titane, 2 gr. 50 ; Peroxyde de zinc, 0 gr. 50 ; Stéarate de zinc, 37 gr. 50 ; Carbonate de magnésie, 2 gr. 50 ; acide borique 2 gr. ; Silicate de magnésie spécial hydraté, Q. S. pour 100 grammes.

Indications. — Complète l'action de la pommade. Démangeaisons, transpiration, toilette intime, échauffements de la peau, érythème fessier et rougeurs des nouveau-nés et des adultes.

Poudre siccatrice, hydrofuge, à pouvoir couvrant considérable et atomisée.

(Publicité exclusivement médicale.)

Présentation :

Tube moyen : 7 fr. 20, Grand tube : 11 fr. 25 Poudre : 7 fr. 20.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 598-15 et 598/23

Laboratoires M. DE RIVE.

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert. — PARIS (XX^e).

MINUREX

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Pour 1 comprimé :

Extrait de Cécropia	} aa	0,015
Extrait de Cynara feuilles fraîches		
Extrait de Teskra		
Diméthylxanthine		0,125
Phosphate de Soude Anhydre		0,10

Propriétés. — Diurétique direct, il diminue l'azotémie, régularise et stimule la systole ventriculaire.

Indications. — Syndrome cardio-rénal, azotémie légère chez certains porteurs d'ulcères jambiers, déficiences à surveiller chez tous les ulcéreux, Dyspnée d'effort.

Mode d'emploi. — Prendre 3 fois 2 comprimés par jour. Demander les brochures des Docteurs P. et R. Bourggraft : *Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.*

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du PRATICIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle).

MIROXYL LAHAYE

Sirop.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la Toux, Expectorant d'action antiphlogistique certaine. Puissant modificateur de toutes les pneumopathies.

Propriétés actives. — A base de Cinnaméine du Baume du Pérou (*Miroxylon Peréiræ*) associée au Sulfogaiacolate de potasse et au Camphosulfonate de Soude.

Une cuillerée à bouche contient :

Extrait hydroalcoolique spécial de Baume du Pérou.	0,075
Sulfogaiacolate de potasse	0,45
Camphosulfonate de soude	0,023
Iodhydrate de codéine	0,015
Sirop de Thym	3 gr. 65

Préparation agréable au goût. Pas de constipation grâce à l'adjonction d'un extrait de *Rhamnus* sans amertume.

Posologie. — *Affections aiguës* : 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, éloignées des repas.

Affections chroniques : 1 cuillerée à soupe matin et soir.

Indications thérapeutiques. — Toutes les affections des voies respiratoires et en particulier la grippe, pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite fétide, toux des tuberculeux.

Prix : 17 fr. 65 (taxe comprise).

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine). (Tél. : Alésia 12-55.)

MISTOL

MISTOL avec Éphédrine

Composition. — Solution huileuse d'essences aromatiques, Camphre, Eucalyptol, Menthol, Chlorobutanol (ou Éphédrine.)

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, et, en général, tous états inflammatoires des voies respiratoires supérieures.

Présentation. — En flacons compte-gouttes, pour instillations nasales.

Dépôt général :

Laboratoires NOVA

61, avenue de Saxe — PARIS (VII^e).

MITOSYL

PANSEMENT BIOLOGIQUE

Pâte et tulle aux vitamines A et D,
Huile de foie de morue et de flétan.

Le premier pansement français aux vitamines.

Propriétés :

Mitosyl active les mitoses cellulaires.

Mitosyl constitue le pansement biologique idéal, antalgique, cytophyllactique, anti-infectieux.

Grâce à la vitamine A, il est un régénérateur des tissus cutané-muqueux et osseux.

Grâce à la vitamine D, il réduit l'inflammation, diminue la douleur et permet la suppression des drains.

Grâce à l'huile de foie de morue, Mitosyl possède un pouvoir de pénétration très grand et rend indolore le changement des pansements.

Indications :

En chirurgie : plaies avec ou sans délabrement tissulaire, abcès incisés, anthrax, panaris, brûlures du premier au troisième degré, ulcérations des moignons, cavités osseuses d'ostéomyélites.

En médecine : ulcérations cutanées atones, engelures, ulcères variqueux, suppurations cutanées, staphylococcies épidermiques, escarres de décubitus.

En pédiatrie : eczéma du nourrisson, érythème fessier.

En dermatologie : eczémas aigus, dermatoses prurigineuses et croûteuses.

En gynécologie : métrites, ulcérations du col, vaginites.

En proctologie : fissures et ulcérations anales et péri-anales.

En oto-rhino-laryngologie : cavités de mastoïdectomie, rhinites atrophiques, ozène.

En stomatologie : stomatites, pyorrhées alvéolaires.

Mode d'emploi de la pâte Mitosyl :

Désinfecter, réséquer, traumatiser le moins possible.

Appliquer *larga manu* le Mitosyl — faire pénétrer dans les anfractuosités et les fistules — couvrir de compresses stériles simples.

Mode d'emploi du tulle Mitosyl :

S'emploie comme les gazes et les tu'les gras et semi-gras.

Ne jamais associer d'antiseptiques chimiques aux pansements faits avec Mitosyl.

UNION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

5 et 7, rue Claude-Decaen, PARIS (XII^e). (Did. 37-93.)

MIXIOD

Médication spécifique de l'Amibiase.

Acide 7 iodo-8 oxyquinoléine-5 sulfonique additionné de bicarbonate de Sodium qui facilite la dissolution de cet acide dans l'eau.

Présentations :

Mixiod poudre pour préparations extemporanées (Cachets-Solutions pour lavements).

Flacons de 15 g. Prix : 35 fr. ; de 30 g. Prix : 64 fr.

Mixiod pilules, dosées à 0 g. 25.

Flacons de 20 pilules. Prix : 17 fr. 50.

Indications. — Amibiase aiguë et amibiase subaiguë.

— Destruction des Amibes et des kystes amibiens.

Mode d'emploi et posologie. — Traitements par voie buccale, par voie rectale (en lavements) et traitements mixtes.

Voie buccale : 1 g. 50 à 3 g. *pro die* pendant une semaine.

Voie rectale : Lavements à doses croissantes de 0 g. 25 à 1 g.

Société parisienne d'Expansion chimique

SPECIA

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

MOLAGAR

Émulsion parfaitement stable d'huile de paraffine et d'agar-agar (sans aucun médicament laxatif).

Le Molagar est une émulsion homogène, très fluide et très agréable au goût, contenant 50 p. 100 d'huile de paraffine *spécialement traitée* et de haute viscosité.

Propriétés : Le Molagar stimule doucement le fonctionnement de l'intestin en lubrifiant les parois et en humidifiant le contenu. Ne contient aucune substance aromatique ou laxative surajoutée. Ne provoque jamais ni nausées ni coliques ; n'occasionne pas de suintement huileux par l'anus, comme c'est le cas pour l'huile de paraffine ordinaire ; aucune accoutumance.

Indications. — Convient surtout aux constipés dont l'intestin est délicat. Recommandé en cas de constipation spasmodique, en cas de colites, surtout chez les coloniaux à foie déficient. Le Molagar est particulièrement utile chez les femmes enceintes, les opérés, les hémorroïdaires, les diabétiques et les enfants, car il agit doucement.

Mode d'emploi. — *Doses pour adultes :* une à deux cuillerées à soupe de Molagar le soir en se couchant ; à répéter dans la matinée si nécessaire, une ou deux heures après le repas. *Doses pour enfants :* de 2 à 4 cuillerées à café prises telles quelles ou mélangées avec du lait, de l'eau ou des aliments.

Prix : 21 fr. 20 le flacon.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 150-7.

Littérature et Échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès. — SURESNES

(Tél. Longchamp 16-85-16-86.)

MOLÈNE

Indications. — Tuberculose pulmonaire à toutes périodes (action d'autant plus rapide que le traitement est appliqué à une période plus précoce de l'infection tuberculeuse) ; adénites tuberculeuses évolutives, à tendance suppurative : tuberculose pleurale ; tuberculoses cutanées diverses.

Contre-indication : Néphrite avec albuminurie abondante.

Mode d'emploi. — Voie intraveineuse ou voie intramusculaire. La dose moyenne est d'une injection d'une ampoule de 1 cc. tous les 2 ou 3 jours ; chez les grands fébricitants, espacer les injections de 4 ou même 5 jours ; dans les lésions torpides, injecter de 1 à 5 cc. tous les 3 jours.

Présentation. — En boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (1 centimètre cube correspond à 0,05 centigrammes d'anhidride Molybdique pur).

Prix de vente au public : 30 fr. la boîte de 12 ampoules.
L. N. C. 463-10.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand — LEVALLOIS-PERRET (Seine).

Dépôt : Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin. — PARIS.

MORÉTHYL DAUSSE

Morrhuate d'Éthyle : solution huileuse à 25 p. 100
(Ampoules de 2 cc.)

Traitement de la tuberculose pulmonaire.

Indications. — Le Moréthyl est actif contre toutes les formes de la tuberculose pulmonaire, où il relève l'état général, fait baisser la courbe thermique, en même temps qu'il diminue l'expectoration bacillaire et produit, dans certains cas, la rétrocession des lésions. Les formes rapides de la maladie et la granulie ne semblent, par contre, nullement influencées. — Le Moréthyl ne comporte aucune contre-indication et ne provoque dans aucun cas de réaction locale ou générale.

Posologie. — Une injection chaque jour, pendant 20 jours consécutifs, par voie sous-cutanée ou intramusculaire. Laisser un repos intercalaire de 10 jours et pratiquer de la sorte plusieurs séries d'injections. Durée du traitement : 3 mois au minimum.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél.: Turbigo 63-40.)

MORRHUALÈNE GAUTIER

Médication leucogène organique phospho-ferro-iodo-arséniée (entièrement assimilable).

Forme. — Sirop (saveur agréable sans action nocive ni irritante pour les muqueuses gastro-intestinales).

Compos. — Iode physiologique stable et inaltérable ; fer organique, d'origine protéique, entièrement assimilable ; sel sodique de l'acide phospho-glycérique ; méthylarsinate disodique, rhamnus frangula.

Action physiol. — Stimulant des organes lymphoïdes et des séreuses ; modificateur vaso-moteur ; excitant des organes hématopoïétiques ; reminéralisateur puissant ; tonique général ; excitant de la nutrition.

Indicat. — Lymphatisme (adénopathies de la scrofule et de la tuberculose, végétations adénoïdes, impétigo), Hypoglobulie (anémie vraie, chlorose, diminution de la proportion d'hémoglobine, débilité générale). Maladies de la nutrition (rhumatisme chronique, artériosclérose, rachitisme, infantilisme). Convalescence de toutes les maladies.

Posologie. — De 2 à 5 ans, 3 cuillerées à café par jour de 5 à 10 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert par jour ; adultes, 2 à 3 cuillerées à potage par jour. (Avant les repas dans un peu d'eau.)

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous le n° 586-10.

Prix : 21 fr. 35.

Echantillons et Littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI^e). (Tél. : Roquette 14-12.)

MORRHUÉTINE JUNGKEN

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et Composition. — Liqueur à base de glycérine pure contenant : Iode métallique, 15 mgr. Hypophosphites composés (NaO, CaO, Manganèse), en tout 15 cgr. par cuillerée à soupe. Phosphate de soude : 15 cgr.

Produit de composition fixe et stable, de goût très agréable ; pas d'irritation des muqueuses ; pas de troubles des fonctions gastriques. Très bien toléré en toutes saisons.

Propriétés. — Dépurateur, Tonique, Reconstituant.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Tuberculose, Convalescences des maladies infectieuses, d'opérations et blessures.

Doses et Mode d'emploi. — *Enfant* : 1/2 ou 1/3 de verre à liqueur. — *Adultes* : 1 ou 2 verres à liqueur, après les repas, pure ou étendue d'eau ou au début des principaux repas.

BRACQUEMOND et Cie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 05-54.)

MORRHUÉTINE VITAMINÉE « JUNGKEN »

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Forme et composition. — La Morrhuéline Vitaminée « Jungken » est un succédané de l'huile de foie de morue renfermant, sous une forme très agréable, les principes actifs de ce produit.

Elle se présente sous la forme d'un granulé que les enfants absorbent avec plaisir et contient, en plus des principes actifs de la Morrhuéline (voir ci-dessus), 24.000 unités internationales de *Vitamines A* et 5.400 unités internationales de *Vitamines D*, par 100 grammes de granulé.

Propriétés. — Dépuratif, reconstituant, reminéralisateur, stimulant de l'appétit et des forces.

Indications. — Anémie, Lymphatisme, Prétuberculose, Asthénie, Convalescences de maladies infectieuses, Rachitisme, Dépressions physiques et nerveuses.

Dose et mode d'emploi. — 1 cuillerée à café deux fois par jour pour les enfants de 6 à 12 ans. 1 cuillerée à entremets deux fois par jour pour les adultes, prises au début ou à la fin des repas.

Laboratoires BRACQUEMOND et Cie

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 05-54.)

MORRHUOL CHAPOTEAUT

Composition. — Extrait concentré d'Huile de Foie de Morue, enrichi en Vitamines A de croissance (11 000 U. I. par gr.) et en Vitamines D antirachitiques (1 500 U. I. par gr.) par de l'huile de Flétan sélectionnée.

Pour compléter l'action propre du Morrhuol, 1 centigr. d'Hypophosphite de Chaux est incorporé à l'enveloppe gélatineuse de chaque capsule.

Indications. — Avitaminose, rachitisme, lymphatisme, athrepsie, troubles de croissance, rhumes, bronchites chroniques, pré tuberculose.

Présentation. — Capsules minces de gélatine très pure, dosées à 0 gr. 10, se dissociant dans l'estomac.

Posologie :

Adultes : 4 à 8 capsules par jour au début des repas.

Enfants : 2 à 4 capsules par jour au début des repas.

Prix : 17 fr. 40 le tube de 80 capsules.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, successeurs

8, rue Vivienne — PARIS (II^e).

(Tél. : Gutenberg 27-03.)

MORUCALCOSE

(Granulé)

Forme. — Granulé reconstituant, de goût très agréable (Huile de foie de morue d'hiver et d'été sans odeur.)

Composition. — Extraits lipoidiques de foie de veau et de foie de morue, thyrotoxine, surrénine, phosphate tricalcique et combinaison iodotannique.

Indications. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue dans toutes ses indications : Anémie, Croissance, Scrofule, Lymphatisme, Rachitisme, Bacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

MORUFINE

Médicament de choix.

Pour les croissances difficiles. Facteur puissant du développement de l'organisme carencé.

Composition. — Extrait de Foie de Morue obtenu par procédé spécial, très riche en vitamines, chaux, iode en combinaison tannique et antiscorbutique.

Pas de colorant artificiel, Jus de Cassis, Jus de Framboises (Fruits sélectionnés, Acide ascorbique).

Indications. — Troubles de la Nutrition, Lymphatisme, Pré-tuberculose, Anémie et Faiblesse générale, Bronchite chronique, Troubles du Métabolisme, Furunculose et éruption cutanée.

Présentation. — Forme sirop, flacon 300 cc.

Prix : 19 francs.

Posologie :

Adultes : 3 cuillerées à soupe avant ou après les repas.

Enfants de 2 à 8 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants au-dessous de 2 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 1111-7.

Laboratoires M. BOURILLOT

6, rue Berbisey — DIJON.

MOTHERSILL'S SEASICK REMEDY

Médication contre le mal de mer, des airs, du chemin de fer et de l'automobile. Préviend et arrête tous les maux de voyages.

Composition	Poudres	Rose	Brune
	Sucre de lait.....	33,0 %	0,0 %
	Cannelle	0,0 —	29,4 —
	Caféine	8,2 —	8,4 —
	Acide stéarique	18,0 —	17,4 —
	Trichlorbutyl-alcool tert	40,1 —	44,5 —

Posologie et mode d'emploi. — a. *Préventif :* prendre une capsule rose et une brune environ une heure avant de prendre le bateau, le train, l'auto ou l'avion. Ces doses doivent être prises 1 heure avant de manger ou 2 heures après. Les doses ultérieures seront prises à intervalles de 6 heures tant que la nausée continue.

Remarque : Pour obtenir les meilleurs résultats, ne jamais prendre ce remède durant l'heure qui précède le repas ou durant les 2 heures qui suivent celui-ci.

b. Pour arrêter les vomissements, répéter la dose dès que le premier vomissement violent est terminé. Au cas où les vomissements sont continus, vider les capsules et en avaler le contenu comme une poudre en prenant quelques gorgées d'eau.

Présentation et prix : Boîte petit modèle, 3 doses : 18 francs.

Boîte grand modèle, 8 doses : 36 francs.

Laboratoire MOTHERSILL REMEDY COMPANY

A GLANDIÈRES, Pharmacien, 5, rue de Provence — PARIS (IX°).
(Tél. Provence 53-67).

MUCICARBOS

Composition. — Charbon animal chimiquement pur activé (Carbos), associé à un mucilage pur pour éviter la constipation.

Forme. — Granulé rond : *Mucicarbos simple* ; *Mucicarbos benzo-naphtolé*.

Indications. — Diarrhées avec hypersécrétion avec lésions ou avec infection de la muqueuse, Entérites, Entérocolites, Diarrhées des tuberculeux, Dyspepsies gastro-intestinales avec constipation et flatulences, Colites avec fermentations, Colites avec putréfactions.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café avant ou après les repas.

Prix : 16 fr. 40.

Durée moyenne ; 8 jours.

Laboratoires E. MILLET
RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).
(Tél. : 30.)

MUCIGRAINS

Grains de Mucilage.

Composition :

Mucilage pur.....	98 %
Extraits de Rhamnus.....	2 %

Action purement mécanique, par gonflement et augmentation du bol alimentaire. Protège et lubrifie la muqueuse intestinale. Action douce et progressive sans accoutumance.

Indications. — *Constipation*, Atonie intestinale.

Posologie et mode d'emploi. — De 1 à 2 cuillerées à café au début ou à la fin des repas. Mettre à sec sur la langue et, sans mâcher, avaler avec un peu de liquide.

Prix : La boîte de 250 gr. : 22 francs.

Laboratoires Henri FRILLEY
94, bd Lefebvre — PARIS (XV^e).

MUCILAXINE

Composition. — Huile de Paraffine de haute viscosité et neutre, associée par procédé spécial à un mucilage pur sans cellulose sans aucune addition d'eau ni de produit laxatif. Action purement mécanique. *Suppression du suintement.*

Forme. — Crème facile et agréable à prendre.

Indications. — Rééducation et pansement de l'Intestin. — Constipation, Colite, Entérocolite muco-membraneuse. Constipation des opérés, des accouchées, des enfants, des nourrissons, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à soupe, à dessert ou à café par jour (suivant l'âge) au début des repas.

Prix : 15 fr. 60.

Le double flacon : 28 fr. 10.

Durée moyenne : 8 jours.

Laboratoires E. MILLET

RAMBOUILLET (Seine-et-Oise).

(Tél. : 30.)

MUCINUM

(Comprimés de)

Composition :

Entérokinase	0 gr. 005
Érepsine.....	0 gr. 005
Pancréase.....	0 gr. 005
Bile	0 gr. 010
Atropa Belladonna	0 gr. 005
Cassia acutifolia	0 gr. 075
Phénolphtaléine.....	0 gr. 075

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif doux, n'irritant jamais l'intestin et ne provoquant pas d'accoutumance. Réussit dans tous les cas de *Constipation* du fait de la pluralité des éléments qui le composent.

Forme. — Petits comprimés, très friables, pouvant être croqués ou avalés.

Posologie. — 1/2 à 2 comprimés par jour selon l'âge et la réaction individuelle (généralement au repas du soir).

Prix : 9 francs la boîte de 36 comprimés.

INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

MUCOBISMUTHINE

Pansement du tube digestif (Carbonate de bismuth pur en suspension dans un mucilage végétal à l'exclusion de tout autre produit de remplacement).

Une cuillerée à soupe contient 2 gr. 50 de carbonate de bismuth.

Indications. — Syndromes douloureux, gastriques et duodénaux. Ulcérations, Colites, Entérites aiguës saisonnières, Fermentations intestinales, Oxyurase.

Doses et modes d'emploi. — Suivant les cas, 2, 3 ou 4 cuillerées à bouche : la présence d'un mucilage permettant de diminuer les doses habituellement données de carbonate de bismuth.

Prix au public : le flacon : 23 fr. 50.

Le 1/2 flacon : 13 fr. 85.

L. N. C. M. n° 515-2.

Docteur J. GALIMARD O. * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES.

MUCOFOIE

Composition. — Complexe d'extrait hépatique et de muqueuse pylorique.

Indications. — Anémies pernicieuses quelle que soit leur origine : anémies Biermeriennes, anémies au cours des leucémies, au cours des ictères hémolytiques, au cours des néphrites.

Forme. — Comprimés renfermant chacun : 0 gr. 140 d'extrait sec de foie, 0 gr. 070 de poudre de muqueuse pylorique.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 8 comprimés par jour. *Enfants* : 4 à 6 comprimés selon l'âge, pendant 15 à 20 jours.

Prix de la boîte : 47 fr. 95.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-33.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS.

(Tél. : Suffren 07-70.)

MUCOSODINE

Antiseptie des muqueuses
Bouche, Nez, Gorge, Oreilles.

Composition. — Bicarbonate de soude, Hyperborate de soude, Chlorure de sodium, Borate de soude.

Propriétés. — Donne un sérum boraté, alcalinisé et oxygéné. Elle déterge la muqueuse pituitaire et la décongestionne. Elle dissout les mucosités et les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, Rhinites, Rhume des foins, Sinusite, Ozène. — Amygdalites, Angines, Laryngites, Otites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café pour un verre d'eau chaude.

Bain nasal, douche nasale, Gargarismes, Bains de bouche, Irrigations.

Prix : 10 fr. 40.

Traitement unité : 10 à 12 jours.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 339-1.

Laboratoires CAILLAUD

37, rue de la Fédération — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 12-63.)

MUCYLLIUM

Traitement rationnel et moderne de la constipation par le plus parfait des Mucilages.

Semences sélectionnées, cultivées spécialement et purifiées scientifiquement de **Psyllium noir**. Désinfectées rationnellement sans détruire ni Vitamines ni Hormones indispensables. Elimination sûre de tous corps étrangers métalliques et organiques.

Innocuité absolue. Pas d'accoutumance. Aucune toxicité. Pas d'action irritante. Aucune contre-indication.

Indications du Mucyllium. — Le Mucyllium doit être employé dans toutes les constipations, qu'elles soient d'origine atonique ou spasmodique, par stase ou par dolichocôlon, et ce aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

On peut le prescrire par conséquent dans tous les états pathologiques où la constipation est en cause, tels que troubles toxiques, état saburral des voies digestives, gastrites, colites segmentaires ou totales, fermentations intestinales, états dysentériques, colites ulcéreuses et hémorragiques, hémorroïdes, fissures anales, appendicite chronique, cholécystites, troubles cutanés, acné, furonculose, manifestations anaphylactiques, eczéma, urticaires, migraine, bouffées de chaleur. Syndrome entéro-rénal, coli-bacillurie.

Doses. — *Enfants* : suivant l'âge, 1 cuillerée à café à 2 cuillerées à soupe.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe ou plus, au moment des repas, dans un peu d'eau, laisser se former le mucilage pendant quelques minutes.

Prix : boîte de 250 grammes : 12 francs.

Prix : boîte de 500 grammes : 23 francs.

Prix : boîte de 1 kilogr..... : 45 francs.

Prix : boîte de 5 kilogr..... : 175 francs.

Prix : boîte de 10 kilos..... : 320 francs.

Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 914-1.

Littérature et Échantillons médicaux sur demande

Laboratoires BERNARD-GARCIN

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON (Vaucluse).

(Tél. : n° 6.)

Eugène GRAS, pharmacien de 1^{re} classe,

Ex-Interne des hôpitaux.

Chimiste expert des tribunaux.

MULTIPLAST

Pansement adhésif cicatrisant.

Composition. — Le *Multiplast* est composé d'une compresse de coton et gaze imprégnée à la Pyoktanine, puissant antiseptique.

Cette compresse est montée sur un support adhésif permettant la fixation instantanée.

Indications. — Au foyer, à l'usine, en voyage, une boîte *Multiplast*, type « Sport », sera très utile pour les soins rapides et la protection des petites blessures des enfants et des adultes.

Pour le cabinet de consultations, le Poste de Secours, l'Infirmerie, un coffret contenant des bandes de largeurs 4, 6, 8 centimètres, permet des centaines de pansements.

Prix au public : *Multiplast*, boîte sport, la boîte : 7 francs.

Multiplast, coffret 1255, le coffret 60 francs.

Fabriqu^e à Paris par les laboratoires Herbel.

Dépôt général.

Pansements PRIMA

3, rue des Reculettes — PARIS (XIII^e).

MURONES DU D^r ROBERT JACQUES

1^o **MURONE aérogène.** — Redressement fonctionnel du poulmon par activation des échanges respiratoires et oxydation.

Indications. — S'adresse aux anémies, aux troubles de la croissance, et à tous les *menacés* de tuberculose.

Composition. — Essences oxydes et essence phénol en proportion juste : ampoule n^o 1, et essence diffusible : ampoule n^o 2, contenues dans la même boîte.

Mode d'emploi. — Injecter quotidiennement en alternant ampoule 1 et ampoule 2 pendant 24 jours, repos 6 jours. Traitement : trois mois.

2^o **MURONES A. B. C.** — Oxygénation et oxydations intratissulaires par oxydoréduction.

Indications. — Tuberculose pulmonaire, osseuse, laryngée, suppurations pulmonaires, bronchites fétides.

Composition. — Murone A : essences oxydantes à doses plus actives ; Murone B : balsamique très diffusible ; Murone C : doué de grande activité infertilisante, ne doit être employé qu'après amélioration des signes généraux et fonctionnels.

Mode d'emploi. — Alternen les injections chaque jour, au début dans l'ordre A. B. B. A. B. B., puis A. B. A. B. A. B., puis A. B. C., B. A. B. C.

Voir notices et formules dans chaque boîte. — Prix en France : 16 fr.

Fabriqu^e par les laboratoires AUG. LUMIÈRE

Dépôt et vente :

Établissements SILBERT et RIPERT

30, rue Bénédit — MARSEILLE.

MUTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications. — Syphilis à toutes ses périodes. Pian, Angine de Vincent, Lupus érythémateux.

Dose normale : Ampoule de 2 centimètres cubes renfermant 13 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 36 francs.

Double dose : Ampoule de 3 centimètres cubes renfermant 26 centigrammes de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 48 francs.

Dose infantile : Ampoule de 1 centimètre cube renfermant 2 cgr. 6 de Bismuth-métal.
Boîte de 10 ampoules : 26 francs.

Mode d'emploi. — Une ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou 1 ampoule de 3 cc. tous les 5 jours.

Traitement de sécurité : Suppositoires Muthanol, adultes et enfants.

Laboratoire du MUTHANOL : G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

MUTHIODE

Solution d'Iodure double de Bismuth et de Sodium.

Indications. — Syphilis à tout âge et à toutes ses périodes. Le MUTHIODE peut être utilisé comme traitement d'attaque.

Hérédo-Syphilis.

Scléroses parenchymateuses et vasculaires.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires par semaine.

Présentation :

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc. (Adultes).

Boîtes de 12 ampoules de 1 cc. (Enfants).

Prix de vente au public :

La boîte de 12 ampoules 2 cc. 24 fr. 50.

La boîte de 12 ampoules 1 cc. 19 fr. 25.

L. N. C. n° 463-17.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND
54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

MUXAGOL

Régulateur du tube digestif. Seul mucilage garanti stérilisé au cours de sa préparation.

Composition. — Graines de *Plantago decumbens* (Psyllium blond des Indes) produit le mucilage le plus abondant et dont la teinte claire permet, par triage à la main, d'éliminer totalement les impuretés qui sont généralement de couleur foncée.

Indications. — Rééducation et pansement de l'intestin, Constipations, Colibacilloses, Entérocrites mucomembraneuses, Colite et dans toutes les affections d'origine intestinale.

Recommandé aux « entéro-névropathes », dyspeptiques, malades atteints d'hémorroïdes, de fissures, de ténésme ano-rectal, etc.

Action sédative dans les coliques néphrétiques, les cystites et dans toutes les inflammations des voies urinaires.

Posologie. — 1 ou 2 fois par jour, au cours des repas,

Adultes : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : 1 ou 2 cuillerées à café.

Un traitement régulier de 3 mois est généralement nécessaire, mais un emploi pendant des années de même qu'une augmentation des doses ci-dessus indiquées ne présentent aucun inconvénient, le MUXAGOL n'étant pas un laxatif, mais un régulateur de transit intestinal. — L. N. C. M. n° 1629-5.

Prix : 18 fr. Permettant un traitement de 15 à 30 jours.

Laboratoire du MUXAGOL

43, rue de Chartres — NEUILLY-SUR-SEINE.

MYCIDOL BADEL

Combinaison allylique et sulfurée de méthanal, essences aromatiques et sels de radium.

Externe. — Antiseptique général, chirurgie, gynécologie, obstétrique.

Dose. — 2 cuillerées à café par litre d'eau.

Prix : 9 francs.

Interne. — Infections gastro-intestinales, non spécifiques, dysentériques, typhiques et grippales. Helminthiase.

Dose. — 50 à 100 gouttes par jour.

Prix : 11 francs.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments
556-2, 556-3.

Laboratoires BADEL

58-60, rue des Moulins — VALENCE (Drôme).

MYCOLYSINE

du Docteur DOYEN

Solution colloïdale phagogène polyvalente. — Stimule la phagocytose.

Formes et doses :

Mycolysine buvable, 4 à 12 cuillerées par jour.

Extrait de Mycolysine, 1 à 4 cuillerées par jour.

Mycolysine injectable, ampoules de 10 cc.

Indications. — Action thérapeutique rapide dans les affections aiguës des voies respiratoires, dans les phlegmons profonds, les lymphangites infectieuses, les fièvres éruptives et la grippe, la méningite cérébro-spinale, etc.

Prix :

Buvable-Extrait : 23 fr. 50 le flacon de 250 gr.

Ampoule : 6 francs.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et Cie, Pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

MYOCHRYSINE

Aurothiomalate de Sodium, sel titrant 50 % d'or métal sous forme de solution aqueuse et de suspension huileuse pour injections intra musculaires ou sous-cutanées. A utiliser dans les cas où les injections intraveineuses de CRISALBINE sont impossibles. Bien toléré localement.

Indications. — Tuberculose pulmonaire de l'adulte et T. P. infantile. T. ganglionnaires et cutanées. Tuberculides. Rhumatismes chroniques et infectieux. Asthme.

Présentations. — Solution aqueuse (étiquettes bleues) et suspension huileuse (étiquettes jaunes). Dosages : 0,01, 0,05, 0,10, 0,20, 0,30, 0,50. Boîtes de 1 et 10 ampoules. (Prix suivant dosage et conditionnement.)

Tuberculose pulmonaire. — Débuter à 0,05 et ensuite 0,10, puis 0,20 et 0,30 par semaine.

Rhumatisme. — Débuter à 0,01 et ensuite 0,05 et 0,10 ou 0,20 par semaine (consulter la notice).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

MYODEN

Élixir Antirhumatismal et Antigoutteux
au Phosphohexaparadiazinammonium.

Composition. — Phosphohexaparadiazinammonium, Sel de Gregory, Extrait stabilisé de belladone, Extrait fluide de bulbes de colchique stabilisés, Teinture de digitale pourprée, Ethanol pur, Eau bi-distillée.

Indications. — Rhumatismes, Arthralgies et Arthropathies aiguës ou chroniques, Goutte, Arthrite goutteuse, Rhumatisme polyarthritique progressif, Sciatique, Affections articulaires chroniques, Lumbago.

Posologie. — *Adultes* : 3 cuillerées à café par jour pur ou dans de la tisane de feuilles de frêne.

Enfants au-dessus de dix ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Durée du traitement : pour un flacon 8 jours. **Traitement complet** : 3 flacons.

Médic^t enregistré au Lab. Nat^l de Contrôle des Médic^{ts} n° 726-1. C.

Prix : 23 francs.

Laboratoires E. DAUPEZ

37, rue des Lois — TOULOUSE (Hte-Gar.). (Tél. : 224-55.)

MYORAL

Le MYORAL est un sel d'or insoluble en suspension huileuse. Il correspond à la formule de l'aurothioglycolate de calcium, soit 64,16 d'or métal et 6,54 de calcium.

C'est le sel le plus riche en or métal employé jusqu'ici, ce qui lui assure une *remarquable efficacité*.

Son insolubilité, d'une part, sa présentation en suspension dans l'huile, d'autre part, en font le *mieux toléré* de tous les sels d'or.

Il doit être utilisé en injection intramusculaire qui est *absolument indolore*.

Le MYORAL est présenté en ampoules de 5 cg. (demi-dose), 1 cc., 2 cc., 3 cc., on peut sans inconvénient en injecter 2 doses de 3 cc. par semaine jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc.

Mode d'emploi :

2 injections intramusculaires par semaine.

En commençant par des doses faibles, arriver le plus vite possible à injecter dans la même semaine 2 ampoules de 3 cc. Jusqu'à une dose totale de 50 cc. à 60 cc., soit environ 3 à 4 gr. d'or métal pour une série. Attendre deux mois avant d'entreprendre une deuxième série.

Prix de vente :	{	12 fr. 25 l'ampoule de 5 cg. (demi-dose).	
		18 fr. 65 — 1 cc. (6 cg. 41 d'or métal).	
		24 fr. 55 — 2 cc. (12 cg. 83 d'or métal).	
		32 fr. „ — 3 cc. (19 cg. 24 —	

Laboratoires du MYORAL

3, rue Saint-Roch — PARIS (1^{er}). (Tél. Opéra 54-58.)

MYOSÉRUM

Plasma musculaire peptonisé et adrénaliné.

Agent fixateur, — Injectable et buvable.

Possède la propriété d'exciter le *pouvoir fixateur* des cellules, permettant ainsi aux tissus malades de *fixer* et de *retenir* les éléments nécessaires à leur bon fonctionnement.

Médication sthénique de 1^{er} ordre. — Anémies, Neurasthénies, Déminéralisation, Blessés, Opérés, Accouchées, Convalescents et toutes déficiences organiques.

Emploi. — Une injection sous-cutanée tous les 2 ou 3 jours ou même tous les jours selon la gravité des cas.

N. B. — Les mêmes ampoules de *Myosérum* peuvent aussi être bues. Ceci pour les cas bénins et dans l'intervalle des injections.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 24 francs.

Inscrit au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments.

Produits SAMY

168, boulevard Saint-Germain — PARIS.
(Tél. : Danton 50-30.)

MYOTHERMINE

Médication externe, imprégnation par essences végétales, réaction thermogène, révulsion atténuée. Onguent non coloré en tube étain.

Indications. — Douleurs articulaires, Courbature, Lumbago, Torticolis, Point de côté, Engelures, Congestions de la gorge, Trachéites, Bronchites, Grippe pulmonaire, Congestion pulmonaire, Pneumonies, Broncho-pneumonies, Pleurésies.

Mode d'emploi. — Étendre une couche de Myothermine avec un tampon de coton, recouvrant largement le point douloureux, la gorge ou le thorax, suivant les cas.

Pour obtenir une révulsion atténuée, non pénible, couvrir avec le papier imperméable spécial contenu dans la boîte.

Prix du tube : 14 francs.

Durée moyenne : 10 à 12 jours.

Échantillon grandeur normale sur demande.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 00-15.)

MYOVARSYL

Sulfarsénobenzol, voie intramusc. ou sous-cutanée.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Hypotrophie des sujets en bas âge. Médication de choix des sujets à veines difficiles : femmes, enfants, nourrissons.

Présentation. — En boîtes unitaires : ampoule de 0,015 à 0,50. A chaque dose est adjoit un *solvant pour arsenicaux*. Ce solvant rend indolore l'injection des arsénobenzènes. Aucun analgésique. Ampoules de 2 et de 5 cc.

L'ampoule de 2 cc. suffit pour dissoudre les doses s'échelonnant de 15 mgr. à 18 cgr. de sel. Au-dessus de cette dernière dose, utiliser 3 à 5 cc.

Prix au public : suivant dose, de 2 fr. 75 à 15 fr. 60.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

Dép. : **Laboratoire et Pharmacie A. MILLET**
5, rue A.-Thomas — PARIS (IX^e). T. : Prov. 20-20.

MYRTINE BÉRAL

Deux formes. — Ampoules et suppositoires.

Myrténol du myrte	0,05
Cinéol du myrte	0,10
Terpinéol.....	0,10
Camphre	0,05
Huile pour hypodermie.....	2 cc.

Synthèse des principes actifs de l'essence de myrte totale.

Dose moyenne. — 1-2 cc. en injections hypodermiques ou musculaires indolores et facilement résorbées.

Traitement de choix de la *mucopurulence* et de l'*infection broncho-pulmonaires*. Toutes *broncho* et *pneumopathies* au stade de mucopurulence et d'hypersécrétion.

Prescrire : Myrtine Béral. Une boîte : 20 fr.

Pour les cas où la voie rectale est préférée :

Suppositoires de Myrtine Béral. Une boîte : 16 fr.

Sans indications, ce sont les ampoules qui sont délivrées.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

NAIODINE LOGEAIS

Formule :

- 1° Normale ou A, solution aqueuse à 1 % d'iodure de sodium stabilisé pour intramusculaires.
- 2° Concentrée, solution B aqueuse à 5 %. Spéciale pour intraveineuses.
- 3° Sulfoiodée (voir Thionaiodine).
- 4° Suractivée (voir Naiodine suractivée).

Formes :

A	6 ampoules de 10 cc.....	27 fr. 50
	6 ampoules de 20 cc.....	35 fr. 80
B	6 ampoules de 10 cc.....	32 fr. 25
	6 ampoules de 20 cc.....	41 fr. 85

Boîtes vrac de 50 ou 100 ampoules réservées au Corps Médical. Prix courant réduit sur demande.

Propriétés :

Solution A. — Sédatif de l'élément douleur dans les algies rebelles, grâce à l'action neurotrope intense de NaI stabilisé.

Solution B. — Action antiseptique et anti-infectieuse puissante par voie intraveineuse dans le traitement des névrxites et leurs séquelles. Cure intraveineuse des algies rebelles.

La NAIODINE A ou B est atoxique, stabilisée, indolore à l'injection, immédiatement assimilable, sans réactions secondaires. Ni incompatibilité, ni contre-indications. Pas d'accoutumance ni d'accumulation.

Indications :

Solution A. — Tout syndrome douloureux, aigu ou chronique : Sciatiques, Lumbagos, Zonas, Névralgies faciales, intercostales et lombaires, Névrites, Myalgies, Toxicomanies, etc., et toutes indications des iodures : Asthme, Emphysème, Artérites, Aortites, Coronarites, etc.

Solution B. — Maladies infectieuses du système nerveux et leurs séquelles, Épilepsie essentielle, Algies rebelles, Mycoses, Artérites, Aortites, Coronarites, etc.

Posologie :

Solution A. — 20 à 40 cc. par jour, en une seule séance, jusqu'à sédation. Injections intramusculaires (*loco dolenti* si possible).

Solution B. — Injections intraveineuses très lentes 20 à 40 cc. par jour. Non sclérosante.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle :

Solution A : N° 602-1.

Solution B : N° 602-1-2.

Laboratoires Jacques LOGEAIS.

ISSY-LES-MOULINEAUX. — PARIS.

(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

NAIODINE SURACTIVÉE

Iodure de sodium + Vitamine B₁.

associés en une même préparation immédiatement injectable.

Forme A pour injections intramusculaires (2 milligrammes de vitamine B₁ par ampoule de 10 cc.).

Forme B pour injections intraveineuses (1 centigramme de vitamine B₁ par ampoule de 10 cc.).

Propriétés et indications. — Agit synergiquement par l'action neurotrope et antialgique de la NAIODINE et l'action antinévritique de la vitamine B₁.

Toutes algies, névrites et polynévrites d'origine toxique ou infectieuse (éthyliques, nicotiniques, saturnines, malariques, gravidiques, diabétiques).

Posologie:

Forme A: 1 à 3 ampoules par jour.

Forme B: 1 à 2 ampoules par jour.

Prix:

A: 6 ampoules de 10 cc. : 30 fr. 60

B: 6 ampoules de 10 cc. : 71 fr. 40

Atoxique. Indolore. Sans réactions secondaires.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle :

Solution A : N° 602-12-1.

Solution B : N° 602-12-2.

Laboratoires Jacques LOGEAS

ISSY-LES-MOULINEAUX-PARIS. (Tél. : Michelet 07-50 et 51)

NASOBORE

Forme. — Comprimés effervescents instantanément solubles, pour Gargarismes et Inhalations.

Composition. — Associe la *Chloramine T* au baume du Pérou véritable et à des essences balsamiques naturelles, décongestionnantes, sédatives et bactéricides.

Indications. — Prophylaxie et traitement des affections du nez, de la gorge, de la trachée, du larynx et des bronches.

Mode d'emploi :

1° Gargarismes (3 à 4 par jour) : 1 comprimé effervescent dans 1/2 verre d'eau bouillie chaude ;

2° Inhalations (3 à 4 par jour) : 2 à 3 comprimés effervescents dans un bol ou un inhalateur d'eau bouillante. Respirer les vapeurs pendant 5 à 10 minutes.

Durée de traitement : 5 à 10 jours.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

NASOPHÉDRINE BÉRAL

Pommade nasale (Huile gélifiée) à 3 p. 100 d'Éphédrine Béral.

Rigoureusement neutre. Exempte d'analgésique et d'oléate.

Effet intégral de l'éphédrine sans irritation et avec conservation de la perception de la respiration nasale.

Agit mieux que les instillations huileuses, dont elle évite les inconvénients.

Indications. — Coryza, Rhinite spasmodique, Asthme nasal, Obstructions nasales, Sinusite, etc.

Mode d'emploi. — Gros comme un grain de chènevis dans chaque narine.

Prescrire : Nasophédrine Béral, un tube.

Prix : 12 fr. 50.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

NATIBAÏNE NATIVELLE

Seule association renfermant 1/3 de Digitaline Nativelle et 2/3 d'Ouabaïne Arnaud.

Forme. — Solution au 1/1000.

Indications. — Myocardites avec troubles du rythme et dilatation des cavités ventriculaires — Arythmie complète avec troubles du tonus — Hypertension artérielle avec tendance à la tachycardie.

Doses. — Suivant le degré de l'insuffisance cardiaque, entre XV et L gouttes de *Natibaïne Nativelle* par jour, les cinq premiers jours de chaque dizaine ou de chaque quinzaine,

Prix : 20 francs.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV°).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

NATROSYL

Forme pharmaceutique. — Soluté.

Composition. — Soluté alcalin à base de Baume du Pérou et d'Essences antiseptiques aromatiques.

Action. — Antiseptique, lénitive, décongestionnante.

Indications. — Traitement médical des affections vagino-utérines, leucorrhée, métrite puerpérale, etc.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café par litre d'eau bouillie chaude en injections vaginales.

Prix : 14 fr. 30

Laboratoires

du Dr Pierre ROLLAND

Usine : 15, rue des Champs — ASNIÈRES.

Dépôt : 127, bd St-Michel — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 22-01.)

NÉALGYL BOTTU

Composition et présentation. — Comprimés constitués d'une association de deux groupements médicamenteux : un noyau antalgique à base d'une nouveauté : la chloralopyrine de Bottu et un groupement correctif des effets nocifs secondaires sur le cœur et le rein (caféine-hexaméthylène amine).

Les comprimés dragéifiés sont insolubles mais faciles à déglutir. Chacun représente 0,27 de chloralopyrine, 0,10 d'oxyéthylacetanilide, 0,01 de caféine et 0,07 d'hexaméthylène.

Indications et posologie. — Toutes les algies, depuis les bénignes (courbatures, céphalées, odontalgies) jusqu'aux douleurs tenaces et rebelles (goutte, sciatique, menstrualgies).

Pour un effet immédiat et massif : 2 comprimés d'emblée suivis à 20 minutes de distance d'un troisième et, si besoin, d'un quatrième. Pour une action prolongée et soutenue : 6 à 8 comprimés par jour toutes les 2 heures, avant ou pendant les repas, mais à éviter pendant le travail de la digestion.

Pour les algies vespérales et insomnies douloureuses, 2 comprimés d'emblée le soir dans un liquide très chaud.

Deux modèles : La boîte P. M. de 12 comprimés.

La boîte G. M. de 30 comprimés.

Laboratoires BOTTU

115, rue Notre-Dame-des-Champs — PARIS (VI°). (Tél. : Danton 13-20.)

NEATOL

(Nouvelle dénomination de NEADOL)

Nouveau complexe antirhumatismal.

Forme. — *Cachets* contenant :

Diméthylaminoantipyrine.	0,18	Nitrate de Potassium....	0,05
Acétyl Paraphénétidine...	0,12	Carbonate de Lithium...	0,05
Phénylacétamide	0,10	Semence de Colchique pul-	
Triméthyl xanthine.....	0,03	vérisée	0,02
Acide Quinique	0,01	Silicate de Magnésium...	0,07
		Carbonate de Calcium...	0,04

Effets thérapeutiques. — Analgésique. Antithermique. Anti-rhumatismal. Diurétique puissant. Eliminateur et réducteur de la production d'acide urique, s'opposant à son accumulation dans les tissus. Modificateur du terrain arthritique.

Indications. — Toutes les manifestations douloureuses de la diathèse urique ; rhumatisme aigu et chronique ; douleurs articulaires et musculaires ; goutte ; gravelle urique ; lumbago ; torticolis ; névralgies (sciatique, intercostale).

Posologie et mode d'emploi. — Un cachet avant chacun des deux principaux repas dans un demi-verre d'eau bicarbonatée ou d'eau de Vichy. Dans les cas aigus, 4 cachets par jour.

Prix : 17 fr. 50 la boîte de 24 cachets.

Laboratoires SUJAL. — J. LAFARGE, Dr en pharmacie
62, rue de la Brauderie — CHATEAUROUX (Indre).

NÉFITOL

Présentation. — En tube, dans une boîte à tiroir.

Composition. — Adrénaline, Benjoin, Co-caine, etc..., dissous ou en suspension dans la vaseline neutre, fluide.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique par excellence des maladies des voies aériennes supérieures, en décongestionnant rapidement les muqueuses sans jamais les irriter.

Indications. — Coryza aigu ou chronique, rhume des foins, rhinites, pharyngites, etc...

Mode d'emploi. — En introduire gros comme un pois dans chaque narine, 3 ou 4 fois par jour (renifler doucement).

L. N. C. n° 835-2

Laboratoires J. TIFFENEAU. Dr en Ph^{le}
24, rue de Monttessuy — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 35-30.)

NÉOBILINE

Forme. — Pilules.

Composition. — Bile de porc, Oléate de soude, Boldo, Iris versicolor.

Indications. — Lithiase biliaire, Congestion du foie, Constipation.

Posologie. — 4 pilules par jour aux repas.

Laboratoire de Thérapeutique Générale
du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien.
RIVE-DE-GIER.

NÉO-BIOELIXIR

Liquide.

Tonique hématopoiétique.

Propriétés. — Thérapeutique reconstituante et anti-anémique énergique par l'acidaminothérapie et l'hépatothérapie combinées : Acides aminés + méthode de Whipple.

Composition :

Acides aminés :

Tryptophane gauche	0 gr. 009.
Monochlorhydrate d'Histidine gauche	0 gr. 018
Bichlorhydrate de Lysine droite	0 gr. 018
Extrait de foie frais	1 gr. 50
(= 150 gr. d'organes frais).	

Elixir de Garus.....	50 gr.
----------------------	--------

Excipient aromatisé	50 gr.
---------------------------	--------

Indications. — Les anémies, l'asthénie, les convalescences médicales ou chirurgicales, l'amaigrissement, les états de dénutrition et de carence.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café, pur ou dans un peu de liquide, avant les 2 repas.

Enfants : 1/2 dose.

Prix : 18 fr. 80.

Laboratoires P. REYGAGNE
160, avenue d'Italie — PARIS.
(Tél. : Gobelins 90-00.)

NÉOBIOL

Composition. — Soufre colloïdal et complexe hydro-carburé spécial, dégraissant et d'odeur agréable.

Formule enregistrée au Laboratoire national de Contrôle des médicaments sous le n° 1501-1.

Indications. — Séborrhée et ses manifestations : chute des cheveux, pellicules, peaux grasses, points noirs, acné.

Mode d'emploi :

Au visage : En applications externes quotidiennes. En frictions douces avec un tampon de coton hydrophile.

Au cuir chevelu : Ecarter les cheveux par quelques raies faites au peigne, et procéder de même qu'au visage.

Prix au public : Flaçon : 21 fr. 20 (250 cc. environ).
Demi-flaçon : 13 fr. 25 (125 cc. environ).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1501-1.

Laboratoires JAUFFRET

NÉOBIOL-IMPÉTIGOL — VANVES, près PARIS.

L. JAUFFRET, pharmacien, ex-interne des hôpitaux.
Correspondance et bureaux : 181, avenue Victor-Hugo,
CLAMART (Seine). (Tél. : Michelet 04-71).

NÉOBOLDINE

Pilules titrées à un milligramme de Boldine et à 0,05 d'Extrait de Boldo, représentant le *Totum Actif du Pneumus Boldus*.

Indications Thérapeutiques :

Toutes les *Insuffisances Hépatiques*, *Maladies du Foie* (Cirrhoses hypertrophiques, Cholécystites chroniques, Congestion du Foie, Ictère), *Constipation chronique*.

Posologie et mode d'emploi :

De 2 à 6 pilules par jour, à prendre le midi et le soir, un quart d'heure avant les repas.

Prix : 14 fr. 60

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

9, impasse Thoréton — PARIS (XV^e).

NÉO-CALCILINE

Total endocrinien intégral.

Reconstituant biologique, para-hépto-pancréato-splénique. Anti-rachitique.

Composition :

Os frais pulvérisé.....	0,15
Parathyroïde.....	0,001
Thymus	0,05
Surrénale	0,05
Diastase pancréatique	0,05
Poudre de muq. intest.....	0,05
Extrait lipoidique de foie	0,05
Extrait lipoidique de rate.....	0,05
Par comprimé ou mesure de granulé.	

Doses. — 2 comprimés ou 2 mesures (granulé) avant chaque repas, 20 jours par mois.

Enfants : 1,2 doses.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV°).

(Tél. : Ségur 69-13.)

NÉOCARDYL

Butyl-thio-laurate de Bismuth oléosoluble.

Indications. — Bismuthothérapie de la syphilis acquise ou héréditaire, par voie intramusculaire.

Présentations et posologie. — Néocardyl (pour adultes), solution huileuse dosée à 0 g. 05 de Bi-métal par cm³. Ampoules de 1 cm³ 5 cont. nant 0 g. 075 de Bi-métal (boîtes de 12 ampoules).

Série de 12 injections bihebdomadaires : intervalle de 5 semaines environ entre deux séries consécutives.

Néocardyl infantile : Solution huileuse dosée à 0 g. 015 de Bi métal par centimètre cube, Ampoules de 1 cm³ (boîtes de 10 ampoules). Dose par injection, suivant le poids de l'enfant (consulter la Notice détaillée).

Prix de vente :

Néoc. Adultes. La boîte de 12 ampoules.. 24 fr. 50
Néoc. Infantile. La boîte de 10 ampoules.. 14 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII°).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-COCCYL

1162 F.

Para-amino-phényl-sulfamide.

Chimiothérapie antibactérienne polyvalente préventive et curative.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 gr. 50 de 1162 F. Ampoules pour injections intrarachidiennes (méningites) ou intrapleurales (pleurésies purulentes), sur demande directe téléphonique ou télégraphique.

Indications. — Spécifique des infections à streptocoque, gonocoque, méningocoque, pneumocoque, staphylocoque, colibacille, mélitocoque, bacille de Ducret, bacille de Friedlander, bacille de Pfeiffer, virus du Trachome, virus de la lymphogranulomatose.

Posologie. — Traitement préventif : 2 à 4 comprimés par jour. Traitement curatif :

Cas :	Bénins.	Graves.	Très graves.
Adultes.....	4 à 6	8 à 10	14 à 20
6 à 12 ans	2 à 4	4 à 7	10 à 14
1 à 3 ans	1 à 2	2 à 3	6 à 8
6 mois.....	0,5	1	2

Gonococcies aiguës ou chroniques : En traitement associé aux lavages. Le 1^{er} et le 2^e jours : 5 à 6 comprimés, les 3^e, 4^e et 5^e jours : 3 à 5 comprimés ; les jours suivants 2 à 3 comprimés.

Mode d'emploi. — Toujours commencer par la dose maxima prescrite.

Fractionner les doses en 6 ou 8 prises.

Poursuivre le traitement une semaine après la disparition des phénomènes morbides.

Proscrire les sulfates (soude, magnésie, chaux) et les traitements arsenicaux.

Éviter la constipation par l'huile de paraffine ou les mucilages. Conseiller le bicarbonate de soude à dose égale au *Néo-CoccyL* absorbé.

Prix : 15 fr. 30 le tube de 20 comprimés.

Enregistré au J. N. C. n° 759-7 (comprimés) et n° 759-8 (ampoules).

Laboratoires du Docteur PILLET

G. HOUET, Pharmacien.

222, boulevard Pereire — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Etoile 40-15.)

Adresse télégr. : Houépillat-Paris.

Service de garde : Molitor 58-85.

NEO-CODION

Puissant sédatif de la toux.

A base de deux nouveaux dérivés :

LE CAMPHOSULFONATE DE CODEINE

et

LE CAMPHOSULFONATE DE DIONINE

Plus actifs — Moins toxiques
que la Codéine et la Dionine.

Composition :

Nouveaux principes actifs :

Camphosulfonate de Codéine.....	0 gr. 75
Camphosulfonate de Dionine.....	0 gr. 75

Excipient thérapeutique:

Teinture de Drosera	30 gr.
Teinture de Grindelia	25 gr.
Teinture de Marrube blanc stabilisé .	20 gr.

Pour 100 grammes.

Présentation. — Deux formes : *Gouttes et Dragées.*

Indications :

- 1° *Toux spasmodiques et réflexes* : Laryngitise
Trachéites, Coqueluche ;
- 2° *Bronchites aiguës* : Grippe, Asthme ;
- 3° *Toux rebelles* : Bronchites Chroniques, Bacillose.

Doses. — *Enfants* : II gouttes par année d'âge
2 à 3 fois par jour.

Adultes : XXX gouttes 3 à 4 fois par jour.

Prix : 16 fr. 65 pour un traitement de quinze jours.

Laboratoires E. BOUCHARA

Docteur en Médecine,

Docteur en Pharmacie,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris,

47, rue de Bretagne — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 94-65.)

NÉO-COLLARGOL

Le Néo-Collargol assure au Corps médical la garantie d'un produit à teneur en argent très élevée (80 p. 100 d'argent métal).

Ni irritant ni toxique, c'est un bactéricide des plus énergique dont l'emploi est toujours utile pour le traitement des maladies infectieuses et pour le pansement des plaies.

Il s'emploie en :

Pommade Néo-Collargol cocaïnée pour le pansement de toutes plaies opératoires, variqueuses, brûlures.

Pommade Néo-Collargol non cocaïnée pour frictions dans les maladies infectieuses.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-19.

Ovules Néo-Collargol réalisant le pansement continu des vaginites, métrites, ulcérations du col utérin, Les sécrétions diminuent et la guérison suit rapidement.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-17.

Suppositoires Néo-Collargol pour hémorroïdes, fissure anale et prostatites.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-21.

Pilules Néo-Collargol pour les entérites, la colibacillose et l'appendicite chronique.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-18.

Compte-Gouttes pour le coryza et la grippe.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1059-22
(sous le nom de solution).

Pommade cocaïnée : 16 fr. 75 (le tube de 20 gr.). —

Pommade non cocaïnée : 15 fr. 70 (le tube de 20 gr.).

— *Ovules* : 15 fr. 30 (les 6). — *Suppositoires* : 15 fr. 30 (les 6). — *Pilules* : 15 fr. 30 (les 40). —

Compte-Gouttes : 14 fr. 20 (le flacon de 15 cc.).

Laboratoires du Dr MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS.

(Tél. : Archives 39-44)

NÉOCORTINE

Composition. — Esther acétique de l'hormone cortico-surrénale obtenue par synthèse (acétate de désoxycorticostérone).

Indications. — Toutes les insuffisances surrénales Chroniques (maladies d'Addison) ; Aiguës (au cours des maladies infectieuses). *Traitement du shock, Traitement des grandes asthénies.*

Présentation. — En ampoules de 1 cc. contenant en solution huileuse 2 mgr. ou 5 mgr. d'acétate de désoxycorticostérone.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires.

Posologie. — Variable, selon les cas, de 2 mgr. à 20 mgr. *pro die.*

Prix :

La boîte de 4 ampoules de 1 cc. à 2 mgr. 80 fr.

La boîte de 4 ampoules de 1 cc. à 5 mgr. 160 —

Laboratoire pour la Diffusion des Produits synthétiques,

Léonce GODEAU, Pharmacien,
73, rue Dutot — PARIS (XV°).

NÉOCRINOL

NÉOCRINOL M

Composition. — Extrait de glande orchitique associé à extrait de surrénale, thyroïde, prostate, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL M existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez l'homme ; troubles adiposo-génitaux de l'adolescence, asthénie neuro-psychique et neuro-musculaire, impuissance et vieillissement de l'organisme, hypertrophie de la prostate.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 12 jours, complétée par cures de 12 ou 24 jours pendant 2 ou 3 mois.

NÉOCRINOL F

Composition. — Extrait d'ovaire associé à extrait de surrénale, thyroïde, hypophyse, cerveau et moelle épinière.

Le NÉOCRINOL F existe également *sans* thyroïde.

Indications. — Chez la femme ; troubles de la puberté, de la menstruation, de la ménopause. Frigidité, obésité, règles doul. ou anormales.

Posologie. — 1 ampoule par jour dans eau sucrée avant repas.

Première cure de 6 jours, complétée par cures de 6 à 12 jours pendant 2 ou 3 mois.

Prix : M ou F : La boîte de 6 ampoules de 10 cc. : 26 francs.

12 — — 10 cc. : 48 francs.

Aux enfants arriérés, prescrire NÉOCRINOL M ou F *Sans thyroïde*

L. GUÉRET, Pharmacien
89, rue Martre — CLICHY (Seine).

NÉO-DMÈGON

Vaccin curatif des complications de la gonococcie.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par des émulsions de cultures diverses de *gonocoques* traitées par le fluorure de sodium.

Indications. — Complications diverses de la Blennorragie (Orchi-épididymites, cystites, prostatites, arthrites, ophtalmie, etc...), dans lesquelles le Néo-Dmègon agit notoirement sur les symptômes douloureux et inflammatoires.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³ (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (races diverses). En principe, 1 ampoule tous les 2 jours, en alternant les ampoules imprimées rouge et bleu. Voie hypodermique, intramusculaire ou intraveineuse.

Prix de vente : la boîte de 6 amp. : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-DMÉTYS

Vaccin curatif et préventif de la coqueluche.

Stock-vaccin atoxique stabilisé constitué par une émulsion de cultures diverses de Bacilles de Bordet traités par le fluorure de sodium.

Indications. — Vaccinothérapie et vaccination préventive de la coqueluche.

Présentation et mode d'emploi. — Ampoules de 1 cm³ (boîte de 6) imprimées rouge ou bleu (souches différentes). Une injection intramusculaire (de préférence) ou sous-cutanée, tous les 2 jours ; commencer par 1/2 ampoule pour atteindre 1 ampoule dès la deuxième injection. Chez les très jeunes enfants, s'en tenir à 1/2 ampoule. Séries de 6 à 10 ampoules (soit 10 à 20 jours environ). Alternier les ampoules imprimées rouge et bleu.

Le Néo-Dmétys peut être utilisé pour l'intradermo-réaction (diagnostic).

Prix de vente : La boîte de 6 amp. : 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NÉO-FEROXAL

Composition :

Protoxalate de fer	10 gr.
Sulfate de cuivre	0 gr. 030
Phosphate de soude	1 gr. 33
Glycérophosphate de chaux ...	0 gr. 20
Glycérophosphate de magnésie..	0 gr. 20

Pour 100 gr.

Présentation. — Flacon de 85 gr. de granulés.

Propriétés :

- 1° Le cuivre associé en quantité minime au fer accélère l'action hémopoïétique de ce dernier métal.
- 2° La concentration en fer importante permet une thérapeutique martiale très active.
- 3° La présence de phosphates alcalins prévient les troubles gastriques et la constipation.

Indications. — *Toutes les anémies*, associée ou non, suivant le type de l'anémie, aux extraits hépatiques ou gastriques. La *chlorose*, le *lymphatisme*, la *scrofule*. Au cours de la *puberté*, de la *grossesse*, de l'*allaitement*, dans les *convalescences* de toutes les maladies infectieuses.

Posologie. — Une cuillerée à café contient 0 gr. 50 de protoxalate de fer et 0 gr. 0015 de sulfate de cuivre.

Enfants : 1/2 cuillerée à café par année d'âge et par jour.

Adultes : 2 à 6 cuillerées à café et plus pendant 3 semaines.

**Société Générale
d'Applications Thérapeutiques**

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

NÉOGLOBULINE

Médication tonique, antianémique, antirachitique.

Forme et Composition. — Comprimés dragéifiés à base d'histidine, de vitamines A, B¹, D, d'extraits opothérapiques, d'extrait d'avoine et de fenu-grec déshuilé.

Action thérapeutique. — Stimule l'appétit, favorise l'anabolisme, augmente le poids et la valeur globulaire, relève l'état général.

Indications. — Croissance, rachitisme, lymphatisme, anémie, asthénie, débilité, convalescence.

Posologie :

Enfants : à partir de 12 à 15 mois, un comprimé par jour et par année d'âge jusqu'à 4 ans, ensuite de 4 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Adultes : 6 à 10 comprimés.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 932-5.

Le flacon de 40 comprimés : 21 fr. 40.

Laboratoire SYNOPS

84, rue du Faubourg-du-Temple — PARIS (XI°).

NÉO-GRANULÉ DU D^r CHURCHILL

Polyvitamine.

Récalcification, Carence vitaminique, Etats dépressifs, Tuberculose.

Composition. — Hypophosphite de chaux, Extrait de rate, Vitamines A, B, C, D.

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café par jour.

Enfants : 3 cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 cuillerées à bouche par jour.
(De préférence au début des repas.)

Prix : 20 fr. 40 (66 fr. 30 la quadruple boîte).
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 225-17.

Laboratoire des Produits du D^r CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien,

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII°).

(Tél. : Did. 74-02.)

NÉO-GYNERGÈNE

Association stable de tartrate d'ergotamine et de tartrate d'ergobasine.

Propriétés. — Le Néo-Gynergène, stimulant du tonus utérin, combine les effets rapides de l'ergobasine à l'action prolongée, mais plus tardive de l'ergotamine. Le Néo-Gynergène n'a pas d'action sur la tension artérielle, contrairement aux extraits hypophysaires.

Indications. — Hémorragies de la délivrance par atonie utérine, Opération césarienne, Subinvolution utérine, Hémorragies gynécologiques.

Posologie. — *Gouttes* : XV à XXX, 1 à 3 fois par jour. *Ampoules* : Injection de 1/2 cc. à 1 cc. (voies sous-cutanée et intramusculaire).

PRODUITS SANDOZ,

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

NÉO-LAXATIF CHAPOTOT

Laxatif.

Composition. — Suc d'orange et manne.

Forme. — Sirop.

Indications. — Laxatif agréable pour les enfants, les dames et les personnes âgées ou affaiblies.

Ne renferme ni produits chimiques, ni phtaléine du phénol, ni drastiques, ni stupéfiants.

Peut être donné aux enfants, même nouveau-nés.

Posologie.

Enfants du premier âge : 1/3 à une cuillerée à café.

Enfants de 3 à 5 ans : une à deux cuillerées à café.

Enfants de 6 à 14 ans : une à deux cuillerées à entremets.

Adultes : une à deux cuillerées à soupe.

S'il y a lieu, augmenter les doses jusqu'à effet pour revenir ensuite à des doses moindres, mais suffisantes.

Prix : 14 fr.80.

Laboratoires CHAPOTOT

56, boulevard Ornano

PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.)

R. C. 231917 B.

NÉOLYSE

Composé silico-magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Reminéralisateur et antinéoplasique. Le meilleur traitement médical des affections cancéreuses.

Indications. — Prophylaxie et traitement des néoplasmes. Traitement préventif des récides et des métastases. Traitement des verrues et des lésions du type pré-cancéreux. Traitement des troubles asthéniques (fatigue, dépression, surmenage). Adénome prostatique.

Posologie. — Un cachet avant les 3 principaux repas, pendant 20 jours. Interrompre le traitement pendant 10 jours.

Boîte de 60 cachets : 25 fr. 65.

Une ampoule par jour, voie hypodermique, intramusculaire ou interstitielle; séries de 16 injections, repos de 15 jours.

Boîte de 4 ampoules ordinaires : 13 francs.

Boîte de 4 ampoules radioactives : 24 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

NÉO-MICTAZINE

Anti-infectieux urinaire à spécificité contre le gonocoque, plus caractérisée que les sulfamides et mieux tolérée. Décongestif pelvien.

Composition par comprimé :

α -(p. amino-benzène-sulfamido) pyridine (Brevet Rhône-Poulenc).....	0 gr. 30
Malva purpurea.....	0 gr. 10

Propriétés thérapeutiques. — La présence du noyau pyridinique dans sa molécule différencie l' α -(p. amino-benzène-sulfamido) pyridine de la p. amino-benzène-sulfamide (1162 F.) et lui confère cliniquement une action particulièrement marquée sur le gonocoque en plus de son action sur le streptocoque, le staphylocoque et le colibacille. D'autre part, sa tolérance est beaucoup plus élevée que celle de la sulfamide. « La détermination de la toxicité du α -p. (amino-benzène-sulfamido) pyridine chez la souris et le rat a montré que celle-ci est le quart de celle de la sulfamide. La *malva purpurea* agit sur la congestion pelvienne réalisant une synergie d'action sur l'élément infectieux et l'élément congestif toujours associés dans les infections génito-urinaires.

Action rapide, durable, sans toxicité.

Indications thérapeutiques. — *Gonococcies* : urétrites, cystites, prostatites, pyélites, pyélonéphrites.

Vaginites, métrites, salpingites.

Prophylaxie des accidents infectieux du *post-partum*.
Fièvre puerpérale du *post-abortionum*, des accidents infectieux post-opératoires en chirurgie urinaire et abdominale.

Posologie. — Dose de début : 10 à 12 comprimés par 24 heures (sous surveillance médicale).

Baisser progressivement avec l'éclaircissement des urines, la sédation des phénomènes douloureux, la chute de la température.

Laboratoire du MICTASOL

5, rue de Lübeck, — PARIS (XVI^e)

Tél. : Klé 71-34.

NÉO-NEUROSINE PRUNIER

Saccharure granulé à base de :

Phospho-glycérate de calcium	
pur	0,05 centigr.
Glycéro-phosphate de sodium	
pur	0,10 —
Chlorure de magnésium pur ..	0,15 —
par cuillerée à café, soit 5 grammes.	

Propriétés thérapeutiques. — Médication tonique, phosphorée, calcique et magnésienne.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, à prendre en nature ou dans de l'eau.

Prix en France : 15 fr. 45 le flacon.

Dépôt général :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. M^{on} Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NÉOPANCARPINE

Solution d'Extrait total de Jaborandi.

Formes. — Gouttes, Granules, Ampoules injectables.

Indications thérapeutiques:

Traitement de fond des troubles vago-sympathiques, en particulier des *altérations de la sensibilité organique* (nerf pneumogastrique et annexes).

ASTHME - GRIPPE

RHUME DES FOINS

CORYZAS SPASMODIQUES

TOUX QUINTEUSES

COQUELUCHE

Accidents respiratoires et digestifs post-anesthésiques au cours des opérations.

Manifestations anaphylactiques.

URTICAIRE - ECZÉMA

Mode d'emploi:

Commencer toujours par des doses faibles. S'en tenir ensuite aux doses moyennes. Augmenter les doses en cas d'insuffisance d'action.

Doses moyennes:

Gouttes : Enfants : III à X gouttes.

— Adultes : VIII à XV gouttes.

3 à 4 fois par jour, immédiatement après les repas.

Granules : Adultes : 1 granule 3 à 4 fois par jour.

Ampoules : Adultes : Commencer toujours par 3/4 d'ampoule, puis l'ampoule entière. Continuer à la dose la mieux tolérée. **1 ou 2 ampoules par jour.**

Le traitement par ampoules peut être continué sans toxicité pendant toute la période du rhume des foin, combiné avec le traitement interne et les instillations nasales et oculaires de **RHINO-FLUINE**.

Dans l'asthme, il peut être poursuivi par périodes de plusieurs semaines, 3 à 4 fois dans l'année comme traitement de fond jusqu'à disparition des crises.

Prix : Gouttes, Granules : 19 fr. 10.

Ampoules : 23 fr. 35.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris.

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 35-25.)

NÉO-PASSIFLORINE

(Comprimés.)

Médication symptomatique et causale
des états vago-sympathiques.

Composition :

Un comprimé contient :

Extrait sec de Passiflora incar-	
nata.....	0,10
Extrait sec de Salix alba ...	0,10
— de Crataegus ...	0,03
Gluconate de Calcium	0,10
Vitamine D pure cristallisée..	1 000 unités intern.
Peptones polyvalentes	0,05
Hyposulfite de magnésium ..	0,02

Action. — Les comprimés de *NEO-PASSIFLORINE* ne sont pas destinés à remplacer la *PASSIFLORINE*, mais ils trouvent leur emploi dans les cas rebelles ou lorsqu'interviennent des causes profondes : troubles du métabolisme du calcium, modifications humorales, phénomènes anaphylactiques, déficience hépatique, chaque fois en somme qu'il faut modifier le terrain et installer une médication symptomatique et causale.

Indications. — Toutes les indications de la *PASSIFLORINE* et tous les syndromes vago-sympathiques d'origine obscure, en particulier les syndromes de neurotonie imbriquée.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés avant chaque repas.

Prix : 20 francs.

G. REAUBOURG et Cie,

Docteur en pharmacie,

115, rue de Paris

BOULOGNE-SUR-SEINE

R. C. Seine 265.702 B.

NÉOPHAGE

Traitement médical des cancers et des états précancéreux.

Néophage n° 1. — Levure injectable travaillant à 37°.

Néophage n° 2. — Extraits glandulaires : Thymus, Thyroïde, Hypophyse, Pancréas. Métaux colloïdaux : Cu, Fe, Se, Mn, Mg.

Injections intramusculaires tous les 2 jours du contenu total d'une ampoule n° 1 et de 1/3 d'une ampoule n° 2 ; augmenter progressivement les doses de n° 2.

Prix public : 104 fr. la boîte de 12 ampoules.

Laboratoires JAMMES

86, rue Michel-Ange — PARIS (XVI^e).

NÉO-PHYSIO

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Infections de moyenne intensité.

Indications. — Gripes, Angines, Toxémies gastro-intestinales, Furunculose, Métrite, Salpingite.

Injections intramusculaires, région rétro-trochantérienne au point de Barthélemy. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Prix : 29 fr. 70 la boîte de 8 ampoules de 5 cc.

PHYSIOSTHÉNINE

Toutes infections graves.

(Voir lettre P.)

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

(Tél. : 32.)

NÉOPLASTEX

Bandes extensibles, lavables en filés Lastex
Faisant office de

Bandages de **CONTENTION** par enroulement.

TROIS QUALITÉS (*Bien préciser la qualité prescrite.*)

1° **EXTRA-MINCE** (ou 3259) pour tous soutiens :

a. Des membres, en largeurs 4, 6, 8, 10 cm. sur 2 m. 50 de long ;

b. De l'abdomen, en largeurs 15, 20, 25, 30 cm. sur 2 m., 2 m. 50, 3 m. de long.

Indications.

a. *Varices, Phlébites, Hydarthroses, etc. ;*

b. *Ptoses, Suites d'Opérations et d'Accouchements, etc.*

Petites bandes pour pansement ombilical, chevilles, poignets.

2° **RENFORCÉE** (ou 3400) en largeurs 8 et 10 cm. sur 2 m. 50 de long, pour plus fortes contentions des membres.

3° **EXTRA-FORTE** (ou 3464) en largeurs 8 et 10 cm. sur 3 m. de long, pour très fortes contentions : traitement ambulatoire des **Ulcères variqueux**, Hémostases, Fractures de côtes, etc.

SANGLE-CEINTURE NÉOPLASTEX

« du Dr BONNET »,

en qualité NÉOPLASTEX EXTRA-FORTE

assure par ENROULEMENT

le traitement mécanique le plus rationnel des **PTOSES**.

Bandages { toujours propres et hygiéniques
(lessivables) ;
Économiques par leurs prix, leur
durée, leur résistance.

Toutes les bandes Néoplastex sont munies pour leur fixation d'attaches élastiques, inoxydables Néoplastex.

NÉOPLASTEX

71, fg Saint-Martin — PARIS (X^e). Tél.: Bot. 18-72.

Dépôts : tous grossistes de Paris et de province.

Détail : toutes pharmacies.

NÉOPULMINE

Affections aiguës et chroniques des voies respiratoires.

Composition :

Sulfogaiacolate de potasse	1,00
Benzoate de sodium.....	1,50
Extrait thébaïque.....	0,02
Dionine	0,02
Teinture de belladone.....	0,65
— de drosera.....	0,65
— de grindelia	0,65
Sirop de baume de tolu.....	15,00
Excipient aromatique... Q. s. p. 100 cc.	

Indications. — Trachéite, laryngite, bronchite aiguë et chronique, asthme, grippe, catarrhe, etc.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe pour les adultes et 2 à 3 cuillerées à café pour les enfants au-dessus de 6 ans.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoires RICHER
Docteur en pharmacie.

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien, PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

NÉO-RÉVULSIF COULLOUX

Révlusif liquide à base de terpènes et d'essences végétales, sans moutarde ni capsicum.

Indications. — Le Néo-Révlusif Coulloux est indiqué dans toutes les affections de l'appareil respiratoire : rhumes, bronchites, grippe, pleurésie, pneumonie.

Comme **calmant** dans : sciatiques, rhumatismes, douleurs intercostales, névralgies, lumbagos, torticolis et toutes les algies.

Mode d'emploi. — Un badigeonnage sur la poitrine et dans le dos, matin et soir, à l'aide du pinceau qui est dans la boîte. Recouvrir de coton ou d'un carré de taffetas, selon l'effet désiré.

Dans : sciatique, névralgies, rhumatismes, lumbagos, etc. Badigeonner la partie douloureuse, matin et soir, et recouvrir de coton cardé ou de flanelle.

Ne jamais l'appliquer sur muqueuses, plaies, éruptions cutanées, ni sur la figure.

Laboratoire G. COULLOUX
AUXERRE (Yonne).
(Tél. : 0-21.)

NÉO-RHÉNIIUM

du Docteur Louis FOURNIER

Principe actif. — Sel rhénio-sodique de préparation spéciale.

Indications thérapeutiques. — Traitement des néoplasmes, carcinomes, fibromes, cancers et de toutes tumeurs bénignes ou malignes.

Forme. — Ampoules de 10 cc.

Chaque ampoule contient 0 gr. 10 de perrhénate de soude chimiquement pur et indolore.

Boîte de 6 ampoules : 178 fr. 50.

Posologie. — Injection quotidienne (intraveineuse, intramusculaire ou sous-cutanée) de 10 cc. au minimum. Traitement à continuer pendant 16 à 24 jours.

Envoi de toute documentation sur demande.

Laboratoires du Néo-Rhénium,

de RIVE, Pharmacien,

82, 84, rue de Belleville — PARIS (XX^e).

(Tél. : Mén. 69-04.)

NÉO-RIODINE

$C^3 H^6 O^4 I S Na$

Composition. — Dérivé sodique à 40 p. 100 d'iode organique en solution aqueuse.

Formes. — Boîtes de 10 ampoules de 2, 3, 5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — *Action immédiate et intensive.* Aucune intolérance.

Indications. — Artério-sclérose, cardio-sclérose, myocardites chroniques, hypertension. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme. Obésité, rhumatisme chronique, maladies spécifiques et dans tous les cas où la médication iodée ou iodurée à résultats rapides est indiquée.

Doses et mode d'emploi. — Par voie buccale : 1 ampoule par jour le matin à jeun dans un peu d'eau. En injections intraveineuses ou intramusculaires de 2, 3, 5 et 10 cc. suivant les cas.

Prix : 20 fr. 90.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

NÉOSALIODE

Huile Iodo-Salolée injectable Indolore.

Composition. — Chaque ampoule de 5 cc. contient :

Iode	0,10
Salol.....	1,00
Camphre.....	0,02
Huile d'olive purifiée à l'éther : Q. S.	

Indications. — Toutes les affections rhumatismales chroniques.

Posologie. — Une ampoule tous les deux jours en injection intramusculaire profonde. Séries de 10 injections séparées par un repos d'un mois.

Prix :

La boîte de 5 ampoules : 27 fr. 50.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

NÉO-SALYL

du Dr Martinet (Ex-Sodisalyne).

Composition. — Salicylate de soude purifié.

Indications. — Spécifique du R. A. A. Antisep-tique général puissant, Cholagogue de choix, Antinévralgique fidèle.

Formes. — Dragées enrobées : 2 dragées = 1 gr. de Salicylate de Na.

Gouttes concentrées : L gouttes : 1 gr. de Salicylate de Na.

Ampoules : Intramusculaires de 10 cc. à 20 p. 100.
Intraveineuses de 10 cc. à 10 p. 100.

Posologie. — 2 à 10 gr. par jour de salicylate de Na :
Dragées, 1 heure avant les repas de préférence ;
Gouttes, pendant les repas ; Ampoules, 1 à 2 pi-
qûres par jour.

Prix. — Le flacon de 60 dragées ou 60 cc. : 19 fr. 60.
Ampoules : 21 fr. 75 la boîte de 6.

Enregistré au L. N. C. n° 759-3-4-5-6.

Laboratoires du Dr PILLET,
222, boulevard Pereire — PARIS.

NÉOSÉDYL

(Vincent)

Composition. — A base d'acétylsalicylate de calcium, salicylate neutre de calcium, Bromhydrate de Codéine, Diallylmalonylurée, Phénacétine.

Indications. — Toutes les algies, états infectieux (grippe, rhume, etc...) rhumatismes, sciatique, douleur d'origine génitale chez la femme.

Posologie. — Jusqu'à 4 ou 5 cachets par jour pour les adultes.

Avantages. — Formule complexe, dépourvue, du fait de l'absence de tout noyau benzénique, de toute toxicité pour les organes généralement sensibles aux analgésiques : cœur, foie, reins.

Présentation. — Tubes de 14 et 6 cachets.

Dépôts : Établissements BOYER,
18, rue de la Perle, Paris, et toutes Drogueries.

Échantillons :

Pharmacie H. BOUISSET

18, boulevard de Strasbourg — ALBI (Tarn).

NÉO-SETI

Solution buvable de Soufre et d'Iode.

Propriétés thérapeutiques. — L'association de Soufre et d'Iode permet le traitement *per os* de toutes les maladies relevant de la Sulfurodothérapie (A. Léri et Dedet).

Indications. — Rhumatismes Chroniques, Arthrites, Névralgies rebelles, Hypertension artérielle, Asthme et périphlébites.

Mode d'emploi. — Prendre de XX à XXX gouttes 3 fois par jour, aux repas, dans un verre d'eau pure ou sucrée.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

NÉOSOLMUTH

Solution huileuse de Campholate de Bismuth.

Indications. — Le Néosolmuth s'emploie en *injections intramusculaires* dans le traitement de la syphilis à toutes périodes. Tolérance parfaite ; élimination complète, sans dépôt huileux ou bismuthique intramusculaire. Activité supérieure à celle des sels insolubles de bismuth, action stérilisante aussi rapide que celle des arsenicaux en solution aqueuse.

Mode d'emploi. — 2 injections intramusculaires de une ampoule par semaine.

Présentation :

En boîtes de 12 ampoules de 1 ou de 2 cc. (la solution contient 4 cg. de Bismuth métal par cc.).

Prix de vente au public :

29 fr. 50 la boîte de 12 ampoules 1 cc.

36 fr. 50 la boîte de 12 ampoules 2 cc.

L. N. C. 463-3.

Laboratoire L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue A.-Briand. — LEVALLOIS (Seine).

Dépôt :

Pharmacie Générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

NÉOSPLÉNINE

Ampoules buvables.

La première synergie d'extraits désalbuminés de rate, foie, muqueuse gastrique,

Indications. — Toutes anémies, Dyspepsies, Déficiences organiques, Hémorragies, Anorexies.

Présentation. — Une ampoule buvable de 5 cc. correspond exactement à 62 gr. 50 d'organes frais sélectionnés.

Posologie et mode d'emploi. — Une ampoule buvable le matin à jeun ou avant le repas du midi et du soir dans un demi-verre de liquide. (Gazeux de préférence.)

Avantages. — Cet extrait concentré, préparé avec des organes frais non congelés ni d'importation, privé de ses albumines et lipoides, peut être donné même aux malades à qui ces organes sont interdits: Goutteux, Brightiques, Azotémiques, Entériques.

10 ampoules buvables = 22 fr. 50.

8 à 10 jours de traitement.

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoires Français de Gastro-Entérologie

71, rue Saint-Anne — PARIS (II^e).

(Richelieu 19-26.)

Dépôt général O. C. P. France et tous grossistes.

Afrique du Nord ; PÉLISSARD

ALGER et CASABLANCA.

NÉOSULFA

Solution non caustique de Sulfamide éphédrinée.
Pour usage nasal.

La Sulfamide en thérapeutique nasale locale.

Indications. — États congestifs inflammatoires et infections du Rhinopharynx et des cavités annexes, Rhinites hypertrophiques, mucopurulentes; Ethmoïdites, Adénoïdites, Catarrhes tubo-tympaniques, Coryzas.

Mode d'emploi. — Pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur nasal. Donner de 12 à 20 coups de poire dans chaque narine, 2 à 4 fois par jour et plus.

Instillations. — V à VI gouttes dans chaque narine, 2 à 4 fois par jour, en renversant la tête.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 703-3.

Laboratoire du GASTRHEMA

71, rue Saint-Blaise — PARIS (XX^e).

(Tél. : Roquette 76-24.)

NÉOSULINE

Régulateur biologique général
par hormonisation cytotatique.

Principes actifs :

1° Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des flots de Langerhans ;

2° Extrait de moelle diaphysaire d'os jeunes.

Présentation. — Comprimés de couleur rouge (60).

Posologie. — 3 comprimés 3 fois par jour, *strictement* une demi-heure avant les repas.

Indications. — Préventif et palliatif de l'anarchie cellulaire des lésions à tendance maligne, néoplasmes, etc.

Observation. — Pour les plaies et ulcérations, conjuguier les deux traitements *Néosuline* (buccal) et *Dermasuline* (local).

Prix : 49 francs.

L. N. C. 353-6.

Laboratoires THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

NÉOTHORIUM MILLOT

Traitement des MÉTRITES CHRONIQUES et des Ulcérations du Col.

Les sels de terres rares (Néodyme, Thorium, etc.) possèdent, en applications externes, de remarquables qualités antiseptiques, topiques et cicatrisantes.

Ces propriétés ont été mises à profit par divers auteurs (A. FROUIN, L. HUDELO, GUENOT, GRENET, DROUIN et MUFFAT), dans le pansement des plaies atones, et principalement dans le traitement des ulcérations du col de l'utérus et des métrites chroniques.

Les sels de terres rares réalisent la médication idéale de ces affections, en effet :

Energiquement antiseptiques et antivirulents, ils amènent rapidement le tarissement de la suppuration.

Décongestionnants et astringents, ils suppriment en quelques jours les phénomènes douloureux et fluxionnaires.

Kératoplastiques, ils stimulent énergiquement la cicatrisation des ulcérations les plus tenaces.

Dépourvus de toute toxicité et de toute causticité, ils sont absolument inoffensifs.

Incolores et inodores, leur emploi est aussi discret qu'on peut le souhaiter à un traitement de ce genre.

Soucieux de rendre pratique cette intéressante médication, les LABORATOIRES MILLOT mettent à la disposition du Corps Médical les quatre préparations suivantes à base de Néodyme et de Thorium stable d'activité pratiquement illimitée.

Ovules Néothorium Millot.

Métrites : un tous les jours, puis tous les deux jours.

Prix médical : la boîte de 6 ovules : 10 francs.

Crayons Néothorium Millot.

Endométrites : 2 à 3 par semaine.

Prix médical : la boîte de 8 crayons : 12 francs.

Comprimés Néothorium Millot.

Leucorrhée et Hygiène quotidienne : 1 ou 2 dans de l'eau chaude en irrigation.

Prix médical : la boîte de 36 comprimés : 9 francs.

Tampons Néothorium Millot.

Ulcérations du col : un tous les jours, puis tous les deux jours. Prix médical : la boîte de 6 tampons : 12 francs.

Nota. — Le prix médical ne peut être accordé qu'aux commandes adressées directement à nos Laboratoires.

Laboratoires MILLOT

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 29-54.)

NÉO-TRÉPOL

Bismuth métalloïdique pur (insoluble) en suspension dans l'eau.

Traitement de la syphilis.

Les Ampoules sont de 2 cc. Chacune contient 0 gr. 16 de Bismuth, soit 0 gr. 08 par centicube.

Posologie. — Une injection intramusculaire profonde deux fois par semaine. Commencer par au moins 5 injections de 1 cc. seulement. Enfin monter à un et demi, un trois quart, puis 2 cc.

Totaliser pour une série de 15 à 20 injections un poids total de 2 à 3 gr. de Bismuth.

Prix de la boîte de 6 ampoules : 20 francs.

Prix de la boîte de 12 ampoules : 36 francs.

Adopté par le Ministère de l'Hygiène.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 535-10.

Laboratoires TORAUDE

J. ROUX, Docteur en médecine, Pharmacien,

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92).

NÉOTROPE AGUETTANT

Plomb colloïdal électrique stable et non toxique, en ampoules injectables.

Le Plomb colloïdal dans le traitement des Cancers.

Nos recherches entreprises en 1924, avec le Professeur Duroux, nous ont fourni une documentation qui s'enrichit encore chaque jour (action du Néotrope seul ou associé au traitement par les rayons X).

Nous sommes à la disposition des médecins pour leur exposer l'état de la question et leur faciliter des expérimentations personnelles.

L'électro-colloïde de Plomb, que nous sommes seuls à savoir obtenir stable, **n'est pas toxique** et ne donne pas de choc.

Les injections sont suivies d'une hémopoïèse importante; jamais nous n'avons observé d'anémie saturnine.

Dose. — 5 cc. par jour ou 10 cc. tous les deux jours, en injection intramusculaire ou mieux intraveineuse. Après 12 injections, cesser 6 à 7 jours et reprendre la cure. Enreg. au L. N. de C. des M. sous le n° 130-1.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.)

NÉPHRACTIVE

Diurétique.

Théobromine française, très pure. Tolérance parfaite.
Activité constamment puissante.

Forme. — Cachets de 0 gr. 50. Théobromine pure ou associée (scillitique).

Indications. — Diurétique idéal des cirrhoses, Œdèmes, Cardio-rénaux, Albuminuriques, Hydropisiques, Artérioscléreux.

Dans les infections, se recommande par son action puissante, immédiate et sa tolérance.

Doses. — 2 à 4 cachets par jour.

Prix : 14 fr. 50.

Demandez échantillons à **Fabrique Vendéenne de Produits pharmaceutiques**, 10, rue Pont-aux-Chèvres, à Fontenay-le-Comte (Vendée).

Dépôt : O. C. P., 43, rue des Francs-Bourgeois, à Paris ;
Établissements Darrasse Frères, 13, rue Pavée, à Paris,
et leurs succursales.

Fabrique Vendéenne de Produits Pharmaceutiques
10, rue Pont-aux-Chèvres — FONTENAY-LE-COMTE
(Vendée).

NÉPHRYLAN

du Dr Lobry (Comprimés)

**ALBUMINURIE, OLIGURIE
COLIBACILLURIE**

et toutes affections des voies urinaires.

Composition. — Lactate de strontium, Chlorophylle pure, Poudre de rein, Cantharis (à dose homéopathique), Extraits de Lawsonia, de Chymaphyla, d'Aphloïa, d'Uva ursi.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour. Suivre l'avis du médecin.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires du Docteur LOBRY

6, rue Parrot — PARIS (XII^e.)

(Tél. : Dorian 49-31).

NEPTAL

Hydroxy-mercuri-propanolamide de l'acide ortho-carboxy-phénoxy-acétique.

Diurétique mercuriel peu toxique et d'action rapide.

Indications:

Oligurie des affections cardio-rénales,

Œdèmes, Anasarque, Ascites, Hydrothorax, Arthrites, Syphilis cardio-aortique.

Présentation: Boîte de 3 ampoules de 1 cm³ 5 (sol. à 9,2 p. 100). Boîte de 10 ampoules de 1 cm³ 5 (sol. à 3 p. 100).

Posologie et mode d'emploi. — Injection intramusculaire du contenu d'une ampoule à renouveler éventuellement après 6 à 10 jours. En cas d'épanchement, ponction préalable. S'abstenir chez les cachectiques, les fébricitants et les azotémiques à partir de 1 gr. Traitement des syphilis vasculaires par la solution à 3 p. 100.

Le Neptal peut être injecté par voie intraveineuse (Neptal à 3 %) en cas de nécessité, ainsi que dans la cavité péritonéale (Neptal à 9 % en cas d'ascite).

Prix de vente :

La boîte de 3 ampoules : 11 fr. 70.

N. à 3 p. 100. La boîte de 10 ampoules : 14 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

NERGINE

Composition. — La Nergine est une farine de germe de blé dégraissé. Le germe de blé riche en un sel de calcium et magnésium associé à un acide phospho-organique : l'acide phytinique, et en sels de fer, calcium, manganèse, réalise un produit reconstituant et reminéralisant d'une activité considérable, rapide et constante.

Indications. — Aliment qui constitue un appoint extrêmement utile dans les régimes destinés à lutter contre un état de déficience ou de fatigue de l'organisme : enfants en période de croissance ou de dentition ; surmenés, convalescents, tuberculeux, nourrices.

Mode d'emploi. — Pour les adultes : 4 à 6 fortes cuillerées à café à prendre par jour en plusieurs fois dans un peu d'eau sucrée ; pour les enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu de lait.

Produits de régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain — NANTERRE (Seine)
2 et 4, chemin Feuillat — LYON (Rhône).

NERVANTYL MILUC

Composition :

Extrait de Lotus alc.....	0,10
Teinture Aubépine 1/5.....	0,50
Extrait de Nénuphar aq.....	0,05
Extrait de Valériane Stab. alc.....	0,10
Ion Calcium.....	0,05

Excipient sans sucre : Q. S. pour une cuillerée à café ou un comprimé.

Propriétés. — Sédatif des palpitations et des troubles fonctionnels nerveux. — Sédatif du système nerveux à électricité génitale.

Indications. — Toutes dystonies du sympathique, déséquilibre nerveux, émotivité, anxiété, neurasthénie, psychasthénie, mélancolie, palpitations, tachycardie et troubles fonctionnels cardio-vasculaires, éréthisme génital, insomnies.

Présentation et prix :

Solution sans sucre : 20 fr. 40. — Comprimés : 15 fr. 30.

Posologie. — Régulateur du système nerveux : 1 ou 2 cuillerées à café ou 1 ou 2 comprimés 1/4 d'heure avant chacun des 2 principaux repas. Contre l'insomnie nerveuse : 2 à 3 cuillerées à café ou 2 à 3 comprimés le soir au coucher.

Chaque cuillerée dans un 1/4 de verre d'eau, ou mieux dans une tisane (feuilles d'oranger). Demi-dose pour enfants.

Laboratoires MILUC

L. RAGOUCY, Pharmacien.

2, rue Joseph-Bara — PARIS (VI^e). (Tél. : Odéon 02-53.

NERVOCITHINE (HÉPATISÉE)

du Docteur TISSOT
HÉPATOCITHINE

Ampoules buvables, Dragées, Sirop.
(Hémoglobine et extrait de foie.)

Méthode de Whipple complètes et actives par sels organiques.

Composition et formes. — Sirop, dragées, ampoules buvables par boîtes de 6 ou boîtes de 12.

Hémoglobine et Extrait de Foie frais activés par sels organiques.

Puissance effective supérieure à celle de ces produits pris séparément.
Tout mauvais goût supprimé.

Nervocithine non hépatisée, ampoules injectables.

Indications thérapeutiques. — Toutes les fatigues, anémies, faiblesses, diminution de résistance, anorexie, pertes de forces, convalescences, épuisements, etc. (Paludisme, maladie du foie, etc.).

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules par jour ; 1 à 2 dragées à chaque repas ou 1 à 2 cuillerées de sirop (très agréable).

Enfants : Au-dessus de 7 ans, moitié dose.

Prix : Taxe d'état comprise :

Sirop : 19 f. 20. — *Dragées* : 14 fr. 40.

Ampoules injectables non hépatisées : 14 fr.

Ampoules buvables : boîtes de 6 : 12 francs.

— — — — — de 12 : 24 francs.

Laboratoire du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. Mont. 01-91.)

NERVYL ROUSSEAU

Comprimés dragéifiés.

Médication à prédilection vago-sympathique.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Extrait mou de Cratægus	0 gr. 05
— de Gelsemium	0 gr. 005
Bromhydrate de quinine	0 gr. 02
Extrait mou de Passiflore	0 gr. 05
— de Cimicifuga	0 gr. 01
Phényléthylmalonylurée.....	0 gr. 01

Indications. — Tous déséquilibres vago-sympathiques, Insomnies, Asthme nerveux, Emotivité, Anxiété, Irritabilité, Spasme, Angor, Eréthisme cardiaque, Troubles cardiaques, Séquelles d'Hystérectomie.

Doses. — 2 à 9 comprimés par jour (doses fractionnées).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1732-1.

Laboratoires ROUSSEAU

SENS (Yonne).

NESAL

Régulateur du Système nerveux.

Composition. — 1 mesure contient :

Tartrate Borico-Potassique	
Bromuré	0,80
Phényléthylmalonylurée.....	0,03
Extrait Hydroalcoolique Sta- bil. de Belladone.....	0,01

Propriétés. — Calmant, Sédatif, Hypnotique, Anti-épileptique.

Indications. — 1° Insomnie.

2° Névroses, Neurasthénie, Hystérie, Troubles nerveux au moment des règles, du retour d'âge, de la puberté, Migraines, Céphalées, Chorée, Tremblements nerveux, Gastrites nerveuses, Hyperexcitabilité, États hypocondriaques, Névroses cardiaques, Pollakiurie, Incontinence nocturne d'urine, etc.

3° Épilepsie.

Avantages. — Produit synergique. Sédatif puissant, mais sans danger, d'une tolérance parfaite, sans accoutumance lors des cures de longue durée.

Forme. — Présentation nouvelle : Granulés à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau, additionnée d'un ou deux morceaux de sucre ou dans une infusion.

Posologie. — 1° Insomnie : 1 mesure avant le coucher. (Dans les cas rebelles, ajouter une mesure vers 18 heures.)

2° Névroses, 2 à 3 mesures par jour.

3° Épilepsie, 3 à 5 mesures par jour.

Flacon petit modèle : 50 doses environ.

Flacon grand modèle, spécial pour cures, 100 doses environ.

Produits POLYPHARMA

Concessionnaire **L. BRUN, Pharmacien**
92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

NESEPTOL BENGUÉ

Composition. — Synergie médicamenteuse à base d'Essence de Pin maritime, Huile de paraffine, Éphédrine et Menthol.

Propriétés et indications. — Astringent, Décongestionnant, Antiseptique. Rhumes de cerveau, Rhume des foins, Rhinite chronique, Pharyngite, Angine, Amygdalite, Prophylaxie des affections rhino-pharyngées.

Forme. — Flacon verre breveté, comportant un bouchon à cupule dit Neillère, à la fois verseur et obturateur. Il supprime l'emploi du compte-gouttes et de la cuiller.

Posologie. — Verser deux fois par jour, matin et soir, le contenu de la cupule dans chaque narine, en inclinant la tête.

Prix : 13 fr. 75. — L. N. C. M., n° 516-5.

Laboratoires du Docteur **BENGUÉ et Fils**,

Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trin. 85-60.)

« NESTAMINE »

Lait concentré sucré Nestlé enrichi en Vitamine D naturelle.

Composition. — Lait concentré sucré Nestlé, enrichi de 185 unités internationales de vitamine D pour 100 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique du rachitisme des nourrissons et en général de toutes les anémies infantiles.

Posologie. — *Base de calcul des rations :* Pour fournir à l'enfant 100 calories et 160 grammes d'eau par kilo de son poids et par 24 heures, diluer 30 grammes de Nestamine dans 150 grammes d'eau bouillie.

Mode d'utilisation. — Même dosage que pour le lait sucré Nestlé.

Prix : 9 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1816-1.

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} Classe

18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 64-90 à 95.)

NESTOGÈNE

Lait en poudre Nestlé.

Lait en poudre demi-gras et sucré (saccharose et maltose-dextrine) obtenu par le procédé du « brouillard ».

Composition :

Matière grasse.....	12	p. 100
Matières protéiques.....	20	—
Lactose	80	—
Maltose-dextrine	15	—
Saccharose	15	—
Cendres.....	4,7	—
Eau	3,3	—

432 calories par 100 gr.

Riche en vitamines, y compris vitamine C, de conservation parfaite, de haute valeur alimentaire et de grande digestibilité.

Indications. — Allaitement normal dès les premiers jours des nourrissons sains, des intolérants aux laits crémeux, des prématurés et des dystrophiques.

Prix : la boîte de 250 gr. : 12 francs ; 500 gr. : 22 francs.
En estagnons de 2 kg. 500 pour les cliniques et œuvres hospitalières, nous consulter.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Association de paraaminobenzoates d'éthyle et de butyle sans aucune toxicité Antiseptique, non irritant.

Propriétés. — Puissante anesthésie de surface par simple contact, pourvu que l'intégrité de la peau soit modifiée, soit accidentellement (ablation, érosion ou même distension), soit naturellement (muqueuse). Suppression rapide et inoffensive de toute douleur ou démangeaison qui provient ou est accompagnée de plaie, érosion, excoriation, inflammation, irritation, éruption, œdème ou qui a son siège sur une muqueuse.

Formes de présentation. — *Pommade au Nestosyl* (Voir à cette rubrique).

Solution huileuse au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Suppositoires au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Ovules au Nestosyl (Voir à cette rubrique).

Pommade : Prix : 15 fr. 30.

Ovules, Suppositoires. Prix : 18 francs.

Solution huileuse. 16 fr. 30.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod. PARIS.

NESTROVIT

Composition. — Association des 4 vitamines indispensables A, B₁, C, D en proportions minutieusement étudiées et parfaitement équilibrées, permettant un dosage exact, un contrôle sûr, une administration agréable et ne présentant aucun danger même à hautes doses.

Indications thérapeutiques. — Hypo- et Avitaminoses, états de dénutrition, d'inappétence, d'anorexie, déminéralisation provenant d'un régime trop uniforme ou insuffisant, rachitisme et lymphatisme, troubles de la digestion et de l'assimilation, diarrhée et constipation chroniques, grossesse, allaitement, convalescences, troubles de la croissance, cicatrisation insuffisante des plaies, retard de la formation du cal après les fractures.

Avantages. — Remplace avantageusement l'huile de foie de morue, se dose facilement et est très bien accepté par tous les estomacs, même les plus délicats. Son goût est délicieux, ce qui représente un grand avantage chez les enfants.

Posologie et mode d'emploi. — Pour nourrissons : 1 cuillerée à café par jour ; pour enfants : 2 ; pour adultes : 3, à mélanger au lait du biberon ou à la bouillie ou à prendre au moment des repas.

Enfants de plus de 4 ans et *adultes* : 2 tablettes par jour à croquer telles quelles ou à laisser fondre lentement dans la bouche.

NESTROVIT

Tablettes. Boîtes de 20 et 100.

Liquide. Flacon de 125 cm³.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-77 (*liquide*) et 504-78 (*tablettes*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

NEURALGIC CARON

Comp. — Liqueur végétale, agréable à prendre, provenant de la distillation de plantes aromatiques et vulnérables, contenant en solution une combinaison de camphre et de Diméthyléthylpyrazolone.

Un verre à liqueur contient .. 0 gr. 30

Une cuillerée à soupe contient. 0 gr. 22

de Camphorate de Pyramidon spécialement préparé au Laboratoire du Neuralgic Caron.

Propriétés. — Spécifique de la douleur, antithermique, action rapide et persistante, parfaitement toléré sans occasionner jamais d'urticaire ni de bourdonnements d'oreilles, plus actif que tous les médicaments généralement employés.

Indications. — Migraines rebelles, Névralgies, Douleurs périodiques, Grippe, Fièvre, toutes les algies.

Présentation et prix. — Le flacon de 150 cc. : 13 fr.
Inscrit au Laboratoire de Contrôle des Médicaments n° 1214-1.

Posologie. — Une à 4 cuillerées à soupe par jour.

Laboratoire E. LATOUR

Avenue de la Gare — TERRASSON (Dordogne).

NEURÈNE

Solution et Comprimés.

Bornéol soluble, principe actif inodore de la valériane associé au principe actif antispasmodique du serpolet.

Doses et mode d'emploi.

Le Neurène, Valériane + Serpolet, se présente sous deux formes :

1° La *solution*, aromatisée au parfum de pêche, agréable à prendre.

Adultes : 3 à 6 cuillerées à café, prises en 3 fois, entre les repas, dans un peu d'eau sucrée froide.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

2° Les *comprimés* : 3 à 6 comprimés par jour. Avaler chaque comprimé avec une gorgée de liquide. Ni sucer, ni croquer.

Chaque comprimé représente la valeur exacte, en principes actifs, d'une cuillerée à café de la solution.

Propriétés thérapeutiques :

Toutes les affections nerveuses.

Prix : 20 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

NEURÉOL

Présentation et composition. — Association soluble de Véronal, Antipyrine, Valériane, Cratægus, Teinture de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antispasmodique, sédatif et hypnotique.

Avantages. — En solution aqueuse, bien toléré, pas d'accoutumance, aucune action nuisible sur le cœur, les reins, la mémoire.

Posologie et mode d'emploi. — Deux cuillerées à café dans un peu d'eau sucrée, avant de dîner ou de se coucher.

Prix : 16 fr. 40.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.
CHAMBOURCY (Seine-et-Oise).

NEURETHANE

Analgésique, Antithermique

Préparé selon la formule du Professeur CABRAZ, de l'Université de Grenoble.

Composition. — Associant les *dérives non toxiques de la belladone* aux *antithermiques et analgésiques* les plus actifs solubilisés en milieu organique, le Neurethane est le plus actif et le moins dangereux des antinévralgiques et fébrifuges.

Avantages. — La solution en milieu organique évite le contact de produits chimiques directement avec les muqueuses et favorise l'activité et la rapidité de la sédation.

La possibilité de varier les doses permet de proportionner l'absorption du produit aux algies à calmer. Ainsi le Neurethane présente toute la gamme des actions sédatives depuis la plus légère (5 à 10 gouttes) jusqu'à celle des dérivés opiacés et de la morphine (80 à 100 gouttes). Autant que possible, absorber fréquemment des doses réduites.

Indications et posologie. — *Toutes les algies : dentaires, faciales, intercostales, règles douloureuses, les états fébriles, les manifestations douloureuses des états rhumatismaux, jusqu'aux phénomènes profondément inflammatoires, relèvent de son action (Ne pas dépasser 350 gouttes par 24 heures.)*

Le Neurethane s'absorbe dans un liquide alcalin : eau de Vichy, eau additionnée d'une pincée de bicarbonate de soude. A défaut, dans les boissons habituelles. XX gouttes (4 à 5 fois par jour).

NOTE. — En cas de légère cristallisation, plonger un instant le flacon dans un bain-marie tiède.

Enregistré au L. N. C. sous n° 1912-1.

Laboratoire du NEURETHANE

Claude BONCOMPAIN, pharmacien. Ex-interne des Hôpitaux de Lyon.
41, rue Emile-Augier, 41 — VALENCE (Drôme)

NEURINASE

Solution ou comprimés à base de Valériane fraîche stabilisée inodore, renforcée par une faible dose de Diéthylmalonylurée (0 gr. 15 par comprimé ou cuillerée à café de solution).

A. Dose et mode d'emploi. — 1° Sédatif : 1 cuillerée à café, ou 1 comprimé matin et soir dans de l'eau sucrée ; 2° Hypnotique : de 1 à 4 cuillerées à café ou de 1 à 4 comprimés le soir au coucher.

Les petits enfants supportent bien la NEURINASE.

Solution. — Doses maxima : Enfants de 6 mois : 2 demi-cuillerées à café par 24 heures en plusieurs fois.

B. Indications. — Régulateur du système nerveux contre Insomnies, Mélancolie, Hystérie, Troubles névropathiques de la Ménopause, Maladie de Basedow, Tics, Alcoolisme aigu et autres délires toxiques, Éréthisme cardiaque, Palpitations, Tachycardie, Excitation générale, Dermatose d'origine nerveuse, Prurit, Surmenage.

Contre-indication : Néant.

Prix : Solution : 17 francs. — Comprimés : 11 fr. 70.

Laboratoire A. GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY-PARIS.
(Tél. : Mail. 17-77.)

NEUROCALCIUM

Antispasmodique physiologique.

Sirop, par cuillerée à café :

Gluconate de Calcium	0 gr. 10
Chlorure de Calcium.....	0 gr. 10
Bromure de Calcium.....	0 gr. 05

Granulé, par cuillerée à café arasée
(3 grammes environ) :

Gluconate de Calcium	0 gr. 20
Phényléthylmalonylurée	0 gr. 01
Bromure de Calcium.....	0 gr. 10

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café et plus suivant l'âge et les indications.

Le sirop s'adresse plus particulièrement aux enfants du premier âge.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, Insomnies, Terreurs nocturnes, Convulsions, Instabilité, Troubles de la dentition, Spasmodophilie, Enurésie, Tics, Eréthisme cardiaque, etc.

**Laboratoires Biologiques
de l'ILE-DE-FRANCE**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e)

NEUROFERYL

Traitement de base des déséquilibres vago-sympathiques
et des dépressions.

Composition. — Atropine, Esérine, Fer, Phényléthylmanolylurée, Manganèse, Boldo.

Propriétés thérapeutiques. — Action synergique sur les deux systèmes par l'administration simultanée de paralysants du vague et du sympathique. Action spécifique du fer sur les troubles de la nutrition et du système nerveux, liés ou non à des symptômes anémiques.

Principales indications. — Anxiété, Obsession, Mélancolie, Neurasthénie, Spasmes et angoisses, Neuro-anémie, Psycho-anémie, Troubles endocriniens, Symptômes nerveux post-opératoires, Syndromes solaires, Troubles digestifs d'origine nerveuse, Dépressions physiques et psychiques.

Posologie. — 2 à 6 comprimés dragéifiés par jour.

Le médicament le plus complet des états nerveux, à la fois sédatif, tonique et fortifiant.

Laboratoire Henri LUZUY

Docteur en Pharmacie.

37, avenue Jean-Jaurès — AUBERVILLIERS (Seine).

NEUROFLORINE

Sédatif Nervin,

Antispasmodique, Cardiotonique.

Présentation. — Solution et Comprimés.

Composition. — Synergie phytothérapique non toxique de : Passiflore, Valériane stabilisée, Saule, Cypripedium, Cratægus.

Avantages. — Sédatif puissant inoffensif et sans accoutumance ; véritable régulateur du système nerveux. *Il redonne la stabilité.*

Inodore.

Tolérance parfaite des voies digestives, du foie et des reins. Sans dépression secondaire. Aucune contre-indication.

Indications. — Nervosisme, Etats spasmodiques et anxieux, Insomnies.

Posologie. — *Dose sédatif :* 1 à 2 cuillerées à café ou 2 à 4 comprimés à chaque repas dans un peu d'eau.

Dose hypnogène : 2 à 3 cuillerées à café ou 4 à 6 comprimés en une seule fois dans une infusion chaude, une heure avant le coucher.

Prix : 14 fr. 95. — Durée moyenne : 8 à 10 jours.

Échantillons :

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

NEUROGALÈNE

Agréable au goût.

Formule établie d'après les enseignements de M. le Dr HENRI LECLERC, ex-président de la Société de Thérapeutique.

Composition. — Extraits aqueux, *sans alcool* et *sans sucre*.

Une cuillerée à café contient :

Chélidoine majus	0 gr. 02
Cratægus oxyacantha	0 gr. 10
Lycium Europæum	0 gr. 01

Propriétés. — Sédatif de l'excitation psychique, des états de dépression et d'anxiété. Équilibrant des fonctions neuro-végétatives. Spécifique des spasmes vasculaires et des plexalgies cardiaques.

Indications. — Tachycardie, Cardialgies, Vertiges, tous états névropathiques : angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. Enfants agités, instables, troubles nerveux de la vie génitale, etc.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans un peu d'eau, avant les repas de midi et du soir.

Contre l'insomnie : 1 ou 2 cuillerées à café avant le coucher, dans un peu d'eau ou infusion.

Échantillons et littérature à la disposition de MM. les Docteurs.

**Laboratoires de Phytothérapie Expérimentale
SOPHYTA**

61, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).

J. LOISEAU, pharmacien.

(Tél. : Laborde 16-15.)

NEUROGASTRINE

Sédatif nerveux, régulateur des fonctions gastro-hépatiques, antiseptique intestinal et urinaire.

Composition. — Granulé fondant contenant par cuillerée à café :

Charb. act. . 0,50	Phényléthylmalonylurée. 0,015
Urotropine . 0,15	Bromure de Potassium . 0,10
Cit. de soude. 0,10	Extrait de Valériane... 0,025
Ext. de boldo 0,05	Extrait de Jusquiame.. 0,01

Indications. — Pesanteurs gastriques, Aérophagie, Vertiges, Migraines, Insomnies, Angor réflexe, Spasme du pylore, Dyskynésies vésiculaires, Cholécystites, Ulcères gastro-duodénaux, Fermentations, Entérites, Pyélonéphrites, Dermatoses, Prurits.

Mode d'emploi :

Adultes : Une cuillerée à café avant les principaux repas.

Enfants : Demi-dose à partir de 10 ans.

Prix : 19 fr. 50

Laboratoires E. et G. GLOMAUD

12, bd Saint-Michel- PARIS (VI^e). (Tél. : Dan.92-66.)

NEURONAL Brothier

Indications. — Angoisse, Emotivité, Vertiges, Anxiété. Spasmes divers, Mal comitial sous ses diverses formes (crises paroxystiques, équivalents). Insomnies de natures variées. Perturbations du système neuro-sympathique.

Composition :

Ethyl-phényl-malonylurée.....	0,10
Belladone totale.....	0,01
Tartrate borico-sodique.....	0,40

Pour un comprimé *pouvant se diviser en quatre*.

Bien toléré. Accoutumance nulle. La facilité de division des comprimés (division cruciale) permet de traiter les grands et les petits nerveux, de fractionner les doses et de soigner les enfants.

Posologie. — Un quart de comprimé à 4 comprimés par jour. Pour les enfants 1/4 de comprimé à un comprimé pris par quart.

Prix : 19 fr. 20 la boîte de 30 comprimés (120 doses par quart).

Laboratoires Pierre BROTHIER

Docteur en pharmacie.

20, rue Henri-Martin — VANVES-PARIS
(Tél. : Michelet 10-30.)

NEUROPHORYL

**Régulateur du Système Neuro-Végétatif
Sédatif Nervin.**

Composition. — Passiflore, Salix Alba, Adonis, Cratægus, Ballote, Intrait de valériane, Jusquiame et Phényléthylmalonylurée solubilisée par procédé spécial.

Indications. — Tous états de nervosismes, dystonies neuro-végétatives telles que : anxiété, angoisse, émotivité, insomnies, éréthisme cardiaque, aérophagie. Tous états spasmodiques.

Présentation. — Elixir de goût agréable. Flacon de 90 cc. (durée 10 jours environ). Prix : 18 fr. 75.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café par jour dans une infusion chaude.

Laboratoire du NEUROPHORYL

187, rue de Créteil — MAISONS-ALFORT (Seine).
(Tél. : Entrepôt 12-97.)

NEUROPHOS

Forme. — Gouttes

Composition :

Acide phosphorique	33 gr.
Glycérophosphate de soude, potasse, magnésie..... aa	10 —
Extrait désalbuminé de glandes orchitiques	20 —
Extrait désalbuminé de glandes interstitielles	20 —
Catalyseur d'oxydation (sel de manganèse spécial).....	2 —
Excipient glycériné et aromatisé.Q. S. p.	100 —

Indications. — Asthénie, Dépression nerveuse, Dépression physique, Fatigue, Surmenage, Dyspepsie hyposthénique, Diabète.

Doses. — XXV à LXXX gouttes (1 à 3 compte-gouttes pleins) dans un grand verre de boisson au cours de chacun des deux repas.

Prix : 20 fr. 80 le flacon pour une durée d'un mois environ.

Laboratoires DAGONNOT — CANNES

NEUROPLEXYL

**Spécifique du nervosisme
et des Troubles vago-sympathiques.**

Présentation : En tube de 50 dragées assimilables.

Composition :

Extrait mou de Jusquiame.....	0,01
— de Passiflore	0,05
— de Cratægus	0,05
Phényléthylmalonylurée	0,01

INDICATIONS :

Ce produit a trois groupes d'indications majeures :

1° **L'instabilité neuro-végétative** au cours de la *maladie de Basedow* et des *syndromes parabasedowiens*, instabilité à l'origine :

- a. Des troubles du caractère, irritabilité, instabilité, angoisse;
- b. Des troubles vaso-moteurs;
- c. Des troubles digestifs.

2° **L'instabilité du système vago-sympathique** dont le déséquilibre subit provoqué par le trouble humoral est l'agent responsable de certains *syndromes anaphylactiques* :

Rhume des foins, Asthme.

Le *Neuroplexyl* trouve là son application principale dans le *traitement de base* longtemps suivi, visant à *modifier le terrain neuro-végétatif* de ces malades.

3° Au cours de certains **syndromes cardio-vasculaires**, le *Neuroplexyl* est une aide précieuse :

- a. En tant que stabilisateur du système nerveux. Il s'oppose aux *troubles spasmodiques des hypertendus* et permet d'éviter dans une certaine mesure les à-coups paroxystiques ;
- b. Par ailleurs, il trouve une application de choix, de par la dose minime de phényléthylmalonylurée qu'il renferme, dans le traitement :

Des algies des moignons ;

Des troubles vaso-moteurs des phlébites.

POSOLOGIE :

1° Maladies de Basedow et états parabasedowiens : 4 à 6 comprimés par jour.

2° Etats anaphylactiques : 2 à 4 comprimés par jour.

3° Maladies hypertensives et éréthisme cardio-vasculaire : 3 à 6 comprimés par jour.

4° Algies des moignons, troubles vaso-moteurs et douloureux des phlébites : 12 comprimés par jour, 1 comprimé toutes les deux heures.

Aucune contre-indication.

Prix : 18 fr. 40 le tube.

LABORATOIRE DU METACUPROL

Barré, pharmacien 1^{re} classe,

5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e). — (Tél. : Jasmin 54-52.)

NEUROSINE PRUNIER

(Phospho-Glycérate de Chaux, Procédé G. Prunier.)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant du Système nerveux et tonique général.

Mode de présentation. — La « Neurosine Prunier » est présentée sous trois formes : granulé, cachets, sirop.

Indications. — Neurasthénie, Phosphaturie, Rachitisme, Débilité, Surmenage, Prétuberculose, etc.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour de granulé ; 2 à 3 cachets par jour ; 2 à 3 cuillerées à bouche par jour de sirop. Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet et chaque cuillerée à bouche de sirop contiennent 0 gr. 30 de Glycérophosphate de chaux (Procédé G. Prunier).

Le flacon ou la boîte :

Prix en France 15 fr. 45.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Anc. Maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NEUROSOLÈNE

(Comprimés enrobés)

Composition :

Pilules de Méglin.	{	Extrait de Jus-	
		quiame	0 gr. 017
		Extrait de Valé-	
		riane	0 gr. 017
		Oxyde de Zinc.	0 gr. 017
Phényl-éthyl-malonylurée ..			0 gr. 017

Indications. — Sédatif du système vago-sympathique.

Posologie :

Avaler sans croquer.

États nerveux : 2 à 4 comprimés par jour.

Insomnie : 2 à 4 comprimés le soir au coucher.

Prix : 15 fr. 60.

**LABORATOIRES D'ANALYSES
BRÉANT**

11, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 23-84.)

NEUROSTABYL

**Régulateur du système nerveux.
Exclusivement végétal.**

Le *Neurostabyl* ne comprend que des plantes dont les propriétés calmantes pour les unes, toniques et apéritives pour les autres, constituent un ensemble qui en fait un stabilisateur par excellence du système nerveux.

Indications. — Neurasthénie, Insomnie, Céphalées, Vertiges, Dépressions physiques et psychiques, Épilepsie, Hystérie, Troubles fonctionnels du cœur et d'origine nerveuse, Affaiblissement intellectuel, Inaptitude au travail.

Posologie. — XXX à XXXV gouttes 3 fois par jour, matin, midi et soir, dans un peu d'eau sucrée, au début des repas.

Pour les enfants : 1/2 dose.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1241-2.

Laboratoires GUILBERT

Boulevard Demailly — AVION (Pas-de-Calais).

NEUROSTHÉNOL

Reconstituant général, neurotonique. Résultats immédiats. Action durable.

Forme. — Gouttes.

Composition. — Extrait total de substance cérébrale, strychnine, acide orthophosphorique, glycérophosphates titrés de sodium, magnésium, calcium et manganèse.

Propriétés. — Tonique rationnel du système neuromusculaire. Modificateur actif des troubles de la nutrition et de l'élimination.

Indications. — Toutes les dépressions (physiques, nerveuses, mentales), surmenage, usure, sénilité, convalescences de maladies infectieuses.

Manifestations alcalosiques (phosphaturie, arthritisme). Auto-intoxication, scléroses.

Posologie. — *Adultes* : XV à XXX gouttes dans un grand verre de liquide, midi et soir, en mangeant.

Prix : 16 francs.

Durée de traitement d'un flacon 12 à 15 jours.

Laboratoire Marcel RICHARD
AUBENAS (Ardèche). — Tél. : 2-79.

NEUROTENSYL

Troubles fonctionnels d'origine sympathico-endocrinienne.

Présentation. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Chlorhydrate de papavérine, Extrait de gui, Sulfate de spartéine, Extrait de Cratægus, Anémone pulvérisée.

Indications. — Troubles sympathiques à la grossesse, à la ménopause, à la puberté, Angoisse, Bouffées congestives, Troubles cardio-vasculaires, Arythmie, Anxiété, Emotivité, Hyperexcitabilité, Tics et spasmes, vertiges.

Mode d'emploi. — Prendre, sans croquer, 2 à 3 comprimés avant les principaux repas.

Laboratoires J.-P. PETIT

72, boulevard Davout. — PARIS (XX°).
(Tél. : Diderot 55-01.)

NEUROVAROL

Traitement de l'Insuffisance ovarienne et de ses troubles secondaires (excitabilité nerveuse, états congestifs, etc.).

Chaque cachet contient :

1 comprimé de ..	{	Thyroïde	0 gr. 0025
		Ovaire	0 gr. 10
		Ext. valériane stabilisée Dausse...	0 gr. 10
Poudres végétales à propriétés vaso-constrictives..	{	Hydrastis	0 gr. 10
		Gossypium	0 gr. 10
		Viburnum	0 gr. 10
		Hamamelis	0 gr. 30

Posologie. — 1° Troubles par hypofonction ovarienne, 1 à 2 cachets par jour.

2° Ménopause physiologique ou opératoire, 1 à 2 cachets par jour pendant 20 jours.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 233-1.

Prix : 17 francs.

Laboratoires DOUETTEAU frères
20, Faubourg Saint-Honoré — PARIS (VIII°).

NEUSEDA

Calmant du cœur — Calmant du sympathique.

Chlorhydrate de papavérine...	0 gr. 006
Phényl-éthyl-malonylurée	0 gr. 004
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 033
Anémone pulsatile pulvérisée.	0 gr. 040
Extrait d'aubépine	0 gr. 006
Excipient	Q. S.

Pour 1 comprimé kératinisé.

Dose moyenne. — 3 à 4 comprimés par 24 heures.

Indications. — *Algies et troubles cardiaques* : 4 à 9 comprimés en 2 ou 3 fois dans un peu d'eau.

Déséquilibre vago-sympathique, anxiétés et troubles nerveux, troubles d'hypertension (vertiges), etc. : 1 comprimé toutes les 2 heures.

Spasmes, douleurs, coliques (intestinale, rénale, hépatique, ovarienne) : 1 comprimé toutes les demi-heures.

Excitations nocturnes de la blennorrhagie : 3 à 4 comprimés au repas du soir.

Prix : 22 francs.

Durée du flacon en moyenne : 10 à 12 jours.

A. LYONS, Pharmacien

30, rue Monge — PARIS (V°).

(Tél. : Odé. 73-42.)

NEUTRACÉTYL NEUTRACÉTYL CHOCOLATÉ

Composition. — 1 comprimé ou 1 tablette chocolatée = 0 gr. 60 d'Acétylsalicylate d'aluminium.

Action. — Antipyrétique, Anti-infectieux,
Antigrippal, Antirhumatismal.

*Tous les avantages de l'acide acétylsalicylique.
Aucun de ses inconvénients.*

Aucune réaction digestive (gastralgie, aigreurs).
Aucun effet secondaire tel que sueurs, adynamie, bourdonnement d'oreilles.

Action régulière et prolongée, car élimination lente.
Absorption facile : comprimés sans aucune saveur, tablettes chocolatées aimées des enfants, divisibles.

Atoxicité aux doses thérapeutiques.

Indications :

Toutes celles de l'aspirine,
Spécialement chez : enfants, *dyspeptiques*, hyperchlorhydriques, tuberculeux, etc.
Donc : grippe, fièvres (*fièvre des tuberculeux*), tous rhumatismes et algies, chorée, etc.

Posologie :

Adultes : Par dose : 1 à 3 comprimés ou tablettes chocolatées.

Par jour : 3 à 10 comprimés ou tablettes chocolatées.

<i>Enfants :</i>	1 an :	1/4 de tablette chocolatée	}	1 à 4 fois par jour.
	5 ans :	1/2 — —		
	12 ans :	3/4 ou 1 — —		

Présentation :

Neutracétyl : Étui de 12 comprimés.

Boîte de 40 comprimés.

Neutracétyl chocolaté : Boîte de 12 tablettes.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,

25, boulevard de La Tour-Maubourg-PARIS (VII^e).

(Tél. : Ségur 60-77.)

NEUTROSES-VICHY

Composition. — Chaque comprimé contient :

Sels extraits des eaux du Bassin de Vichy (Deuto-carbonates naturels) ..	0,008
Carbonate de calcium	0,27
Carbonate de bismuth	0,06
Carbonate de magnésium	0,114
Saccharose pure	0,55
Essence de menthe Mitcham	0,0001

Forme. — Comprimés de 1 gramme.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur de la fonction digestive par excellence.

Indications. — Gastralgies, Dyspepsies, Gastrites, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Hypersthénie, Fermentations acides de l'hyper et de l'hypo-Chlorhydrie.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 5 comprimés, croqués de préférence, 2 heures après chacun des repas, ou bien au moment où l'on sent un malaise.

Enfants : 2 à 3 comprimés.

Laboratoire Médico-Pharmacologique de Vichy
1 et 3, rue Lafloque — VICHY (Allier).

NÉVRALGOL BROSSARD

(Cachets).

Analgésiques. — Antithermiques — Fébrifuges.

Indications. — Grippe — Toutes Névralgies : faciales, dentaires, stomacales, oculaires, intercostales, utérines, sciatiques — Rhumatismes — Migraines — Zona.

Doses et mode d'emploi. — Un à trois cachets par 24 heures pour les adultes.

Prix : la boîte de 12 cachets, 11 fr. 50.

La boîte de 6 cachets, 6 francs.

Enreg. au Lab. Nat. Cont. sous le n° 955-1.

Laboratoire CORNAUD et BROSSARD
1, rue des Cordouan — LA ROCHELLE
(Tél. : 21-30.)

Échantillons sur demande des Docteurs.

NÉVROSAN

Sédatif du système nerveux.

Action élective sur le système *neuro-végétatif*.

Composition. — Teinture de Cratægus, Passiflore, Gentiane, Alcoolature de ballote.

Action. — L'action bien connue du Cratægus, de la Passiflore et de la Gentiane est renforcée par la Ballote (antispasmodique à action principale sur l'irritabilité neuro-végétative).

Indications. — Insomnies nerveuses, Troubles nerveux de la vie génitale, Etats spasmodiques, Troubles fonctionnels du cœur, Psychoses fonctionnelles, Incontinence d'urine, etc.

Doses. — Action sédatif : 80 à 100 gouttes le soir au coucher. Action antispasmodique : 30 à 50 gouttes 3 fois par jour avant les repas, dans un verre à vin d'eau pure ou sucrée.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

NÉVROSOL

Remède-type de l'élément douleur.

Formule :

Diméthylamino-	Carb. de chaux.	0,12
antipyrine ... 0,30	Caféine	0,03
Phénacétine.... 0,20	Chl. d'amyleine.	0,003
Chl. quinine.... 0,10		
« Aucun hypnotique. »		

Spécificité. — Ne provoquant jamais d'hyperchlorhydrie, de nausées, ni de crampes.

Névosol, particulièrement indiqué chez les malades porteurs d'ulcus gastriques ou dont l'estomac est sensible.

Indications. — Algies, céphalées, migraines, névralgies, grippe, rhumatisme, goutte, lumbago, sciaticque. Douleurs menstruelles.

Posologie. — 1 à 3 cachets par jour.

Prescription strictement médicale.

Boîte de 10 cachets : 9 fr. 20

Laboratoires ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

NÉVROSTHÉNINE FREYSSINGE

A base de Glycérophosphates cérébraux alcalins.

Forme. — Gouttes concentrées, sans sucre, chaux, alcool, arsenic ni strychnine ; XX gouttes = 0,40 cgr. de glycérophosphate composé à base de soude, de potasse et de magnésie, éléments de constitution et d'entretien des tissus nerveux.

Dose. — XV à XX gouttes à chaque repas dans le premier verre de boisson, sans interruption nécessaire jusqu'à effet obtenu.

Propriétés. — Reconstituant rationnel par suite de sa composition qui est celle même des Tissus nerveux. Aucune contre-indication.

Indications. — Neurasthénie, Paralysie générale. Dépression et Fatigue nerveuses, Surmenage, Anémie cérébrale. Vertiges, Convalescence, etc.
N. B. — Se fait également sous forme d'ampoules.

Laboratoire FREYSSINGE

6, rue Abel — PARIS.

NEVROVITAMINE 4

Nouvelle dénomination de **BEDENAL**.

Spécifique des troubles nerveux de l'enfance de l'adolescence.

Composition. — Association des éléments modificateurs du « terrain » (vitamines B. D. E., hypophyse), des éléments sédatifs nervins végétaux (salix alba, passiflora incarnata), de la phényléthyl-malonylurée, à petite dose.

Indications :

Avant 3 ans : Agitation habituelle nocturne et diurne, spasmophilie.

Après 3 ans : Onychophagie, tics, terreurs nocturnes, incontinence d'urine, onanisme, troubles de la puberté, etc.

Forme. — Granulé délicieusement parfumé.

Posologie :

Avant 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Après 3 ans : 3 cuillerées à café par jour (une cuillerée avant chacun des trois repas).

Prix : 19 fr. 05.

Laboratoire d'ACTINO-BIOLOGIE
LAURENÇON et Cie, pharmaciens
11, rue François-Giraud
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

NICOBION

VITAMINE P-P.

(LA VITAMINE DE L'ECTODERME ET DE L'ENDODERME.)

COMPOSITION :

	<i>Ampoules.</i>	<i>Comprimés.</i>
Amide nicotinique	10 cgr.	5 cgr.

PROPRIÉTÉS :

L'activité impressionnante de l'amide nicotinique dans les formes infiniment variées de l'avitaminose P-P. est établie par un grand nombre de travaux expérimentaux et cliniques (1923-1939).

La **digestion** est facilitée par le NICOBION, qui assure le fonctionnement normal de l'intestin et guérit, en quelques jours, les troubles digestifs de la pellagre.

L'**énergie** des sujets déprimés, anxieux, cénestopathes (dans l'urine desquels on trouve toujours la coproporphyrine), est stimulée par le NICOBION. La porphyrine disparaît en vingt-quatre heures.

La **croissance** est accélérée. Le NICOBION est un facteur alimentaire essentiel.

Une série de lésions **cutanées** (érythèmes, hydroas vacciniiformes) et **muqueuses** (rectite ou urétrite) cèdent au NICOBION.

Le NICOBION est dépourvu de toxicité, même après un emploi prolongé.

INDICATIONS ET POSOLOGIE :

Doses fortes : { *Pellagre, porphyries, maladie des rayons et du radium.*

40 à 80 cgr. par jour. { *Maladies digestives : stomatites, dyspepsies, colites. Affections cutanées, urétrites, vaginites.*

Doses moyennes : { *Affections mentales : syndromes dépressifs et confusionnels.*

20 à 40 cgr. par jour. { *Troubles de la croissance. Affections digestives de l'enfance.*

Doses faibles : { *Troubles de la croissance. Affections digestives de l'enfance.*

Boîtes de 6 ampoules à 10 cgr.

et flacons de 40 comprimés de 5 cgr. : 22 francs.

Laboratoires **L. LEMATTE** et **G. SOINOT**

52, rue La Bruyère, PARIS.

(Tél. : Trinité 44-31. Télégr. : Chevrematte 90, Paris.)

NIGÉRINE VINCENT

Charbon médicinal de haut pouvoir adsorbant.

Fixateur par excellence des toxines
et alcaloïdes.

Forme. — Poudre noire sans odeur ni saveur.

Indications. — Diarrhées, gastro-entérites aiguës et chroniques, intoxications d'origine gastro-intestinale, empoisonnements.

Doses. — 3 cuillerées à café par jour entre les repas dans un peu d'eau. — Dans les empoisonnements, 3 fortes cuillerées à soupe en une ou plusieurs fois.

VINCENT, pharmacien,
14, avenue Mac-Mahon — PARIS.

NITIUM

Bromure de radium suractivé enrichi en rayonnement alpha.

Crayons. — Traitement des métrites chroniques et hémorragiques (Curetage médical).

Ovules. — Vaginites, Ulcérations du col.

Pommade :

Dermatoses rebelles, plaies atones. Ulcérations torpides étendues et infectées. Ulcères variqueux rebelles.

Toutes les présentations contiennent 6 microgrammes de bromure de radium.

Soc^{té} Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

NITRARGOL

Amino-nitrate d'argent indolore
pour usage externe.

Indications. — Urologie (lavages et instillations), Gynécologie, Affections oculaires, etc., et toutes indications du Nitrate d'Argent. — S'emploie aux mêmes concentrations.

Indolore. — Ne provoque pas de ténésme. — Puissant bactéricide. — Non irritant.

Formes. — 1° Solution aqueuse à 1 p. 100 en ampoules de 6 cc.

2° En solution aqueuse à 1 p. 2 000, en flacon de 1 litre.

Posologie. — Usages externes : en instillations et lavages uréthro-vésicaux, en badigeonnages, en dermatologie, etc.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert
VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).
(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

NORGANGINE

Solution hydro-alcoolique des Glucosides totaux de Rheum officinale, des Glucosides de Matricaria camomilla avec adjonction d'acide salicylique.

Indications. — Toutes les inflammations de la bouche et du pharynx.

Action. — Utilise les propriétés antiphlogistiques remarquables des Glucosides anthraquinoniques.

Son pouvoir de pénétration lui permet d'agir non seulement en surface, mais dans la profondeur de la muqueuse. Rapidement les phénomènes inflammatoires et leur corollaire, la difficulté de la déglutition, s'atténuent pour disparaître.

Emploi. — Une demi-cuillerée à café dans un demi-verre d'eau pour bain de bouche ou gargarisme, badigeonnages ou vaporisations. De préférence toutes les demi-heures.

Prix : 20 fr. 40.

Laboratoires NORGAN

P. ALEXANDRE, Pharmacien

21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e).

NORMACOL

Mucilage Évacuant

pulissant, facile à ingérer, actif.

Possède toutes les propriétés à exiger d'un mucilage thérapeutique : pureté, pouvoir de gonflement considérable, infermentescible, inassimilable, extrême division (les grains restant indépendants même après gonflement), ingestion facile, presque agréable.

Action. — Laxatif mécanique.

Augmente le volume du contenu intestinal.

S'oppose à sa dessiccation excessive.

Rend sa surface onctueuse et glissante.

Forme. — Granulé dragéifié très menu.

Dose (moyenne). — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Différentes préparations :

Normacol (ordinaire) : avec bourdaine (constipés habituels).

Normacol pur : sans bourdaine (entéritiques, diarrhéiques).

Normacol atropiné : Voir SPASMACOL.

Normacol et Charbon : Voir CARBOMUCIL.

Prix : Petit modèle : 14 fr. 15.

Grand modèle : 45 fr. 65.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien.

21, r. de Madrid — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

NORMAFLUX

Gouttes régulatrices.

Indications. — Troubles de la circulation, Stimulant ovarien, Aménorrhée, Dysménorrhée, Règles douloureuses, Puberté et Ménopause, Hémorroïdes, Prostatite.

Formule :

Extrait fluide de Marron d'Inde ..	10 gr.
Extrait fluide d'Hamamélis	30 gr.
Extrait Rhamnus frangula	10 gr.
Extrait fluide d'Ergot.....	2 gr.
Teinture de Piscidia	10 gr.
Teinture de Viburnum.....	10 gr.
Teinture de Senecia.....	12 gr. 80
Teinture de Capsicum	0 gr. 20
Excipient	Q. S. P. 100 gr.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée à chacun des deux principaux repas ou selon prescription du médecin.

Laboratoire MALAVAL :

Ch. Malaval, pharmacien de 1^{re} classe,

8, rue Fleury — LYON-OUILLINS (Rhône).

NORMALAX

produit français

Mucilage Type.

Régulateur Intestinal.

Non irritant, non toxique, non fermentescible.

Propriétés. — Déclenche le péristaltisme par action mécanique, augmente le bol intestinal.

Pas d'accoutumance. Tolérance parfaite pour les intestins les plus délicats.

Indications. — Tous les troubles de la fonction intestinale.

Constipation, Atonie intestinale.

Doses moyennes. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas. Avaler, sans mâcher, avec un peu de liquide.

Enfants : demi-doses.

Deux préparations. — Normalax simple : mucilage pur. — Normalax au Cascara : Mucilage pur + Cascara 2 p. 100.

Présentation. — Boîte de 200 gr. : 20 francs.

Laboratoires Henri SCHÉHADÉ

9, impasse Thoréton — PARIS (XV°).

NORMATENSOL BOURET

Composition :

Tartrate borico-potassique	1 gramme.
Lactose.....	3 grammes.
Mélange sucro-édulcorant	Q. S.

Pour un paquet.

Effets physiologiques. — Par le *Bore* agit sur la thyroïde (Loeper) et libère la sécrétion interne de cette glande hypotensive (De Cyon), est diurétique et débarrasse l'organisme des produits de déchet. Par le *Potassium*, il a des effets modérateurs sur le myocarde et les fibres lisses des vaisseaux (Claude Bernard).

Indications. — Hypertension artérielle, Néphrites chroniques, Céphalées persistantes, Dermatoses dues à une insuffisance de l'épuration urinaire.

Avantages. — Pas de toxicité, pas de contre-indication, parfaitement toléré par le tube digestif.

Mode d'emploi. — 1 paquet le matin à jeun et 1 le soir en se couchant, dans 1/2 verre d'eau froide ou tiède, 12 jours par mois ou 2 périodes de 6 jours.

Prix au public : 12 fr. 75.

Pharmacie CHAUMEL

87, rue Lafayette — PARIS (IX°). (Tél. : Trud. 27.44.)

NORMOGASTRYL

Tous dyspeptiques, aérophages, petits hépatiques.

un comprimé effervescent de 2 gr.	{	Bicarbonats de soude.....	0 gr. 60
		Sulfate de soude sec.....	0 gr. 285
		Phosphate de soude sec.....	0 gr. 195
		Bromure de sodium desséché.....	0 gr. 25
Excip. citrique. Q. s. pour 1 comprimé effervescent de 2 gr.			
5 tubes de 10 comprimés de 2 gr. Prix : 18 fr. 35.			

Particularités. — Présence de bromure de Sodium sédatif de l'aérophagie et de l'état général.

En une solution agréable au goût, le dyspeptique trouve l'activation de ses digestions et la disparition de son aérophagie, s'il la prend avant le repas (apparition de citrate de soude) ; une sédation de ses brûlures et malaises s'il la prend après, dans 1/2 verre d'eau.

Emploi. — 1 comprimé avant les repas (hyposthéniques, aérophages) ou après ceux-ci (hypersthéniques) dans 1/2 verre d'eau, matin, midi et soir.

En tous lieux, avec agrément et commodité, un comprimé de Normogastryl est une dose qui réalise une solution de Bourget bromurée citratée.

Inscrit au Labor. National de Contrôle N° 412-14.

J. OLIVE — 14, rue des Minimes — PARIS

NORMOSOL

Traitement mixte (interne et externe) de l'Eczéma et des Dermatoses récidivantes.

Solution NORMOSOL.

Composition. — Extraits végétaux (Salsepareille, Noyer, Hamamélis), Arsénites mono et di-potassiques (0,06 p. 1.000) Chlorure, Sulfate et Thiosulfate de Mg, en solution bicarbonatée sodique saturée.

Pommade NORMOSOL vitaminée.

Vitamines naturelles A et D. Oxyde de Zn.

Indications. — Eczémas secs, suintants, chroniques, Dermatoses professionnelles, Psoriasis, Gourme, Impetigo.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour pendant 10 jours.

Enfants (à partir de 5 ans) : 2 cuillerées à café par jour.

Applications quotidiennes de pommade *loco dolenti*.

Présentation. — Traitement complet, comprenant 1 flacon de solution Normosol pour 10 jours de traitement et 1 tube de Pommade vitaminée Normosol.

Prix : 30 fr. 60.

Laboratoires SECLO

J.-P. Pinta, Pharmacien,

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Wagram 62-71.)

NORMUCYL

Granulé.

Produit français. Le mucilage de Plombières.

Mucilage gommeux pur enrobé, ni sucré, ni parfumé. Créé et expérimenté avec succès à Plombières-les-Bains.

Mode d'action. — Laxatif doux agissant progressivement grâce à son très grand pouvoir de gonflement. (Il absorbe 40 fois son volume d'eau.) Lubrifie la muqueuse. Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Particularité. — PUR. Ne contient ni phénolphthaléine, ni produits drastiques, ni agar-agar. Ni digestible, ni fermentescible, ni putrescible. Plus encore, il s'oppose à l'alcalinisation trop forte du contenu colique et par suite aux putréfactions intestinales.

Indications. — Constipations, fausses diarrhées.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café à chacun des deux principaux repas. Avaler sans mâcher en s'aidant d'un peu d'eau.

Prix:

La boîte renfermant 150 gr. de granulé : 18 fr. 50.

La boîte renfermant 400 gr. de granulé : 43 francs.

Cette dernière permet un traitement de 30 à 40 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1232-3.

Existe également sous forme de :

NORMUCYL BELLADONE (chaque cuillerée à café renferme cinq gouttes de teinture de Belladone). Boîte renfermant 150 gr. granulé.

NORMUCYL BOURDAINE (4 p. 100 de Bourdaine). Boîtes renfermant 150 gr. et 400 gr. granulé.

BOLDOMUCYL (Boldo, Artichaut, Charbon végétal activé, Normucyl). (*Voir à cette rubrique.*)

Laboratoires CHATRON, docteur en pharmacie,
PLOMBIERES-LES-BAINS (Vosges),
et 45, rue Cambronne — PARIS (XV°).
(Tél. : Ség. 26-79.)

NOVACÉTINE PRUNIER

(Saccharure granulé à base de Sulfosalicylate de Pipérazine, Lithine et Soude).

Antiarthritique énergique
agréable à prendre.

Indiqué contre les manifestations rhumatismales et gouteuses de l'arthritisme.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café par jour (suivant les cas et l'avis du médecin), à prendre au moment des repas, dissoutes dans un peu d'eau.

Chaque cuillerée à café contient 0 gr. 30 de sulfosalicylate composé.

Prix en France : 16 fr. 45 le flacon.

Dépositaires généraux :

CHASSAING, LE COQ et Cie

(Ancienne maison Chassaing-Prunier)

1, quai Aulagnier — ASNIÈRES (Seine).

NOVALIBUT

(ex « HALIBUT »)

Association et concentrations naturelles des vitamines A et D.

Puissant antirachitique biologiquement contrôlé.

Deux formes. — Gouttes et pilules (vanillées et chocolatées).

Composition. — Huile naturelle, non irradiée, de foie du poisson *Hippoglossus Hippoglossus* L., présentant des teneurs considérables de vitamines A et D.

Concentrations. — 1 gramme d'huile contient :

50 000 U. I. vitamine A ; 6 250 U. I. vitamine D.

Propriétés. — Puissant antirachitique par la vitamine D ; puissant anti-infectieux par la vitamine A.

Indications. — Rachitisme (traitement spécifique et prophylaxie), tous troubles de l'ossification (ostéomalacie, caries dentaires, etc.), tuberculose, pré-tuberculose, maladies infectieuses (traitement curatif et préventif), déminéralisation dans la grossesse, etc...

Posologie. — **Gouttes :** nourrissons : II à III gouttes par jour.

Enfants : IV à VI gouttes par jour (selon l'âge).

Adultes : VIII à X gouttes par jour.

Pilules. — **Enfants** (5 à 10 ans) : 2 à 3 pilules par jour.

Enfants (10-15 ans) : 3 à 4 pilules par jour.

Adultes : 5 à 6 pilules par jour.

Prix. — Gouttes et pilules : 21 fr. 20. Durée minima : 15 jours.

Enregistrés au Lab. Nat. de Contrôle sous les Nos 689-30 et 689-31.

Laboratoire DU GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

NOVALIBUT LOCAL LOCALIBUT

Antiseptique, analgésique, biologique, à base de vitamines A et D naturelles pour traitements externes et locaux.

Composition. — A base d'huile pure d'Hippoglossus Hippoglossus L à très hautes concentrations de vitamines A et D *naturellement associées*. (NOVALIBUT), *Voir ce mot.*)

Propriétés. — Anti-infectieux, analgésique, stimule la réparation des tissus (cutané-muqueux, osseux).

Indications. — Traitements externes (Plaies, Brûlures, Ulcères, Affections et Suppurations cutanées, etc.).

Traitements locaux : Otorhinolaryngologie (Rhinites, Sinusites, suites d'Otites et Mastoïdites), Ophtalmologie (Kératites, Blépharites, etc.).

Modes d'emploi. — En pansements, badigeonnages, pulvérisations, instillations.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 689-37.

Prix du flacon : 21 fr. 20.

Laboratoire du GLEFINA

348, rue Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Opéra 90-85.)

NOVAMIDE

109 M.

**Traitement des Gonococcies, Streptococcies,
Méningococcies, Colibacilloses.**

Composition. — A base de 109 M, nouveau dérivé soluble de la paraaminophénylsulfamide, très actif, sans action nocive sur le sang.

Indications. — Gonococcie et ses complications, Erysipèle, Fièvre puerpérale, Méningococcies, Colibacilloses, Affections pulmonaires.

Formes. — *Comprimés* de 0 gr. 50.

Ampoules pour injections intraveineuses.

Solution pour usage externe.

Posologie. — *Adultes* : 5 à 10 comprimés par jour.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE, près Saint-Denis(Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

NOVARGYRE

Ampoules Guillaumin
à l'oxycyanure d'hydrargyre indolores.

Composition. — Les ampoules de Novargyre contiennent : Oxycyanure d'hydrargyre : 1 cgr. ; Novocaïne : 1 cgr. ; Eau distillée : 1 cc.

Propriétés. — Solution très stable, rigoureusement dosée, neutre, indolore, ne coagulant pas les albuminoïdes, d'une action très prompte et très sûre.

Indications. — Accidents syphilitiques.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires tous les 2 jours de 1 à 2 cc. selon l'intensité de la maladie ou la susceptibilité du sujet. Faire 8 à 12 injections et laisser reposer le malade pendant 1 ou 2 semaines. Renouveler ensuite le traitement s'il est nécessaire.

Prix : 19 francs.

Laboratoires **ANDRÉ GUILLAUMIN**
13, rue du Cherche-Midi — PARIS.
(Tél. : Littré 26-92.)

NOVARSÉNOBENZOL BILLON

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100.

Donne avec l'eau distillée des solutions *neutres* injectables exclusivement par voie veineuse.

Indications :

Syphilis, Symbloses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Présentations: Ampoules unitaires de 0 g. 15, 0 g. 30, 0 g. 45, 0 g. 60, 0 g. 75, 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections intraveineuses graduées : 0 g. 15 à 0 g. 90. Applications en poudre ou collutoire comme topique local.

Le **Novarsénobenzol Billon** est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

NOVHEPAR

Indications. — Anémies, convalescences,
Traitement auxiliaire de la tuberculose,
Insuffisance hépatique.

Composition. — Extrait de foie.

Forme.—*Ampoules buvables*, 3 présentations :

Boîte de 6 ampoules de 10 cc..... 18 fr. 75.

Boîte de 18 amp. de 10 cc..... 52 fr.

Anémies, convalescences : adultes.

Boîte de 10 ampoules de 3 cc..... 16 fr. 60

Anémies, convalescences : enfants.

Insuffisance hépatique : adultes et enfants.

Posologie.

Une ampoule de 10 cc. par jour, dans de l'eau sucrée,
avant le repas.

Une ou deux ampoules de 3 cc. par jour.

L. GUÉRET, pharmacien
89, rue Martre — CLICHY (Seine).

NOVIGOL

Traitement mercuriel et ioduré.

Sous les trois formes :

Élixir (Prix : 23 fr. 50) :

Par cuillerée.....	A bouche.	A entremets.	A café.
Bi-iodure de Mercure.	0,006	0,004	0,002
Iodure de Potassium ..	0,15	0,10	0,05

Dans un véhicule liquide et aromatique spécial.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à bouche par jour aux repas.

Enfants, jusqu'à 10 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

De 10 à 18 ans : 2 à 3 cuillerées à entremets par jour.

Suppositoires (Prix : 19 fr. 20) :

Adultes : Hg. vif. 0,04 par suppositoire.

Enfants : Hg. vif. 0,015 par suppositoire.

Posologie. — 1 suppositoire le soir au coucher pendant 15 jours.

Globules (Prix : 19 fr. 20) : Sulfophénate Hg. : trente milligrammes
pour un globule.

Posologie : { *Adultes* : 4 à 6 globules par jour.
 { *Enfants* (Au-dessus de 10 ans) : 2 à 4 globules par jour.

Indications. — Cure d'imprégnation mercurielle entre les séries de
piqûres. Traitement de consolidation et d'entretien :

Hérédo-Syphilis, Dermatoses, Artério-Sclérose.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1660-1.

Laboratoire du NOVIGOL

24, rue de Lesson — ROCHEFORT-SUR-MER (Ch.-Inf.) Tél. : 1-00.

NOVISMUTH

Composition. — Sous-nitrate de bismuth pur, très léger, très couvrant, peu chargé en acide nitrique combiné.

Propriétés. — Adsorbant, sédatif, protecteur des muqueuses gastriques et intestinales.

Indications et posologie. — C'est au médecin traitant seul qu'il appartient de fixer la posologie du Novismuth.

Le Novismuth est en général constipant à faible dose et laxatif à haute dose.

Les indications que nous donnons ci-dessous sont d'ordre général :

Ulcères gastriques ou duodénaux : 3 à 10 gr., 1/2 h. avant chaque repas.

Dyspepsies, Crampes, Aérophagie : 3 à 5 gr. 3 à 4 fois par jour.

Colites, Constipation : 20 gr. par jour, pendant 20 jours le matin à jeun.

Fermentations et Infections intestinales, Entérites, Helminthiase, Colibacilliose : 3 à 5 gr. au réveil à chacun des principaux repas et le soir au coucher.

Chez les enfants, réduire les doses de moitié ou des 2/3 suivant l'âge.

En cas de selles blanches ou grisâtres, suspendre momentanément la médication.

Prix : *Novismuth pur*, 20 sachets de 10 gr. : 71 fr. 35 (Prix public.)

— — 10 — 10 gr. : 36 fr. 70 —

Novismuth kaoliné, 20 — 10 gr. : 55 fr. 05 —

— — 10 — 10 gr. : 28 fr. 50 —

Laboratoires POINTET & GIRARD,

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 03-29 ou 42-40.)

NOVO-BROL

Bouillon bromuré en tablettes,
avec addition de lupulin et de phosphates.
(Bromure non spécifié.)

Préparation et marque absolument françaises.

Le Novo-Brol est le seul produit utilisant les remarquables vertus calmantes du lupulin (extr. du houblon) associé au bromure (A.-C. Guillaume et H. Leclerc).

Les phosphates du Novo-Brol entretiennent l'élément nutritif du noyau cellulaire, toujours déphosphatisé chez les névropathes.

Indications. — Hyperexcitabilité morale ou physique, crises nerveuses et syndrome sympathicotonique.

Mode d'emploi et dose. — Ecraser les tablettes de Novo-Brol dans une tasse d'eau bouillante, pour obtenir un bouillon que l'on absorbe bien chaud, tel quel, ou mélangé à l'alimentation habituelle. Na Br chim. pur desséché 1 gr par tablette.

Dose normale : 1 à 3 tablettes par jour — Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour. — *Enfants nerveux* : 1/2 à 2 tablettes (suivant l'âge).

(Enveloppage spécial des tablettes Novo-Brol dans aluminium ou étain paraffiné — dépôt de garantie.)

Contenance : 30 tablettes. — Prix : 21 fr. 30.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Auteuil 11-86.)

NOVOCORTEX ISCOVESCO

Extrait de la partie corticale de la glande surrénale
en gouttes

Hormones antitoxiques et antiasthéniques.

Indications :

Toutes les maladies infectieuses.

Toutes les convalescences.

Toutes les asthénies.

Hypotension. Troubles végétatifs du système nerveux. Vomissements de la grossesse.

Aucune contre-indication.

Posologie générale. — XXX gouttes par jour au minimum en deux prises dans un peu d'eau quelques minutes avant les repas. Ces doses doivent être augmentées dans les cas graves afin de permettre l'administration de plus grandes quantités d'hormones corticales.

Posologie infantile. — De 2 à 6 ans, X à XX gouttes par jour : — au-dessus de 6 ans : dose normale.

Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

(Tél. Alésia 04-39).

NOVOLACTOL DAGUIN

Forme nouvelle. — Afin d'assurer un dosage rigoureux, le granulé est remplacé par des comprimés se délayant facilement dans l'eau sucrée.

Composition. — Papaine extractive ; Citrate de soude ; Benzonaphtol ; Ferments lactiques.

Dose :

Nourrissons : 2 à 3 comprimés par jour.

Enfants 15 mois à 2 ans : 3 à 4 comprimés.

Et au-dessus, 5 par jour.

Indications. — Affections gastro-intestinales et gastro-entérites des nourrissons ; éruptions cutanées. Intoxication alimentaire.

Prix : 12 fr. 75 la boîte.

Laboratoire DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

NOVOLAX

Cholagogue. Laxatif.

Rééducateur opothérapique du péristaltisme intestinal.

Composition. — Ferments lactiques du *Leben*, Extrait de glandes intestinales, Extraits biliaires, Extrait de *Combretum*, *Scaminonée*, *Évonymine*, *Jusquiame*.

Indications. — Atonie intestinale liée à une insuffisance hépatique, *Colibacillose*. (Nos ferments lactiques du *Leben* sont nettement antagonistes de la flore intestinale pathogène et en particulier du colibacille.)

Constipation habituelle par insuffisance de sécrétion glandulaire intestinale. Stase intestinale chronique. Troubles dérivant de la constipation (auto-intoxication digestive).

Rééduque l'intestin sans provoquer d'accoutumance.

Posologie. — 2 dragées le soir au potage.

(Augmenter ou diminuer les doses suivant effet produit.)

Ne contient pas de belladone.

Adjuvant des cures hydro-minérales.

Prix : 12 fr. 85.

Laboratoire des **SPÉCIALITÉS CABASSON**

A. GROS-CAVALIER, Pharmacien,
183, rue de Rome — MARSEILLE.

NOVOLUG

Composition :

Arrhénal	0,002
Hydrargyrophénoldisulfonate de soude.	0,042
(Soit 1,5 centigramme Hg métal.)	
Sirop aromatisé à la groseille framboisée. Q. S.	
pour 1 cuillerée à soupe.	

Indications :

Traitement arséno-mercuriel dissimulé.

Posologie :

Adultes	2 cuillerées à soupe	par jour.
3 à 6 ans	2 —	à café —
6 à 14 ans	3 —	à café —
14 à 20 ans	2 —	à dessert —

(A prendre aux principaux repas.)

Nourrissons : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

Observation importante :

Goût très agréable. Étiquette discrète.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

NOVOPLASMINE

1^o Dragées à noyau glutinisé

(En boîte de 3 tubes.)

Composition. — *Éléments hémapoïétiques et catalyseurs* (extraits de foie, extrait d'antré pylorique, carotène, vitamine D). — *Éléments reconstitutifs des hématies* (globinates de fer, de manganèse, de cuivre). L'action des globinates dans le traitement de l'anémie secondaire n'est plus à démontrer, depuis les travaux de G. Fontès et de L. Thivolle. Ils permettent de faire ingérer, en même temps que le fer, le manganèse et le cuivre, le groupement prosthétique de l'hémoglobine « la globine », et par suite de refaire très rapidement les hématies et l'hémoglobine que réclame tout anémique. — *Éléments nerveux* (phosphate de magnésie associé à la noix vomique et au fluorure de calcium).

Indications. — Anémies graves (Biermer et autres) ; anémies secondaires (grippe, tuberculose, cancer, paludisme, etc.) ; anémies post-hémorragiques, par hémolyse ; anémies de la puberté et de la grossesse ; anémies provoquées par certains traitements (curiethérapie, röntgenthérapie, bismuthothérapie, chrysothérapie, etc.) ; convalescences, asthénie, surmenage, etc.

Posologie. — 1^o *Adultes* : 2 à 3 le matin ou le midi, et 2 à 3 le soir aux repas. 2^o *Enfants* : 2 à 3 par jour en 2 ou 3 fois.

2^o Solution injectable (en ampoules de 1 cc.)

Présentation. — **Novoplasmine A** (solution faible pour commencer le traitement des adultes et pour les enfants). **Novoplasmine B** (exclusivement pour les adultes en cours de traitement).

Composition. — Complexe nucléino-strychniné en milieu spécial pour le traitement spécifique de la tuberculose sous toutes ses formes (pulmonaire, ganglionnaire, osseuse, génitale, abcès froids, lupus, etc.). Une seule contre-indication : la tuberculose pulmonaire en poussée évolutive.

Action. — Bactéricide, antitoxique, leucocyto-gène. L'action est quelquefois si rapide que l'on est étonné du changement radical qui survient presque brutalement : retour de l'appétit, disparition des troubles gastro-intestinaux, de la toux, de l'insomnie, des sueurs nocturnes, de l'affaiblissement nerveux, augmentation régulière du poids (jusqu'à 1 kilogramme par semaine).

Doses. — *Adultes* : de 1/2 cc. de **Novoplasmine A** à 1 cc. de **Novoplasmine B**. *Enfants* : ne se servir que de **Novoplasmine A**. Pour la technique des injections, consulter la notice placée à l'intérieur de chaque boîte. Brochure sur demande.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine.)
(Tél. : Tremblay 25-33.)

NOVOSPASMYL

Antispasmodique. Sédatif nerveux.

Composition :

Extrait de belladone titré	0,002
Extrait de jusquiame titré	0,01
Phényléthylmalonylurée.....	0,01
Extrait de cratægus stabilisé ...	0,04
Bromhydrate de quinine	0,04
pour 1 comprimé dragéifié.	

Indications. — Tous les troubles fonctionnels reconnaissant une origine spasmodique ou nerveuse.

Posologie. — De 2 à 6 comprimés par jour, à prendre au début des repas, en 2 à 3 fois, avec un peu d'eau.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 20 francs.

Laboratoires HENRI FRILLEY
94, boulevard Lefebvre — PARIS (XV^e).

NOVOTYOL

Composition. — Pommade dont la consistance crémeuse est due à un excipient spécial utilisé pour la première fois en dermatothérapie et qui sert de support aux principes actifs : Chlorophylle, Acide isolinoléique, Vitamines A et D.

Indications. — Favorise la cicatrisation, arrête la formation des exsudats, stimule l'épidermisation.

Eczémas aigus ou chroniques, brûlures, engelures, gerçures, crevasses et toutes les irritations du revêtement cutané.

Mode d'emploi. — Application en couche épaisse à renouveler toutes les 24 heures.

Présentation. — Le tube de 35 gr. : 12 fr. 25
Échantillons.

Laboratoires du D^r F. DEBAT
60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

NOVURIT

Diurétique mercuri-purique.
Suppositoires. Ampoules de 1 et 2 cc.

Composition. — Sel de sodium de l'allylamidométhoxytriméthylcyclopentane-dicarbonat hydroxy-mercure à raison de 0 gr. 10 pour 1 cc. + 0 gr. 05 de Théophylline ; 0 gr. 50 pour un suppositoire.

Action. — Diurétique très énergique, rénal et surtout tissulaire, sans toxicité aux doses indiquées. Pas d'accoutumance.

Indications. — *Tous les œdèmes, tous les épanchements.*

Sous ses deux formes : Œdèmes cardiaques, rénaux, etc. Hydrothorax, Pleurésies, Toutes ascites (cirrhotiques ou autres), Stase pulmonaire, Œdèmes postphlébitiques, Eczéma aigu, Obésité hydrophile, Hydramnios, etc.

Les suppositoires : Spécialement indiqués :

- 1° Si intraveineuses ou intramusculaires impossibles (oblitération veineuse, nodules fessiers) ;
- 2° Au début de l'insuffisance cardiaque, stade pré-œdémateux ;
- 3° Pour le maintien du régime hydrique et au lieu de l'administration *per os* de théobromine ou de théophylline ;
- 4° Dans les indications mineures : obésité hydrophile, etc.

Et en général chaque fois que l'état du malade demande une thérapeutique active et cependant prudente.

Contre-indications. — Glomérulonéphrites, Azotémie élevée, Fièvre élevée, Cachexie, Tendance au collapsus. Pas de suppositoires en cas de diarrhée, rectite, hémorroïdes, fissure anale.

Posologie :

Suppositoires : 1 tous les 3 à 7 jours, deux heures environ après défécation spontanée ou obtenue par purgation douce. Les introduire *profondément*. Pas de lavement.

Ampoules : 2 cc., intraveineuse ou intramusculaire ou dans le liquide d'épanchement (voir notice), mais jamais hypodermique. Laisser au moins 48 heures entre les injections.

Adjuvants : Tonicardiaques en cas de décompensation cardiaque. *Chlorammonie* pour renforcer la diurèse : 9 à 12 dragées par jour. (Voir annonce.)

Présentations :

5 ampoules de 1 cc. ; 5 ampoules de 2 cc. ; 5 suppositoires.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°).
 (Tél. : Ségur 60-77.)

NUCIPHOS

Agent incomparable de la suractivité cellulaire avec phagocytose exaltée entraînant une réparation des tissus, modifiant le terrain d'évolution de toutes affections microbiennes.

Injection indolore pendant et après la piqûre.

Indications. — Asthénie, Cachexies de toutes origines, Neurasthénie, Surmenage, Amaigrissement, Prétuberculose, Gripes et Convalescences, Anémie, Suite d'interventions chirurgicales, Anémie sénile.

Doses. — Le traitement est de trois séries de 10 piqûres à raison d'une ampoule tous les deux jours avec repos de dix jours entre chaque série.

Prix : 27 francs.

Durée d'une série : 20 jours.

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

NUCLÉARSAN

(Élixir)

Tonique analeptique et puissant reconstituant favorise le métabolisme organique.

Formule. — Arrhénal, Acide nucléinique, Formiate de soude, Acide Phosphorique, Glycéro de Soude et de Magnésie, Teintures de Kola et de Damiana dans excipient aromatisé.

Indications. — Prétuberculose, Asthénie, Cachexie, Dépression nerveuse, Chlorose, Convalescence, etc.

Posologie :

Adultes : 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 cuillerées à café par jour.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie

45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 484.

NUCLÉARSITOL ROBIN

Association de la combinaison nucléo-phosphatée (Voir *Nucléatol*) avec le méthylarsinate de soude.

Granulé. Comprimés. Ampoules injectables.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesures, 5 à 6 comprimés ou 1 à 2 injections hypodermiques par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Antituberculeux. Reconstituant puissant.

Indications. — Cachexie des pays chauds, fièvres paludéennes, syphilis, tuberculose, scrofule, lymphatisme.

Prix : *Granulé* : 17 fr. 55

Comprimés : 18 fr. 05. — *Ampoules*. 20 fr. 15.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon et 08-55 38-75.)

NUCLÉATOL ROBIN

Combinaison de glycérophosphates et de nucléinate de soude.

Granulé : glycérophosphate de chaux et de soude et nucléinate de soude. — **Injectable** : glycérophosphate de soude pur et nucléinate de soude.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillers-mesure de granulé aux repas ou 1 ou 2 ampoules en injection par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Exaltant de la Phagocytose, abaisse la température en quelques heures. Effets analogues à ceux des ferments métalliques ou des colloïdes.

Indications. — S'emploie dans les convalescences, les débilités, les cachexies ; provoque la défervescence dans les fièvres infectieuses, puerpérales, érysipèles, typhoïdes, etc. ; s'emploie aussi préventivement dans les opérations chirurgicales.

Prix : *Granulé* : 17 fr. 55. — *Ampoules* : 20 fr. 15.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

NUCLÉOCARDYL

Traitement des troubles cardio-vasculaires
par l'ADENOSINE

extraite de muscles d'animaux jeunes.

(Communication à l'Académie de médecine, séance du
18 janvier 1938 ; communication à la Société de
Cardiologie Royat, 17 Juillet 1938.)

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique physiologique à action directe sur l'innervation vasomotrice.

Trois formes : Ampoules injectables, gouttes, comprimés dragéifiés.

Indications. — Angor, Coronarite, Asthme cardiaque, Tachycardie, Tachyarythmie, Névroses cardiaques, Refroidissement et Asphyxie des extrémités, Claudication intermittente, Hypertension.

Posologie :

Traitement d'attaque : Ampoules : 1 ou 2 ampoules par jour en injection sous-cutanée ou intramusculaire.
Gouttes : 2, 4 ou 6 prises par jour. (chaque prise est de LX gouttes).

Traitement d'entretien : 2, 4 ou 6 comprimés par jour.

Laboratoire A. DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. 91-609.)

NUCLERGOL

Granulé à base de Manganèse, Phytines, Lipides spléniques, Carotènes (Vitamines A), Oxalate de fer.

Reconstituant général des forces physiques et du système nerveux, Chlorose, Asthénie, Convalescence, Dénutrition, Troubles de la croissance.

Posologie. — *Adultes :* 1 cuillerée à dessert au début de chaque repas.

Enfants : à partir de huit ans, une cuillerée à café.

Prix : 20 francs.

Laboratoire BIOSEDRA

E. Estrader, Docteur en pharmacie

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

NUJOL

Huile de paraffine.

Description. — Le NUJOL est une huile de vaseline parfaite, incolore, inodore et sans goût, possédant un degré exactement défini de viscosité et de densité.

CRÈME DE NUJOL

Émulsion.

Description. — La Crème de Nujol est une émulsion d'un blanc très pur et d'un goût agréable, à base de Nujol, dont elle possède les propriétés thérapeutiques. Ne contient pas de sucre ; convient aux diabétiques. Est recommandé pour les enfants et toute personne acceptant difficilement l'huile de paraffine pure.

Indications. — Traitement de la constipation.

Dépôt Général :

Société Générale

d'Applications Thérapeutiques.

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

NUSYL

Suppositoires Mialhe, pommade Mialhe.

Composition. — Iodobismuthate de métadioxybenzène et borate de zinc. Existe sous deux formes : suppositoires et pommade.

Indications. — Cure rationnelle des quatre éléments du syndrome hémorroïdaire : congestion, douleur, constipation, atonie cellulaire. Ne renfermant pas d'anesthésiques locaux. *Nusyl* : biogénétique et cicatrisant, constitue le traitement spécifique des hémorroïdes et est également indiqué dans toutes les congestions pelviennes et notamment le prostatisme.

Mode d'emploi :

Traitement d'attaque des cas aigus : un suppositoire matin et soir pouvant être remplacé par une application de pommade.

Traitement d'entretien des cas chroniques : un suppositoire (ou une application de pommade) soit tous les soirs, soit 3 fois par semaine.

N. B. — Chaque suppositoire est à garder longtemps : 12 heures si possible.

Prix :

Suppositoires (la boîte de 12) : 15 fr. 90.

Pommade (le tube de 25 gr.) : 15 fr. 90.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments, n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS.

(Tél. : Richelieu 35-10.)

NUTROMALT

Sucre nutritif pour le biberon
d'après la formule de Soxhlet.

Composition. — Maltose 30 %, Dextrines 67 %, Chlorure de Sodium 1 %, H²O 2 %.
Sucre nutritif ne fermentant pas dans l'intestin. Complément indispensable du lait de vache dans l'allaitement artificiel.

Forme. — Poudre.

Indications. — Maternise le lait de vache, s'emploie contre les selles acides et diarrhéiques des nourrissons et des enfants.

Mode d'emploi. — Une demi-cuillerée à café par biberon (soit 5 grammes environ) pendant les 3 premières semaines, puis une cuillerée à café par biberon (soit 10 grammes environ). Durée de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

NUXEOL

Élixir physiologique complet.

Tonique, reconstituant, reminéralisant, digestif.

Composition :

Juglan Regia, ext. mou...	0,15	Chl. manganèse.....	0,10
Noix de kola, ext. mou...	0,10	Ac. phosphorique off....	0,05
Ec. oranges am., ext. mou.	0,10	Phosphate disodique.....	0,05
Noix vomique, ext. sec ...	0,007	Excip. généreux aromatisé	100 cc.

Indications. — Anémie, Débilité, Convalescence, Prétuberculose, Tuberculose, Neurasthénie, Inappétence, Dépression nerveuse, Surmenage physique et intellectuel, Tous États asthéniques et atoniques, Maladies de la nutrition.

Ne contient pas d'arsenic.

Très bien toléré par les hépatiques et les malades du poumon.

Forme. — Élixir très agréable au goût, 450 cc. environ ; 19 fr. 80.

Posologie. — 2 à 3 fois par jour, prendre avant les repas.

Adultes : une cuillerée à soupe.

Enfants : au-dessus de 10 ans, 1 cuillerée à entremets ;
de 6 à 10 ans, 1 cuillerée à café.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS,
47, rue Maleret — BORDEAUX.

OBSOR**(Dragées.)**

Présentation. — En étui de 50 dragées.
(19 fr. 85)

Principes actifs. — Iodure d'amidon,
Glandes thyroïdes desséchées, Extrait de
fucus, Extrait de Bourdaine.

Indications. — Obésité, disparition de la
graisse, augmentation des forces sans
modification de régime.

Mode d'emploi. — Prendre 2 dragées au
milieu des deux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-18.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

OCRÉINE GRÉMY

Traitement des insuffisances ovariennes de la puberté
à la ménopause.

Formule:

Chaque pilule correspond à 0 gr. 20 de corps jaune frais.
Existe sous 3 formes pharmaceutiques.

Pilules : 4 à 6 par jour.

Gouttes : XXX à L par jour dans un peu d'eau.

Ampoules : 1 injection intramusculaire tous les 2 jours
pendant la période du traitement.

Indications:

Règles rares, peu abondantes, douloureuses, boursées de
chaleur, migraine, obésité, rhumatisme de la ménopau-
se, acrocyanose et toutes les manifestations de
l'insuffisance ovarienne.

Permet de réaliser, en association avec la **Follestrine
Grémy** (voir à ce nom), le cycle physiologique
ovarien.

Prix : *Pilules-Gouttes* : 22 fr. 45. — *Ampoules* : 28 fr. 05.

Enregistré L. N. C. N° 608-5-6-66.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 48-43.)

OCTENSANOL

Solution à 1 p. 10.000 d'alcool octylique primaire.

Indications. — Hypertension artérielle et ses conséquences.

Formes thérapeutiques. — Ampoules de 10 cc. pour injections intraveineuses.

Boîte de 12 ampoules : 32 francs au public.

Perles glutinisées, Boîte de 42 : 19 fr. 20 au public.

Posologie. — 1 ampoule tous les deux jours (série de 12). 3 à 6 perles par jour.

Bibliographie. — Clerc, R. Paris, J. Stern, *P. M.*, 25 nov. 33 ; F. Pezzangora, *C. R. Soc. Biol.* 1935, 119, 1931 ; M. Loeper, Mougeot et Aubertot, *Presse méd.*, 1934, n° 42, 857.

Laboratoires Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 67-73, 67-74.)

OCULASE

Forme. — Solution.

Composition. — Acide borique, antipyrine, sulfate de zinc en solution tamponnée, rigoureusement isotonique et neutre aux larmes.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Soins prophylactiques et curatifs de toutes les infections oculaires primitives ou secondaires : conjonctivites, orgelets, blépharites.

Mode d'emploi. — S'utilise en tamponnements ou en bain d'œil tièdes, renouvelés

Prix :

Le flacon de 125 cc	8 fr. 15
— 250 cc	14 fr. 30

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

ODARSOL

Opiat dentifrice antispérochétosique, contenant 0 gr. 50 p. 100 de Sulfo-Tréparséna, parfumé aux essences de menthe et de badiane.

Indications. — Préventif et curatif des infections buccales : Pyorrhée alvéolaire, polyarthrite alvéolo-dentaire, ulcération buccales, amygdalites, angines de Vincent.

Peut être utilisé journellement pour l'hygiène dentaire.

Forme. — Tube de 31 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

ŒNOPHOS

*Acides hydroéthylène-phosphorique.
Reminéralisation phospho-dolomitique.*

Méthode des Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Formes. — Elixir, granulé, gouttes.

Propriétés thérapeutiques. — Neurotonique, reconstituant énergétique : *fixateur électif* de la magnésie et de la chaux (Voir fiche DOLOMA). Médication phosphorique rationnelle.

Indications. — Phosphaturie, neurasthénie, psychasthénies, surmenages physique et nerveux, cancer, tuberculose.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : A chaque repas : 1 cuill. à soupe d'Elixir ou 2 cuill. à café de Granulé ou LX gouttes dans un demi-verre d'eau ou de vin léger sucré. *Enfants* : réduire les doses suivant l'âge. Pour la cure reminéralisante. voir « DOLOMA ».

Prix et n° Enregistrement L. N. C. M.

La boîte granulé Œnophos. 18 fr. 70 — L. N. C. M. 216-7.
Le flacon gouttes — 15 fr. 60 — L. N. C. M. 216-8.
— élixir — 20 fr. 80 — L. N. C. M. 216-6.

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — DIJON.

(Tél. : 16-42.)

OÉRÉLIODE

Iode de l'Otorhinolaryngologiste.

La plus active et la mieux tolérée des préparations iodées.

Solution huileuse d'Iode d'absolue pureté, *non combiné*, entièrement diffusible à froid.

Huile *violette*, neutre, indolore, non irritante.

Indications. — Rhinites, Affections catarrhales et inflammatoires du nez, Infections et congestions des muqueuses naso-pharyngées, du larynx, des amygdales, otites, otites mycosiques.

Echantillons gratuits sur demande.

Le flacon de 50 cc. Prix : 14 francs.

— 30 — — 10 fr. 75.

Laboratoire BOUVOT

AUVERS-SUR-OISE (S.-et-O.).

(Tél. : Auvers 49.)

ŒSTROBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré
associé à une solution de Folliculine
titrée physiologiquement.

Boîte de 15 tablettes.

1 tablette { NaBr..... 1 gramme.
contient : { Folliculine 100 unités internationales.

Mode d'emploi et doses. — 1 à 2 tablettes 2 fois par jour : matin et soir.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait dissoudre 1 ou 2 tablettes ; on prépare ainsi un bouillon savoureux qu'il convient d'absorber le plus chaud possible.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles nerveux accompagnant une dysfonction ovarienne : Aménorrhée, Dysménorrhée et surtout Ménopause.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-62.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°). (Tél. : Archives 91-10.

ŒSTROGLANDOL « ROCHE »

Hormone œstrogène titrée biologiquement

Une ampoule ou 1 comprimé ou 1 gramme d'onguent
= 1.000 unités internationales.

Indications. — Tous les troubles dus à une insuffisance ovarienne. Troubles de la Puberté et de la Ménopause, Acné, Prurit vulvaire, Céphalée, Vertiges, Dysménorrhée, Aménorrhée, Hypoplasie génitale, Retard des règles, Ménopause précoce.

Doses et modes d'emploi :

Comprimés (flacon de 20) : 1 à 2 par jour.

Ampoules (boîte de 6) : 1 à 2 par jour, deux à trois fois par semaine.

Onguent (tube de 20 g) : en applications suivies d'un léger massage matin et soir.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous les n^{os} 504-73 (*ampoules*), 504-74 (*comprimés*), 504-75 (*onguent*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 91-10.)

OKAMINE Simple

Formule N° 2 du Dr Dani Hervouet :

Glycocolle.....	2 gr. 50
Méthylglycocolle	1 gr. 50
Monométhyl N Leucine gauche.....	1 gr.
Solvant isotonique.....	Q. S. p. 100 cc.
Boîte de 10 ampoules de 2 cc.	

Mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée tous les deux jours.

Indications. — Toutes tuberculoses courantes. Toute déficience organique. Supprime les vomissements gravidiques.

OKAMINE Dragées

Glycocolle, 4 gr. ; Sarcosine, 0 gr. 40 ; Leucine, 0 gr. 40 pour un flacon de 40 dragées.

Mode d'emploi. — 2 à 4 avant le petit déjeuner.

Indications. — Prolongent et renforcent les ampoules. Toute affection broncho-pulmonaire.

Enfants adénopathiques.

OKAMINE Cystéinée

Formule N° 3 du Dr Dani Hervouet.

Boîte de 20 ampoules pour 10 injections.

10 ampoules N° 1 de 2 cc.

Okamine et solvant spécial.

10 ampoules N° 2 de 1 cc.

Cystéine et solvant spécial.

Le mélange des deux ampoules dans la seringue est isotonique.

Mode d'emploi. — 1 ampoule tous les deux jours en injection sous-cutanée. — Plus puissant que l'Okamine simple.

Indications. — Tuberculoses graves ou rebelles pour traitement tenace.

Laboratoire Contrôle 8847 $\begin{matrix} \diagup 1 \\ \diagdown 2 \\ \diagup 3 \end{matrix}$

Pierre BUGEARD, pharmacien,
13, rue Pavée — PARIS (Tél. : Tur. 84-40.)
Dépôt général : DARRASSE Frères.

OLBIA

Solution huileuse de Bismuth.

(Dicamphocarbonate de Bismuth.)

Spécifique de la Syphilis.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes, Spirilloses, Spirochètoses.

Formes :

1^o Ampoules de 2 cc. pour injections intramusculaires indolores ;

2^o Ampoules de 1 cc. pour injections intramusculaires indolores.

Posologie :

Adultes : Injecter dans la région fessière une ampoule de 2 cc. tous les 4 jours.

Enfants : Injecter dans la région fessière une ampoule de 1 cc. tous les 4 jours.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé à la Faculté de Médecine,
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert

VILLENEUVE-LA-GARENNE

près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

OLCALAN

Composition :

Borate de soude, Huile d'Olive stérilisée,
Eau de chaux, Lanoline.

Trois présentations : OLCALAN SIMPLE,
OLCALAN SALICYLIQUE, OLCALAN
RÉSORCINE.

Tubes de pommade.

A employer dans toutes les irritations de
l'épiderme : Eczémas, Brûlures, Rougeurs
des Nouveau-Nés, Prurit, etc...

Le tube : 6 fr. 25.

Enreg. au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX (Gironde).

Tél. : 840-78

OLEGEL

Association d'huiles essentielles rigoureusement pures, présentées en gelée transparente, grâce à un procédé spécial, sans adjonction d'aucun mucilage.

Formule :

Pélargonium odorantissimum.....	5
Rosmarinus officinalis	5
Cupressus sempervirens.....	2,5
Thymus vulgaris	2,50
Lavandula officinalis	10
Excipient neutre	75

Pour 100 de gelée.

Indications cutanées. — Brûlures, plaies septiques, plaies atones, ulcères variqueux, furoncles et toutes pyodermites.

Indications gynécologiques. — Métrites, salpingites, pertes et toutes affections gynécologiques.

A employer, soit pure, soit en dilution aqueuse, l'OLEGEL formant instantanément au contact de l'eau une solution opalescente stable.

Tube de 50 grammes.

a) Gelée. — b) Ovules. — Boîte de 6 ovules.

L. CHAUVIN, Pharmacien,

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

OLÉOCHRYSINE LUMIÈRE

Chrysothérapie et Caloitérapie par Injections de suspension huileuse.

L'Oléochrysine Lumière est une suspension dans l'huile d'auro-thiopropanol sulfonate de calcium, teneur en or 35 p. 100, taux calcique 4.52 p. 100.

L'Oléochrysine Lumière présente le considérable avantage de n'exercer aucune agression brutale à l'égard du rein et autres émonctoires ou organe, le calcium accroît encore la tolérance.

Une injection intra musculaire tous les 4 ou 5 jours réalise une imprégnation continue. Absorption lente, régulière, acquise totalement en un temps variant entre 96 et 120 heures.

L'absorption à doses filées se trouve ainsi réalisée, d'où une fixation organique de l'or plus élevée que lorsque le sel est brutalement absorbé.

Tuberculose sous ses diverses formes et, au premier chef, Tuberculose pulmonaire, sans nulle restriction imposée par les caractères évolutifs de l'affection.

Dans les Tuberculoses dites externes : cutanées, osseuses, laryngées, ganglionnaires, articulaires, des résultats satisfaisants sont atteints par l'usage de l'**Oléochrysine Lumière**. Les localisations rénales sont elles-mêmes favorablement influencées par l'**Oléochrysine Lumière** qui doit alors être administrée avec précaution sous le contrôle d'une surveillance minutieuse.

Rhumatismes et, plus particulièrement, la grande polyarthrite chronique infectieuse. Non seulement un rhumatisme chronique infectieux traité par l'**Oléochrysine Lumière** cesse d'évoluer, mais encore des malades immobilisés depuis des années par des nouures articulaires extrêmement douloureuses ont récupéré intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'**Oléochrysine Lumière** avec des résultats inégalés dans de telles affections par tout autre traitement chimique.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse (l'or franchit la barrière méningée), de plus l'**Oléochrysine Lumière** semble donner quelques résultats dans la sclérose multiloculaire considérée comme échappant aux ressources de la thérapeutique.

L'Oléochrysine Lumière est livrée en ampoules de 0 gr. 10, 0 gr. 20, 0 gr. 30.

Mode d'emploi :

Tuberculose. — Début 0 gr. 10, puis 0 gr. 20 et 0 gr. 30. 1 injection tous les 5 jours. Traitement de 10 à 40 injections.

Rhumatisme. — Mêmes directives, mais progression lente des doses. Récidiver 2, 3 ou 4 fois les dosages 0 gr. 10 et 0 gr. 20, ensuite 0 gr. 30.

Laboratoires LUMIÈRE
45, rue Villon — LYON.

OLÉOCHRYSOS LUMIÈRE

(CH₂ S Au CHO₂ SO₃ Sr)

Suspension dans l'huile

d'Aurothiopropanol-sulfonate de strontium

Teneur or 47,9 % — Taux du strontium 10,6 %

L'Oléochrysos Lumière est un sel hydrosoluble, à hydrosolubilité restreinte (0,9%) de sel d'or et de strontium en combinaison sulfo-organique; cette combinaison est de celles qui permettent d'atteindre au plus haut index thérapeutique, par rapport au poids d'Or administré.

L'Oléochrysos Lumière est totalement absorbé, lentement et avec régularité; l'élimination sous de faibles concentrations n'est pas irritante pour les émonctoires, car jamais elle ne leur impose une quantité massive de déchets.

Tuberculose — sous ses diverses formes — succès particulièrement tangible à l'égard des poussées évolutives, mais les Tuberculoses chroniques avec lésions anciennes n'échappent pas à l'indication de l'Oléochrysos Lumière.

Rhumatismes. — et tout particulièrement la grande polyarthrite chronique infectieuse que l'Oléochrysos Lumière arrête dans son évolution et permet aux malades de récupérer intégralement ou presque leur faculté de mouvement.

Affections des yeux qui s'apparentent au Rhumatisme, telle l'Irido-cyclite.

Maladies infectieuses diverses : Lèpre, Syphilis.

Dermatoses : Lupus érythémateux, Tuberculides, Psoriasis, sont traités avec l'Oléochrysos Lumière.

La maladie de Nicolas-Favre est justiciable de l'Oléochrysos Lumière.

Affections du système nerveux : Prévention et traitement de la Syphilis nerveuse. L'or franchit la barrière méningée.

L'Oléochrysos Lumière est livré en ampoules dont le dosage est indiqué en Or élément.

Les dosages sont 25 milligrammes, 50 milligrammes et 100 milligrammes d'Or-métal. Le but essentiel étant d'administrer de l'or, il est logique de fixer les doses en Or-métal.

Le rythme moyen des injections est bi-hebdomadaire ou hebdomadaire

Mode d'emploi :

Pour tâter les susceptibilités individuelles

et chez les sujets jeunes : débiter par 25 milligrammes d'Or.

Cette dose permet l'Or aux hypersensibles.

	Début	Doses ultérieures	Rythme	Nombre d'injections
Tuberculose	50	100	Chaque	De dix
Lèpre	milligr.	milligr.	7 ou 10	à
Spirillose	d'Or	d'Or	jours	quarante

Après une série, cessation de 1 à 2 mois, puis reprise du traitement

Rhumatisme.....
Sclérose multiloculaire.....
Psoriasis.....
Lupus érythémateux....
Syphilis.....

} Mêmes directives générales, mais progression lente des doses; récidiver 2 ou 3 ou 4. et même 5 fois les dosages.

Alternier la thérapeutique par l'arsenic, le mercure, le bismuth, l'antimoine, avec des séries d'Oléochrysos Lumière, dont l'intérêt essentiel est dans la prévention des accidents nerveux et, le cas échéant, la cure de ceux-ci.

L'index toxique de l'Oléochrysos Lumière est inférieur à celui de l'Oléochrysin et à celui de l'Allochrysin, d'où possibilité d'user de doses plus élevées qu'avec l'un et l'autre de ces produits.

Pas de contre-indications formelles. Cependant il est préférable de s'abstenir chez les sujets présentant un trouble profond, des constantes hématiques, une albuminurie importante, une diarrhée persistante.

Laboratoires LUMIERE

43, rue Villon — LYON

OLÉOCIDASE

ACIDE OLÉIQUE PAUL THIBAUT

Capsules dosées à 0 gr. 50 d'Acide Oléique pur, extrait de l'huile d'olive, procédé Paul Thibault, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Sous un volume très restreint, l'Acide Oléique Paul Thibault réalise, avec effet rapide et constant, l'action toujours très lente et souvent incertaine attribuée à l'huile d'olive dans la désagrégation des calculs de cholestérine. La plus sûre méthode de drainage biliaire.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholécystites lithiasiques, Cholestérinémie, Ictères, Crises de Coliques hépatiques, Evacuation des calculs de Cholestérine par désagrégation.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir dans un peu d'eau minérale bicarbonatée ou chlorurée sodique tiède (Vichy, Châtel-Guyon, Vals, etc.).

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Nota. — Pour éviter toutes confusions, prescrire toujours : capsules d'Oléocidase Paul Thibault.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 218-9.

Voir également : OLÉOSODINE.

OLÉOFORMINE CORBIÈRE

Comprimés glutinisés et dragéifiés.

Composition :

Acide cholique.....	0,05
Oléate de soude anhydre	0,20
Hexaméthylène tétramine.....	0,25

Indications. — Lithiase biliaire, Coliques hépatiques, Cholécystite, Ictères, Cirrhoses, Insuffisance hépatique, Cholémie familiale.

Mode d'emploi. — Deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chacun des deux principaux repas, pendant 20 jours.

Présentation. — En boîtes aluminium de 40 comprimés. Traitement pour 10 jours. Prix : 14 francs.

Laboratoire pharmaceutique

CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

OLÉO-MEL

« LE LAXATIF DE RÉGIME »

Formule. — Huile de Paraffine extra-neutre à viscosité maxima et spéc. raffinée p. l'usage interne. } P. E.
Miel surfin sélectionné.

Indications. — L'association de ces deux substances réalise une synergie parfaite qui relève, pour le traitement de la Constipation et des Affections gastro-intestinales, de toutes les indications et de la posologie même de l'huile de paraffine. **Action mécanique. Innocuité absolue.**

Préparation. — L'Oléo-Mel, préparé par un procédé spécial, se présente sous forme d'une gelée homogène, absolument stable et inaltérable : il conserve tout l'arome et toute la saveur du miel, ce qui en fait une médication des plus agréables et des plus faciles à prendre.

Laxatif idéal des Enfants et des personnes délicates.

Prix : 17 fr. et 28 fr. (taxe comprise).

Durée moyenne : 8 et 15 jours de traitement.

Laboratoire DELFOUR. Docteur en Pharmacie.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

à **POUILLON** (Landes) — (Tél. : 9.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 246-1.

OLÉOPHÉDRINE BÉRAL

Huile d'Éphédra à 1 et 2 p. 100 d'éphédrine naturelle, à alcalinité atténuée sans anal-gésique, sans oléate.

La plus active et la moins irritante des huiles éphédrinées. Pour **pulvérisations** nasales contre rhinites, sinusites, rhume des foins, coryzas, surdités catarrhales, céphalées sinusiennes, etc...

Utiliser de préférence l'éphédriseur BÉRAL, pulvérisateur de poche, étui métal : 26 francs.

Prescrire: OLÉOPHÉDRINE BÉRAL.

Un flacon : 12 fr. 50 et 15 fr. 60

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS.

OLÉO-SANOCRYSINE

de Mollgaard

Thiosulfate d'or et de sodium.

En suspension huileuse.

Indications et posologie de la « Sanocrysine aqueuse »
(Voir celle-ci).

Forme :

Suspension.	1 %	5 %	10 %	Sanocrysine.
Amp. à 2 cc.	2 ctg.	10 ctg.	20 ctg.	,
— 3 cc.	3 —	15 —	30 —	,
— 5 cc.	5 —	25 —	50 —	,

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires.
Avant l'emploi, agiter l'ampoule jusqu'à ce que la suspension soit homogène.

Valentin Aage MOLLER,

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX.

Tél. : 80-989.

Dépositaire pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX

OLÉOSODINE

Oléate de soude **Paul Thibault.**

Composition. — Capsules dosées à 0 gr. 30 d'oléate de soude anhydre, chimiquement pur.

Propriétés. — Produit parfaitement toléré par les estomacs digérant mal les corps gras, exaltation de la sécrétion biliaire, désagrégation et expulsion des calculs de cholestérine, sédation des phénomènes douloureux.

Indications. — Lithiase biliaire, Cholélithiasie, Cholestérinémie, Coliques hépatiques.

Posologie. — 2 à 3 capsules le matin à jeun, 2 à 3 capsules dans le milieu de la journée et, si besoin, 2 à 3 capsules le soir, dans un peu d'eau minérale tiède (Vichy, Vals, Châtel-Guyon).

Prix : 16 fr. pour 6 à 8 jours de traitement environ.

Établissements SOUDAN

48, rue l'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

(Voir également **OLÉOCIDASE.**

OLÉOVULES

Ovules gynécologiques de formule entièrement originale.

Acide picrosalique : Nouveau succédané de l'Acide Picrique dépourvu de ses inconvénients (ne colore pas les téguments, ne détermine, même à haute dose longtemps continuée, aucun accident toxique) (M. Marchand, *Thèse Paris*, 1935).

Rubacrine ou Rouge d'Acridine : puissant antiseptique, non irritant (S. Lurié, *Thèse Paris*, 1934).

Sulfostérol : Composé organique soufré remplaçant l'Ichtyol (inodore et ne tachant pas).

Avantages. — Efficacité. Propreté. *Fusion parfaite.*

Indications. — Infections de toute nature des voies génitales inférieures (Blennorrhagie après la phase aiguë, Infections streptococciques post-puerpérales, etc.) et principalement : Métrites, Cervicites, Ulcérations et érosions du col, Vaginites.

Posologie. — 2 à 3 ovules par semaine.

Présentation. — Boîte de 6 ovules : 17 fr. 25.

Littérature. — Thèses de G. Donet et de M. Marchand ; Communication à la Société de Gynécologie ; travaux de MM. Chéron, Vigneron, Thijery, Fuchs, Fayot, de Manet, etc.

Laboratoires SFÉAT

5, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine). (Tél. Plaine 13-31.)

OLIPAN

« Tout l'Olivier ».

Composition. — Glucosides et principes actifs totaux de l'olivier.

Indications. — Hypertension, urémie.

Les indications de l'Olipan s'étendent jusqu'aux cardio-rénaux ; son action favorise la diurèse, fait régresser rapidement les œdèmes et, résultat tout à fait remarquable, diminue le taux d'urée sanguine.

Son action se prolonge même après arrêt du traitement.

Doses et mode d'emploi. — Le matin, à jeun XX à XXV gouttes. Le soir, quelque temps avant le dîner : XX à XXV gouttes également.

A prendre dans un peu d'eau sucrée ou non, ou dans une infusion (queues de cerises, camomille, verveine, etc.,)

Médication phytothérapique sans aucune toxicité pouvant être poursuivie un long temps avec de brèves interruptions, sans aucun inconvénient.

Le flacon de 30 cc. : 25 francs.

Inscr. au L. N. C. M. sous le n° 536-27.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. Auteuil 11-86.)

OLIPHÉDROL

Antisepsie des voies respiratoires, sans Menthol, sans Cacaïne.

Formule : Ess. Vég. Ant. 4 + Camphre 1 + Ephédrine nat. 0,5 + Stovalne 0,1 + Huile végétale neutre purifiée.

Indications. — Coryza, Rhume des Foies, Rhinites, Sinusites, Pré-servation des maladies contagieuses : Grippe. Rougeole.

Propriétés. Avantages. — Vaso-constricteur, Sédatif, Antiseptique Sans menthol. Ne contenant que des essences naturelles. Ne rancit pas. Non irritant, odeur agréable.

Présentation :

Solution	Flacon de 30 cc. avec compte-gouttes	16 fr. 30
	Flacon de 30 cc. avec pulvérisateur.....	28 fr. 05
Capsules, boîte de 24.....		16 fr. 30

Mode d'emploi. — Pulvérisations, Instillations (VI à VIII gouttes ou une capsule) dans chaque narine et plusieurs fois par jour.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments 1170-1.

Pour les personnes à muqueuses très sensibles et chez le nourrisson employez l'Oliphédrol B. B. — Ephédrine 0,3 — adrénaline 0,05 — chloréthane 0,5 — essences 2 — huile quantité suffisante p. 100.

Laboratoire de l'OLIPHÉDROL

25, Bd. Edgar-Quinet — COLOMBES — (Tél.: Cha. 27-86).

OLIRICYL

EX-OLIRICIN

Composition. — Chaque comprimé dragéifié contient :

Huile de Ricin saponifiée..	0,025	Bile dépigmentée	0,03
Huile d'Olive saponifiée..	0,025	Soufre pur	0,02
		Belladone pulv.	0,015

Originalité. — Utilisation des sels de l'huile de ricin et de l'huile d'olive, actifs sous un faible volume, sans aucun des désagréments des huiles (nausées, renvois, indigestions, etc.). Sans drastiques.

Posologie. — 1 à 5 comprimés par jour avant ou après le repas, ou le soir au moment du coucher.

Commencer par 2 comprimés le soir.

Augmenter ou diminuer suivant les résultats obtenus.

Avaler sans mâcher.

Indications. — Toutes les formes de constipation. Stimulant hépatobiliaire sans réactions. Lithiase biliaire. Cholagogue.

Présentation. — Tube de 40 comprimés assurant 15 à 20 jours de traitement.

Laboratoire National de Contrôle : n° 1.555-3.

Laboratoires Paul HARDY

Docteur en Pharmacie, Ancien Interne des Hôpitaux
42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°). (Tél.: Gobelins 36-96.)

OLIVÉOL

Acide oléique β

Olivéol pilules, 6 par jour.

Olivéol globules, 1 à 2 par jour.

Olivéol gouttes (pour enfants), X à XL
gouttes suivant l'âge.

SPÉCIFIQUE HÉPATIQUE

augmente la sécrétion biliaire,
se retrouve dans la bile hypersécrétée,
dissout le calcul de cholestérine.

Prix : Globules-Gouttes : 14 fr. 50.

Prix : Pilules : 16 fr. 50.

L. N. C. M. : Pilules, 1208-3 ; Globules, 1208-4 ; Gouttes, 1208-2.

Lab. OLIVÉOL et HÉPATICOL ÉTIÉVANT

Ed. BRUN, Pharmacien de 1^{re} classe

Ancien interne des Hôpitaux de Lyon

TASSIN-LA-DEMI-LUNE (Rhône), Tél. : 140-38.

OLIVIASE

Composition. — Extrait total, liquide, sans alcool ni sucre des feuilles d'olivier (procédé spécial du laboratoire Gmet).

Propriétés. — Désintoxicant, désagrège et élimine les résidus toxiques de l'organisme qu'il rajeunit. Action « dégrasante » très nette. Secondairement peut diminuer l'hypertension et augmenter le taux des urines. Mais toujours, atténue ou supprime les malaises des hypertendus (irritabilité, insomnie, vertiges, agitation, anxiété). L'amélioration se produit le deuxième mois en général, parfois avant.

Indications. — Auto-intoxication, Hypertension, Arthritisme, Cinquantaine (à donner dès la quarantaine aux gros mangeurs, arthritiques avec tendance à l'obésité), Cures de désintoxication et de rajeunissement, Surexcitation et dépression des auto-intoxiqués.

Posologie. — 1 cuillerée à café dans une tasse d'eau chaude, sucrée ou non, le matin à jeun et le soir au coucher, trois semaines par mois pendant trois mois.

Prix :

Le flacon de 150 cc. : 22 fr. 45

Le flacon géant de 500 cc. : 58 francs.

Laboratoire GMET

Dr A. LOROT, Pharmacien,

27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.

(Tél : Provence 43-10.)

ONCTION ANGELINI

Curacare

Guérison de la Gale même infectée.

Sans bains.

Sans frotte — En une seule application.

Adoptée par la Marine nationale.

Traitement des maladies rebelles de la peau.
L'Onction Angelini, à base de soufre et
huile de cade, est en usage dans les hôpi-
taux maritimes de Brest, Cherbourg,
Lorient, Rochefort, Toulon, Bizerte.

Prix au public : 11 francs.

Angelini, Pharmacien,
61, rue de Seine — PARIS

(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous

les commissionnaires et droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

ONGUENT FREVAL

Composition. — 45 p. 100 de mercure ; 2 p. 100 d'extraît
frais de Belladone et 10 p. 100 d'extraît frais de ciguë.

Propriétés thérapeutiques. — Antiphlogistique,
Résolutif, Antiseptique, Calme immédiatement la
douleur et localise l'infection.

Indications. — Tout état inflammatoire : Piquûre infec-
tée, Furoncle, Phlegmon, Panaris, Anthrax, Hémor-
roïdes, Phlébite, Orchite, Arthrite aiguë, Adénite.

Tumeurs blanches et autres tuberculoses ostéo-arti-
culaires et ganglionnaires.

Tout traitement mercuriel par friction (très recom-
mandé pour les enfants ou comme traitement discret
chez les adultes).

Mode d'emploi. — Étendre l'onguent, le recouvrir
d'un linge propre ou d'une gaze et faire tenir.

Dose journalière. — Chez l'adulte : gros comme une
noisette en une ou deux fois.

Prix : le tube de 30 gr. environ, 16 fr. 30.

Laboratoire du DELTA (Tél. : Tru. 45-18.)

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX°).

Préparateur des SUPPOGLANDINES

ONOGO

(Pilules.)

Présentation. — En étui de 50 pilules.
(21 fr. 90)

Principes actifs. — Extrait de Piper methysticum. Extrait de Bucchu, Bi-Carbonate de soude, Salol.

Indications. — Affections des voies urinaires, Blennorrhagie, Métrites aiguës et chroniques.

Mode d'emploi. — 8 à 10 pilules par jour.
Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-28.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

OPHTAL**Composition :**

Novocaïne	0,05
Sulfate d'Alumine	0,20
Sulfate de Zinc.....	0,15
Azotate de Potassium.....	0,05
Chlorure d'Ammonium	0,05
Sulfate de Cuivre.....	0,05
Laudanum.....	0,30
Alcoolat vulnéraire.....	5,00
Eau distillée de rose	10,00
Eau distillée de sureau.....	10,00
Eau distillée. Q. S. pour.....	100,00

Indications. — Conjonctivites infectieuses ou traumatiques, blépharites, orgelets, chalazions. Prophylaxie des affections oculaires.

Mode d'emploi. — En bains tièdes de 2 ou 3 minutes au moyen d'une ceillère, matin et soir, dans les cas bénins.

Trois fois et plus par jour dans les cas aigus.

Prix : 11 fr 50 le flacon de 125 cc.

Laboratoire de l'Ophthal

F. LAGARCE, Docteur en Pharmacie
13, place de la Nation — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 61-05.)

OPOBROL

Médication synergique, Neuro-endocrinienne.
Ovaro-régulatrice et Sympathico-régulatrice.

Composition :

Iso-bromovalérylurée.....	0 gr. 05
Ovarine totale.....	0 gr. 10

Action :

- 1° Par remplacement des sécrétions ovariennes qui manquent ;
- 2° Par trophicité meilleure de l'ovaire déficient par introduction d'albumines tissulaires spécifiques.
- 3° Par l'action régulatrice sur le sympathique vaso-moteur.

Action sur le psychisme par l'ion brome : émotivité, irritabilité, anxiété, insomnie d'origine neuro-végétative, malaises, hyperresthésies.

Action sur le sympathique vaso-moteur par l'iso-bromovalérylurée : spasmes, pâleurs et sensation de froid ; dilatation et sensation de chaleur, rougeurs, sueurs ; éréthisme cardiaque.

Mode d'emploi. — Doit être employé comme traitement de fond : 15 jours par mois et 3 ou 4 mois de suite à la dose de 2 à 6 comprimés par jour.

Présentation. — Boîte de 40 comprimés (10 ou 20 jours de traitement).

Prix : 22 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1536-1.

Laboratoire C. LE FOLLET

NOZEROY (Jura).

(Tél. : Nozeroy 5.)

OPOBYL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-3.

Forme. — Pilules.

Composition. — Extrait hépatique, Sels biliaires, Boldo et Combretum.

Propriétés pharmacodynamiques. — Cholagogue, Rééducateur des fonctions entéro-hépatiques. Excitant physiologique du péristaltisme intestinal.

Indications. — Hépatites. — Ictères — Cholécystites. — Lithiase biliaire. — Entérocolites, Constipation chronique. — Dyspepsie gastro-intestinale.

Mode d'emploi. — 1 à 2 pilules au début ou à la fin des repas, 2 ou 3 fois par jour.

L'étui de 50 pilules : 15 fr. 30.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél.: Lab. 62-30.)

OPOCALCIUM DU D^r GUERSANT

Reminéralisation. Polyopothérapie.

Composition. — Extraits totaux de glandes endocrines. Parathyroïde (titrant 200 unités Collip au gr.), surrénale, thymus, hypophyse, (ce dernier dans le granulé seulement), associés au fluorure, phosphate, glycéro-phosphate, carbonate de Ca, phosphate de Mg et nucléinate de Mn.

Formes. — Cachets (en tubes d'aluminium), comprimés, poudre, granulé (recommandé pour enfants).

Propriétés thérapeutiques. — La décalcification et, d'une façon générale, la déminéralisation de l'organisme sont dues moins à un apport insuffisant des minéraux alimentaires qu'à la déficience des glandes endocrines.

Pour recalcifier et reminéraliser, il faut donc procurer à l'organisme les extraits des glandes dont l'action hormo-stimulatrice et régulatrice assure le métabolisme des minéraux.

Indications. — Prétuberculose, tuberculose, neurasthénie, surmenage, débilité, croissance, phosphaturie, convalescence, lymphatisme, rachitisme, fractures, carie dentaire, grossesse, allaitement.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 3 cachets, 6 comprimés, 3 cuillerées à dessert de granulé, 3 à 5 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 cachet ou 2 comprimés, 3 cuillerées à café de granulé, 2 cuillers-mesures de poudre.

Enfants jusqu'à 5 ans : 2 cuillerées à café de granulé, 1 cuiller-mesure de poudre. Durée du traitement : minimum 10 jours.

Opocalcium arsénié (avec 1 cc. de méthylarsinate disodique). — Une seule forme : cachets.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium gaïacolé (avec sulfo-gaïacolate de potasse). — Antisepsie pulmonaire et reminéralisation associées.

Adultes : 3 cachets par jour ; avant 12 ans : 1 ou 2 cachets par jour.

Opocalcium irradié. — (Voir plus loin.)

Opoferrine (avec fer organique et extraits organiques). (Voir notice plus loin.)

Adultes : 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 comprimés par jour

Prix. — Cachets : 17 fr. 45 — Comprimés : 17 fr. 45,

Granulé : 19 fr. 05. — Poudre : 19 fr. 05.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Ménilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCALCIUM IRRADIÉ DU D^r GUERSANT

Composition. — Vitamine D pure cristallisée titrant 40 millions d'unités internationales au gramme, associée au complexe endocrinominéral de l'Opocalcium. (L'extrait parathyroïdien titre 200 unités Collip au gramme).

Formes. — Cachets (présentés en tubes d'aluminium), Comprimés, Granulé.

Propriétés thérapeutiques. — L'Opocalcium irradié assure une reminéralisation intégrale. Il fixe le calcium et le phosphore dans les tissus.

Indications. — Rachitisme, Croissance, Carence minérale, Ossification, Dentition, Lymphatisme, Dénutrition, Prétuberculose, Tuberculose, Débilité, Asthénie, Surmenage, Phosphaturie, Infections, Fractures, Grossesse, Allaitement, Anémie, Convalescence.

Doses journalières et mode d'emploi :

Cachets : Adultes : 3.

Comprimés : Adultes : 6.

Granulé ; Adultes : 3 à 4 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 10 ans : 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants jusqu'à 5 ans : 1 cuillerée à café.

Durée du traitement : minimum 10 jours.

Prix : Cachets : 24 fr. 55 ; Comprimés : 24 fr. 55 ; Granulé : 25 fr. 50.

Littérature et échantillons :

Laboratoires de L'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS (XX^e).

(Tél. : Mémilmontant 62-81 et 62-82.)

OPOCÉRÈS

Hormones sexuelles associées au complexe manganoferrique et au phosphore embryonnaire.

Reconstituant biologique général.

Poudre d'orchitine	0 gr. 05
— Lobe antérieur de l'hypophyse.	0 gr. 02
— Surrénale.	0 gr. 01
— Oxalate de fer	0 gr. 04
— Chlorure de Manganèse	0 gr. 02
— Inositohexaphosphate de calcium et magnésium. Q. S.	0 gr. 20
Excipient.... pour un comprimé de ..	0 gr. 20

Indications. — Développement tardif; Surmenage; Convalescence; Dépression; Neurasthénie; Dénutrition; Asthénie; Anorexie; Rachitisme; Déminéralisation; Déglobulisation.

Doses et mode d'emploi. — *Enfants* : 1 demi-comprimé au milieu des deux repas, écrasé dans la confiture.

Adolescents : 1 comprimé.

Adultes : 2 comprimés.

A avaler avec une gorgée d'eau ou à prendre délayé dans un peu d'eau sucrée ou boisson habituelle, suivant avis du médecin traitant.

Boîte de 40 comprimés, prix : 20 fr. 80.

OPOCÉRÈS

Ampoules buvables.

Inositohexaphosphate mixte de calcium et de magnésium	0 gr. 50
Extrait orchitique correspondant à 10 fois son poids d'organes frais	0 gr. 10
Extrait de surrénale correspondant à 10 fois son poids d'organes frais.....	0 gr. 025
Ext. de lobe antérieur d'hypophyse correspondant à son poids d'organes frais.	0 gr. 02
Glycérophosphate de fer.....	0 gr. 02
— de manganèse	0 gr. 02
Teinture de noix vomiques	IV gouttes.
Acide orthophosphorique.....	0 gr. 30
pour 1 tube scellé de 5 cc.	

La boîte de 10 ampoules : 24 francs.

Une à 2 ampoules par jour, au début du repas du matin et de midi, à prendre dans un demi-verre d'eau sucrée.

Laboratoire de l'AÉROCID

20, rue de Petrograd — PARIS (VIII^e).

G. SCHMIDT, pharmacien.

Enr. au Lab. nat. de Cont. des Médic. sous le n° 89-4.

OPOCHOL

Composition :

Oléate de soude, Bile dépigmentée et décholestérinée, Extrait total hépatique, Extrait de Boldo, Extrait de Kinkélibah (Combretum).

Forme pharmaceutique :

Comprimés lenticulaires dragéifiés et glutinisés.

Indications thérapeutiques :

Régulateur des fonctions hépato-biliaires, convenant aussi bien aux hépatiques diarrhéiques (ne contient pas de drastique) qu'aux hépatiques constipés (présence d'oléate de soude).

Affections hépato-biliaires. — Hépatites, Cirrhoses, Ictères, Cholémie simple et familiale, Angiocholites, Coliques vésiculaires, Cholécystites médicales, Insuffisance hépatique et biliaire, etc.

Affections gastro-intestinales. — Dyspepsies réflexes, Constipation par insuffisance de chasse biliaire, Entéro-colite muco-membraneuse.

Maladies de la nutrition. — Diabète par hypohépatie, Goutte, Obésité, Arthritisme, Hépatisme de Roger Glénard, Etats hypercholestérinémiques.

Affections de l'appareil circulatoire avec participation du foie. — Foie cardiaque, Syndrome d'hypertension portale, Varices et Hémorroïdes des hépatiques, Hémophilie, certaines anémies.

Infections, Intoxications.

Neuro-psychiatrie. — Psychasthénie avec signes hépatiques, mélancolie anxieuse présénile, dépression avec troubles hépatiques.

Mode d'emploi :

A. *En période de crise.* — 4 comprimés par 24 heures, 2 comprimés au moment des repas de midi et du soir.

B. *Régulateur. Entretien.* — 2 comprimés par 24 heures, un comprimé à midi et un autre le soir aux repas.

Prescrire :

Opochol : comprimés, 1 flacon.

Prix, le flacon de 50 comprimés : 18 fr. 15.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 553-4.

Laboratoire de MÉDECINE EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe, BEAUVAIS (Oise).
(Tél. : 0-50.)

Échantillons et littérature à la disposition
de MM. les Docteurs.

OPODERMYL

Onguent cutané opothérapique.

Composition. — Extraits embryonnaires, albumoses et tous principes actifs de la régénération cutanée.

Propriétés thérapeutiques. — Agent spécifique de l'épidermisation.

Indications. — Plaies atones. Pertes de substances chirurgicales ou diathésiques, Engelures, Brûlures, Erythèmes, Crevasses du sein, Prurits, Dermatoses.

Mode d'emploi. — Application permanente en couche épaisse, renouvelée aussi souvent que possible.

Prix au public : 13 fr. 25.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

OPO-DINITRA

Sans ovaire. Sans thyroïde.

Dinitrophényl-lysidine, Lobe antérieur d'hypophyse, Extrait hépatique

Le *Lobe antérieur d'hypophyse*, par ses hormones adipolytique, gonadotrope et thyroïdienne, est une médication synergique de la nitro-phénazine.

L'*Extrait hépatique* réduit les intolérances idiosyncrasiques et facilite le travail du foie si souvent déficient chez les obèses dysendocriniens.

Opo-Dinitra est le médicament des obésités d'origine **endogène** (insuffisance glandulaire, hypométabolisme, ménopause, syndrome adiposogénital), *Dinitra* étant réservé aux obésités d'origine **exogène** (sédentarité, polyphagie). Voir *Dinitra*.

OBÉSITÉ DE LA MÉNOPAUSE } 1 comprimé par 10 kgs
OBÉSITÉS ENDOCRINIENNES } de poids corporel.

LASSITUDE MENSTRUELLE : 2 à 4 comprimés par jour, 3 jours avant et pendant les règles.

FRIGIDITÉ GÉNITALE masculine ou féminine, 4 à 6 comprimés par jour.

Boîtes de 60 comprimés et de 300 comprimés.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

OPOFERRINE VITAMINÉE

Thérapeutique anti-anémique.

Composition. — Association des Peptonates de fer et de manganèse à l'extrait hépatique (méthode de Whipple) et à l'extrait splénique, en présence des Vitamines A (Carotène) et C (Chlorophylle), qui commandent le métabolisme du fer.

Action. — Agent de régénération sanguine : stimulant l'hématopoïèse.

Indications. — Anémies de toute nature (post-hémorragiques, infectieuses, parasitaires, toxiques, cancéreuses, de l'enfance, etc...), chlorose, altérations et affections sanguines, déficiences spléno-hépatiques, états post-opératoires, convalescence, surmenage, intoxications (saturnisme, oxyde de carbone, alimentaire, etc...), amaigrissement.

Forme. — Granulé.

Doses journalières. — *Adultes* : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café. Aucune action toxique.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoires de l'OPOCALCIUM

A. RANSON, Docteur en Pharmacie.

96, rue Orfila — PARIS.

(Tél. : Ménilmontant : 62-81, 62-82.)

OPOGERMINE

**Reconstituant Intégral, Recalcifiant,
Anti-anémique, Tonique.**

Composition. — Association de la Germinine du Blé à l'extrait hépato-splénique désalbuminé, en présence d'ergostérol irradié. Granulé fondant, d'un goût exquis, sans odeur ni saveur médicamenteuse.

Indications. — Rachitisme, Croissance difficile, Carie dentaire, Fracture, Allaitement, Grossesse, Phosphaturie, Anémie, Convalescence, Surmenage, Usure, Bacillose.

Mode d'emploi :

Doses quotidiennes :

Nourrissons : 1 cuillerée à café ;

Enfants : 2 cuillerées à café,

Adultes : 3 cuillerées à café.

Laboratoire national de contrôle n° 1219-2.

Prix : 20 francs.

Éts Pharmaceutiques M. et P. LEDENT

MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-60).

OPO-IODAMÉLIS LOGEAIS

Composition. — Iodotanan de l'*Iodamélis* neutre, stable et sans iode libre sous forme d'un extrait sec associé à l'organothérapie masculine ou féminine et présenté sous forme de comprimés glutinisés et enrobés.

Propriétés. — Associe les effets stimulants de l'*Iodamélis* sur le métabolisme général, à l'action compensatrice et régulatrice des extraits endocriniens stabilisés et des hormones, action synergique, douce et progressive par stimulation de l'ensemble du tractus génital.

DEUX FORMULES

M	{	Iodotanan de l' <i>Iodamélis</i>	0 gr. 10
		Orchitine.....	0 gr. 10
		Anté-hypophyse.....	0 gr. 005

Indications. — Obésité, troubles circulatoires, hypertension solitaire de la cinquantaine, insuffisance testiculaire transitoire, impuissance, neurasthénie, retard du développement sexuel chez l'homme, syndrome adiposo-génital, adénome prostatique, sénilité, stérilité, troubles vagotoniques ou amphotoniques du système nerveux chez l'homme et chez la femme.

Doses. — De 2 à 6 dragées par jour.

Prix. — L'étui de 40 comprimés..... 23 fr. 35

F	{	Iodotanan de l' <i>Iodamélis</i>	0 gr. 10
		Ovaire	0 gr. 05
		Anté-hypophyse.....	0 gr. 005
		Benzoate de dihydro-folliculine ..	40 U. I.

Indications. — Retard de puberté, infantilisme utérin, dysendocrinies de la jeune fille et de la femme, dysménorrhées, règles trop espacées, règles trainantes, douleurs menstruelles, stérilité, vaginites, leucorrhées, pertes blanches, menstruations fétides, ménopause, hypertension solitaire de la cinquantaine, troubles vaso-moteurs et bourdonnements d'oreilles, bouffées de chaleur, migraines, obésité, troubles psychiques.

Doses. — De 2 à 6 dragées par jour.

Prix. — L'étui de 40 comprimés..... 26 fr. 50

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle :

Formule M : n° 602-9.

— F : n° 602-8.

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
 (Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

OPOMICRO

« *Chez tout nerveux, il y a un endocrinien* »
(LEOPOLD-LEVI)

OpoMicro n° 1 toux : Asthme, Emphysème, Grippe, Trachéites, Bronchites aiguës, Bronchites chroniques, toutes les Adénopathies. Toutes les toux, mêmes bacillaires. Etats pré ou paraphymateux, Phymatose.

OpoMicro n° 2 hépato-gastrique : Dyspepsies, Flatulences, Pyrosis, Gastralgies, Ulcus, Spasmes du Pylore, Diabète, Ictères, Congestion du Foie, Cholécystites, Crises hépatiques.

OpoMicro n° 3 nerfs : Insomnies, Amaigrissement, Mauvais état général, Neurasthénie, Perte d'appétit, Surexcitation, Nervosité, Convalescence, Surmenage physique et intellectuel, ainsi que troubles de croissance.

OpoMicro n° 4 ovarien : Dysménorrhée, Puberté féminine, Ménopause.

Chaque pilule d'OpoMicro contient des extraits de cinq glandes endocrines complémentaires associées, à très faibles doses, telles qu'en employait Léopold-Lévi.

Avaler, croquer ou sucer **une pilule quatre fois par jour**, 10 minutes avant chacun des quatre repas, ou bien deux heures après.

(*Enfants et nourrissons, mêmes doses.*)

Les OpoMicro agissent par catalyse, par leur action de présence, et non pas par leur masse; c'est ce qui explique qu'il est inutile d'en prendre plus d'un à la fois, et que les doses sont les mêmes pour les nourrissons que pour les adultes.

Chaque boîte contient 40 pilules réparties dans deux tubes, dont on prend un jour l'un, un jour l'autre.

Prix de la boîte : 16 fr. 30.

GERBAY, Pharmacien,

6, rue de Babylone — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-24.)

OPOPHOS

Composition. — Glycérophosphate de chaux, Inosito-Phosphate de chaux et magnésie ; Gluconate de calcium ; Phosphates de magnésie, de manganèse ; Protosalate de fer, Splénine, Thy-musine, Parathyroïdine.

Indications. — Anémies, Chlorose, Asthénie, Surmenage, Rachitisme, Lymphatisme, Carences, Troubles de Croissance et de Nutrition, Déminéralisation, Caries dentaires.

Forme. — 1° Granulé sucré, aromatisé. Ne contenant aucun produit toxique, l'OPOPHOS constitue la forme la plus facile et la plus agréable pour faire prendre fer et phosphates aux enfants et aux bébés. — 2° Cachets (pour adultes).

Doses. — 1° *Bébés* : 1/4 de cuill. à café 2 fois par jour. — 2 à 5 ans : 1/2 cuill. à café 2 fois par jour. — 5 à 15 ans : 2 cuill. à café par jour. — 2° *Adultes* : 2 cachets par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoire DENISOT

19, rue de Fleurus — PARIS (VI°).

OPO-PLASMA

Composition. — Extraits de Foie, Rate, Muqueuse gastrique Pancréas, Rein, Surrénale, Glande mâle, Extrait de Malt et Peptone de muscle (Acides aminés totaux) en Plasma marin synthétique, hypertonique par les facteurs Ca, Mn, Mg, Cu.

Indications. — *Maladies chroniques*, déglobulisantes, déminéralisantes et consomptives : Anémies, Lymphatisme, Rachitisme, Avitaminose, Athrepsie des Nourrissons ; *Tuberculose* dans toutes ses manifestations, rhumatismes chroniques, Paludisme, Cachexies, Néoplasies etc.

Maladies aiguës toxi-infectieuses ou septicémiques. Fièvres éruptives, broncho-pneumonies, diphtérie, états typhoïdes et puerpéraux, pyo-septicémies chirurgicales, etc... Toutes convalescences.

Présentation. — Ampoules buvables (non injectables) de 20 cc.

Prix : 46 fr. 80 la boîte de 10 ampoules.

— 26 francs — 5 —

(Par voie buccale.)

Adultes : 1 à 4 ampoules par jour dans un peu d'eau ordinaire ou gazeuse avant ou loin des repas. *Enfants* : 1 à 2 ampoules suivant l'âge.

(Par voie rectale.)

Mêmes doses étendues d'un volume égal d'eau bouillie tiède ou mieux incorporées dans un « goutte à goutte » de sérum physiologique ou glucosé.

L. BÉLIÈRES,

19, rue Drouot — PARIS.

OPOSCLÉRINE VERGELOT

Traitement de l'arthritisme et de l'artério-sclérose par les extraits opothérapiques.

Composition. — Extrait ovarique, Extrait orchitique, Peptone iodée, Extrait thyroïdien.

Propriétés. — Synergie opothérapique par association d'extraits de glandes génitales au corps thyroïde et à l'iode, agissant sur tous les éléments concourant à la production de l'artério-sclérose. Abaisse le taux du cholestérol sanguin. Abaisse la tension artérielle. Action antisclérosante sur les tissus et les vaisseaux. Augmente la force musculaire.

Indications. — Arthritisme, Artério-sclérose, Goutte, Asthme, Hypertension, Rhumatismes chroniques et de la ménopause.

Présentation et mode d'emploi. — Dragées : 2 à 4 par jour, avant chaque repas, 20 jours par mois, suspendre et recommencer.

Prix : 17 fr. 70 le tube de 40 dragées.

Laboratoires Ch. VERGELOT

Docteur en Pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18.)

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-1.

OPO-SIGNAL

Traitement opo-arséno-mercuriel dissimulé.

Forme. — Solution en flacon compte-gouttes.

Composition. — 40 gouttes représentent : HgI_2 0,01, AsI_3 0,01, Glucose 0,10, Extrait de Foie 0,10, d'Hypophyse 0,05, de Surrénales 0,02, de Thyroïde 0,01.

Indications. — 1^o *Syphilis acquise* (Traitement d'entretien). — 2^o *Hérédosyphilis* (Traitement de base). — 3^o *Prophylaxie de l'avortement syphilitique* (Protection de l'embryon contre l'imprégnation).

Posologie. — 1^o *Adultes* : 40 gouttes dans un peu de liquide, 2 fois par jour, aux repas. — 2^o *Enfants* : 2 gouttes par année d'âge, 2 fois par jour. — 3^o *Nourrissons* : 1 à 2 gouttes 2 fois par jour dans le biberon.

Avantages. — Par l'adjonction d'extraits opothérapiques, l'OPO-SIGNAL est une préparation originale en rapport avec les travaux récents des pédiatres (V. Hutinel, E. Lesné, etc.) — les glandes semblant plus exposées aux effets de l'infection (V. Hutinel).

Par l'association hydrargyre et arsenic, le traitement donne des résultats sérologiques que l'on n'obtiendrait pas avec une médication exclusivement Arsenicale ou exclusivement Mercurielle (Lacapeyre et Pasteur Valléry-Radot).

La présence du glucose jointe à l'opothérapie hépatique met le foie dans les meilleures conditions de résistance à l'action toxique de l'arsenic (Thèse de Max Vauthey, 1928. Recherches cliniques et expérimentales sur le Foie et sur l'Arsonie).

Sa présentation permet un traitement dissimulé.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).

(Tél. : Tremblay 25-33.)

Hémopoïétique. **OPOSSEÏNE.** Reminéralisant

Polyopothérapie, Polyionothérapie.
Granulé. Endocrino-Minéral vitaminé.

Composition : Vitamine D : Pure, Cristallisée, Inaltérable.

Glandes endocrines : Thymus, Rate, Parathyroïde, Foie.

Ions : P, Ca, Hypophosphites Mg, Nucléinates Mn et Na, Triphytine, poudre d'os, Phosphate et Glycérophosphate de Ca.

Indications : Minéralisation. Hémopoïèse. Déminéralisation. Croissance. Rachitisme. Toutes anémies. Convalescences. Surmenage. Dépressions nerveuses. Phosphaturies. Prétuberculeuse. Tuberculose. Fractures. Grossesse. Dentition. Allaitement. Toutes déficiences organiques ou endocriniennes. Polyopothérapie. Polyionothérapie.

Mode d'emploi. — Adultes et enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

2^e Enfance : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

1^e Enfance : 1 cuillerée à café par jour.

Action : Réalise intensément reminéralisation et hémopoïèse. Favorise la Nutrition de la cellule nerveuse et osseuse. Remédie aux spoliations phosphorées et aux carences calciques. Régularise le métabolisme des ions et des stéroïdes. Assure l'équilibre minéral et acido-basique. Supplée à toutes les déficiences organiques et endocriniennes.

Prix : 23 fr. 10. Taxe d'armement comprise.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-3.

Laboratoires OPOS

Pharmacien HOMPS,

Bureaux : 33, rue Rempart-Matabiau — TOULOUSE. — (Tél. : 253-97.)

Usine : 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY. — (Tél. : 3-10.)

OPOSTYL

Auxothérapie Opocrinienne des Asthénies.

Composition. — Cortico-Surrénale + Arsenic organique, Moelle osseuse + Hypophosphites, Thymus + Magnésium et Rate + Fer.

Indications. — Réunit ainsi 4 associations en synergie du sel minéral et de la glande qui le fixe dans l'organisme.

1^o Stimule puissamment le pouvoir anti-infectieux et l'hématopoïèse ; 2^o rend possible la création de réserves consommables, même sur le terrain peu favorable d'un organisme déprimé ; 3^o restaure le tonus nerveux.

Épuisement des réserves, convalescences, épuisement nerveux.

Formes. — Dragées, Liqueur.

Posologie et mode d'emploi :

Liqueur : 2 à 4 cuillerées à café par jour avant le repas, de préférence dans un peu d'eau sucrée.

Dragées : 2 à 4 par jour à avaler avant les repas.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BAZIN

SUCS ORGANIQUES BAZIN

Extraits totaux glycélinés d'organes frais
(méthode de Brown-Séquard.)

Simple macération glycélinée suivie d'expression de l'organe frais, ces préparations constituent l'idéal opothérapique. Journallement et uniquement préparés avec des glandes fraîches, il n'entre dans leur fabrication aucun organe frigorifié d'origine américaine.

Opothérapie simple. — Suc ovarien, orchitique, thyroïdien, hépatique, pulmonaire, rénal, surrénal, hypophysaire, thymique, para-thyroïdien, pancréatique, cortico-surrénal, gastrique, intestinal, amygdalien, mammaire, placentaire, prostatique, splénique, médullaire, cérébrine, cardine, oculine, sérum de porc anticolibacillaire, etc.

Opothérapie associée. — Suc thyro-ovarien, thyro-orchitique, surrénal-ovarien, surrénal-orchitique, hypophyso-ovarien et orchitique, triglandulaire M. et F., pluriglandulaire M. F. et toutes formules que MM. les médecins voudront bien nous indiquer.

Mode d'emploi. — Deux à quatre cuillerées à café dans un peu d'eau pure ou d'eau minérale et suivant avis du médecin.

1 cuillerée à café correspond à 1 gr. d'organe frais.

Présentation. — 1^o En flacons de 90 cc. au prix de 12 francs les uniglandulaires et 13 francs les pluriglandulaires ;

2^o En ampoules (boîte de 10 ampoules de 10 cc.) au prix de 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Laboratoire Spécial BAZIN

Autorisé par l'État après avis favorable de l'Académie de Médecine pour préparation des Extraits organiques.

H. GARRAUD, Pharmacien,

Ancien assistant de la Faculté, Lauréat, Médaille d'or.

9, cours Victor-Hugo — BORDEAUX (Gironde). Tél. : 927-61.

OPOTHÉRAPIE BOUTY

Extraits totaux d'organes frais desséchés sous un vide profond à basse température et présentés en dragées (préparées à froid et permettant une conservation indéfinie) ou en ampoules de 1 et 3 cc.

Thyroïdine : (0 gr. 10 de corps thyroïde), Obésité. Myxœdème.

Oviginine : (0 gr. 12 d'ovaires), Ménopause naturelle ou artificielle.

Gastrozymase : Comprimés effervescents de suc gastrique de porc. Dyspepsies, embarras gastrique.

Liquueur à la Thyroïdine : 1 cuillerée à café = 0 gr. 02 de thyroïde desséchée, Myxœdème infantile.

Globépal : Poudre de foie frais.

Opostyl : Voir 1/2 page spéciale.

Triglandine :

Thyroïde.....	0 gr. 08	} Asthénies endocriniennes féminines.
Hypophyse.....	0 gr. 05	
Ovaire.....	0 gr. 10	

Triglandol :

Thyroïde.....	0 gr. 08	} Asthénies endocriniennes masculines.
Hypophyse.....	0 gr. 05	
Testicule.....	0 gr. 10	

Biliol, Séquardine, Hépatine, Surrénaline, Néphrine.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

OPOTHÉRAPIE BYLA

Présentations brevetées.

SANS ODEUR, CONSERVATION INDÉFINIE
CONSTANCE D'ACTIVITÉ

1° **Cachets « OPO »** contenant dans le même pain azyme, deux **comprimés** concentriques renfermant, l'un le substratum cellulaire sec, l'autre le lipéide correspondant (procédé breveté).

Posologie. — Uniforme pour tous les Opos : 2 à 4 par jour.

Prescrire : OPO-OVARINE-BYLA, etc.

2° Les **« EXO » BYLA**, sucs totaux **inaltérables**, préparés par exolyse des organes frais (procédé breveté).

Prescrire : EXO-THYROIDINE BYLA, etc.

Posologie. — Uniforme pour tous les Exos : 2 à 4 cuillerées à dessert par jour.

3° Les **GLANDULES BYLA** (comprimés dragéifiés), enrobés de sucre, afin d'empêcher l'action de l'air sur le principe actif et d'éviter toute odeur.

Conservation indéfinie.

Prescrire : GLANDULES DE SURRÉNINE BYLA.

Posologie. — (4 à 8 par jour).

4° Les **AMPOULES BYLA** : préparées à partir des ORGANES FRAIS ; amenées à un état voisin de l'isotonie et présentées en ampoules de 1 cc. correspondant à 0 gr. 25 d'organe frais.

Prescrire : AMPOULES D'HÉPATINE BYLA, etc.

Pour les doses massives : AMPOULES **« ISO » BYLA** de 2 cc. correspondant à 1 gr. d'organe frais par cc.

Prescrire : AMPOULES ISO REIN BYLA, etc.

Posologie. — 1 ampoule tous les 2 jours.

*Opothérapie simple, pluriglandulaire
et panglandulaire.*

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e)

(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE BYLA

Cachets OPO — Exolysés — Glandules — Ampoules.

Formule

MÉDICATION ASSOCIÉE

1	Hypophysine. 0.10 Orchitine 0.60	Infantilisme masculin. Dystrophie des adolescents.
2	Hypophysine. 0.10 Ovarine..... 0.20	Infantilisme féminin, troubles de la ménopause. Syndromes adipo-génitaux
3	Orchitine 0.60 Thyroidine... 0.025	Myxœdème. Infantilisme masculin.
3 bis	Ovarine 0.20 Surrénine... 0.10	Hypotension et asthénie de la ménopause.
4	Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Hypertension et Troubles de la méno- pause naturelle ou opératoire. Obésité
4 bis	Ovarine..... 0.15 Orchitine... 0.30	Carence sexuelle féminine.
5	Surrénine.... 0.10 Hypophysine. 0.10	Myasthénies. Insuffisance surrénale Hypotension.
6	Surrénine.... 0.10 Thyroidine... 0.025	Retards de croissance. Etats thyroïdien avec hypotension. Fatigabilité.
7	Hypophysine. 0.10 Thyroidine... 0.025	Infantilisme. Obésité. Sénilité précoce.
7 bis	Placentine... 0.25 Mamelline .. 0.25	Galactogue.
8	Surrénine.... 0.15 Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025	Asthme essentiel. Myasthénies. Syndrome adipo-génital. Infantilisme.
8 bis	Ovarine..... 0.15 Surrénine.... 0.05 Hypophysine. 0.05	Troubles de la puberté et de la méno- pause. Syndromes adipo-génitaux.
9	Hypophysine. 0.05 Ovarine..... 0.20 Thyroidine... 0.025	Retards de la puberté. Troubles de la ménopause et de la puberté. Syndromes adipo-génitaux
9 bis	Ovarine..... 0.20 Surrénine.... 0.05 Thyroidine.... 0.025	Troubles de la puberté et de la ménopause. Etats dépressifs avec hypotension.
10	Hypophysine. 0.05 Orchitine 0.60 Thyroidine.... 0.025	Développement tardif. Infantilisme. Syndromes adipo-génitaux.
11	Hypophysine. 0.05 Thyroidine... 0.025 Surrénine.... 0.05 Orchitine 0.10	Infantilisme masculin. Syndromes adipo-génitaux. Sénilité précoce.
12	Hypophysine. 0.05 Thyroidine.... 0.025 Surrénine.... 0.05 Ovarine..... 0.10	Insuffisances glandulaires. Troubles de la puberté et de la méno- pause. Obésité.

14	Splénine....	0.15	Reconstituant général dans toutes les anémies.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	S. H. P.		
15	Duodénase..	0.15	Excito-régulateur des diverses sécrétions commandant la digestion duodéno-hépatopancréatique — Troubles du carrefour sous-hépatique. Syndromes digestifs mal définis.
	Hépatine....	0.15	
	Pancréine...	0.15	
	D. F. P.		
16	Hépatine....	0.15	Puissant reconstituant général dans toutes les formes de l'anémie.
	Gastérase...	0.15	
	Splénine....	0.15	
	Surrénine...	0.05	
	F. E. R. S.		

Les dosages indiqués sont ceux des CACHETS OPO.

Traitement de l'obésité : Cachets Amaigrissants Byla, n° 21 (sans thyroïde).

Traitement de l'oxyurose : Glandules n° 20 (gastérase-entéropancréatine-hépatine-bile).

Posologie :

Cachets Opo Byla. 2 à 4 par jour | Exos Byla (sucs). 2 à 4 cuil. par jour
Glandules (dragées). 4 à 8 par jour | Ampoules Byla. 1 tous les 2 jours

MÉDICATION PANGLANDULAIRE

contenant toutes les glandes en proportion normale.

PANGLANDULAIRES BYLA: Masculins, Féminins, Infantiles.

28, av. de l'Observatoire. Paris-14^e

(Tél. : Danton 08-11.)

OPOTHÉRAPIE CARRION

1° Comprimés dragéifiés et Cachets uniglandulaires. — Poudres d'organes renfermant, inaltérées chimiquement, les substances spécifiques contenues dans les organes frais. La forme « comprimés », de conservation plus aisée, est recommandée particulièrement.

Comprimés à 0 gr. 10 de corps jaune, Fiel, Hypophyse totale, Hypophyse lobe antérieur Ovaire, Surrénale.

Comprimés à 0 gr. 20 de Myocarde, Gastrique, Moelle osseuse, Orchitique, Ovaire, Pancréas, Placenta, Prostate, Rate, Rein, Substance grise, Surrénale totale, Surrénale cortex.

Comprimés à 0 gr. 50 de Foie, Glande Mammaire, Thymus.

Comprimés de Thyroïde à 0 gr. 01, 0 gr. 05, 0 gr. 10 et 0 gr. 20.

Comprimés de Parathyroïde à 0 gr. 01.

Boîtes de 24 comprimés. Prix variant suivant les cas.

Cachets à tous dosages et suivant toutes formules, sur ordonnance.

Posologie. — En général, 2 à 4 comprimés ou cachets par jour.

2° Comprimés dragéifiés et Cachets pluriglandulaires.

T. O. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. O. S.	{	Thyroïde	0,02
		Ovaire....	0,10			Ovaire	0,10
		Surrénale .	0,10			Surrénale	0,10
		Hypophyse	0,03				
T. A. S. H.	{	Thyroïde .	0,02	T. S. H.	{	Thyroïde	0,02
		Orch. (A).	0,10			Surrénale	0,20
		Surrénale..	0,10			Hypophyse....	0,05
		Hypophyse	0,03				
T. O. H.	{	Thyroïde .	0,02	O. S. H.	{	Ovaire.....	0,15
		Ovaire....	0,10			Surrénale	0,05
		Hypophyse	0,03			Hypophyse	0,05
S. H.	{	Surrénale .	0,20	T. O.	{	Thyroïde	0,03
		Hypophyse	0,05			Ovaire.....	0,20
T. A.	{	Thyroïde .	0,03	O. M.	{	Ovaire.....	0,20
		Orch. (A)..	0,20			Mammaire (glande).....	0,30

Posologie. — 2 à 3 comprimés ou cachets par jour ; la boîte de 24 23 fr. 35 (T. A. : 17 fr. 50).

3° Extraits injectables uniglandulaires. — En ampoules de 2 cc. correspondant à 0,10 d'extrait d'organe (sauf Parathyroïde). Une injection par jour ou tous les 2 jours. La boîte de 6 ampoules : 17 fr. 50.

Pluriglandulaires : en ampoules de 2 cc. répondant aux formules des comprimés. La boîte de 6 ampoules : 23 fr. 35.

4° Per-extraits injectables. — Voir plus loin « Per-Extraits » « Per-Hépatique », « Per-Ovarien », « Per-Surrénalien », « Per-Thymique ».

5° Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse. — Voir plus loin : « Rétropituine ».

Enregistré au L. N. C. n° 514, n° divers.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

OPOTHÉRAPIE CHOAY

I. EXTRAITS TOTAUX CHOAY, poudres d'organes (Codex) préparées à froid (0°) et dans le vide profond, de propriétés pharmacodynamiques égales à celles des pulpes fraîches correspondantes.

Formes pharmaceutiques. — *Cachets et Comprimés* présentés en tubes hermétiques.

Posologie moyenne. — 4 à 6 par jour.

Nomenclature et dosage des produits les plus couramment utilisés.

Cachets et comprimés : Hépatiques	25 et 50 cg.
Hypophysaires	5 et 10 —
Mammaires	25 et 50 —
Orchitiques (ou Androïques)....	25 et 50 —
Ovariens	20 à 50 —
Pancréatiques	25 et 50 —
Spléniques	25 et 50 —
Surrénaux	10 et 20 —
Thymiques	25 et 50 —
Thyroïdiens ...	1 et 5 mgr., 1, 2, 5 et 10 —

Boîtes de 24 à 40 cachets ou comprimés suivant dosage.

II. EXTRAITS INJECTABLES CHOAY : Solutions aqueuses, désalbuminées, stérilisées et sensiblement isotoniques.

Formes pharmaceutiques. — Ampoules de 1 à 10 cc.

Nomenclature et posologie des solutions les plus utilisées :

Ampoules Hépatiques.....	1, 2 et 5 cc.,	1 tous les jours.
Ampoules Hypophysaires (lobe antérieur)	1 et 2 cc	1 tous les 2 jours.
Ampoules Hypophysaires (lobe postérieur)	Voir « Post-Hypophyse Choay »	
Ampoules Mammaires.....	1 et 2 cc ...	1 tous les 2 jours.
— Orchitiques	1 et 2 cc ...	—
— Ovariennes	1 et 2 cc ...	—
— Spléniques	1, 2 et 5 cc ...	—
— Surrénales.....	0,5 et 1 cc ...	—
— Thymiques.....	1 et 2 cc ...	—
— Thyroïdiennes	0,5 et 1 cc ...	—

Boîtes de 6 et de 12 ampoules.

OPOTHÉRAPIE ASSOCIÉE : Syncrines Choay. (Voir ce mot.)

Laboratoire CHOAY

48, avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

OPOTHÉRAPIE du D^r FRAYSSE

(Associations)

THYRODOSE. — Pastilles de chocolat de 1 gr. contenant : ovaire 0,10, thyroïde 0,025.

Doses. — *Adultes* : 2 à 3 pastilles par jour.

Indications. — Insuffisances thyroïdienne et ovarienne. — Troubles de la croissance, de la puberté et de la ménopause. — Obésité, etc. — Trait^t : 3 sem.

NEURODOSE. — Comprimés de 1 gr. contenant : orchitine 0,20, substance grise 0,10.

Doses. — *Adultes* : 4 par jour.

Indications. — Épuisement nerveux sous toutes ses formes. — Impuissance sexuelle, surmenage. — Infantilisme, etc. — Traitement : 15 jours.

PLAOENTODOSE. — Granulés de Placenta et de mammaire.

Doses. — 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Flaccidité utérine. — Métrorragies. — Insuffisance lactée. — Flaccidité et atrophie des seins. — Métrite. — Tumeurs. — Fibromes, etc. — Traitement : 15 jours.

SPLÉNODOSE. — Comprimés de 0 gr. 60 composés de : Rate. — Foie. — Surrénale. — Hémoglobine. — Osséine.

Méthode de Whipple renforcée.

Doses. — 4 à 6 par jour.

Indications. — Déminéralisation. — Maladies du Foie et de la Rate. — Chlorose. — Anémie. — Paludisme, etc. — Traitement : 15 jours.

Laboratoires du D^r FRAYSSE

21, r. de Neuilly — NANTERRE (Seine). Tél. : 12-88

Notices et échantillons sur demande.

(Voir aussi *Folli-Lobine*.)

OPOTHÉRAPIE E. VERGELOT

AMPOLASES

Composition. — Extraits totaux ovariens, orchitiques, rate, foie, parathyroïde, préparés à froid sans modification du pH et maintenus en suspension isotonique avec toutes leurs propriétés physiologiques. Ampolases O, Ampolases G, Ampolases R, Ampolases F, Ampolases Para N, Ampolases de thymus.

Indications. — Troubles des fonctions génitales, Dépression, Déminéralisation, Anémie, Débilité, etc.

Présentation. — Ampoules buvables.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ou 2 ampoules par jour contenant 33 p. 100 de produit actif.

Durée du traitement. — 12 jours au moins par mois.

Prix : La boîte de 6 ampoules : 21 fr. 30.

OPOLASES

Composition. — Dragées contenant à l'abri de l'air les différents produits opothérapiques prélevés aseptiquement dès l'abat et desséchés par le froid et l'air sec.

Avantages. — Ces produits sont dosés de telle sorte qu'ils permettent aisément les combinaisons individuelles les plus variées.

Les poudres de glandes sont préparées par les Laboratoires de Organotechnie situés à proximité des abattoirs de la Villette où sont recueillies les glandes ; elles sont soumises à un simple courant d'air pour les dessécher, ce qui permet de conserver inaltérés leurs principes actifs et leur confère ainsi une activité remarquable.

Principaux produits. — *Opolases* : Ovaires « O », Ovaire et Thyroïdine « O. T. », Thyroïde « T », Surrénale totale « S », Ovaires-Surrénales-Hypophyse-Thyroïdine « P », Testicules-Surrénales-Hypophyse-Cérébrine « P. M. », Mammaire « M », Hypophyse « H », G. Testiculaires.

Parathyroïde à 1/10 de mgr. Thyroïde à 1/10 de mgr (Ttt).

Posologie et mode d'emploi. — 1 à 2 dragées par jour.

Prix : 17 et 21 fr. 30 la boîte de 24 dragées.

Enregistré au laboratoire national des médicaments sous les n^{os} 997-1 à 997-15.

Laboratoire E. VERGELOT

163, rue de Flandre — PARIS (XIX^e).

(Tél. : Nord 48-22.)

OPOTHÉRAPIE FOURNIER

LES ENDOCRISINES

Extraits totaux d'organes frais. — Hormones

TOUTES LES GLANDES

Prescrire : ENDOCRISINES FOIE, etc...

Cachets dosés en extrait sec. Ampoules dosées en glande fraîche, soit environ cinq fois le poids d'extrait sec.

Exécution rapide de toutes les Prescriptions Médicales

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
BILE ou BILEYL Sels biliaires dépigmentés et décholesté- rinés	1^o GLANDES PRINCIPALES Affections biliaires et hépatiques. Cholécystites. — Ictères. Entérocolites. Constipation.	60 globules	17. »
FOIE Glande totale	Insuffisances hépatiques. Cirrhoses — Dermatoses. Hémophilie.	24 cach. à 0,50 30 comp. à 0,30 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.	18. »
*Foie Buvable	Toutes les anémies : Méthode de Whipple pour thérapeu- tique infantile.	7 amp. b. de 10 cc. (150 gr. de foie frais) 12 amp. b. de 2 cc. (30 gr. de foie frais)	35. » 18. »
HYPOPHYSE Glande totale	Hypotension, myocardites, toxi-infections. Syndrome adiposo-génital. Neurasthénie-Otosclérose.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20 30 compr. à 0,05 et 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,25	18. » à 40.30 18. » 25.50 18. »
Lobe antérieur (Extrait total)	Retards de la croissance — Obésité Insuffisances ovariennes et génitales. — Ectopie testiculaire. — Enurésie.	24 cach. à 0 gr. 05, et 0,10 30 comprimés à 0,10 6 amp. de 2 cc. à 0,25	18. » 29.70 27.60 24.40
Lobe postérieur (Extrait total)	Ménorragies et Hémorragies viscérales. — Céphalées. Diabète insipide.	24 cachets à 0,10 5 tubes de poudre à priser à 0,15	31.80 24.40
Hormone post-hypo- physaire ocytocique ou PHYSOCRI- SINE	Inertie utérine. Hémorragies de la délivrance. Ménorragies et Hémorragies viscérales. Diabète insipide. Atonie gastro-intestinale. Hémoptysies des tuberculeux.	3 amp. 1 cc. à 5 U. I. 6 amp. 1 cc. à 5 U. I. (inj. sous-cutanée) 3 amp. 10 cc. à 5 U. I. (inj. intravein.)	17. » 27.60 27.60
OVAIRE et dérivés Glande totale	Troubles de la ménopause, de la grossesse et de la puberté. Troubles psychiques. Rhumatismes chroniques. Obésité.	30 cach. à 0,05 24 cach. à 0,10, 0,20, 0,25, 0,30, 0,50. 30 comp. à 0,10 et 0,20. 6 amp. 2 cc. à 0,50	15.90 à 40.30 17. » et 21.20 18. »
Corps jaune (sans folliculine)	Troubles des fonctions menstruelles. — Ménorragies. Stérilité. — Vomissements de la grossesse.	24 cach. à 0,05 0,10 et 0,20 6 amp. de 2 cc. à 0,50	18. » à 29.70 18. »

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
Corps Jaune Vit. E ou VIT - E - LUTEINE	Stérilité. Avortements à répétition. Troubles de la grossesse.	40 pilules à 0,12 de c. j. et 1 gr. d'huile de germe de blé	22.30
Lipides de l'ovaire ou MINOVA-RIUM	Hyperovarie. Hémorragies menstruelles. Puberté précoce.	40 pilules à 0,15	19. »
Hormone ovarienne FOLLI-CULINE (Benzoate de dihydro en sol. huileuse) et *FOLLIDI-MYL	Hypo-ovarie. Aménorrhées. Oligoménorrhées. Dysménorrhées par hypoplasie ovarienne. Troubles de la ménopause et de la castration. Ariérites oblitérantes. Enfants prématurés et athrepsiques.	6 amp. de 1 cc. à 200 U. I. 6 amp. de 1 cc. à 500 U. I. 6 amp. de 1 cc. à 1000 U. I. 6 amp. de 1 cc. à 2000 U. I. *4 amp. de 1 cc. à 5000 U. I. *2 amp. de 1 cc. à 10.000 U. I. (Follidimyl) *1 amp. de 1 cc. à 50.000 U. I.	24.40 24.40 24.40 26.50 29.70 29.70 47.75
PARATHY-ROIDE	Tétanie - Spasmophilie - Ulcus gastrique. Décalkification - Otosclérose Maladie de Parkinson.	40 cachets à 0,001 et 0,002 30 cac. à 0,01 et 0,02 50 comprimés à 0,001 et 0,005 amp. inj. s. dem.	17. » 27.60
RATE Glande totale	Paludisme. Anémie. Tuberculose.	24 cach. à 0,50 6 amp. de 2 cc. à 1 gr.	18. »
Extraits désalbuminés de Rate à haute concentration SPLENO-CRISINES 15-30-60	Eczémas. Dermatoses rebelles et prurigineuses. Asthme vrai. Tuberculose.	5 amp. de 3 cc. à 15 gr. » - - 30 gr. » - - 60 gr. (inj. intramusc.)	23.35 36. » 53. »
REIN	Néphrites. - Urémie. Albuminurie.	30 cachets à 0,25	15.90
SURRÉNALE Glande totale	Maladie d'Addison. Choc opératoire. Adynamie des syndromes infectieux malins. Collapsus. - Asthénies. Décalkifications.	30 et 24 each. à 0,10 et 0,25 30 comp. à 0 gr. 10 6 amp. de 2 cc. à 0,50	15.90 et 17. » 15.90
Cortico Sur rénale (exempte d'adrénaline)	Intoxications. - Adynamies. Hypotension. - Troubles psychiques et Neurasthénie. Alopécies. Vomissements gravidiques.	30 et 24 each. à 0,10, et 0,25 6 amp. de 2 cc. à 0,50	17. » et 22.30 12. »
Hormone surrénale ADRÉNA-LINE (Organique)	Asthénie - Hypotensions - Collapsus - Mort apparente. Asthme. Shock anaphylactique.	Flacon de 15 gr. sol. à 1 p. 1000. 6 amp. de 1 cc. à 1 p. 1000.	10.60

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
TESTICULE	Infantilisme génital. Obésité.	30 cach. à 0,20	15.90
Glande totale	Troubles sexuels masculins. Neurasthénie sexuelle. Hypertrophie de la prostate. Stérilité.	30 comp. à 0,30 6 amp. de 2 cc. à 0,50	18. » 18. »
Extrait orchitique dissimulé. ou ANTAGONYL	Médication complémentaire chez la femme — Troubles psy- siques et psychiques fém. par carence sexuelle. Ozène.	40 comp. à 0,33 6 amp. de 2 cc. à 1,50	21.20
THYMUS	Troubles de la croissance et du dévelop. intellectuel de l'enfant. Ectopie testiculaire. Enurésie.	24 cach. à 0,50 30 comp. à 0,30 amp. inject. sur demande.	18. »
THYROÏDE	Myxœdème — Obésité — Rhumatismes chroniques. Infantilisme et retards de la puberté. — Athrepsie infantile. — Migraines. Iochtyose. — Sénilité précoce. Dysménorrhées.	48 cach. à 1, 2, 5, 20, 25 milligr. 30 cach. à 0,05, 0,10 et 0,20. 24 cach. à 0,25, 0,50. 50 compr. à 1 et 5 milligr. 30 comp. à 0,025 et 0,10, 6 amp. de 2 cc. à 0,025	15 90 à 24.40 15.90 18. »
UTÉRUS ou HORMUTER	Troubles liés à la ménopause chirurgicale et à l'hypo- génésie utérine. Dysménorrhées essentielles. Douleurs menstruelles. Frigidité féminine. Fibromes utérins.	40 comp. à 0,30. 6 amp. de 2 cc. à 2 gr.	22.50
2° AUTRES GLANDES			
Amygdale Bulbe Cerveau Cervelet Cœur Corps ciliaire Epiphyse	Ganglion grand sympathique Ganglion lymphatique Mamelle Moelle épinière Moelle osseuse Muqueuse gastrique Muqueuse intestinale	Os Pancréas Placenta Poumon Prostate Rein Rétine	
Prix : de 15.60 à 21.85 la boîte de cachets. Ampoules injectables sur demande.			

GLANDES	INDICATIONS	PRÉSENTATION	PRIX
S. H. A. (sol. inj. : sur- rénale, hypo- physe et adrénaline)	3^e ASSOCIATIONS ENDOCRINIENNES Crises d'asthme.	6 ampoules.	19. »
PLURI- GLANDU- LAIRES F. et M.	Troubles de la puberté. Déficiences endocriniennes des deux sexes.	30 cachets 60 comprimés 6 ampoules.	19. » 19. » 19. »
Bivalents Trivalents Quadriva- lents	<u>O. T. — O. H. — O. S.</u> <u>A. T. — A. H. — A. S.</u> <u>T. H. S. — T. H. O. — T. P. F.</u> <u>T. O. S. — H. O. S. — T. H. A.</u> <u>T. A. S. — H. A. S.</u> <u>E. I. P. F. — H. T. S. O.</u> <u>H. T. S. A.</u>	24 cachets 30 comprimés (associations soulignées).	22.30 à 24.40
CRINO- STHENYL Glandes de l'énergie	4. LES « 3 CRINOS » Asthénies. Convalescences. Déficiences physiques et psychiques.	40 comprimés 6 amp. inj. Sirop.	21.20 21.20 21.20
CRINO- TENSYL Régulateur de la tension, de la circu- lation et de la nutrition générale	Hypertension artérielle. Artério-sclérose. Troubles circulatoires et spasmes vas- culaires. Troubles de la ménopause et de la cinquan- taine.	45 comprimés.	20.40
CRINO- MENSTRYL Régulateur ovarien	Aménorrhées. Dysménorrhées. Troubles de la puberté et de la ménopause. Obésité.	40 comprimés Amp. inject. (Lobe ant. d'hypo- physe et folliculine) Amp. inject. « S » (Hormone Gonado- trophe et folliculine).	23.35 29.70 76.50

N. B. — Les produits marqués d'un astérisque ne peuvent être échantillonnés.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet, PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 86-45, 5 lignes groupées.)

OPOTHÉRAPIE ISCOVESCO

(Lipoïdes H. I.).

Définition. — Opothérapie totale contenant toutes les hormones spécifiques et les principes actifs de la glande renforcés par les lipoïdes et débarrassée des principes nocifs et inactifs.

Nomenclature :

Extrait ovarien	Gynocrinol.
Extrait orchitique.....	Androcrinol.
Extrait de la glande surrénale débarrassé d'adrénaline	Adrénol Total.
Extrait de la partie corticale de la glande surrénale	Adrénol Cortex.
Extrait du corps jaune	Gynolutéol.
Extrait du cerveau	Cérébrocrinol.
Extrait du placenta	Placentocrinol.
Extrait du foie	Hépatocrinol.
Extrait de l'hypophyse	Hypophysol.
Extrait de la rate	Splénocrinol.
Extrait du cœur	Cardiocrinol.
Etc...	

Présentation. — Pilules dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique (tube de 60). Ampoules injectables en solution huileuse, neutre, indolore, dosées à 0,02 ctgr. d'extrait spécifique par ampoule (boîte de 12).

Mode d'emploi :

Per os : Minimum 9 pilules par jour, en trois prises avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : une injection hypodermique quotidienne ou trihebdomadaire.

Opothérapie associée.

Ovaire-Hypophyse.....	Gynohypophysol.
Ovaire, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Gynopolycrinol.
Glande orchitique, Hypophyse, Surrénale, Thyroïde.....	Andropolycrinol.
Ces deux derniers produits n'existent que sous la forme pilule.	

AUTRES PRÉPARATIONS

Yo-Androl. } Voir à Yo-Androl.
Yo-Gynine. }

OPOPÉDOL (granulé thyroïdien) à l'usage infantile.

ANDRO-GOUTTES fractions hydro et lipo-soluble de la glande orchitique. (Voir à *Andro-Gouttes*.)

GYNO-GOUTTES, solution hydro-alcoolique d'un extrait contenant la totalité des principes actifs de l'ovaire. (Voir à *Gyno-Gouttes*.)

NOVOCORTEX, extrait de la partie corticale de la glande surrénale en gouttes. (Voir à *Novocortex*.)

Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).

Tél. : Alésia 04-39.

OPOTHÉRAPIE LAURIAT ISORGANE

Fabrication LAURIAT (Procédé breveté).

Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

FOIE DE VEAU

Cachets de 0 gr. 50

Dose d'entretien : 1, 2, 3 cachets par jour.

Dose maxima : de 8 à 10 cachets par jour.

Indications. — Anémies graves et pernicieuses. Déchéances organiques. Convalescences. Troubles hépatiques.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

COMPLEXE F

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'ovaires.....	0,10
— d'hypophyses.....	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Arriération féminine. Retard des signes de la puberté. Syndromes adiposo-génitaux. Faiblesses générales. Surdité, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

COMPLEXE H

Cachets de 0,25

Poudre de glande thyroïde.....	0,05
— d'orchitine.....	0,10
— d'hypophyses.....	0,05
— de thymus.....	0,05

Dose normale : 1 cachet matin et soir.

Indications. — Infantilisme masculin. Développement retardé. Syndromes adiposo-génitaux. Surdité. Boîte de 20 cachets : Public : 25 fr. 55.

OVARINE COMPOSÉE

Cachets de 0,10

Poudre d'ovaires.....	0,075
— d'orchitine.....	0,025

Dose normale : 1 cachet matin et soir, 5 jours avant la date présumée des règles.

Indications. — Insuffisance ovarienne. Ménopause. Troubles menstruels. Règles insuffisantes. Aménorrhée. Dysménorrhées, etc.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

Exécution de toutes formules
sous notre propre marque

OPOTHÉRAPIE LAURIAT

ISORGANE

Fabrication LAURIAT (Procédé breveté)
Sans goût. Sans odeur. Conservation indéfinie.

RATE

Cachets de 0,35 (Poudre de rate de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 1 cachet matin, midi et soir.

Indications. — Paludisme. Cachexie palustre. Hypertrophie de la rate. Toutes les anémies. Hémorragies utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

REINS

Cachets de 0,25 (Poudre de reins de porc).

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Accidents urémiques. Insuffisance de l'activité rénale. Néphrites aiguës, infectieuses et toxiques. Brightisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

ORCHITINE COMPOSÉE

Cachets de 0,20

Poudre d'orchitine 0,175

Poudre d'ovaires..... 0,025

Dose d'entretien : 1 cachet matin et soir ; 15 jours par mois.

Indications. — Insuffisance organique. Impuissance fonctionnelle. Débilité sénile. Asthénie musculaire et nerveuse. Infantilisme.

Boîte de 20 cachets. — Public : 21 fr. 30.

MAMMAIRE

Cachets de 0,40 (mamelles de vaches).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Stimulante de la sécrétion lactée chez les nourrices insuffisantes. Régulatrice d'un fonctionnement utéro-ovarien excessif. Congestions utérines.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

THYMUS

Cachets de 0,50 (Poudre de thymus de veau).

Dose d'entretien : 1 à 2 cachets par jour.

Dose maxima : 4 cachets par jour.

Indications. — Maladies de Basedow. Goitre simple. Enfant débile. Troubles de la croissance et de la nutrition.

Boîte de 20 cachets. — Public : 25 fr. 55.

Laboratoires LAURIAT

31, av. Foch — LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

(Tél.: Charlebourg 23-78.)

magistrales (Produits opothérapiques)

"Isorgane". — Voir à Isorgane.

OPOTHÉRAPIE MONCOUR

En Sphérulines, pilules inaltérables et toujours solubles grâce à leur enrobage spécial. A tous les extraits totaux préparés avec des glandes fraîches par dessiccation à froid dans le vide profond.

Dosage. — Suivant les extraits.

Posologie. — 1 à 6 par jour.

Prix : de 16 à 20 francs l'étui de 30 à 60 sphérulines, suivant les extraits et les dosages.

NÉO-SPHÉRULINES MONCOUR

Opothérapie fraîche préparée de suite au reçu de la prescription médicale, avec des glandes fraîches pour être ingérées fraîches.

Préparations datées.

Tous dosages, organes, associations et nombre de prises formulés.

Formes. — Cachets et glutubes.

Posologie. — Thyroïde et hypophyse, dose moyenne quotidienne de 0 gr. 20 à 0 gr. 30. Pour toutes les autres glandes, la posologie moyenne est de 1 gr. de glande par jour.

Laboratoires MONCOUR

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.
(Tél. : Molitor 01-14.)

OPOTHÉRAPIQUES

« CRINEX-UVÉ ;

Nos extraits totaux permettent de traiter efficacement : 1° tous les troubles génitaux, généraux, nerveux ou périphériques liés à un dysfonctionnement ovarien ; 2° tous les troubles d'origine hypophysaire.

Comme des causes pathologiques différentes produisent des syndromes identiques, un même trouble devra, selon l'étiologie, être traité par des produits différents.

Pour chaque syndrome, les produits à essayer successivement sont classés selon l'ordre de fréquence de chaque étiologie.

Les produits sont désignés par des initiales :

A. : CRINEX-OREX (médication Ambohormonale).

C. : CRINEX (ovaire).

F. : FRÉNOVEX (extrait mammaire, corps jaune).

Fl. : FLAVEX (corps jaune).

M. : MÉTREX (utérus).

O. : OREX (testicule).

P. : PANPHYSEX (hypophyse totale).

<i>Acné juvénile</i>	O.
<i>Anorexie</i>	P.
<i>Aménorrhée primitive</i>	P. A. C. O. F.
<i>Aménorrhée secondaire</i>	C. P. O. A.
<i>Asthénies psychiques et somatiques</i>	O. P.
<i>Avortements à répétition</i>	Fl. F.
<i>Castration</i>	A.+M. ou A.+Fl.
<i>Cryptorchidie</i>	P. O.
<i>Dépression nerveuse</i>	O.
<i>Dermatoses (acrocyanose, érythrocyanose, eczéma, etc.)</i> ...	O.
<i>Dysménorrhées</i>	M. C.
<i>Dysménorrhées rebelles</i>	O. A. M.
<i>Engelures</i>	O.
<i>Fibromes, polypes (hémorragies des)</i>	F. Fl.
<i>Frigidité féminine</i>	C. P. F.
<i>Hémorragies utérines</i>	F. Fl.

<i>Hypoplasie utérine</i>	M. A.
<i>Hyperfolliculinie</i> (Troubles par)	Fl. F. O.
<i>Hypergénéralisme</i>	O. F.
<i>Hyperhidrose</i>	O.
<i>Insuffisance hypophysaire totale ou partielle</i>	P.
<i>Maigreur hypophysaire</i>	P.
<i>Mastopathies douloureuses</i> ...	O. Fl. F.
<i>Menaces d'avortement</i>	F. Fl.
<i>Méno-métrorragies de la Puberté et de la Ménopause</i> ...	F. Fl.
<i>Ménopause</i>	C. A. Fl.
<i>Obésité</i>	P. O. C.
<i>Oligoménorrhées primaires</i> ...	A. P. M.
<i>Oligoménorrhées secondaires</i> ...	C. O. P.
<i>Ovarite scléro-kystique</i>	Fl.
<i>Polyménorrhées</i>	F. Fl.
<i>Prurit vulvaire</i>	O.
<i>Puberté</i> (Voir Aménorrhée, Oligoménorrhée primaire)..	
<i>Retard de développement somatique et psychique</i>	P.
<i>Rhumatismes ovariens</i>	C. A.
<i>Stérilité féminine</i>	C. Fl. P. O.
<i>Syndrome adipo-génital</i>	PO. PC.
<i>Troubles psycho-génitaux et neuro-psychiques</i>	O. Fl.
<i>Troubles (légers) de la glyco-régulation (certains)</i>	O. P.
<i>Troubles des métabolismes (eau, graisse, etc.)</i>	P.

Pour la posologie et le mode d'emploi, se reporter à

CRINEX-OREX	FLAVEX
CRINEX	MÉTREX
FRÉNOVEX	OREX
	PANPHYSEX

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue
PARIS (XIV^e).

OPO-VACUOLINE et VACUOLINE-ÉMULSION

Traitement de la Constipation.

L'association de ces deux préparations constitue une médication rationnelle de la constipation et s'adresse à tous les cas.

1° L'une est active : **Opo-Vacuoline** (suc intestinal associé à une émulsion d'huile de paraffine et d'agar-agar-phthaléinée).

Indications. — Constipation chronique ou aiguë, Insuffisance duodénale.

Doses. — 1 à 3 cuillerées à café au milieu des repas.
Prix du flacon : 18 francs.

2° L'autre, émolliente : **Vacuoline-Émulsion** (huile de paraffine émulsionnée à des algues marines, sans laxatif, sans drastique).

Action purement mécanique.

Rééducation intestinale rapide sans irriter.

Indications. — Constipation, Entérite, etc. Préparation excellente pour enfants et nourrissons, recommandée pendant la grossesse et l'allaitement.

Doses. — 1 à 2 cuillerées à soupe au milieu des repas.
Prix du flacon : 15 francs.

Laboratoires DECHOSAL

39, rue Roger-Salengro — BONDY (Seine). (Tél. : 65.)

OPO-VEINOGENE

12 ampoules buvables de 3 cc., à base de vigne rouge, hamamélis, extraits opothérapiques, iode et magnésium.

**Tous les troubles
de la circulation du sang
et de la tension.**

1 ampoule par jour, à jeun.

La boîte de 12 ampoules buvables : 32 francs.

Le Veinogène simple (ovoïdes) est à base d'iodures, bromures, genêt, hydrastis, marrons d'Inde, etc.

La boîte de 40 ovoïdes : 18 fr. 50.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en pharmacie

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 10-23.)

OPOZONES LUMIÈRE

Préparation à base de glande fraîche.

Organothérapie moderne.

Médication des Troubles endocriniens.

Constitution. — Totalité des principes actifs des organes glandulaires frais, éléments chimiques, ferments organiques, albuminoïdes.

Propriétés. — Les dragées d'OPOZONES LUMIÈRE sont obtenues :

1^o Sans déshydratation vraie, par un procédé de pseudo-dessiccation qui dissimule l'eau et tous les liquides de constitution en des complexes cristallins. De ce fait, les OPOZONES LUMIÈRE sont les plus actifs des médicaments opothérapiques s'administrant par voie buccale.

Il est, en effet, avéré qu'un organe qui a perdu 60 p. 100 de son eau de constitution est devenu inactif.

2^o Avec rapidité (inégalisée par tout autre procédé), d'où il résulte que les pollutions et les phénomènes d'autolyse n'ont pas le temps de se produire.

3^o La mise immédiate sous forme de dragées glutinisées et vernies protège les OPOZONES LUMIÈRE contre toute désintégration spontanée, toute oxydation, toute hydrolyse ultérieures et contre l'action destructive d'une attaque brutale par les sucs digestifs.

Les OPOZONES LUMIÈRE, même préparées depuis fort longtemps, demeurent inodores. *Ouvrez une dragée, son contenu n'a pas d'odeur.*

Doses courantes. — Commencer avec une dragée par jour en augmentant graduellement.

Formuler. — Une boîte de 54 dragées d'OPOZONES LUMIÈRE, en spécifiant l'extrait désiré.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villou — LYON

OPTALIDON

Forme et composition. — *Comprimés dragéifiés* renfermant : Isobutylallyl-malonylurée, 0 gr. 050 ; Diméthylaminophénazone, 0 gr. 125 ; Caféine, 0 gr. 025.

Suppositoires : teneur en principes actifs 3 fois plus élevée que pour les dragées.

Propriétés. — Association *antinévralgique*, sédative et hypnagogue. Apaise la douleur sans stupéfier. Aucun danger d'accoutumance. Bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Toutes douleurs, insomnies douloureuses.

Posologie. — De 2 à 6 dragées par jour. Dose hypnagogue dans l'insomnie douloureuse : 2 à 4 dragées 1/2 heure avant le coucher.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Enfants : 1 à 3 dragées ou 1/2 à 1 suppositoire par jour, à partir de 5 ans.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

OPTICURA BENQUÉ

Composition :

Alcool à 90°.....	3 gr. 75
Sulfate de zinc.....	0 gr. 45
Novocaïne.....	0 gr. 30
Pour 100 grammes.	

Indications. — Collyre en flacon compte-gouttes, de conception spéciale. Le liquide ne peut être ni altéré, ni souillé : pas de contact de compte-gouttes ni atmosphérique. Conjonctivite, Blépharite, Larmoiement, Fatigue oculaire produite par le travail à la lumière, par le soleil, par les poussières, par le vent.

Forme. — Flacon compte-gouttes. Les gouttes sont obtenues par la dilatation de l'air dans le flacon, sous l'influence de la chaleur de la main.

Posologie. — Une goutte dans chaque œil deux ou trois fois par jour.

Prix : 13 fr. 75. — L. N. C. M., n° 516-6.

Laboratoires du Docteur BENQUÉ et Fils,
Pharmaciens

16, rue Ballu — PARIS (IX°).
(Tél. : Trin. 85-60.)

OPTIPLASTE

Composition. — Sparadrap caoutchouté au ZnO.

Forme. — Occlusive ou perforée, en rouleaux de :
1 m. de long de 1 à 5 cm. de large ;
5 m. de long de 1 à 20 cm. et plus de large.

Avantages. — Adhésivité parfaite, aucune irritation de la peau, grande facilité à l'enlèvement, longue conservation dépassant largement celle habituellement admise pour les produits similaires, aucune odeur.

Indications. — Contention des pansements ; pansements de tractions, d'extensions, etc...

Laboratoires FISCH et C^{ie}, S. à. r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X°).
(Tél. : Trudaine 92-52.)

OPTO SCOTT

Produits Ophtalmiques Scott :

Opto-Gouttes. — Opto-Tubes. — Opto-Bain. — Opto-Borine.

Notre but : 1° Constance absolue de nos préparations.

2° Asepsie rigoureuse.

3° Groupement de l'arsenal ophtalmologique en un seul mot : *Opto-Gouttes, Opto-Tubes, Opto-Bain, Opto-Borine.*

4° Présentation toute nouvelle correspondant à la perfection pour chacun de nos produits :

<i>Opto-Gouttes</i> : le flacon spécial	12 fr. 80
<i>Opto-Tubes</i> : le tube spécial à canule	7 fr. 40
<i>Opto-Bain</i> : l'ocillère spéciale	18 —
<i>Opto-Borine</i> : le sachet antiseptique.....	10 —

Opto-Gouttes :

N° 1 Sulfate neutre d'Atropine	1	p. 100
N° 2 Nitrate de Pilocarpine.....	2	p. 100
N° 3 Argyrol	3	p. 100
N° 4 Sulfate de zinc	0,5	p. 100
N° 5 Sulfate de zinc	1	p. 100
Novocaïne	1	p. 100

Opto-Tubes :

N° 1 Oxyde jaune de Mercure	1	p. 100
N° 2 Ichtyol	2,5	p. 100
Oxyde de zinc	5	p. 100
N° 3 Iodure de Sodium.....	3	p. 100
Chlorure de Calcium.....	2	p. 100
N° 4 Cuprol	1	p. 100

Opto-Bain :

Tannin à l'éther.....	0 gr. 05
Sulfate de cuivre	0 gr. 05
Sulfate de zinc	0 gr. 10
Acide salicylique	0 gr. 25
Acide borique	1 gr.
Borate de soude	5 gr.
Bau distillée d'hamamélis	150 cc.
Eau distillée.....	Q. S. P. 500 cc.

Opto-Borine :

Acide Borique	1 gr.
Borate de soude	1 gr.
Fluorescéine : Q. S.	
Essence de lavande : Q. S. par sachet.	

Produits enregistrés au L. N. C. M.

A. W. B. SCOTT pharmacien.

348, rue Saint-Honoré — PARIS (1^{er}).

(Tél. : Central 90-85.)

OPTRAEX (Bain oculaire).

Composition. — Extraits végétaux : Hamamélis, borates, etc...

Propriétés. — Décongestif, antiseptique léger, vaso-constricteur, régulateur circulatoire. Sans aucun toxique.

Indications. — Inflammation de la conjonctive et des paupières. Surmenage oculaire. Préventif pendant les maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — De 1 à 3 bains par jour, selon les cas, en utilisant l'œillère fournie avec le flacon. Durée de chaque bain : une minute environ.

Prix. — Le flacon ordinaire : 13 fr. 50 ; double : 20 fr. 40 ; hôpital : 36 fr. 70. Impôt compris.

Laboratoires P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

ORARGOL-AMICROS

Complexe colloïdal électrique or et argent.

Anti-infectieux général.

1° ORARGOL INJECTABLE (0,05 p. 100).

Boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 23 francs.

Tube de 1 ampoule de 10 cc. : 9 francs.

Indications. — Septicémies, Grippe, Fièvres. Traitement pré et post-opératoire.

Posologie. — 5 à 20 cc. intramusculaires ou intraveineux, tous les jours ou tous les 2 jours. Chez les enfants, 1 cc. par année d'âge. Dès le début d'une infection, seul ou combiné à la vaccino ou sérothérapie.

2° ORARGOL NON INJECTABLE (0,1 p. 100).

Voir *Gouttes d'Orargol, Rhino-Orargol.*

COLLYRE-ORARGOL

Solution isotonique à 0,2 p. 100.

Boîte de 4 ampoules ou flacons compte-gouttes : 17 francs.

Toutes les indications de l'Argent colloïdal en ophtalmologie.

Laboratoire AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS.

ORCALCINE

(Granulé)

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Régénérateur complet du sang et recalifiant intégral. Véritable régénérateur organique. Résultats cliniques remarquablement constants et durables.

Composition. — Extraits hépatiques et spléniques concentrés 33 fois.

- + Fer, Phosphore, Calcium.
- + Chlorophylle et Carotène.
- + Sels d'or à dose homéopathique.

Posologie :

Enfants : 2 cuillerées à café par 24 heures.

Adultes : 2 cuillerées à dessert par 24 heures.

Prix : 19 fr. 75 (pour 15 jours de traitement).

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires de l'Orcalcine

9, rue de la Platière — LYON. (Tél. : Burdeau 66-45.)

OREX

Médication orchitique à formule dissimulée pour prescription chez la femme ou chez l'homme.

Composition. — Extrait orchitique total standardisé (procédé Biosymplex), contient toutes les hormones du testicule.

Gouttes : Solution hydro-alcoolique, 1 cc. (40 gouttes) correspond à 2 gr. de glande fraîche.

Dragées à croquer : 1 dragée = 5 gouttes.

Ampoules injectables : Solution aqueuse isotonique, indolore. 1 cc. correspond à 2 gr. de glande fraîche.

Mode d'action :

Chez la femme, il rétablit l'équilibre ambocriné, freine l'hypersécrétion folliculaire.

Chez l'homme, stimule ou remplace la sécrétion orchitique déficiente.

Dans les deux sexes, exerce un effet tonique sur le psychisme ; régularise les métabolismes.

Indications :

Chez la femme. — Certains troubles menstruels ou généraux par déséquilibre ambocrinien rebelles à l'opothérapie homologue ; Hyperfolliculinie, certaines Aménorrhées, Stérilité, Mastite chronique, Ménopause, Castration, etc...

Troubles cutanés et trophiques d'origine génitale : Prurit vulvaire, Eczéma, Acné, Engelures, Acrocyanose, Hyperhidrose, Livedo, etc...

Troubles psychiques d'origine génitale : Irritabilité, Insomnies, Perte de mémoire, Sénilité précoce, Psychasthénie, Nymphomanie, *Troubles psycho-sexuels* (célibat de fait).

Chez l'homme. — Retard intellectuel, Psychasthénie, Surmenage nerveux et intellectuel, Sénilité précoce, Hypertrophie de la prostate.

Posologie :

Gouttes : Doses moyennes quotidiennes : 20 à 50 gouttes (hommes) ; 20 à 30 gouttes (femmes), en 2 ou 3 prises, 1/2 heure avant les repas, dans 1/2 verre d'eau.

Dragées : 4 à 10 (hommes), 4 à 6 (femmes) par jour, croquer et non avaler.

Ampoules injectables : Tous les jours ou tous les 2 ou 3 jours, suivant les cas, injecter une ampoule seule ou associée à l'autohémothérapie, méthode qui renforce notablement l'activité du produit.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-4.

Prix :

Gouttes ou dragées.....	18 fr. 55
Boîtes de 6 ampoules.....	31 fr. 80

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).
(Tél. : Alésia 28-51.)

OREXYL

Spécifique des maladies de la nutrition et le plus actif des reconstituants, ranime l'appétit.

Composition. — Persulfates alcalins, métavanadate de soude, fluorure de sodium, tannate d'orexine, glycérophosphate de chaux.

Formes. — Granulé et comprimés.

Indications. — L'OrexyL est indiqué dans tous les cas où il s'agit d'augmenter la nutrition et de relever l'état général de l'organisme : Inappétence, Neurasthénie, Anémie, Asthénie, Grossesse, Convalescence, Bacillose pulmonaire, Surmenages, physique ou intellectuel, Fractures, Convalescences.

Posologie. — *Enfants* : Une cuillerée à café de granulé dans un peu d'eau, quelques instants avant les deux principaux repas, ou un comprimé. *Adultes* : Une cuillerée à soupe de granulé, ou deux comprimés à avaler avec un peu d'eau, avant chaque repas.

Prix : Le flac., granulé : 20 francs., 15 j. de trait. p. enfants.
comprimés : 22 fr. 95, 15 j. de trait. p. adultes.

L. N. C. M. N° 714-16.

Paul PHILIPPE

Docteur en Médecine — Pharmacien de 1^{re} classe.
5, rue Mazarin — LYON (Rhône). — (Tél. : Franklin 76-20.)

ORGANESIUM

Médication stimulante — Tonique — Réparatrice — Association Opo-minérale.

Forme : Granulé de goût agréable.

Formule :

Lobe antérieur hypophyse.....	0, 15
Extrait de glandes orchitiques.....	1, 20
Extrait de glande interstitielle.....	0, 40
Inosito-hexaphosphate de magnésium et de calcium.....	3, 00
Nucléinate de magnésium.....	0, 125

Excipient, Q. s. pour 100 gr.

Prix : 20 fr. 80 la boîte.

Action et indications thérapeutiques.

- 1° *Action stimulante sur l'état général.* — Anémies, convalescences, états dépressifs, surmenage physique.
- 2° *Action tonique sur le système nerveux et neuro-musculaire.* — Troubles nerveux, asthénie, fatigue cérébrale et certains phénomènes séniles, tremblements, crampes, contractures.
- 3° *Action reminéralisante et fixatrice du calcium.* — Croissance, rachitisme, convalescence des maladies infectieuses.

Doses :

Enfants. — 1 cuillerée à café.

Adultes. — 1 cuillerée à soupe avant les deux principaux repas.

Mode d'emploi. — Mettre directement la cuillerée de granulé dans la bouche en une ou plusieurs reprises, avaler ensuite une gorgée d'eau.

Echantillon sur demande. — Grossistes dépositaires O. C. P. et C. N. P. f.

Laboratoires DOUETTEAU Frères

20, faubourg Saint-Honoré — PARIS

ORGANI-CALCION ENDOCRINIEN POLYVITAMINÉ

Opothérapie stimulante.

Granulé de Calcium soluble et Phosphore organiques associés à une synergie glandulaire et aux vitamines A, B et D. Assimilable par voie gastrique. Association médicamenteuse très active, répondant aux plus récentes données de l'endocrinologie et de la biologie.

Indications. — Déficiences glandulaires, neurasthénie, pré-carences (troubles entéritiques, asthénie, anémie). Rachitisme, fractures, carie dentaire, troubles de la croissance. Toutes déminéralisations, convalescence, surmenage, débilité, Grossesse, allaitement, Tuberculose, Rhumatisme chronique, Aérophagie.

Posologie. — *Nourrissons* : 1/2 cuillerée à café par jour; *enfants* de 1 à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café; de 5 à 10 ans : 3 cuillerées à café; *adultes* : 3 cuillerées à dessert. A croquer (goût agréable) ou à délayer.

Aucune contre-indication : ni arsenic, ni strychnine, ni surrénales, ni thyroïde.

Prix : 21 fr. 30. (Durée minimum 10 jours.)

Laboratoire National de Contrôle, 196-3.

Laboratoires du VIOPHAN

91, rue de Monceau — PARIS (8^e).

ORGANI-CALCION SIMPLE

(Gluconate de Ca français).

Ne possède pas les inconvénients du chlorure de calcium (saveur désagréable, phénomènes d'acidose).

Utilise au maximum, grâce à sa combinaison organique, les propriétés thérapeutiques du Ca ionisé.

Son emploi est curatif et préventif : Hémostatique, coagulant. Hémorragies : opératoire, gastrique, intestinale, pulmonaire, menstruelle. Déchlorurant-diurétique (oedème, ascite, albuminurie, néphrite). Antitoxique (intoxication gastro-intestinale avec dermatoses). Anticlasique : réactions sériques, urticaire, rhume des foins, asthme. Recalcifiant : Grossesse, allaitement, tuberculose.

Troubles vago-sympathiques : hypervagotonie, spasmodie, tétanie, etc.

A noter que l'Organi-Calcion augmente considérablement l'effet thérapeutique de la médication thyroïdienne.

Boîtes de 30 cachets dosés à 0 gr. 50 (2 à 10 par jour).

Prix : 16 fr. 30.

Forme injectable :

Boîtes de 5 ampoules 5 cc. : 16 fr. 30.

Laboratoire National de Contrôle 196-4 et 5.

Laboratoires du VIOPHAN

91, rue de Monceau — PARIS (8^e).

ORGANO-STHÉNOLÉINE

DU DOCTEUR L. DELALBRE

EX-STHÉNOLÉINE

PRÉPARATION

OPOTHÉRAPIQUE ET CHIMIOTHÉRAPIQUE
non toxique

RÉPARATRICE DES ORGANISMES AFFAIBLIS
pour

MÉDICATION HUMORALE IMMUNISANTE

curative et préventive

DANS TOUTES LES INFECTIONS MICROBIENNES
(générales, pulmonaires et autres localisations)

PRÉSENTÉE sous forme d'AMPOULES INJECTABLES

- COMPOSITION -

Cholestérine pure.....	0 gr. 02	Camphre.....	0 gr. 02
Lipoïde de Bile.....	0 gr. 001	Essence de Niaouli.....	0 gr. 02
Lipoïde de Rate.....	0 gr. 02	Gaïacol.....	0 gr. 01
Cinnamate de benzyle pur.....	0 gr. 01		
	pour 1 c.c.		

Excipient : Huile d'olive surtine, soigneusement épurée et lavée à l'alcool,
délivrée en **AMPOULES de 5 cc. à 2 pointes.**

Chaque ampoule de 5 cc. contient 5 fois les doses ci-dessus.

- INDICATIONS THÉRAPEUTIQUES -

L' "Organo-Sthénoléine" a pour but la défense de l'organisme
contre les invasions microbiennes

en permettant à celui-ci d'acquérir artificiellement une véritable
tolérance ou immunité vis-à-vis de tous les germes infectieux, par ren-
forcement du pouvoir antitoxique du sang (action de la Cholestérine,
extraite des cervelles de mouton) et par modification des milieux hu-
moraux (action du Cinnamate de benzyle, retiré du baume du Pérou).

Cette dernière action entraîne une forte hyperleucocytose et, dans les
poumons, la création de tissu conjonctif réparateur et protecteur.

DEUX INDICATIONS GÉNÉRALES

États déficients : Convalescences, Lymphatisme, Prétuberculose, etc.

Grandes infections : rippe, Typhoïde, Pneumonie, Tuberculose, etc.

----- TRÈS RARES CONTRE-INDICATIONS -----

- MODE D'EMPLOI ET DOSES -

L'injection, toujours indolore, se fait dans les muscles (fesse ou cuisse).

Jamais la moindre réaction ; toutefois mieux vaut l'injection lente.

DOSES MOYENNES POUR 48 HEURES

ADULTES :

Une injection d'une ampoule de 5 cc. tous les 2 jours (prati-
quement trois injections de 5 cc. par semaine) jusqu'à con-
currence de 24 injections de 5 cc. au minimum en 2 mois.

Pour la durée du traitement (2, 4 ou 6 mois consécutifs) et pour doses
supérieures (5 ou 10 centic. par jour), se conformer aux indications du
Médecin.

ADOLESCENTS

4 cc.

ENFANTS

1 à cc.

NOURRISSONS

1/2 à 1 cc.

PRIX AU PUBLIC : 29 fr. 60 LA BOITE de 8 AMPOULES

LABORATOIRES DU DOCTEUR L. DELALBRE

PRODUITS PHARMACEUTIQUES SPÉCIALISÉS

2, rue Claude-Matrat, ISSY-les-MOULINEAUX (Seine).

(Tél. : Michelet 24-11.)

ORGANOTIOL S. S.

Soufre naturel organique non oxydé.

Dérivé Thiophénique naturel soluble dans l'eau. *En gouttes ou en injections.*

Composition. — Le Méthyl Propyl Thiophène Sulfonate de Soude est un Soufre vital fossilisé extrait de dépôts organiques riches en Planktons. Ce Soufre se présente sous la forme Thiophénique naturelle, c'est-à-dire la plus apte à l'absorption par l'organisme.

L'*Organotiol* est atoxique, sans choc et parfaitement assimilable. Aucune contre-indication.

Indications. — Les Carences soufrées. Rhumatismes aigus et chroniques, Catarrhes oto-rhino-trachéo-bronchiques, Bronchorrhées Bronchites chroniques des arthritiques, Dilatation des bronches, Localisations subaiguës inflammatoires articulaires ou péri-utérines, Ictères infectieux, Surrénalites, Diathèses colloïdo-clasiques, Accumulations métalliques Hg, Bi, As, Acnés, Eczémas, Psoriasis.

Formes. — L'*Organotiol S. S.* existe sous deux formes:

1° En flacon de 30 cc., forme gouttes ;

2° En boîte de 6 ampoules de 5 cc. injectables.

Forme gouttes (formule) :

Méthylpropylthiophène sulfonate de soude	13 gr. 33
Essence d'orange	1 gr. 65
Alcool à 95°	8 cc.
Eau distillée, Q. S. pour	100 gr.

Posologie. — > L gouttes d'*Organotiol S. S.* contiennent 0 gr. 4 de méthylpropylthiophène sulfonate de soude, soit : 0 gr. 06 de Soufre organique naturel.

Dose :

Adultes : Prendre à chacun des 2 repas XV à XX gouttes dans un verre d'eau sucrée (XXX à L gouttes par jour).

Enfants : demi-dose.

Pour la numération des gouttes, se servir de la pipette graduée.

Forme injectable (formule) :

Méthylpropylthiophène sulfonate de soude.....	0,04
Glucose desséché	0,03
Eau bi-distillée, Q. S. pour	1 cc.
Chaque ampoule de 5 cc. contient 0,20 de méthylpropylthiophène sulfonate de soude et 0,052 de Soufre organique non oxydé.	

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. par jour en injections sous-cutanées profondes, indolores, atoxiques. Injecter lentement. Aucune contre-indication.

Enfants : demi-dose.

Prix en France :

<i>Organotiol S. S.</i> en gouttes, le flacon.....	22 fr. 45
6 ampoules de 5 cc	23 fr. 45

Laboratoires de Spécialités scientifiques LOGEAS

Produits Pharmaceutiques LOGEAS

J. GOBERT, Pharmacien,

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE

(Tél. : Auteuil 40-15, 40-16.)

ORTÉDRINE

Sulfate de phényl 1-amino 2-propane.

Composé organique stimulant l'activité du système orthosympathique et du système nerveux central.

Indications. — **Dépressions physiques et psychiques.** Maladies de Parkinson post-encéphalitique, Narcolepsies, Hypersomnies.

Présentation et posologie. — Tubes de 20 comprimés dosés à 0 gr. 005 (divisibles en deux). Posologie variable suivant les sujets. Posologie variable suivant les cas. Commencer par 1 comprimé et augmenter, au besoin, par 1/2 comprimé, la dose totale journalière étant généralement comprise entre 1 et 3 comprimés.

L'ortédrine doit être absorbée de préférence le matin.

Prix de vente : Le tube de 20 comprimés, 12 fr.
Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

ORTHOCYNOL

Dragées.

Médication de *stimulation hépato-spléno-rénale* à base de *Cynara*, d'*Orthosyphon*, d'*acide ascorbique* (Vitamine C) et de *Quinquina*.

Propriétés. — Sollicite les sécrétions hépato-biliaires, Mobilise et élimine la cholestérine en surcharge. Active les sécrétions rénales (aqueuse, azotée, chlorurée). Combat la sclérose viscérale et l'arthritisme. Corrige les dyscrasies sanguines.

Indications. — Insuffisance hépatique (ictère, troubles digestifs, manifestations cutanées, troubles liés à l'imperméabilité rénale).

Foie colonial. Brightisme Oligurie. Hépato-néphrites aiguës. Scléroses viscérales et vasculaires. Diathèse arthritique. Diathèse hémorragique. Trouve ses applications tant en médecine d'adulte qu'en chirurgie et en pédiatrie.

Posologie. — De 6 à 12 dragées par jour, au cours des repas avec une tasse d'infusion chaude 1/2 dose pour les enfants.

Cure : 10 à 20 jours par mois.

Laboratoires R. BOUTIN

Pharmacien, ex-interne des Hôpitaux de Paris.

8, rue Aumont-Thiéville — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 09-63.)

ORTHO-GASTRINE

Formule:

Sulfate de Soude anhydre	0 gr. 25
Phosphate de Soude anhydre	0 gr. 25
Bicarbonat de Soude.....	0 gr. 10
CITRATE de Soude	0 gr. 10

Pour 1 paquet n° 30.

Avantages. — Sels purs et anhydres, absolument conformes au Codex. Chaque prise donne un verre à Bordeaux de solution limpide et facile à boire même pour les enfants, toujours stable comme goût et composition.

Indications. — Toutes celles de la solution alcalino-sodique dite de Bourget. Insuffisance sécrétoire du foie et de la vésicule biliaire. Dyspepsie, Gastralgie, Hyperchlorhydrie, Entérite, Intoxication alimentaire, etc.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 paquets par jour.

Enfants (sucrer légèrement) de 6 mois à 1 an 1/2 : 1 paquet par jour dans le lait et les bouillies.

De 1 à 3 ans : 1 paquet par jour.

Prix : 10 francs.

Laboratoire A. LEBLOND

Pharm. de 1^{re} classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36).

ORTHOGÉNOL

**Traitement de Base des Maladies
de l'Age mûr.**

**Formule de redressement biologique (1)
du Docteur A. VERNIER**

Composition. — Phosphore, Magnésium, Manganèse, Silice, Soufre, Lithine, Diurétine, Scille, Ac. Thyminique (solv. urique physiol.)

+ Opothérapie homostimulante, substitutive et régulatrice : Foie, Hypophyse antér., Thyro-Parathyroïdes, Glande interstitielle mâle, Sur-rénale (privée d'adrénaline).

— Régénérations cellulaires. Réactivation physiologique. Dépuration.

Indications. — Déficiences organiques et fonctionnelles qui constituent l'usure physiologique. Troubles biologiques intriqués de l'Involution sénile normale ou pathologique. Age critique des deux sexes. Arthritisme, Artériosclérose, Rhumatismes (2), Diabète, Obésité, Azotémie, Anuries médicales.

Présentation. — Deux formes : *Cachets* et *Élixir*.

Posologie. — L'ORTHOGÉNOL, traitement de Base, se prescrit à la dose minima, longtemps soutenue, de 3 cachets ou cuillerées à soupe d'élixir par jour. Dans les grandes *Anuries* (avec Anasarque, Hydropisie, Asystolie), cette posologie doit être doublée pour obtenir fidèlement les Débâcles libératrices sous l'action conjuguée des *Dépureurs tissulaires*, des *Diurétiques rénaux* et des facteurs *Endocriniens* de la Diurèse (1).

(1) Sénescence et morbidité sénile, M. Mazauric (*Thèse de Montpellier*, 1931).

(2) Dermo-révulsion par effleurage « en raies de feu ». *Le Polycautére du Dr Vernier*, R. Grégoire (*Thèse de Montpellier*, 1933).

Prix : 38 francs.

Laboratoires BELIÈRES
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

ORTHOLAXINE

Présentation. — Dragées à noyau central glutinisé sous un revêtement se dissolvant dans l'estomac.

Composition.

Revêtement externe soluble dans l'estomac.	Extrait de Cascara Sagrada privé d'amertume.....	0gr.035
	Extrait de bourdaine.....	0gr.050
	Poudre d'aloès.....	0gr.025
	Evonymine brune.....	0gr.015
	Extrait de belladone.....	0gr.005
Noyau central ne se dissolvant que dans l'intestin.	Poudre de belladone.....	0gr.005
	Poudre de muqueuse d'intestin grêle.....	0gr.05
	Extrait inaltérable de fiel de bœuf.....	0gr.05
	Extrait pancréatique.....	0gr.03
	Ferments lactiques.....	0gr.05
	Essence d'anis.....	0gr.025

Action physiologique — Laxatif doux ne provoquant aucun spasme ni colique, aucune irritation ni accoutumance.

Indications. — La *Constipation* chronique ou passagère, sous toutes ses formes, avec toutes ses conséquences habituelles : affections gastro-hépatiques, entérites, maladies de la nutrition, arthritisme, migraines, affections cutanées, hémorroïdes, syndrome entéro-rénal, etc.

Posologie. — Comme laxatif habituel, une ou deux dragées avant le dîner (une ou deux dragées supplémentaires dans les cas de constipation rebelle).

Prix : 17 francs l'étui de 36 dragées.

Laboratoires GRIMAULT

V^e L & C^{ie}, successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène
8, rue Vivienne — Paris (11^e). (Tél. : Gut. 27-3.)

ORTHONEUROL

Stimulant physiologique général.

Formule :

Acide phosphorique.....	20 gr.
Glycérophosphate de soude	18 —
Glycérophosphate de magnésie ..	3 —
Glycérophosphate de manganèse .	2 —
Sérum physiologique... Q. S. P.	100 —

Indications. — *Tonique nervin. Stimulant général* qui trouve son application dans tous les cas de *Faiblesse générale et nerveuse, Convalescence, Surmenage, Neurasthénie, Phosphaturie, Alcalose, etc.*

Forme. — Gouttes.

Posologie. — XX gouttes à chaque repas dans la boisson.
Enfants : demi-dose.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Prix au public : 16 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoires SOURIGUÈRE

ANGOULÊME (Charente).

(Tél. : 2-42.)

ORTHOPHORINE

Composition. — Granulé soluble, d'un goût agréable sans acidité brutale, pouvant se croquer pur.

Acide orthophosphorique	7 gr.
Phosphate disodique crist.	14 gr.
Sucre	20 gr.
Lactose	Q. S. P. 100 gr.

Une cuillerée à café = VI gouttes PO⁴ H³ libre.

Indications. — Troubles de la nutrition. Lithiase phosphatique, Etats alcalosiques, Dermatoses, Dyspepsie, Céphalées, Prétuberculose, Phosphaturie, Déminéralisation, Oxalémie, Arthritisme, Anémie.

Tonique du système nerveux. Asthénie, Mélancolie, Surmenage physique et intellectuel.

Mode d'emploi. — Se prend au milieu des repas, pure ou dans un peu d'eau.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1/2 dose.

Prix : Traitement pour 7 jours, 16 francs.

Laboratoires A. LEBLOND

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

ORTHOSIPHÈNE

Composition. — Solution concentrée et titrée des principes actifs extraits des feuilles de l'*orthosiphon stamineus*, sans toxicité.

Propriétés. — *Médicament hépato-rénal, stimulant de la dépuratation urinaire, abaisse le taux de l'urée sanguine, Antiurique, Désintoxicant.*

Forme. — Extrait aqueux en ampoules buvables de 10 cc. (Boîte de 8 amp.). contenant tous les principes actifs de 6 gr. de feuilles sélectionnées de plante.

Indications. — A prescrire au cours des Insuffisances hépato-rénales, Azotémie, Uricémie, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Affections cardio-vasculaires.

Posologie. — Diluer le contenu d'une ampoule dans un demi-litre d'eau, sucrer à la convenance la tisane ainsi préparée, l'absorber en 4 ou 5 prises au cours de la journée, et dans l'intervalle des repas.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie

20, rue des Fossés-St-Jacques — PARIS.

OSMOLÉINE

Pommade stérilisée antiseptique pour pansement de la muqueuse des fosses nasales.

Composition. — Camphre, Benzoate de soude, Soufre précipité, Acide borique, Mentholtraces, Essence de géranium rosat.

Propriétés. — Désinfection de l'auvent nasal, de la filière nasale jusqu'à sa partie postérieure.

Indications. — Toutes les affections subaiguës ou chroniques des fosses nasales : l'ozène avec sécrétion et croûtes fétides, les séquelles de sinusite maxillaire et frontale.

Emploi. — Après avoir mouché l'une et l'autre narine alternativement, mettre le volume d'un pois dans chaque narine 3 ou 4 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec embout fixe

Prix : 8 fr. 70.

L. N. C. 314-35.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS.

OSMO-PEPTINE SANOVA

Comprimés destinés à donner une solution osmotique qui dialysera la muqueuse stomacale, la cellule hépatique et la vésicule biliaire.

Formule par comprimé :

Sulfate de Soude.....	0,14
Sulfate de Magnésie.....	0,14
Sesquiphosphate de Soude.....	0,04
Bromure de Sodium.....	0,05
Peptone.....	0,02
Bicarbonate de Soude.....	0,10

Champ d'action : Tous les troubles de l'estomac, du foie et de la vésicule.

Principales indications. — Hyperchlorhydrie, dyspepsies, fermentations, ballonnement, digestions pénibles, migraine, urticaire, surmenage alimentaire, neurasthénie dyspeptique, ulcères, gastropathies hépatiques et biliaires, constipation.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés à jeun dans un verre d'eau chaude. Petit déjeuner 1 heure après. Pendant 12 à 15 jours consécutifs chaque mois ou tous les 2 matins en alternant avec un comprimé d'Hépatisme le soir en dînant.

En cas de brûlures, de lourdeurs ou de malaises de l'estomac, on peut, dans la journée, croquer 3 ou 4 comprimés si on n'a pas d'eau chaude.

Prix : 14 fr. 25 le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT, 103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

OSMO-VACCINS BRÉANT COLIBACILLES

Vaccins par voie buccale, par pansements ou par instillations vésicales.

Composition. — 200 milliards de germes:

Colibacilles.....	150 milliards.
Entérocoques.....	30 —
Bacillus proteus.....	10 —
Staphylocoques.....	10 —
Endo et exotoxines en milieu osmotique.	10 cc.

Indications. — Infections intestinales (colites, entérocolites, etc.), Syndrome entéro-rénal, colibacillurie, soins pré et post-opératoire, etc...).

Posologie. — Une ampoule, le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau.

Boîte de 8 ampoules de 10 cc..... 37 fr. 50

Boîte cure de 18 ampoules de 10 cc 52 fr.

N. B. — Existent:

Les **Osmo-Vaccins Bréant Gynécologiques.**

Les **Osmo-Vaccins Bréant Rhino** (ampoules).

Les **Osmo-Vaccins Bréant Staphylo** (ampoules).

LABORATOIRES D'ANALYSES BRÉANT

11, rue de Clichy. — PARIS. (Tél. : Trinité 23-84.)

OSSYL

Reminéralisateur et reconstituant vivant directement assimilable.

Composition et propriétés. — *L'oude d'os frais, non calcinés (os fœtaux).* — Produit vivant à maximum d'activité, contient les vitamines naturelles.

Inosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie. Phosphore organique naturel, extrait de l'embryon de blé. Contient les Vitamines A et B.

Nucléinate de manganèse. — Provoque une réaction de défense hyperleucocytaire.

Silicate de magnésium — Agent de reminéralisation et d'ossification.

Fluorure de calcium. — Reminéralisateur. Stabilise la cellule nerveuse. Règle le fonctionnement des glandes endocrines.

Poudres de surrénale et de thymus. — Anti-toxique et anti-rachitique.

OSSYL renferme les vitamines : A. B. E. G. P.

Indications : Troubles de croissance, rachitisme, fractures, états pré-tuberculeux, tuberculose, grossesse, lactation, anémie, convalescence.

Forme et posologie : Cachets et granulé fondant à prendre au début des repas.

Adultes : 3 cachets par jour ou 3 cuillerées à dessert.

Adolescents : 2 cachets par jour ou 3 cuillerées à café.

Enfants : 2 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix : Cachets : 17 francs. — Granulé : 18 francs.

Enreg. au L. N. C. M. Nos 1542-1 et 1542-2.

Laboratoire de l'OSSYL

D^r F. VASSEUR, Ph^a, Ancien chef de Labor. - GLAGEON (Nord). Tél. 20

OSTÉOPEPTINE

Composition. — Poudre de moelle osseuse rouge. Pepsine extractive. Phosphate tricalcique.

En dragées chocolatées, facilement acceptées par les enfants.

Indications. — Dyspepsie et anorexie infantiles. Insuffisance de poids et de taille. Convalescence des maladies infantiles aiguës.

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour avant les repas.

Prix : 18 fr 35 la boîte de 30 comprimés.

LES LABORATOIRES DRAPIER

RETHEL (Ardennes). (Tél. : 0-19.)

OSTRÉIODE

Eau de mer, biologiquement suriodée; procédé Salles-D^r Loubatie.

Composition. — Eau de mer naturelle iodoactivée par un procédé respectant les lois de la nature et le cycle de l'iode dans les océans.

Présence de quantités d'iode importantes par rapport à la teneur en iode du milieu marin et sous ses diverses formes dont la forme thyroïdienne.

Teneur : 80 milligrammes par litre, d'iode assimilable.

Indications. — Lymphatisme sous toutes ses formes. Croissances difficiles. Asthénie des convalescents. Inappétences. Dépressions. Anémies. Grossesse. Rachitisme. Dysthyroïdies.

Toutes les cures marines à domicile.

Posologie. — *Adultes* : 4 cuillerées à bouche par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Enfants au dessous de 5 ans : 2 cuillerées à dessert.

Au début des repas, pure ou dans un liquide tiède ou froid. (Eau, lait, bouillon).

Prix : 20 fr. 80 le flacon d'un demi-litre.

OSTRÉIODE Injectable

Composition. — Eau de mer iodoactivée biologiquement par le procédé Salles-D^r Loubatie. Procédé permettant le maintien de la vie marine en milieu directement isotonique, au sérum sanguin.

Teneur en iode : 50 milligr. par litre.

Indications. — Toutes les indications du traitement marin enrichi en iode vital. Effets extrêmement rapides dans les carences minérales.

Prétuberculose, rachitisme, croissance, lymphatisme, suites opératoires, surmenage, anémies secondaires, infections, convalescences, paludisme, séquelles coloniales.

Mode d'emploi. — Série de 8 injections — une tous les deux jours. Voie sous-cutanée. Interrompre 10 jours et reprendre.

Présentation. — Boîte de 8 ampoules de 10 cc.

Prix : 31 fr. 20.

Laboratoires de l'OSTRÉIODE

J. SOUTERBICQ, Pharmacien

344, boulevard de la Plage — ARCACHON

(Tél. : 0.64.)

Agent général de vente : S. I. T. S. A.

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).

OSTRICALCIUM

Remède de base dans le traitement de tous les états de déminéralisation, dans les asthénies et les convalescences.

Ostricalcium présente une microdose d'origine biologique de calcium assimilable accompagnée de ses facteurs de fixation (parathyroïdes). L'assimilation est également favorisée par l'apport des vitamines A, E, B₁, B₂, etc. Enfin les éléments énergétiques : extraits de céréales, levure de bière, complètent l'action certaine d'Ostricalcium.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, Rachitisme, Croissance, Convalescence, Allaitement, Amaigrissement, Carie dentaire, Fractures, Grossesse, Asthénie, Fatigue cérébrale, Phosphaturie, Asthénie post-infectieuse, Surmenage scolaire.

Posologie :

Comprimés : 2 à 3 comprimés avant les deux principaux repas.

Granulés : Enfants :

Jusqu'à 2 ans : 1 cuillerée à café le matin.

De 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café matin et soir.

De 5 à 10 ans : 1 cuillerée à café aux trois principaux repas.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café avant les deux principaux repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1820-6

Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BÉTHUNE.

OTALGOLEX

Tube Instillateur de soluté neutre glyciné rendu adhésif au tympan par un procédé spécial.

Composition. — Sol. d'adrénaline, stovaine, eau de laurier-cerise, borate de soude, glycérolé d'amidon, glycérine chimiquement pure.

Propriétés. — Analgésique des affections auriculaires, antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Otites catarrhales, otites aiguës et subaiguës, otalgies, myringites.

Mode d'emploi. — Plonger le tube bien fermé dans un bol d'eau tiède pendant 2 minutes, puis instiller 3 fois par jour dans le conduit auditif IV à V gouttes en maintenant la tête inclinée vers l'épaule opposée pendant 5 minutes.

Prix du tube : 12 francs
pour 15 jours de traitement.

Dépôt général pour la France.

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12°).

OTODRAINS

Mèches capillaires de drainage pour oreilles, stérilisées en milieu humide à 120°.

Forme. — Mèches cylindriques hydrophiles à mailles lâches, uniquement longitudinales, permettant le drainage par capillarité des sécrétions les plus visqueuses.

Présentation. — Présentés en boîtes métalliques de 24 mèches disposées par 4 dans des sachets cellulés.

Pour l'approvisionnement médical, il existe des boîtes de 100 mèches aseptiques en vrac, à prix médical.

Mode d'emploi. — Introduire la mèche dans le conduit avec une pince, sans tasser. Renouveler tous les jours, ou plus fréquemment selon l'écoulement.

Indications. — Otites, oto-mastôidites, et généralement toutes les fois qu'il y a lieu de réaliser un drainage otologique.

Laboratoires de LA FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT

5, Grande-Rue — MONTPELLIER.
(Tél. : 54-93.)

OTOLÉINE

Composition. — Sulfate de paraaminobenzoyldi-butylaminopropanol, adrénaline, acide phénique cristallisé, glycérine neutre.

Propriétés. — Analgésique, vaso-constrictive, décongestive et antiseptique.

Indications. — Otites externes, otites moyennes, sèches ou suppurées, et toutes affections congestives, subaiguës ou chroniques de l'appareil auditif.

Présentation et prix. — Un flacon : 14 francs.

Posologie et mode d'emploi. — 2 fois par jour, instiller après avoir fait tiédir au bain-marie quelques gouttes d'OTOLÉINE dans chaque oreille, et recouvrir d'un tampon d'ouate stérile.

**Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique.**

72, rue de Bagneux — MONTRouGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

OUABAÏNE ARNAUD

Principe actif pur cristallisé et invariable du Strophanthus gratus. — Étalon International.

Propriétés. — Cardio-tonique énergique. Diurétique puissant.

Indications. — Insuffisances cardiaques, notamment quand le pouls est régulier ou lent. — Insuffisance aiguë ou progressive du ventricule gauche. — Myocardites.

Formes. — Solution à 2/100 (L gouttes = 20 mg. — Solution à 4/1000 (L gouttes = 4 mg.).

Ampoules 1/4 mg. (1 cc.) pour inject. intravein.

Ampoules au 1/2 mg. (2 cc.) pour injections intra-musculaires.

Doses. — L'*Ouabaïne Arnaud* ne s'accumulant pas, le traitement peut être poursuivi aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Per os. Doses d'attaque : XL à LX gouttes par jour de solution à 2/100 en 2, 3 prises.

Doses d'entretien : XXV à XL gouttes par jour en 2 prises.

Voie parentérale. Injecter par jour : soit 1/4 mg. (1 cc.) d'une ampoule intraveineuse, soit 1/2 mg. (2 cc.) d'une ampoule intra-musculaire.

Prix :

Solution à 2/100	21 francs.
Solution à 4/1000.....	20 francs.
Ampoules	20 francs.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

Tél. : Suffren 31-21 (3 lignes).

OUABAÏNE-MIALHE

Soluté au centième d'Ouabaïne cristallisée. Cent gouttes = vingt milligrammes.

Ralentit, renforce, régularise le cœur, provoque la Diurèse. Réduit les œdèmes. Insuffisance cardiaque, Dilatations aiguës des cavités droites, Cardiopathies valvulaires, Asthénie du Myocarde, Arythmie, Tachycardie, Médication spécifique du cœur droit.

Ouabaïne-Mialhe ne s'accumule pas ; le traitement peut donc être prolongé tout le temps nécessaire à l'amélioration du malade.

X à L gouttes par 24 heures.

Conservation indéfinie.

Flacon 6 cc. Prix : 21 fr. 20.

Ampoules au 1/10 et au 1/4 de milligramme.

Intraveineuse ou intramusculaire.

Ouabaïne Mialhe au millième se prescrit sous le nom de *Mialbaïne*.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (II^e). (Tél. : Rich. 35-10.)

OUATAPLASME

du D^r Ed. LANGLEBERT.

Pansement humide, complet

Instantané, aseptique, émollient.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Abscesses, Brûlures, Eczéma, Phlébites, Coliques, Plaies contuses.

Mode d'emploi. — Se prépare instantanément par simple immersion dans l'eau bouillie, chaude ou froide. Il peut être arrosé de substances médicamenteuses (Liquide de Labarraque, Eau d'Alibour, Laudanum, etc.). Conserve son humidité pendant 24 heures.

Il existe également un **Ouataplasme antiseptique** au **Chromosol** (sel sodique de la Dibromo-Oxymercure-Fluorescéine), tout spécialement destiné au traitement des Furoncles, Anthrax, Abscesses, et toutes manifestations cutanées d'origine microbienne, qui se prépare également par simple immersion dans l'eau préalablement bouillie.

Échantillons médicaux sur demande.

Établissements SABATIER

10, rue René-Bazin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 06-40.)

OVA-CRINE

Dragées.

Composition :

Hormone ovarienne lipoidique acéto-soluble	0,01
Ovarine	0,05
Hypophysine	0,01
Hépatine	0,05
Phényléthylmalonylurée	0,01

Pour 1 comprimé dragéifié.

Mode d'action. — Supprime l'hypo-activité ovarienne. Médication endocrinienne d'appoint.

Indications. — Tous les cas d'insuffisance ou de suppression de la fonction ovarienne et des troubles qui l'accompagnent. Troubles de la puberté. Troubles de la menstruation. Aménorrhée. Dysménorrhée. Règles douloureuses. Ménopause naturelle ou artificielle. Stérilité. Obésité.

Posologie. — De 2 à 4 dragées par jour en 2 fois, loin des repas, pendant 10 à 20 jours par mois.

Prix : 20 fr. 80.

Laboratoires Henri **SCHÉHADÉ**

9, impasse Thoréton — PARIS (XV^e).

OVOBIOL

Bouillon Bromuré Lécithiné.

Puissant sédatif du Système Nerveux.

Reconstituant cellulaire.

L'Ovobiol apaise le système nerveux en état d'excitation morale ou physique et favorise le sommeil. Il fortifie par les phosphates assimilables et la lécithine qu'il renferme.

Effets rapides et prolongés sans inconvénient.

Les tablettes d'Ovobiol se dissolvent rapidement dans l'eau bouillante.

Absorber tel quel ou mélangé à l'alimentation habituelle (potage, légumes, etc...).

Dose normale, toujours utile : 1 à 3 tablettes par jour.

Dose forte : 3 à 6 tablettes par jour (selon l'avis du médecin).

Enfants nerveux : 1 à 2 tablettes suivant l'âge.

Prix : 23 francs.

Laboratoire **A. DANIEL-BRUNET**

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 11-86.)

OVOCYCLINE ET OVOCYCLINE P

Hormone folliculaire cristallisée.

ŒSTRADIOL ET DIPROPIONATE D'ŒSTRADIOL
CIBA

L'Œstradiol (OVOCYCLINE) est une forme de l'hormone folliculaire se prêtant à l'absorption par la voie digestive (comprimés). Le dipropionate d'Œstradiol (OVOCYCLINE P) est une autre forme de l'hormone folliculaire dont l'action, très énergique et très prolongée, se manifeste après administration parentérale (présentation exclusivement en ampoules).

L'action physiologique de l'Ovocycline a été étudiée par des méthodes de dosage assez analogues à celles antérieurement utilisées pour l'hormone orchitique (PERANDRONE) et permettant une appréciation comparée avec d'autres substances. Ces essais physiologiques sont basés sur les tests de l'œstrus provoqué chez l'animal castré et sur le test de croissance de l'utérus. Les deux tests mettent en évidence la grosse supériorité de l'Ovocycline sur les préparations extractives.

Les effets thérapeutiques de l'Ovocycline sont extrêmement nets dans tous les cas où la fonction ovarienne est inhibée, supprimée ou gravement perturbée. Son action conjuguée avec celle de l'hormone du corps jaune (LUTOCYCLINE) est indiquée dans les cas d'hypoplasie, de stérilité, les troubles marqués de la ménopause naturelle et surtout provoquée (voir Lutocycline).

Indications. — Tous les troubles résultant d'une déficience caractérisée de la fonction ovarienne :

Persistance du stade infantile.

Aménorrhée primitive avec hypoplasie de l'utérus. Aménorrhées secondaires liées à l'inhibition de l'ovaire.

Oligoménorrhées et hypoménorrhées.

Troubles vasculaires et nerveux de la ménopause naturelle ou provoquée.

Manifestations dépendant du déficit ovarien : prurit vulvaire, vaginite sénile, frigidité, dépression psychique, nervosisme.

Deux présentations :

OVOCYCLINE : comprimés d'Œstradiol dosés à 0 mgr. 02.

OVOCYCLINE P : ampoules de dipropionate d'Œstradiol à 1 mgr. et 5 mgr. (solution huileuse).

Doses. — Comprimés Ovocycline à 0 mgr. 02 : 6 à 10 par jour.

Ampoules Ovocycline P à 1 et 5 mgr. : 1 à 25 mgr. et plus par semaine.

Formuler :

1 flacon de 50 comprimés Ovocycline.

1 flacon de 100 comprimés Ovocycline.

1 boîte de 5 ampoules Ovocycline P à 1 mgr.

1 boîte de 1 ampoule Ovocycline P à 5 mgr.

1 boîte de 5 ampoules Ovocycline P à 5 mgr.

Laboratoire CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

OVOMALTINE

Aliment naturel équilibré.

Source abondante de vitamines et de diastases.

Composition. — Extrait préparé sous vide à basse température, à partir du malt, du lait et du jaune d'œuf frais, aromatisé par une trace de cacao.

Forme. — Paillettes solubles.

Propriétés thérapeutiques. — Aliment d'épargne, complet, tonique riche en diastases, sels minéraux et vitamines. Auxiliaire de la digestion. Galactagogue.

Petit déjeuner reconstituant.

Indications. — Diète liquide. Etats fébriles, états post-opératoires, anémies, convalescences, grossesse, suralimentation. Affections de l'appareil digestif : abcès dentaires, phlegmons de la gorge, angines, ulcères, troubles gastro-intestinaux, carences frustes.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à soupe à faire dissoudre dans une tasse de lait, eau, café, thé, ou toute autre boisson chaude. Ne pas faire cuire.

Société Anonyme des Établissements WANDER

CHAMPIGNY (Seine).

Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.

OVUCRIDINE

Ovules au « Riclogonol ».

Composition. — Acridine, Cristal violet, Chlorure de platine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, Antigonnococcique, Décongestif, Sédatif du système nerveux génital.

Indications. — Blennorrhagie et ses complications. Dans le traitement conjugal de la blennorrhagie à utiliser dans tous les cas.

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Mode d'emploi. — Un ovule tous les deux soirs.

Remarque : Les taches pouvant résulter de leur emploi disparaissent après simple savonnage.

Prix : 18 fr. 55.

(N° du L. N. C. M. 795-7).

Laboratoires TERRASSE

2, Rond-Point du Centre — LA GARENNE-COLOMBES
(Seine).

(Tél. : Charlebourg 22-84.)

OVUGYNE

Ovules polyvalents.

Décongestifs, Cicatrisants, Sédatifs, Antiprurigineux.

Composition. — Un cicatrisant et antimicrobien :
Baume du Pérou.

Trois analgésiques : *Jusquiame, Chloral, Anesthésine.*
Un décongestionnant et hémostatique : *Hamamélis.*

Indications. — Leucorrhées, Métrites, Métrorragies,
Prurit vulvaire, Ulcération du Col et du Vagin.

Présentation. — Chaque ovule est conservé sous une
enveloppe aseptique.

Mode d'emploi. — Après une injection d'eau bouillie
tiède, introduire un ovule, le soir au coucher, aussi
profondément que possible, dans la cavité vaginale
et se garnir. Poursuivre le traitement 10 à 12 jours,
dans la période intermenstruelle.

La boîte de 6 ovules : 24 francs.

L. N. C. n° 479-10.

Laboratoire P. SEVENET

38, rue de Ponthieu — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Bal. 56-91.)

OVULE AU LACTOSMOSE

Iso-acide du vagin pH : 4,5.

BOUILLIE LACTIQUE à base de Lacto-Sérum.

Lacto-sérum acide, 4 cc.; bac. lactiques, 60 µ; lactose,
20 cc.

Emploi comme d'usage.

L'Ovule au Lactosmose, iso-acide, n'irrite pas la muqueuse,
Remplace les ovules médicamenteux. NE TACHE PAS.

Indications. — Leucorrhée, vulvo-vaginites, vaginites
séniles, métrites, infections gynécologiques.

La boîte de 6 ovules..... 19 fr. 50

OVULACYD

Pour Vaginite à Trichonomas.

Stovarsol, 0,25 ; hydrates de carbone, 0,5 ; lactose, 1,5.
Mettre un Ovulacyd matin et soir dans le vagin. Au bout
de 10 jours, alterner Ovulacyd et Gyno-Lactosmose.

Laboratoires LAVRIL — PACY-SUR-EURE.

N° d'inscription au L. N. C. M. : 768.

Bureaux : 26, boulevard des Batignolles — PARIS.

(Tél. : Marcadet 21-14.)

OVULES ALAVITA

Ovules à la vitamine A.

Composition. — Vitamine A : 10 000 U. I. ; Huile solidifiée, Q. S. pour 12 gr.

Propriétés. — Les *Ovules Alavita* réunissent les avantages de la vitamine A et de l'huile.

- 1° Ils régénèrent complètement la muqueuse vaginale ;
- 2° Ils empêchent le pullulement microbien si fréquent sur une muqueuse en mauvais état ;
- 3° Ils ont une action anti-infectieuse remarquable dans toutes les affections gynécologiques ;
- 4° Ils forment par leur excipient huileux un pansement adoucissant et lubrifiant pour l'appareil génital.

Indications. — Toutes les irritations et infections de l'appareil génital.

Posologie. — Un à deux ovules par 24 heures selon avis médical.

Prix : la boîte de 6 ovules : 30 francs.

Laboratoires du SUPPOVITA

S. RICQUIER, Pharmacien

56, boulevard de la République — SAINT-CLOUD
(Seine-et-Oise).
(Tél. : Val d'Or 08-17.)

OVULES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur dans : Vaginites, Vaginisme, Abscess du vagin, Fistules, Plaies, Tumeurs, Métrites, Règles douloureuses, Vulvites, Bartholinites, Papillomes, et tous examens et petites interventions gynécologiques (Speculum, curetage, cautérisations, dilatations, etc.).

Posologie. — Délai nécessaire pour la fusion complète : 3 heures environ. Compte tenu de ce renseignement, introduire 1 ou 2 ovules en temps utile. Renouveler cette introduction chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*.

Dans les pays tropicaux où l'ovule est inutilisable, y substituer un tampon vaginal imbibé de *Solution huileuse au Nestosyl*.

Prix : 18 francs la boîte de 6 ovules.

L. N. C. 581-4.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod-PARIS.

OVULES AU PARAIODE

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Paraïode*. Chaque ovule contient 1^{er},50 de Paraïode.

Indications. — Assèche rapidement vaginites, métrites et toutes leucorrhées. Est également indiqué dans les salpingites et salpingométrites.

Mode d'emploi. — Un ovule le soir suivi le lendemain matin d'une injection.

La boîte de 6 ovules. Prix : 22 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. 1484-4.

Laboratoire du PARAIODE

R. HARAND, Pharmacien

23, rue Doudeauville — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 19-70.)

OVULES CHAUMEL

à la Glycérine solidifiée.

Indications :

Aménorrhée. — Ovules Chaumel emménagogues (apiol, cannelle).

Antisepsie. — Ovules Chaumel acide borique.

Congestions. — Ovules Chaumel simples et ichtyol.
Ovules Chaumel (borate de soude).

Douleurs. — Ovules Chaumel sédatifs (belladone-morphine).

Inflammations. — Ovules Chaumel résolutifs (Iodure-belladone).

Leucorrhée. — Ovules Chaumel astringents (tannin-sulfate de zinc).

Métrites. — Ovules Chaumel ichtyol.

Prix : 19 fr. 20.

Durée moyenne de l'unité de vente : 6 applications.

Crayons CHAUMEL

Très appréciés pour leur fusion et la facilité avec laquelle le médecin les pose.

Prix : 18 fr. 15.

Établissements FUMOUE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

OVULES HYSTAN

du Dr L. Lafay

Ovules *astringents*, d'action *asséchante*.

Formule :

Plomb, zinc colloïdal	ãã 0,005
Acétate de plomb.....	0,15
Sulfate de zinc.....	0,08
Molybdate de plomb.....	0,02
Excipient Q.S.....	16

Indications. — Tous exsudats vagino-utérins, microbiens ou non, même gonococciques. Aucune toxicité.

Mode d'emploi. — Chaque soir, ou tous les deux soirs, suivant avis du médecin, introduire un ovule après toilette.

Cure moyenne : 12 ovules.

Présentation. — Boîte de 6 ovules. Prix : 21 fr. 15.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1090-3.

Laboratoires du Dr L. LAFAY

LECOQ et FERRAND, Pharmaciens,
69, rue de Provence, 54, Chaussée d'Antin —
PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 21-06.)

OVULES OAPE

Présentation. — En boîte de 6 ovules sous cupules. (24 fr. 45.)

Principes actifs. — Ichtyol, Extrait d'Hamamélis, Baume de San Salvador.

Indications. — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, Salpingites, etc...

Mode d'emploi. — Applications locales. Laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-45.

Laboratoire PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

OVULES " PHYTOVULES "

Composition. — *Rosa Centifolia*, *Hypericum perforatum*, *Malva sylvestris*, *Chenopodium* en macération alcoolique = 1 gramme par ovule, Beurre de cacao, Q. S.

Propriétés. — Émollient, astringent, cicatrisant, décongestif, sédatif du système nerveux génital.

Indications thérapeutiques. — Toutes métrites, pertes blanches, infections gynécologiques, vaginites, suites de couches, salpingites, ovarites, etc.

Avantages. — Facilité d'introduction par leur petite dimension et leur rigidité. Fonte totale extrêmement rapide — quelques minutes — assurant ainsi une action constante des principes actifs sur les parties malades pendant toute la nuit. Ne tache pas.

Mode d'emploi. — Introduire un ovule le plus profondément possible, tous les soirs ou tous les deux soirs, en se couchant (suivant avis du médecin). Se garnir pour la nuit.

Le lendemain matin, prendre une injection, soit avec de l'eau bouillie simple, soit additionnée d'une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude.

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Laboratoires RICHOU

G. GUÉNAIRE, pharmacien,
39, rue Taitbout — PARIS (IX^e), (Tél. : Paris 46-12.)

OVULES RHEMDA RADIOACTIFS

(Radiovules.)

Composition. — A base de terres radioactives et de Terpinéol : d'une radioactivité égale à une unité uranique.

Action. — Par émission de radiations amenant une action bactéricide et leucocytogène.

Indications thérapeutiques. — Vaginites, Métrites, Leucorrhée, etc.

Boîte de 6 ovules.

Prix au public : 24 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 466-2.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89. — R. C. Seine 255-068-B.

OVULES SAPOREX

Fondants-Glycérinés, Saponiques.

Formule :

Essences Saporex :		
—	Lavande	0,45
—	Thym.....	0,13
—	Citronnelle.....	0,08
—	Verveine	0,07
—	Santal.....	0,07
Thymol		0,10
Pâte de savon neutre		5,00
Glycérine solidifiée, Q. S. pour faire une		
masse de		100 gr.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestifs, cicatrisants, résolutifs, désodorisants, diminuant les exsudats vaginaux.

Indications. — Métrites, leucorrhées, vaginites, ulcérations, tumeurs, abcès. prurit vaginal, etc...

Mode d'emploi. — Un ovule le soir ; le lendemain matin une injection au *Saporex* (voir rubrique *Saporex*).

Boîte de 6 ovules : 20 francs.

Laboratoires SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e).

(Tél. : Villeurbanne 93-88.) Chèques Post. Lyon 96-04.

OVULES SÉDO-HÉMOSTATIQUES

du Dr JOUVE

Les ovules Sédo-Hémostatiques à excipient gélatino-glycériné véhiculent comme principes actifs l'antipyrine et le chlorure de calcium, médicaments hémostatiques et sédatifs qui ont fait leurs preuves. Ils sont fusibles à la température du corps, ne tachent pas et n'irritent pas les muqueuses. Nullement toxiques, ils peuvent être renouvelés à volonté.

Composition. — Les doses pour un ovule sont les suivantes :

Gélatine officinale lavée et séchée.....	1 gr.
Glycérine officinale.	10 gr.
Antipyrine.....	1 gr. 50
Chlorure de calcium.....	0 gr. 50
Eau distillée.....	2 gr.

Enregistré au Laboratoire National des Médicaments sous le n° 1050-1.

Une triple action :

- a) **Analgésique.** — (Métrites, Vaginites, Règles douloureuses, etc.)
- b) **Hémostatique.** — (Métrorragies, Ulcérations, Règles prolongées, etc.)
- c) **Décongestive.** — (Ils s'associent heureusement à la Diathermie gynécologique.)

Les Ovules sédo-hémostatiques remplacent avantageusement les « tampons locaux » utilisant des préparations magistrales d'exécution plus ou moins délicate et d'action variable.

Une indication précieuse. — Pour éviter les douleurs menstruelles, utiliser les Ovules Sédo-Hémostatiques 3 ou 4 jours avant l'apparition des règles.

Mode d'emploi. — Introduire l'Ovule aussi profondément que possible se garnir et rester étendue.

Prix de vente : 22 francs.

Laboratoire du Dr JOUVE,

16 bis, rue Dufrenoy — PARIS (XVI^e) Tél. : Trocadéro 69-87.

OVULES STÉRIGYNE

Ovules secs spumescents à base d'Octylhydrocupréicine (0 gr. 01 par ovule).

Traitement nouveau, pratique et propre des leucorrhées, pouvant être prolongé sans inconvénients, même à titre d'hygiène habituelle. Les ovules secs Stérigyne décongestionnent et désodorisent. Ne coulent pas. Ne tachent pas. Inutile de se garnir.

Posologie. — Introduire le soir au coucher un ovule aussi profondément que possible. Un ovule Stérigyne coûte environ trois fois moins qu'un ovule classique.

La boîte de 8 ovules : 11 francs.

La boîte de 16 ovules : 19 francs.

Littérature et échantillons :

Laboratoires SERVIER
ORLÉANS. (Tél. : 31-10.)

OVULES-VACCINS « INAVA »

Pansement Gynécologique.

(Vaccin Inava M.)

Antipolymicrobien (aérobies et anaérobies),

Efficace, Propre, Commode.

Aseptise les Voies génitales féminines.

Indications.

Métrites, Salpingites, Leucorrhées, Vaginites,
Préventif des Infections Puerpérales.

Mode d'emploi. — Introduire l'ovule profondément et se garnir. Ne procéder à la toilette ordinaire que 12 heures après.

Prix : 19 fr. 05 la boîte de 6 ovules.

Enregistré L. N. C. M. : 760-2.

Laboratoire INAVA

E. GUIGNIER, Pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

OXY-BUCCOL

Enregistré au L. N. M. sous le n° 363-37.

Forme. — Bain de bouche liquide.

Composition. — Sulfate neutre d'orthoxy-quinoléine ; chloral.

Propriétés pharmacodynamiques. — Antiseptique, cicatrisant, calmant.

Indications. — Soins post-opératoires dentaires et de toutes interventions dans la cavité buccale. Aphtes, stomatites, gingivites, angines ; hygiène buccale quotidienne.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau tiède.

Le flacon de 100 cc. : 9 fr. 20.

— 500 cc. : 23 fr. 35.

— d'un litre : 42 fr. 45.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — Paris (VIII^e). (Lab. 62-30.)

OXYDOTHYRINE PARIS

Composition. — La totalité des principes actifs de la glande Thyroïde privée de toxine par un procédé spécial. Est sans action sur le cœur.

Indications. — Embonpoint. Obésité. Fibrome. Goitre et tous les états dus à l'insuffisance thyroïdienne.

Forme. — Pilules renfermant 0 gr. 10 de substance active.

Posologie. — 1 à 2 par 24 heures prises de préférence le matin à jeun.

Prix : 20 fr. 80 le flacon de 50 pilules.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-5.

Laboratoires Biologiques

André PARIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYDOVARINE PARIS

Composition. — Tous les principes actifs de l'ovaire. Corps jaune et cellules interstitielles.

Forme. — Pilules dosées à 0 gr. 10 de substance ovarique totale.

Posologie. — 2 à 6 par 24 heures aux repas.

Indications. — Troubles de la menstruation. Retentissements pathologiques de l'ovariotomie. Irrégularités. Insuffisance. Douleurs périodiques, accidents de la ménopause, etc.

Prix : 20 fr. 80 le flacon de 50 pilules.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-6.

Laboratoires Biologiques

André PARIS

4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ségur 55-12.)

OXYFUGE

Cachets.

Composition :

Chenanthol	0 gr. 09
Thymol	0 gr. 45
Calomel chimiquement pur	0 gr. 45
Semen contra pulv.	2 gr. 70
Pyréthrum flor. pulv.	2 gr. 70

Pour 9 cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des parasites intestinaux : ascarides, ankylostomes, tricocéphales et tout particulièrement des *oxyures*.

Mode d'emploi. — (Adultes seulement.) Pendant 3 jours consécutifs, faire prendre le matin à jeun avec une infusion 3 cachets, chacun de 1/2 heure en 1/2 heure. N'absorber aucun aliment jusqu'au repas de midi, qui sera normal.

Présentation. — Tube aluminium renfermant 9 cachets.

Prix : 15 francs.

Laboratoire CASTEL

1, place Bouquerie — NIMES

A. CASTEL, Pharmacien.

Ingenieur-chimiste, Licencié ès Sciences.

OXY-INJECTEUR DU D^r FIALIP

Appareil pour injections sous-cutanées d'oxygène naissant.

Indications. — Toutes les insuffisances respiratoires : Asthme, Emphyseme, en diminuant la dyspnée ; Tuberculose, Broncho-pneumonie, *Asphyxies accidentelles et cyanose des nouveau-nés*, septicémies et intoxications en oxydant et détruisant les toxines ou poisons organiques.

Avantages de l'appareil. — Portatif, peut se mettre dans une poche de manteau. — Fabrique son oxygène au moment de l'emploi. — Pas d'obus à recharger. — Toujours prêt à fonctionner.

Complet avec tous ses accessoires : 150 francs.

Pharmacie du D^r FIALIP

23, av. de la Motte-Picquet — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 00-91.)

OXYLÉINE Adultes

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications :

Troubles intestinaux : Diarrhées, colites, fermentations, dysenteries, intoxications alimentaires, vers et tous parasites intestinaux, excepté le tœnia.

Troubles des voies biliaires : Cholécystites.

Troubles des voies urinaires : Colibacillose et toutes infections (pyélites, gonococcie et ses complications).

Doses :

Au-dessus de 15 ans : 2 à 4 comprimés à chaque repas (midi et soir).

De 8 à 15 ans : 1 à 3 comprimés à chaque repas (midi et soir).

De 4 à 8 ans : 1 comprimé à chaque repas (midi et soir).
Ne pas croquer pour éviter le goût désagréable.

Prix : 18 fr. 85 le flacon de 50 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seinc-et-Oise).

(Tél. : 32.)

OXYLEINE Enfants

Principe actif. — Sulfate neutre d'oxyquinoléine.

Indications. — *Troubles intestinaux* : Diarrhées, colites, fermentations, dysenteries, intoxications alimentaires, vers et tous autres parasites intestinaux, excepté le tænia.

Troubles des voies urinaires. Colibacillose et toutes infections.

Forme. — Comprimés solubles, de goût agréable.

Doses :

Jusqu'à 6 mois : 1 comprimé par jour.

De 6 à 12 mois : 2 comprimés par jour.

De 12 à 18 mois : 3 comprimés par jour.

De 18 mois à 2 ans : 2 comprimés matin et soir.

De 2 à 4 ans : 2 à 4 comprimés matin, midi et soir.

à prendre aux tétées ou aux repas.

Mode d'emploi

Dans une cuillerée à soupe d'eau :

Dissoudre		Ajouter
1 ou 2 comprimés.	1 morceau sucre	+ 1 cuillerée à soupe lait.
3 — 4 —	2 — —	+ 2 — —

Prix : 13 fr. 75 l'étui de 70 comprimés.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

OXYMENTHOL

(Tablettes et pâtes.)

A base d'oxygène naissant, menthol, cocastovaïne, benzoate de soude, etc.

Tablettes et pâtes de goût agréable.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes*, 6 à 10 par jour à sucer ; *Enfants*, 3 à 6 par jour à sucer.

Propriétés thérapeutiques. — Anesthésiques, antiseptiques, pectorales.

Indications. — Affections des voies respiratoires et de la gorge. Toux, Gripes, Pharyngites, Bronchites, Asthme, Emphyseme, Tuberculose, hygiène de la bouche et des dents.

Prix au public : Tablettes 6 fr. ; Pâtes, 5 fr. 50. pour 8 à 10 jours de traitement.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr PERRAUDIN, pharmacien.
21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trinité 29-29.)

OXYPLASTINE

Thérapeutique Chirurgicale post-opératoire.

Protection intégrale de la peau avoisinant toute plaie suppurante aiguë ou chronique.

Résistance absolue à l'attaque des sécrétions (pus et liquides organiques).

Forme. — Crème onctueuse aseptique, adhésive *ne séchant pas, ne s'écaillant pas* (s'enlève par simple essuyage à la compresse).

Indications. — Opérations abdominales avec drainages, *Anus artificiels*, Fistules biliaires, duodénales, pancréatiques, Fistules du grêle, *Pleurésies purulentes*, *Cystostomies*, Adénites et abcès froids fistulisés, Arthrotomies, *Ostéomyélites*, Mastoïdites, Brûlures, Ulcères variqueux, *Escarres*.

Indications spéciales. — Améliore la cicatrice opératoire, *Esthétique des cicatrices*.

Présentation. — Tube G. M. : dit tube chirurgical : 140 gr. : 23 francs, tube médical : 70 gr. : 16 francs, tube P. M., 40 gr. : 12 fr. 50.

Laboratoires de l'OXYPLASTINE

78, avenue de Saint-Ouen — PARIS (XVIII°).

(Tél. : Marcadet 61-96.)

OXYTHYOL

du Docteur P. Bourggraff.

Composition. — Ichtyol titré d'origine strictement naturelle gisements autrichiens. — Oxyde de zinc calibré chimiquement pur 999 pour 1 000. — Amidon calibré.

Propriétés. — Grâce à la teneur rendue constante de tous ses éléments composants, la pâte *Oxythyol* permet d'obtenir des résultats toujours identiques. Ses propriétés kératoplastiques et antiphlogistiques font de cette pâte un élément précieux de l'arsenal thérapeutique du dermatologiste et du praticien.

Indications. — Dermites variqueuses, eczémas secs et suintants.

Mode d'emploi. — Demander les brochures des docteurs P. et R. Bourggraff : « Ulcères variqueux » et « Eczémas pré et post-ulcéreux ».

Présentation. — Pâte grise en pot :

Grand modèle.....	28 fr. 25
Petit modèle	15 fr. 20

L'Oxythyol étant l'un des éléments du « Traitement Ambulatoire du Praticien », prière de se reporter à ce texte.

Littérature sur demande aux :

Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANGE (M.-et-M.).

OZOL

Traitement rationnel de la blennorragie.

Composition :

Résorcine	0,40	} pour 100 grammes.
Sel marin	0,70	
Goudron végétal pur.....	1	

Indications. — Blennorragie chez l'homme et chez la femme.

Avantages. — Propriété osmotique du milieu. Pénétration dans les espaces sous-muqueux, contact assuré avec les cellules infectées. Pas d'action coagulante.

Posologie. — *Chez l'homme* : 4 à 5 injections de 10 cc. par jour, à conserver 5 à 10 minutes. En cas d'intolérance de l'urètre, dédoubler les premières injections avec de l'eau bouillie.

Chez la femme : Tamponnements à l'Ozol pur et injections de 2 litres d'eau bouillie contenant 4 à 5 cuillerées à soupe d'Ozol. Lorsque la maladie s'étend à l'urètre : petites injections d'Ozol pur dans l'urètre. Enregistré au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments, n° 572-2.

Forme. — Liquide.

Prix du flacon : 18 fr. 85,

Laboratoire de l'OZOL

6, place des Ternes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOLASE

Antiseptique gynécologique en comprimés.

Composition :

Trioxyméthylène	0,008	} pour 1 comprimé.
Peroxyde de magnésium	0,030	
Sulfophénate de zinc.....	0,075	
Sulfate de zinc	0,075	
Sel marin.....	0,145	
Alun	1,172	

Indications. — Métrite, leucorrhée, vulvite prurit, toilette intime et par dégagement d'oxygène et d'acide carbonique, **action calmante sur le réseau nerveux utérin** : insomnie, excitabilité, irritabilité.

Avantages. — Solubilité immédiate, odeur discrète et non persistante, innocuité absolue, usage quotidien sans inconvénient.

Forme. — Comprimés de 2 gr. 25, parfumés au thym.

Posologie. — Pour la toilette intime : 1 comprimé par litre d'eau. Etats inflammatoires : 2 comprimés par litre d'eau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 577-1.

Prix de la boîte (40 comprimés) : 13 fr. 75.

(L'emploi de l'Ozolase entraîne une dépense de 0 fr. 34 par jour.)

Laboratoire de l'OZOL

6, place des Ternes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Roquette 09-35.)

OZOTHINE

Ozonide d'Essence de térébenthine en SOLUTION AQUEUSE isotonique fixant 1.15 mgr. d'OZONE par 10 cc. (Procédé F. SAUVAGE).
Dépourvue de tout élément irritant.

Action. — *Antitoxinique, Bactéricide, asséchante et désodorisante, Oxydant de l'Hémoglobine, Puissant modificateur du terrain.*

Indications :

Médicales : *Maladies des voies respiratoires, infections généralisées ou obstétricales. Pneumopathies aiguës, subaiguës ou chroniques, Pleurésies purulentes, Bronchites aiguës ou chroniques. Dilatations bronchiques, Gripes et suites post grippales, Asthme et emphysème, Broncho-pneumonies infantiles (suites de rougeole, coqueluche, etc.). Rhumes, Trachéites, Toux, Laryngites. — Stimulant cellulaire.*

Chirurgicales : *Préventif des complications pulmonaires post-opératoires.*

Formes :

Ampoules 2 cc., 5 cc., 10 cc., pour injections : intramusculaires, intraveineuses, intratrachéales ou intrabronchiques.

Injectons totalement indolores, sans réaction locale ou générale.

Gouttes, Capsules, pour traitement oral.

Composé : Inhalations, Fumigations.

Suppositoires.

Posologie :

Ampoules.

a) *En médecine. Adultes : 10 cc. 1 ou 2 fois par jour avec éventuellement association de gouttes ou de capsules.*

Dose pouvant être augmentée dans les cas graves sans danger.

Enfants et nourrissons : injection intramusculaire de 2 cc., en augmentant selon état jusqu'à 5 cc. ou plus.

Au-dessus de 3 ans : de 2 cc., augmenter rapidement à 5 cc. ou plus.

b) *En chirurgie :*

1 injection de 5 cc. avant l'opération et après l'opération.

Continuer les injections pendant quelques jours après l'intervention.

Gouttes.

Adultes : Le matin à jeun et le soir avant de se coucher de XL à LX gouttes dans un peu d'eau sucrée. Enfants : 1/4 jusqu'à 1/2 dose.

Capsules.

Adultes : 4-6 capsules au début des principaux repas. Enfants : 1/4 jusqu'à 1/2 dose.

Composé :

Inhalations, Fumigations : de V à XXX gouttes dans un bol d'eau chaude.

Aucune contre-indication.

Présentation :

Boîtes de 6 ampoules de 10 cc.

Boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

Boîtes de 12 ampoules de 2 cc.

Suppositoires.

Ozothine Gouttes.

Ozothine Capsules.

Ozothine Composé, (Inhalation, Fumigation.)

Présentation spéciale pour le Corps médical, les hôpitaux et cliniques.

Boîtes de 25 ampoules et boîtes de 100 ampoules.

Laboratoire de l'OZOTHINE

J. POMPANON, Pharmacien, 23, rue Sébastien-Mercier — (XV^e).

DÉPOT-VENTE : G. WARIN, Pharmacien,

4, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e). — (Tél. : Aut. 71-98.)

PADÉRYL

Composition. — Dragées de :

Bromhydrate de papavérine.....	0,03
Bromhydrate de codéine	0,02
Extrait de valériane stabilisée	0,10
— de jusquiame stabilisée	0,035

Propriétés et Indications :

Calmant de la toux : toux pharyngolaryngée, toux rebelles et persistantes des affections pleuro-pulmonaires chroniques, toux coqueluchoïdes, toux réflexes au cours des insufflations du pneumothorax artificiel, toux incoercibles et émétisantes de certaines affections pulmonaires aiguës ou tuberculeuses.

Sédatif nerveux sans action hypnotique, troubles fonctionnels d'origine nerveuse et neurovégétative : *surmenage, troubles nerveux menstruels, insomnies* (qu'il jugule sans causer de troubles au réveil).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour et plus selon prescription médicale. Tubes de 20 dragées.

Laboratoires CLIN, COMAR ET Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

PAINS DE RÉGIME HEUDEBERT

Les Pains de régime **Heudebert** ont été créés pour l'alimentation des malades auxquels l'usage du pain ordinaire est interdit.

Diabète.

Pain de gluten : 5 à 10 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime très sévère.

Pain d'aleurone : 15 à 20 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime sévère.

Diabétique-Biscotte } 30 à 35 p. 100 d'hydrocarbonés.

Special-Diabetic } Régime normal.

Pain essentiel : 55 à 60 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime léger.

Biscottes au gluten, Flûtes au gluten : 60 à 65 p. 100 d'hydrocarbonés. Régime de repos.

Albuminurie-Arthritisme.

Régime de désintoxication.

Pain désazoté . 2,93 % mat. azotées. Régime très sévère.

Pain hypoazoté. 8,12 — — — — — normal.

Pain de Vittel . 7,80 — — — — —

Biscottes, Gressins } sans sel, 12,50 % mat. azotées.
Longuets. } Régime léger.

Pains de Contrexéville, d'Evian, de Saint-Nectaire.

Cœur et vaisseaux.

Mêmes pains, appauvris en matières azotées, que dans le régime de désintoxication.

Pain de Royat.

Pain de Bains-les-Bains (artères).

Constipation.

Pain complet (frais).

Biscottes de pain complet.

Pain de Châtel-Guyon.

Pain de son (frais).

Baguettes de pain complet.

Pain de Plombières.

Dyspepsie-Entérite.

Biscottes de pain grillé, longuets, gressins.

Pain de Vichy.

Foie et voies biliaires.

Pain hypoazoté.

Biscottes, longuets, gressins.

Pains de Vichy, de Vittel.

Obésité.

Pain essentiel.

Gressins.

Pain de Brides.

D'une haute valeur nutritive, tous ces pains ont une composition rigoureusement constante, placée sous le contrôle permanent du Laboratoire.

Produits de Régime HEUDEBERT

85, rue Saint-Germain, à NANTERRE (Seine).

2 et 4, Chemin Feuillat, à LYON (Rhône).

PALPITINE

Sédatif d'effet constant non déprimant.

Composition. — Association de *sédatifs à doses faibles* (Phosphate de codéine, 0,006 ; Phényléthylmalonylurée, 0,01) et d'un *tonique* (Méthylarsinate, 0,008. Guaranine, 0,01). 50 dragées par tube.

Indications. — Nervosité habituelle ou occasionnelle; Emotivité, anxiété, éréthisme cardiaque, palpitations. algies précordiales qui les accompagnent souvent, Dépression due aux préoccupations de la vie courante. Troubles nerveux qui précèdent les règles ou la ménopause. Hyperexcitabilité sous toutes ses formes.

La *Palpitine* apporte le calme, régularise le travail et facilite le sommeil.

Mode d'emploi. — 1 à 2 dragées avant chacun des 3 repas, pendant trois semaines environ. *Doses faibles* : 4 dragées par jour. *Dose moyenne* : 6 dragées par jour. — La *Palpitine* peut être prise ou renouvelée sans danger d'accoutumance.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-10.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X°).

(Tél. Botzaris 38-78.)

PAMPRYL

Jus de raisin naturel

Blanc et rouge.

Composition. — Jus de raisin naturel, préparé à Nuits-Saint-Georges (Côte-d'Or), sans pasteurisation par filtration stérilisante. Donc jus de raisin intégral, sans concentration ni modification.

Indications. — **Nutritif, Antitoxique, Alcalinisant, Diurétique.**

Toutes les indications de la cure de raisin : Auto-intoxications, Entérites, Insuffisance hépatique et rénale, Urologie, Néphrites, Arthritisme, etc.

Bolsson de chevet des malades dans tous les états infectieux et fébriles.

Dose moyenne. — 3 verres à bordeaux par jour, on peut augmenter sans inconvénient.

Se trouve dans toutes les Pharmacies : bouteille (8 à 9 verres) : 13 francs.

Bien spécifier la marque « Pampryl ».

Société du PAMPRYL

NUITS SAINT-GEORGES (Côte-d'Or)

Bureau de PARIS : 149, rue du Port-de-Bercy (XII°),
(Tél. : Diderot 37-88.)

PANBILINE

Formes. — Pilules et Solution.

Définition. — La Panbiline, spécifique total des *Maladies du Foie* et des affections qui en dérivent, agit simultanément sur la sécrétion hépatique et sur l'excrétion biliaire.

(Voir *Rectopanbiline*.)

Composition. — Elle associe synergiquement les Opothérapies Hépatique et Biliaire avec les Cholago-cholérétiques sélectionnés et réunit, en milieu glyciné : Extrait hépatique, extrait biliaire intégral, extrait de Boldo, podophyllin (traces). La Panbiline n'est ni toxique ni irritante, et ne contient ni sucre ni alcool.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Lithiase biliaire (Coliques hépatiques, Ictères), Hépatisme-Arthritisme, Cholémie familiale, Diabète par Dyshépatie, Artériosclérose, Tuberculose et Lymphatisme justiciables de l'Huile de Foie de Morue, que la Panbiline remplace. Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Entérite mucomembraneuse, Constipation, Appendicite, Fièvre typhoïde, Intoxications, Infections, Névroses, Troubles de la grossesse, Dermatoses par dyshépatie, Maladies des pays chauds, Congestions du foie, Hépatites et Cirrhoses (Alcool, Paludisme, Syphilis).

Doses moyennes. — 6 pilules de Panbiline ou 6 cuillerées à café de Panbiline liquide par jour, au début des repas. *Enfants* : Demi-dose.

N° d'Enregistrement au L. N. C. : 469-1-2.

Prix au public :

14 fr. 50 la boîte de 50 pilules de Panbiline.

21 fr. 30 le flacon de Panbiline liquide.

Laboratoires du Docteur PLANTIER

ANNONAY (Ardèche).

PANBIOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-36.

Forme. — Pilules.

Composition. — Acides aminés (Histidine, Tryptophane, Lysine), Extrait total de muqueuse et de muscle gastriques, Phosphore organique de l'embryon du blé, Manganèse organique, Fenugrec.

Propriétés pharmacodynamiques. — Anti-anémique, tonique, reconstituant. Fixateur des sels de chaux et de magnésium.

Indications. — Tous les états anémiques, toutes les asthénies, anorexies, déminéralisations. Grossesse, allaitement, croissance, rachitisme, cachexie; troubles de la nutrition et du métabolisme, convalescences.

Posologie. — 4 à 6 pilules par jour.

L'étui : 18 fr. 05.

LABORATOIRES A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

PANCALCION

Chlorure de Calcium d'action rapide.

Composition. — Solution halogénée titrée de *chlorure de calcium* cristallisé, stable et pur. XL gouttes = 1 gr. de CaCl^2 .

L'adjonction de traces d'halogènes et de P qui sont les satellites habituels du CaCl^2 dans l'organisme, lui assure une orientation biologique qui explique sa rapidité d'action (ces corps fixent le calcium à la manière des catalyseurs).

Indications. — *Recalcifiant* : croissance, rachitisme, fractures, lymphatisme, tuberculose, grossesse, allaitement. *Anti-hémorragique* : Préventif et curatif de toutes les hémorragies. *Diurétique-déchlorurant* : pleurésie, ascite, œdème, néphrites, albuminuries. *Anti-anaphylactique et redressant humoral* : accidents du sérum, urticaire, asthme, spasmophilie, tétanie.

Doses. — Se souvenir que XL gouttes = 1 gr. de CaCl^2 .

Dose quotidienne pour *adultes*, à prendre dans un peu d'eau sucrée avant les repas.

Recalcifiant : 1 gr. (2 fois XX gouttes).

Hémostatique : 2 à 4 gr. (4 fois XX gouttes ou 4 fois XL gouttes).

Diurétique déchlorurant ou anti-anaphylactique : 3 à 6 gr.

Enfants : V à X gouttes par année d'âge suivant les cas.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 71-33.)

PANCHOL-SEL

Poudre.

Composition :

Sulfate disodique chimiquement pur et anhydre...	8 gr.
Sulfate de magnésie pulvérisé	14 gr.
Phosphate de soude sec	20 gr.
Bicarbonate de soude pur	40 gr.
Citrate de soude pur	18 gr.
Pour 100 gr. de Panchol-sel.	

Indications. — Syndromes gastro-hépatiques, Dyspepsies, Toutes insuffisances hépatiques, Hépatisme et ses conséquences, Cures d'entretien et de complément, Cholécystites, Vésiculaires sensibles, Migraine, Urticaire, Hypertension, Hyperviscosité sanguine, Intoxications.

Posologie et mode d'emploi :

Doses moyennes. Adultes : une demi-cuillerée à trois cuillerées à café le matin à jeun dans un peu d'eau.

Enfants : un quart à une cuillerée à café le matin à jeun dans un peu d'eau.

Autre mode d'emploi. — Faire dissoudre 1 à 3 cuillerées à soupe dans 1 litre d'eau bouillie ou d'eau minérale. Prendre à jeun un verre à Bordeaux.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1593-2.

Laboratoires ROUSSEAU
SENS (Yonne).

PANCODINE

Le succédané le plus actif de la morphine, sans accoutumance ni toxicité, sans action nuisible sur les centres respiratoires.

Composition. — Chl. de Dihydrooxycodénone stabilisé.

Indications. — États douloureux chroniques, Coliques hépatiques et néphrétiques, Affections respiratoires, Névralgies, Douleurs postopératoires, Dysménorrhées, États spasmodiques, Prostatites, Syndromes cancéreux, etc.

Posologie :

Par voie hypodermique : 1 à 3 fois par jour 1/2 à 1 ampoule de 0.02 gr.

Par voie rectale : 1 à 3 fois par jour 1 suppositoire de 0.02 gr.

Présentation :

10 ampoules à 0,02, la boîte : 32 francs.

10 suppositoires à 0,02, la boîte : 30 francs.

Laboratoire de la PANCODINE

G. DUBŒUF, Pharmacien-Biologiste,

4, rue Raymond-Poincaré — NANCY.

Produit français.

PANCRÉAL KIRCHNER

Composition. — Le PANCREALUM KIRCHNER est le complexe d'extraits minutieusement dégraissés et purifiés de suc pancréatokinatique suractivé par des ferments biologiques auxquels revient une action thérapeutique aussi constante que parfaite.

Caractéristique :

- 1° *Comprimés de 25 centigrammes renfermant 100 p. 100 d'ingrédient actif (Hydrolases diastatiques et Zymases pancréato-kinatiques) sans addition de sucre, cacao, lactose ou amidon (véhicules) ;*
- 2° Procédé de purification perfectionné au plus haut degré, permettant d'obtenir un comprimé inaltérable et sans mauvaise odeur à laquelle le malade prenait le dégoût ;
- 3° Dosage et titrage exacts et une solubilité absolue dans le suc digestif alcalin ;
- 4° Pas de contre-indication.

Propriétés thérapeutiques et indications :

Pancréal Kirchner facilite et parachève la digestion (Dyspepsie, Gastrite, Intolérance de matières grasses), équilibre l'acidité du suc gastrique (Hypo ou Hyperchlorhydrie) et évite la Prédisposition à l'Ulçère.

Pancréal Kirchner réalise la Zymatothérapie totale et parfaite du Diabète.

Pancréal Kirchner est le vrai antiseptique physiologique des intestins dans les multiples infections gastro-intestinales (Gastro-entérite, Fermentations, Auto-intoxication, Urticaire).

Pancréal Kirchner représente le stimulant éminemment précieux de la sécrétion interne et de la régurgitation duodénale (Affaiblissement général, Régime de suralimentation, Vieillesse).

Pancréal Kirchner supprime les troubles de la grossesse (Vomissements) en garantissant l'afflux normal de la sécrétion interne et en compensant l'assimilation maternelle.

Pancréal Kirchner stimule les contractions péristaltiques et représente le remède étiologique de la Constipation.

Pancréal Kirchner active la sécrétion cellulaire du foie et règle l'élimination de l'acide urique.

Nourrissons :

Pancréal Kirchner permet le traitement de l'intolérance au lait de vache des nourrissons.

Pancréal Kirchner constitue le régularisateur du fonctionnement du tube gastro-intestinal du nourrisson en réalisant la désintoxication intestinale (Gastro-entérite) d'une façon plus parfaite que peuvent le faire les agents chimiques.

Doses :

Adultes : 3-4 fois par jour, 2-4 comprimés.

Enfants : 2-3 fois par jour, 2-3 comprimés.

Nourrissons : 2-3 fois par jour, 1-2 comprimés.

Prix : 22 fr. 50 le flacon de 60 comprimés.

11 fr. 50 le flacon de 30 comprimés.

Enreg. au L. N. C. n° 1799-1.

Littérature et échantillons :

Laboratoires du Docteur KIRCHNER
SARREGUEMINES-STRASBOURG

Toute correspondance : 24, rue de Verdun, STRASBOURG (Bas-Rhin).

PANCRÉASTASE DEFRESNE GRANULÉE

Caractéristiques. — Suc duodéno-pancréatique total activé maltasé à 5 p. 100. Ne contenant ni pulpe ni déchet et présenté sous forme de granulés protégés par un enrobage spécial.

Indications. — Digestions difficiles et prolongées. Troubles de l'assimilation : croissance insuffisante, amaigrissement, accidents anaphylactiques, urticaire, eczéma, réactions sériques.

Chez le nourrisson. — Traitement de l'intolérance au lait de vache, de l'athrepsie, du rachitisme, par la technique de prédigestion du lait au moyen de la Pancréastase.

Aucune contre-indication.

Doses. — *Enfants* jusqu'à 6 ans : 2 à 6 cuillers-mesures par jour. *Grands enfants ou adultes* : 6 à 12 cuillers-mesures par jour.

Littérature et Échantillons :

Laboratoires DEFRESNE

19, rue Jacob — PARIS (VI^e).

PANCRÉATINE (Pilules Philippe)

Pilules Kératinisées.

La pilule *Pancréatine Philippe*, grâce à sa gaine de Kératine, traverse la fraction du trajet digestif, dont le milieu est très notablement acide, sans subir de dommage qui détruirait ou entraverait son action. La pilule en arrivant ainsi intacte à l'intestin peut donner toute son action.

Indications. — Pancréatite chronique, insuffisance pancréatique, traitement d'entretien, du diabète, diarrhée et entérite rebelles, troubles de la motricité intestinale.

Posologie. — 4 à 8 pilules par jour, soit 2 à 4 pilules au moment des deux principaux repas.

Prix : 17 francs.

(Prière spécifier Pilules Philippe Pancréatine.)

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, Quai Fulchiron — LYON.

PANCRÉATOKINASE CARRION

Composition. — Poudre de pancréas et de muqueuse duodénale desséchés dans le vide.

Formes. — Comprimés dragéifiés. Granulé.

Indication. — Dyspepsies intestinales. Constipation.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés à chaque repas. *Enfants* : 1 à 2 mesures.

Présentation et prix. — Le flacon de 50 comprimés ou de granulé : 17 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 514-57.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré
PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PANCRÉATOSE IDON

Cl ₇ H ₁₉ AzO ³ HCl.....	0,50	Pancréatine	25
Na Cl.....	30	Mg O.....	15
Carb. Ca.....	50	Na H CO ³	850
Lactose	30	Essence d'Anis	1

Poudre, cachets et granulé à base de pancréatine, lactose, magnésie, chlorure de sodium, essence d'anis et un calmant.

Indications. — Maladies d'estomac, du foie et des intestins. Hyperchlorhydrie. Gastrite, gastralgie, urticaire, fermentations intestinales, dermatose, aérophagie, auto-intoxication, insuffisance hépatique.

Posologie

Poudre : 1 cuillerée à café avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Cachets : 1 cachet avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Granulé : 1 cuillerée à soupe avant ou après les principaux repas dans de l'eau.

Prix : Poudre et cachets : 12 fr. au public (10 jours de traitement).

Granulé 14 fr. au public (8 jours de traitement).

Laboratoire de la PANCRÉATOSE IDON

Jean BREVIERE (succ.)

Docteur en Pharmacie,

Ancien préparateur à la Faculté,

89, rue Saint-Georges — NANCY (M.-et-M.). (Tél. : 73-89.)

PANCRÉBILE

Composition :	<i>Pancréas total (ext. spécial).....</i>	0 gr. 1.
	<i>Bile dépigmentée, décholestérinée.</i>	0 gr. 20
	<i>Glandes de l'intestin (ext. pulv.)...</i>	0 gr. 05
	<i>Oléate de soude.....</i>	0 gr. 05
	<i>Carbonate de chaux. Q. S. p...</i>	1 dragée glutinisée.

Propriétés. — Stimulant et régulateur hépato-pancréatique. Cholagogue, Anti-infectieux, Laxatif doux.

Indications. — Foie, Intestin, Constipations, Dermatoses.

Posologie. — 1 dragée avant ou après les repas. Avaler sans croquer.

Constipations : 3 dragées le soir au coucher.

Nota. — PANCRÉBILE n'est pas un laxatif irritant, mais un cholagogue doux. Son action est augmentée par la présence du carbonate de chaux qui neutralise l'Acidité et dont le Calcium agit comme Auxo-ferment ou Zymosthénique.

PANCRÉBILE s'administre 1 heure avant les repas si on désire un effet excito-sécrétoire : 1 heure après, si on veut suppléer à la sécrétion pancréatique déficiente.

Commencer le traitement par une dragée à chaque repas. Augmenter suivant l'effet obtenu

Prix : 17 francs (15 jours de traitement).

Conditions spéciales au corps médical.

Laboratoire des Docteurs E. ALBERT

71, rue Saint-Anne, PARIS (II) — (Richelieu 19-26.)

App. pharm. et Dépôts France : O. C. P. — PARIS et tous Grossistes.

Afrique du Nord : PÉLISSARD — ALGER-CASABLANCA.

PANCRÉPAR

Médication eupeptique.

Association en proportions définies d'extraits pancréatique et hépatique, de bile de bœuf, de boldine.

Propriétés thérapeutiques. — Médication eupeptique régularisant les fonctions hépato-biliaires et pancréatiques.

Indications. — Manifestations digestives dues à un trouble d'assimilation. Dyspepsies, Insuffisance hépatique, Constipation d'origine hépatique, Anaphylaxie digestive, insuffisance pancréatique.

Forme. — Dragées glutinisées.

Doses et mode d'emploi. — Au début de chacun des trois repas : 2 à 3 dragées.

Enfants à partir de trois ans : moitié de ces doses. Au-dessous de trois ans, s'abstenir sauf avis contraire du médecin.

Prix au public : 18 fr. 25.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr. E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 29-29.)

PANCRÉPATINE LALEUF

Composition. — Extrait spécial de Pancréas activé par addition de Suc hépatique et analgésine.

Chaque capsule contient 25 centigrammes de principes actifs.

Propriétés et indications. — Opothérapie du Diabète par médication interne. Sous l'influence de la PANCRÉPATINE, on remarque :

- 1° Abaissement de la Glycémie;
- 2° Abaissement et disparition totale fréquente de la Glycosurie;
- 3° Disparition de la Polyphagie et retour à un appétit normal;
- 4° Disparition des troubles secondaires, soif, polyurie, prurit, etc.
- 5° Amélioration rapide de l'état général.

Forme. — Capsules glutinisées.

Posologie et mode d'emploi. — Les capsules de PANCRÉPATINE LALEUF doivent toujours être prises au cours des repas. De 6 à 12 capsules par 24 heures, suivant prescription médicale.

Durée moyenne des unités de vente. — 12 à 18 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 100 capsules : 27 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PANCRÉPEPTAL

Traitement des manifestations de l'insuffisance hépatique et pancréatique.

Antianaphylactique, désensibilisant de l'organisme en cas d'anaphylaxie alimentaire. Indiqué dans tous les cas de " choc protéinique ;

Asthme, Coryza spasmodique, Rhume des foins, Urticaire Eczéma, Migraines.

Composition. — Association de pancréatine, peptone, papaïne, lactate de chaux et bicarbonate de soude.

Le Pancrépeptal supplée à l'insuffisance des sucs digestifs, permet une désintégration plus complète de la molécule albuminoïde et, de ce fait, une meilleure assimilation.

Deux présentations. — Granulé et cachets (2 cuil. à café de granulé correspondent à 1 cachet).

Posologie :

Adultes : 2 cuil. à café de granulé dans un peu d'eau au début des 2 principaux repas, ou 1 cachet (en mangeant) au commencement ou au milieu des 2 repas. (Ne pas prescrire de cachets en dehors des repas.)

Enfants : 1 cuil. à café de granulé dans un peu d'eau au début des 2 principaux repas.

L. N. C. M. n^{os} 2011-1 et 2011-2.

H. PERRIN, pharmacien,

55, rue Auguste-Comte — LYON

PANCRINOL

Complexe d'extrait désalbuminé et délipoidé de foie, rate, rein et surrénale.

Indications. — Toutes les anémies, anémies banales ou secondaires, en particulier celles s'accompagnant d'état asthénique. — Toutes les convalescences des maladies aiguës ou infectieuses. — Toutes les dépressions physiques ou nerveuses, le surmenage, etc.

Action. — Reprise de l'appétit, réapparition des forces, augmentation du nombre des globules rouges et du taux de l'hémoglobine, élévation du poids.

Posologie:

Adultes : 2 à 4 ampoules de 7 cc. par jour ou 1 à 2 cuillerées à soupe d'Elixir.

Enfants : 1 à 3 ampoules de 3 cc. ou cuillerées à café de sirop ou d'Elixir par jour.

Présentation:

Adultes : Boîte de 10 ampoules de 7 cc. : 24 fr. 40.

— 30 ampoules de 7 cc. : 62 fr. 60.

Elixir, le flacon : 17 fr. 50.

Enfants : Boîte de 12 ampoules de 3 cc. : 17 francs.

Le flacon de sirop : 24 fr. 40.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

PANDRÉNALINE JULIEN

Gouttes. — Suppositoires.

Composition. — Extrait *total* désalbuminé et stabilisé de *glandes surrénales* contenant, en solution *exactement titrée et stable* :

— Un pour mille d'adrénaline *naturelle* extraite de la zone médullaire.

— Tous les *principes extractifs* antitoxiques contenus dans la zone corticale (Hormone, etc.).

Indications. — *Insuffisances surrénales* au cours des maladies infectieuses et toxiques, *asthénies* et *états neurasthéniques*, *hypotension*, *collapsus* et *choc*, *affections digestives*, *vomissements graves*, *hémorragies*, *intoxications aiguës*.

Posologie. — XV gouttes 2 fois par jour sur un morceau de sucre à sucer lentement.

3 suppositoires par jour. Chaque suppositoire contient X gouttes de Pandrénaline.

Prix : 20 fr. 40. — Echant. gratuit sur demande.

Louie JULIEN, Docteur en Pharmacie,

105, rue de Rennes, PARIS (VI^e). Tél. : Littré 80-76.

PANFÉBRINE

Médicament de la fièvre et de toutes les fièvres.

Stimulant les fonctions hépatique, biligène et splénique, sans action déprimante sur le cœur.

Traitement du paludisme : **Panfébrine AB.**

Spécifique de toutes les pyrexies : **Panfébrine B**

1° Panfébrine B (toutes fièvres).

Composition. — Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Son rôle. — Antithermique dans toutes les *pyrexies*.

Action. — 1° Apyrétique énergique chez tous les tuberculeux fébricitants ;

2° Maladies infectieuses (grippe, dothiéntenterie, scarlatine, etc., et phlegmasies de toutes sortes).

Posologie. — Un cachet-comprimé de Panfébrine B dès que la température est à 38° ou au-dessus (peut être renouvelée 2 à 4 fois en 24 heures).

Prix : le tube de 10 *cachets*, 16 fr. 10

2° Panfébrine AB (paludisme).

Composition. — Panfébrine A : Acide méthylarsinique $As = O-CH^3 (OH)^2$. Alcaloïdes totaux hydrogénés des Cinchonas. Opothérapie hépatique, biliaire et splénique.

Panfébrine B : Composition indiquée ci-dessus.

Son rôle. — Action spécifique dans le paludisme (n'occasionne jamais d'accidents quiniques).

Avantage. — Innocuité absolue.

Posologie. — Préventif : 1 cachet-comprimé A le matin, 1 cachet-comprimé B le soir. — Paludisme aigu et chronique : 3 cachets-comprimés A et 3 cachets-comprimés B par jour. — *Enfants* : 12 ans, 2 cachets-comprimés A et 2 cachets-comprimés B par jour; de 7 à 8 ans, 1 cachet comprimé B par jour.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments, sous les n°s 586-11 et 586-12.

Prix : la boîte de 40 *cachets*, 38 fr. 50.

Échantillons et littérature :

Laboratoires DORANTOWICZ

17 bis, avenue Parmentier — PARIS (XI°).

(Tél. : Roquette 14-12.)

PANFLUINE

Du Docteur Moity.

Combinaison organique dissimulée d'iode, avec les tanno-glucosides de vaso-constricteurs et plastifiants veineux.

Indications. — Régulateur circulatoire, Affections phlébotiques et artérielles, Hémorroïdes, Varices, Hypertension, Troubles congestifs, Formation de la jeune fille et troubles de la quarantaine chez les deux sexes, Rhumatismes diathésiques et infectieux, Arthritisme, Hyperviscosité sanguine, Dépuratif.

Formule. — Ex. *Hydrastis Canadensis*, 4 ; — Sol. Intrait Marron d'Inde stabilisé, 2 ; — Extrait fl. *Viburnum Prunifolium*, 2 ; — Extrait fl. *Hamamelis virginica*, 8 ; — Extrait fl. *Rhamnus frangula*, 2 ; — T. *Cupressus Sempervirens* 2 ; — Teinture d'Iode combiné, 2 pour 100 cc.

Doses. — 3 à 5 comprimés par jour, 2 à 3 cuillerées à soupe, Selon les indications du médecin.

Prix : Flacon de 250 cc. : 17 francs. Boîte 40 comprimés : 17 francs.

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du Dr J.-O. MOITY

Docteur en Médecine, Docteur en pharmacie,
ex-interne des hôpitaux de Paris.

199, Boulevard Bineau — NEUILLY-SUR-SEINE.

PANGADUINE

Bloc total de Vitamines et Principes actifs des Foies de Morues.

Composition. — La *Pangaduine* contient tous les alcaloïdes, phosphoglycérides, lécithines, vitamines et principes actifs des foies de morue.

Elle permet d'absorber, sous un petit volume et sous une forme de goût très agréable, la valeur d'une grande quantité d'huile de foie de morue.

Indications (Fatigue générale). — Les indications de la *Pangaduine* sont celles de l'huile de foie de morue que peu d'enfants et de grandes personnes tolèrent.

C'est le médicament par excellence des enfants et des jeunes gens déprimés par une croissance difficile ou trop rapide, des neurasthéniques, des convalescents et de toutes les personnes fatiguées par un travail excessif ou pour toute autre cause.

C'est le médicament à prescrire dans l'insuffisance hépatique.

Action. — La *Pangaduine* agit :

1° Comme stimulant de la nutrition et de la circulation ;

2° Comme diurétique.

Au bout de quelques jours de traitement, on remarque toujours le retour de l'appétit et la reprise des forces.

Deux formes agréables et actives :

Adultes : Pangaduine Elixir : 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Prix, le flacon de 310 cc. : 19 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-25.

Enfants : Pangaduine granulée, 1 à 2 cuillerées à café avant chaque repas selon l'âge.

Prix, le flacon de 95 grammes : 10 fr. 85.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1059-24.

Docteur MARTINET

16, rue du Petit-Musc — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 39-44)

PANGASTROL

Pansement de l'Estomac.

Composition. — Kaolin, Bismuth, Belladone, Codéine, Carbonate de Chaux, Magnésie.

Forme. — 15 Sachets de 10 grammes.

Propriétés thérapeutiques. — De par sa composition, le PANGASTROL réalise le pansement gastro-intestinal le plus parfait, et soulage rapidement les douleurs les plus aiguës.

Indications. — Hyperchlorhydries, Spasmes gastriques, Ulcères, Aérophagie, Dyspepsies, Diarrhées, Fermentations.

Prix : 14 fr. 90

Enregistré L. N. C. n° 62-2.

Laboratoire STOULS

156, Av. Victor-Hugo, PARIS. (Passy 68-14.)

PANGESTYL NARTY

Nature et action. — Le *Pangestyl Narty* est un produit mixte qui agit : 1° Par les antiseptiques et absorbants qu'il contient, comme désinfectant remarquable du tube digestif ; 2° par l'heureuse combinaison des ferments qui en font un digestif de tout premier ordre, d'où son nom :

PANGESTYL (*qui digère tout*).

Indications. — Dyspepsies, Hypo ou Hyperchlorhydrie, Stases gastriques, Dilatations d'estomac, Désinfection intestinale, Diarrhée. Excellent désinfectant du foie et de ses voies d'excrétion ; Coliques hépatiques, Ictère ou Jaunisse, Angiocholites, Cholécystites, etc.

Formes et Mode d'emploi. — *Granulés* ou *Cachets*. Une cuillerée à café de granulé ou un cachet à la fin des repas ou au moment des malaises dans une infusion chaude, café, tilleul, thé, camomille, etc.

Granulés : 17 fr. 50. (25 cuillerées à café).

Cachets : 15 francs (24 cachets).

Laboratoires Georges TINARD

134, boulevard Péreire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

PANGLANDINE

Description. — La *Panglandine* est une préparation opothérapique comprenant l'ensemble des glandes endocrines et dosée en raison de l'activité physiologique de chaque glande : hypophyse, thyroïde, surrénales, glandes génitales (ovaires, testicules et prostate), parathyroïdes, thymus, rate, moelle rouge, foie, pancréas, duodénum.

Action thérapeutique. — En raison des connexions fonctionnelles des endocrines et de leurs interdépendances, toute dysfonction glandulaire entraîne des perturbations générales du système sympathico-endocrinien, dont le traitement exige une médication « panglandinienne », à doses régulatrices ou légèrement stimulatrices. Cette posologie prudente et nuancée permet d'adapter le traitement adéquat à chaque cas sans fatiguer l'organisme, ni exciter les glandes dont le fonctionnement est normal.

Indications. — La *Panglandine* ne s'adresse pas aux lésions glandulaires graves (maladie d'*Addison*, maladie de *Basedow*), mais plutôt aux *petits états endocriniens*, petits insuffisants pluriglandulaires, dont le tableau clinique est souvent mal défini, parce que les signes en sont insuffisants ou imprécis.

Troubles de croissance physique, de développement du psychisme ; certains troubles de la nutrition, de la vie génitale ; dysfonctions ovariennes chez la femme (aménorrhée, dysménorrhée, frigidité, stérilité) ; impuissance chez l'homme, sénilité précoce ; convalescences après maladies infectieuses ; asthénie, surmenage scolaire et comme adjuvant chez les tuberculeux qui sont de grands déficients pluriglandulaires.

Formes pharmaceutiques. — La *Panglandine* est présentée sous deux formes distinctes :

1° **Capsules** (50 par flacon) qui se prescrivent à raison de 2 à 18 par jour, la dose moyenne suffisante étant en général de 3 à 6 capsules.

2° **Solution** glycinée plus pratique pour les enfants (flacon de 45 centimètres cubes) se prescrivant de X à XL gouttes à 2 ans ; XX à LX gouttes à 5 ans ; L à C gouttes à partir de 10 ans (XX gouttes correspondent à une capsule).

Prescrire : *Panglandine capsules* ou *Panglandine liquide*.

Prix. — Capsules : 28 fr. 60. Solution : 31 fr. 20.

Durée du traitement : Capsules 5 à 25 jours. Solution 10 jours à 3 mois.

LABORATOIRES COUTURIEUX

18, avenue Hoche. — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

PANHÉMOL

Composition :

Sirop :

Extrait hématique total.....	8 gr.
Glycérophosphate de Sodium cristallisé..	0 gr. 10
Extrait hydro-glycéro-alcoolique d'écorces d'oranges amères.....	Q. S. P. 15 cc.

Indications. — Anémie, Asthénie, Surmenage, Convalescences, Tuberculose, Rachitisme, Croissance, Déchéance organique, Hémorragie, Paludisme.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop avant chaque repas, midi et soir.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café de sirop suivant l'âge, avant les repas, midi et soir.

Laboratoires R. BOUYSSOU
à CHAMBOIS (Orne).

PANLUTÉINE VOGEin

Association de 0,05 extrait total ovarien et de 0,005 extrait thyroïdien.

Indications. — Dans tous les cas où il y aura carence de l'organisme en extrait total ovarien. Elle réussit merveilleusement dans tous les cas de castration chirurgicale ou spontanée, troubles de la ménopause, obésité de la ménopause.

Posologie. — 2 comprimés avant les 2 repas. 10 jours par mois. Le flacon : 18 fr. 35, Traitement de 10 jours.

L. N. C. n° 745-9.

Laboratoires VOGEin

2 à 6, rue des Deux-Ponts — PARIS (IV^e).
(Tél. : Danton 83-24.)

PAN-NEUROL

Stabilisateur et Régulateur du Système Nerveux.

Traitement biologique de toutes les Neurotonies.

Forme. — *Comprimés Dragéifiés.*

Composition. — Phényléthylmalonylurée. Polybromures. Belladonne. Passiflore. Phosphoglycérates.

Indications. — Etats anxieux et émotifs. Palpitations. Insomnies rebelles. Dépression nerveuse. Neurotonies cardio-vasculaires et gastro-intestinales.

Posologie. — 4 à 6 comprimés en 24 heures, de préférence au moment des repas.

Prix : 17 francs l'étui de 40 comprimés.

Enregistré L. N. C. n° 62-4.

Laboratoire STOULS

156, Av. Victor-Hugo, PARIS. (Passy 68-14.)

PANOSAN

Tonique général.

Reconstituant énergique. Préparation agréable et suractivée.

Composition. — Elixir complexe à base de vins généreux contenant entre autres des hypophosphites, de la créosote, du gaiacol, des extraits hépatiques, pancréatiques et spléniques, de l'huile de foie de morue prédigérée, de l'extrait de malt, de la gentiane et de la noix vomique.

Indications. — Toutes les convalescences et en particulier celles des maladies pulmonaires. Anémies, Déficiences organiques, Asthénie post-grippale.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe 4 à 6 fois par jour, avant ou après les repas. *Enfants* : De 3 à 5 ans, 1 cuillerée à café. Au-dessus de 5 ans, jusqu'à 2 cuillerées à café.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le N° 150-8.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en Pharmacie

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.

PANOSTYL

Régénérateur total

à base de sang pur de pur sang boulonnais.
Renferme l'hémoglobine totale et les hormones en solution dans le plasma sanguin dilué-fluoré.

Anémie, Tuberculose, Dénutrition, Croissance
Surmenage, Convalescences, Paludisme,
Déchéances organiques.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules. Voie buccale, réalisant l'opothérapie sanguine intégrale.

Posologie. — 2 ampoules par jour aux repas.

Aucune contre-indication.

Prix de vente au public : 18 francs.

Laboratoire N. de C. des M. n° 1018-1.

Littérature et échantillons :

PHARMACIE BIOLOGIQUE

57, rue Mathurin-Régnier — PARIS (XV^e).

Adr. télég. Ibacépède-Paris 102.

(Tél. : Ségur 11-40.)

Fournisseur des hôpitaux civils et militaires.

PANPHYSEX

Biosymplex hypophysaire total.

Actif par voie buccale.

Composition. — Extrait hydroalcoolique d'hypophyse totale fraîche (procédé Biosymplex). 1 cc. (35 gouttes) de solution correspond à 0 gr. 25 de glande fraîche.

Mode d'action. — Panphysex possède toutes les activités hormonales de l'hypophyse, ce « cerveau endocrinien », qui agit sur la croissance, la morphogénie, le fonctionnement des gonades ; régularise les métabolismes de l'eau, des lipides et des glucides ; stimule le fonctionnement de toutes les glandes endocrines (thyroïde, etc.)

Avantages. — A l'encontre des produits purifiés dont l'action exclusivement substitutive n'opère que par injections et cesse avec l'administration du produit, Panphysex est actif per os à faibles doses ; Panphysex remplace ou stimule les sécrétions absentes ou déficientes.

Indications. — Toutes les insuffisances hypophysaires : Troubles de croissance : Retards de développement statural et pondéral, Syndromes adiposo-génitiaux, Acromicrie.

Troubles génitaux divers : Infantilisme, Aménorrhées. Dysménorrhées, Oligoménorrhées, Impuissance masculine, Cryptorchidie.

Troubles des métabolismes : Polyurie cryptogénétique, Diabète insipide, Maigreurs, Obésités hypophysaires.

Retard de développement psychique : Attention, Mémoire, Langage, Arriération mentale, Mongolisme.

Posologie. — 5 à 20 gouttes en 2 ou 3 prises. *Absorber les gouttes 1/2 heure avant les repas, dans un peu d'eau ou sur un morceau de sucre que les malades laisseront fondre lentement dans la bouche.*

Commencer par 1 à 2 gouttes par jour et augmenter peu à peu pour atteindre la dose utile au bout d'une semaine de traitement (chez les malades très sensibles, diminuer légèrement la posologie en cas de nervosisme).

Dans la plupart des cas, appliquer le traitement par période de 15 jours, espacées de périodes de repos de 8 à 15 jours.

Ne pas interrompre brusquement le traitement, diminuer graduellement la posologie.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-12.

Prix, le flacon : 28 fr. 55.

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, avenue du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).
(Tél. : Alésia 28-51.)

PANSARCINE FOUCHÈRE

Indications. — Asthénie, Anémie, Surmenage physique et intellectuel, Croissance, Suite d'opérations.

1° Sirop. — Plasma musculaire d'équidés aromatisé.

Trois cuillerées à soupe par jour avant les repas.

2° Élixir. — Plasma musculaire d'équidés, Acide phosphorique, Chlorure de manganèse, Noix vomique, Noix de kola.

Un verre à liqueur avant les deux repas.

3° Ampoules buvables. — Plasma hémato-musculaire, Nucléinate de manganèse, Fer, Foie, Rate, Thymus, Surrénale.

Une à deux ampoules par jour aux repas dans un peu d'eau sucrée.

Laboratoire de Thérapeutique générale du S. E.

A. FOUCHÈRE, Pharmacien,

RIVE-DE-GIER.

PANSEMENT NEMAUSA

(Boîtes brevetées NEMAUTAL)

Pour le médecin qui n'a pas à pratiquer quotidiennement des pansements aseptiques, la disposition de plusieurs compresses dans une même boîte présente le grand inconvénient de compromettre l'aseptie des gazes non encore utilisées, quelles que soient les précautions prises en prélevant chaque compresse.

Le dispositif NEMAUSA consiste à isoler chaque compresse dans un sachet hermétique se décachetant comme une carte-lettre et assurant sa protection individuelle. Les boîtes brevetées NEMAUTAL, en feuille métallique soudée, contiennent 10, 25 ou 50 sachets NEMAUSA.

Avantages. — Facilité d'ouverture de la boîte NEMAUTAL et du sachet NEMAUSA.

Conservation de l'aseptie pour les compresses non encore utilisées.

Prix réduit de la boîte NEMAUTAL.

Formes. — Le dispositif NEMAUSA est appliqué aux :

Compresses de gaze Nemautil, Compresses oculaires Nemautil, Coton pour accouchement Nemautil, Pansement vulvaire Nemautil, Pansement ombilical Nemautil, Tampons vaginaux Nemautil, Tulle gras Nemautil.

Laboratoires de la FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT

5, Grande-Rue — MONTPELLIER.

(Tél. : 54-93.)

PANSMACOL

du Docteur Moity

Pansement colloïdal gastro-intestinal

Formule. — Kaolin colloïdal, 80 gr. — Silicate de calcium activé, 10 gr.
— (5 gr. absorbent 268 cc. CO₂). Silicate de magnésium précipité, 10 gr.

Indications. — Toutes les gastrites — Toutes les colites — Toutes les inflammations de l'intestin — Ulcères — Hyperchlorhydrie — Désinfection gastro-intestinale — Aérophagie.

Aucune contre-indication.

Le Pansmacol est très agréablement aromatisé et édulcoré sans addition de sucre (pas d'amorce de digestion). Il peut être prescrit aux diabétiques.

En suspension dans un demi-verre d'eau, il présente la facilité d'absorption d'une crème vanillée.

Mode d'emploi. — *Traitement de base* : une grosse cuillerée à soupe bien délayée dans un demi-verre d'eau, le matin à jeun.

Se coucher 5 minutes sur chaque côté.

Une deuxième cuillerée à soupe le soir, avant le dîner.

Traitement symptomatique : une cuillerée à soupe au moment des douleurs et à n'importe quel moment.

Prix, la boîte de 200 grammes : 18 francs,

Diffusion strictement médicale.

Laboratoire du D^r J.-O. MOITY

Docteur en médecine, Docteur en pharmacie,

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

199, boulevard Bineau — NEUILLY-sur-SEINE.

PANSOLANÉE

Composition. — Extrait de belladone spécialement titré.

Indications. — Excellent médicament susceptible d'apaiser l'état nerveux des malades anxieux, quelle que soit l'origine de cette anxiété, elle est la médication apaisante par excellence en ce sens qu'elle apaise l'excitation nerveuse de ces malades en même temps qu'elle calme les douleurs qu'ils ressentent et leur rend confiance.

Mode d'emploi :

Ampoules : 1 injection sous-cutanée par jour.

Comprimés : 2 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 par jour le matin ou le soir de préférence après une selle.

Boîte de 15 ampoules.

— de 8 ampoules.

— de 30 comprimés.

— de 16 suppositoires.

— de 8 suppositoires.

Enregistré au L. N. C. M. sous les numéros :

Amp. 590-13. Comprimés 590-15. Suppositoires 590-14.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-50.)

PANSTOMASE

1° Ampoules buvables ; 2° Dragées à noyau mou.
Méthodes de Castle et de Whipple associées.

Composition. — Extrait de foie de veau ; Extrait et suc frais de muqueuse d'estomac, d'antra pylorique et de jejunum de porc. Renferme donc à la fois tous les principes antianémiques et tous les ferments digestifs à l'état naissant, notamment la Pepsine et la Sécrétine.

Indications. — Toutes les Anémies, Apepsies, Asthénies, Cirrhoses du foie, Cholécystites, Tuberculoses, Achylics, Dyspepsies, Gastrites chroniques hypoacides, Entérocrites, Diarrhées.

Posologie. — Ampoules buvables : de 1 à 3. Dragées, de 2 à 6 par jour, aux repas ou en dehors des repas.

Prix. La boîte de 10 ampoules : 37 fr. 10

24 Dragées : 21 fr. 20

Laboratoires GENEVRIER

45, rue du Marché — NEUILLY (Seine).

(Tél. : Mai. 17-77).

PANSULINE

(Ex-Insuline Buccale FORNET.)

Principe actif :

Extrait hypoglycémiant de la sécrétion interne des îlots de Langerhans.

Présentation :

Concentration I (faible) : *Pilules vertes.*

Concentration III (forte) : *Pilules rouges.*

Posologie. — 3 pilules 3 fois par jour, *strictement* une demi-heure avant les repas.

Indications. — *Tous les cas justiciables de l'Insuline* (cas graves exceptés). Glycosurie, anorexie, amaigrissement, vomissements incoercibles et acétoniques, cardiopathies, etc.

Observation. — Toujours recourir à la concentration forte (concentration III, pilules rouges) au début du traitement.

Prix : 28 francs et 49 francs.

L. N. C. 353-7, 353-8.

Laboratoires THAIDELMO

11, Chaussée de la Muette — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 21-69.)

PANTAMINE

Composition et forme :

Granulé dosimétrique renfermant par mesure de 1 gramme :

- | | |
|---|------------------------|
| 1° Vitamine A (Huile d'Halibut)..... | 6.250 Unités Internat. |
| 2° Vitamine D (Stérols marins)..... | 1.000 Unités Internat. |
| 3° Vitamine C (Extrait de Cynorrhodon)..... | 20 Unités Internat. |
| 4° Hydrolysât de levures (Vitamines B ₁ et B ₂ — Acides aminés et diastases) 0 gr. 15 | |

Indications :

- 1° *Nourrissons* : Etats de dénutrition, d'hypotrophie, d'anorexie.
 2° *Enfants* : Toute la période de croissance. Rachitisme et Lymphatisme.
 3° *Adultes* : Affections saisonnières. Insuffisance de régimes. Grossesse et lactation.

Avantages :

- 1° *Origine naturelle* et équilibre biologique des Vitamines.
 Les Vitamines naturelles sont plus actives, mieux assimilées et moins toxiques que les Vitamines synthétiques. Une proportion judicieuse est indispensable pour éviter les antagonismes.
 2° *Totalité des Vitamines et des Acides aminés.*
 Les Avitaminoses simples sont rares ; par contre, les carences relatives sont extrêmement fréquentes. Les acides aminés, les diastases et les bases hexoniques sont les éléments catalytiques indispensables à une bonne assimilation.
 3° *Concentration maxima et administration facile.*
 Granulé à grains très fins, d'absorption très facile, même pour les nourrissons. Action très rapide.

Posologie.

Nourrissons : 1 mesure de 1 gramme par jour, en 2 ou 3 fois, qu'on peut faire dissoudre dans un peu de lait tiède.

Enfants et Adultes : 2 mesures de 1 gramme par jour.

Prix : 25 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 507-63.

Laboratoires **ROBERT et CARRIÈRE**

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

PANTAVOINE

CORBIÈRE

Principes excito-toniques de l'avoine employés pour la première fois en thérapeutique.

Composition. — Complexe lipido-protéique, huile essentielle aromatique, hormone, alcaloïdes de l'avoine.

Propriétés thérapeutiques. — Action excito-tonique sur le système neuro-musculaire.

Indications. — Asthénies de toute origine, Insomnie, Oligurie, Impuissance sexuelle, Diabète, Anémie et asthénie des colonaux, Surmenage des intellectuels.

Posologie. — 6 à 10 comprimés par jour, avant les repas.

Présentation. — Comprimés. Boîte de 60.

Prix : 16 fr. 50.

Produit naturel, puissant, dénué de toute toxicité.

Laboratoire **Pharmaceutique CORBIÈRE**

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

PANTOGÈNE

Forme. — Élixir, granulé vermicellé.

Composition. — Arrhénal, manganèse, acide nucléinique, glycérophosphate de soude, carbonate de chaux, lécithine.

Dans l'élixir sont ajoutés : kola, coca, noix vomique.

Indications thérapeutiques. — Anémie, surmenage, convalescences, asthénies, anorexie, puissant accélérateur de la nutrition, tonique de la cellule nerveuse.

Posologie. — *Élixir* : une cuillerée à soupe avant les deux repas. *Enfants* : demi-dose.

Granulé : une cuillerée à café pendant ou après les trois repas. *Enfants* : demi-dose.

Prix. — Élixir : 22 fr. 90.

Granulé : 16 fr. 65.

Établissements André **HATIER**

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire)

PANTOPON « ROCHE »

Opium total injectable. — Tous les alcaloïdes de l'opium sous forme de chlorhydrates solubles et injectables.

- 0 g. 01 de **Pantopon « Roche »**,
- = 0 g. 50 de teinture d'opium,
- = 0 g. 025 d'extrait d'opium,
- = 0 g. 005 de morphine.

Posologie et modes d'emploi.

Voie buccale :

PANTOPON « ROCHE » SIROP

(dosé à 0 g. 01 de Pantopon « Roche » par cuillerée à soupe.)

Adultes : 1 à 3 cuill. à soupe par jour et plus.

Enfants : 1 à 3 cuill. à café selon l'âge.

PANTOPON « ROCHE » COMPRIMÉS

(Flacon de 20.)

(1 comprimé = 0 g. 01 de Pantopon « Roche ».)

Adultes : 1 à 3 par jour et plus.

Voie Hypodermique :

PANTOPON « ROCHE » AMPOULES

(1 ampoule = 1 cm³. = 0 g. 02 de Pantopon « Roche ».)

Boîtes de 6 et 12 Ampoules.

Adultes : 1 à 2 par jour et plus.

Enfants : 1/4 à 1/2 ampoule selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Toutes celles de l'opium, de la morphine et de leurs dérivés.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 504-25 (poudre), 504-26 (sirop), 504-23 (comprimés), 504-22 (ampoules).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

PANVEININE

Synergie phytothérapique toni-veineuse suractivée par la présence d'une petite dose d'Iodométhylate de Formène.

Formule :

Extr. <i>Æsculus Hippocastanum</i>	0.02	Extr. <i>Origanum Marjorana</i>	0.01
Extr. <i>Hamamelis virginica</i>	0.02	Extr. <i>Cratægus Oxyacantha</i>	0.02
Extr. <i>Cupressus sempervirens</i>	0.01	Pulvis Hoang-Nan.....	0.01
Extr. <i>Senecio Jacobæa</i>	0.01	Extr. <i>Pneumus Boldus</i>	0.02
Extr. <i>Cassia Bursapastoris</i>	0.01	Extr. <i>Cascara sagrada</i>	0.02
Extr. <i>Hyoscyamus niger</i>	0.01	Méthyl-iodydhydrate de Formine	0.02
		Pour un comprimé	

Indications :

- 1° *Tous les états variqueux* et de leurs complications : Phlébites, Péri-phlébites, Ulcères, Eczémas.
- 2° *Des affections hémorroïdaires* et des troubles qu'elles entraînent.
- 3° *Des troubles circulatoires dus à l'âge ou au cycle menstruel* : Dysménorrhée, Métrorragies de la ménopause ou de la puberté, règles douloureuses ou irrégulières.
- 4° *De l'hypertension* accompagnant souvent la ménopause et se manifestant par des céphalées, des vertiges, des bouffées de chaleur.

Mode d'emploi et doses :

La *Panveinine*, dépourvue de toxicité et d'effets secondaires fâcheux, se prescrit à la dose moyenne de 2 à 3 dragées avant les deux principaux repas, par périodes de dix à quinze jours.

Prix : 18 francs l'étui de 50 dragées.

Laboratoire Scientifique AUCLAIRE

E. AUCLAIRE, Pharmacien de la Faculté de Paris,
36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e).

PANVITA

Vitaminothérapie Intégrale.

Composition. — Vitamines A, B¹, B², C, D, E, associées aux acides aminés nobles.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'équilibre et de résistance aux infections, favorise la croissance.

Indications. — Troubles de croissance, Prétuberculose, Convalescence, Toutes les carences vitaminiques, Diabète.

Deux formes : Comprimés.

Liquide (chaque boîte contient :

Flacon n° 1 : Vitamines hydrosolubles ;

Flacon n° 2 : Vitamines liposolubles.

Posologie. — *Nourrissons* : 2 comprimés ou XX gouttes de chaque solution par jour. *Enfants* : 4 comprimés ou XL gouttes. — *Adultes* : 6 comprimés ou LX gouttes de chaque solution.

Laboratoire A. DEFFARGE, Docteur en Ph¹^e
188, cours de la Somme — BORDEAUX. (Tél. : 91-609.)

PANXYLON LOGEAI

INJECTABLE

Auto-défense de l'organisme par immunisation indirecte contre les infections aiguës, subaiguës et chroniques.

Injectons sous-cutanées ou intramusculaires atoxiques indolores et alternées de :

1° Cinnaméine (amp. A) :

Cinnaméine totale du Miroxylon

Pereiræ 0 gr. 07

Oleum olivæ neutrum déshyd ... 1 cc.

2° Campholine (amp. B) :

Camphorate de choline 0 gr. 01 p. 1 cc.

Pharmacodynamie :

La Cinnaméine totale LOGEAI est extraite directement du Baume du Pérou, dont elle contient tous les principes actifs et naturels.

Elle est donc plus active que le seul Cinnamate de Benzyle préparé synthétiquement.

La Cinnaméine a une action immunogène et leucocytaire intense (Brown Séquard).

La Campholine joint à son pouvoir cholestérinogène une intense action toni-cardiaque et sympathico-tonique ainsi qu'une augmentation considérable des globules rouges. L'association de ces deux produits en une synergie médicamenteuse réalise l'auto-défense de l'organisme.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences médicales et chirurgicales, Etats infectieux des voies respiratoires, Infections pulmonaires spécifiques ou non.

Mode d'emploi. — Une ampoule chaque jour, en alternant les ampoules A et B. Dans les cas aigus, injecter simultanément les 2 ampoules A et B en mélangeant le contenu dans la même seringue.

Avant injection, faire tiédir l'ampoule Cinnaméine.

PANXYLON L 12% : Injections modificatrices locales, Fistules, Adénites, Pneumothorax.

PANXYLON GRANULÉ : entre les séries de PANXYLON injectable.

Forme et prix au public :

8 amp. 1 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B) ... 19 fr. 20

8 amp. 2 cc. 5 (4 amp. A, 4 amp. B) .. 23 fr. 45

12 amp. 2 cc. 5 (6 amp. A, 6 amp. B) . 31 fr.

PANXYLON GRANULÉ. La boîte 20 fr. 30

PANXYLON L (3 amp. 10 cc) 23 fr. 45

PANXYLON L (6 amp. 5 cc.) 25 fr.

Laboratoires

des Spécialités Scientifiques LOGEAI

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 40-15 et 16.)

PAPAVÉRINE HOUDÉ

Granules titrés à 2 centigrammes.

Propriétés thérapeutiques. — Antispasmodique, avec effet électif sur les *muscles striés* de tout l'organisme. Dilatateur énergique des coronaires, hypotenseur. Stimulant respiratoire. Équilibrant du système végétatif.

Indications. — Angine de poitrine. Spasmes artériels en général. Migraine. Spasmes gastro-intestinaux (constipation, vomissements, hyperchlorhydrie). Spasmes œsophagiens. Asthme, coqueluche, toux quinteuses et émétisantes.

Présentation. — Granules titrés à 2 centigrammes de chlorhydrate de Papavérine rigoureusement pur (alcaloïde du *Papaver species*).

Posologie. — 5 à 12 granules par jour. Chez l'enfant (coqueluche, diarrhées infantiles) débiter par 1/4 de centigramme par année d'âge *pro die*, pour arriver progressivement à 1 centigramme et demi.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS (X^e). (Tél. : Nord 40-58.)

PAPAVÉRYL

Chlorhydrate de papavérine chimiquement pure.

Indications. — Oblitération artérielle aiguë. *Tous les spasmes musculaires lisses.* Résultats particulièrement remarquables dans : l'hypertension, l'angine de poitrine, les spasmes digestifs, l'entérocolite muco-membraneuse, les coliques hépatiques, néphrétiques, la constipation spasmodique, l'asthme, les toux spasmodiques (Coqueluche), le hoquet, la dysménorrhée.

Présentation : Existe sous trois formes :

- 1° Tube de 20 comprimés dosés à 4 cgr. par comprimé.
- 2° Boîte de 6 et 12 ampoules de 2 cc. dosées à 4 cgr. par ampoule.
- 3° Boîte de 6 suppositoires dosés à 4 cgr. par suppositoire.

Posologie :

2 à 6 comprimés par jour et plus. Chez l'enfant 1/4 de comprimé par année d'âge.

Laboratoire ORRILLARD

J. LAVALLE

245, rue de Vaugirard — PARIS

(Tél. : Suffren 78-88.)

PAPIER IODOGÈNE EYMONNET à l'iode naissant.

Toute la réoulsion. Depuis la rubéfaction jusqu'à la vésication.

Remplace : Vésicatoires, Sinapismes, Ventouses, Coton iodé.

Aucune contre-indication. Non toxique pour le rein.

Mode d'action. — La feuille de révulsif est formée de plusieurs papiers accolés, imbibés de produits qui, au contact de l'eau, se décomposent en libérant de l'iode.

Mode d'emploi. — Tremper une feuille dans un peu d'eau. L'iode naissant apparaît. Appliquer à l'endroit voulu et recouvrir de la feuille imperméable incluse dans la pochette.

Durée d'application : 2 à 5 minutes : Rubéfaction.

5 à 10 minutes : révulsion simple, égale aux ventouses et sinapismes.

10 à 20 minutes : révulsion moyenne.

30 à 40 minutes : révulsion forte, légère vésication.

Au delà : vésication avec soulèvement de l'épiderme.

Indications. — Toutes affections pulmonaires et pleurales. Tous rhumatismes. Toutes névralgies, lumbagos, sciatiques. Médication sans égale, très aimée de la clientèle. (*Adjuvant de la Chimiothérapie.*)

Prix : La pochette deux feuilles : 8 francs.

Laboratoire du PAPIER EYMONNET

14, Grande-Rue — PONT-DE-VAUX (Ain).

PAQUETS ALCALS

Les Paquets Alcals s'adressent à l'appareil digestif (*estomac, foie, intestin*). Ils ont pour but de réaliser la médication alcalino-sodique sous une forme simple et pratique.

Il existe *trois spécialités* distinctes, différentes par leurs formules pour s'adapter aux *nourrissons, aux enfants, aux adultes*.

Ce sont les :

Paquets Alcals-Nourrissons.

Paquets Alcals-Enfants.

Paquets Alcals-Adultes.

PAQUETS ALCALS-NOURRISSONS

Formule :

Citrate de soude hydraté.....	0 gr. 40
Sulfate de soude hydraté	0 gr. 50

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Agit aussi bien à titre préventif qu'à titre curatif dans les embarras gastriques, l'insuffisance hépatique, les affections cutanées (éruptions, eczéma, prurigo, strophulus), inappétence, accidents de la dentition.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant le cas.

(Prix : 12 francs.)

PAQUETS ALCALS-ENFANTS

Formule

Carbonate acide de sodium	0 gr. 50
Phosphate mono-acide de sodium hydraté	1 gr.
Citrate de sodium hydraté.....	0 gr. 80
Sulfate de sodium officinal hydraté.....	1 gr.

Pour un paquet de poudre *desséchée*.

Indications. — Dyspepsie, gastrite, insuffisance hépatique, entérite, intoxication alimentaire, constipation, hyperchlorhydrie et dermatoses telles que prurit, boutons, acné, urticaire, eczéma, prurigo.

Présentation. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative exposant les modes d'emploi suivant l'âge.

(Prix : 15 fr. 40.)

PAQUETS ALCALS-ADULTES

Formule. — Même composition que les « Paquets-Alcals-Enfants », mais les doses des composants sont différentes.

Indications. — Mêmes indications que les « Paquets Alcals-Enfants ».

Présentations. — Chaque boîte contient 30 paquets et porte une notice explicative, exposant les modes d'emploi.

(Prix : 15 fr. 40.)

Notices et échantillons sur demande.

Laboratoires FLEURY — ARCACHON — Tél. : 1-24.

G. FLEURY, Docteur ès Sciences

Docteur en Pharmacie, Lauréat du Ministère de la Santé publique.

PAQUETS VÉDÉ

Antigastralgiques du Docteur de Montmorot.

Hyperchlorhydrie et affections du tube digestif.

Réalisant une chimiothérapie saturante totale de l'acidité gastrique. Les résultats obtenus ne sont nullement comparables à ceux enregistrés avec une poudre de saturation quelconque, les produits entrant en composition étant d'une pureté chimique absolue.

Hydrate de magnésie extra-blanc et pur, Bicarbonate de soude sursaturé raffiné n° 1, Carbonate de chaux « précipité extra-léger », Lactose de Hollande, Essence d'anis de France.

2 à 4 paquets par 24 heures aux repas.

Boîte de 18 paquets : 11 fr. 80 pour 8 jours.

Boîte de 36 paquets : 19 fr. 80 pour 18 jours.

Boîte de 100 paquets : 47 francs pour 45 jours.

Laboratoires VÉDÉ

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX°).

(Tél. : Roquette 97-46, 97-47 et 51-58.)

Usine : 10, rue Petit — PARIS (XIX°).

(Tél. : Nord 90-40 et Botzaris 07-38).

PARADOLINE

AMPOULES BUVABLES

Indication. — *Syndrome Douleur* (Douleurs d'accouchement, Nausées de la grossesse, Toutes Coliques, hépatiques et néphrétiques principalement. Crises rhumatismales.)

Posologie. — Absorber le contenu d'une ampoule tous les quarts d'heure jusqu'à sédation complète de la douleur. Une heure maximum.

Composition. — Romarin stabilisé, Boldo, Buchu, Pichi, Uva-Ursi, Piscidia, Chirette, Maïs, Carbonate acide et Salicylate de Soude, Artichaut.

Contenance. — 5 ampoules de 10 cc. **Prix :** 24 fr. 50.
L. N. C. 1270-2.

LIQUIDE

Indication. — *Cure d'entretien hépatique*, notamment pour la femme et pour l'enfant (goût très agréable).

Posologie. — *Enfants* : de 2 à 4 ans, XX à XXX gouttes par jour en 2 fois ; 4 à 6 ans, XL gouttes par jour en 2 fois ; 6 à 8 ans, LX gouttes par jour en 2 fois.

Cadets de 8 à 15 ans : 2 demi-cuillerées à café par jour.

Adultes : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

La PARADOLINE LIQUIDE se prend le matin à jeun et avant le repas du soir, diluée dans 6 fois son volume d'eau minérale.

Composition. — Sulfate, Phosphate, Citrate, Carbonate acide, Salicylate de Sodium chimiquement purs ; Boldo, Chirette, Artichaut.

Contenance. — 100 cc. **Prix :** 18 fr. 75. — L. N. C. 1270-1.

PARADOLEX

(Paradoline externe).

Liniment concentré en flacon stilligoutte.

S'emploie en applications concurremment avec la **Paradoline** ampoules buvables, dont il renforce considérablement l'action dans les douleurs rhumatismales, rénales, génito-urinaires.

Analgésique externe O. R. L.

Contenance : environ 20 applications. **Prix :** 20 francs.
L. N. C. 1270-4.

Laboratoire CHEVILLON

99, rue de Paris — MASSY (Seine-et-Oise)
(Tél. : 22.)

PARAGERM

Les brumes désinfectantes de "Paragerm" préviennent et combattent les épidémies.

Elles sont les meilleures auxiliaires du médecin.

Bactéricides, elles ne sont pas toxiques et permettent au Corps médical l'application du décret du Ministère de la Santé publique du 16 mai 1936, prévoyant la désinfection en cours de maladie.

La désinfection de l'atmosphère et des surfaces des locaux ne suffit pas à circonscrire les épidémies qui se propagent surtout par contagions directes ; une imprégnation de l'organisme par la brume de *Paragerm*, émise en présence des personnes, est indispensable pour compléter la désinfection et leur permettre de résister à la contagion.

De ce fait, l'application de cette méthode de désinfection, en présence des individus, enfants et adultes, dans les cas de grippe, bronchite, rougeole, scarlatine, coqueluche, etc., protège l'entourage et évite au malade les contaminations secondaires.

Il est conseillé de compléter cette désinfection en utilisant pour les soins d'hygiène corporelle, ainsi que pour les lavages désinfectants des objets usuels du malade, une eau additionnée de *Paragerm* colloïdal.

Mode d'emploi. — Le *Paragerm* se présente sous deux formes :

1° *Forme volatile.*

2° *Forme colloïdale.*

1° **Forme volatile.** — S'emploie pure par brumisation, vaporisation ou pulvérisation.

Paragerm solution faible : pour les désinfections préventives.

Paragerm solution forte : désinfections préventives en période d'épidémie ; désinfections en cours de maladie ; désinfections massives des locaux.

Doses :

1/4 cc. par mètre cube d'air : désinfections préventives.

1/2 cc. par mètre cube d'air : désinfections en cours de maladie ou en période d'épidémie.

4 cc. par mètre cube d'air : désinfections massives.

Dans la pratique, pour les petits intérieurs où l'on utilise un vaporisateur ou un pulvérisateur à main, il faudra vaporiser ou pulvériser plusieurs fois par jour en quantité suffisante pour former une légère brume autour du malade et de son entourage.

2° **Forme colloïdale.** — Le *Paragerm* colloïdal miscible à l'eau complète l'arsenal prophylactique destiné à lutter contre la propagation des maladies contagieuses ou des infections.

Doses :

Lavages de bouche et gargarismes : 4 à 5 gouttes par verre d'eau.

Désinfection des mains : 100 gouttes par litre d'eau.

Toilette, soins intimes : 8 à 10 gouttes par litre d'eau.

Désinfection des objets : 200 gouttes par litre d'eau.

Le *Paragerm* se vend dans toutes les pharmacies : les solutions forte et faible en flacons de 250 et 500 cc. Le Colloïdal en flacons de 30, 45, 125 et 250 cc.

Établissements L. D. P. Laboratoires du PARAGERM

151, avenue de Neuilly — NEUILLY-SUR-SEINE (Seine).

(Tél. : Maillot 76-25 et 76-26.)

PARAIODE

Association du complexe NaIO^3 . 5NaI avec des sels stabilisateurs.

Propriétés. — Antiseptique incolore, dépourvu de toxicité. Agit en libérant de l'iode naissant, uniquement au niveau des foyers infectieux à l'exclusion des tissus sains. N'est jamais irritant et réussit rapidement et sûrement dans de très nombreux cas où les autres antiseptiques ont échoué (leucorrhées rebelles, cystites séniles, etc.).

Indications. — Chirurgie générale : Désinfection et désodorisation des plaies. Urologie : Urétrites, cystites, etc. Gynécologie : Vaginites, métrites, toutes leucorrhées. Voir aussi : **Ovules au Paraiode.**

Doses. — Le *Paraiode* est délivré sous forme de solution concentrée (à 10 p. 100). Il s'emploie à la dose de 1 à 5 cuillerées à dessert par litre d'eau.

Formuler un flacon de *Paraiode*. — Prix : 22 fr.

Enregistré au L. N. C. n° 1484-4.

Laboratoire du PARAIODE

R. HARAND, Pharmacien

23, rue Doudeauville — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 19-70.)

PARALGININE

GOUTTES

Le plus puissant des antinévralgiques. Sans alcaloïdes ni barbituriques, et non toxique.

Dépourvu de toute amertume.

Composition. — Association chloraloanalgésine, pyramiduréthane.

Posologie. — De XXV à L gouttes en une fois.

CCL gouttes par 24 heures.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Absorber les gouttes dans un peu de liquide.

Indications. — Les grandes affections douloureuses (néo, tabes), Névralgies faciales, oculaires, intercostales, Zona, Sciatique, Lumbago, Rhumatismes, Arthrites, Réactions douloureuses des fractures, etc.

La Paralginine gouttes peut suppléer à la morphine dans les algies des cancéreux.

La Paralginine existe aussi sous forme de cachets de couleur bleue ; sa formule est différente de celle des gouttes. De 1 à 4 cachets par jour dans les algies courantes, grippe, hyperthermie, courbatures. Règles douloureuses.

Inscrit au L. N. C. M., n°s 1669-1 et 1669-2.

Ech. et Lit. : **Laboratoire de la PARALGININE**

9, rue Saint-Ferdinand — PARIS (XVII^e)

(Tél. : Etoile 53-58.)

PARASCLÉROSE

Composition. — Le *Parasclérose* est une préparation d'Iodure de Strontium additionnée d'extrait d'artichaut présentée en pilules glutinisées dosées à 4 centigrammes d'Iodure de Strontium et à 20 centigrammes d'extrait d'artichaut.

Indications. — Le *Parasclérose* qui chasse le cholestérol par l'extrait d'artichaut et le calcium grâce à l'Iodure de Strontium s'oppose au durcissement des artères. C'est le médicament de la sclérose artérielle, cardiorénale, etc... *

Mode d'emploi et doses. — Le *Parasclérose* se prescrit à la dose moyenne de 3 à 5 pilules par jour, prises avec un peu d'eau, au début des repas. Le traitement doit durer jusqu'au moment où les symptômes de sclérose ont disparu ou ont été fortement atténués. Il s'agit ensuite de faire de temps en temps des cures, avec la même quantité de pilules, de 3 à 4 semaines chacune, pour conserver le bénéfice acquis. Cette façon de procéder préserve des accidents graves de la sclérose artérielle.

Présentation. — Flacon de 50 pilules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 590-29.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS (IV°).

(Tél. : Archives 44-59.)

PARATOXINE du Prof. LEMOINE

Contre la Tuberculose (Lipoides biliaires).

Deux formes : 1° Boîte de 15 ampoules 1 cc. *Paratoxine A* et en boîte de 8 ampoules 2 cc. pour injections sous-cutanées ;

Boîte de 30 pilules de 0 gr. 20 pour médication interne.

2° *Paratoxine B*, en boîte de 6 ampoules de 5 cc. pour injections intralaryngées ; Capsules pour médication interne.

Action thérapeutique et usages. — Préconisée aux diverses périodes de la tuberculose en injections sous-cutanées ou intralaryngées, modifie le terrain et constitue le traitement de choix de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi. — *Paratoxine A* : En injection sous-cutanée de 1 cc. ou 2 cc. par jour et plus. En pilules 2 à 6 par jour comme adjuvant de la médication sous-cutanée.

Paratoxine B : En injection intralaryngée tous les 2 jours pour laryngite bacillaire. En capsules dans les cas de diarrhée bacillaire.

La *Paratoxine* présente le grand avantage d'être inoffensive. Les hautes doses sont en général inutiles. Chez les enfants au-dessous de 12 ans, les doses doivent être diminuées de moitié.

Les injections doivent se faire assez profondément sous la peau à la limite de la couche graisseuse et du muscle.

Prix : Ampoules de 1 et 2 cc., 30 francs ; 5 cc, 21 fr. 50 ; Pilules : 17 francs

Enregistrée au L. N. C. M. sous les n°s 240-9 à 240-10.

Laboratoires DUCATTE, 191, rue Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Opéra 68-80.)

PARATYRONE

Composition. — La Paratyronne est l'hormone parathyroïdienne, physiologiquement titrée (1 cc. = 20 unités).

Indications thérapeutiques. — Toutes les insuffisances parathyroïdiennes, tétanies, états spasmophiles, ulcères digestifs, syndromes spasmodiques douloureux, rhumatisme chronique, certains troubles psychiques, épilepsie, chorée, tics, cataracte, oto-spongiose, otite scléreuse, ulcères variqueux, etc.

Présentation et posologie. — La PARATYRONE est présentée en flacons de 5 cc. contenant 100 unités, soit 20 unités par cc. Les flacons, destinés en principe aux injections, s'utilisent aussi par voie orale (XXXV-VL gouttes = 1 cc.). Ampoules (boîte de 12) à 10 unités par ampoule de 1 cc. Une injection quotidienne de 1/2 à 1 cc., sous-cutanée. Suppositoires (boîte de 10), un par jour. Solution pour pulvérisations nasales.

Dans certains cas, il sera utile d'ajouter aux injections de PARATYRONE une cure par l'IRRASTERINE BYLA, dont on sait la puissance comme fixateur du calcium.

Prix. Flacon : 47 fr. 75. Ampoules : 63 fr. 60. Suppositoires : 47 fr. 70. Solution pour pulvérisations : 51 francs.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée
Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

PARAVEININE

Gouttes.

Composition. — Iodopeptine, Extraits fluides de Marron d'Inde, Hamamelis, Cupressus, Alcoolés de Piscidia et d'Anémone Pulsatille.

Indications. — Etats variqueux, Phlébites, Hémorroïdes, Varicocèles, Artério-sclérose, Accidents de la Puberté et de la Ménopause.

Posologie. — XXV gouttes, 2 fois par jour, dans un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Phar¹⁰
45, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n^o 484.

PARLAX

Huile de Paraffine pure de haute viscosité.

Description. — **Parlax** est la reine des huiles de Paraffine. Inodore et insipide, limpide comme le cristal de roche, sa pureté est absolue.

Indications. — Son onctuosité et sa viscosité remarquables lui permettent d'assurer le rythme de l'évacuation intestinale. **Parlax** doit être prescrit : dans tous les cas de constipation, entérites, appendicite, hémorroïdes, aux opérés, aux femmes enceintes, aux nourrissons.

Doses. — *Adultes* : 1 cuillerée à potage deux fois par jour.

Enfants : 1 cuillerée à café deux fois par jour.

Parlax doit être pris de préférence pendant les repas, dans les purées de pommes de terre, de légumes secs, avec les épinards, endives et salades cuites, etc. Dans la salade assaisonnée au jus de citron. Dans les confitures, compotes de fruits.

Laboratoires F. LATOUR

71, rue Douy-Delcupe — MONTREUIL-s-BOIS (Seine).
(Tél. : Avron 32-52.)

PAROÏDOCALCIUM

Cachets.

Traitement de la colite membraneuse.

Composition :

Poudre de Parathyroïde <i>Byla</i>	1 mgr.
Gluconate de calcium	0 gr. 50
Pour un cachet n° 40.	

Posologie moyenne. — 2 cachets avant les 2 principaux repas et *selon avis médical*.

Indications. — **Colite muco-membraneuse et toute décalcification.**

Prix : La boîte de 40 cachets : 25 francs.
Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1781-2.

Laboratoire du Calcium 30

299, rue des Pyrénées — PARIS (XX^e).

PAROLAGAR

(Marque déposée.)

Le Parolagar est une émulsion perfectionnée de 65 % d'huile de paraffine et d'agar-agar.

Formes thérapeutiques et indications :

N° 1. *Parolagar simple* (étiquette bleue).

Huile de paraffine.....	65 %
Agar-agar, eau distillée.....	35 %
	<hr/> 100 %

Traitement de choix de la constipation habituelle: doit être employé à la suite du Parolagar phtaléiné, lorsque l'habitude de l'évacuation à heure fixe aura été provoquée.

N° 2. *Parolagar composé* (étiquette rouge).

Huile de paraffine.....	65,00 %
Phénolphtaléine	0,32 %
Agar-agar, eau distillée.....	34,68 %
	<hr/> 100,00 %

Renferme la dose prudente de 5 centigrammes de phénolphtaléine par cuillerée à potage. Indiqué comme traitement d'attaque de la stase chronique et surtout pour les malades ayant abusé de purgatifs. On lui substituera la forme simple dès que l'habitude de l'évacuation régulière aura été obtenue.

Posologie.

Adultes : Une cuillerée à soupe le soir, pendant le repas, ou matin et soir si nécessaire.

Peut être pris dans de l'eau ou du lait.

Enfants : Une cuillerée à café ou une cuillerée à soupe. Peut être mélangé aux aliments ou au biberon.

Pas de suintement. Pas d'accoutumance.

LABORATOIRES DU PAROLAGAR

10-12, rue de Strasbourg — PARIS (10°).

PAROXYL

(Gouttes spécifiques contre la coqueluche.)

Le *Paroxyl* n'est pas toxique. Il ne renferme aucune substance vénéneuse ni stupéfiante.

Propriétés thérapeutiques. — Action régulière et sûre.

Effet *non seulement calmant, mais curatif.*

Indications. — Coqueluche (nourrissons, enfants et adultes).

Pas de contre-indication.

Posologie. — 3 prises par jour (quel que soit l'âge du malade).

Trois prises par jour :

<i>Enfants</i> de moins de 1 an	X à XXX gouttes.	
— de 1 à 5 ans	XX à LX	—
— de 5 ans et au-dessus..	XX à C	—
<i>Adultes</i>	XXX à C	—

Prix : 12 fr. 50.

THIRIET et Cie

26 et 28, rue des Ponts — NANCY.

(Tél. : 40-65.)

PARULCINE

Composition. — Pepsine injectable en solution neutre.

Présentation. — Ampoules de 2 cc. dosées à 0 gr. 10 de Pepsine.

Indications. — Ulcus gastro-duodéal.
Lithiase biliaire.

Mode d'emploi. — Injections intramusculaires, à raison de 3 par semaine (commencer par 1/4 de cc., en augmentant de cette quantité, jusqu'à 2 cc.) série de 15 injections.

Prix : 27 fr. 25.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

PARVULA

Semences Laxatives.

(*Plantago Ispaghula* Roxb.)

Propriétés. — Ces semences, produit végétal naturel, fournissent dans l'intestin un mucilage abondant qui provoque des contractions péristaltiques et réveille la tonicité de l'intestin par action réflexe. Dépourvues d'action offensive sur la muqueuse, elles la lubrifient simplement.

Indications. — Le rééducateur intestinal, traitement rationnel de la constipation, laxatif de choix de la grossesse, des entéritiques, des malades à hypersensibilité intestinale, etc...

Posologie et mode d'emploi. — 3 à 5 cuillerées à café le soir avec le potage, ou le matin avec le petit déjeuner. Peuvent être également prises pures ou incorporées à de la confiture, purée de légumes, etc.

Prix : 15 fr. — L. N. C. 968-1.

Échantillon gratuit sur demande.

Laboratoire A. BRUNSCHWIK

Pharmacien de 1^{re} classe

3 bis, rue Vallier — LEVALLOIS-PERRET.

(Tél. : Pereire 40-46.)

PASSIBROMINE

Sirop

Indications. — Toutes affections nerveuses et spasmodiques.

Formule. — Bromure de calcium 0 gr. 20, Bromure de sodium 0 gr. 40, Phényl-éthyl-malonylurée 0 gr. 01, Teinture de cratægus 0 gr. 15, Extrait fluide de passiflore 0 gr. 25, Extrait fluide de valériane stabilisée 1 gr. 50, Glycérine, Sirops d'écorces d'oranges amères, de valériane et de serpolet aa Q. S. pour 1 cuillerée à café.

Doses et emploi. — *Comme équilibrant* du système nerveux : 1 cuillerée à café à chaque repas. *Comme sédatif* des insomnies : 1, 2 ou 3 cuillerées à café le soir au coucher, dans une infusion ou du lait.

Prix : 19 fr. 80 le flacon de 90 cc. (18 c. à café).

N° d'enregistrement : 1176-7.

Laboratoire G. CALMELS

AUTERIVE (Haute-Garonne).

PASSICARBONE

Charbon animal purifié. Charbon végétal.

Charbon végétal activé.

Extraits sédatifs végétaux (*Passiflorine*).

L'étude comparative des différents charbons utilisés en thérapeutique démontre que, suivant leur porosité, leur texture capillaire et leur origine, ils semblent avoir des propriétés variables d'absorption et d'adsorption. On a donc intérêt à associer des charbons d'origine variée. C'est à cette formule que répond le *Passicarbone*.

D'autre part, les affections gastro-intestinales s'accompagnent souvent de réactions spasmodiques, de troubles neuro-végétatifs ou de troubles psychiques. L'addition aux charbons des sédatifs végétaux qui ont fait le succès de la *Passiflorine Réaumur* font du *Passicarbone* un remède complet dans tous ces cas.

Composition. — Le *Passicarbone* est un granulé fondant dont 5 grammes (soit pratiquement une cuillerée à café) contiennent 2 grammes, soit 40 p. 100, de charbons sélectionnés et actifs et la valeur d'une cuillerée à café de *Passiflorine*.

Usages :

Aérophagie et formes diverses des dyspepsies flatulentes.

Dyspepsies nerveuses.

Gastrites diverses. — Gastrites infectieuses, gastrites post-anesthésiques, gastro-entérites, etc.

Ulcères.

Affections intestinales. — Colites ou typhlocolites, Colibacillose, diarrhées diverses, entérites, grippe à forme intestinale et états intestinaux toxico-infectieux, fermentations intestinales.

Affections hépatiques (Ictère, lithiase biliaire, etc.).

Intoxications.

Doses. — 1 ou 2 cuillerées à café aux repas.

La boîte : 18 francs.

G. REAUMOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie

115, rue de Paris — BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

PASSIFLORINE

Traitement phytothérapeutique des états
névropathiques.

Composition. — Une cuill. à café contient
0 gr. 50 extrait fluide de *Passiflora incar-*
nata ; 0 gr. 25 extrait mou de *Salix Alba* ;
XX gouttes alcoolé de *Cratægus oxya-*
cantha.

Action. — La *Passiflore* diminue la tension
artérielle, régularise l'influx nerveux dans
le domaine du grand sympathique et est un
sédatif et un antispasmodique de premier
ordre.

Son action est renforcée et prolongée dans la
Passiflorine par le *Saule*, sédatif nervin
que les auteurs américains ont comparé
au bromure, et par le *Cratægus* dont l'ac-
tion tonicardiaque et équilibrante du sys-
tème nerveux est bien connue (Huchard,
Renon, H. Leclerc, etc.).

Indications. — Tous états névropathiques :
angoisse, anxiété, neurasthénie, etc. In-
somnie nerveuse, troubles fonctionnels du
cœur d'origine nerveuse (palpitations,
tachycardie, etc.), troubles nerveux de la
vie génitale, etc.

Posologie. — Comme médicament équil-
brant du système nerveux : une cuillerée à
café midi et soir avant les repas.
contre l'insomnie nerveuse : une à trois
cuillerées à café le soir.

Prix : 18 francs.

G. RÉAUBOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie,

115, rue de Paris,

BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

PASTILLES HOUDÉ

au Chlorhydrate de cocaïne.

Pastilles dosées à 1 milligramme de Chlorhydrate de cocaïne.

Indications. — Stomatites, *angines*, *pharyngites aiguës*. Calmant des gastralgies, des vomissements. Excellent sédatif des *toux nerveuses* et des hoquets. Calmant des irritations laryngées. Véritable *gargarisme sec*.

Doses. — 6 à 12 pastilles par jour, suivant l'âge.

Formes diverses. — Cocaïne simple ; Cocaïne et chlorate de potasse ; Cocaïne et borate de soude ; Cocaïne et menthol ; Cocaïne, borate et chlorate ; Cocaïne, borate et menthol.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

PASTILLES M. B. C.

Chaque pastille renferme les principes actifs suivants :

Chlorhydrate de cocaïne	0,0002
Chl. d'amyléine (stovaine)	0,0003
Menthol	0,005
Borate de soude.....	0,02
Chlorate de potasse.....	0,06

Boîte de 5 paquets de 12 (*enveloppement automatique*).

Mode d'action. — Antiseptique, Anesthésique, Cicatrisant.

Indications. — Affections de la gorge (*angines*, *amygdalites*, *laryngites*, *stomatites*, etc...). — Désinfection de la bouche (*fumeurs*, *haleine fétide*, etc...). — Hygiène de la voix (*chanteurs*, *professeurs*, *conférenciers*, etc...).

Mode d'emploi. — 8 à 10 pastilles par jour.

Durée : 7 à 8 jours.

Prix : 5 fr. 50.

Établissements GOY

23, rue Beautreillis, PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 34-68.)

PÂTE A L'EAU ALOPLASTINE

La première pâte à l'eau spécialisée.
Pâte à l'eau stable, poreuse, aseptique, porphyrisée. Ne renferme ni vaseline, ni corps gras, souvent mal tolérés, facile à enlever.

Deux formes :

Aloplastine simple.

Indications. — Eczémas suintants, dermites irritables, érythèmes fessiers, etc.

Aloplastine Ichthyolée à 5 p. 100.

Indications. — Eczémas, Eczématides, Parakératoses, Dermo-épidermites microbiennes, Acné, Engelures, Brûlures.

**Laboratoires Biologiques de
l'ÎLE-DE-FRANCE**

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

PÂTE A L'EAU R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés et sélénisés naturels
de La Roche-Posay.

Indications. — Lésions suintantes peu étendues, eczémas irritables, eczémas infantiles. Pâte décongestionnante, agit comme pansement humide.

Mode d'emploi. — S'applique à la spatule, en couche légère sous enveloppement de préférence; au renouvellement, laver à l'eau chaude additionnée de quelques sachets de sels de bains R. P. (Deux à six suivant la quantité). Dès l'assèchement panser au cérat R. P. et ultérieurement au Cold Cream naturel R. P.

Poudrer toujours légèrement avec la « Poudre Dermique R. P. ».

Présentation et prix :

Pâte à l'eau R. P. de La Roche-Posay. Le grand pot.....	16 fr.
Sels de bains R. P. La boîte de 30 sachets	12 —
Cérat inaltérable R. P. Le tube	10 50
Cold-Cream naturel R. P. Le tube	11 50
Poudre dermique R. P. La boîte	12 fr.

Laboratoires des PRODUITS DERMIQUES R. P.
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

PÂTE GINGIVALE A L'ACÉTYLARSAN

Préparation où se trouvent associés l'ACÉTYLARSAN, spirillicide bien connu, et le ricinoléate de sodium, savon bactéricide, antitoxinique et générateur d'anti-virus.

Indications. — Traitement préventif des infections fuso-spirillaires, des gingivites et des stomatites aiguës ou chroniques. Traitement de la pyorrhée alvéolo-dentaire. Prévention de la carie dentaire.

Mode d'emploi. — Dans les cas de lésions pyorrhéiques étendues ou importantes, appliquer la pâte sur les gencives pendant 15 minutes 1 fois par jour, après brossage préalable à l'aide d'une brosse dure.

Dans les cas légers ou à titre prophylactique, employer la pâte gingivale comme une pâte ordinaire, suivant les règles habituelles.

Présentation. — En tube d'étain.

Prix de vente, le tube : 8 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PATE MIREILLE

A l'extrait concentré de Sirop Mireille.

(Voir à *Sirop Mireille*.)

Mêmes propriétés : même composition (avec en plus : Chlorhydrate d'amyléine et chlorate de potasse). Même saveur plaisante.

Prix au public : 6 fr. 50.

Laboratoires LEGENDRE

Section D.-S. — Houilles (S.-et-O.).

Dépôts généraux pour la vente en gros,

France, Colonies et Protectorats :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique : M. Ramlot, 72, rue de l'Escaut,
à Bruxelles-Maritime.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments sous le n° 1045-1.

PAVÉRINOL LALEUF

Composition. — Chaque capsule contient très exactement :

Papavérine Chlorhydrate.....	0,015
Camphre monobromé.....	0,15

Propriétés et indications. — Puissant stimulant respiratoire, cardiaque et circulatoire.

Le PAVÉRINOL dilate les vaisseaux coronaires, amplifie les contractions cardiaques, diminue l'excitation des fibres musculaires et en empêche la paralysie passagère.

Son emploi est recommandé dans les états infectieux et spasmodiques entraînant une insuffisance cardiaque.

Forme. — Capsules glutinisées.

Posologie et mode d'emploi. — De 4 à 6 capsules par jour, suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 à 12 capsules par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 capsules : 22 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

PAVÉRON DAUSSE

(Alcaloïdes totaux de l'Opium.)

Hypnotique, sédatif, analgésique.

Complexe alcaloïdique renfermant à l'état de chlorhydrates solubles tous les alcaloïdes de l'Opium.

0 gr. 02 de Pavéron = 0 gr. 01 de Morphine.

Action plus douce, plus régulière et plus durable que celle de la Morphine.

Indications. — Toutes les indications de l'Opium, de la Morphine et de ses succédanés.

Formes et posologie. — Ampoules de Pavéron dosées à 0 gr. 02 de Pavéron par cc.

Dose : 1 ampoule à la fois ; 2 par jour.

Dragées de Pavéron dosées à 0 gr. 01 de Pavéron. —

Dose : 1 à 2 dragées à la fois.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

PAVONOL

Alcaloïdes totaux de la Jusquiame associés à la Morphine et au Camphre.

Composition. — Morphine (Chlorhydrate) 0 gr. 01, Codéine (Phosphate) 0 gr. 01, Extrait hydro-alcoolique de Jusquiame 0 gr. 02, Sulfo-camphonate de sodium 0 gr. 10, Sérum physiologique camphré Q. S. pour une ampoule de 2 cc.

Propriétés. — Sédatif du système nerveux, Toni-cardiaque, Neutralisation des phénomènes douloureux en toutes circonstances.

Forme et posologie. — Une à deux ampoules de 2 cc. par 24 heures en injections hypodermiques.

Ce médicament s'emploie également par voie buccale ou en petit lavement à garder, par voie anale.

Boîte de 8 ampoules de 2 cc. Prix : 22 francs.

Laboratoire CASTEL

1, Place de la Bouquerie — NIMES.

A. CASTEL, Pharmacien,

Ingénieur-chimiste, licencié ès sciences.

PAXÈNE

Trois synergies phytothérapeutiques.

Sédatif Nervin: Valériane et Cypridium.

Antispasmodique: Chaton de saule et Passiflore.

Cardiotonique: Cereus grand. et Aubépine.

Indications : Névropathies, Cardiopathies, Insomnies nerveuses.

Doses. — *Insomnies nerveuses :* 2 à 3 cuillerées à café le soir, pur ou dans un peu de tisane.

Nervosisme en général : 1 à 2 cuillerées à café à chaque repas.

Médication très active, agréable, non toxique et sans accoutumance.

Prix au public : 17 fr. 40.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et OH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

PECTINE OBERLIN

Une cuillerée à soupe contient :

Benzoate de soude.....	0 gr. 50
Eau de laurier-cerise.....	0 gr. 20
Sulfogaïacolate de potasse.....	0 gr. 50
Sirop de morphine.....	6 gr. 60
Sirop de punch..... Q. S. P.	20 gr.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires.

1 cuillerée à soupe 3 ou 4 fois par 24 heures.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

Tél. Trudaine 14-73.

PECTORAL COULLOUX

Pour les enfants.

Composition. — Teinture de belladone, Alcoolature d'aconit, Teinture de drosera, NaBr, Benzoate de soude, Ext. d'ipéca, Analgésine, Thiocolum, Sirop de Codéine, Sirop de Coquelicots, Sirop de Tolu.

Action et Indications. — Le Pectoral Coulloux calme les toux les plus rebelles, modère les sécrétions ; régularise les fonctions essentielles de l'économie et facilite la guérison de toutes les maladies des voies respiratoires.

Le Pectoral Coulloux est expectorant, sédatif et antispasmodique en même temps.

Doses et mode d'emploi. — Dans les 24 heures :

1^o De 1 à trois ans : 2 à 4 cuillerées à café ;

2^o De 3 à 5 ans : 4 à 6 cuillerées à café ;

3^o De 5 à 8 ans : 3 à 6 cuillerées à dessert ;

4^o De 8 à 10 ans : 3 à 4 cuillerées à soupe.

A donner loin des repas. Pour six jours ou deux jours de traitement suivant l'âge.

Laboratoire COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE. Tél. : 0-21.

PECTORAL FOUCHÈRE

Composition. — Dionine, Sulfogaïcolate de potasse, Aconit, Belladone, Droséra, Écorces d'oranges amères, Laurier-cerise, Tolu.

Posologie :

Adultes 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants Au-dessus de 10 ans, 3 cuillerées à dessert par jour.

Indications. — Toutes affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande.

**Laboratoire de Thérapeutique Générale
du S. E.**

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.**

PECTOSÉDYL

CALMANT DE LA TOUX

Composition :

Dionine	0 gr. 004
Codéine	} m 0 gr. 005
Extrait de jusquiame ..	
<i>Hélénine</i>	0 gr. 003
Benzoate de soude	0 gr. 20

pour un comprimé glutinisé.

Indications. — Toutes les affections aiguës ou chroniques de l'appareil respiratoire. **Particulièrement indiqué chez les Tuberculeux pulmonaires qu'il soulage sans danger d'hémoptysie.**

Posologie. — Dose moyenne chez les adultes : 4 à 10 comprimés par 24 heures.

Présentation. — Boîte de 24 comprimés.

Prix de vente : 16 fr. 30

Laboratoires du Pectosédyl.

E. CONSTANTIN, Pharmacien,
24, rue de Meaux — PARIS (XIX^e).
(Tél. : Nord 33-06.)

PEDIOZEMA

(Granulés)

Composition. — Médication oposérothérapique à base de sérums actifs de jeunes taureaux et d'organes frais de jeunes animaux.

Propriétés. — Désensibilisation. Libération des émonctoires. Brassage endocrinien.

Indications. — Eczéma infantile. Erythème fessier.

Présentation et posologie. — Boîte de granulés aromatisés à prendre à jeun, dissous dans un peu de lait, à raison de 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 15 fr.

Laboratoire biologique VALTRY

122, Champs-Élysées — PARIS.

(Tél. : Élysées 28-12.)

PÉLARGON DE NESTLÉ

(Lait de Marriott.)

Lait entier acidifié en poudre, non sucré, pour l'alimentation infantile normale ou diététique. Antidyspeptique, anti-anémique.

Deux formules :

Simple : sans farine, ni sucre.

Complet : avec farine et sucre.

Calories par 100 gr. : 95.

Haute valeur nutritive sous faible volume, extrême digestibilité, composition constante, excellente conservation.

Indications. — Alimentation des prématurés, dystrophiques, dyspeptiques, vomisseurs, de certains diarrhéiques, des eczémateux, des coquelucheux, pneumoniques, cysto-pyélitiques. Alimentation de certains nourrissons sains intolérants à tout lait normal.

Prix : la boîte de 225 gr. : 14 francs ; de 500 gr. : 23 francs. En estagnons de 2 kg. pour les œuvres, hospitalières et les cliniques ; nous consulter.

Société NESTLÉ

6, avenue César-Caire — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 64-90 à 95.)

PENGHAWAR DES ILES

(Hémostatique Végétal.)

Composition. — Penghawar Djambi finement trié à la main.

Propriétés. — Hémostatique très sûr ; sans contre-indications, sans danger ; à effet très rapide.

Indications. — Hémorragies dentaires et nasales, Hémostase après applications de sangsues. Toutes coupures superficielles persistant à saigner.

Mode d'emploi. — Pratiquer une légère compression à l'aide de petits tampons sur les points hémorragiques.

Echantillons sur demande.

Prix { Boîte grand modèle : 6 francs.
au public { Sachet d'urgence : 2 fr. 50.

D. RINGEADÉ, pharmacien.
FOSSEBOUDEAU-BLAYE (Gironde).

PENTAMICROS

Complexe colloïdal électrique.

Or, Rhodium, Argent, Cuivre, Manganèse.

Anti-infectieux polyvalent.

Formule :

Or, Rhodium, Argent, Cuivre, Manganèse, colloïdaux électriques	0,0003
Saccharose.....	0,095

pour 1 cc. en ampoules de 3 cc., isotoniques, injectables.

Aux modifications humorales et à l'effet leucogénique anti-infectieux de la colloïdothérapie s'ajoute une action chimiothérapique indiscutable qui varie suivant la nature des métaux employés.

Le *Rhodium* et l'*Or*, très dispersés (méthode nouvelle employée pour la préparation du *Rhodium Amicros*), sont des anti-infectieux très actifs dans la grippe, fièvre typhoïde, pneumonie. L'adjonction de l'*Argent* dont l'action est maintenant classique, du *Cuivre*, qui agit sur le streptocoque, et du *Manganèse*, leucogène puissant et facteur important dans les oxydations cellulaires, fait du *Pentamicros* le type des médicaments anti-infectieux d'urgence. Sa polyvalence est remarquable. Il ne donne ni choc, ni réaction pénible et, employé seul ou associé aux vaccins, c'est un médicament anti-infectieux de premier ordre.

Indications : tous les états infectieux, grippe à forme grave, broncho-pneumonie, pneumonie, fièvre typhoïde et ses complications, septicémie puerpérale et toutes les septicémies en général, érysipèle, péritonites, rhumatismes infectieux, etc.

Mode d'emploi : 1 à 4 ampoules par jour en injections intramusculaires ou intraveineuses. Dans les cas graves, on peut injecter deux ampoules d'emblée. Se baser surtout sur la température et l'état général pour la répétition des injections.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 30 francs.

Echantillons médicaux sur demande.

Laboratoires AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).

PÉPIODON HENRY

Composition. — Combinaison de l'iode, avec les produits de la dégradation moléculaire des protéiques poussée jusqu'aux acides aminés, par la trypsine et l'érepsine.

Chaque cc. contient 50 mgr. d'iode pur, à l'état combiné.

Le Pépiodon est la combinaison idéale de l'iode parce que :

1° C'est un produit dérivant d'une hydrolyse trypsique et érepsique poussant la dégradation des peptones jusqu'à sa phase ultime, *acides aminés*. De ce fait, le *Pépiodon* est plus assimilable que les peptones iodées.

2° C'est un produit où l'iode a un dosage toujours constant de 50 mgr. par cc.

3° Le *Pépiodon* n'est pas décomposé par le suc gastrique et n'irrite donc pas la muqueuse stomacale.

Doses. — *Adultes* : 40 à 60 gouttes par jour aux repas. Ces doses peuvent être augmentées ; certains médecins prescrivent 100 à 200 gouttes par jour sans la moindre intolérance.

Enfants : 5 à 10 gouttes et plus suivant âge.

Flacon de 45 gr. : 18 francs, pour 15 jours,

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÉGE.

PÉPIONE

Gouttes.

Formule. — Iode pur, Peptone, Essence citron, Eau distillée.

Présentation. — En flacon compte-gouttes.
(17 fr. 85)

Indications thérapeutiques. — Contre le lymphatisme, scrofule, asthme, emphyseme, goitre, obésité, artériosclérose, affections du cœur et des vaisseaux, goutte, rhumatismes.

Mode d'emploi :

Adultes : XX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : V à X gouttes 2 fois par jour, suivant âge.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-21.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo : 40-83.)

PEPSINACID

(Granulé)

La médication chlorhydro-pepsique, présentée sous une forme stable, d'un goût agréable, de conservation parfaite et d'activité contrôlée par digestion artificielle.

Composition. — 1 cuiller à café (3 gr. de granulé) renferme : V gouttes HCl dilué, 0,25 de pepsine.

Indications. — Troubles gastriques liés à l'Hypochlorhydrie, Pesanteurs, Anorexie, Troubles sympathiques post-prandiaux.

Troubles intestinaux : diarrhée par insuffisance gastrique, colites.

Traitement complémentaire dans les anémies graves. Dénutrition. Anachlorhydrie des néoplasiques.

Mode d'emploi. — 1 cuiller à café de granulé dissous dans la boisson habituelle, tout au début et pendant les repas.

Le flacon : 16 fr. 65.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LACHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 12-35.)

PEPSINE-FERMENT

Solution de suo glandulaire gastrique.

Possède, comme tout produit glandulaire, une action d'ordre *général*. Il engendre, par l'intermédiaire des centres nerveux, un réflexe *régulateur* sur le débit pepsique et excite la fonction hépatique.

D'où son efficacité constante et sûre dans toutes les :

Dyspepsies, Hyper et Hypo

(Inappétence, Flatulence, Gastralgie, Hépatisme).

A employer comme agent de la suralimentation.

Emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau *une demi-heure* avant chaque repas.

N. B. — Bien spécifier *une demi-heure avant le repas*, afin que le Pepsine-Ferment introduit dans la circulation puisse produire son maximum d'effet au moment même de la digestion.

Prix du flacon : 19 francs (12 jours de traitement).

Inscrit au Laboratoire national de Contrôle.

Produits SAMY

168, boulevard Saint-Germain — PARIS (VI^e).

(Tél. : Danton 50-30.)

PEPSOBYL

Médication rationnelle de la constipation et de la dyshépatie.

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Pepsine	0,10	Calomel	0,004
Boldo	0,025	Extrait de Combretum	0,015
Bile	0,05	Extrait de Rhamnus Pur-shiana	0,015
Extrait d'artichaut	0,025	Poudre de Belladone	0,004

Avantages. — Association synergique de produits d'une valeur thérapeutique universellement reconnue avec le plus puissant des cholagogues : le Calomel.

Mode d'emploi :

Si prédominance des troubles hépatiques : 2 à 4 dragées le matin à jeun.

Si prédominance des troubles gastro-intestinaux : 1 à 2 dragées aux 2 principaux repas.

Enfants au-dessous de 13 ans : 1/2 dose.

Indications générales. — Toutes les insuffisances glandulaires digestives d'origine hépatique et leurs conséquences physiologiques (auto-intoxication, constipation, lithiase, hypertension, artério-sclérose, troubles nerveux et psychiques, angor biliaire, etc.).

Prix : 17 francs.

Échantillons sur simple demande.

Enregistré au lab. nation. de contr. des médicaments sous le n° 1790-1.

Laboratoire de CHIMIOTHÉRAPIE

22, rue de Turbigo — PARIS (11°).

PEPSO-PANCRÉ-MALT WANDER

Composition. — Pepsine, pancréatine glutinisée, extr^t de malt (diastases, vitamines B).

Forme. — Paillettes.

Indications. — Insuffisances digestives ; digestions pénibles, dilatation et pesanteur de l'estomac ; accidents d'anaphylaxie alimentaire : eczéma, urticaire, prurit, etc. ; maladies de la dénutrition : amaigrissement, débilité ; convalescence.

Doses. — *Enfants :* 1 à 2 cuillerées à café.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe à la fin des principaux repas, dissous dans de l'eau ou une infusion, ou délayé dans un peu de compote, de purée ou de bouillie.

Durée moyenne de consommation : 15 jours.

P. BASTIEN, Pharmacien

CHAMPIGNY (Seine). (Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

PEPTALMINE

Peptones de Vlande et de Poisson
Extraits d'Œuf et de Lait
Farine de blé dans l'enrobage.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique polyvalente.

Indications. — Migraines, Urticaires, Troubles digestifs par assimilation défectueuse, Rougeurs de la face, Somnolences ou Pesanteurs après les repas, Colites, Asthme, Prurits, Eczémas et, en général, les diverses manifestations anaphylactiques.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 dragées ou 2 cuillers à café de granulés, *une heure avant chacun des trois repas.*

Enfants : Moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 18 francs ; granulés : 18 fr. 25.
Pour 10 jours de traitement.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTALMINE MAGNÉSÉE

Peptones de viande et de poisson.

Extraits d'œuf et de lait.

Farine de blé dans l'enrobage.

Sulfate de Magnésie.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-anaphylactique et cholagogue.

Indications. — Troubles digestifs d'origine hépatique, insuffisance hépatique, congestions du foie, cholestites chroniques et toutes les manifestations anaphylactiques avec participation hépatique.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cuillerées à café de granulés ou 4 dragées 1 heure avant chacun des 3 repas.

Cholagogue : 2 cuill. à café de granulés le matin à jeun. Répéter cette dose 1/4 d'heure après la première.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : dragées : 18 francs ; granulés : 18 fr. 25.
Pour 10 jours de traitement.

Laboratoire des produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél. : Trinité 29-29.)

PEPTARGYL AGUETTANT

Sirop peptoné à teneur élevée
d'Argent colloïdal

Anti-infectieux, Antitoxique, Antithermique,
très actif,
à grande facilité d'emploi.

Aucun des inconvénients des sels d'Argent.

Indications. — Etats infectieux buccopharyngés et du tube digestif. Etats septicémiques. Gripes, amygdalite, sinusite, bronchite, congestion pulmonaire, colites, gastro-entérites, dysenteries, fièvre typhoïde, phlébites, dyscrasies sanguines. Staphylococcies : furonculose, anthrax, acné.

La pénétration parfaite de l'argent colloïdal étend son action à tout l'organisme.

Dose. — *Préventive* : 3 à 5 cuillerées à café par jour.

Curative : 4 à 8 cuillerées à café par jour.

Une demi-heure avant les repas, avec un peu d'eau.

Particulièrement indiqué pour les enfants, ils en sont friands ; on leur donne 1/2 dose.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-3.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

PEPTICOL

Formes. — Elixir de goût aromatique, très agréable, absorbé sans répugnance, même par les tout jeunes enfants.

Granulé aromatisé, permettant un usage plus commode aux personnes prenant leurs repas hors de leur domicile.

Composition. — Peptones de viande, de poisson, d'œuf, de lait, de farine de blé. Glycérine, Alcool.

Propriétés thérapeutiques. — Médication anti-choc complète ; spécifique des intoxications d'origine alimentaire ; excite l'appétit et facilite la digestion en augmentant et régularisant les sécrétions des glandes salivaires, des muqueuses gastriques et intestinales ; favorise les sécrétions et le péristaltisme du gros intestin.

Indications. — *Urticaire, Manque d'appétit, Mauvaises digestions, Intolérances stomacales, Prurits, Somnolences après les repas, Flatulences, Asthme.*

Posologie :

Liquide ou granulé.

Enfants : une demi-cuillerée à café.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, 15 minutes avant les repas.

Prix au public :

Elixir, le flacon : 15 fr. 30.

Granulé, la boîte : 15 fr. 30.

Laboratoire du PEPTICOL

13, avenue du Maréchal-Foch,
DAMMARIE-LES-LYS (S.-et-M.).

PEPTO-CORRECTINE

Forme. — Granulé dont la constitution permet une diffusion rapide et facile dans l'estomac.

Composition. — Papaïne pancréatine, extrait hépatique.

Indications. — Hypochlorhydrie, atonie gastrique fermentations alcalines, dyspepsies des hépatiques, des constipés et des anémiés.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café en terminant les repas.

Prix : 16 fr. 65.

ALCALINO-CORRECTINE

Composition. — Carbonate de bismuth, carbonate de magnésie, kaolin, belladone, essence d'anis vert.

Forme. — Granulé dont la constitution permet une diffusion rapide et facile dans l'estomac.

Indications. — Toutes dyspepsies à prédominance hyper-sécrétive et acide, hyperchlorhydrie, gastralgies, fermentations acides, aigreurs, ulcères.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café après les repas.

Prix : 16 fr. 65.

Établissements André HATIER

Pharmacien,

13, place du Peuple — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

PEPTODIASE

Stimulant gastrique.

Forme. — Gouttes.

Composition. — 1° Association de :

Chlorure de calcium,
— magnésium,
— sodium,

sels qui stimulent la sécrétion et la motilité gastriques et augmentent considérablement le pouvoir digestif du suc gastrique.

2° **Principes amers de la gentiane**, renforçant l'action des chlorures.

Propriétés thérapeutiques :

Réveille l'appétit.

Augmente la sécrétion et l'activité des sucs digestifs.

Accélère la digestion.

Favorise l'évacuation de l'estomac.

Indications. — Atonie gastrique.

Hypoacidité.

Hyposécrétion.

Digestion lente.

Aérogastrie.

Anorexie.

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée au début ou au milieu des repas.

Enfants : IV gouttes par année d'âge et par 24 heures.

Prix : 17 fr. 10.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-Interne en Pharmacie —
Lauréat des Hôpitaux, Lauréat des Fac. de
Méd. de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96.)

PEPTO-FER JAILLET

Composition. — Combinaison organique chlorée de peptonate de fer.

Avantages. — Le fer dans le PEPTO-FER du D^r Jaillet est animalisé par la peptone, ainsi l'organisme l'assimile-t-il avec une grande facilité ; le taux d'hémoglobine est rapidement augmenté, sans aucune fatigue ni pour l'estomac ni pour l'intestin. La peptone facilite la digestion et y apporte son rôle anti-anaphylactique.

Le PEPTO-FER du D^r Jaillet n'a pas la saveur styptique de la plupart des préparations ferrugineuses, mais son goût agréable le fait accepter favorablement par le malade ; de plus, il ne noircit pas les dents et ne constipe pas.

Indications. — Anémies.

Forme pharmaceutique. — Elixir.

Doses. — *Grandes personnes* : 1 verre à liqueur après chaque repas.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café après les repas dans un peu d'eau.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS.

PEPTOGIL

Peptones gastriques et pancréatiques.

Propriétés thérapeutiques. — Médication antianaphylactique polyvalente, spécifique des anaphylaxies protéiques.

Indications. — Urticaires, migraines, phénomènes congestifs qui suivent les repas, troubles du foie et de l'intestin, asthme, coryza et toutes manifestations anaphylactiques des enfants et adultes.

Conditions d'emploi. — 3 fois par jour, 1 heure avant les repas, croquer 1 à 2 dragées. *Adultes* : 2 dragées.

Enfants : jusqu'à 12 ans, 1 dragée.

Prix de la boîte de 56 dragées : 16 fr. 50.

Établissements JACQUEMAIRE

Société Anonyme au capital de 10.000.000 fr.
VILLEFRANCHE (Rhône).

P. PHILLIPPE, Pharmacien de 1^{re} classe

PEPTO-KOLA ROBIN

Type du Médicament Aliment.

Liqueur très agréable à base de Glycérophosphates et de Kola.

Dose et mode d'emploi. — 1 verre à liqueur avant chaque repas.

Indications. — Fatigues passagères physiques ou intellectuelles, Albumine, Diabète, Stimulant pour les sportifs, etc.

Prix : 22 fr. 30

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTO-MAGNÉSIE VASSAL

Composition. — *Granulé de Peptones Polyvalentes* (de viande, d'œuf, de lait, de gélatine, de poissons, de céréales) et de *Sulfate de Magnésie pur sec*, goût agréable.

Propriétés thérapeutiques. — Stimulant Hépatobiliaire, puissant Cholagogue qui agit efficacement sur le foie et les voies biliaires, puissant antianaphylactique polyvalent.

Indications et posologie. — Cholécystite, congestion du foie, ictère, entéro-colites mucomembraneuses, lithiase, constipation, asthme, urticaire, eczémas, vertiges et migraine.

1 à 3 cuillerées à café dans un 1/2 verre d'eau chaude, le matin à jeun.

Prix de la boîte : 16 fr. 65.

Échantillons sur demande :

Aux Laboratoires Léon DANJOU

28, rue Hôpital-Militaire — LILLE.

PEPTOMALTONE DÉJARDIN

Préparée dans le vide, à basse température, donc sans destruction des vitamines.

Trois préparations :

- A. *Etiquette verte* : sans œufs ni cacao.
- B. *Etiquette bleue* : sans œufs, mais aromatisée au cacao.
- C. *Etiquette violette* : sans œufs, mais avec arôme café.

Indications. — Pour combattre toutes les déficiences de la nutrition, remédier aux déphosphatisations.

Posologie. — De 2 à 4 cuillerées à café par tasse, mais après refroidissement, à bonne température, du liquide choisi comme excipient, eau, lait, café ; préalablement bouilli.

Prix : 8 fr. 50 la boîte de 250 grammes environ.

Établissements DÉJARDIN

10, rue Parent-de-Rosan — PARIS (XVI^e).
(Tél. : Auteuil 03-04.)

PEPTONAL

Composition. — PEPTONE de viande intégrale rendue inaltérable par dragéification spéciale.

Action. — Le meilleur préventif de la migraine par action empêchante de la crise hémoclasique ; curatif de l'urticaire par atténuation des effets de la crise.

Indications. — Traitement préventif et curatif des migraines urticaires, intoxications alimentaires, asthme d'origine digestive.

Formes pharmaceutiques. — Comprimés dragéifiés.
— Granulé.

Dose. — Deux comprimés 1 heure avant chaque repas, ou deux cuillerées à café de granulé.

Enfants $\frac{1}{2}$ dose

Prix :

Comprimés : Le tube, 17 francs

Granulé : La boîte, 17 francs

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

PEPTONATE DE FER ROBIN

Combinaison définie de peptone et de fer.
Gouttes concentrées. Elixir. Vin.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* :
X à XXX gouttes ou 1 verre à liqueur
d'Elixir ou de vin à chaque repas. *Enfants*
1 goutte par année d'âge 2 fois par jour.

Propriétés thérapeutiques. — Reconsti-
tution des hématies.

Indications. — Tous les états anémiques
et chlorotiques

Prix : *Gouttes* : 16 fr. 45.

Elixir : 22 fr. 30. — *Vin* : 25 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

PEPTONE VASSAL

Viande de bœuf digérée,
SÈCHE

Représente 12 fois son poids de viande de bœuf.
Cette Peptone, fabriquée d'après les dernières
données scientifiques, est un produit remar-
quable tant par ses qualités organoleptiques que
par sa richesse en matières directement assimi-
lables. Cette Peptone a en outre l'avantage d'être
d'un *prix modéré* qui en permet un usage prolongé.
Agréable au goût.

Dose. — 3 cuillerées à soupe par jour dans le potage
ou dans du vin de Malaga.

Chaque flacon de 50 gr. « Peptone » représente
600 gr. de viande de bœuf solubilisée.

Échantillon gratuit sur demande.

Prix : 28 francs.

Laboratoires Léon DANJOU
LILLE.

PEPTOPANCREASE

Se recommande dans tous les cas de troubles digestifs.

Renfermant la totalité des ferments gastriques et pancréatiques, la **Peptopancrease** représente une thérapeutique très complète, basée sur les recherches scientifiques les plus modernes.

On emploie la **Peptopancrease** dans toutes les dyspepsies gastro-intestinales, ainsi que pour corriger les insuffisances et l'atonie de l'estomac.

Se prend à la dose d'une cuillerée à café dans un peu d'eau avant chaque repas.

Présentation : flacons de solution.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71 et 72.)

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

PEPTOSTHÉNINE CHOAY

Composition. — Association opothérapique digestive suivant formule :

Poudre gastrique	15 cgr.
— entéro-pancréatique ..	15 —
— hépatique	15 —
— biliaire	5 —

Pour 1 cachet ou 1 comprimé de 50 cgr.

Indications. — Troubles dyspeptiques par insuffisance des glandes digestives.

Mode d'emploi. — Un cachet ou comprimé à la fin de chacun des principaux repas.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

PEPTOZYM

Composition :

Extrait de pancréas	0 gr. 10
Extrait de bile	0 gr. 05
Boldine	0 gr. 00075
Extrait de muqueuse gastrique..	0 gr. 15
Poudre de noix vomique	0 gr. 025

En deux enrobages concentriques, le premier contenant les deux derniers composants et soluble dans l'estomac, le deuxième soluble dans l'intestin et contenant les trois premiers composants.

Indications. — Toutes dyspepsies par insuffisances sécrétoires et par insuffisance de la motricité, stimulant de la sécrétion et de la motilité gastro-intestinale, dysfonctionnements gastriques à tendance hypo.

Laboratoire R. BOUYSSOU

CHAMBOIS (Orne).

PÉRANDRONE

Propionate de testostérone.

CIBA

HORMONE ORCHITIQUE DE SYNTHÈSE.

Propionate de testostérone préparé synthétiquement selon le procédé original de Ruzicka. Représente, à l'heure actuelle, la substance possédant l'activité hormonale la plus élevée, telle qu'elle est révélée par la méthode des tests.

Indications :

Chez l'enfant et l'adolescent : Les troubles du développement sexuel, tels que puberté retardée, infantilisme, eunuchoïdisme, cryptorchidie, adiposité, anomalies morphologiques (gynécomastie) et psychiques résultant de ces troubles.

Chez l'adulte : L'insuffisance testiculaire, avec ses répercussions physiologiques et psychiques, affaiblissement ou cessation prématurée de la fonction sexuelle, eunuchoïdisme, pusillanimité, adiposité, sénilité précoce.

hez les prostatiques : A toutes les périodes les troubles urinaires sont très améliorés et, au premier stade, disparaissent souvent complètement. *L'état général* est toujours relevé; même chez les sujets qui ne sont plus justiciables que de l'intervention, l'invigoration et la résistance accrue favorisent l'acte opératoire et son pronostic.

Dans les affections chroniques par déficience endocrine : Tels certains états d'asthénie, de psychasthénie avec affaiblissement de la mémoire, l'obésité, lorsqu'elle traduit la carence testiculaire.

Chez la femme : Les mastopathies, les fibromes et certains troubles menstruels relevant d'un état d'hyperfolliculémie habituelle sont très heureusement influencés.

Présentation.

Solution I. Boîte de 4 amp. à 5 milligr.

Solution II. — 5 — 10 —

Solution III. — 2 — 25 —

qui permettent des traitements moyens et plus ou moins intensifs.

Traitement moyen : 1 Amp. Sol. I, 2 ou 3 fois par semaine.

— *intensif :* 1 Amp. Sol. II, tous les 2 ou 3 jours.

— *très intensif :* 1 Amp. Sol. III, 2 ou 3 fois par semaine.

PERANDRONE A

Acétate de testostérone.

CIBA

Boîte de 5 ampoules de 10 milligr.

Boîte de 1 ampoule de 40 milligr.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PÉRASUROL

Éliminateur des déchets uriques.

Composition :

Salicylate de lithine.....	2	grammes.
Phénylcinchoninate de soude	2	—
Tartrate de diméthylpipérazine.....	3	—
Anhydrométhyl. citr. d'urotropine ..	3	—
Phosphate de soude.....	4	—
Excipient effervescent aromatisé pour 100 gr.		

Forme. — Granulé effervescent.

Indications. — Rhumatismes, goutte, lithiase rénale, arthritisme, coliques néphrétiques, gravelle.

Doses :

2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée du flacon : 8 à 10 jours.

Prix. — 20 fr. 75.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôlesous le n° 1081-2.

G. BAETZ, pharmacien
CHEF-BOUTTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21).

PERCAÏNE

Chlorhydrate de la diéthyléthylène-diamide
de l'acide a-butyloxyinchoninique

OIBA

ANESTHÉSIQUE LOCAL

Action très intense (10 fois celle de la cocaïne) et d'une très longue durée. Utilisable par injections et en surface, chirurgie et médecine (algies, viscéralgies, méthode Lemaire).

Anesthésie par infiltration. — Solution de 1 à 2 p. 1.000, additionnée ou non d'adrénaline.

Anesthésie rachidienne. — Ampoules de 20 cc. à 1 p. 1.500 (JONES), et de 2 cc. à 5 p. 1.000 (QUARELLA).

Anesthésie des muqueuses, du nez, de la gorge, de l'urètre, de la vessie. — Solutions de 1/1.000 à 2 p. 100 (oto-rhino-laryngologie).

Doses :

Solution à 1 p. 1.000 : 60 à 120 cc.

— à 2 p. 1.000 : 2 à 40 cc

— à 2 p. 100 : 1 ou 2 cc. uniquement en surface.

Formuler :

Comprimés de 5 centigrammes pour la préparation extemporanée des solutions. Tube de 20 comprimés.

Ampoules de divers titres et contenances pour infiltration et rachi.

(Nous demander notice : TITRES ET DOSES.)

PERCAÏNAL CIBA

ONGUENT ANALGÉSIQUE ET ANTIPRURIGINEUX,
A BASE DE PERCAÏNE.

Calme la douleur et la démangeaison dans toutes les lésions ou éruptions douloureuses de la peau et des muqueuses. Assure le repos et le sommeil. Favorise la guérison des lésions.

Indications principales. — Eczéma, prurigo, crevasses, gerçures, ulcères, zona, prurit anal et vulvaire, fissure anale, hémorroïdes, etc.

Prescrire. Un tube Percaïnal.

Laboratoires OIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERCALCINE

Composition. — Association d'arrhénal, de divers sels de chaux (en particulier du silicate), de fenugrec et de girofle (qui supprime les inconvénients du fenugrec.)

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant intensif. Augmente l'appétit, l'assimilation, le poids.

Indications. — Amaigrissement, Prétuberculose, tuberculose, anémie, déphosphatation, carence calcique, dépressions nerveuses, Neurasthénie, Croissance difficile, faiblesse musculaire et osseuse, fractures.

Grossesse et allaitement.

Mode d'emploi :

A prendre 20 jours par mois.

Adultes : 3 cachets par jour au milieu des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans : 2 cachets ; de 4 à 10 ans : le contenu d'un cachet pris en 2 fois, aux repas de midi et du soir, mélangé aux potages, aliments ou confitures.

Prix : 17 fr. 45. La boîte de 30 cachets.

Laboratoire du DELTA (Tél. : Tru. 45-18.)

84, rue de Rochechouart — PARIS (IX^e).

Préparateur des SUPPOGLANDINES

PERCALCIUM

Composition. — a. *Solution de Chlorure de Calcium*, stabilisée et dosée de façon à ce que 1 goutte = 0,02 ctg de sel.

b. *Solution de Chlorure de Manganèse*, jouant le rôle de catalyseur et rendant le *Percalcium* beaucoup plus actif que les préparations similaires.

c. *Excipient spécial* masquant la saveur particulièrement désagréable du Chlorure de Calcium.

Propriétés thérapeutiques. — a. *Anti-Hémorragique* : Action curative dans les maladies hémorragiques, les hémorragies viscérales : épistaxis-hémoptysies, métrorragies. etc., action préventive des hémorragies post-opératoires.

b. *Recalcifiant* : 1^o la *Tuberculose* et les *Etats prétuberculeux*, dans toutes leurs formes, dans toutes leurs phases évolutives ; 2^o les *Troubles du Métabolisme calcique* : Rachitisme, Grossesse, Tétanie, Décalcification osseuse, Caries dentaires.

c. *Régulateur du Métabolisme de l'eau* : Résorption des épanchements séreux d'origine rénale, hépatique, pleurale.

d. *Anti-choc* : Etats colloïdoclasiques : choc hémoclasique ; rhinorrhée ; asthme, rhume des foins ; urticaire, accidents sériques.

Posologie. — Chez l'enfant : V à XX gouttes par année d'âge jusqu'à 8 ans ; au-dessus de 8 ans et chez l'adulte, de XX à CC gouttes.

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Percalcium : A. JOURDIN

Avenue Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Passy 92-54.)

PERCORTÈNE

Acétate de désoxycorticostérone.

CIBA

HORMONE CORTICO-SURRÉNALE DE SYNTHÈSE.

Cette hormone synthétique du cortex surrénal est nettement spécifique et permet d'obtenir la survie indéfinie des animaux surrénalectomisés.

Indications. — Tous les états d'insuffisance surrénale, qui ne sont pas rares au cours de nombreuses affections et des états pathologiques les plus divers.

L'indication princeps est la grande insuffisance progressive de la maladie d'Addison, considérée il y a peu de temps comme inexorablement mortelle. Mais, à côté de cette grande insuffisance, il existe de nombreux états d'hypofonction déterminant des troubles divers, dont les plus apparents sont l'hypotension artérielle, l'adynamie, l'extrême fatigabilité et la mélanodermie. Indépendamment de ces signes majeurs, de nombreux sujets sont en état de petite insuffisance avec symptômes atténués, au nombre desquels on relève toujours l'asthénie, puis certains troubles du métabolisme des graisses et du glucose. Mentionnons enfin les toxicoses de la grossesse (d'origine hypophyso-surrénale) et certaines affections cutanées telles que le psoriasis.

Indépendamment de sa grande indication, l'*Addisonisme*, le Percotène est donc susceptible de rendre d'éminents services dans un grand nombre d'états pathologiques, tels que les suivants :

Asthénie et adynamie constitutionnelle. Convalescence des maladies aiguës et infectieuses (en particulier la diphtérie, la grippe, la pneumonie, la fièvre typhoïde qui atteignent toujours les surrénales). Toxicoses de la grossesse. Etats de choc après les grands traumatismes ou opérations graves. Plaies infectées et brûlures étendues lentes à cicatriser. Cirrhose alcoolique. Intoxications chroniques professionnelles. Chez les enfants, la maladie cœliaque, la dystrophie hypophysaire.

Présentation. — Le Percotène est présenté sous forme injectable uniquement, en ampoules de 1 cc. renfermant une solution huileuse titrée à 2 et 5 mgr. par ampoule.

Posologie :

Grande insuffisance.....	5 à 10 mgr. par jour.
Moyenne insuffisance	2 mgr. tous les 2 ou 3 jours.
Petite insuffisance.....	2 mgr. par semaine.

Formuler :

Boîte de 4 ampoules à 2 mgr.
Boîte de 4 ampoules à 5 mgr.

Laboratoires CIBA O. ROLLAND

103 à 117, boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

PER-EXTRAITS CARRION

Extraits opothérapiques injectables préparés selon une technique spéciale.

Composition. — Solutions désalbuminées correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. (Corps jaune, Cortex, Foie, Ganglions lymphatiques, Hypophyse antérieure, Hypophyse totale, Mammaire, Moelle épinière, Moelle osseuse, Myocarde, Orchitique, Ovaire, Pancréas, Placenta, Prostate, Rein, Rate, Surrénale, Thymus, Thyroïde, Utérus). Pour le Per-Parathyroïde, une ampoule de 1 cc. correspond à 0,05 d'organe.

Voir dans ce dictionnaire : *Per-Hépatique*, *Per-Ovarien*, *Per-Surrénalien*, *Per-Thymique*.

Forme. — Ampoules de 2 cc. (sauf Parathyroïde de 1 cc.), Perhépatique et Perthymique de 2 et 5 cc.

Indications. — Troubles endocriniens.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire, tous les jours, ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 28 fr. 10; la boîte 6 ampoules de 5 cc. : 45 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. n° 514, n°s divers.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERGLANDÈNE HÉPATIQUE

Extrait de Foie injectable, délipoidé, désalbuminé.

Indications. — Cirrhoses, ictères, dyspepsie, insuffisances hépatiques au cours des maladies aiguës et chroniques, en particulier de l'intoxication éthylique. Toutes manifestations anaphylactiques, cutanées, respiratoires, nerveuses, etc. Dépression mélancolique et manifestations convulsives.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 20 gr. de foie frais.

Conduite du traitement. — Une injection par jour ou tous les deux jours de 1 cc. Séries de 15 injections espacées de 15 à 20 jours.

Prix de la boîte : 37 fr. 25.

Prix du tube : 34 fr. 76.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-28.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

PERGLANDÈNE ORCHITIQUE

Extrait d'Organe injectable, délipoidé, désalbuminé.

Indications. — *Chez la femme*: troubles de la ménopause et de la puberté, anxiété génitale, troubles liés à la continence, aménorrhée rebelle. *Chez l'homme*: infantilisme, impuissance, sénilité précoce. *Dans les deux sexes*: obésité, engelures, acrocyanose.

Formes et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Conduite du traitement. — Une injection tous les deux jours de 1 cc. ou suivant prescription médicale.

Prix de la boîte : 21 fr. 95.

Prix du tube : 19 fr. 90.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-30.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

PERGLANDÈNE OVARIEN

Extrait d'Ovaire injectable, délipoidé, désalbuminé.

Indications. — Insuffisances ovariennes, troubles de la puberté, de la ménopause naturelle ou opératoire, aménorrhée ou dysménorrhée.

Forme et composition. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Tube de 6 cc., chaque cc. = 5 gr. d'organe frais.

Conduite du traitement. — Une injection par jour, ou tous les deux jours, de 1 cc. Séries de 20 ou de 10 injections en dehors de la période menstruelle.

Prix de la boîte : 40 fr. 30.

Prix du tube : 38 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-29.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

PER-HÉPATIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de foie désalbuminé, correspondant à 1 gramme ou 2,5 gr. d'organe frais par ampoule.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Insuffisance hépatique au cours des maladies aiguës et chroniques (tuberculose notamment). Intolérance à certaines médications (chryso et arsénothérapie), Cirrhoses.

Posologie et mode d'emploi. — 1 ampoule en injection sous-cutanée ou intramusculaire tous les jours ou tous les deux jours.

Présentation et prix. — La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 28 fr. 10. La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 45 fr. 60.

Enregistré au L. N. C. n° 514-26.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRICOLS DU D^r LEGROS

Présentation. — Conglomérés à base de glycérine pouvant contenir tous médicaments, de forme discoïde, d'élasticité parfaite.

Avantages. — Entre en contact parfait avec la muqueuse du col utérin, épousant la forme des culs-de-sac. Fonte parfaite.

Composition. — Péricols bellado-iodurés ; au thigénol ; à l'ichtyol ; au collargol.

Et toute formule spéciale désirée par le médecin.

Indications. — Toutes les affections gynécologiques.

Prix : Boîte de 6 : 19 fr. 65.

Boîte de 20 : 42 fr. 85.

Laboratoires G. LESOURD

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

PÉRISTALTINE

CIBA

LAXATIF-ECCOPROTIQUE.

Glucoside pur du *Rhamnus purshiana* agissant exclusivement sur le péristaltisme, sans provoquer de coliques. Utilisable également par voie hypodermique (Ampoules de 1 cc. 1/2).

Indications. — Constipation chronique, formes atoniques et spasmodiques. Atonie post-opératoire : injecter préventivement 1 ou 2 ampoules après l'intervention.

Comprimés — Cachets — Ampoules.

Doses. — *Adultes* : 1 à 3 cachets ou comprimés, 1 à 3 ampoules. — *Enfants* : Quart ou demi-dose de l'adulte suivant l'âge. — Injectée ou ingérée, la Péristaltine agit au bout de 10 à 15 heures.

Formuler. — Boîte de 20 cachets.
Flacon de 20 comprimés.
Boîte de 5 ampoules.
Boîte de 20 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PERLES TAPHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Perles gélatineuses contenant 0 gr. 25 de tannophosphate de créosote d'une irréprochable pureté et d'une parfaite tolérance gastrique.

Propriétés thérapeutiques. — Asséchant bronchique, bactéricide, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Bronchites aiguës et chroniques, catarrhes, pré tuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 5 perles par jour prises de préférence une à une, à tout moment de la journée. Dans les affections chroniques, procéder par alternance des périodes de cure (10 jours) et de repos (5 jours).

Prix : 17 fr. 10.

Littérature et Échantillons:

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PERMYASE

Composition. — Suc désalbuminé et stérilisé de larves de *Lucilia sericata*.

Formes :

PERMYASE LIQUIDE : Ampoules de 5 cc., et de 2 cc., de suc de larves dilué dans du sérum physiologique, résorciné à 1/1 000.

PERMYASE GÉLIFIÉE : Tube de 50 gr. de gelée à base de suc de larves, résorcinée à 1/500.

Indications. — Toutes les suppurations ouvertes, aiguës ou chroniques.

Chirurgie : Pansements post-opératoires dans la chirurgie septique.

• Anthrax, furoncles, panaris, abcès divers.

Médecine : Ulcères variqueux, eczéma suintant, brûlures s'accompagnant de sphacèle.

Oto-rhino-laryngologie : Ozène, otites, pansements post-opératoires.

Mode d'emploi. — Applications locales en méchages ou pansements, à renouveler selon les cas deux fois par jour, tous les jours ou tous les deux ou trois jours jusqu'à nettoyage et bourgeonnement de la plaie.

Prix de la boîte de 5 ampoules de 5 cc. : 27 fr. 55.

Prix de la boîte de 10 ampoules de 2 cc. : 21 fr. 95.

Prix du tube : 21 fr. 95.

L. N. C. n° 234-25-2, 234-25-1, 234-26.

Laboratoire de l'ENDOPANCRINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 07-70.)

PER-OVARIEN CARRION

Composition :

Extrait spécial d'ovaire total, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule.

Forme : Ampoules de 2 cc.

Indications.

Insuffisances ovariennes, Ménopause, Aménorrhée, Dysménorrhées.

Posologie et mode d'emploi :

1 ampoule en injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 ou 12 ampoules.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 28 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. n° 514-29.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PERQUINOL

Sulfate double d'ortho-oxyquinoléine et de potassium.

Quatre formes.

A. VOIE EXTERNE :

1° **Perquinol comprimé** de 0 cgr. 50.
Boîte de 20 comprimés.

Prix : 15 fr. 90.

Antiseptique puissant.

Gynécologie, Urologie, Oto-Rhino-Laryngologie-Stomatologie-Hygiène en général.

Ni toxique, ni caustique, désodorisant, très soluble, inaltérable.

S'emploie en solution de 0,50 à 2 p. 1 000.

2° **Perquinol ovules.** Boîte de 6 ovules.

Prix : 15 fr. 90.

3° **Perquinol pommade.**

Prix du tube : 10 fr. 60.

Rougeurs, Écorchures, Eczémas, Herpès, *Engelures*, Brûlures, Pyodermite.

B. VOIE INTERNE :

Perquinol dragées. Boîte de 35 dragées dosées à 0 gr. 10.

4 à 6 dragées par jour, les avaler, ne pas les croquer.

Affections gastro-intestinales, Colibacilloses, Grippe, Ictère catarrhal, Cystites, Blennorrhagie, Tuberculose (remplace la créosote).

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (II^e).

(Tél. : Ric. 35-10.)

PERSODINE LUMIÈRE

Traitement de l'Hypo-nutrition et de l'Anorexie.

Constitution. — Préparation stable à base de Persulfates alcalins purs, établie par nos procédés spéciaux, sous forme de comprimés.

Propriétés. — Active le métabolisme général, elle crée le besoin de s'alimenter, elle réalise véritablement l'oxygénothérapie interne, par la production d'oxygène naissant qui active dans une très large mesure les échanges nutritifs.

La **Persodine Lumière** est un apéritif par action secondaire, son mode d'action est profond, il stimule les besoins organiques et ne crée pas seulement l'envie de réplétion gastrique.

Les aliments ingérés avec faim sous l'influence de la **Persodine Lumière** sont assimilés parce qu'ils répondent à une sollicitation organique profonde. Particulièrement précieux chez les tuberculeux.

Indications : Anorexie, Hypo-nutrition.

(Tuberculose, Chloro-Anémie, Rachitisme, Dyspepsie, Neurasthénie, Convalescence, etc.).

Éviter l'usage de la **PERSODINE LUMIÈRE** chez les malades présentant une hyperchlorhydrie accentuée.

Doses courantes. — 2 fois par jour, un quart d'heure avant les repas, dans un quart de verre d'eau pure, non sucrée.

Adultes : 3 comprimés.

Enfants de 8 à 14 ans : 2 comprimés.

Enfants de 2 à 7 ans : 1 comprimé.

Formuler. — Flacon de comprimés de **PERSODINE LUMIÈRE**.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

PER-SURRÉNALIEN CARRION

Composition. — Extrait spécial de surrénale totale, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule, et renfermant 1 mgr. d'Adréaline (1/2 milligramme par cc.).

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Indications. — Insuffisances surrénales aiguës des maladies infectieuses, syndrome secondaire de la diphtérie maligne. Insuffisances surrénales chroniques, maladie d'Addison, asthénie, hypotension artérielle.

Posologie et mode d'emploi. — 1/2 à 1 ampoule à la fois en injection sous-cutanée. Commencer éventuellement avec moins encore, pour tâter la susceptibilité du malade.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules : 28 fr. 10.

Enregistré au L. N. C. n° 514-31.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PER-THYMIQUE CARRION

Composition. — Extrait spécial de thymus, désalbuminé, correspondant à 1 gramme d'organe frais par ampoule de 2 cc. et à 2 gr. 50 d'organe par ampoule de 5 cc.

Forme. — Ampoules de 2 cc. et de 5 cc.

Indications. — Ectopies testiculaires. Troubles de croissance et de nutrition du jeune enfant. (Insuffisance de la première dentition.) Syndrome adiposo-génital, Infantilisme, Certaines Dysménorrhées ou Aménorrhées.

Posologie et mode d'emploi. — 1 injection sous-cutanée tous les jours ou tous les deux jours, par séries mensuelles de 6 à 12 injections.

Présentation et prix :

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 28 fr. 10.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 45 fr. 60.

Enregistré au L. N. G. n° 514-32.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PÉRUBORE (Comprimés)

Inhalations — Gargarismes.

Composition

Chaque comprimé contient :

Baume du Pérou.....	0 03	Borate de soude	0 60
Essences aromatiques	0 025	Bicarbonate de soude.....	0 30

Propriétés thérapeutiques. — Pansement antiseptique et sédatif du revêtement intérieur des voies respiratoires.

Indications thérapeutiques. — Rhumes, angines, toux, affections de la gorge, enrhouements, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, sinusites, coryza, grippe.

Posologie et mode d'emploi. — 1^o *Inhalation* : à faire matin, midi et soir, de 1 à 2 comprimés dans un bol d'eau bouillante ou dans un inhalateur, respirer les vapeurs par le nez et la gorge pendant cinq minutes.

2^o *Gargarisme* : à faire plusieurs fois par jour, un comprimé pour un demi-verre d'eau bouillie chaude.

Pulvérisation : dissoudre 2 comprimés dans l'eau du pulvérisateur à vapeur et faire une pulvérisation de 5 minutes.

Prix : 15 fr. 80 (8 jours de traitement).

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). — Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL, pharm., 4, avenue Orban.

PERVOSINE

Composition. — Extr. stabilisés de marron d'Inde, de gui, de séneçon, Bourse à Pasteur, Bourdaine, Passiflore, Cratægus, Anémone, NaBr.

Sans alcool.

Forme. — Gouttes.

Indications. — Tous les troubles de la circulation du sang aussi bien chez l'homme que chez la femme.

Doses. — XV à XX gouttes dans un peu d'eau sucrée, trois fois par jour avant chaque repas.

Prix du flacon, réglementé : 16 fr. 85.

Durée du flacon : 15 jours environ.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 1081-3.

G. BAETZ, Pharmacien,
CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres).
(Tél. : 21.)

PHAGOSTHYL

Sérum neurotonique, Cytophile, Hémopoïétique, Reconstituant, phagocytaire. (*Pour adultes.*)

Formule :

Cacodylate de soude pur	20 centigr.
— de magnésie pur	10 —
Sulfate de strychnine.....	2 milligr.
Soluté chloruré isotonique	5 cc.

Indications. — Tuberculose, Prétuberculose, Anémies, Asthénie, Neurasthénie, Grippe, Convalescences, Paludisme, Dermatose, Tertianisme, Etats cancéreux, Cachexies.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les jours ou tous les 2 jours.

Se vend en boîte de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 fr. 90.

Phagosthyl Infantile pour enfants de 8 à 15 ans.

12 ampoules de 2 cc. : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-3.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS
4, rue de La Motte-Picquet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 55-12.)

PHAGOSTHYL MANGANÉ

(Pour adultes.)

(Exempt de strychnine.)

Formule :

Cacodylate de manganese	2 centigr.
— de soude	10 —
— de magnésie	8 —
— de calcium	10 —
Eau distillée	5 cc.

Indications. — Carences, Dénutrition, Décalcification, Anémies, Asthénie, Convalescence des Maladies aiguës, Anergie grippale, Surmenage, Amaigrissement, Troubles endocriniens.

Emploi. — Une injection indolore intramusculaire ou sous-cutanée tous les deux jours, dans la région fessière, en prenant les précautions aseptiques d'usage.

Se vend en boîtes de 12 ampoules de 5 cc.

Prix au public : 22 fr. 90.

Phagosthyl Mangané Infantile : 12 ampoules de 2 cc. pour enfants de 8 à 15 ans.

Prix : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 232-4.

Laboratoires Biologiques André PÂRIS

4, r. de La Motte-Picquet — PARIS (XV*). (Tél. : Ség. 55-12.)

PHARYNGASEPTYL

Composition. — Résorcine, Méthylpyrocatechine, Acides borique, salicylique, tartrique, benzoïque, Terpinéol, Cinéol, Myrthol, Pinènes et Polyterpènes purifiés.

Forme. — Poudre.

Indications. — Laryngites, Trachéites, Sinusites, Chordites, Fatigue vocale, Enrouement, Catarrhe tubaire, Stomatites, Pharyngites, Amygdalites, Angines diverses.

Posologie. — *Adultes :* 1 cuillerée à café dans un verre d'eau chaude, 2 à 4 fois par jour en gargarismes, bains de gorge, fumigations, inhalations, vaporisations, lavages et bain nasal.

Enfants : 1/2 cuillerée à café.

Prix : 17 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 219-14.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

PHARYNGOLÉINE

Composition. — Adrénaline, benzoate de soude, bromure de sodium, analgésine, alcool de menthe, glycérine neutre, eau de laurier-cerise.

Propriétés. — Antiseptique, analgésique, décongestive.

Indications. — Toutes affections inflammatoires et microbiennes de la bouche et du carrefour aéro-digestif, stomatites, gingivites, aphtes, muguet, pharyngites, laryngites.

Posologie. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau en bains de bouche ou gargarismes, ou en pulvérisations avec un pulvérisateur type Lucas-Championnière.

Pure en badigeonnages.

Présentation et prix. — Un flacon : 17 francs.

Laboratoires de Thérapeutique
Oto-rhino-laryngologique.

72, rue de Bagneux — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Alésia 02-41.)

PHARYNXOL

(Rhinopharynxol)

Capsules nasales d'huile balsamique

Composition. — Huile végétale diffusible, neutralisée, d'arôme agréable, à base de santalol et de camphre.

Tolérance absolue : aucun élément caustique, irritant ou toxique.

Action. — Lubrifie, décongestionne et déterge, sans les irriter, les muqueuses du nez et de la gorge : grâce à son pouvoir de diffusion, cette huile se répand dans toutes les voies aériennes supérieures ; elle exerce une action particulièrement élective sur les cordes vocales.

Indications. — Coryza, aigu ou chronique. — Maladies du nez, de la gorge, du larynx, de la trachée. — Affections grippales des voies respiratoires supérieures. Protection contre les multiples maladies infectieuses à début rhino-pharyngé et en particulier contre celles du premier âge (Rougeole, scarlatine, etc...). Spécifique rationnel contre l'enrouement.

Mode d'emploi. — Couper préalablement le col de la capsule à sa partie supérieure ; par une légère pression, en verser le contenu dans chaque narine, en prenant soin de renverser la tête en arrière.

Formule. — Chaque capsule d'environ 0 gr. 50 contient :

Santalol.....	0 gr. 0036
Camphre.....	0 gr. 0030
Huile végétale aromatisée.....	0 gr. 4934

Prix : 13 fr. 05 la boîte de 20 capsules nasales.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL & C^{ie}, successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène

8, rue Vivienne — PARIS (11^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

PHÉNA

(Phénaseptyl V. de Christmas.)

Composition. — Phénate de soude, Ac. salicylique, Ac. benzoïque, Menthol, Formol, Ess. aromatiques, dans véhicule spécial glycérimé sodique.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1591-I.

Propriétés. — Puissant Antiseptique, Bactéricide, Analgésique, Cicatrisant, Décongestif, Phagocytaire.

Indications. — Dans tous les cas exigeant un puissant antiseptique en Oto-rhino-laryngologie, Stomatologie, Chirurgie, Dermatologie, Gynécologie, Hygiène, etc.

Préventif des maladies d'origine microbienne.

Présentation et mode d'emploi. — PHENA (liquide) : Hygiène, bains de bouche, lotions : X à XX gouttes dans un verre d'eau tiède. Gargarismes, pansements, lavages après extractions dentaires, etc. : 1 cuill. à soupe par litre d'eau bouillie. Injections vaginales : 1 à 2 cuill. à soupe par litre d'eau.

PHENA (ovules) : En pansement gynécologique.

Prix. — PHENA : flacon P. M., 12 fr. 50 ; flacon G. M., 18 fr. 50

PHENA : boîte de 10 ovules, 21 fr.

Littérature et échantillons aux

Laboratoires « PHENA »

Boîte postale N° 5 — LIMOGES (Haute-Vienne).

PHÉNÉDRINE

Dragées dosées à 0 gr. 003 de sulfate de phénédrine ou sulfate de β phénylisopropylamine.

PROPRIÉTÉS. — Corps synthétique proche de l'adrénaline et de l'éphédrine, c'est :

- 1° Un stimulant du système nerveux central (action euphorisante) ;
- 2° Un sympathicomimétique actif (effet antispasmodique sur les fibres lisses, action modérément hypertensive).

POSOLOGIE ET INDICATIONS — La dose utile est assez variable suivant les sujets et les affections ; les doses indiquées peuvent être facilement dépassées, la phénédrine étant très peu toxique ; elle provoque parfois une réaction passagère (rougeur de la face, sécheresse de la gorge, etc.) qu'on évitera en tâtant la susceptibilité individuelle par une faible dose de début. Les dragées seront administrées de préférence le matin, l'action stimulante pouvant amener une certaine insomnie après prise trop tardive. L'accoutumance au produit ne semble pas à craindre.

1° **Asthénie et dépressions psychiques et physiques.** La phénédrine est particulièrement indiquée dans :

- a. *La fatigue intellectuelle et physique transitoire des sujets normaux.*
- b. *La dépression constitutionnelle, la neurasthénie, la psychasthénie.*
- c. *La dépression alcoolique en général.*

1 à 4 ou 6 dragées par jour en deux prises au début de la matinée.

2° **Affections nerveuses.** — a. *Narcolepsies* : 3 à 10 dragées par jour en plusieurs prises espacées suivant les besoins.

b. *Syndromes parkinsoniens post-encéphalitiques* : 6 à 10 dragées par jour en deux prises, au réveil et à midi.

c. *Myasthénies* : 4 à 6 dragées par jour en 2 prises, au réveil et à midi (comme adjuvant).

3° **Hypotension artérielle idiopathique** : 4 à 6 dragées en 1 ou 2 prises dans la matinée.

4° **Spasmes gastro-intestinaux** : 2 à 8 dragées selon l'âge et le poids, en une prise pour lever le spasme (action surtout utile pour les examens radiologiques). Tâter auparavant les susceptibilités individuelles par une dose d'essai de 2 dragées.

CONTRE-INDICATIONS. — 1° Les états anxieux, mélancoliques et d'excitation maniaque ; l'épilepsie, la maladie de Basedow ;

2° L'hypertension artérielle, l'artériosclérose, les aortites et les coronarites ;

3° La tuberculose et les états de dénutrition ;

4° L'insomnie.

LITTÉRATURE. — Thèse du D M. Bellet (Paris, 1938).

PRÉSENTATION. — Tubes de 30 dragées : 16 francs.

Présentations et dosages spéciaux pour essais thérapeutiques, documentation sur demande.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et Cie, Successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène

8, rue Vivienne — PARIS (2°). (Tél. : Gut. 27-03.)

PHÉNIODINE BOUCHEREAU

Chimiquement : Ethyliodophénate d'Hexaméthylène-amine. Nouveau dérivé aminé iodo-phénolé cristallisé, hydrosoluble, *antiseptique atoxique essentiellement neurotrope. Anti-infectieux général.*

Indications. — Utilisation très efficace dans toutes les *affections neuro-vasculaires* de diverses origines, intéressant le système nerveux central et le système neuro-végétatif : Névralgies, grandes Hypertensions, Hémiparésies, Synovites, Sciatiques, Accidents secondaires, etc.

Forme. — Ampoules dosées à 0 gr. 50 de produit actif par 10 cc., une ampoule tous les jours ou tous les 2 jours, en intramusculaires profondes ou éventuellement en intraveineuses.

Boîte de 6 ampoules 10 cc., public : 39 francs.

Laboratoire de Contrôle N° 1621-5. Dépôt O. C. P.

Laboratoire de Chimie Thérapeutique

P. BOUCHEREAU

Docteur en Pharmacie, Lauréat de la Faculté de Paris.

57, Boulevard A.-Briand — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél.: Pompadour 197.)

PHILENTÉROL

Vaccin polyvalent buvable.

Composition. — Association d'une émulsion de colibacilles avec des filtrats : colibacillaire, entérococcique, staphylococcique.

Emploi préventif.

Vaccination pré et post-opératoire. — Grossesses, accouchements Pyélonéphrite, phlébites, septicémies.

Huit jours avant l'intervention, prescrire une ampoule par jour pendant les six premiers, et deux par jour pendant les deux derniers.

Après l'opération : 1 ampoule par jour.

Emploi curatif.

Rétablissement de l'équilibre humoral intestinal et des fonctions hépato-rénales et gastriques, antisepsie des voies génito-urinaires.

Indications. — Gastro-entérites, colites, diarrhées, grippe intestinale, syndrome entéro-rénal, appendicites, fièvres typhoïdes. 1 ampoule par jour pendant dix jours. Reprendre la cure si nécessaire après un repos de huit à dix jours.

La boîte de 10 ampoules : 27 fr. 30.

Boîtes de 50 pour MM. les Chirurgiens, les cliniques et hôpitaux.

Laboratoires du Dr P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS. — (Tél. : Auteuil 24-52.)

PHILODERME YLDRA

Pommade au précipité blanc et au Salol.
Décongestive, Réductrice et Cicatrisante.

Indications. — Streptococcies et Staphylococcies cutanées, Eczémas rebelles, Psoriasis, Dartres, Brûlures, Engelures, Érythèmes, Prurits et Plaies de toute nature.

Contre-indication. — Applications simultanées de produits iodés.

Avantages. — Ni caustique, ni irritant.

Mode d'emploi. — Étendre à l'aide d'une spatule sur une compresse de gaze hydrophile. — En application matin et soir.

Présentation. — En tube de 50 grammes.
Prix : 12 francs.

Laboratoire du Docteur E. ARDELY

20, rue Antoinette — PARIS (XVIII^e).

O. C. P. et C. N. P. F.

(Tél. : Montmartre 02-98.)

PHLÉBOCRATYL

Agréable au goût.

Formule établie d'après les enseignements de M. le Dr HENRI LECLERC, ex-président de la Société de Thérapeutique.

Composition. — Extraits aqueux, *sans alcool* et *sans sucre*.

Une cuillerée à café contient :

Hamamelis Virginica	0 gr. 15
Polygonum Hydropiper	0 gr. 15

Propriétés. — Régulateur de la circulation veineuse, décongestionnant (très puissant du fait que cette préparation ne contient pas d'alcool) et antihémorragique.

Indications. — Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Troubles de la puberté, de la ménopause, Varicocèle.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, de préférence au milieu des repas, dans un peu d'eau.

Échantillons et littérature à la disposition de MM. les Docteurs.

**Laboratoires de Phythothérapie Expérimentale
SOPHYTA**

1, boulevard Malesherbes — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 16-15.)

PHLEBOS

Forme. — Dragées et Gouttes.

Composition. — 2 dragées ou XV gouttes correspondent à :

Intrait de marron d'Inde Dausse	0,006.
Extrait fluide de Berberis	0,20.
Extrait fluide de Seneçon	0,20.
Alcoolature de Ficaire	0,20.
Alcoolature d'anémone	0,10.
Extrait de noix vomique	0,02.

Actions thérapeutiques. — Vasoconstricteur périphérique énergique, sédatif puissant, régulateur, emménagogue, décongestif, hémostatique et tonique vasculaire.

Indications. — Spécifique des hémorroïdes, varices, ulcères variqueux, phlébites, hémorragies viscérales et utérines, hémoptysie, Dysménorrhée, Aménorrhée.

Posologie. — XV gouttes ou 2 dragées avant les deux principaux repas.

Prix : 16 fr. 50 (dragées et gouttes).

Voir *Suppoalgos*, spécifique des règles douloureuses.

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoire LA GOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

(Tél. : Moncey 14-35).

PHLÉBOSINE CARRION

Association de produits opothérapiques et d'extraits végétaux.

Composition :

Phlébosine M. : Thyroïde, Orchitique, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Phlébosine F. : Thyroïde, Ovaire, Surrénale, Hypophyse, Hamamélis, Berberis, Hydrastis, Marron d'Inde.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Varices, Hémorroïdes, Hypotonicité vasculaire.

Posologie et mode d'emploi. — 2 à 4 comprimés par jour au repas. Bien spécifier M. ou F.

Présentation et prix. — Le flacon de 24 comprimés : 22 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. n° 514-58 et 59.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

PHLÉBOTONINE

Solution d'extraits fluides ou stabilisés agissant sur le cœur (gui, genêt, aubépine) et les vaisseaux (hamamélis, viburnum, cupressus, etc...).

Avantages. — Aucun trouble digestif et aucune toxicité.

Indications. — Troubles circulatoires, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, etc.

Forme. — Liquide, flacon de 125 cc. pour un traitement de 10 à 12 jours.

Dose. — 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 16 fr. 65.

G. MARTINIE, Pharmacien

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

R. C. Seine 440-107.

(Tél. : Roquette 86-84.)

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1122-6.

PHLOXIODE

Composition et propriétés thérapeutiques. — Solution huileuse à base :

- 1° *D'iode spécial*, correspondant à quelques milligrammes par cc.
- 2° *Xylol* (0,02 par cc.) qui provoque une leucopénie légère, aboutit à un rajeunissement leucocytaire, au réveil des réactions d'activité, entretenues et exaltées par l'iode à dose homéopathique.
- 3° *Camphre* (0,10 par cc.) qui agit comme toni-cardiaque et avec :
- 4° *L'Eugénol* (0,03 par cc.) comme anti-thermique et antiseptique.

Indications. — S'adresse à tous les états infectieux. Médication d'allure spécifique dans les infections grippales, typhiques, *pneumococciques*, (broncho-pneumonies, pneumonies).

Condition du succès. — La mise en train immédiate du traitement : *frapper vite et fort*.

Posologie. — *Cas légers, moyens* : 1 ampoule par injection. *Cas graves, désespérés* : 2 ampoules par injection. Tous les jours, au besoin matin et soir jusqu'à la chute de la température. Dans les cas graves et rebelles, *quel que soit l'âge et quelle que soit l'infection*, ne pas hésiter à employer d'emblée la dose de 2 ampoules.

La boîte de 10 ampoules : 35 francs pour un traitement de 5 à 10 jours.

Laboratoires **G. GAIZARD**

95, rue Michelet — ALGER — Tél. : 81-56.

PHONODIOSE

Composition. — Le phonodiose est un composé d'iode et d'un naphtène sélectionné, dosé à 1 gr. d'iode pour 1. 000. Le phonodiose est délivré en ampoules de 5 cc.

Propriétés. — Cette nouvelle combinaison permet d'utiliser les propriétés bactéricides de l'iode sans avoir à redouter la corrosivité qui jusqu'ici en rendait l'emploi malaisé. Aux effets thérapeutiques de l'iode s'ajoute l'action lénitive, adoucissante, protectrice du naphtène. Aussi, obtiendra-t-on des résultats remarquables dans toutes les affections des tissus superficiels, dans le cas d'inflammation ou d'infection de la peau ou des muqueuses, que ce soit en oto-rhino-laryngologie, en gynécologie, en urologie, en dermatologie, en petite chirurgie, etc.

Posologie. — Le phonodiose s'applique sur toutes les parties faciles à atteindre à l'aide d'un tampon de coton ou, de préférence, à l'aide de l'atomiseur L. G. de la Sté des Atomiseurs 42, rue Beaumarchais, MONTREUIL (Seine).

Lorsque le traitement doit être appliqué sur des points difficilement accessibles, il est indispensable de se servir des appareils spéciaux, créés pour cet usage, dénommés les atomiseurs médicaux.

Les applications se font, alors, par des pulvérisations très fines sur les tissus malades, répétées aussi souvent qu'il est nécessaire.

Oto-Rhino-Laryngologie : Sinusites, otites, coryzas, laryngites, angines... — **Phtisiologie :** Trachéites, bronchites, asthme...

Gynécologie : Endométrites, métrites cervicales, bartholinites...

Urologie : Urétrites et prostatites blennorragiques.

Dermatologie : Psoriasis, acnés, impétigo et toutes affections du derme.

Petite Chirurgie : Phlegmons, anthrax, furonculoses, plaies variqueuses, etc... et toutes plaies infectées.

LABORATOIRES F. LATOUR

71, rue Douy-Delaupé — MONTREUIL-s-BOIS(Seine). Tél. : Avron 32-52.

PHOSARKYL

(Ancienne dénomination : Quinarsol antianémique).

**Extrait de quinquina Grandval
associé aux Strychno-Phospharsinates.**

Propriétés thérapeutiques :

Tonique. — Stimulant général. — Apéritif.

Composition. — *Chaque comprimé contient :*

Quinquina Grandval	0 gr. 30
Glycérophosphates composés	0 gr. 30
Strychnine combinée.....	1 mgr. 60
Arsenic combiné.....	0 mgr. 18

Indications. — Anémie, Surmenage intellectuel et physique, Faiblesse générale, toutes convalescences, Grippe. — Diabète et ses complications, Séquelles du Paludisme.

Permet l'absorption facile du Quinquina et de la Strychnine.

Dose :

2 comprimés avant chacun des deux principaux repas.

La boîte de 32 comprimés : 14 francs.

(Toutes pharmacies.)

Laboratoires GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS.

Tél. : 31-63.

PHOSBIOSE (Codex)

Inosito-hexaphosphate mixte de calcium et de magnésium.

Produit **naturel** retiré des céréales, le plus riche en magnésium des phosphates organiques végétaux : 11 p. 100.

Se dissout dans le suc gastrique.

Contient 20 p. 100 environ de phosphore, associé intimement aux ions magnésium et calcium en une molécule organique complexe, dans des proportions sensiblement les mêmes que dans les céréales à l'état vivant.

Indications. — Troubles de la croissance, Rachitisme, Lymphatisme, Anémies, Neurasthénie, Tuberculose, Néoplasmes, Convalescences longues et difficiles, Grossesse, Allaitement, Surmenage.

Présentation :

Granulé à 10 o/o : la 1/2 boîte de 55 gr. 10 fr. 65 ; la grande boîte de 110 gr. 19 francs.

Cachets : dosés à 0 gr. 50, la boîte de 24 cachets : 15 francs.

Comprimés : dosés à 0 gr. 25, la boîte de 50 comprimés : 16 francs.

Poudre pure : le flacon de 30 gr. : 26 fr. 65.

Posologie. — *Poudre* (formules magistrales) : 0 gr. 50 à 2 gr. par jour ou 2 à 8 mesures de 0 gr. 25.

Comprimés { *Enfants* : 2 à 4 par jour.
 Adultes : 4 à 8 par jour.

Cachets : 2 à 4 par jour.

Granulé { *Bébés* : demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Enfants : 2 Cuillerées à café par jour.

Adultes : 4 cuillerées à café par jour.

Se prend de préférence avant les repas.

Laboratoires **BOYER et Cie**
18, rue de la Perle — PARIS (3^e).

PHOSCAMINE

Granulé recalcifant hémato-gène,
Activateur de la nutrition.

Principes actifs. — Glycérophosphates de chaux, magnésie, fer et manganèse. Méthylarsinate de soude, acides aminés provenant de l'hydrolyse des hématies.

Indications. — Anémie, Convalescence, Tuberculose, Néoplasmes, Dyspepsie, Retard de développement et de croissance.

Doses :

Adultes : 2 cuillerées à café avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant chaque repas.

Prix : 15 fr. 25.

Laboratoire **MAUCHANT**
à GENNEVILLIERS (Seine).
(Tél. : Grésillons 05-21.)

PHOSMA

Puissant reconstituant général

Composition :

Acide phosphorique off.....	1 gr.
Chlorure de magnésium pur.....	1,20
Teinture de noix vomique.....	0,05
Teinture de cannelle	0,50
Teinture d'écorce d'oranges amères.....	1 gr.
Carbonate de lithine	0,005

Pour 100 gr.

Indications thérapeutiques. — Anémie, Asthénie, Chlorose, Surmenage, Croissance, Convalescence, Inappétence, Stimulant du Système nerveux.

Avantages. — Bien toléré par les hépatiques et les tuberculeux. Saveur très agréable.

Présentation. — Forme Elixir, flacon de 310 cc., de 10 à 20 jours de traitement. Prix : 19 francs.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant ou pendant les repas, pur ou coupé d'eau.

Enfants (à partir de 5 ans) : 1 à 2 cuillerées à café avant ou pendant les repas, coupé d'eau.

Laboratoires PHOSMA

Marcel FREMONT, Docteur en médecine de la Faculté de Bordeaux. — Pharmacien de première classe,
47, rue Maleret — BORDEAUX.

PHOSOFORME

Principes actifs. — Esters éthylphosphoriques.

Bibliographie : Prof. Bégouin, Bordeaux ; Prof. Bing, Bâle ; Prof. Cavalié, Bordeaux ; Prof. Escat, Toulouse ; Prof. Gérard, Lille ; Prof. Jeanbrau, Montpellier ; Prof. Laignel-Lavastine, Paris ; Mercadal y Peyri, Barcelone ; Prof. Papin, Bordeaux ; Prof. Rémond, Toulouse ; Prof. Spillmann, doyen Faculté Nancy, etc.

Indications. — *Correcteur des troubles de la nutrition*. Dyspepsies, États alcalosiques (dermatoses, asthme, etc.), Déminéralisation (décalcification, rachitisme, phosphaturie, carie dentaire), insuffisances hépatiques, colibacilliose, rhumatisme chronique.

Tonique général et nerveux. Neurasthénies, Convalescences, Fatigues cérébrale et musculaire, Anémie, anorexie, tuberculose.

Mode d'emploi. — *Solution et solution arsénée* : 2 cuillerées à soupe par jour, chaque dose diluée dans un grand verre de la boisson habituelle (eau, vin, etc.), sucrée de préférence, et absorbée au cours des repas.

Gouttes : 6 gouttes midi et soir, prises comme ci-dessus.

Prix :

25 fr. le flacon 375 cc. ; 15 fr. le 1/2 flacon 187 cc. ; 25 fr. le flacon-gouttes 45 cc. ; 48 fr. le flacon-gouttes 90 cc.

Durée : 12 à 15 jours.

Laboratoires DROUET et PLET
RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).
(Tél. : 32.)

PHOSOL

(Forme Élixir et forme Granulé)

PHOSOL ÉLIXIR

Composition. — Acide phosphorique officinal, Glycérophosphate de soude, Teinture de noix vomique, Extrait de ratanhia, Phosphate bicalcique, Vin kola muscat, Excip.

Indications. — Suralimentation, convalescence, croissance et anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — Dans un grand verre d'eau ou de vin : 2 cuillerées à soupe par jour pour les adultes ; pour les enfants 2 cuillerées à café. A ne pas donner aux enfants au-dessous de 9 ans.

PHOSOL GRANULÉ

Composition. — Sulfate manganèse, Acide phosphorique, Hypo phosphite de chaux, Extrait quinquina, Extrait kola, Alc. oranges douces, Cacao, sucre vanillé.

Indications. — Suralimentation, convalescence, anémie, surmenage, neurasthénie, amaigrissement, affaiblissement général.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert à chaque repas.
Enfants : 1 cuillerée à café à chaque repas.

Prix : Elixir 16 fr. 30.

Granulé 15 fr. 30.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Laboratoire QUINET

143, rue du Temple — PARIS. (Tél. : Archives 42-27.)

PHOSO-MAGNÉSIUM

Calci que vitaminé D

Du D^r J.-P. CLARY.

Composition. — Composé nettement défini de phosphate double de magnésium et de calcium, additionné de 2 centièmes de milligramme de vitamine D cristallisée par 10 gr. de granulé.

Indications. — Toutes celles du phosphore, du calcium et du magnésium. Reconstituant osseux et nervin par excellence. Tonique général. Entièrement assimilable. Dépourvu de toute toxicité.

Posologie. — *Adulte* : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour, 10 jours par mois.

Enfant de 5 à 10 ans : 2 à 3 cuillerées à café.

Jusqu'à 5 ans : 1 à 2 cuillerées à café et moitié de cette dose chez le nourrisson.

Prix de la boîte : 20 francs.

Laboratoire du Docteur J.-P. CLARY

72, avenue Kléber — PARIS.

PHOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Phosphate de Créosote chimiquement pur, stable et complètement assimilable.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique, modificateur direct des lésions, antioxygène (met obstacle aux phénomènes d'autoxydation). Grand pouvoir asséchant. Tonifie l'organisme.

Indications. — Bronchite aiguë et chronique, broncho-pneumonie, grippe, prétuberculose, tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — 1° Injections intramusculaires profondes de 1 cc. tous les jours (ou 2 cc. tous les 2 jours, ou 3 cc. tous les 3 jours), par cures de 21 jours suivies de 9 jours de repos ; 2° Suppositoires dosés à 0 cc. 5 : 2 par jour. S'abstenir de recourir simultanément à la médication arsenicale.

Prix :

1 cc. : 20 fr. 65 — 2 cc. : 24 fr. 50 — 3 cc. : 27 fr. 05.
Supp. : 20.65.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

PHOSPHAN CADUCIA

Acidifiant. Sthénique. Recalcifiant.

Première utilisation des acides organiques mono et diméthylphosphoriques.

En solution stable et contrôlée par une nouvelle technique de dosage. (*Bulletin de la Société Chimique*, t. XIX, 1898, page 883 ; *Journal de Pharmacie et de Chimie*, 8^e série, t. XX, 1934, pages 160 à 167.)

Formule :

Acide diméthylphosphorique.....	2,11	p. 100
Méthylphosphate acide de calcium	2,90	—
Phosphate diacide de calcium	0,49	—
	<hr/>	
	5,50	p. 100

Forme. — Solution.

Avantages :

- Teneur la plus élevée en principe actif : concentration 5,50 p. 100, soit 0 gr. 75 d'acide organique libre par cuiller à soupe.
- Tolérance parfaite pour les muqueuses digestives.
- Utilisation de l'ion calcium ne pouvant se fixer dans les tissus qu'en combinaison phosphorique.
- Action tonique immédiate.

Indications thérapeutiques :

- 1° *Toutes les asthénies* : musculaires, nerveuses et psychiques.
- 2° *Tous les états de déminéralisation* : phosphaturie, grossesse, pré tuberculose et tuberculose.
- 3° *Tous les états alcalosiques.*
- 4° *Rhumatisme, dyspepsies, asthme, diabète.*
- 5° *Coli-Bacillose et syndrome entéro-rénal.*

Posologie :

Une semaine de traitement alternée avec une semaine de repos.

Adultes : 2 cuillerées à dessert ou à soupe par jour. Chaque cuillerée consommée midi et soir, au cours du repas, dans un grand verre d'eau rougie ou sucrée.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 23 fr. 50.

1 flacon pour 2 semaines de traitement.

Laboratoires CADUCIA

Y. Jund, Docteur en pharmacie,
78, avenue Schneider — CLAMART (Seine).

(Tél. : Michelet 33-78)

PHOSPHARSOL

Composition. — Préparation phosphoarséniée organique combinée à la strychnine. Correspondant à 2 mgr. cacodylate de strychnine et 15 cgr. glycérophosphate par tablette.

Indications thérapeutiques. — Reconstituant général dans l'anémie, la neurasthénie, l'impuissance, la tuberculose, etc.

Doses et mode d'emploi. — De 2 à 4 tablettes, en progressant, à chacun des deux principaux repas. *Ne pas dépasser la dose de 8 comprimés par jour.*

Prix en France : 15 fr. 60 la boîte.

Dépôt général pour le gros :

Laboratoires RICARDOU

Docteur en Pharmacie

46, rue Pierre-Charron — PARIS (VIII^e).

PHOSPHATE DE CHAUX DU DOCTEUR PINARD

Phosphate tricalcique extrait directement des os
en particules infinitésimales
en suspension dans un liquide isotonique.

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 à 4 cuillerées à potage.

Enfants et Nourrissons : 2 à 4 cuillerées à dessert.

Prix : 15 francs le flacon pour 10 jours de traitement.

PHOSPHATE DE CHAUX IRRADIÉ DU DOCTEUR PINARD

Phosphate de Chaux simple du Docteur Pinard
et « Vitamine D » cristallisée.

(750 unités internationales par cuillerée à potage)

Doses quotidiennes :

Adultes : 2 cuillerées potage. *Adolescents :* 2 cuillerées à dessert. *Enfants :* 2 cuillerées à café.

Prix : 20 fr. 80 le flacon pour 10 jours de traitement.

90, boulevard Saint-Denis — COURBEVOIE-PARIS (Seine).

(Tél. : Défense 02-69.)

PHOSPHIGEM

Réalise sous forme de granulés fondants d'un goût très agréable, en combinaison stable et inaltérable, la formule de Joulie :

Acide orthophosphorique	50 gr.
Phosphate acide de soude.....	100 —
Granulés fondants, Q. S	1 000 —

Propriétés et indications. — Tonique général et nerveux, reminéralisateur, correcteur des troubles de la nutrition, le Phosphigem est indiqué dans :

Neurasthénie, Impuissance, Anémie, Anorexie, Convalescence, Déminéralisation, Etats Alcalosiques et leurs manifestations : Dermatoses, Rhumatisme chronique, Dyspepsies, Phosphaturie, Lithiase phosphaturique, Congestion hépatique.

Présentation. — Granulés d'un goût exquis, en boîte métal. (150 gr. environ)

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe après les repas.

Enfants et vieillards : 1/2 dose.

Innocuité absolue, aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des médicaments sous le n° 1244-4.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Central 01-35.)

PHOSPHOBIASE LANDON

Composition. — Acide phosphorique, phosphate de soude, jus de raisin concentré et sucré. Combinaison particulièrement agréable au goût. Une cuillerée à soupe du médicament contient 1 gr. acide phosphorique et 2 gr. phosphate de soude.

Propriétés. — Tonique général. Correcteur des états d'alcalose.

Indications. — Asthénie, Surmenage, Déminéralisation, Troubles de la croissance, Alcalose, Colibacillose.

Posologie. — *Adultes* : une cuillerée à soupe ou deux à chaque repas.

Enfants : une à trois cuillerées à café à chaque repas.

Mode d'emploi. — Le médicament ne doit pas être absorbé pur, mais dilué dans un verre d'eau qui sera pris au cours du repas.

Prix au public :

Le flacon P. M. : 17 fr. 50.

Le flacon G. M. : 27 fr. 50.

La Phosphobiase se fait également en granulé au prix de 17 fr. 50 le flacon.

Laboratoire Central de CHATEL-GUYON

M. LANDON, Pharmacien

CHATEL-GUYON (Puy-de-Dôme).

PHOSPHOBIOL

Forme. — Solution aromatisée au sirop de curaçao et de citron.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Chlorh. quinine	0,05
Hypoph. de Manganèse	0,05
Hypoph. de chaux	0,05
Citrate de fer	0,025
Sulf. de strychnine	0,001

Propriétés thérapeutiques. — Puissant reconstituant général, Accélérateur de la nutrition. Favorise l'augmentation de poids et provoque l'appétit.

Indications. — Toutes dépressions organiques : Croissance, Anémies, Surmenage, Neurasthénie, Convalescences, etc...

Mode d'emploi. — Dose moyenne : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau deux fois par jour au début des repas.

Prix : 18 fr. 25. — Durée du traitement : 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

PHOSPHOBROM

Composition. — Bromure, Phosphate, Citrate alcalin.

Forme. — Granulé fondant soluble, de goût agréable.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour. *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Indications thérapeutiques. — Névropathie. — Fatigues nerveuses. — Neuroarthritisme. — Insomnies. — Palpitations des fausses cardiopathies. — Convulsions de l'enfance. — Dyspepsies nerveuses. — Aérophagie. — Menstrues douloureuses. — Vomissements incoercibles de la grossesse.

Prix : 15 fr. 25.

Laboratoire SERINDAT

4, rue Lecomte-de-Nouy — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 53-48.)

PHOSPHO-FLUOR BEYNET

Reconstituant général aux phosphates organiques fluorés contenant aussi de la magnésie, du fer, de la silice dans les proportions où on les trouve dans l'économie.

Forme. — Granulé, cachets, comprimés.

Indications. — Différentes tuberculoses, rachitisme, ostéites, caries dentaires, grossesse, allaitement, anémie, convalescence, surmenage nerveux, phosphaturie.

Dose et mode d'emploi. — Granulé : *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à café par jour, pur ou dans un liquide.

Enfants de 3 à 10 ans : 1/2 dose.

Nourrissons : une pincée dans la bouillie.

Cachets ou comprimés : 2 à 4 par jour ; *enfants* 1/2 dose.

Chaque cuillerée à café de granulé, chaque cachet ou comprimé contient 0 gr. 50 de principe actif.

Prix actuel : 13 fr. 05.

Envoi d'échantillons sur demande adressée à la

Pharmacie SEGUIN

165 rue Saint-Honoré — PARIS.

PHOSPHOGAIACOL MARY

Nature. — A base de sels calciques assimilables, avec addition de sulfogaiacolate de potasse et de nucléinate de manganèse.

Propriétés thérapeutiques. — Modification rapide des sécrétions bronchiques. Disparition de la toux, de l'expectoration, des engorgements ganglionnaires et du lymphatisme.

Forme. — S'emploie sous la forme de granulé très agréable au goût, à la dose de 2 à 3 cuillerées à café.

Prix : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 742-0.

Laboratoire P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie.

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV^e).

PHOSPHOLÉOSE DEMASLES

Succédané de l'huile de foie de morue. Reconstituant physiologique, de goût agréable.

Composition. — **Phospholéose A** : Iode organique, tannin, phosphore, glycéro-arséniate de soude (nouveau sel d'arsenic organique).

Phospholéose B : même composition, mais sans arsenic.

Indications. — Lymphatisme, prétuberculose, anémie, croissance, adénopathies, convalescences.

Présentation. — Une seule forme : liquide.

Posologie. — De 3 ans à 6 ans : une cuillerée à café avant les 2 principaux repas. Au-dessus de cet âge : une cuillerée à soupe avant les 2 principaux repas.

Phospholéose C : Traitement arséno-mercuriel dissimulé associé à l'iodure.

Composition. — Une cuillerée à soupe de **Phospholéose C** contient : 0,01 cgr de Hg + 0,01 cgr. de As + 0,50 cgr. d'iodure + 0,10 cgr. de phosphate.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe. *Enfants* : par cuillerées à café.

Prix : **Phospholéose A et B** : 17 fr. 45. **Phospholéose** 19 fr. 60.

Laboratoires DEMASLES
VIENNE (Isère). (Tél. : 160.)

PHOSPHONEUROL

Un polyphosphate phosphorique
sans excipient ni alcaloïde.

Formule :

Acides éthyl-phosphoriques	22,50
Phosphate de soude	45,00
Biphosphate de chaux	22,50
Glycérophosphate magnésie	10,00
	100 gr.

1° Par sa richesse en acides éthyl-phosphoriques et phosphate de sodium :

Phosphoneurol est donc indiqué :

a. Dans tous les cas de déperdition phosphatée.

Fatigue, surmenage, surtout avec insomnie.

Amaigrissement.

Convalescence de maladies infectieuses ou d'actes opératoires, **Etats de dépression nerveuse** (Neurasthénie, Psychasthénie, etc.)

b. Dans l'arthritisme, les rhumatismes subaigus ou chroniques.

c. Dans toutes les dyspepsies.

d. Dans la **colibacillose**, comme adjuvant de l'urotropine.

2° Par son phosphate de calcium :

a. Dans les troubles de l'ossification (croissance, rachitisme).

b. Dans la cure de la tuberculose en général.

3° Par son phosphate de magnésium :

Dans la cure et la prophylaxie des tumeurs malignes.

Présentation. — Une seule forme : **Gouttes.**

Posologie : { *Adultes* : XV à XXX gouttes.
 { *Adolescents* : X à XX gouttes.
 { *Enfants* : V à X gouttes.

A prendre à l'un des principaux repas (de préférence à celui de midi), dans un verre d'eau sucrée ou de boisson.

Prix : Le flacon (traitement pour un mois) 20 fr.

Laboratoires DEPRUNEAUX

18, rue de Beaune — PARIS (VII^e).

(Tél. : Littré 54-07.)

PHOSPHONINE SOULIÉ

(Solution et Gouttes.)

Composition. — Acide Phosphorique. Biphosphate de Chaux mielleux. Phosphate de Soude.

Indications. — Tonique de la cellule nerveuse centrale et périphérique, régulateur du système sympathico-glandulaire.

Asthénies, Surmenages physique et intellectuel, Convalescences, Anorexies.

Posologie :

Adultes (Prescrire Solution) : 1 cuillerée à café dans un peu d'eau avant chacun des 2 grands repas.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose suivant l'âge.

Nourrissons (Prescrire Gouttes) : 1 goutte par mois d'âge, 2 fois par jour dans un peu d'eau ou dans le lait des biberons.

Laboratoire COLONIAL

21, rue Mouton-Duvernet — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Ségur 77-70.)

PHOSPHOPINAL JUIN

Phosphore colloïdal assimilable en combinaison organique avec la térébenthine du pin.

Indications. — *Reminéralisateur* : Maladies de la nutrition, tuberculose, convalescence, anémie.

Fixateur des sels de chaux. — *Aliment de la cellule nerveuse* : Maladies du système nerveux, dépression mentale, neurasthénie, surmenage, fatigue cérébrale.

Pas de contre-indication.

Formes et doses moyennes.

<i>Capsules</i> : adultes : 4 à 6 par jour.	{	Contenance du
enfants : 2 à 3 par jour.		
<i>Élixir</i> : adultes : 2 cuil. à café par j.	{	Contenance du
enfants : 1 cuil. à café par j.		
<i>Gouttes</i> : adultes : 40 à 60 par jour.	{	Contenance du
enfants : 20 à 30 par jour.		

flacon : 50 capsules.

flacon : 90 grammes.

flacon : 40 grammes.

Ces doses peuvent être doublées sans inconvénient.

LE PHOSPHOPINAL JUIN se prend dans un peu d'eau ou de boisson froide.

Prix : 17 francs.

Nouvelle forme.

Ampoules injectables :

2 cc. adultes : 1 ampoule tous les 2 jours } Contenance de
1 cc. enfants : 1 ampoule tous les 3 jours } chaque boîte : 10 ampoules.

Prix : 22 francs

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos : 121-2, 121-3, 121-5, 121-10.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Marcadet 37-98.)

PHOSPHOSODINE

*Médicament des troubles de la Digestion et de la Nutrition.
Tonique général et nerveux*

Composition :

Cephælis Ipécacuanha Tre. Rac.	4
Croton Eluthéria Teint. Ec.	10
Ac. ortho-phosphorique off.	15
Phosphate disodique pur.	30
Excipient hydro-glycériné.	Q. S. P. 100 cc.

Indications. — Dyspepsie hypochlorhydrique, Atonie gastrique. Fermentations anormales, Lithiases, Phosphaturie, Oxaluries, Colibacilloses, Rhumatismes chroniques, Etats alcalosiques, Dermatoses. Neurasthénie, Fatigue, Convalescences, Etc...

Forme. — Solution concentrée. Le flacon de 125 cc. environ : 17 fr.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un verre de boisson, à boire en mangeant, midi et soir (sauf indication contraire du médecin).

Remarque : Chaque dose doit être prise au cours du repas, diluée dans un grand verre d'eau ou de boisson, sucrée au besoin.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments

Dépôt général :

Laboratoire BORDELAIS
47, rue Maleret — BORDEAUX.

PHOSPHO-STRYCHNAL LONGUET

Composition :

<i>Strychnal</i> (Sulfate d'éthylbétaine de l'acide strychnique	0,005
Acide phosphorique officinal	0,15
Glycérophosphates crist. de NA	0,20
— — CA	0,02
— — K	0,015
— — Mg	0,0025
Chlorure de manganèse.....	0,005

Pour XX gouttes.

Indications. — Action tonique non excitante du Strychnal à faible dose. Action tonique, réacidifiante, anti-dyspeptique de l'acide phosphorique. Action reconstituante des glycéro-phosphates. Action catalytique du manganèse. Anorexie, Asthénie, Convalescences

Forme. — Gouttes.

Posologie :

Adultes : XX à XL gouttes 2 fois par jour dans un peu d'eau sucrée ou non.

Enfants : V à XX gouttes par repas, suivant l'âge.

Prix : 16 fr. 50 (15 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e)

PHOSPHOXYL

voir

FOSFOXYL CARRON

Phosphore colloïdal.

PHOSTHÉNINE LINDEUX

Forme. — Solution concentrée en flacon compte-gouttes.

Composition. — Acide-éther monoéthylorthophosphorique pur, surrénales, hypophyse.

XXX gouttes représentent 0 gr. 50 d'acide orthophosphorique sous la forme la plus assimilable et la plus douce à la muqueuse gastrique (ac. monoéthyl exempt de diéthyl et d'alcool), 0.05 de surrénales et 0.01 d'hypophyse.

Indications. — *Toutes celles de l'acide phosphorique* : colibacillose, asthénie, anémie, anoréxie, neurasthénie, convalescences, maladies fébriles, grippe, tuberculose, dyspepsie, dermatoses, alcalose, sclérose, azotémie, rhumatisme chronique, gravelle, phosphaturie.

Chez la femme, dans la lassitude anormale aux époques de la formation et de la ménopause, pendant la grossesse et après l'accouchement.

Chez l'enfant, dans l'Enurésie et pour remédier aux perturbations du développement et de la croissance, en même temps qu'aux états languissants et apathiques.

Posologie. — 1^o *Adultes* (au-dessus de 16 ans) : à XL gouttes dans un verre d'eau, aux repas, 2 à 3 fois par jour ;

2^o *Enfants* (au-dessous de 16 ans) : II gouttes par année d'âge, 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires LINDEUX

7, avenue des Marronniers — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine).
(Tél. : Tremblay 25-33.)

PHYLLA

Chlorophylle pure solubilisée.

Seul le pigment chlorophyllien pur, isolé et *solubilisé*, est actif et assimilable, contrairement à la chlorophylle des légumes verts, crus ou cuits.

Indications :

Anémies pernicieuses, anémies post-hémorragiques.

Anémies néoplasiques. — (La chlorophylle relève le taux de l'hémoglobine et active les effets de l'opothérapie hépatique.)

Anorexies des nourrissons. — *Anorexies des tuberculeux.* — (La chlorophylle augmente l'appétit sans altérer la muqueuse gastrique.)

Asthénies — *Surmenage* — *Convalescences* (tonique dépourvu de toute toxicité).

Hypotensions artérielles (Idiopathique, permanente, symptomatique).

Acrocyanoses (adynamie circulatoire).

Adynamie des Cancéreux et des Tuberculeux.

Hypotrophies — *Rachitisme* — *Carences solaires.* [La chlorophylle sensibilise l'organisme aux radiations (X et U, V.) et à l'action des médicaments irradiés.]

Posologie :

XX à XXX gouttes avant les trois repas, 15 jours par mois.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, Bd. de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

PHYSIOSCYAMINE

Médication du vague et du sympathique.

Composition. — Combinaison définie d'atropine, d'hyoscyamine et d'ésérine activée par la présence de pepsine spécialement préparée, unie à un excipient approprié.

Indications. — Troubles nerveux ressortissants à la dyspepsie hyperchlorhydrique, à la dilatation et à la ptose gastrique, tel que : vertiges, congestions postprandiales, migraines gastriques, palpitations de cœur d'origine digestive, tremblements, somnolence, bâillements, constipation d'origine sympathique, etc...

Posologie. — Un cachet 10 à 15 minutes avant les trois repas.

Présentation. — Boîte de 30 cachets. Prix de la boîte : 16 francs.

Dépôt général :

Laboratoires BORDELAIS

47, rue Maleret — BORDEAUX. — (Tél. : 843-22.)

PHYSIOSTHÉNINE

Admise dans les Hôpitaux de Paris.

Toutes infections graves.

Indications. — Angines, Broncho-pneumonies, Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Fièvre puerpérale, Gripes, Pleurésies, Septicémies. Injections intramusculaires, région rétro-trochanterienne au point de Barthélemy. Pas de réaction sérique. Pas de phénomène de choc. Toxicité nulle.

Formes. — *Adultes* : boîte 4 ampoules 20 cc.

Prix : 54 fr. 55.

Enfants : boîte 4 ampoules 10 cc.

Prix : 54 francs.

NÉO-PHYSIO

Infections de moyenne intensité.

(Voir lettre N.)

Laboratoires DROUET et PLET

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

(Tél. : 32.)

PHYTINE

nosito-hexaphosphate de chaux et de magnésie.

CIBA

TONIQUE, RECONSTITUANT, DYNAMOGÉNIQUE.

Phosphore organique végétal 22 p. 100.

Calcium 12 p. 100. Magnésium 1,50 p. 100.

Préparation phosphorée extraite des graines végétales. Le plus riche et le plus assimilable des médicaments phosphorés.

Indications. — Neurasthénie, Névroses, Surmenage sous toutes ses formes, Tuberculose, Chlorose, Anémie, Anorexie, Convalescences, Troubles de la grossesse et de la lactation, etc.

Doses. — *Adultes* : 2 à 4 cachets ou cuillerées à café de granulé, 4 à 8 comprimés. *Enfants* : 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte.

Formuler. — Boîte de 20 cachets.

Flacon de 40 comprimés.

Flacon de granulé.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

PHYTOCHOLINE

La Phytocholine double la Cholérèse.

Puissant cholérétique à base de **Curcuma Xanthorriza**.

Composition. — Poudre et extrait de *Curcuma Xanthorriza*, extraits d'orthosiphon, de *Berberis*, de *Combretum*.

Propriétés. — *Double la Cholérèse*. Puissant diurétique, Cholestérolitique.

Indications. — Dans tous les cas où il convient de recourir à une médication à la fois *Cholérétique et Diurétique*.

1° Insuffisances hépatiques, ictères, angiocholite, lithiase biliaire, cholécystite, cholémie, foie colonial ;

2° Urémie et états hyperazotémiques, hypercholestérolémie (cellulites), affections de la peau d'origine hépatique (urticaire, prurit, herpès). Aucune contre-indication. Aucune accoutumance.

Posologie. — *Enfants* (à partir de 6 ans) : de 1 à 2 dragées par jour au moment des repas.

Adultes : de 2 à 4 dragées par jour, au moment des repas.

La Phytocholine existe uniquement en flacons de 40 dragées.

Prix : 20 francs.

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, Successeurs

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Nord 54-57.)

PHYTOCUPRINE

Composition. — Association de chlorophylle, sulfate de cuivre et hexainositolphosphate de calcium et de magnésium.

Indications. — Thérapeutique anti-anémique. Maladies du sang et toutes les complications consécutives à l'hypoglobulie et à l'homoglobulinémie. Maladies de la nutrition.

Présentation. — Dragées, ampoules buvables.

Posologie :

Dose moyenne : 6 dragées par 24 heures.

Cas graves : 9 dragées par jour, 3 avant chaque repas.

Prix : 20 fr. 40 le tube.

Laboratoire du MÉTACUPROL

5 bis, rue Pajou — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jas. 54-52.)

PHYTOGÉNOL GRANULÉ

Spécifique des maladies de la Nutrition.

Formule du Phytogénol (par 100 gr. de granulé entièrement soluble):
Méthylarsnate disodique : 0 gr. 20 ; Nucléinate de Manganèse : 0 gr. 25 ; inosito-phosphate de Calcium et de Magnésium : 1 gr. 25 ; Gluconate de Calcium : 2 gr. 50 ; Hémoglobine crist. : 5 gr. ; Extrait de Surrénale totale : 0 gr. 80 ; Extrait de glandes interstitielles : 1 gr. 25 ; Extrait mou de Kola : 2 gr. 50.

Indications thérapeutiques :

Toutes formes de fatigue : surmenage, asthénie nerveuse, dépression physique et intellectuelle.

Usure organique : sénilité, ralentissement fonctionnel des glandes vitales.

Troubles de croissance : rachitisme, chlorose, anémie.

Troubles de ménopause : psychoses génitales qui accompagnent la période cataméniale. Prétuberculose, déminéralisation, fractures, caries osseuse et dentaire. Grossesse. Convalescences post-hémorragiques et infectieuses.

Doses journalières :

Adultes : 1 cuillerée à dessert, pur ou dissous dans de l'eau au début des 3 repas. *Enfants (4 à 8 ans)* : 1/2 cuillerée à café.

Jeunes gens (8 à 16 ans) : 1 cuillerée à café aux mêmes heures.

Prix : 17 fr. 50 — Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoires F. MARIOTTE, 15, rue Pasteur — BOURG (Ain).

Dépôt : O. C. P., C. N. P. F. et toutes drogueries.

N. B. — Enregistré au L. N. C. M., sous le N° 1637-1.

PHYTOGYL

Granulé reminéralisateur.

Vitamine D₂ cristallisée chimiquement pure, associée à la Germiné (phosphore, chaux, magnésium), d'origine végétale et assimilable.

Indications. — Toutes décalcifications : Anémies, Convalescence, Surmenage, Dépressions nerveuses, États ganglionnaires, Prétuberculose, Stimulant de la nutrition.

Présentation. — Granulé fondant au premier contact avec la muqueuse buccale, en tube de 125 gr.

1 cuillerée à café contient 1/5° de mgr. de vitamine D₂ cristallisée à 10 cgr. de Germiné.

Doses journalières :

De la naissance à 1 an : Jusqu'à 1 cuillerée à café.

De 1 à 10 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : 2 à 3 cuillerées à café.

La cure peut être continuée pendant 2 ou 3 mois ; si elle a été interrompue, elle peut ensuite être reprise sans aucun inconvénient.

Prix au public : Le tube, 19 fr. 05.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littré 58-43.)

PHYTOJAVA

Composition. — Extrait de *Temœ Lawaq* (*Curcuma xanthorrhiza*) associé à l'*Orthosiphon stamineus* (plantes originaires de Java).

Indications. — Le *Temœ Lawaq*, cholérétique, augmente la sécrétion de la bile sans provoquer de spasmes ni de coliques.

L'*Orthosiphon*, diurétique hépato-rénal favorise l'excrétion de l'urée et des chlorures.

(D^r Leclerc, *Presse médicale*, 9 nov. 1935; *Courrier médical*, 30 mai 1935; *J^{al} Méd. et Chir. pratiques*, mars 1937.)

(D^r Decaux, *Presse médicale*, 22 mai 1935; *Communication Société thérapeutique*, janv. 1936.)

Ictères, Cholécystites, Congestion du foie, Cholestérinémie.

Formes. — Comprimés dragéifiés. Gouttes.

Posologie. — 1 à 2 comprimés avant chaque repas. X à XXX gouttes avant chaque repas.

Enfants : gouttes 1/2 dose.

Prix : 16 francs (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PHYTO-KOLA

Toni-stimulant complet. Association de phosphore organique d'origine végétale Hexa-inosito phosphate de calcium et de magnésium, *Suractivée* par les Noix fraîches de Kola.

Propriétés et indications thérapeutiques. — Reminéralisateur, excitant puissant du métabolisme, Stimulant de l'activité cérébrale, donnant des résultats rapides et très constants, dans toutes les déficiences organiques, toutes les convalescences : médicales, chirurgicales, obstétricales.

Toutes les dépressions : Anémie, Surmenage, Asthénie, Psychasthénie.

Présentation. — Boîte de 60 comprimés en trois tubes.

Posologie. — Croquer 4 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Innocuité absolue. Aucune contre-indication.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n^o 1244-2.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteur en Pharmacie, Docteur en Médecine,
38, rue du Louvre — PARIS (I^{er}).

(Tél. : Central 01-35.)

PHYTOLAX

Laxatif-cholagogue végétal.

Stimulant des fonctions hépatiques et intestinales. A base d'extraits de végétaux, rigoureusement exempt de phénolphtaléine et de laxatifs chimiques.

Composition. — Artichaut, Cascara, Podophylle, Bourdaine, Hydroxyde d'alumine colloïdal.

Avantages. — Evacuation rapide et totale sans colique et sans irritation surajoutée.

Apport d'hydroxyde d'alumine colloïdal qui tapisse la muqueuse sensible d'un véritable pansement mucilagineux doux et protecteur.

Posologie. — 1 à 3 comprimés par 24 heures pris *ad libitum*.

Prix : 9 fr. 05

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

PHYTOSPLÉNOL PLÉ

Synergie opothérapique et minérale : lipoides spléniques, poudres de thymus, moelle osseuse rouge, surrénales, parathyroïdes, d'os frais, Nucléinate de fer et de manganèse, composé phosphoré organique végétal et Vitamine A stabilisée.

Propriétés. — A tous les âges relève le tonus neuro-végétatif, active les échanges, reminéralise, favorise la croissance staturale et pondérale.

Indications. — Asthénies, Allaitement, Amaigrissement, Anorexie, Convalescences, Croissance, Déminéralisation, Dentition, Grossesse, Fractures, Rachitisme et pré-rachitisme, Spasmophilie.

Présentation. — En granulés aromatisés (150 grammes) et en dragées également aromatisées (50 dragées).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments (Fac. Pharm.) sous les n^{os} 82-7 et 82-8.

Posologie. — Prescrire avant ou au cours de deux repas journaliers :
Nourrissons : 1 cuiller à café de granulé.

Enfants : 2 cuillers à café de granulé ou 2 dragées.

Adolescents et adultes : 3 cuillers à café de granulé ou 3 dragées.

Prix : 19 fr. 90.

Laboratoires J. PLÉ

Docteur en Pharmacie.

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3^e).

PHYTOTHÉRAPIE COLONIALE

Thé Malgache ou Voafotsi.

Toutes les affections du foie.

Uvarion.

Mélange de **Uvaria** et maté,
en macération pour
vin neurotonique et apéritif.

Littérature et échantillons :

Angelini,

Pharmacien de la Faculté de Paris.

61, rue de Seine — PARIS.

(Tél. : Dan. 92-73.)

PHYTOVEINOL

(Gouttes.)

Formule entièrement originale, exclusivement végétale,
très bien supportée par les voies digestives.

Composition. — Ficaire (vaso-constricteur), Berberis
(veino-tonique), Millefeuille (astringent), Gossypium
(décongestionnant).

Indications. — Insuffisance veineuse dans ses diverses
manifestations, Hémorroïdes, Varices, Phlébites,
Etats congestifs de la ménopause.

Mode d'emploi :

XXV gouttes au début des deux principaux repas.

Traitement d'entretien : 20 jours par mois (soit un
flacon).

Prix : 16 fr. 65.

Suspendre cette médication au moment des règles.

Pharmacie ROGÉ-CAVAILLÈS

M. LAOHARTRE, Docteur en Pharmacie,
Successeur.

116, boulevard Haussmann — PARIS (VIII°).

(Tél. : Laborde 12-35.)

PHYTO-VITAMINES PLÉ

Solution non huileuse des vitamines A et D étalonnées à l'état colloïdal associées aux vitamines B, à la chlorophylle pure, soluble, d'action vitaminique semblable à la vitamine C, et aux acides aminés.

Propriétés. — Haute activité vitaminique en synergie. Aucune toxicité. Est miscible directement à l'eau. Saveur agréable.

Indications. — A titre prophylactique : chez les enfants en fin d'hiver et au printemps, régimes alimentaires, femmes enceintes et allaitantes, nourrissons ; à titre curatif : comme adjuvant aux traitements anti-infectieux, le lymphatisme, les anémies, états ganglionnaires, chez les prématurés et les athrepsiques ou hypotrophiques, les troubles du métabolisme phospho-calcique.

Présentation. — Liquide aqueux d'emploi aisé avec son « Compte-gouttes Doseur ». Une dose = XX gouttes.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 82-9.

Posologie : Avant les deux repas :

Nourrissons : 1 dose. **Enfants :** 2 doses. **Adolescents et Adultes :** 3 doses.

Prix : 19 fr. 60.

Littérature et échantillons aux

Laboratoires J. PLÉ, Docteur en Pharmacie

111 bis, rue de Turenne — PARIS (3°).

(Tél. : Archives 83-52.)

PICRICOL

Réparateur des tissus.

Antiseptique, Kératoplastique, Lénifiant.

Composition. — Acide Picrique (0 gr. 06 par c.), Sulfate de Zinc-Amidon.

En comprimés parfumés, très solubles (usage externe).

Indications. — Cicatrisation des plaies et muqueuses.

Plaies chirurgicales. — Lavages, pansements, 2 à 3 comprimés par litre.

Gynécologie. — Hygiène et traitement des affections vaginales, Vulvite, Infections gonococciques, Pertes blanches, Sécrétions fétides, Métrites du col avec ou sans ulcérations, Métrites en général, Salpingites, Ovarites.

Injectons (4 à 5 comprimés pour 2 litres d'eau).

Plaies accidentelles. — Coupures douloureuses et souillées, brûlures (2 à 4 comprimés par litre).

Gargarismes antiseptiques et cicatrisants.

Emploi. — Faire dissoudre les comprimés dans l'eau bouillie chaude, utiliser la solution atténuée.

Pas de réactions douloureuses. — Pas d'irritations.

Action sédative très réelle.

Remarque. — Le borax fait disparaître facilement les taches de Picricol.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-15.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

PILULES DU D^r DEBOUZY

Opothérapie biliaire.

Pilules de 0 gr. 20, extrait total de bile sélectionnée, stérilisée et boldine.

Ne renfermant aucun drastique ni laxatif.

Affections hépatiques. Lithiase biliaire. Insuffisance hépatique. Entéro-colite.

Dose. — 4 à 8 pilules par jour, prises aux repas.

Durée moyenne : 25 jours.

Le flacon de 100 pilules : 17 francs.

— 50 — 9 fr. 35.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

PILULES DU D^r MOUSTIER

Formule :

Digitale stabilisée.....	0 gr. 05
Scille stabilisée.....	0 gr. 05
Scammonée d'Alep.....	0 gr. 05
Gentiane pulvérisée.....	0 gr. 02
par pilule,	

Indications :

Toutes les *affections cardiaques* pour lesquelles la digitale est recommandée : asystolie, accidents gravido-cardiaques, œdèmes dus à l'insuffisance cardiaque.

Toutes les contre-indications de la digitale.

Présentation :

Originale : sous forme de *grain de café sucré*, rendant son emploi commode et agréable, *inaltérable* de par sa fabrication ; enrobage dragéifié, de conservation indéfinie.

Posologie, durée du traitement : 1 ou 2 pilules matin et soir, suivant les cas, **10 ou 15 jours par mois**.

Prix de vente au public : 20 francs le flacon de 50 pilules.

Enregistré au L. N. C. n° 270-1.

Laboratoires du D^r MOUSTIER,

 SAINT-VALLIER (Drôme). — Tél. : 10.

PILULES HÉLÉNIENNES NAUD

Composition. — A base d'Hélénine cristallisée, protoxalate ferreux et quassine.

Indications. — D'après les essais cliniques les plus récents (thèse du D^r E. PARIZOT), l'*Hélénine* constitue le spécifique par excellence de la Leucorrhée, sans lésions anatomiques.

Mode d'emploi. — Sauf indication contraire du médecin, 4 à 8 pilules par jour aux repas.

Échantillon et littérature sur demande.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires LACROIX

MEROBIAN et FILS, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Nord 54-57.)

PILULES LEMARY

Ces pilules kératinisées suivant le procédé du D^r Henri Philippe constituent un traitement mercuriel discret très tolérable et efficace.

Indications. — Traitement d'entretien (malades éloignés des centres médicaux) très utile pour le praticien dans les affections douteuses ou réelles d'origine spécifique (cœur, yeux, système nerveux), pour les organismes usés supportant mal les traitements d'attaque.

Formule A. — Dupuytren du Codex. Bichlorure de mercure à 0,01 cgr. : 17 fr.

Formule B. — Ricord du Codex. Iodure mercurieux à 0,05 cgr. : 17 fr.

Formule C. — Bi-iodure Hg 0,005 mgr. et Ki à 0,25 cgr. (formule de Gibert) : 19 francs.

A et B : 2 à 4 pilules par jour.

C : 2 pilules par jour (avant chaque repas).

Le flacon porte une étiquette discrète.

Produits du Docteur Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULES MYOSOTIS

Molles

Composition :

Bichlorure de Hg	0,005
Poudre d'opium	0,005
Poudre fraîche de coca	0,15
Extrait de gentiane	0,04

Indications. — Traitement mercuriel *per os* suivant technique adoptée par le Dr Vernes.

Emploi :

1^{re} semaine : 1 pilule par jour au repas du midi.

2^e semaine : 2 pilules par jour aux repas : midi et soir.

3^e semaine : 3 pilules par jour aux repas : matin, midi et soir.

4^e et 5^e semaines : 4 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 1 soir.

6^e et 7^e semaines : 5 pilules aux repas : 1 matin, 2 midi, 2 soir.

8^e et 9^e semaines : 6 pilules aux repas : 2 matin, 2 midi, 2 soir.

En cas d'intolérance, redescendre à la dose immédiatement inférieure.

Prix : Flacon de 40 pilules. 10 fr. 85.

Laboratoires NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e). (Tél. : Laborde 08-00.)

PILULES PHILIPPE

Kératinisées.

Iodure de Potassium (KI) à 0,10-0,20-0,50 ..	19 fr.	»
Iodure de Sodium (NaI) à 0,10-0,20-0,50.....	19 fr.	»
Iodure de Lithium, 0,25.....	22 fr.	»
Philippe Harlem (Voir <i>Harlem Philippe</i>)....	17 fr.	»
Philippe Pancréatine (Voir <i>Pancréatine Philippe</i>)	17 fr.	»
Kérasalicyl, salicylate 0,50 (Voir <i>Kérasalicyl</i>)	17 fr.	»
Kéraspirine, aspirine kératinisée, 0, 25-0,50 ..	9 fr.	85
Pilules Lémery (Voir <i>Pilules Lémery</i>).		
Pilules Philippe Dupuytren (Codex)	17 fr.	»
— — Ricord (Codex).....	17 fr.	»
— — (Bi-iodure HgKI	19 fr.	»
Antidote Malaria, Quinine, Extrait biliaire,		
Méthylarsinate disodique, Oxalate de fer...	19 fr	»

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

PILULE V.-E. DOUMER

Formule :

Chaque pilule contient 5 cgr. de bleu de méthylène *chimiquement pur*.

Doses :

De 3 à 8 pilules par jour, suivant les cas, espacées dans la journée.

Indications :

Affections des voies urinaires, entérite bacillaire, paludisme, fièvre de Malte, grippe, angine de poitrine, sciatique, rhumatismes, etc.

Laboratoires BOMEL
ANNONAY (Ardèche) — France.

PINEOLEUM

Composition. — *Forme simple* : Eucalyptus, Pin Pumilionis, Cannelle, Camphre, Menthol, Huile de Paraffine pure.

Forme éphédrinée : même formule + éphédrine.

Propriétés. — Antiseptique spécifique des affections rhino-pharyngées.

Formes. — *Pulvérisateur* vendu garni de PINEOLEUM.

Applicateur avec compte-gouttes spécial. *Grand flacon* pour recharger le pulvérisateur ou l'applicateur.

Important. — Chacune de ces trois formes existe en deux formules :

Simple ou *éphédrinée*.

Prix :	{	Pulvérisateur garni.	23 fr. 85	} Simple ou éphédrinée.
		Applicateur	14 fr. 90	
		Grand flacon	21 fr. 20	

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
Tél. : Charlebourg 39-70.

PIORÉFAGINE

Technique et formules de Ch. Hulin.

Traitement rationnel des Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites, Suppuration, Douleur, Congestions gingivales, Angines, Muguet.

Auto-traitement.

Onguent Pioréfagine (pâte). Le tube	15 fr. 60
Topique — (élixir). Le flacon .	39 fr.
— — (élixir). 1/2 flacon..	20 fr. 80
Pastille — La boîte	6 fr. 90
Anaphylène (pilules). Le flacon	17 fr. 25

Traitement chirurgical.

Fibrogénine injectable. La boîte	46 fr.
— applicable. Le flacon	28 fr. 75
Kératoline (caustique). Le flacon	28 fr. 75
Ulosane (pâte sclérogène). Le tube	17 fr. 25

Laboratoire HYGIO-DONTIS

CROISSY-SUR-SEINE (Seine-et-Oise).

Toutes Pharmacies. — Dépôt général : O. C. P.

PIPÉRAZINE MIDY

Diéthylène Diamine, $\text{NH} \begin{array}{c} \text{CH}^3\text{-CH}^3 \\ \text{CH}^3\text{-CH}^3 \end{array} \text{NH}$, alcalin organique du groupe des Pyridines inscrit au Codex français 1908.

Granulé effervescent, dosé à 0 gr. 20 de PIPÉRAZINE pure par cuillerée à café.

Doses et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour comme préventif ; 4 à 6 cuillerées à café par jour dans les crises aiguës, dissoutes dans un demi-verre d'eau à distance des repas.

Propriétés thérapeutiques. — Dissout 92 p. 100 des composés de l'acide urique : réduit les déchets uratiques en stimulant l'activité hépatique ; antiseptise les urines.

Indications. — Le plus actif des remèdes à prescrire dans toutes les manifestations de l'Arthritisme et de l'Uricémie : Goutte, Rhumatisme, Gravelle, Calculs, Coliques hépatiques et néphrétiques, Sciatique, Artério-Sclérose, Eczéma, Diabète.

Aucune contre-indication, innocuité absolue (cœur, estomac, vaisseaux).

Prix : 21 fr. 25. — **Durée du traitement :** une semaine.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

PIPERITOL

Combinaison nouvelle assurant un drainage parfait de l'organisme par dissolution et élimination de l'acide urique et des urates.

Formule. — *Comprimé blanc.* — Tartrate de pipérazine : 0,075. Benzoate Lithine : 0,075. Masse effervescente Q. S. pour 1 comprimé terminé à 0,50.

Comprimé bis. — Anhydrométhylène citrate hexaméthylène tétramine : 0,075. Condurango pulv. : 0,01. Théobromine : 0,025. Phosphate de soude : 0,05. Masse effervescente Q. S. pour 1 comprimé terminé à 0,50.

Indications. — Anti-arthritique de choix.

Goutte. Rhumatisme. Sciatique. Artériosclérose. Gravelle. Calculs Coliques néphrétiques et biliaires. Eczéma. Diabète.

Toutes les infections hépato-rénales.

Colibacillose. Cholécystite. Pyélite. Blennorrhagie aiguë et chronique, etc.

Hydropsie cardiaque et néphrétique. Néphrite chronique.

Modificateur du terrain dans les maladies héréditaires et acquises.

Posologie. — 1 à 2 comprimés blancs dans un demi-verre d'eau au début des repas du midi et du soir.

1 à 2 comprimés bis dans un demi-verre d'eau à la fin du repas du midi et du soir.

Si nécessaire, il est possible de prendre ensemble les comprimés blancs et bis au début du repas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 2007-1.

Laboratoires QUIRET

21, place du Maréchal-Pétain — BÉTHUNE.

Thérapeutiques de l'eau de mer, que connaissent
les médecins et les pharmaciens.
Maison
de la mer

Si l'eau est plus puissante. On sait que la mer est

PLASMA DE QUINTON

Nom déposé en 1907.

Composition. — Eau de mer puisée dans l'Atlantique, avec des précautions spéciales, en des lieux et à des moments où la pureté de l'eau est parfaite ; transportée à Paris sans délai, ramenée à un degré de concentration saline qui la rend comparable à ce point de vue au sérum du sang, stérilisée sans emploi de l'ébullition ni des agents chimiques, mise en ampoules de verre neutre et inattaquable.

Le Plasma de Quinton (toutes manipulations selon la méthode authentique de R. Quinton) *est l'unique préparation marine du monde entier soumise à un contrôle biologique quotidien qui en garantit l'efficacité et la régularité d'action.*

Bibliographie. — Pour les idées générales relatives à la Méthode marine, 23 p. de références in R. QUINTON : *L'eau de mer, milieu organique*, MASSON, Paris, 1912, 2^e éd. Pour les applications thérapeutiques de l'eau de mer, une centaine de références in JARRICOT : *Le Dispensaire marin*, MASSON, Paris, 1921.

Indications :

Traitement prénatal. Application la plus féconde en beaux résultats et celle qui possède les applications les plus nombreuses. L'Eugénique n'a pas d'arme plus puissante. On sait qu'il a été fondé (D^r ARNULPHI, 1922) une *Ligue du Traitement prénatal*.

Ce traitement a pour objet (et l'expérience montre qu'il a pour résultat) : 1^o de conduire à terme le produit conçu ; 2^o de s'opposer à l'athrepsie et aux états de dénutrition si fréquents chez les héréditaires (tuberculose, syphilis, paludisme) ; 3^o d'améliorer la nutrition de la femme enceinte (disparition constante et rapide des vomissements, même dans les cas les plus sévères).

Entérites des adultes et des grands enfants. Le traitement marin est efficace, quelle que soit la forme affectée par la maladie : colite muco-membraneuse, diarrhée, constipation pure, constipation avec débâcles.

Gastro-entérites des nourrissons. Qu'il s'agisse des formes vulgaires ou de l'entérite aiguë (entérite cholériforme), la guérison est la règle. Le traitement doit être institué sans hésitation, même dans les cas les plus redoutables. Plus le cas est grave, plus l'indication d'agir sans délai est formelle. Il n'existe aucune raison, en aucun cas, de différer le traitement.

Intolérance lactée, Athrepsie. L'amélioration se manifeste dès les premières heures qui suivent la première injection. Quel que soit le retard, l'athrepsie s'accroît immédiatement avec l'intensité maxima, l'accroissement normal du premier mois de la vie, s'il est d'ailleurs nourri et réchauffé comme il se doit.

Maladies de la peau (Acné, Psoriasis, Eczéma, Tuberculoses cutanées) ; **Maladies du Système nerveux** (Névralgies, Enuresis, Algies diverses, Gynalgie, Neurasthénie) ; **Tuberculoses osseuses et ganglionnaires.** Les succès sont habituels, impressionnants parfois de rapidité.

Régimes, doses d'Injections. — Pour tous ces points essentiels au succès de la cure marine par le *Plasma de Quinton*, se reporter aux notices envoyées gracieusement, par retour, à toute demande.

Présentation. — Ampoules de 5, 10, 30, 50, 100, 200, 300 et 500 cc.

Renseignements et littérature (Renseignements oraux à Paris et renseignements par correspondance ; envois de notices sur les applications et la posologie du *Plasma de Quinton* : DISPENSAIRE RENÉ QUINTON, 4, rue de l'Arrivée, Paris (Gare Montparnasse).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 514-60.

Commandes et ordres d'expéditions :

Produits Biologiques CARRION

54, Faubourg-Saint-Honoré — PARIS.

(Tél. : Anjou 36-45 et 46.)

Adresse télégr. Rioncar-Paris-123.

PLASMARINE

Analeptique marin polyminéralisé.

Composition. — Calcium en combinaisons minérale et organique assimilables ; Phosphates et acide phosphorique calco-manganique ; Iode en solution marine ; Manganèse glycérophosphorique assimilable ; éléments en combinaison et solution dans le Plasma Marin naturel isotonique.

Action thérapeutique :

- 1° Réveil immédiat de l'appétit.
 - 2° Reminéralisation intégrale intensive.
 - 3° Action tonique et réparatrice.
 - 4° Action dépurative.
 - 5° Modification favorable du terrain.
- Energique, agréable, atoxique.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe.

Grands enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert.

Petits enfants : 2 à 3 cuillerées à café.

Soit au début, soit à la fin des repas.

Prix : 18 fr. 65.

Laboratoires « LA BIOMARINE »
DIEPPE (Seine-Inférieure). (Tél. : 14-54.)

PLASMOSTHÈNE

Médication sthénique totale des débilités, surmenés physiques et intellectuels.

Formule. — Gouttes :

Méthylarsinate de sodium.....	3 gr. 25
Glycérophosphate de magnésium.....	3 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	3 gr. 50
Cacodylate de fer.....	0 gr. 30
Cacodylate de strychnine.....	0 gr. 05
Acide phosphorique.....	20 gr.
Excipient Q. S. p.....	100 gr.

En flacon compte-gouttes de 45 cc. Prix : 17 fr. 35.

Particularités. — Association synergique complète phosphorique, magnésienne, ferrique en milieu d'eau de mer, associée à la strychnine et au manganèse. Présence des diastases métalliques cuivre et zinc.

Adultes : XX gouttes 2 à 3 fois par jour. } Existe en ampoules.

Enfants : V gouttes 2 fois par jour. } 1 ampoule par jour.

Ampoules : Cacodylate de soude : 0 gr. 15 ; Glycérophosphate de soude : 0 gr. 15 ; Cacodylate de strychnine, 0 gr. 001 ; Fer colloïdal (solution à 5/1000), 0 gr. 075 ; Scurocaïne, 0 gr. 002, pour 2 cc.

Indications. — Tous les états de dépression physique et morale, Anémies, Phosphaturie, Sénilité, Ménopause.

Inscrit au Labor. National de Contrôle :

Plasmosthène gouttes, N° 412-16 — Plasmosthène ampoules, N° 412-15.

Laboratoires du NORMOGASTRYL
J. OLIVE — 14, rue des Minimes — Paris.

PLEXALGINE LALEUF

Composition. — Extraits spéciaux de : muscle strié, myocarde, pancréas, foie et rein, parathyroïde, phényléthylmalonylurée, extraits végétaux (datura, mandragore, jaborandi, lobélie).

Propriétés et indications. — Sédation et suppression des désordres causés par le déséquilibre vaso-sympathique. La **PlexalGINE** agit non seulement sur les effets (algies et spasmes), mais aussi sur les causes (carences métaboliques, spasmophilie).

Spécialement indiquée dans : douleurs précordiales et solaires, aéro-phagie, palpitations, spasmes, angoisses, dysthyroïdie, troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 6 dragées par 24 heures, de préférence en plusieurs prises.

Prix : 20 francs l'étui de 50 dragées (de 10 à 30 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires **LALÉUF**

Georges **DUGUÉ**, Docteur en Pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

PLEXAMINE

Indications. — Sédatif des plexus sympathiques, Douleur des règles, Rhumes des foins, Ulcères gastro-duodénaux, Épigastralgies, Angine de poitrine, Syndrome de Raynaud, Hypertension artérielle. Toutes les algies (Névrites, Zona, etc.).

Composition. — La **Plexamine** est une solution de chlorhydrate d'histidine à 4 p. 100, présentée en boîtes de 6 ampoules de un centicube avec l'aiguille spéciale pour l'injection intradermique.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection intradermique du contenu d'une ampoule chaque jour.

Prix : boîte de 6 amp. : 23 fr. 10, Cure : 6, 12, 18 jrs.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Enregistré au L. N. C. M. — n° 111-5.

Laboratoire **LAURENT-GÉRARD**

40, rue de Bellechasse, 1 et 3, rue Las-Cases
PARIS. (Tél. : Invalides 78-44.)

PLURIBIASE

Indications. — Cholagogue doux. Antisephtique intestinal. États anaphylactiques, Urticairé, Cholécystites, Laxatif léger. Rééducatéur intestinal.

Composition. — Comprimés à 2 noyaux.

Noyau externe.		Noyau interne.	
Pepsine T. 500.....	0,05	Extr. Boldo	0005,
Extr. de Belladone .	0,001	Bile dépigmentée et	
Extr. de Jusquiame.	0,001	décholestérinée ...	0,10
Sucre.....	0,20	Pancréatine T. 200.	0,10
		Poudre de muqueuse	
		intestinale.....	0,20
		Ferments lactiques	
Gluten.....	0,05	concentrés	0,03

Doses. — 2 comprimés avant chaque repas, 20 jours par mois.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV°).
(Tél. : Ségur 69-13.)

PLURINATRYL

Granulé.

Composition. — Benzoate de soude, citrate de soude, hyposulfite de soude, sulfate de soude, phosphate de soude, bicarbonate de Na.

Posologie :

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

En cas de brûlures d'estomac, 1 ou 2 cuillerées à café au moment des douleurs.

Enfants : en général la moitié des doses pour adultes.

Indications. — Insuffisance hépatique, Hyperchlorhydrie, Dyspepsie, Constipation, Anaphylaxie (urticairé, eczéma, migraine, asthme), Hypertension artérielle, Obésité, Arthritisme.

Laboratoire TERRASSE

2, Rond-Point du Centre
LA GARENNE-COLOMBES (Seine.)
(Tél. : Charlebourg 22-84.)

PLURION

Description. — Complexe colloïdal d'arsenic, fer, manganèse et vanadium, isotonique, indolore, non toxique, en ampoules de 2 cc. (8 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le PLURION augmente l'activité des organes hémopoiétiques et fournit aux globules rouges les éléments minéraux nécessaires à leur constitution (fer), à leur accroissement (arsenic) et à leur activité (manganèse et vanadium).

Indications. — 2 ampoules par jour dans les *anémies graves*, 1 ampoule par jour dans les *anémies des convalescents, paludéens, syphilitiques, cancéreux*, 1 ampoule tous les 2 jours dans les cas plus bénins.

Prix : 34 fr. 30 pour 4 à 16 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS

(Tél. : Carnot 18-75.)

PNEUMALCOOL

Solution d'alcool éthylique à 20 p. 100.

Indications. — Toutes les affections pulmonaires aiguës : Pneumonies, Broncho-pneumonies, Abscess du poumon, Pneumonies et Broncho-pneumonies infantiles, Suppurations pulmonaires chroniques.

Technique. — Injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses.

Doses. — De 10 à 50 cc. par jour suivant la gravité. Chez les enfants, maximum : 5 cc. à 6 mois, 10 cc. à un an, 15 à 20 cc. chez les grands enfants.

Boîte de 6 ampoules de 10 cc. :

Laboratoire LAGÜE

63, av. de la Grande-Armée — PARIS (XVI^e).

PNEUMOGÉINE RENARD

Composition. — Iodure double de caféine et de théobromine (chaque cuillerée à café = 0,05 de caféine + 0,10 de théobromine) combiné à 0,08 d'iode combiné et en solution dans un véhicule qui en masque le goût.

Propriétés thérapeutiques. — L'action de l'iode et de la caféine se trouve renforcée et complétée par l'adjonction de la théobromine « le plus fidèle, le plus constant, le plus inoffensif des diurétiques » (Huchard).

La PNEUMOGÉINE, par son action :

régulatrice respiratoire, assure aux poumons le maximum de rendement fonctionnel ;

cardio-tonique, soutient le myocarde défaillant, abaisse la tension artérielle ;

éliminatrice, débarrasse le sang des toxines et des déchets qui y sont accumulés, augmente la diurèse.

Indications. — I. Tous les états dyspnéiques : asthme, emphyseme, bronchite chronique, dyspnées cardio-rénales, dyspnées névropathiques, etc.

II. Syndrome cardio-rénal.

Posologie. — Pendant les crises paroxysmiques, 4 à 8 cuillerées à café par jour. Entre les crises, 2 à 5 cuillerées. À prendre dilué dans de l'eau bien sucrée.

Dragées : 15 fr. 60 — Liquide : 16 fr. 90.

Durée moyenne du flacon : 7 jours.

Enregistré au L. N. C. :

Solution 994-3; Dragées 994-6.

Laboratoires RENARD

35, rue de Paris — CLICHY.

(Tél. : Pereire 14-08.)

PNEUMO-LIPASE

Ampoules injectables.

Médication leucogène nutritive, antituberculeuse surtout.

Composition. — Cholestérol, Ether benzyl-cinnamique, Huile d'olive et de chènevis camphrée, débarrassée de ses acides. Quatre concentrations n^{os} 1, 2, 3, 4.

Mode d'emploi et indications :

INJECTIONS EXTRA-PLEURALES, INTRA-PLEURALES, INTRA-PULMONAIRES : Pleurésies séro-fibrineuses, purulentes. Tuberculoses chroniques, évolutives, fébriles ou non. Asthme. Emphysème.

INJECTIONS INTRA-LARYNGO-TRACHÉALES : Tuberculoses laryngées.

INJECTIONS INTRA-MÉNINGÉES : Tuberculoses méningées.

INJECTIONS INTRA-PÉRITONÉALES : Tuberculoses péritonéales.

INJECTIONS SOUS-CUTANÉES ET INTRA-MUSCULAIRES : Prétuberculoses, anémies, convalescences post-opératoires, surmenage, infections grippales, bronchites chroniques, infections urinaires, (prostatites, etc.).

Littérature et échantillons sur demande:

Laboratoires H. YVRARD, 17, rue Soufflot — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 56-67.)

PNEUMOSTYL DAGUIN

2 Formes :

Ampoules de 2 cc. Injections hypodermiques. Boîte bleue 18 fr. 70

Ampoules de 6 cc. Injections Intra-trachéales. Boîte rouge 24 fr. 95

Composition. — Morrhuate d'éthyle, cholestérine, cinnamate et benzoate de benzyle, camphre, goménol, eucalyptol, essences de labiées et huile neutre.

Indications. — Tuberculose, prétuberculose et toutes les affections des voies respiratoires.

Échantillons sur demande au :

Laboratoire DAGUIN

SAINT-MAUR (Seine).

Tél. : Gravelle 00-27.

POFENANE

Composition. — Bourgeons de Peuplier, Fenugrec, Hoang-Nan.

Indications. — Débilité, Asthénie, Hypotrophie, Bronchite chronique, Asthme, Tuberculose, Diabète, Neurasthénie, Atonie digestive, Troubles de la croissance, Perte de poids, Déminéralisation, Perturbation du métabolisme, Lymphatisme, Anémie, Impuissance, Enurésie.

Remarque importante. — Dans les affections broncho-pulmonaires, l'action du POFENANE se traduit par une diminution de la purulence des sécrétions bronchiques, par une plus grande facilité de l'expectoration et par la cessation de la toux.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 6 à 8 dragées par jour.

Enfants de 10 à 15 ans : 3 dragées par jour, à prendre avant les repas.

Avaler sans sucer ni croquer, avec une gorgée d'eau.

Présentation et prix :

La boîte de 60 dragées : 15 fr. 60.

L. N. C. 428-9.

Laboratoire du Dr VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

POLIOL CHURCHILL

(Hypophosphites composés de 0 gr. 20 par dose.)

Médication reconstituante par le phosphore directement assimilable. Association du phosphore avec les bases de l'organisme dans leur proportion avec 1 mgr. de méthylarsinate de strychnine par dose. Reconstituant complètement assimilable. Reminéralisant de choix.

Indications. — Neurasthénie, surmenage intellectuel et physique, convalescence, déminéralisation, phosphaturie, affaiblissement.

Sirop. — 1 cuillerée à soupe dans un peu d'eau après chacun des deux principaux repas de la journée.

Comprimés. — 2 comprimés absorbés, mais non dissous, à chacun des deux principaux repas de la journée.

Ampoules. — 1 injection intramusculaire chaque deux jours.

Sirop. — A partir de 7 ans par cuillerée à dessert. Au-dessous de cet âge par cuillerée à café.

Comprimés. — A partir de 7 ans : 1 comprimé dans les mêmes conditions que pour les adultes.

Ampoules. — Suivant indications du médecin traitant.

Trois formes : sirop, comprimés, ampoules. — Prix : 19 fr. 60.

Toutes les formes de Poliol se font aussi sans méthylarsinate de strychnine.

PRODUIT FRANÇAIS

Enregistré au L. N. C. n° 225-4.

Laboratoire des Produits du Dr CHURCHILL

P. DESCHAMPS, Pharmacien

92, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII°). (Tél. : Did. 74-02.)

POLYBROMURE GONNON

Bromures de sodium, potassium, ammonium et strontium.

Forme et Posologie.

<i>Sirop</i> : 1 cuillerée à soupe avant le coucher dans une infusion aromatique (2 gr. de polybromure).	Prix public 16 fr.
<i>Poudre</i> : 1 mesure = 1 gr. de polybromure.	11 fr.

Propriétés thérapeutiques. — Médication bromurée très énergique, sans bromisme et sans fatigue d'estomac grâce à la présence du bromure d'ammonium et du bromure de strontium qui est un excellent eupeptique.

Indications. — Toutes maladies nerveuses, toutes affections du cerveau et de la moelle épinière, états convulsifs et troubles de l'intelligence.

Durée moyenne de l'unité de vente :

Sirop : 15 jours. — Poudre : 30 jours.

Produits GONNON — J. et C. GONNON, Pharmaciens
14, rue Victor-Hugo — LYON. (Tél. : Franklin 36-80.)

POLYCALCION

Solution titrée agréablement aromatisée (gouttes et dragées).

XL gouttes ou une dragée correspondent à :	{	Chlorure de calcium.....	0 gr. 40
		Phosphate di-acide de calcium.....	0 gr. 08
		Gluconate de calcium.....	0 gr. 04

C gouttes correspondent à 1 cuiller à café.

Propriétés thérapeutiques. — Antihémorragique, déchlorurant, neuro-sédatif, anti-infectieux, recalcifiant, anti-anaphylactique.

Indications. — Hémorragies de toutes natures : épistaxis, hémoptysies, hématomes, hématuries, métrorragies, purpura, hémophilie, hémorragies des maladies infectieuses. États spasmodiques. Tétanie, Cardiopathie, néphrites, œdèmes, épanchements séreux. Décalcification, tuberculose, ostéomalacie. Accidents anaphylactiques, sériques.

Dose et mode d'emploi:

Adultes : XL à C gouttes 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée avant les repas ; ou 3 à 8 dragées par jour en trois fois.

Enfants : Il est préférable d'employer les gouttes de Polycalcion. X à XL gouttes 3 fois par jour dans un peu d'eau sucrée avant les repas. Les doses peuvent être augmentées ou diminuées suivant l'avis du médecin.

Prix au public : le flacon de 100 gr. : 17 fr. 50

La boîte de 60 dragées : 17 francs.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, Pharmacien.

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 29-29.

POLYFERMENTS LALEUF

Composition. — Ferments digestifs totaux, associés aux Sels de Sodium et de Magnésium.

Propriétés et indications. — Stimulant de la sécrétion glandulaire. Médicament de choix des dyspepsies de toute nature et de toutes les affections du tube digestif et de ses annexes.

Formes. — Granulé et tablettes.

Posologie et mode d'emploi. — Une ou deux cuillerées à café ou 2 à 4 tablettes à croquer ou à délayer dans 1/2 verre d'eau légèrement tiède, à la fin des principaux repas, ou au moment des troubles digestifs.

Durée moyenne des unités de vente : 10 à 15 jours.

Prix de vente au public :

L'étui de granulé ou la boîte de 48 tablettes : 18 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

POLYIODURE GONNON

(*Iodures de Sodium, Ammonium, Strontium.*)

Forme. — Sirop comprenant 1 gr. par cuil. à soupe d'iodures alcalins, associés aux écorces d'oranges amères et au vin de Bordeaux.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique dépuratif, non toxique, action rapide, tolérance parfaite.

Indications. — Engorgements, tumeurs, abcès, asthme, rhumatisme, goutte.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour au milieu des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 12 jours.

Prix public : 19 fr. 20.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

POLYPEPTONAL

Composition. — Peptonates polyvalents de Magnésie. Digestats chlorhydropeptiques de Foie total et d'Albumines végétales.

Indications. — Nouvelle médication polyvalente, antichoc, cholagogue et antianaphylactique. Troubles digestifs. Troubles anaphylactiques généraux. Troubles hépato-biliaires. (Congestion du foie, atonie vésiculaire, insuffisance biliaire, infections chroniques des voies biliaires.)

Posologie :

Comprimés : *Adultes* : 1 à 5 une 1/2 heure avant les repas.

Granulé : *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à bouche.

Enfants : 1 cuillerée à café dissous ou non dans un peu d'eau une 1/2 heure avant les repas.

Prix :

La simple dose (comprimés ou granulé). 18 fr. 50.

La triple dose (comprimés ou granulé). 41 fr. 40.

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
(Tél. : Grésillons 37-34. 2 lignes groupées.)

POLYSALYL

Soluté de salicylates associés de sodium, pyramidon, lithine.

Composition :

Salicylate de Soude	1 gr. 70
Salicylate de Pyramidon	0 gr. 15
Salicylate de Lithine.....	0 gr. 15
Citrate d'Urotropine.....	0 gr. 10
Citrate de Caféine	0 gr. 02
Teinture de Coca.....	0 gr. 20
Excipient q. s. pour 15 cgr.	

Préparation de goût agréable, masquant la saveur insupportable des salicylates. Possibilité de traitement prolongé. Activité intense.

Indications. — Toutes celles des salicylates.

Posologie. — 1 à 5 cuillerées à soupe par jour dans un verre d'eau de Vichy.

Doses. — 1 cuillerée à soupe contient : 2 gr. Polysalicylates ; 2 cgr. Citrate de Caféine ; 10 cgr. Citrate d'Urotropine.

Inscrit au L. N. C. sous le n° 1877-11.

Laboratoires J. LANDRIER

COULANGES-SUR-YONNE (Yonne).

POLYVALINE

du D^r Bayle

Nature. — Extrait spléno-surrénal.

Indications. — Les maladies infectieuses : Grippe, Typhoïde, Paratyphoïdes, Pneumonie, Bronchopneumonie, Erysipèle, Fièvres éruptives, Oreillons, etc., où il agit comme un sérum spécifique très actif.

Emploi. — 1 ou 2 injections par jour (intramusculaires à la fesse ou sous-cutanées abdominales) jusqu'à la défervescence.

Doses. — *Adultes* : POLYVALINE injectable A (10 cc.). La boîte de 2 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Enfants : 1 cc. par année d'âge de POLYVALINE injectable B.

Polyvalline buvable

2 par jour dans les maladies aiguës, les convalescences, les anémies avec asthénie.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 722-20/1
722-20/2, 722-21.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon (ancienne rue de l'Orne)
PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaugirard 16-11.)

POLYVEININE

(Comprimés.)

Composition. — Dose pour 4 comprimés :

P. de Surrénale	0,020
P. d'Hypophyse.....	0,008
P. de Thyroïde	0,020
Ext. stab. de Marron.....	0,040
Ext. stab. d'Hamamelis	0,20
Ext. stab. d'Hydrastis	0,02
Ext. stab. de Viburnum.....	0,04
Excip. gomme et sucre.....	Q. S.

Indications. — Médicament scientifique dans lequel les effets curatifs des glandes à sécrétions internes sont joints aux vertus vaso-constrictrices des extraits végétaux stabilisés.

Association judicieuse des toniques veineux opothérapiques aux toniques veineux végétaux, la *Polyveinine* est le parfait tonique des parois veineuses, en s'attaquant directement à la cause de leurs affections. C'est en quelque sorte la digitale du système veineux périphérique.

Posologie. — Avaler sans les croquer deux comprimés avant chacun des deux repas, vingt jours par mois.

Formule du professeur Sicard.

L. CASTERAN, Ph^{les}, 152, Côte-Pavée — TOULOUSE.

POMMADE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide et inoffensive de la douleur ou démangeaison dans : Eczémas, Ulcères variqueux, Prurit vulvaire ou anal, Prurit sénile, Prurit diabétique, Dermite infantile, Prurigo, Hémorroïdes, Brûlures, Engelures, Gerçures, Crevasses du sein, Vaginisme, Vulvites, Pansements douloureux, Plaies post-opératoires, Escarres, Radio-dermites, Zona, Furoncles, Anthrax, Impétigo, Lupus, Chancres, Urticaire, Herpès, Ampoules, Intertrigo, Erythèmes solaires, Boutons de chaleur, Piqûres d'insectes, en résumé tous les Prurits, Dermatoses, Lésions des muqueuses.

Conditions d'efficacité. — Nécessité d'une modification de l'intégrité de la peau, soit accidentelle (érosion, ablation ou distension), soit naturelle (muqueuse) ; un épiderme absolument intact est un obstacle à l'action de la pommade.

Nécessité, pour obtenir une action prolongée, de maintenir la pommade en permanence sur la lésion, sous forme de pansement **par exemple.**

Posologie. — Aucune limite ni dans les doses ni dans la durée du traitement. Prix : 15 fr. 30. — L. N. C. 581-1.

Laboratoires P. BAUDE,

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : LABOBOD — PARIS.

POMMADE BEBIA

Composition :

Pommade à base de sous-nitrate de bismuth, oxyde de zinc, acide benzoïque, acide borique.

Propriétés :

Antiseptique, kératoplastique, anti-prurigineuse.

Indications :

Puériculture, rougeurs des nourrissons, crevasses, gerçures, engelures, toutes dermatoses irritées.

Présentation et prix :

La boîte : 6 fr. 35. — La triple boîte : 14 fr. 85.

AUTRES PRODUITS BEBIA

Poudre Bebia, la boîte : 7 fr. 40.

Boîte poudreuse : 4 fr. 75.

Savon Bébia : 2 fr. 10.

Suppositoires Bébia, miel et glycérine contre la constipation.

La boîte de 15, pour bébés : 3 fr. 70

— — pour enfants : 4 fr. 75

— de 16, pour adultes : 5 fr. 85

Laboratoire BEBIA

5, avenue E.-Boissier — NANTES.

POMMADE BERNAMONT

A base de peroxyde de zinc, d'oxyde de zinc et d'amidon, la *Pommade Bernamont* constitue le traitement spécifique des Ulcères variqueux et des Plaies atones.

Indications. — Ulcères variqueux, Brûlures, Plaies, Fistules, Crevasses, Eczémas, Maladies de la peau.

Mode d'emploi. — Après un nettoyage soigneux à l'éther de la plaie à traiter, appliquer une couche épaisse de *Pommade Bernamont* et recouvrir d'un pansement.

Prix : Le pot de 120 grammes, 13 fr. 50.

Durée moyenne du traitement : 3 à 4 semaines.

Utilisation : un pot par semaine.

Littérature et Échantillons.

Enregistré au L. N. C. M. sous le numéro : 1602-2.

Laboratoires BERNAMONT

87 et 89, rue du Commerce — NEVERS

(Tél. : 0-23 Nevers.)

POMMADE-CRÈME LUDIN

Spécifique des affections de la peau et du cuir chevelu.

Composition. — Hg. + As. + B. du Pérou.
+ H. de Cade + Soufre + Acide Salicylique
+ Oxyde de Zinc.

Propriétés thérapeutiques. — Dermatophylactique, Antiseptique, Innocuité absolue.

Indications thérapeutiques. — Staphylococcies et Streptococcies cutanées, Psoriasis et Eczématides psoriasiformes, Dermatoses sèches et squameuses, Pelade, Plaies atones cicatrisant mal, Dermatoses exotiques d'origine microbienne ou ulcérées, Rougeurs, Affections prurigineuses de cause externe, etc., Erythèmes.

Mode d'emploi. — Par massage de quelques minutes, bien faire pénétrer la pommade dans la peau.

Enregistré au Laboratoire national de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-4.

Laboratoires REY — DIJON (Tél. : 22-12.)

POMMADE DU D^r BUTLER

Composition. — Précipité blanc (Chlorure mercurieux), Acide salicylique, Acide borique, Oxyde de zinc, Excipient spécial.

Propriétés. — Anti-prurigineuse, analgésique, cicatrisante. Supprime démangeaisons et douleurs, antiseptique puissant.

Indications. — Eczémas suintants, secs, aigus, chroniques. Tous les prurits avec ou sans lésion cutanée. Psoriasis, acné, folliculite, impétigo, boutons de toutes natures. Prurigo, dartres, brûlures, herpès, ulcères, coups de soleil, érythème fessier. En applications aussi bien chez l'enfant que chez l'adulte.

Emploi. — En onction douce, massages légers, recouvrir d'une compresse de gaze. Un pansement par jour maximum, ne pas laver la région traitée avant complète guérison, se contenter d'essuyer et de détacher les squames épidermiques avec un linge doux.

Présentation. — Tube G. M. : 14 fr. Tube P. M. : 8 fr. 50. Pot : 12 fr. Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-1.

POUDRE DU D^r BUTLER

Mêmes éléments actifs que dans la *Pommade Butler*. Dermatoses sèches et suintantes. Toilette de Bébé : 7 francs, présentée en élégante boîte poudreuse de 150 grammes environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1205-2.

Laboratoire du D^r BUTLER — BOGUET, Pharmacien.
1, rue Bossuet — DIJON (Côte-d'Or).

POMMADE ET SUPPOSITOIRES INSÉVA

Traitement des affections ano-rectales par vaccinothérapie locale.

La pommade et les suppositoires **INSÉVA** sont à base de bouillon-vaccin de colibacilles et d'entérocoques, auxquels sont imputables, pour la plupart, les infections hémorroïdaires.

Indications. — Hémorroïdes internes, hémorroïdes externes, eczéma anal, ano-rectal ou péri-anal, tumeurs hémorroïdaires.

Action. — Guérison rapide des hémorroïdes et tuméfactions hémorroïdaires, sédation du ténésme.

Mode d'emploi. — Appliquer localement, ou introduire dans l'anus, au lever et au coucher, et après chaque selle.

Présentation :

Le tube : 17 fr.

Le 1/2 tube : 9 fr. 55.

La boîte de 10 suppositoires : 17 fr.

INSÉVA

Institut de Séro et Vaccinothérapie de Garches,
151-153-155, rue de Buzenval — GARCHES.

Échantillons : 60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées);

POMMADE FORNET

à l'Insuline Fornet. (Pansuline.)

Pour éviter toute confusion avec les préparations similaires, la Pommade Fornet s'appellera désormais :

DERMASULINE

Voir ce mot.

POMMADE LENOIR

à la Cinnamoléine.

Traitement spécifique des *dartres chroniques* ; s'adresse exclusivement à ces eczémas à forme sèche, desquamant sans cesse, souvent prurigineux, dont la ténacité est si désespérante pour le malade et pour le médecin.

Dans le *Pityriasis* du cuir chevelu, en découpant la couche épaisse des pellicules qui enserrant et étouffent les cheveux, elle enrayer la calvitie et permet de recourir avec succès aux diverses lotions excitantes et microbiocides qui, sans elle, ne pourraient atteindre le sébum-bacille enfermé dans les glandes sébacées.

Employée aussi avec succès contre les *verruës plates séborrhéiques* du visage, dites *crasse des vieillards*, les *psoriasis*, le *sycosis*, la *teigne*, le *javus*.

Mode d'emploi. — Onction matin et soir sur la partie malade.

Prix : 15 fr. 30

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Plepus — PARIS (XII^e). (Tél. : Dorian 47-00.)

POMMADE LOGEAI

Composition :

Extrait total d'hamamélis.	6	Cupressus.....	0,29
Sulfoichtyolate de soude..	6	Genêt.....	0,29
Onguent populéum.....	69	Jusquiame.....	1,45
Lanoline anhydre.....	5,70	Teskra	1,45
Marron d'Inde	0,29	Pour 100 grammes.	

Propriétés :

ATOXIQUE : Ni stupéfiant, ni adréaline.

ANALGESIQUE : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTE : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTISEPTIQUE : Action antiseptique de l'huile sulfatée sur la muqueuse rectale.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prurits anal et vulvaire. Prostatites.

Mode d'emploi. — Après bain savonneux, onction matin et soir avec le doigt enduit d'une forte couche de pommade LOGEAI et jusqu'à sédation de la douleur (quelques minutes). Une canule permet le traitement des hémorroïdes internes.

Prix : Le tube P. M. : 10 fr. 40. — Le tube G. M. : 16 francs.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI
GOBERT, Pharmacien.

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

POMMADE MIDY

(Adrénostyptique).

Adrénaline	0,0066
Stovaine	1 gr.
Anesthésine	1 gr.
Extrait de Marron d'Inde frais	
stabilisé	2 gr. 50
Extrait d'Hamamélis	0 gr. 50

Pour 100 grammes de pommade.

Mode d'emploi. — Une application matin et soir, et après les garde-robes. Précéder d'une application, pendant 10 minutes, ou de glace ou de compresses à 45°.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation des douleurs, arrêt des hémorragies, décongestion et vaso-constriction, antiseptique.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Une canule rectale s'adaptant au tube permet d'atteindre les hémorroïdes internes, haut placées.

Prix : 16 fr. **Durée du traitement** : 10 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

POMMADE NOËLLINE

Composition. — Pommade à base d'acide benzoïque et de tanin incorporés à un excipient à la fois gras et alcool.

Action. — Traitement préventif et curatif des gerçures des seins, et des rougeurs des bébés.

Durée d'utilisation : une ou deux semaines suivant gravité.

Mode d'emploi :

a. Gerçure des seins. *A titre préventif :* en massage des mamelons dans les derniers mois de la grossesse.

A titre curatif : En pansements, après lavage antiseptique.

b. Rougeurs des bébés. Application locale recouverte de poudre Noëlline.

Prix : le tube 8 francs.

Laboratoire de la NOËLLINE
GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POMMADES OPHTALMIQUES CHIBRET

Pommades en tubes à canule dévissable et stérilisable, et à canule fixe, faites par des procédés spéciaux de fabrication à : l'Oxyde Jaune, Violet de Méthylène, Bleu de Méthylène, Aristol, Vioforme, Iodoforme, Rouge Ecarlate, Cuivre (hémocuvre), Oxyde de Zinc, Zinc Cadmium, Zinc Tuméol, Zinc Ichtyol, Calomel, Fondante (Kⁱ +, CaCl²), Ichtyol, Soufre, Tannin, Précipité Blanc, Bismuth Hydroxyde, Dermatol, Extrait thyroïdien, Peroxyde de zinc, Collargol, Argyrol, Azotate d'argent, Protargol, Cocaïne, Ethylhydrocupréine (Optochine). Rose de Bengale, Xéroforme, Orthoforme, Essence de Niaouli (Goménol), Bismuth Violet, Bismuth Rose, Optochine Rose, Violet Rose, Colorant Composé, Esérine, Euphtalmine, Scopolamine, Atropine, Pilocarpine, Adrénaline, Dionine, Homatropine, Bétuline Hg, Bétuline Ag, Bétuline Cu, Chibromercurobrome. Choloptomercuro (Bile Ethylhydrocupréine (Optochin) Chibromercurobrome).

Radio Bleu (Radio Activé au bromure de Ra associé au bleu de Méthylène) à employer lorsque l'on veut obtenir une cicatrisation rapide des tissus cornéens et conjonctivaux.

Ampoules fondantes chloro-iodo-calciques (Bains d'yeux pour cataracte). **Céillères Chibret** à rebord caoutchouté.

Extrait corps ciliaire en amp. pour inj. et instil.

Solution composée en amp. de 1/2 cc. (pour inj. s.-conjonctivales).

Humeur aqueuse artificielle (pour opération de la cataracte).

Pommade pour le nez : Baume du Pérou, Adrénaline.

(Voir à Collyres la suite des Produits Chibret.)

(Voir à Chibromercurobrome, le libellé spécial.)

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 1471-7 à 1471-21.

LABORATOIRES CHIBRET,

5, Saint-Herem-CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme). (Tél. : 33-26.)

POMMADES OPHTALMIQUES GOVAERTS

Grâce à un excipient spécial,
LA VASESTÉRINE (Marque déposée)
nos pommades ophtalmiques sont rigoureusement inaltérables et d'une activité nettement supérieure à celle des collyres.

Présentées en tubes, en étain *pur*, nous les préparons à tous les médicaments ophtalmiques usuels.

POMMADES NASALES A LA
VASESTÉRINE,

Laboratoire M. GOVAERTS
50, Grand'Place — PONT-A-CELLES
Hainaut. — Belgique.

POMMADES PROBIOS

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Pommade

Formule. — Antivirus et Bactériophages Staphylococciques, Streptococciques et Bacilles Pyocyaniques.

Présentation. — En tube d'étain. P. M. 9 fr. 65 — G. M. 19 fr. 35.

Indications thérapeutiques. — Infections cutanées, Acné, Panaris, Furoncles, Anthrax, Absès, Phlegmons, Pyodermites, Plaies infectées, Eczéma.

Mode d'emploi. — En applications locales.

POMMADE NASALE PROBIOS

Formule. — Antivirus-Bactériophages, Antistreptococciques, Antistaphylococciques, Friedlander, Proteus, Antivirus Bac. Pfeiffer, Antipneumococciques.

Présentation. — En tube à injection. 9 francs.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhino-pharyngites, Ozène, Grippe et certaines formes d'asthme, Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi. — Introduire le produit aussi loin que possible dans les fosses nasales, en aspirant fortement, 2 à 3 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-9 et 10.

Laboratoires PROBIOS
8, rue Saint-Martin — PARIS (IV°)
(Tél. : Turbigo 40-83.)

POMMADE VITAMINÉE LAFAY

Cicatrisante, anti-infectieuse, antalgique.

Formule. — Huiles de fletan et de foie de morue, Carotène, Ergostérol irradié, Tégumentine, Cholestérine, Oxydes de titane et de zinc.

Caractéristiques. — Concentration optima en Vitamines A et D. Consistance onctueuse permettant un étalement facile.

Indications. — Ulcères, brûlures à tous degrés, toutes plaies (même atones) avec ou sans infection, cavités opératoires.

Dermatoses par carence organique ou cellulaire.

Mode d'emploi. — Après nettoyage sans utilisation d'antiseptiques, appliquer largement la pommade et recouvrir d'une gaze stérile. Renouveler le pansement tous les deux jours.

Présentation. — Tube.

Prix : 18 fr. 35.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1090-4.

Laboratoires du Dr L. LAFAY

LECOQ et FERRAND, Pharmaciens,

69, rue de Provence, 54, Chaussée d'Antin —

PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 21-06.)

POMMADE VITAMORRHUINE

agréablement parfumée.

A base d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50, associé à la graisse de laine, l'huile d'olive, le stéarate de zinc, les essences de lavande et bergamote.

1 gramme de *Pommade Vitamorrhaine* contient :

4550 unités internationales Vitamines A naturelles.

975 unités internationales Vitamines D naturelles.

Indications. — Plaies atones, ulcères, ulcères variqueux, dermatoses chroniques, brûlures, engelures, toutes les irritations de la peau, etc.

**PHARMACIE CENTRALE DE
BELGIQUE, S. A.**

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

POMMADE ZYLOR

Traitement local des hémorroïdes internes et externes et de leurs complications. Prostatite.

Extrait d'Hamamelis	3 gr.
Extrait de Rathania	3 gr. 90
Extrait fl. de Marrons d'Inde.	3 gr.
Extrait fl. de Saturne	2 gr.
Oxyde de zinc	2 gr.
Stovaine	0 gr. 10
Solution de Suparénine 1000°.	3 gr.
Lanoline	23 gr.
Vaseline.....	60 gr.

En un tube canule.

Mode d'emploi. — Application matin et soir après compresse à l'eau tiède et séchage.

Propriétés. — Analgésique, Décongestif antiseptique. Existe aussi en suppositoires.

Prix. — Le tube de pommade : 10 fr. 20 ; la boîte de suppositoires : 10 fr. 20.

Laboratoires COUSSINET
122, Champs-Élysées — PARIS (VIII°).

PORODERMAL

Composition. — Pâte poreuse, toujours tolérée, même par les dermatoses aiguës et suintantes.

Présentations. — PORODERMAL simple : eczémas aigus, pyodermites, érythèmes.

PORODERMAL au peroxyde de Zinc : antiseptique cicatrisant, plaies atones, brûlures.

PORODERMAL à l'Ichtyol : kératoplastique anti-prurigineux : eczémas érythématosquameux, lichens, prurigo.

Indications. — Les applications combinées du PORODERMAL au peroxyde de zinc et du PORODERMAL à l'ichtyol cicatrisent rapidement les plaies atones, les ulcères variqueux sans interrompre ni le travail, ni la marche.

Prix :

PORODERMAL simple : 12 fr. 50.

Ichtyol : 15 fr. 60.

Peroxyde de Zinc : 15 fr. 60.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoire SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. Tél. : 840-78.

POSTERISAN

(Nom déposé.)

Traitement spécifique des Hémorroïdes.

(Pommade et Suppositoires.)

Composition. — Antivirus du Colibacille, Acide carbolique.

Propriétés. — Action rapide et sans danger. Aucun effet secondaire.

Indications. — Remède spécifique des Hémorroïdes et de toutes les maladies cutanées causées par les bactéries intestinales.

Présentation. — Boîte de 10 suppositoires. Tube de Pommade avec canule rectale.

Emploi. — *Hémorroïdes externes* : Oindre avec la pommade après chaque selle, ainsi qu'au lever et au coucher.

Hémorroïdes internes : Introduire 1 ou 2 suppositoires ou de la pommade, à l'aide de la canule qui se visse sur le tube.

Laboratoires LOBRU

L. Brun, Pharmacien

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

POST-HYPOPHYSE CHOAY

Nature. — Extrait purifié injectable, désalbuminé, stérilisé, de lobe postérieur d'hypophyse.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi :

Post-hypophyse n° 2. — Solution *obstétricale*.

Ampoules de 1 cc., titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Inertie utérine secondaire, en l'absence de toute dystocie.

Injection sous-cutanée de 1/2 cc. à 1 cc., à dilatation complète (tête fixée).

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 4. — Solution *chirurgicale*.

Ampoules de 1 cc. titrées à 10 unités internationales.

Indications. — Prévention des hémorragies opératoires : 1/2 à 1 cc. avant l'intervention.

Parésie intestinale : 1/2 à 1 cc. Diabète insipide : 1 cc. par jour.

Boîtes de 3 et de 6 ampoules.

Post-hypophyse n° 5. — Solution *hémostatique* diluée dans du sérum.

Ampoules de 10 cc. titrées à 5 unités internationales.

Indication. — Hémoptysies des tuberculeux : Injection intraveineuse

Là pousser très lentement.

Boîtes de 3 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, Avenue Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e)

Tél. : Autenil 44-09 et 44-10.)

POTION ADOL

Composition. — Préparation à base de : Bromure d'ammonium, Amidopyrine, Iodure d'ammonium, Sulfate de Spartéine, *Stovaine*, Citrate de Caféine, Intrait de Valériane.

Action thérapeutique. — Analgésique et antalgique extrêmement puissant.

Avantages. — Pas de toxicité, goût agréable, action constante. Pas de contre-indications.

Indications. — Douleurs aiguës, quelle qu'en soit l'origine. Céphalées, migraines, rachialgies, lumbago, sciaticques, névrites, coliques néphrétiques et hépatiques, douleurs rhumatismales, grippe.

Mode d'emploi. — 1 à 6 cuillerées à bouche par jour, loin ou avant les repas.

Prix : 18 fr. 55.

Laboratoire ADOL

L. GIROUD, Pharmacien de 1^{re} classe

78, Cours de la Liberté — LYON.

(Tél. : Moncey 13-37.)

POTION DIOGA

Traitement rationnel et radical de toutes les affections des voies respiratoire

Composition :

Galacol	0 gr. 25
Glycérine	5 gr.
Eau de Laurier-Cerise	5 gr.
Benzoate de soude.....	2 gr.
Dionine.....	0 gr. 06
Sirop de Tolu	50 gr.
Eau chloroformée.....	10 gr.

Eau q. s. pour 100 gr. de potion colorée en vert et parfumée à la menthe.

D'un goût très agréable, la **Potion Dioga** peut être supportée par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Rhumes de poitrine, Bronchite, Catarrhe, Asthme, Emphyseme.

Posologie. — *Adultes* : 2 à 5 cuillerées à soupe par jour (loin des repas).

Enfants au-dessus de 10 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert (loin des repas)

Prix : le flacon 18 fr. 50.

Laboratoire BIOSEDRA

E. ESTRADER, Docteur en Pharmacie,

37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 10-23.)

POUDRE ANTI-H

(H = Symbole de l'acidité.)

Médication stomacale.

Composition. — Silicate double d'alumine et de sodium.

Indications. — Toute la pathologie gastrique. (Voir également *Ampoules Anti-H.*) D'une façon générale, réserver les *Ampoules Anti-H* aux cas complexes (Maladie de Reichmann, Ulcères et Ulcérations, Hypermotricité, Spasmes du pylore), et la *Poudre Anti-H* aux cas simples (Hyperchlorhydries, Gastralgies, Dyspepsies). Les ampoules peuvent également s'employer en traitement d'attaque et la poudre en traitement d'entretien.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau après les deux repas, ou au moment des douleurs, ou selon indications médicales.

Prix : 16 fr. 50.

Laboratoires REYGAGNE

160, avenue d'Italie — PARIS.

(Tél. : Gobelins 90-00.)

POUDRE BEAU CHLOROFORMÉE

(Ou Éther)

Deux formes : Poudre Beau Chloroformée et Poudre Beau Éther.

Formule :

Ext. gr. Chanvre Indien	0,125
Menthol naturel	0,10
Chloroformé (ou Éther)	0,50
Bic. de soude chim. pur	75
Sucre. Q. S. pour	100

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate des phénomènes douloureux gastriques. Antiacide, Antispasmodique.

Indications. — Hyperchlorhydries, Dyspepsies douloureuses, Spasmes, Ulcères, Vomissements incoercifs et tous les syndromes douloureux de l'estomac.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un 1/3 de verre d'eau après les principaux repas et au moment des douleurs.

Pas d'accoutumance. Pas de contre-indications.

Prix : 12 fr. 25. — Durée du traitement : 10 à 15 jours.

Laboratoires Pharmaceutiques du Rhône

Ph. QUELY, Docteur en Pharmacie

16, cours Gambetta — LYON.

POUDRE CASSARINI

Médication Sédatrice du Système Nerveux

ÉPILEPSIES — HYSTÉRIE — NÉVROSES DIVERSES

(En Comprimés.)

Nouvelle combinaison antitoxique bromée aux extraits végétaux.
Spécifique hérolque des épilepsies et des affections nerveuses avec hyper-excitation du système nerveux.

Prix au public : 26 fr. 50 la boîte (un mois de traitement environ).

Posologie:

Adultes : 6 comprimés par jour, 2 immédiatement avant chacun des trois principaux repas. Dissous dans un demi-verre d'eau.

Adolescents : 10 à 15 ans : 3 jusqu'à 4 comprimés par jour. Un ou deux immédiatement avant les trois principaux repas, dissous dans un demi-verre d'eau ou dans le potage.

Enfants de 6 à 10 ans : 2 jusqu'à 3 comprimés par jour, un immédiatement avant le petit déjeuner, un avant le repas du soir, dissous dans n'importe quel liquide.

Enfants au-dessous de 5 ans : Demander renseignements.

Littérature sur demande.

R. COLUMEAU, Pharmacien spécialiste

Laboratoire COLUMEAU, 24, rue Flégier — MARSEILLE

(Tél. : National 50-06.)

POUDRE CHAUMEL

Hygiène de la Femme.

Borate de soude et Essence de Lavande,
entièrement soluble dans l'eau, Odeur
agréable et discrète.

Indications. — Décongestionnante, Anti-septique, Adoucissante.

Hygiène intime de la femme.

Hygiène des yeux (blépharites, etc.).

Traitement des plaies.

Mode d'emploi. — Un sachet pour un à deux litres d'eau chaude.

Prix : La boîte de 20 sachets, 19 fr. 20.

Durée moyenne de l'unité de vente :

28 à 30 jours.

Établissements FUMOUE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

POUDRE ESCOUFLAIRE

Poudre et cigarettes anti-asthmiques.

Composition. — A base de nitre et de solanées les mieux triées (récoltes de 1^{er} choix).

Indications thérapeutiques et formes. — N° 2 (la plus faible) : Bronchite chronique, oppressions cardiaques, etc. — N° 1 : Asthme nerveux, Asthme des foins, fns de coqueluche, etc.

Mode d'emploi. — Une bonne pincée ou une demi-cuiller à café de poudre, allumée sur un fond de soucoupe recouverte d'un entonnoir ou d'un cornet en papier dirigeant la fumée vers la gorge. Avaler la fumée.

Ne pas attendre les affres de la crise : la prévenir par une fumigation anticipée et surtout la fumigation préventive du soir, avant de se mettre au lit.

Prix de vente : 11 fr. 75 (pour environ 30 fumigations ou 30 cigarettes).

L. N. C. n° 322 à 325. Dos. 77.

Laborat. ESCOUFLAIRE — BAISIEUX (Nord).
(Echantil. grat. sur demande de MM. les Docteurs.)

POUDRE ET POMMADE D'INSULINE PHYLOZE

Forme et composition. — Insuline purifiée de fabrication française ; présentée en poudre et en pommade.

Mode d'action. — Excite la vitalité cellulaire et active la cicatrisation des plaies.

Indication. — Ulcères variqueux, plaies atones, cicatrisation rapide de la plaie.

Mode d'emploi. — Déterger la plaie par un pansement humide, la saupoudrer de Poudre d'Insuline Phyloze ou appliquer la Pommade d'Insuline Phyloze et recouvrir d'une gaze.

Appliquer la Poudre ou la Pommade d'Insuline Phyloze une fois par jour.

Dans les cas graves et après cicatrisation de la plaie, pour parachever la guérison, recourir aux injections d'Endopancrine. (Voir ce mot.)

Prix pour 20 pansements : 25 francs.

Prix pour 10 pansements : 13 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 234-12, 234-11.

LABORATOIRE DE L'ENDOPANCORINE

48, rue de la Procession — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 07-70.)

POUDRE HYGIÉNIQUE SATINE

Composition :

Stéarates	24 gr.
Acide borique	6 gr.
Silic. de Magnésie.....	4 gr.
Carbonate de chaux.....	6 gr.

Par boîte.

Propriétés thérapeutiques. — Irritations de la peau ; rougeurs des nouveau-nés.

Ne se laisse pénétrer par aucun liquide.

Indications. — Toilette des bébés, irritations cutanées, eschares des malades alités, feux du rasoir.

En vente, toutes pharmacies et grands magasins (Hygiène). 8 francs la boîte.

Laboratoires NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

POUDRE NOELLINE

Composition.

Poudre à base de Dermatol et Acide Borique.

Indications.

Rougeurs des bébés, Intertrigo, Escarres.

Mode d'emploi.

En application locale tant à titre préventif qu'à titre curatif.

Durée d'utilisation : plusieurs semaines.

Boîte spéciale permettant à la fois le tamisage et l'imprégnation d'une houppette.

Prix : 8 francs.

Boîte décorée de luxe, pour table de toilette : 19 fr. 20.

Laboratoire de la NOELLINE

GUINGAMP (Côtes-du-Nord). Tél. : 200.

POUDRE PASTORILOS

Composition. — Poudre de sedum telephium, d'hypericum perforatum, produits humiques, excipient Q. S.

Propriétés. — Poudre absorbante, bactéricide, hémostatique, cicatrisante, forme un « épiderme » provisoire qui assure la réparation des tissus sous-jacents.

Indications. — Pansement idéal de toutes plaies, brûlures graves, etc...

Forme. — En boîte stérilisée à 130°.

Posologie. — En applications quotidiennes, recouvrir d'une gaze (suivre les prescriptions indiquées sur la boîte).

Laboratoire DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

POUDRE PATERSON

Composition :

Sous-nitrate de bismuth pur, léger. Magnésie calcinée. Sucre pur.

Propriétés :

Le meilleur saturant neutre. Ne constipe jamais. *Agit à faibles doses.*
Saturant gastrique neutre présenté en pastilles, obligeant à la salivation. Action inoffensive. Très supérieur au carbonate de bismuth et aux produits de substitution (kaolin, etc.).

Indications :

Poudre en paquets : Pansement gastrique, Saturation, Gastropathies douloureuses, Dyspepsies, Hyperchlorhydrie, Acidités anormales, Ulcus gastrique et duodénal, Entérites et infections intestinales, Dyspepsies gravidiques, Troubles digestifs du nourrisson.

Pastilles : Traitement d'entretien, Troubles digestifs légers ou chroniques. Digestions pénibles. Etats nauséux de la grossesse.

Forme et posologie :

Paquets : (2 gr.), 2 à 5 p. jour et plus au moment des crises douloureuses.

Pastilles : 15 à 20 par jour. Laisser fondre en bouche.

Prix au public : *Poudre :* la boîte (40 paquets), 17 francs ; la demi-boîte (20 paquets), 9 fr. 35. *Pastilles :* la boîte, 8 fr. 80 ; la demi-boîte, 4 fr. 80.

15-20 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits PATERSON, G. et M. Armingeat,
 46, rue de Saintonge — PARIS (Arch. : 15-10).

POUDRE ROCHER LAXATIVE

Traitement de la constipation.

Laxatif doux et agréable, agissant sûrement et sans coliques.

Composition. — Association en proportions convenables de substances émollientes et aromatiques.

Posologie. — Une ou 2 cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le soir, au coucher.

Échantillon franco à Messieurs les Docteurs.

Prix : 6 fr. 75.

Laboratoires E. FERRÉ

J. LEROY, Pharmacien

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (VI^e).

Détail : 142, boulevard Saint-Germain
(Tél. : Danton 98-45.)

POUDRE ZEDEN

A base de Sulfate de zinc (Zn) pour usage gynécologique.

Sachets contenant :

Sulfate de zinc	2 gr.
Sulfate de cuivre	0 gr. 10
Alun pur cristallisé	0 gr. 10
Essences aromatiques, Q. S. pour	2 gr. 25

Mode d'emploi. — *Soins d'hygiène habituels :* un sachet pour 2 litres d'eau bouillie, en lavages ou injections.

Traitements gynécologiques : un à deux sachets pour un litre d'eau bouillie.

Indications. — Soins intimes, Pertes, Vaginites, Vulvo-vaginites, Métrites, Ulcérations, etc.

Avantages. — La *Poudre Zeden* maintient l'intégrité des muqueuses et respecte leurs fonctions sécrétoires normales. Elle est enfin cicatrisante, antiseptique et astringente.

La boîte de 12 cachets : 12 francs.

Laboratoire M. PLANCHARD

27, boulevard Henri-IV — PARIS (IV^e).

PRAGMOLINE

Solution stable de bromure d'Acétycholine.

Hypotenseur et antispasmodique.

Indications. — Accidents de l'hypertension en général.

Affections spasmodiques d'origine artérielle (artérites sténosantes des membres, maladie de Raynaud, localisations cérébrales, rétiniennes, auriculaires, etc.).

Hypovagotonie. *Sueurs des Tuberculeux.*

Présentations et Posologie. — Boîtes de 10 ampoules.

Solution A : Dosée à 6 p. 100 de bromure d'acétylcholine (ampoule de 1/2 cm³). Prix : 23 fr. 50.

Solution B : Dosée à 12,5 p. 100 (ampoule de 1 cm³).

Prix : 41 francs.

Injection sous-cutanée ou intramusculaire : 0 g. 03 à 0 g. 06 pour les sueurs des tuberculeux ; 0 g. 25 à 0 g. 50 pour les angiospasmodiques. Débuter par de petites doses.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PRÉFAGYL

Gastriques fonctionnels. Petits hépatiques.

Aérophages.

Particularités. — Comprimés effervescent de 2 gr. permettant de réaliser immédiatement, en tous lieux, une Solution de Bourget bromurée citratée, avec addition de chlorure de magnésium.

Indications. — Tous les gastriques fonctionnels, dyspeptiques, aérophages, hépatiques.

Emploi. — Dyspeptiques, hépatiques, nerveux : 1 comprimé effervescent le matin à jeun et avant chaque repas dans un demi-verre d'eau tiède ou froide.

Hyperchlorhydrie : 1 comprimé au moment des douleurs ou des brûlures.

Formule :

Chlorure de magnésium	0,03
Bromure de sodium sec	0,25
Bicarbonate de soude sec	0,60
Sulfate de soude desséché	0,285
Phosphate de soude sec	0,195
Acide citrique	Q. S. p. 1 comprimé effervescent.

Boîte de 3 tubes de 12 comprimés. Prix : 16 fr. 50.

Boîtes de 3 tubes de 12 comprimés. Prix : 16 fr. 85.

Inscrit au Laboratoire National de Contrôle, n° 742-14

Laboratoires P. TAVERNIER

Docteur en pharmacie, 32, rue de l'Ouest — PARIS.

PRÉMALINE

Médication antipaludique totale.

Composition. — Association d'une partie de rodopréquine et de 10 parties de quinacrine.

Présentation. — Comprimés dosés à :

Quinacrine	0 gr. 10
Préquine (plasmochine)	0 gr. 005
Rhodoquine	0 gr. 005

Indications. — Traitement du paludisme de rechute. Application des nouvelles méthodes de lutte collective contre le paludisme.

Posologie. — Pour 1 journée :

Adultes : 3 comprimés.

Enfants : jusqu'à 1 an : 1/2 comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé 1/2 ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés 1/2.

Absorber toujours le médicament *pendant les repas*, avec une alimentation très riche en *féculents*.

Vente autorisée seulement en France, aux Colonies françaises, en pays de protectorat français et sous mandat français.

Prix de vente : le tube de 15 comprimés : 19 francs.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PRESSYL

Composition :

	Ampoules.	Comprimés.	Gouttes. (1 cc.)
Camphramine ...	20 cgr.	10 cgr.	25 cgr.
Pressédrine	5 —	2 —	5 —

15 gouttes = 1 comprimé.

Injection indolore, grande marge thérapeutique, tolérance générale parfaite.

Propriétés. — Tonique cardiaque et respiratoire par la camphramine ; hypertenseur par la pressédrine. C'est le médicament type des défaillances cardio-vasculaires et respiratoires aiguës des hypotensions chroniques et de l'asthme.

Indications :

Ampoules : Collapsus hémorragiques et toxi-infectieux comas, syncopes cardiaques et respiratoires, états de chocs anaphylactique, thérapeutique, traumatique. Crises d'asthme, syncopes anesthésiques, chocs opératoires ou obstétricaux.

Comprimés et gouttes : Hypotensions essentielles, hypotension des maladies infectieuses, convalescences asthme, accidents sériques, intolérances médicamenteuses, coqueluche et bronchite infantiles, cardiopathie chronique.

Posologie :

Ampoules : Injection intraveineuse : action rapide et énergique. Injection sous-cutanée ou intramusculaire : effet prolongé ; peuvent être renouvelées toutes les deux à quatre heures.

Comprimés et gouttes : Adultes : 2 à 5 comprimés ou XXX à LXXV gouttes par jour.

Nourrissons : V gouttes 3 ou 4 fois par jour.

Enfants de 1 à 5 ans : X à XV gouttes 3 à 4 fois par jour

Enfants au-dessus de 5 ans : XV à XX gouttes 4 à 5 fois par jour.

Prix :

La boîte de 6 ampoules : 22 fr. 80.

La bte de 36 comprimés ou le flacon de gouttes : 20 fr. 65.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

Tél. : Trinité 44-31. — Télégr. : Chevrematte 90-Paris.)

PRÉVALIDINE

Forme. — Pommade résorbable en tube gradué.

Composition :

Camphre.....	20,00
Baume du Pérou.....	4,00
Essence d'Eucalytus..	4,00 pour 100 gr.

Indications. — Grippe, Bronchite, Broncho-pneumonie, Emphysème, Coqueluche, Tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — Une onction par jour, le premier jour le dos, le second jour la poitrine, troisième jour l'un des bras, quatrième jour l'autre bras, le cinquième les cuisses.

Présentation. — Tube gradué par onction.

Prix : 15 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-10.

Laboratoires FISCH et C^{ie}, S. à r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à Paris : 104, faubourg Poissonnière.
(Tél. : Trudaine 92-52.)

PRÉZYMASE

Cure de désensibilisation.

Composition :

Peptone de poisson, peptone de viande,
extrait sec de quinquina.

Mode d'action :

Prémunit l'organisme contre les accidents de la sensibilisation (Théorie de Widal, Méthode de Pagniez, et Pasteur-Vallery-Radot).

Posologie :

Une à deux dragées une demi-heure avant chaque repas.

Prix : 20 fr. (20 jours de traitement.)

Laboratoires LEBOIME

1-3-5, rue Fernand-Widal - PARIS (XIII^e).

(Tél. : Glacière 24-48.)

PROBIOS

Thérapeutique mixte. Antivirus. Bactériophage.

PROBIOS ANTIPYOGÈNE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophages
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus. 30 fr. 60. Demi-boîte: 16 fr. 30.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages. Anti-Streptococcique, Staphylococciques et Pyocyaniques.

Indications. — Infections pyogènes : Abscesses, Phlegmons, Panaris, Plaies suppurées, Brûlures infectées, Pyodermites et toutes les suppurations. A titre préventif sur les plaies en chirurgie, avant, pendant et après les interventions septiques.

Mode d'emploi: Buvable, injections locales, pansements.

Pommade (Voir à Pommades PROBIOS).

Comprimés (Voir à Comprimés PROBIOS).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-1.

PROBIOS ANTISTAPHYLOCOCCIQUE

Présentation. — 4 ampoules incolores de 5 cc. = Bactériophage.
4 ampoules jaunes de 5 cc. = Antivirus. 30 fr. 60. Demi-boîte: 16 fr. 30.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophage Anti-Staphylococciques.

Indications. — Acné, Sycosis, Furoncles, Anthrax et toutes les infections à Staphylococcus.

Mode d'emploi: Buvable, injections locales, pansements.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-2.

PROBIOS VOIES RESPIRATOIRES

Présentation. — 5 ampoules incolores de 2 cc. = Bactériophages.
5 ampoules jaunes de 2 cc. = Antivirus. La boîte de 10 amp. : 30 fr. 60.
La boîte de 6 amp. : 18 fr. 35. De plus, chaque boîte contient un instillateur nasal.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages, Anti-Streptococciques, Staphylococciques, Friedländer, Proteus, Antivirus Pfeiffer, Pneumocoque.

Indications. — Coryza, Sinusites, Rhinites, Ozène, Otites, Bronchites, Pneumonie, Broncho-Pneumonie, Grippe, Angines, certaines formes d'Asthme. Préventif dans la Grippe et le Coryza.

Mode d'emploi: Buvable, instillations nasales, Gargarismes.

Pommade (Voir à Pommades PROBIOS).

Comprimés (Voir à Comprimés PROBIOS).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-5.

PROBIOS ANTI B. COLI

Présentation :

Adultes :

4 ampoules incolores	5 cc. = Bactériophages.	} 30 fr. 60. 16 fr. 30.
4 ampoules jaunes	5 cc. = Antivirus.	
	Demi-boîte.	

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores de 1 cc. = Bactériophages.	} 11 fr. 95.
3 ampoules jaunes de 1 cc. = Antivirus.	

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, B. Paracoli, Friedländer et Proteus.

Indications. — Toutes infections provoquées par B. Coli, Paracoli, Friedländer et Proteus, notamment Bactériuries, Cystites, Pyérites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Vulvo-Vaginites, etc.

Mode d'emploi: Buvable, instillations vésicales ou dans le bassin.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-3.

PROBIOS ENTÉRO-RÉNAL

(Voies urinaires.)

Présentation :

Adultes :

Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. }
(5 ampoules de bactériophage claires). } 30 fr. 60.
5 ampoules d'antivirus jaunes.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 18 fr. 35.

Enfants : La boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 12 fr. 20.

Principes actifs. — Antivirus et bactériophages de B. Coli, para B. Coli-typhoïdiques et para-typhoïdiques, A et B ; B. Friedländer, Proteus, staphylocoques, streptocoques, entérocoques, B. pyocyaniques, B. dysentériques.

Indications. — Infections de l'appareil génito-urinaire, urétrites, Cystites, Prostatites, Métrites, Salpingites, Pelvipéritonites, Fièvre puerpérale, Coli-bacillose, Syndromes entérogénital ou entérorénal.

Mode d'emploi. — Par voie buccale ou par voie rectale, ou en injections vaginales.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-48.

PROBIOS INTESTINAL

Présentation :

Adultes :

5 ampoules incolores 2 cc. = Bactériophages. } 30 fr. 60.
5 ampoules jaunes 2 cc. = Antivirus.

La boîte de 6 ampoules de 2 cc. : 18 fr. 35.

Enfants et nourrissons :

3 ampoules incolores 1 cc. = Bactériophages. } 11 fr. 95
3 ampoules jaunes 1 cc. = Antivirus.

Principes actifs. — Antivirus et Bactériophages Anti-B. Coli, Dysentériques, Typhiques et Para, Friedländer, Proteus, Staphylococciques, Streptococciques, Entérocoques, Pyocyaniques.

Indications. — Entérites, Colites, Syndrome entéro-rénal, Stases et tous états toxi-infectieux : Diarrhées des nourrissons : Diarrhées des enfants ; Diarrhées saisonnières : Dysenterie bacillaire.

Mode d'emploi. — Buvable, instillations par voie rectale.

Comprimés (Voir *Comprimés Probios*).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-4.

PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE BUVABLE

Présentation. *Traitement complet.*

20 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant les Bactériophages.

20 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps bactériens. La boîte : 122 fr. 40.

Demi-traitement :

10 ampoules incolores de 5 cc., limpides, contenant les Bactériophages.

10 ampoules jaunes de 5 cc., troubles, contenant les Antivirus et les Corps Bactériens. La boîte : 71 fr. 40.

Principes actifs. — Antivirus Corps Bactériens Antigono-cocciques, Pseudo-Gonococciques, B. Coli, Entérocoques, Streptococciques, Staphylococciques, Bactériophages Anti-entérocoques, Streptococciques, Staphylococciques, B. Coli.

Indications. — Urétrites aiguës et chroniques à Gonocoques. Infections urinaires.

Mode d'emploi. — Buvable, applications locales, pansements mèches à demeure.

Vaccin Probios Antigonorrhéique injectable (Voir : Vaccinothérapie Probios).

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-8.

BUV-AKINTYL

Vaccin Curatif buvable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou.....	1 milliard.
Bacilles de Pfeiffer.....	100 millions.
Bacilles de Friedländer	1 milliard.
Bacilles Pyocyaniques	500 millions.
Streptocoques.....	100 millions.
Staphylocoque	2 milliards
Pneumocoque	100 millions.
Micrococcus Catarrhalis.....	500 millions.
Pour un centimètre cube dans un mélange d'Antivirus des mêmes bactéries, en proportions correspondantes.	

Présentation. — 10 tubes scellés bleus de 2 cc. 30 fr. 60

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche et ses complications.

Mode d'emploi. — Réservé aux cas où, pour des causes diverses, les injections ne sont pas acceptées ou sont pratiquement irréalisables. Le *Buv-Akintyl* sera employé selon les indications du médecin.

Voir Vaccins injectables à *Vaccinothérapie Probios*.

OVULES PROBIOS

Présentation. — En boîtes de 6 ovules sous cupules. 30 fr. 60

Principes actifs. — Extraits mous de mélange d'Antivirus et de Bactériophages de staphylocoques, streptocoques, entérocoques, B. Coli, extrait mou d'Antivirus de Diplococcus de Neisser.

Indications. — Affections gynécologiques, Vaginites, Métrites, etc.

Mode d'emploi. — Application locale, laisser l'ovule fondre dans la cavité vaginale.

DENTIFRICE PROBIOS

Présentation. — En tube d'étain. 7 fr. 65

Indications thérapeutiques. — Antipyorrhéique, Prévient et guérit toutes les affections inflammatoires de la bouche, des gencives et des dents.

Mode d'emploi. — Habituel aux dentifrices.

PROBIOS CREAM

Antipyogène

Présentation. — En tube d'étain. 9 fr. 15

Indications thérapeutiques. — Contre boutons, dartres, crevasses, engelures, rougeurs de toute nature.

Mode d'emploi. — En applications locales.

Laboratoires PROBIOS
8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

PROCOLYL

Comprimés dragéifiés.

Composition. — Opothérapie hépato-intestinale associée à une action crypto-toxique de premier ordre, douce et très puissante.

Indications. — Toutes les affections atoniques du foie et de l'intestin. Toutes les constipations.

Doses moyennes :

Adultes : 2 comprimés avant le repas du soir.

Enfants : 1 comprimé avant le repas du soir.

Prix. La boîte de 56 comprimés : 18 francs.

Dépôt chez tous les Grossistes.

Laboratoires du PROCOLYL

E. ROCHE, Pharmacien

9, rue de la Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

PROCUTA

Topique au Thiodiméthoxyanthranol.

Propriétés thérapeutiques. — Topique actif, non odorant, non irritant. Agent de rénovation et de réfection épidermique.

Le Procuta exerce une action incontestable sur le psoriasis (Dr Brocq).

Indications. — Psoriasis. Pityriasis. Parakératoses psoriasiformes. Kératose pileaire. Dermatoses à formes squameuses.

Mode d'emploi. — Étendre le *Procuta* sur la région malade. Protéger par un pansement.

Procuta et Procuta fort.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,

157, rue Championnet. — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

PRODYNASE

Médication Phosphorée, Calorique, Magnésinée.

Composition. — Comprimés comprenant :

Méthylphosphate de Chaux	0 gr. 20
Méthylphosphate de Magnésie	0 gr. 05

Propriétés. — Produit introduit nouvellement en thérapeutique par les auteurs. Médication spécifique du système nerveux. Puissant facteur de croissance. Contribue à la formation du squelette. Régulateur de la Nutrition.

Indications. — Surmenage, Croissance, Dystrophie phosphocalcique, Rachitisme, Fractures, Altérations dentaires, Grossesse, Allaitement, Tuberculose, Diabète, Asthénie, Cancer.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 comprimé au début des repas, midi et soir.

Adultes : 2 comprimés au début des repas, midi et soir.
Prix : 22 francs.

Laboratoires A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en Pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

PROGASTER

Procédé Hély.

(Nom déposé.)

Sous forme de comprimés.

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Superoxyde de magnésium préparé par une méthode spéciale (procédé Hély), permettant sa décomposition instantanée en présence du suc gastrique en oxygène et en chlorure de magnésium naissants. Chaque comprimé dégage 5 cgr. d'oxygène actif.

Propriétés. — Désinfectant remarquable du tube digestif. Amélioration surprenante de l'état général chez tous les chroniques. Action combinée de l'oxygène et du chlorure de magnésium à l'état naissant.

Indications. — Troubles digestifs, hépatiques, arthritisme, artériosclérose, diabète, toutes asthénies, convalescents. Tous les chroniques, tous les sédentaires.

Mode d'emploi. — Pas de contre-indication, pas d'accoutumance du nourrisson au vieillard.

Chez tous les chroniques : 2 comprimés le matin à jeun.

Dans les troubles digestifs : 2 à 6 comprimés et plus au moment de ces troubles.

Prix : 11 fr. 70.

E. ROCHE, Pharmacien.

Dépôt chez tous les Grossistes.

9, rue de la Platière, LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

PROGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par l'Acridine.
Ampoules de 10 cc. pour injection intraveineuse (solution à 0,5 %).

Comprimés : Acridine associée au Kawa et à l'Arbutine.

Propriétés. — Ne donne pas de choc acridinique ni d'accidents hépatiques ou rénaux, ne sclérose pas les veines et ne colore pas les téguments.

Posologie. — Ampoules : *Blennorragie aiguë*, 1 injection intraveineuse tous les jours ou tous les 2 jours pendant 2 à 3 semaines.

Blennorragie chronique de l'homme et de la femme, complications, 1 injection tous les 2 jours.

Comprimés : 4 à 8 par jour, au moment des repas.

Présentation et prix :

Progone (ampoules) : la boîte de 5 amp. de

10 cc 19 fr. 25

Progone (comprimés), l'étui de 30 comprimés.. 17 fr. 25

Bucco-Progone (pastilles), la boîte de 50 past.. 5 fr. 75

Littérature, Thèses de S. Lurie et de P. Porret. Travaux de P. Barbellion et J. Fuchs.

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 13-31.)

PROLYSES

(Ovules).

Lysats sodiques à 1/10^e d'émulsion microbienne de *gonocoques*, *streptocoques*, *staphylocoques*, *B. coli* et *cuti communis*.

Indications. — *Gynécologie générale*. Métrites, Salpingites et toutes infections microbiennes de l'appareil génito-urinaire chez la femme.

Présentation. — Boîte de 6 ovules.

Prix au public : 23 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1236-10.

Ch. VERGELOT, Docteur en pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. Trud. 10-88.)

PROMÉTHINE

Cholagogue et Décongestionnant physiologique.

Forme. — Granulé de saveur agréable.

Composition. — Peptone sèche pure, Sulfate de magnésie anhydre, Salicylate de soude, Extrait fluide de Romarin, Excipient spécial.

Indications. — Insuffisances hépato-biliaires, Lithiasse biliaire, Congestion hépatique et vésiculaire, Ictère et tous troubles d'origine hépatique.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café, le matin dans 1/2 verre d'eau tiède.

Laisser passer la phase aiguë des Cholécystites. Tâter la susceptibilité des Lithiasiques en commençant par des doses faibles.

Durée moyenne ; 10 jours.

Laboratoires R. GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS

(Tél. : Danton 81-53.)

PROPIDEX

Pommade à base de Propidon.

Bactériothérapie cutanée.

Indications :

Toutes plaies suppurées ou exposées à la suppuration. Furoncles, Brûlures : Ulcérations, Engelures, Excoriations, etc.

Présentation. — Tubes étain de 30 grammes.
Prix : 11 fr. 70.

Mode d'emploi. — Applications deux fois par jour ; recouvrir d'un tissu souple stérilisé.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIDON

Applications à la Bactériothérapie locale.

Propidon-Pansement :

Étui renfermant 1 ampoule de 5 cc.,
1 compresse, 1 coton, 1 imperméable.

Prix : 5 fr. 85.

Propidon usage externe.

Boîtes de 10 ampoules de 5 cc. sans
pansement. Prix : 26 fr. 50.

Indications. — Plaies cutanées de
toute nature, plaies chirurgicales,
angines, stomatites.

Propidon Stilligouttes :

Boîtes de 6 ampoules compte-gouttes.

Prix : 14 fr. 50.

Indications. — Oto-rhino-laryngologie
(Instillations, méchages).

Suppositoires au Propidon :

Boîtes de 10 suppositoires : Prix : 17 fr. 50.

Indications. — Lésions de la région
anale, hémorroïdes, rectites.

Ovules au Propidon :

Boîtes de 6 ovules. Prix : 17 fr. 50,
avec tampons stériles.

Indications. — Affections gynéco-
logiques, métrites, vaginites, panse-
ments post-opératoires.

Société Parisienne d'Expansion chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIDON

(Bouillon stock-vaccin du Professeur Pierre Delbet.)

L'association de cultures de streptocoques, de staphylocoques et de *B. pyocyaniques*, atténuées à la fois par la chaleur et par le vieillissement, confère à ce vaccin une action très efficace dans les affections à pyogènes.

Indications :

Staphylococcies fébriles, Anthrax, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Erysipèles, Affections gynécologiques, Vaccination préopératoire.

Posologie et mode d'emploi :

Injection intramusculaire ou sous-cutanée profonde du contenu d'une ampoule. A renouveler, s'il est nécessaire, après 24 ou 36 heures, jusqu'à 3 ampoules. L'injection donne lieu à une forte réaction fébrile d'eux bien supportée.

Présentation. — Boîte de 3 ampoules de 4 cc. Prix: 23 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PROPIVANE

Propyl-phényl-acétate de diéthylaminoéthanol
(Chlorhydrate).

Propriétés. — Médication spasmolytique agissant électivement sur les éléments nerveux et musculaire, non toxique, n'ayant pas les inconvénients de la belladone.

Indications. — Tous les spasmes ; en pathologie digestive, génito-urinaire, pulmonaire, circulatoire ; Maladie de Parkinson, mal de mer.

Présentations :

Dragées à 0 gr. 05. (flacons de 30 dragées) : 25 francs.

Solution à 5 p. 100 (pour injections intramusculaires, boîtes de 10 ampoules de 1 cc.) : 25 francs.

Suppositoires à 0 gr. 10 (boîtes de 10) : 25 francs.

Posologie :

Voie buccale : 2 à 3 dragées 2 à 3 fois par jour, dans un peu d'eau sucrée.

Voie parentérale : 1 à 2 ampoules par jour.

Voie rectale : 1 à 4 suppositoires.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

PROSTAL

Suppositoires Sédatifs.

Composition. — Extraits de Jusquiame, Ciguë, Ratanhia, Bromure de camphre, Prostatine, Hypophyse, Surrénine, Stovaine, Anesthésine, Menthol.

Propriétés. — Suppositoires analgésiques, décongestifs, opothérapiques.

Indications. — Affections douloureuses de la prostate et du petit bassin, Hémorroïdes.

Posologie. — 2 à 3 suppositoires par jour. La boîte de 10 suppositoires : 20 fr. 40

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

PROSTALYSE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition.

Hypophysine...	0,0001	Extrait de belladone...	0,001
Surrénine	0,01	— piscidia	0,01
Prostatine.....	0,02	— cupressus...	0,02
Orchitine	0,02	— œsculus	0,02
		Phosphate de Magnésie.	0,05

Propriétés pharmacodynamiques. — Stimule et régénère les fonctions de la prostate par une association synergique d'extraits de glandes endocrines, décongestionne la prostate par des extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives.

Indications. — Prostatites aiguës et chroniques. Hypertrophie de la Prostate. Congestions pelviennes.

Mode d'emploi. — 2 à 3 dragées à chacun des deux principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 17 francs la boîte de 60 dragées pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

PROSTATIDAUSSE

(Chalones testiculaires prostatolytiques.)

Nature du médicament. — L'adénome prostatique provient de l'hypertrophie de l'utriculé, résidu embryologique femelle inclus dans la prostate.

Cette formation reste atrophiée tant que le testicule fonctionne et exerce son action empêchante (effet de chalone) ; quand le déficit testiculaire survient, l'utricule se développe anormalement, écrase le canal de l'urètre et le prostatisme apparaît.

Le *Prostatidausse* est un extrait testiculaire de pouvoir chalonique très élevé. Son activité est maintenue grâce à la dissolution de la chalone dans son milieu quasi naturel, c'est-à-dire le sérum de taureau. Il est présenté sous forme d'ampoules de 5 cc. à utiliser par la voie buccale.

Indications thérapeutiques. — A titre préventif, le *Prostatidausse* sera pris par tous les sujets avoisinant la cinquantaine, surtout s'ils présentent un peu de dysurie et de la pollakiurie nocturne.

A titre curatif, il peut être utilisé à toutes les périodes de l'hypertrophie de la prostate, même dans les cas avancés ; il fait parfois réapparaître la possibilité des mictions spontanées.

Posologie et mode d'emploi. — Le *Prostatidausse* se délivre sous forme d'ampoules buvables et de suppositoires.

Ampoules, le matin à jeun, une demi-heure avant le petit déjeuner dans 1/2 verre d'eau sucrée.

A titre préventif, 6 à 12 ampoules par mois.

A titre curatif, 12 ampoules par mois, à raison d'une ampoule par jour, pendant 12 jours consécutifs, ou une ampoule tous les deux jours pendant 24 jours.

Cure d'entretien, 6 à 12 ampoules par mois, une tous les deux jours.

Suppositoires, le soir au coucher, même posologie que ci-dessus.

Le médicament ne provoque aucune réaction, il est bien toléré et ne comporte aucune contre-indication.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 68-40.)

PROSTATOLS BEAUXIS LAGRAVE

Suppositoires calmants, fondants, décongestifs, anti-infectieux, résolutifs de toutes affections prostatiques, aiguës ou chroniques.

Composition. — Ion Hg + (très petite dose) extrait de solanées et de papavéracées, Hamamelis, Hormones prostatiques totales.

Indications thérapeutiques. — Toutes douleurs, Inflammations (prostatites aiguës ou chroniques), Blennorrhagie et ses complications génito-urinaires, Ténésmes, Contractures, Spasmes divers, Pollakiurie nocturne, Pesanteurs et irradiations périnéales, Hypertrophie (adénomes-tumeurs) et toutes affections de la prostate, opérables ou non (suites opératoires).

Mode d'emploi. — Le plus habituel, un le soir au coucher.

(En boîte de dix suppositoires.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-4.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X°).

(Tél. : Botzaris 38-78.)

PROSTHÉNASE GALBRUN

Gouttes titrées. Solution organique de fer et de manganèse combinés à la peptone et à la glycérine, entièrement assimilable.

L'association de ces deux métaux en combinaison organique renforce singulièrement leur pouvoir catalytique et excito-fonctionnel réciproque. Ne donne pas de constipation. Tonique puissant. Reconstituant énergétique.

Anémie, Chlorose, Débilité, Convalescence.

XX gouttes de Prosthénase contiennent 1 cgr. de fer et 5 mgr. de manganèse.

V à XX gouttes pour les enfants,

X à L gouttes pour les adultes.

Prix de vente au public : 17 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 33-2.

Laboratoire GALBRUN

10 et 12, rue Guynemer, St-Mandé (Seine).

(Tél. : Daumesnil 10-38.)

PROSTIGMINE « ROCHE »

Péristaltigène synthétique.

Anti-myasthénique

Composition. — Esterdiméthylcarbamique du *m*-oxyphényltriméthylammonium-méthyl-sulfate.

Propriétés. — Action rapide et sûre sans aucun effet sur l'activité cardiaque et la pression sanguine.

Indications. — *En Injections* (ampoules de 1 cm³ dosées à 1/2 mg.). Atonie intestinale post-opératoire, Atonie réflexe post-partum et post-abortionum, Douleurs abdominales, Rétention d'urine post-opératoire, Spasme de l'uretère, Obstruction intestinale du nourrisson intoxiqué, etc.

En comprimés (dosés à 15 mg.), Dystrophies musculaires, Myasthénies, Myopathies, etc.

Posologie et modes d'emploi. — Pour provoquer l'évacuation des gaz : 1 ampoule de 1 cm³ le lendemain de l'opération. Pour provoquer l'évacuation alvine : 1 ampoule de 1 cm³ suivie d'un lavement de 200 cm³ d'une solution glycinée à 10 p. 100 une demi-heure après l'injection. **Dans les myopathies** et surtout dans la **myasthénie**, la prostigmine s'administre à des doses variant de 2 à 5 ampoules de 1 cm³ par voie sous-cutanée 2 à 3 fois par jour ou mieux 2 à 6 comprimés par jour par voie buccale.

Présentation. — La Prostigmine « Roche » se présente sous deux formes : *Ampoules* de 1 cm³ dosées à 1/2 mg. pour injections sous-cutanées ou intramusculaires et *Comprimés* dosés à 15 mg.

Ampoules : boîte de 6. Comprimés : flacon de 20.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-56 (ampoules), 504-85 (comprimés).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Arch. 91-10.)

PROSYMPAL

(883 F.)

Chlorhydrate de benzo (diéthylaminométhyl)-dioxane
Chimiothérapie sympathicolytique.

Indications. — Traitement symptomatique de l'angine de poitrine.

Présentations et Posologie :

Comprimés : Dosés à 0 gr. 01 (tubes de 100).

Ampoules : De 2 cc. dosées à 0 gr. 05 (boîtes de 10).

0 gr. 10 à 0 gr. 20 par jour par prises fractionnées.
Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 ampoule à renouveler dans la journée en cas de besoin.

Prix de vente :

Le tube de 100 comprimés : 25 fr.

La boîte de 10 ampoules : 25 fr.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

PROTENSÈNE LEJEUNE

Composition. — V gouttes contiennent :

Iode bisublimé	1 cgr.
Peptone de cœur	4 cgr.
Extrait fluide stabilisé de gui	5 cgr.
Extrait fluide stabilisé de genêt	1 cgr.

Propriétés thérapeutiques. — Propriétés de l'iode et des iodures sans *iodisme*.

La *Peptone de cœur* est un agent thérapeutique précieux de la débilité myocardique constitutionnelle et de la dégénérescence myocardique acquise.

L'*extrait de gui* est un hypotenseur éprouvé, il régularise les battements du cœur.

Le *genêt* est en même temps un toni-cardiaque et un diurétique.

Indications. — Hypertension, artériosclérose, affections cardio-vasculaires.

Mode d'emploi. — XX à XXX gouttes à chacun des 2 principaux repas.

Prix : 18 fr. 85.

Laboratoires A. LEJEUNE

142, rue de Picpus — PARIS (XII^e). (Tél. Dorlan 47-00.)

PROTÉODYNE

Professeurs DUBARD et VOISENET de Dijon.

Composition. — Sélection de noyaux aminés de Peptones et d'Albumoses.

Formes. — Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 25 de principes actifs (*Enfants*).

Ampoules de 5 cc. à 0 gr. 50 de principes actifs (*Adultes*).

Injectons hypodermiques indolores.

Jamais de choc, ni de réactions anaphylactiques.

Propriétés. — Par ses effets préventifs et curatifs des infections fébriles et des intoxications, la Protéodyne est une arme puissante toujours à la disposition du médecin devant une infection dont il n'a pas le sérum spécifique.

Indications. — Infections fébriles en général. Grippe, Pneumonies, Fièvres typhoïdes, puerpérales, etc. Dermatoses par auto-intoxication, Urticaires. Furunculose ; désensibilisation de tout syndrome anaphylactique : Asthme vrai, Asthme des foin, Migraines, etc.

Doses. — *Adultes* : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 50 à la première injection.

Enfants : 1 à 2 ampoules à 0 gr. 25 à la première injection.

A renouveler de 24 en 24 heures ou de 48 en 48 heures si la sédation des accidents infectieux n'a pas été obtenue ou ne s'est pas maintenue.

Chez le jeune enfant, réduire la dose suivant l'âge et le poids.

La Protéodyne ne doit être employée que sous le contrôle du médecin.

Prix : La boîte 4 ampoules Protéodyne, 20 fr. 80.

Communications du professeur DUBARD de Dijon : Journal de médecine et de chirurgie pratique, 1919 ; La Clinique et le Scalpel, 1923.

Littérature et Echantillons sur demande au

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

PROTIODYNE DRAGÉES

Composition. — Albumoses et Peptones iodées, Sulfate de magnésie.

Propriété. — Désensibilisation de tout syndrome anaphylactique.

Indications. — Manifestations anaphylactiques en général : migraines, urticaires, prurits, eczémas, entérocolites, asthmes, troubles digestifs par assimilation défectueuse : rougeurs de la face, somnolences, flatulences, pesanteurs après les repas, etc., etc.

Forme. — Comprimés dragéifiés, à 0 gr. 40 de principes actifs.

Doses et mode d'emploi. — Une heure avant chacun des trois repas. *Adultes* : deux dragées.

Enfants : une dragée. La dragée ne doit être ni croquée, ni sucée, mais avalée avec un peu d'eau.

Prix : la boîte de 50 dragées Protiodyne : 18 fr. 70.

N° Enregistrement L. N. C. M. 216-9,

Littérature et échantillons sur demande.

Laboratoire général d'Études Biologiques S. A.

29, place Bossuet — DIJON. — (Tél. : 16-42.)

PROTO-GAMBIER

(Comprimés de)

Principe actif. — Protochlorure de mercure léger et dissociable.

Propriétés. — Antiseptique, désinfectant gastro-intestinal, Purgatif, Cholagogue et cholérétique, Vermifuge, Diurétique.

Indications. — Toutes celles du calomel ordinaire, dont il n'a aucun des inconvénients.

Présentations. — Comprimés de 1 milligramme, 1 et 5 centigrammes.

Chaque comprimé porte sur l'une de ses faces le nom et le dosage ; sur l'autre, une rainure en croix qui permet de le diviser en 2 ou 4 parties égales.

Boîte de 45 comprimés répartis en trois tubes, dont un métallique.

Posologie. — En principe, les doses à employer sont moitié moindre que celles du calomel. Leur administration doit être fractionnée

Enfants au-dessous d'un an : 1 à 2 comprimés de 1 mgr. par jour.

Enfants de un à 4 ans : 1/4 à 1 comprimé de 1 mgr. par jour.

Enfants de 4 à 7 ans : 1 à 3 comprimés de 1 mgr. par jour.

Adultes et enfants au-dessus de 7 ans : 1/2 à 3 comprimés de 5 mgr. par jour.

Spécialités Roger BELLON

J. GAUTIER, Pharmacien,

Laboratoire du GAMBÉOL 42, rue Emile-Deschanel.

Fournisseur du Ministère de la Santé Publique et des Hôpitaux.

COURBEVOIE (Seine). — (Tél. : Déf. 17-67.)

PROVAC'S

Vaccin polyvalent, injectable par voie sous-cutanée, constitué par les microbes anaérobies pathogènes de la flore bucco-pharyngo-dentaire.

Composition. — Spirochæta microdentium, Spirochæta macrodentium, Leptospira buccalis, Bac. fusiformis, Bac. ramosus, Staphylococcus parvulus, Micrococcus foetidus.

Indications :

Préventivement : avant toute opération effectuée dans la cavité buccale ou ses annexes.

Curativement : toutes les affections dues à la flore bucco-dentaire : angines, stomatites, abcès et phlegmons de l'amygdale, adénoïdites, sinusites, accidents de la dent de sagesse, arthrites dentaires aiguës et chroniques (pyorrhée), alvéolites, suppurations chroniques broncho-pulmonaires.

Posologie et mode d'emploi :

Lieu d'injection : face postérieure du bras.

Mêmes doses pour les enfants et pour les adultes.

La grossesse n'est pas une contre-indication.

Cas aigus : 2 cc. d'emblée et 1 cc. matin et soir.

Cas subaigus : 0,5 cc. à 1 cc. par jour.

Cas chroniques : débiter par 0 cc. 1, augmenter lentement, espacer les injections (2-3 jours).

Précautions. — Les asthmatiques, les eczémateux, les malades atteints de suppurations fétides broncho-pulmonaires sont quelque fois hypersensibles au Provac's ; il est indispensable de ne commencer leur traitement que par de très faibles doses, 1/20^e ou 1/10^e de cc.

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 1 cc., pour la vente au public. Boîte de 20 ampoules, pour dentistes et hôpitaux exclusivement.

Laboratoire Pharmaceutique DAUFRESNE
42, rue Thiers — LE HAVRE.

PROVEINASE MIDY

(Comprimés) Type de l'Endocrino-Phytothérapie veineuse.

Composition :

1° Extraits secs (desséchés dans le vide) de plantes stabilisées : Cupressus, Genêt, Marron d'Inde, Hamamélis et Viburnum.

2° Poudres titrées d'organes frais, prélevés aux abattoirs de Paris, obtenues dans nos Laboratoires par procédé spécial MIDY : Thyroïde 0,005, Surrénale 0,025, et Hypophyse 0,015.

Ces poudres sont mises en comprimés dès fabrication.

Propriétés thérapeutiques. — Synergie régulatrice de l'insuffisance veineuse. Associe les effets organothérapiques des glandes endocrines et les vertus vaso-constrictives de plantes soigneusement sélectionnées.

Indications. — Toutes les affections du système veineux : Varices, Varicosités, Varicocèles, Ulcères variqueux, Hémorroïdes, Œdèmes post-phlébitiques, Troubles consécutifs de la Ménopause et de la Puberté.

Mode d'emploi :

États chroniques : 2 à 4 comprimés par jour.

États aigus : 3 à 6 comprimés par jour.

Prix : 17 fr. 60.

Durée du traitement : 10 à 15 jours

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

PROVULSIF PROBIOS

Révulsif liquide.

Présentation. — En flacon avec pinceau (11 fr. 95).

Principes actifs. — Teinture de lavande, Teinture de capsicum, Méthane tétrachloré, Essence de térébenthine, Essence de moutarde, Essence de serpolet.

Indications. — Contre les affections des voies respiratoires, Névralgies, Douleurs intercostales, Rhumatismes.

Mode d'emploi. — Badigeonner le dos et la poitrine ou la partie malade, recouvrir ensuite la partie malade avec une feuille d'ouate hydrophile aspergée d'eau de Cologne.

Enregistré au L. N. C. n° 900-32.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

PROXYTOL

Composition. — Association des diastases tissulaires des organes de la digestion (foie, estomac, intestin, pancréas).

Propriétés. — Régénérateur des fonctions digestives.

Indications. — Dyspepsies, Entérites, Insuffisance hépatique, Gastro-entérite des nourrissons.

Forme. — Boîte de 36 comprimés.

Posologie.

Adultes : Croquer de 4 à 6 comprimés par jour, le matin à jeun ou loin des repas.

Enfants : Demi-dose.

Nourrissons : 2 à 4 comprimés dissous dans l'eau à prendre 3/4 d'heure avant les tétées.

Prix : 14 fr. 80.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

PRUNAGAR

Pruneaux, Agar-Agar, Cholagogues végétaux.

Le **PRUNAGAR** est sans danger ; son efficacité est souveraine pour le traitement de la constipation chronique ou accidentelle et de toutes ses conséquences (vertiges, migraines, énervements, pituites, glaires, états nauséux, dyspepsies, congestions, etc.), il devient un parfait régulateur de l'intestin.

Le **PRUNAGAR** n'irrite pas l'intestin en forçant sa muqueuse à sécréter ; il provoque des contractions douces, semblables à celles qu'on obtiendrait par un massage bien fait.

Le **PRUNAGAR** est en dragées, en forme de lentilles ; d'un emploi facile, avaler sans croquer une ou deux dragées, avant ou pendant le repas du soir, suivant le résultat cherché. La selle arrive naturellement le matin, sans colique ni douleur.

En boîte aluminium de 50 dragées. Prix : 14 fr. 55.
L. N. C. 428-1.

Laboratoire du Docteur VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 18-54.)

PRURILYSE

Spécifique du Prurit.

Composition :

Chloral, acide acétique, eau distillée double d'Hamamélis, glycérine, eau de menthe.

Indications :

Prurit anal, vulvaire, sénile, etc. Urticaire, Herpès, Prurigo, Piqûres d'insectes et toutes démangeaisons.

Mode d'emploi :

Lotionner les parties atteintes de Prurit, une ou plusieurs fois par jour.

Produit non toxique, ne tache pas, ne graisse pas.

Prix : 17 fr. le flacon.

— 8 fr. le flacon d'essai.

Laboratoire R. ROUSSEL

72, Grande-Rue — FLERS (Orne).

PSORÉAL DRAGÉES

Traitement interne du psoriasis et autres dermatoses

Composition. — Soufre — Hyposulfites de Na et Mg. — Bi-Tartrate de K. — Résine de Gayac — Rhubarbe.

Propriétés. — Médication anti-choc et de désensibilisation. Action du S. sur cellule hépatique et élimination par la peau. Action stimulante de tous les composants sur les glandes de défense : Hépto-biliaires, Rénales, Sudoripares.

Indications. — Traitement interne du Psoriasis, des Eczémas, Herpès, Prurits, Urticaires et autres dermatoses pouvant provenir d'une auto-intoxication, anaphylaxie, floculation ou d'une imprégnation de l'organisme par des toxines alimentaires, médicamenteuses, etc...

Posologie.

Adultes : 1 à 3 dragées au début des 3 repas (moyenne 6 par jour).

Enfants : 1 à 3 dragées par jour, suivant l'âge. Durée habituelle du traitement : un mois.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : le flacon de 60 dragées : 19 fr. 10 franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON

à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORÈNE GOUTTES

Traitement interne du psoriasis.

Gouttes *iodo-arsenicales-hydrargyriques-méthylarsinées*.

Propriétés. — Action spéciale de As — I — et Hg pour combattre l'imprégnation de l'organisme par les toxines microbiennes d'origine suspecte, acquise ou héréditaire (Φ ou Σ souvent associées).

Indications. — *Traitement interne du psoriasis* (ou d'entretien après piqures ou cures thermales). Affections héréditaires, Déchéance organique hérédo-spécifique, Lupus.

Mode d'emploi. — 1° *Enfants*. I à II gouttes par jour et par année d'âge, en 2 ou 3 fois, à partir de 2 ou 3 ans.

2° *Adultes*: X à XX ou même XXX gouttes 2 à 3 fois par jour, soit de XXX à LX ou XC gouttes par 24 heures. Dose habituelle LX gouttes par jour. Commencer par XXX gouttes par jour en augmentant, rester 20 jours à la dose maxima, revenir au point de départ et suspendre 10 jours. Recommencer le traitement.

Mentionner sur l'ordonnance : A renouveler.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : le flacon, 19 fr. 10. Envoi franco France et Colonies.

Laboratoire ÉON

à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORÉON

Traitement interne du Psoriasis

Composition. — Médication Chrysophanique-Hydrargyro-Cadique, sous forme pommade en tubes.

Propriétés. — Spécifique du *Psoriasis*. Réducteur complet, anti-prurigineux et kératoplastique. Spécialité efficace, pratique, non irritante.

Indications. — Unique en son genre, ce médicament est réservé au traitement local du Psoriasis et des affections psoriasiformes.

Mode d'emploi. — En applications pendant la nuit après un sérieux nettoyage des plaques.

Présentation. — Tube ordinaire : 21 fr. 20. Tube très grand modèle : 53 francs. Conditions spéciales aux Hôpitaux, Sanatoria, Cliniques, Dispensaires, etc... Envoi franco France et Colonies.

Enregistré au L. N. C. M.

Laboratoire ÉON, à DINAN (Côtes-du-Nord).

PSORYL

Dérivé anthranolique employé dans le

TRAITEMENT EXTERNE

des

I. — *DERMATOSES NON IRRITABLES*

Psoriasis.

90 p. 100 de résultats. *Associer le régime sans graisses.* (Ann. dermat. et syphil., juin 1938.)

Parakératoses, Eczémas squameux ou secs, non irritables, Lichens plans chr., Lichénifications secondaires.

II. — *DERMATOSES PARASITAIRES*

Trichophyties, Epidermophyties, Erythrasma, Pythiriasis, Eczémas mycosiques, **Teignes**, **Tokeleau**.

III. — *DERMATOSES DIVERSES*

Pelades : résultats constants.

Formes et mode d'emploi :

1° *Solution* : S'emploie dans le **psoriasis** du tronc et des membres (action rapide, procédé propre, sans odeur), dans les parakératoses, les **pelades**.

Un badigeonnage léger le soir.

2° *Pommade* : Une application légère le soir.

Prix, solution ou pommade : 19 fr. 10.

Laboratoire R. SAVOIRE

Docteur en pharmacie,

Ancien Interne des hôpitaux de Paris.

VENDOME

(Téléphone 26.)

PSOTHANOL

Composé arséno-bismuthique soluble.

Indications thérapeutiques. — Parakératoses psoriasiformes. Psoriasis avec ou sans arthropathies.

Présentation. — Ampoules de 3 cc. avec anesthésique pour injections intramusculaires.

Ampoules de 3 cc. sans anesthésique pour injections intraveineuses.

Posologie. — Une ampoule tous les 2 jours en commençant par 1/4 d'ampoule et en augmentant la dose suivant la tolérance du malade. Séries de 30 injections.

Boîte de 10 ampoules : 34 francs.

Thérapeutique autophylactique, rénovation leucocytaire : Psothanol en amp. de 1 cc. pour injections intramusculaires.

Boîte de 10 ampoules : 28 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

PSYLLIUM LANGLEBERT

Composition :

Semences de Psyllium noir de Provence, sélectionnées et triées à la main, ne renfermant ni pierre ni débris végétaux.

Indication :

Par le mucilage qu'elles contiennent, les semences de Psyllium Langlebert augmentent le volume du contenu intestinal ; ramollissent les selles dures et agglutinent les selles liquides. Recommandé aussi bien dans la constipation que pour l'entérite.

Mode d'emploi :

Une à deux cuillères à soupe le soir dans le potage, ou pur, et après, absorption d'un demi-verre d'eau.

Prix de vente au public : 14 fr. 50

Laboratoires TAOHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

PUERICRINE REY

Complexe Endocrino-arsenical à l'usage des enfants et des adolescents.

Présentation. — Sirop parfumé agréablement.

Composition. — Extraits hépatique, splénique, médullaire, surrénal, hypophysaire, thyroïdien. Méthylarsinate disodique.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles de la croissance. Toutes les dysendocrinies congénitales ou acquises. Tous les troubles de la puberté, du développement. Toutes les convalescences, toutes les asthénies.

Puéricrine Rey est un adjuvant indispensable du traitement des cachexies, tuberculose sous toutes ses formes, anémies, chlorose, lymphadénie, leucémie, toutes les affections chroniques.

Posologie :

Enfants au-dessus de 4 ans : 1 à 2 cuillerées à dessert par jour, avant les repas.

Enfants au-dessous de 4 ans : 1 à 2 cuillerées à café par jour, avant les repas.

(Interrompre le traitement 10 jours par mois.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 302-7.

Laboratoires REY

DIJON

(Tél. : 22-12.)

PULMO BAILLY

Anciennement
PULMOSÉRUM

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 363-50.

Forme. — Solution.

Solution codéinée de Gaïacol synthétique en milieu phosphorique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Modificateur de l'expectoration. Sédatif de la toux. Antiseptique des voies respiratoires. Reconstituant de l'état général.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires. — Grippe. — Toux catarrhale. Laryngites. — Bronchites. — Congestions pulmonaires. — Séquelles de Coqueluche et de Rougeole.

Mode d'emploi. — 3 à 4 cuillerées à soupe dans un peu d'eau, à prendre dans la journée ou au milieu des deux principaux repas.

Le flacon de 270 cc. : 18 fr. 50.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome - PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 62-30.)

PULMOCARDINE

SIMPLE

Indications. — Affections dyspnéiques pulmonaires et cardio-pulmonaires : *Asthme, Emphysème, Bronchites chroniques, Scléroses pulmonaires, Gazés de guerre.*

Composition. — *Dragées faciles à prendre.*

Iodure de Caféine. Grindélia. Lobélia. Quebracho.

Doses. — 2 dragées au début des 2 repas.

Traitement pour 10 jours : 18 francs.

CONTRE TOUTE CRISE AIGÜE DE DYSPNÉE :

Remplacer la Pulmocardine simple
par **Pulmocardine ÉPHÉDRINÉE**

1 dragée toutes les 1/2 heures, jusqu'à effet.

Soulagement immédiat.

Littérature et échantillons :

Enregistré au L. N. C. M. n°s 487-4 et 6.

Les Laboratoires PERROCHON

A. ABADIE, Dr en Pharmacie. TOURS (Tél. 54.65.)

PULMODION

1° Tube de 30 comprimés dragéifiés à base de Dionine.

Chaque comprimé représente :

Dionine (chlorhydrate d'éthylmorphine)	0,004
Extrait d'Aconit	0,003
Extrait de Belladone	0,003
Extrait de Marrube	0,10
Extrait de Drosera	0,01
Terpine	0,05

2° Sirop à base de Dionine, Sulfogalacolate de potasse, Bromoforme.

Indications. — Affections respiratoires, Traitement énergique de la toux et de l'oppression dans les cas de bronchite, Trachéite, Laryngite, toux nerveuses.

Grâce à la Dionine, activité remarquable sans *accoutumance* et tolérance parfaite par l'estomac.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1° *Comprimés* : enfants à partir de 10 ans : 2 à 4 comprimés suivant l'âge.

Adultes : 4 à 6 comprimés à prendre en dehors des repas.

Avaler sans sucer ni croquer.

2° *Sirop* : enfants au-dessus de 10 ans : 3 à 5 cuillerées à café.

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Contenance du flacon de sirop : 220 grammes.

A prendre le plus loin possible des repas. Prix : chaque forme : 17 fr.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-7.

Laboratoires JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII°). (Tél. : Marcadet 37-98.)

PULMODYNOL

Spécifique broncho-pulmonaire tonique et eupnéique.

Formule :

Chlorhydrate d'Ephédrine	0 gr. 05	Codéine	0 gr. 015
Sulfate de Sparteïne....	0 gr. 075	Alcoolature rac. d'aconit.....	0 gr. 36
Chlorhydrate d'éthylmorphine	0 gr. 015	Teinture de Belladone.....	0 gr. 36
Acide phosphorique ..	1 gr.	Teinture de Drosera ..	0 gr. 72
Sulfogalacolate de potasse	1 gr. 10	Teinture de Grindelia..	0 gr. 72
		Essence de Rhum.....	0 gr. 09
		Sirop de sucre q. s. p...	100 gr.

Flacon de 210 gr. environ. Prix : 17 fr. 35.

Particularités. — Contient éphédrine, sparteïne et acide phosphorique associés aux sédatifs de la toux et aux antiseptiques pulmonaires. Goût très agréable. Tolérance absolue.

Emploi. — De 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. } Existe en ampoules
1 à 2 par jour.

Ampoules : Lécithine, Goménol, Eucalyptol, Cholestérine, Strychnine.
Ampoules de 2 cc.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës et chroniques. Bronchites, Emphyseme, Asthme, Catarrhe, Grippe, Laryngites.

L.N.C. Pulmodynol sirop N° 742-16. Pulmodynol ampoules N° 742-15.

Laboratoires du SEDATHRYL

(Antirhumatismal.)

P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie,

32, rue de l'Ouest, PARIS (XIV°).

PULMOFLUIDE

Élixir glycéro-alcoolique de **Terpine** et **Terpinol**, associés aux balsamiques : eucalyptus, tolu, benjoin, traités par procédé spécial d'extraction. **Ipéca**, **Aconit**.

Antiseptique, modificateur des sécrétions bronchiques (fluidifie).
Expectorant, décongestif.

Sédatif par de faibles doses de belladone et de **Codéine**, le plus sûr et le plus inoffensif des alcaloïdes de l'opium.

Indications. — Rhumes, Bronchites, grippe, Congestions pulmonaires, Broncho-pneumonie, Tuberculose pulmonaire et, en général, tous les cas où un **Dégagement broncho-pulmonaire** s'impose rapidement.

Pas de contre-indications. Favorise l'appétit et la diurèse, n'augmente pas la glycosurie.

Doses. — 3 à 4 petits verres à liqueur par jour, pur ou dans un liquide quelconque.

Prix : 13 fr. 50 le flacon de 187 cc.

PULMOFLUIDE ÉPHÉDRINE

Même formule que le précédent avec 1 centigramme de chlorhydrate d'Ephédrine g. par cuillerée à soupe.

——— **Eupnéique incomparable.** ———

Indications principales. — Asthme bronchique, Emphysème, Trachéo-bronchite, Bronchite chronique, Oppression. Doublement efficace chez les tuberculeux hypotendus.

Contre-indications. — États hypertensifs, Myocardites, Néphrites. Dans ces différents cas l'on peut alterner avec le Pulmofluide simple.

Mode d'emploi. — *Doses :*

Adultes : 1 cuillerée à soupe 3 à 4 fois par jour.

Au-dessus de 10 ans : 1 cuillerée à dessert 3 à 4 fois par jour.

Au-dessus de 5 ans : 1 cuillerée à café 3 à 4 fois par jour.

Comme préventif et curatif de la crise d'asthme :

1 cuillerée au début de l'accès, puis de 2 heures en 2 heures, sans dépasser la dose quotidienne.

On pourra prévenir la crise en prenant 1 cuillerée 1 heure ou 2 heures avant son apparition habituelle.

Prix : 15 francs le flacon de 187 cc.

Laboratoire LEURQUIN
DREUX

PULMONE

Indications. — Pré-Tuberculose, Tuberculose, Toutes les maladies des voies respiratoires.

Nouvelle entité pharmaco-dynamique dans la thérapeutique antibacillaire formant la première Association médicamenteuse à base phytothérapique, opothérapique et chimiothérapique.

Composition. — Groupe phytothérapique : Ail.

Groupe Opothérapique : Poumon-Foie-Rate-Moelle des os rouges-Ovaires-Orchitine.

Groupe chimiothérapique : Glycogène-Vanadate et Arséniate de soude-Phosphore-Calci um-Potassium.

Propriétés. — Reconstituant général.

Présentations. — Elixir-Ampoules-Cachets.

Posologie. — *Elixir* : 1 cuillerée à café avant les 2 repas dans 1/4 de verre d'eau bien sucrée.

Prix du flacon de 155 gr. : 35 francs. (Durée : 22 jours.)

Ampoules (exclusivement par le médecin ou sous sa direction) : 3 séries : la première série, 6 jours de suite 1 inj. sous-cut., repos 4 jours.

Reprendre pendant 6 jours., repos 7 jours. — Opérer de même pour les séries suivantes. Ces séries seront répétées s'il y a lieu et de la même façon.

Boîte de 6 : Prix : 25 Fr. (Durée : 6 jours.)

Cachets : Un cachet avant les 2 repas, à faire prendre alternés avec les périodes de repos des piqûres, ou pour remplacer ces dernières suivant le degré de pusillanimité du malade.

Boîte de 24 : Prix : 25 Fr. (Durée : 12 jours.)

Enregistré au Lab. Nat. Cont. 1734-3 à 5.

Laboratoires BIOS

10, rue Vineuse, PARIS (16^e). — (Tél. : 57-44.)

PULMORECTOL

(Ampoules.)

(Suppositoires adultes, enfants et nourrissons.)

Forme. — Ampoules et Suppositoires (adultes, enfants et nourrissons).

Composition. — Héléline, Codéine et essences balsamiques pures.

Indications. — Bronchites, Pneumonies, Broncho-Pneumonies, Coqueluche, Tuberculose et abcès fistuleux.

Posologie. — Une ampoule de 2 cc. à mélanger dans une cuillerée à soupe de lait en lavement à garder, ou suppositoires.

Prix : { Ampoules : 22 fr. 90
 { Suppositoires : 19 fr. 50.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, r. des Moines, Paris 17^e. (Tél. : Mar. 04-02.)

PULMOREX

(109 M.).

Traitement des Streptococcies et des Affections broncho-pulmonaires.

Composition. — Nouveau dérivé soluble de la paraaminophénylsulfamide, très actif, ne donnant pas d'anémie, sans action nocive sur le sang.

Indications. — Bronchites chroniques, Affections du cavum, Affections broncho-pulmonaires aiguës et subaiguës, Traitement des Streptococcies, Erysipèle, Fièvre puerpérale, Traitement des Ménin-gococcies et des Gonococcies.

Formes. — Comprimés, ampoules pour injections intraveineuses.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 comprimés par jour au milieu des repas
Dans les formes aiguës, 6 à 10 comprimés par jour.

Enfants : Moitié ou tiers de ces doses.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur agrégé à la Faculté de Médecine,

Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARENNE
près Saint-Denis (Seine). (Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

PULMOSEPTINE

Dragées.

Composition. — Eucalyptol, Phosphate de Galacol, Terpène, Cinnamate de Soude, Codéine, Lactate de Chaux.

Indications. — 1^o *Toutes affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures* : Rhino-pharyngites, Laryngites, trachéites, trachéo-bronchites, bronchites aiguës, gripes à forme respiratoire, etc.

2^o *États chroniques* : Laryngites chroniques, catarrhe respiratoire des fumeurs, bronchites chroniques, etc.

3^o *Toux nerveuses de toute origine* : toux spasmodique, coqueluche et toux coqueluchoïde, accidents mineurs de l'asthme, etc.

Forme et posologie. — Un flacon de 48 dragées.

Adultes : 6 à 8 dragées par jour dans les états aigus, 3 à 4 dragées par jour dans les états chroniques.

Enfants : demi-doses.

A prendre à n'importe quel moment de la journée (avant, pendant ou après les repas).

Prescrire par exemple : 3 dragées à avaler avant le repas du soir et 3 avec une infusion chaude avant dormir.

Aucune contre-indication. — Ne provoque pas de constipation.
N'irrite pas l'estomac.

Prix : 15 fr. 75, taxe comprise.

Laboratoires des SPÉCIALITÉS CABASSON

A. GROS-CAVALIER, Docteur en Pharmacie,
183, rue de Rome — MARSEILLE.

PULMO-THIORINE

Opothérapie pulmonaire. Extrait trachéo-broncho-pulmonaire. Hypo-sulfite de soude et de magnésie granulé.

Thérapeutique de fond de toutes les affections pulmonaires subaiguës et chroniques et de toutes les suppurations de l'arbre respiratoire et de ses annexes.

Indications. — Ozène, Sinusites. Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches. Adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites. Trachéo-bronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Gangrène pulmonaire. Catarrhes chroniques. Bronchites persistantes des gazés et des vieillards. Tuberculose pulmonaire (formes torpides et formes sécrétantes). Pneumonies et séquelles de pneumonies. Pleurésies séro-fibrineuses. Pleurésies purulentes de la grande cavité de l'interlobe ou du médiastin. Kystes hydatiques pulmonaires suppurés, fistulisés. Ostéo-arthropathies pneumiques.

La cuillerée à café 5 gr. de granulés renferme : 0,25 d'extrait pulmonaire, 0,20 d'hyposulfite de Na et 0,05 d'hyposulfite de Mg.

Dose et mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café 3 fois par jour avant les repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau.

Enfants : 1/2 ou 1/4 de dose.

Prix : 17 fr. 65.

Laboratoire de la SULFO-THIORINE

J. DEDIEU, Pharmacien,

39, rue Fondaudège — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

PULSAMONE

Antispasmodique végétal.

Composition. — Anémone pulsatille, Gui, Passiflore, Saule Blanc, Mélisse, Aubépine.

Forme. — Solution aromatique et comprimés sans sucre.

Propriétés. — Médication équilibrante du système nerveux central ; action complémentaire efficace dans les névroses liées à l'irritabilité du sympathique.

Avantages. — Composition strictement végétale et atoxique ; absence rigoureuse de stupéfiants et de barbituriques.

Indications. — Nervosisme, Insomnies, Anxiété, Aéro-phagie, Troubles cardiaques et menstruels d'origine nerveuse, et tous cas de déséquilibre vagosympathique.

Posologie. — 3 à 4 cuillerées à café ou 3 à 4 comprimés. par jour.

Prix : Le flacon 16 fr. 65.

Le tube de 50 comprimés : 17 fr.

Georges BLAQUE

Docteur en Pharmacie, Licencié ès Sciences

59, rue Boissière — PARIS (XVI^e). (Tél. : Kléber 88-70.)

PULVÉOL

(Poudre et pastilles.)

réalisant l'antisepsie du carrefour aéro-digestif.

Antiseptique volatil, dénué de causticité, à base de menthol (*faible dose*), eucalyptol, terpinol, acide borique et borate de soude.

INDICATIONS. — *Oto-rhino-laryngologie et stomatologie courantes.*

— Sinusites, rhinites, pharyngites, trachéites, affections du cavum, angines, stomatites, gingivites. Calme toutes les dysphagies.

Affections respiratoires. — Trachéo-bronchites, gripes à forme respiratoire, asthme, coqueluche.

Hygiène du nez, de la gorge, et de la bouche dans les pyrexies ; dentifrice en nature sur la brosse à dents dans les traitements spécifiques mercuriels ou bismuthiques.

Usage hygiénique : tous professionnels de la voix.

MODE D'EMPLOI. — **Poudre** : inhalation avec une cuiller à café de poudre dissoute dans un bol d'eau bouillante.

Les éléments volatils disparus, il reste une excellente solution tiède antiseptique et isotonique pour gargarismes, bains de gorge ou lavages de bouche. Contenance du flacon 100 grs.

Pastilles. — 8 à 10 par jour. Boîte de 40 pastilles.

Prix : Poudre : 14 fr. 90 — Pastilles : 5 fr. 75.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 121-4.

Laboratoire JUIN

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Marcadet 37-98.)

PULVI-LACTÉOL

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés : 176 670 000 000 pour 100 grammes.

Propriétés. — *Favorisant de la cicatrisation.* Dès les premiers pansement, les plaies se détergent, sont désinfectées et bourgeonnent activement.

Indications. — *Enfants, adultes.*

En obstétrique et en gynécologie : Plaies vagino-périnéales infectées, Ulcérations du col, Catarrhes vulvo-vaginaux, Suppurations mammaires.

En chirurgie : Plaies suppurées et sphacélées, Plaies atones, Ulcères.

Présentation. — Poudre.

Mode d'emploi. — Le *Pulvi-Lactéol* s'emploie : soit sous forme de poudre en saupoudrant largement la plaie ; soit sous forme de bouillie lactéolée, obtenue en délayant le produit dans un peu d'eau bouillie refroidie.

Suivant les cas, badigeonner, ou instiller, ou faire pansement avec gaze imbibée.

Laboratoire du Dr BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

PULVITA

Poudre des 4 Gluconates (Mn, Mg, Ca, AzH⁴).

Licence exclusive Sandoz.

Pulvita est employé en pansement local dans les affections pulmonaires en particulier.

Prix : 22 francs et boîte grand modèle contenant 7 boîtes ordinaires, au prix de 6 boîtes : 130 francs.

Traitement appliqué en pulvérisations à l'aide d'un pulvérisateur électrique, dit pulvérisateur « Pulvita », appareil indispensable pour pouvoir suivre un traitement par **Pulvita** dans de bonnes conditions.

Prix : 170 fr. 50.

Pour toute documentation écrire aux

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE (Paris-Ouest).

Tél. : Auteuil 11-86.

PURARGOL

Composition. — Solution stérilisée et titrée d'Argent colloïdal chimiquement pur à 5 p. 100.

Présentation. — Ampoule compte-gouttes scellée, très pratique à l'emploi.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant dénué de toute causticité et toxicité. Action surtout catalytique s'opposant au développement des bactéries.

Indications. — Antisepsie préventive et curative dans les maladies infectieuses (grippe, scarlatine, etc.) ; en Rhino-Laryngologie (coryzas, sinusites, rhinites, angines, laryngites) ; en Otologie (otites, abcès, écoulements) ; en Oculistique (inflammations et infections oculaires, conjonctivites, blépharites, etc.).

Mode d'emploi. — *Rhinologie* : IV à V gouttes dans chaque narine, une ou plusieurs fois par jour.

Otologie : quelques gouttes dans l'oreille malade deux ou trois fois par jour.

Oculistique : introduire deux fois par jour II à IV gouttes dans l'œil malade.

Obstétrique : introduire I ou II gouttes dans chacun des yeux du nouveau-né, sitôt sa première toilette faite.

Durée de traitement : 15 à 25 jours.

Les Laboratoires du LUGOCALCION — OULLINS (Rhône).

PURGANOL DAQUIN

(C²⁰H¹⁴O⁴)

Forme. — Pastilles laxatives, à la menthe, dosées chacune à 0 gr. 25 de médicament actif. Bien préférable à la forme comprimés qui se désagrègent mal.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1/2 à une pastille le soir, au coucher.

Enfants : 1/4 à 1/2 selon l'âge. Sucrer lentement et boire ensuite.

Ne donne pas de coliques, ne congestionne pas les organes du petit bassin, ce qui permet aux femmes enceintes d'en faire usage. Laxatif préféré des nourrices.

Le flacon contient 20 pastilles, soit 40 doses laxatives. Prix: 9 fr. La boîte d'essai: 3 fr. 75.

Échantillons sur demande au

Laboratoire DAQUIN

SAINT-MAUR (Seine). (Tél. : Gravelle 00-27.)

PURGAREX

Comprimés plats dragéifiés inaltérables.

Toutes les constipations.

Ne donne pas de coliques.

Composition. — Produit Phyto-opothérapique formé par l'association de principes végétaux (Podophyllin, Boldo, Artichaut, Évonymine, Cascara sagrada, Agar-Agar, Jusquiame, Belladone).

Propriétés. — Laxatif doux et sûr, Cholagogue, Rééducateur des fonctions hépatiques et intestinales.

Indications. — Toutes les constipations, toutes les affections hépato-biliaires et leurs conséquences, Artériosclérose et Hypertension, Cholestérinémie.

Dose et mode d'emploi. — 1 ou 2 dragées le soir au repas. Avaler sans croquer.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix au public : 15 fr. 30.

**Laboratoires du BUCCASEPTYL
et du PURGAREX**

R. WALTER, Pharmacien,

Ex-chef de laboratoire de la F. M.,

17, av. Charles-Lambert — CHATOU (S.-et-O.)

PYO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'*Ampho-vaccin* pansement antipyogène.

Composition. — Le *Pyo-amphogel* n'est pas une pomade ni un pansement gélosé. C'est une gelée *molle*, *non grasse*, contenant une très forte proportion (75 p. 100) de bouillon-vaccin polyvalent, antipyogène (*staphylocoques*, *streptocoques*, *b. coli*, *entérocoques*, *b. pyocyaniques*).

Avantages. — Ne nécessite pas de fusion préalable. Eminemment absorbable par la peau. Favorise la cicatrisation. Son emploi n'offre aucun danger, il n'a aucune contre-indication.

Indications. — Abscès, Furoncles, Anthrax, Acné, Impétigo, Intertrigo, Eczémas suintants, Ulcères, Syco-sis, Mastites, Orgelets, Plaies infectées, Brûlures, etc...

Mode d'emploi. — Déposer la gelée sur la région à traiter en se servant d'un coton ou d'une gaze stérile qui sera laissée si un pansement à demeure est possible. Dans le cas contraire, la gelée adhère suffisamment par elle-même.

En tubes de 70 grammes.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse.

A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie

21, boulevard de Riquier — NICE

Dépôt à Paris : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Tur. 72-34.

PYOCOLINE

Acidifiant, Antiseptique urinaire Diurétique.

Composition. — Chlorure d'Ammonium, Chlorhydrate d'Ortho-oxyquinoléine, Terpène.

Indications. — Colibacilloses, Cystites, Pyélonéphrites, Cholécystites, Lithiases (oxaluriques et phosphaturiques), Cystites des prostatiques.

Forme. Mode d'emploi. — Comprimés glutinisés, 6 à 10 par jour au milieu des repas.

Prix : 19 fr. 10.

Laboratoires R. SAVOIRE

Docteur en Pharmacie

Ancien interne des hôpitaux de Paris,

VENDOME (Loir-et-Cher).

(Tél. : 26.)

PYODARSÉNOL « INAVA »

Fuso-Strepto-Vaccin Pyodyl « B »

associé au **Sulfarsénol**.

BACTÉRICIDE — SCLÉROSANT —

ANTISPIRILLAIRE.

Trois formes :

Pâte dentaire bleue immunisante pour l'hygiène quotidienne (Voir à *Inava*).

Pyodarsénol gelée pour massage gingival.

Pyodarsénol injectable (boîte de 10 ampoules).

Enregistré L. N. C. M. : n° 760-12 et 13.

Laboratoires INAVA,

E. GUIGNIER, Pharmacien.

14, rue de Normandie — **ASNIÈRES (Seine).**

(Tél. : Grésillons 31-30.)

PYODOLYSINE

Dentifrice antipyorrhéique

Méthode de désensibilisation des muqueuses buccale et gingivale par l'hyposulfite de sodium.

Action topique et antiseptique (phénol camphré, iode, thymol).

Action hémostatique, tonique et astringente (acide gallotanique).

Formes : 1° *Pâte Gingivale en tube.*

2° *Solution Topique.*

Mode d'emploi. — 1°. — A) Brossage biquotidien des dents et des gencives avec une brosse dure ou demi-dure recouverte d'un ruban de pâte.

B) Rinçage de la bouche avec un verre d'eau bouillie auquel on aura ajouté de 30 gouttes à une demi-cuillerée à café de Solution Topique.

2°. — Attouchements des gencives 2 à 3 fois par semaine avec la Solution Topique pure.

Particularités. — Pâte dentifrice colloïdale. Grâce à un excipient spécial, la pâte PYODOLYSINE constitue un Gel maintenant ses principes actifs dans un état moléculaire parfaitement dispersé, ce qui leur assure un meilleur contact avec les muqueuses.

Indications — Pyorrhée alvéolaire, Stomatites mercurielles, Gingivites, aphtes; Gencives sanguinolentes, tuméfiées ou douloureuses; Dents déchaussées.

Employé comme Dentifrice courant, assure une parfaite hygiène dentaire.

Prix au public: Pâte: 12 fr. 50. — Topique: 20 fr. 80.

Durée du tube de pâte: environ trois mois.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les N°s 1569-2 et 1569-3.

Echantillons sur demande :

Laboratoire de la PYODOLYSINE — F. MARTIN, Pharmacien
2, rue des Trois-Mages, MARSEILLE. — (Tél. Lycée 60-31.)

PYODYL INAVA " B "

Fuso-Strepto-Vaccin injectable.

Vaccination préventive spécifique des Infections générales d'origine dentaire.

Moyen prophylactique et thérapeutique applicable :

- 1° Aux manifestations locales de l'infection dentaire (phyorrhée, gingivites, abcès, phlegmons) ;
- 2° Aux complications de voisinage (angine de Ludwig, angine de Vincent, sinusites) ;
- 3° Aux complications à distances (infections broncho-pulmonaires, rhumatismes infectieux, néphrites, endocardites, septicémie, etc.).

Injections intra-musculaires de 1/8 de cc. à 1 cc. espacées de 1 à plusieurs jours, suivant l'acuité de l'infection et le degré de sensibilisation du malade.

Boîte de 10 ampoules de 1 cc. : 31 fr. 80.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 760-4.

Laboratoires INAVA, E. GUIGNIER, Pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIERES (Seine).

(Tél. : Grés. : 31-30.)

PYOFORMINE

Ampoules de 2 cc.

Mélange de leucocytes et de ferments sécrétés par les globules blancs en suspension dans une solution physiologique d'*Uroformine Gobey* (Leucocytothérapie).

Propriétés thérapeutiques. — Médication préventive et curative de toutes les infections microbiennes non chroniques. Doit être injectée dès l'apparition des symptômes infectieux qu'elle fait souvent avorter.

Indications. — Grippe trainante ou compliquée. Septicémies. Etats puerpéraux. Infections pleuro-pulmonaires, Angines, Typhoïdes et Paratyphoïdes. Colibacilloses, Péritonites, Cholécystites, Pyélonéphrites, Suppurations, Méningites, Encéphalites.

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Posologie. — Voie intramusculaire ou, en cas d'urgence, voie intraveineuse.

Chez les *Adultes* : 2 à 3 ampoules par jour. Chez les *Enfants* : Demi-dose. La *Pyoformine* doit être employée précocement ; elle ne détermine aucune réaction, ni locale, ni générale.

Prix au public : la boîte de 4 ampoules : 23 fr. 30

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI°).

(Tél. : Littre 58-43.)

PYOREX

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-40.

Forme. — Pâte dentifrice.

Composition. — Arsolithol Bailly (sel de Lithium de l'acide acétylaminoparaoxyphénylarsinique). Lactate d'éthoxydiaminoacridine et Ricinoléate sodique insipide adsorbés par le kaolin colloïdal.

Propriétés pharmacodynamiques. — Pâte gingivale antispirillaire, antimicrobienne, antitoxinique polyvalente à pouvoir microbicide extrêmement élevé, parce que ses éléments ont leurs propriétés antiseptiques dirigées sur des groupes d'espèces pathogènes d'origine et de spécificité différentes. Modifie le milieu buccal et le rend impropre à la vie microbienne.

Indications. — Gingivites, stomatites, adjuvant au traitement chirurgical de la pyorrhée alvéolaire, préventif des associations fusospirillaires.

Mode d'emploi. — En massages gingivaux dans les gingivites, comme pâte dentifrice dans les caries et les affections dentaires et l'hygiène buccale biquotidienne.

Le tube de 75 grammes: 11 fr. 75.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 62-30.)

PYO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Streptocoques et de Staphylocoques.

Indications. — Suppurations : phlegmons, abcès, panaris, adénophlegmons, plaies infectées, fractures ouvertes, pyodermites du nourrisson : pemphigus, etc...

Pesologie. — Ampoules de 1 cc. Une première injection de 1/2 de cc. les suivantes un centicube tous les jours, puis tous les 2 jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 27 francs.

PYO - VACLYDUN PANSEMENTS

Vaccination locale ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi. — Imbiber de vaccin une compresse stérilisée. Mettre sur la plaie et recouvrir d'un imperméable. Pour les cavités, introduire une mèche imbibée de Pyo-Vaclydun pansement.

Présentation. — Boîte de 6 ampoules de 5 cc.

Prix : 19 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

PYRALLIUM

Composition :

Extrait stabilisé d'*Allium sativum*. 0,10

Pyrophosphate diacide de calcium.. 0,20

pour 1 dragée. Ces 2 éléments sont unis en un complexe colloïdal.

Indications. — Tous états hypo-acides : *Asthénies*.
Déminéralisations, Vieillesse prématuré.
Ralentissements de la Nutrition.

Posologie. — 4 à 8 dragées par jour avant ou au cours des repas. Avaler sans croquer.

Tolérance absolue.

Prix : 18 fr. 20 la boîte de 50 dragées.

Laboratoire COUDERC

9 et 9 bis, rue Borromée — PARIS (XV^e).

PYRÉLAÏNE COLLAS

Composition. — Fixation à chaud du soufre sur les acides gras non saturés d'une huile végétale.

Chaque cc. contient 0 gr. 06 de soufre organique combiné non oxydé doué de son pouvoir catalytique. Excipient balsamique.

Propriétés. — Permet d'administrer du soufre actif par voie digestive. Contrairement aux formes habituelles du soufre *per os*, la Pyrélaine n'est pas oxydée dans l'estomac et possède une action nette.

Indications. — Toutes celles du soufre. *Carences Sulfurées*. Résulfuration thérapeutique. Toutes affections tributaires de la Diathèse lithiasique, notamment *Lithiase biliaire*, *Cholécystite*, *Rhumatismes chroniques*, *Goutte*, *Dermopathies*, *Parasites intestinaux*.

Pas de contre-indications.

Forme et posologie. — Capsules gélatineuses dosées à 0 gr. 25 (Soufre : 0 gr. 015 par capsule). Affections chroniques et doses d'entretien : 2 à 3 capsules par jour avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Crises aiguës : 4 à 6 capsules par jour.

Enfants : moitié de ces doses.

Le tube de 50 capsules : Prix au public : 15 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1024-3.

Société des Produits COLLAS et BOUDAULT

MOUGNAUD et C^{ie}, pharmaciens

LONGJUMEAU (Seine-et-Oise). — (Tél. : 96.)

PYRÉTHANE

Antinévralgique puissant.

Forme liquide ; Gouttes ; Ampoules.

Composition. — Diméthylaminopyrazoline phenazone carbamate d'éthyle (uréthane.)

Emploi et doses. — Doit se prendre dilué en eau bicarbonatée sodique (Vichy, Vals ou eau ordinaire ou sucrée) 60 cc. avec 0,30-0,50 de bicarbonate.

Gouttes. — *Adultes* : XXV-L à répéter à intervalles de 20 minutes. Chercher la dose-levier et passer aux doses massives LXXX-C si nécessaire. Maximum : CCC *pro die*.

Enfants : I à II gouttes par année d'âge.

Indications antithermiques : Donner à doses réfractées.

Ampoules A. — 2 cc. antithermiques : 1 à 2 ampoules avec ou sans médication intercalaire.

Ampoules B. — 5 cc. antinévralgiques. Grandes névralgies, tabes, névrites, sciatiques : 1 à 2 par jour, avec ou sans médication intercalaire intensive. Maximum : CC gouttes.

Injectons intramusculaires.

Indications. — Migraines, Céphalalgies, Névralgies essentielles, intercostales, faciales, oculaires (XXV-L à répéter), chercher la dose-levier ; Disménorrhées (XXV-L) ; Arthrites, Lumbagos-Sciatiques, Radiculites, Polynévrites, Syringomyélie (doses variables) ; Algies syphilitiques, Tabes, Cancer (LX-LXXX-C gouttes, *permettent de garder en main médicale l'emploi de la morphine, de la diminuer ou de l'espacer*) ; Rhumatisme chronique et séquelles rhumatismales (XXV-L., 2 fois par jour) ; phénomènes douloureux, inflammatoires et traumatiques ; Pansements douloureux (Post-opératoire en petite chirurgie). — Echantillons et Littérature.

Gouttes : (25 cc.) 21 fr. 95.

Ampoules { A (2 cc. × 6) } 19 fr. 10.
 { B (5 cc. × 6) }

Dépôt à Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Malesherbes — PARIS.

Laboratoires CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(Tél. : Gobelins 00-70.)

PYRI-PYRIDIUM

(Phényl-azo-' α -' α -diamino-pyridine.)

Corps chimique nouveau, antiseptique génito-urinaire réellement actif, car il agit dans la profondeur des muqueuses et s'élimine en partie par les glandes des voies génito-urinaires.

Indications. — Pyélites, Pyélonéphrites, Cystites, Gonorrhées, Colibacilloses.

1° *Dragées par voie buccale.* Le flacon de 20 dragées 18 fr. 75, 3 à 6 par jour.

2° *En ampoules pour vole intraveineuse.* Traitement d'attaque des affections génito-urinaires graves par la stimulation du système réticulo-endothélial. La boîte de 10 ampoules : 15 francs, 1 à 4 par 24 heures.

Laboratoires SERVIER

25, rue Eugène-Vignat — ORLÉANS.

(Tél. : 31-10.)

PYROCUROL

Traitement des brûlures.

Formes : Solution et pommade au Tanin.

D'une efficacité remarquable par ses qualités antiseptiques et cicatrisantes, le Pyrocurool possède également de puissantes propriétés anesthésiques dues à l'adjonction d'un produit de la série des éthers de l'acide paramino-benzoïque qui en font un excellent remède dans le traitement des infections et lésions cutanées.

SOLUTION ; recommandée spécialement dans le traitement des grandes brûlures.

Grâce à son procédé de tannage par pulvérisation, la solution Pyrocurool réalise l'application la plus rationnelle et la plus efficace, permettant d'obtenir une guérison rapide en atténuant ou supprimant la douleur et en favorisant la reconstitution des tissus sains.

Mode d'emploi : Ouvrir les phlyctènes et faire l'ablation des tissus mortifiés, puis pulvériser le Pyrocurool une ou deux fois par jour ; bien laisser sécher et recouvrir ou non d'une gaze aseptique.

La solution Pyrocurool est également indiquée dans les cas tels que : escarres, fissures anales, radio-dermites, etc., où l'application par pulvérisation présente des facilités ou des avantages.

Pulvérisateur spécial.

POMMADE en tube : non toxique, demi-grasse, très pénétrante : brûlures, engelures, gerçures, plaies diverses, hémorroïdes, ulcères, eczémas, impétigos, prurits, psoriasis, etc.

Mode d'emploi : Étendre une couche de pommade sur la partie malade et recouvrir d'une gaze aseptique.

LABORATOIRES NOLLET

47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

PYROLÉOL EDET

Composition. — Principes actifs de plantes non toxiques à saturation (mélilot, mille-pertuis, eucalyptus, etc.) solution huileuse.

Propriétés. — Neutre et aseptique, non toxique, analgésique et antiseptique, stimulant, tonique et cicatrisant.

Indications. — Brûlures, plaies atones, dermites, radiodermites, ulcères variqueux, engelures, escarres, eczéma, zona.

Présentation. — En flacons : 1/4, 1/2, entier.

Mode d'emploi. — Laver à l'eau bouillie et à l'eau oxygénée. Appliquer compresses stérilisées imbibées de *Pyroléol*. Renouveler après 24 ou 48 heures.

Résultats. — Disparition de la douleur, suppression de suppuration fétide. Production rapide de cicatrices vascularisées, lisses, souples, non adhérentes.

Pharmacie Centrale de France
25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV°).
(Tél. : Archives 18-67.)

PYROSELLINE

Diurétique exclusivement végétal.

Médication Phytothérapique.

Composition. — Extraits totaux de *Combretum*, *Chimaphylla*, *Piloselle*.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Infections aiguës et chroniques des voies urinaires (Cystite, Urétrite, Blennorragie), Maladies infectieuses aiguës (Septicémies, Grippe, Collibacilloses).

Maladies chroniques : Rhumatisme, Goutte, Gravelle, Insuffisance hépatique, Cholécystite, Lithiases. Rétention hydrique.

Posologie. — Dose moyenne : 2 comprimés au petit déjeuner et 2 au repas de midi.

Les doses peuvent être doublées sans aucun inconvénient.

Prix : 18 fr. 35.

Laboratoires CHAPOTOT
AUBRIOT, Pharmacien
56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII°).
(Tél. : Mon. 28-90 et 30-65.)
R. C. 231-917 B.

PYUROL

Composition. — C'est une combinaison de l'urotropine avec:

1° Deux métaux qui en suractivent les propriétés et augmentent l'acidité urinaire, le calcium qui l'oriente vers le rein, le magnésium qui augmente le flux biliaire ;

2° Le buchu, antiseptique urinaire, le boldo, cholagogue puissant.

Indications. — Action antiseptique sur l'appareil urinaire, action sur l'appareil digestif et sur le foie, action sur la diurèse.

Forme et mode d'emploi. — Granulé soluble.

Adultes : infections urinaires moyennes, 3 cuillerées à café dissoutes dans un verre d'eau ou de tisane. prises :

La première à jeun,

La seconde une heure avant le déjeuner,

La troisième une heure avant le repas du soir.

Infections urinaires aiguës, 3 cuillerées à entremets aux mêmes heures

Enfants : ces doses sont diminuées de moitié.

Dose pour 7 jours. Prix : 16 francs.

Laboratoire A. LE BLOND

Pharmacien de 1^{re} classe, Ex-interne des Hôpitaux de Paris.

15, rue Jean-Jaurès — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Longchamp 07-36.)

QUASSIA-KINA RABOT

Aux écorces d'oranges amères.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant énergétique. Le meilleur stimulant de l'appétit. Très bien toléré par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Asthénie, Vertiges stomacaux, Inappétence, Débilité, Convalescences.

Formes pharmaceutiques et mode d'emploi.

VIN : Un verre à madère aux 2 principaux repas. Véhicule idéal de la médication iodée, même intensive. — Prix : 26 fr. 65.

DRAGÉES : Recommandé aux malades, auxquels le vin est contre-indiqué. *Adultes :* 3 à 6 par jour, 1/4 d'heure avant les repas. *Enfants :* 1/2 dose. — Prix : 12 fr. 50.

GRANULÉ : Convient particulièrement aux enfants. *Adultes :* 1 cuillerée à café aux repas. *Enfants :* 1/2 dose. Prix : 12 fr. 50.

Les Établissements **O. DAVID-RABOT**

O. DAVID et ses Fils, pharmaciens

49, rue de Bitche — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 28-46.)

QUASSINOL

Gouttes

Anorexie, Surmenage, Anémie, Stimulant des fonctions digestives.

Formule : Teinture Quassia..... 40 grammes

Teinture Colombo 20 —

Teinture Noix vomique 20 —

Excipient alcool-glycérine. Q. S.... 100 —

Enregistré au Laboratoire national de contrôle des Médicaments sous le n° 1610-1.

Présentation. — Flacon compte-gouttes de 24 cc.
Prix au public : 15 fr. 60.

Mode d'emploi : *Adultes :* XV gouttes dans un peu d'eau ou de vin, avant chaque repas.

Enfants au-dessus de 5 ans : demi-dose.

Durée du traitement, 15 jours environ.

Laboratoires du QUASSINOL

J. OLIVE, pharmacien de 1^{re} classe,

73, bd Baille, et 109, rue de Lodi — MARSEILLE

(Tél. : Garibaldi 55-06.)

R. C. Marseille 117-209.

Compte Chèques postaux : Marseille 43-564.

QUINA BARON

Extrait sec et complet de Quinquina frais en solution aqueuse *sans alcool* et *sans sucre*.
1 cuillerée à soupe = 0 gr. 50 d'extrait sec de quinquina (titrant 18-20 p. 100 d'alcaloïdes).

Forme :

Solution ; flacon de 310 cc. = 10 jours de traitement.

Action physiologique :

Reconstituant énergique, amer, fébrifuge.

Indications :

- 1° *Etats dépressifs et asthéniques*. Se prescrit en particulier après les grippez, aux convalescents, opérés, tuberculeux, vieillards, femmes enceintes, accouchées, etc.
- 2° *Tonique de choix* lorsque l'alcool est contre-indiqué. Régime des albuminuriques, diabétiques, hépatiques, hypertendus, nerveux, etc.
- 3° *Etats févreux, paludisme*. Forme très assimilable de la quinine.

Dose et mode d'emploi :

- 1° *Adultes* : 1 cuillerée à soupe avant les 2 repas, pur ou dans de l'eau sucrée.
- 2° *Enfants* : 1 cuillerée à dessert.

L. N. C. N° 1905-1.

Prix : 18 francs.

Laboratoire du QUINA BARON,
fondé en 1870.

R. CAILLE, docteur en pharmacie,
3, place de la Miséricorde — LYON.
(Tél. B. 14-03.)

QUINA BOURCET GRANULÉ

Composition. — Saccharure fondant exactement titré à 4 % d'extrait sec de Quinquina. Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-1.

Mode d'emploi. — Granulé titré à 0 gr. 20 par cuillerée à café avant les repas pour les enfants ; granulé titré à 0 gr. 60 par cuillerée à soupe pour les adultes.

Indications. — Anémie, Anorexie, Tuberculose, Grippe, Convalescence, Neurasthénie. Paludisme, Maladies infectieuses.

QUINA BOURCET SOLUTION

Composition. — Cette solution, exactement titrée à 4 % d'extrait sec de Quinquina, Formule enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments. N° 754-2.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à soupe (0 gr. 60 d'extrait) avant les repas pour les adultes. Une cuillerée à café (0 gr. 20 d'extrait) avant les repas pour les enfants.

Indications. — Stimulant de la Digestion; recommandé dans l'Anémie, l'Anorexie, le Diabète, la Grippe, la Neurasthénie, les Convalescences et dans toutes les maladies aiguës, dans la Cachexie palustre et le Paludisme.

Laboratoire du QUINA BOURCET
7, avenue du Doyenné — LYON.
(Téléphone : F. 25-35.)

QUINACRINE (ATÉBRINE)

Noms déposés.

Dichlorhydrate de la chloro 2-diéthylamino-pentylamino 5-méthoxy-7-acridine. — Vente limitée à la France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français. — Médication antipaludique essentiellement schizonticide, créant dans l'organisme un état réfractaire contre l'hématozoaire. Tolérance parfaite.

Indications. — Toutes les formes du paludisme. Traitements curatifs et préventifs.

Présentations. — *Comprimés* dosés à 0 g. 10 de Quinacrine. Tubes de 15 et 30 comprimés.

Chocolatés de tannate de quinacrine (pour très jeunes enfants) (Boîtes de 12). Un chocolaté correspond à un comprimé.

Ampoules de Quinacrine pour préparation extemporanée de solutions injectables. Boîtes de 5 ampoules à 0 g. 10 et boîtes de 5 ampoules à 0 g. 30 (avec même nombre d'ampoules bidistillées).

Dose habituelle.

Adultes : 3 comprimés par jour.

Enfants : jusqu'à 1 an : 1/2 comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé 1/2 ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés 1/2.

Absorber toujours le médicament pendant les repas avec une alimentation très riche en féculents.

Société Parisienne d'Expansion Chimique « **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). — (Tél. : Balzac 22-94.)

QUINARSOL FÉBRIFUGE

Extrait de quinquina à haut titre alcaloïdique avec fer et arsenic assimilable.

Composition. — Chaque comprimé contient :

Quinquina Grandval (à haut titre).	0 gr.	60
Fer combiné.....	0 gr.	015
Arsenic combiné	0 mgr.	90

Propriétés thérapeutiques :

Antipaludique. — Permet, suivant la dose, soit de juguler l'accès, soit de combattre l'état chronique et de faciliter la résistance de l'organisme. — Régénérateur du Globule et des Eléments protoplasmiques.

Indications :

Paludisme et ses conséquences, Fièvre de Malte, Affections produites par le séjour dans les pays chauds.

Dose :

Pendant la crise, 4 à 8 comprimés par jour, suivant la violence de l'accès. — **Etat chronique**, 4 comprimés par jour.

La boîte de 30 comprimés : 22 fr. (toutes pharmacies).

LABORATOIRES GRANDVAL

12 et 14, rue Féry — REIMS. (Tél. : 31-63.)

QUINDYNOL BIOPHILE

Composition :

Extrait complexe (et non mélange) de Quinquina et de Blé germé contenant la *totalité* des principes actifs sous forme de liquide concentré *non alcoolisé*. (La richesse en phosphore du blé germé explique son action sur les centres nerveux.)

Propriétés :

Biodynamogène puissant, Fébrifuge, *Anti-infectieux*, Microbicide par stimulation de la phagocytose. Régénérateur nerveux, Tonique cérébral et musculaire, Euphorique, Revitalisant.

Indications :

Tous les états infectieux avec ou sans suppuration, Fièvres éruptives, Épidémies, Septicémie, Tuberculose, Grippe, Surmenage intellectuel, Fatigue et anémie des collégiens, Asthénie, Neurasthénie, Inquiétude.

L'action euphorique est très nette et durable.

Doses :

1 à 2 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau ou de vin. Dans les états infectieux, doubler ou tripler les doses.

Prix :

Le flacon de 150 cc. : 22 fr. 45.

Le flacon géant de 500 cc. : 58 francs.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,

27, rue du Faubourg-Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 43-10.)

QUINÉINE

Extrait intégral des principes actifs
du quinquina.

Préparation concentrée, de titrage fixe, très active, faite avec des écorces choisies de même origine, concassées de la même façon, etc. XL gouttes deux fois par jour comme tonique. Dose fébrifuge : par 1/2 cuillerée à café. En solution non alcoolique.

Indications. — Paludisme, gripes, asthénie, convalescences, anémies.

Prix au public : 16 fr. 65.

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien,

21, rue Chaptal — PARIS

(Tél. : Trinité 29-29.)

QUINÉNOL

Topique spécifique de la cicatrisation des accidents pyorrhéiques, des gingivites et des stomatites.

Composition. — 15 p. 100 d'éther carbonique neutre de quinine.

Propriétés. — Antispirillaire, antiseptique, tonifiant, analgésiant, sclérosant, non amer, aucune toxicité, véritable catalyseur de la cicatrisation.

Indications :

Après extractions dentaires banales ou chirurgicales ayant nécessité un grand délabrement tissulaire.

Après le traitement chirurgical de la polyarthrite alvéolo-dentaire pyorrhéique.

Après l'ablation des kystes d'origine dentaire.

Après les résections apicales.

Dans les fractures ouvertes des maxillaires.

Après les plasties buccales.

Dans toutes les affections à fuso-spirilles, polyarthrite alvéolo-dentaire pyorrhéique, angine de Vincent, toutes les stomatites mercurielle, bismuthique, aurique, saturnine, arsenicale.

Dans toutes les affections locales et banales de la bouche et dans les localisations buccales des maladies générales : gingivites, stomatites, aphtes, muguet, etc.

Mode d'emploi. — Instillations dans les clapiers et cavités, complétées par des massages.

Prix : Le tube : 15 fr. 30.

PÂTE DENTIFRICE GIBBS R. S.

Composition. — Quinénol, Ricinoléate de soude et mica.

Indications :

La Pâte Gibbs est recommandée à tous pour les soins journaliers d'hygiène et de propreté.

La Pâte Gibbs R. S. est surtout nettement indiquée dans les cas de :

Pyorrhées, Stomatites et Gingivites de toutes origines, abrasion du collet et caries si douloureuses de cette région, toutes lésions traumatiques ou chirurgicales de la muqueuse buccale, désinfection buccale chez les opérés de chirurgie générale et chez les patients atteints de maladies infectieuses pour éviter les complications pulmonaires ou septicémiques dues aux microbes de la bouche.

Prix : Le tube : 10 fr. 20.

Laboratoire A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 58-43.)

QUINICARDINE

Comprimés à 0 gr. 20 de Sulfate de Quinidine pur.

INDICATIONS ET POSOLOGIE

Traitement préparatoire (en prévision de l'action dépressive de la *Quinicardine* sur le cœur) : dose moyenne ou forte de *Digitaline Nativelle* ou d'*Ouabaïne Arnaud*. — S'il y a insuffisance cardiaque, n'instituer la cure de *Quinicardine* que si cette insuffisance a favorablement réagi au traitement cardiotonique ou diurétique. — Repos au lit. — Voir ci-après les contre-indications.

Arythmie complète par fibrillation auriculaire.

Traitement d'attaque : Après la cure cardiotonique préparatoire, administrer 8 gr. 80 de *Quinicardine* en 10 jours :

Jours.....	1 ^{er}	2 ^e	3 ^e	4 ^e	5 ^e	6 ^e	7 ^e	8 ^e	9 ^e	10 ^e
Comprimés à 0 gr. 20.	1	2	3	4	5	5	6	6	6	6

avec, si possible, contrôle électrocardiographique.

Si, après cette cure, le cœur n'est pas régularisé, prescrire la dose moyenne de *Digitaline Nativelle* 5 jours sur 10, pendant 4 à 6 semaines, puis faire une nouvelle cure de 10 jours de *Quinicardine*.

En cas de nouvel échec, ou bien si une tachycardie régulière remplace l'arythmie, abandonner la *Quinicardine* et prescrire la dose moyenne ou forte de *Digitaline Nativelle*.

Cure d'entretien : Dès que le rythme est régularisé, administrer la dose d'entretien de 2 comprimés de *Quinicardine* par jour pendant 10 à 15 jours par mois, afin de prévenir la réapparition du trouble rythmique.

Régime : En cas de diarrhée, supprimer les fruits, les légumes verts et, au besoin, la viande, le lait, les œufs. Donner des potages maigres, pommes de terre, pâtes, riz, pain grillé. Régime hypochloruré et même déchloruré.

Arythmie extra-systolique d'origine endocrinienne, nerveuse, réflexe ou toxique.

En dehors du traitement étiologique, prescrire 2 à 3 comprimés de *Quinicardine* par jour, pendant 10 à 15 jours par mois.

Tachycardie paroxystique de Bouveret.

Traitement curatif (l'injection intraveineuse d'Ouabaine Arnaud, par son action sédative, aide à supporter la crise et l'arrête même souvent) : 2 à 3 comprimés de *Quinicardine* par jour Cesser si la tension vient à baisser.

Traitement préventif (contre le retour périodique des crises) : En dehors du traitement étiologique, prescrire 2 à 3 comprimés de *Quinicardine* par jour pendant 10 à 15 jours par mois.

Flutter Auriculaire.

Traitement curatif : 1) Doses fortes de *Digitaline Nativelle* pour transformer le flutter en fibrillation auriculaire.

2) Ce résultat obtenu, 2 à 3 comprimés par jour de *Quinicardine* suffiront pour rétablir le rythme normal. (Si possible, contrôle électrocardiographique fréquent.)

Traitement préventif : 2 à 3 comprimés de *Quinicardine* par jour pendant 10 à 15 jours par mois.

Névroses Tachycardiques (Basedow)

En dehors du traitement étiologique, l'administration de deux comprimés de *Quinicardine* par jour, avec arrêts périodiques, rendra les plus grands services.

CONTRE-INDICATIONS

Insuffisance cardiaque irréductible au traitement cardiotonique, Bradycardie par dissociation auriculo-ventriculaire, Tendance aux syncopes, Thrombose cardiaque, Age avancé.

MODE D'ADMINISTRATION

La dose quotidienne de comprimés s'administre autant que possible au début des repas, en une ou plusieurs fois.

Prix : 17 fr. 45.

Laboratoire NATIVELLE

27, rue de la Procession, PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 31-21, 3 lignes.)

QUINIMAX

Alcaloïdes totaux suractivés du Quinquina.

Composition. — Sel complexe obtenu par combinaison des alcaloïdes totaux du quinquina avec un dérivé phénolique activant. (Communication à l'Académie des Sciences, 18 septembre 1938).

Propriétés. — *Antithermique, antipaludique et reconstituant* agissant à faibles doses. Ne provoque aucun des inconvénients de la quinine, ni bourdonnements d'oreille, ni brûlures d'estomac, ni vertiges, ni inflammation locale.

Indications thérapeutiques. — *Paludisme, Asthénie et Cachexie palustre. Etats fébriles, gripes* et toutes indications habituelles de la quinine.

Formes :

Comprimés à 0 gr. 10.	La boîte de 20.	Prix au public.	13 fr. 50
—	— 40.	—	25 fr.
Ampoules. de 1 cc à 0 gr. 10	La boîte de 10.	Prix au public.	20 fr.
— 2 cc à 0 gr. 20	— 10.	—	25 fr.
— 4 cc à 0 gr. 40	— 10.	—	32 fr.
Suppositoires Enfants 0 gr. 05	La boîte de 10.	Prix au public.	20 fr.
— Adultes 0 gr. 15	— 10.	—	26 fr.
Granulé chocolaté pour enfants		28 fr.
Posologie. — Même mode de prescription que la quinine, mais à doses 2 fois moindres.			

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

QUININE-CALCIUM-SANDOZ

voir

CALGLUQUINE

PRODUITS SANDOZ

B. JOYEUX, Dr en Pharmacie.

20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

QUININE PELLETIER

Marque des Trois Cachets.

Composition et présentation. — La QUININE des TROIS CACHETS se présente sous forme de perles renfermant le sel de quinine en nature, légèrement comprimé sans addition de gomme, sucre, amidon ou poudres inertes.

Elles sont dosées à 10 cgr. et se délivrent en tubes de 10, 20, 50, 100 capsules.

Indications. — Névralgies, fièvres intermittentes, paludisme, fièvres pernicieuses, fièvre typhoïde, affections hépatiques et spléniques des pays chauds, anémies.

Posologie. — Variable suivant les indications.

Prix : variable suivant les différents sels :

Sulfate ; Bisulfate ; Chlorhydrate ; Valérianate ; Bromhydrate ; Bichlorhydrate ; Chlorhydrosulfate.

Chaque perle porte imprimé en noir le nom de PELLETIER.

Laboratoires GRIMAULT

VIAL et C^{ie}, successeurs

8, rue Vivienne — PARIS (II^e).

(Tél : Gutenberg 27-03.)

QUININO-PHYTINE

Inosito-hexaphosphate de quinine.

CIBA

58 p. 100 de Quinine — 9 p. 100 de Phosphore.

Phosphate organique de quinine, très soluble, d'une parfaite tolérance, unissant à l'action spécifique de la quinine l'action tonique et reconstituante du phosphore végétal.

Indications. — Celles de la quinine en général et plus particulièrement : Grippe, Migraines, Névralgies, Paludisme (surtout les formes anciennes accompagnées de cachexie et d'anémie). Maladies infectieuses, Coqueluche, Diabète, etc.

Doses. — Même posologie que pour le sulfate ou le chlorhydrate de quinine (comprimés à 0 gr. 10).

Formuler. — Tube de 20 comprimés.

Flacon de 50 comprimés.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.

(Tél. : Moncey 43-26.)

QUINIO-STOVAR SOL

4-oxy-3-acétylamino-phényl-
l-arsinate de quinine.

Combinaison chimique définie, renfermant des proportions égales de Quinine et de Stovarsol ; le pouvoir curatif des composants est exalté par cette association.

Indications. — Paludisme viscéral ; hépatite, splénomégalie, anémie et cachexie palustres.

Traitement eutrophique complémentaire des divers traitements anti-paludiques. Quinacrine (Atébrine), Rodopréquine — noms déposés. La Quinacrine et la Præquine ne sont vendues qu'en France, colonies françaises, pays de protectorat et sous mandat français.

Présentation. — Tubes de 20 comprimés à 0 gr. 25.

Prix. — 17 fr. 50.

Posologie. — *Adultes* : 3 comprimés par jour.

Enfants : jusqu'à 1 an : 1 demi-comprimé ; de 1 à 3 ans : 1 comprimé ; de 3 à 6 ans : 1 comprimé et demi ; de 6 à 9 ans : 2 comprimés ; de 9 à 12 ans : 2 comprimés et demi.

Société Parisienne d'Expansion Chimique.

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

QUINOBORE

Poudre Antiseptique, Astringente, Cicatrisante, Désodorisante, Décongestive.

Produit idéal pour l'hygiène intime de la femme.

Mode d'emploi. — Injection : 1 cuillerée à café par litre d'eau bouillie.

Prix : 12 francs.

Durée moyenne de l'unité de vente : 25 jours.

Non toxique, Usage externe. Non caustique.

Laboratoire du PHOSOL

L. QUINET, Pharmacien-Préparateur,

143, rue du Temple — PARIS.

(Tél. : Archives 42-27.)

QUINOCARBINE

Charbon suractivé bismuthique.

Modificateur du milieu.

Indications. — Aérophagie, Dyspepsie, Aérocolie, Entérites, Colites, Colibacillose et oxyures.

Deux formes : Granulés, Cachets.

Prix : 18 francs.

Posologie. — Trois cuillerées à café ou 3 cachets par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Oxyures : 1 à 2 cuillerées à café le matin à jeun pendant 21 jours.

Aucune toxicité.

Charbon suractivé 1 gr.

Bismuthate d'Orthoxyquinoléine 0 gr. 50

Excipient Q. S. pour 1 cuillerée à café.

Laboratoire Émile CHARPENTIER

7, rue du Bois-de-Boulogne — PARIS.

(Tél. : Passy 55-46.)

QUINOFORME LACROIX

Composition. — Formiate basique de quinine découvert par H. Lacroix, inscrit au Codex (1925).

Avantages. — Le plus soluble et le plus actif des sels de quinine.

Le plus riche en quinine (87,56 p. 100) des sels basiques ou neutres
Injection indolore, n'occasionnant jamais d'abcès.

Indications. — Paludisme, Fièvres malariques, Fièvres intermittentes.

Formes pharmaceutiques :

Ampoules : 6 et 12 ampoules de 0,25, 0,50, 0,75, 1 gr., 1,25 et 1,50.

Cachets : 6 et 12 cachets de 0,25 et 0,50.

Comprimés : 10 et 20 comprimés de 0,10 à 0,50.

Pilules à 0,10.

Ampoules, boîtes de 6. Prix : 12 fr. 75, 17 fr. 70, 23 fr. 40, 29 fr. 60,
34 fr. 85, 40 fr. 50

Boîte de 12. Prix : 20 fr. 30, 31 fr., 40 fr. 50, 49 fr. 90, 60 fr. 85,
69 fr. 15.

Cachets, boîte de 6. Prix : 8 fr. 85, 15 fr. 85.

Boîte de 12. Prix : 15 fr. 85, 27 fr. 55.

Comprimés, boîte de 10. Prix : 6 fr. 75, 12 fr. 75, 15 fr. 85, 23 fr. 40.

Boîte de 20. Prix : 12 fr. 75, 20 fr. 30, 27 fr. 55, 37 fr. 20.

Pilules. Prix : 14 fr. 80.

Laboratoires H. LACROIX

V. Merobian et fils, successeurs.

37, rue Pajol — PARIS (XVIII^e). (Tél. : Nord 54-57.)

QUINOÏDINE DURIEZ

Dérivé du quinquina exempt des intolérances de la quinine, supérieur à elle dans les états chroniques. (Communications à l'Académie de médecine de Paris, etc..., littérature sur demande.)

0 gr. 10 principe actif par dragée.

Indications. — Grippe, paludisme et leurs séquelles : prévention et traitement. Névralgies grippales ou palustres.

Tonique général : convalescence des maladies infectieuses : diphtérie, pneumonie, typhoïde, etc.

Tonicardiaque : petites défaillances, nervosité ou irrégularité du cœur, avec ou sans lésion.

Posologie. — Comme tonique et préventif, contre les séquelles de grippe ou de paludisme ou en thérapeutique du cœur : selon l'âge et la sensibilité du sujet : 1 à 2 dragées par jour, au début des repas.

Comme fébrifuge et antinévralgique (états aigus) : 2 à 6 dragées par jour, à intervalles égaux, pendant une ou plusieurs semaines, à doses décroissantes.

Prix : le tube : 15 fr. 30 (taxe d'armement comprise).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 152-1.

DURIEZ — 20, place des Vosges — PARIS.

QUINOLAX

Composition. — A base de cinnamate et sulfate de Quinine; Phénacétine, Aloïne, Podophyllin, Guaranine; Essence de Cannelle de Ceylan.

Forme : Comprimés.

Propriétés. — Anti-infectieux, anti-thermique, analgésique, laxatif stomachique et cholagogue, tonicardiaque, diurétique et myosthénique, tonique général.

Indications. — *Infections :* Grippe, coryza, fièvres infectieuses (préventif et curatif); *Etats douloureux :* céphalées, névralgies, sciatique, lumbagos, rhumatismes, migraines. *Paludisme. Affections hépatiques.*

Posologie. — Avaler avec un peu d'eau 1 à 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : la boîte de 24 comprimés : 12 fr. 25 (4 à 8 jours).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).

Tél. : Charlebourg 39-70.

QUINOSIPHON

Formule :

Acide phénylquinoléique Carbonique.	0,10
Extrait aqueux Orthosiphon stamineus.	0,016
Ether salicylique de l'Acétylparami- nophénol	0,10
Extrait total de boldo	0,035
Pour un comprimé dragéifié.	

Posologie. — 4 à 6 comprimés espacés dans la journée.

Indications. — Lithiases hépato-rénales, Favorise excrétion de l'urée et des chlorures, Analgésique des manifestations uricémiques et arthritiques.

Prix : 18 francs.

Laboratoires du CYTOBIASE

A. MARTIN, 25-27, rue du Commandant-Rivière — COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 03-62.)

QUINQUINA GMET

Composition. — Extrait total obtenu directement et exclusivement à l'aide du *Quinquina succirubra*. Coloration et amertume parfaitement naturelles. *Sans alcool.*

Propriétés. — Stimulant apéritif fébrifuge. *Active remarquablement la phagocytose.*

Indications. — Anémie, anorexie, grippe, tuberculose, épidémies, paludisme, tous les états fébriles ou non où l'activité leucocytaire doit être stimulée. Aménorrhée. Athrepsie. Angines, Panaris, Furoncles, etc.

Posologie. — 1 à 3 cuillerées à café dans un peu d'eau ou de vin *immédiatement avant un repas* ou l'absorption d'une tisane, d'un peu de lait, d'un biscuit.

Le grand pouvoir apéritif du Quinquina GMET pouvant occasionner (si le malade ne mange pas aussitôt après) la sensation nauséuse consécutive à la faim non apaisée.

Le flacon de 135 cc. 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

QUINSAL

Médication Quino-salicylique-lithinée
en tablettes glutinisées.

ACTION THÉRAPEUTIQUE POLYVALENTE

Calmant immédiat de la Douleur par le groupement acétylsalicylique et la Quinine.

Antithermique par la Quinine.

Diurétique et Uricolytique par le Sel de Lithine et la Quinine.

Spécifique antirhumatismal par l'ion salicylé. Tolérance parfaite (tablettes glutinisées).

Indications. — Rhumatismes, Sciatique, Lumbago, Névralgies, Douleurs grippales et en général toutes les Algies.

Posologie. — *Cas aigus.* — De 7 à 12 tablettes en trois fois par 24 heures. de préférence loin des repas afin que l'action sédative soit plus rapide.

Cas chroniques : Dans l'intervalle des accès : 3 par 24 heures.

Enfants : de 1 à 3 par 24 heures.

Prix de la boîte : 17 francs.

Laboratoire du QUINSAL

F. BOLLA, Docteur en pharmacie.

Licencié ès sciences.

GRAY (Haute-Saône) — (Téléphones : 126.)

Échantillon et littérature sur demande.

QUINTHÉRYL

Composition. — Ether anesthésique, essence de serpolet, oléo-camphre.

Applications. — *Traitement curatif de la coqueluche, correctif* de toutes les toux quinteuses émétisantes, de l'asthme et de l'emphysème. Peut être employé dans les affections des voies pulmonaires.

Présentation :

1° Ampoules de 1 cc. (série A) pour les enfants de moins de 2 ans.

2° Ampoules de 2 cc. (série B) pour les enfants plus âgés et les adultes.

Posologie. — Une injection *intramusculaire* (pratiquement *indolore*), hebdomadaire pour les enfants, tous les quatre jours pour les adultes.

Prix : Série A : 15 fr. 30.

— Série B : 18 fr. 35.

DÉPOT GÉNÉRAL,

LITTÉRATURE ET ÉCHANTILLONS :

M. LÉONARDON, Docteur en pharmacie

Licencié ès sciences. Ancien Elève de l'Institut Pasteur.

Lauréat de l'Académie de Médecine.

1, rue Paul-Bert — ANGERS

(Tél. : 38-61.)

QUINTI-SUPPOS

Composition. — Phényl-éthyl-barbiturate de codéthyline, éphédrine, phényl-éthyl-malonylurée, serpolet.

Présentation. — Boîtes de 10 suppositoires en étuis.

Trois dosages : Bébés jusqu'à 18 mois, enfants et adultes.

Propriétés. — Sédatif de la toux, d'administration facile, surtout chez les enfants et les malades à intolérance gastrique. Suppriment les vomissements des coquelucheux.

Indications. — *Toutes les toux quinteuses :* Coqueluche, Rougeole, Toux ganglionnaire et rhinopharyngée des enfants. Laryngite, Trachéite, Bronchite aiguë ou chronique, Toux rebelle des fumeurs, Toux émétisante des tuberculeux.

Posologie et prix :

Quinti-Suppos B. Prix : 16 fr. 50.

A partir de 5 mois : un suppositoire le soir.

Après 8 mois : un matin et soir si nécessaire.

Quinti-Suppos E. Prix : 16 fr. 50.

Enfants de plus de 18 mois. Jusqu'à 4 ans : un suppositoire le soir.

Au-dessus : un suppositoire matin et soir.

Quinti-Suppos A. Prix : 18 fr. 50.

Adolescents et adultes. A partir de 15 ans : un suppositoire le soir.

Adultes : un suppositoire matin et soir.

Laboratoires M. PINGUET

38, rue de la République. — MONTLUÇON (Allier).

QUINTOZONE

(Inhalant-Révlusif)

Médication naturelle et externe des maladies de l'appareil respiratoire.

Formule. — Essences balsamiques ozonisées (Pin, Eucalyptus, Lavande, Serpolet... etc.), 13 + Benzoate de benzyle, 1 + Iodure d'éthyle, 0,5 + Acétate d'éthyle, 0,2 + Excipient, 85,3.

Indications et mode d'emploi :

Coqueluche, bronchite, broncho-pneumonie, badigeonnages et frictions sur le thorax. Compresse.

Asthme, Rhume des foins, Coryza : Inhalations fréquentes sur un mouchoir.

Laryngites, trachéites, Angine : Inhalations.

Assainissement des chambres des malades : Vaporisation, Evaporation.

Propriétés. — Avantages. — Odeur agréable, analgésique, antispasmodique, anticongestif.

Le QUINTOZONE agit par évaporation et endosmose.

Présentation. — Flacon stilligoutte pour usage externe.

Prix : 12 fr. 25

Enregistré au L. C. M. n° 1170-3.

Laboratoires de l'OLIPHÉDROL

25, bd Edgar-Quinet, COLOMBES — (Tél. : Cha. 27-86.)

QUINURYL

Cachets :

Acide quinique	0,25
Théobromine.....	0,10
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,25 par cachet.

Comprimés :

Acide quinique.....	0,125
Extrait aqueux sec d'Orthosiphon Stamineus	0,15
Poudre Myrtilles (feuilles)	0,05 par comprimé.

Indications :

Antiréurétique. Spécifique de l'Azotémie. Adjuvant du régime hypoazoté.
L'Orthosiphon Stamineus est un diurétique hépato-rénal, agissant sur l'élimination de l'urée et des chlorures.

(Comm. Soc. de Thérapeutique, janv. 1936.)

Symptômes de la petite Azotémie : vertiges, céphalées, éblouissements, bourdonnements d'oreilles.

Arthritisme, Oligurie.

Cachets (Quinuryl), Comprimés (Quinuryl-Ortho).

Mode d'emploi :

2 à 4 cachets ou 4 à 8 comprimés par jour.

La boîte : 18 fr. 50 (10 jours de traitement)

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

RADIO-BARYX

Préparation opaque pour l'exploration radiologique du tube digestif.
Aliment opaque en poudre contenant 60 p. 100 de sulfate de baryum chimiquement pur, aromatisé au cacao débeurré et sucré.

Enregist. au labor. nat. de Contrôle des Médicaments sous le n° 1143-1.

Avantages. — Facile à diluer, Agréable au goût, met l'estomac en présence de produits familiers, ne provoque aucun spasme réflexe. Expulsion du bol fécal facilitée mécaniquement par l'addition d'une petite quantité d'agar-agar. Conservation parfaite.

Posologie :

Estomac 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 fois.

Région cæco-appen-
diculaire 200 gr. dans 250 gr. d'eau en 1 ou 2 fois.

Transit 400 gr. dans 500 gr. d'eau en 2 ou 3 fois.

Mode d'emploi. — Verser la poudre dans un grand bol et délayer peu à peu avec de l'eau chaude ou froide (ou du lait) en évitant les grumeaux jusqu'à obtention d'une crème liquide.

Présentation. — Boîte de 200 grammes : Prix : 16 francs.

Conditions spéciales à MM. les médecins.

Présentation réservée au corps médical et aux hôpitaux : Boîtes de 2 kgs, 4 kgs, 8 kgs, 18 kgs et fûts de 50 kgs.

Tarif, Echantillons et Littérature sur demande aux :

Laboratoires du RADIO-BARYX

1, rue de Paris — LIMOURS (Seine-et-Oise). (Tél. : n° 71).

R. C. Rambouillet 5-184. — Compte chèques postaux Paris 1857-27.

Commandes pour Paris : Trudaine 55-77.

RADIOBAUME ADRIAN

A base de stovaine, baume du Pérou, gaulacol, extrait de noyer et naphtolate de soude.

Présentation. — Pommade en tube.

Indications thérapeutiques. — Préparation kérato-plastique et kératogénique. Protège, cicatrise, vitalise. A utiliser au cours des traitements par l'électricité, les rayons X, les rayons ultraviolets, l'héliothérapie. Traitement idéal des brûlures, coups de soleil, rougeurs, crevasses, irritations de la peau, etc...

Posologie. — A utiliser en onctions.

Le tube : { Grand modèle : 17 fr. 05.
 { Petit modèle : 10 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. n° 523-42.

**Société Française
de Produits Pharmaceutiques,**

Anc^t ADRIAN et Cie,

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RADIOMAGNÉSIUM

Dragées de chlorure de magnésium (0,30) radioactivé par le bromure de mésothorium (0,001 de microgramme) et possédant à la fois les propriétés décrites par le ^r Pierre Deibet, à l'Académie de Médecine (séance du 10 juillet 1928) et les propriétés radioactives du Bromure de Mésothorium, vitalisant cellulaire de premier ordre et excitant des produits auxquels il est associé.

Indications du Radiomagnésium

1° Reconstituant dans tous les cas de fatigue et d'asthénie; neurotonique puissant: dépression, convalescence, surmenage. — 2° Infections intestinales, entérites, fermentations intestinales, constipations, insuffisance hépatique, toutes infections de voies biliaires. — 3° Tremblements et prurits séniles ou autres, maladie de Parkinson, contractures, crampes. — 4° Troubles nerveux, hypervagotonie. — 5° Dermatoses autotoxiques, prurits, eczéma, aigé, psoriasis. — 6° Verrues et lésions de type précancéreux. — 7° Prophylaxie du cancer et traitement adjuvant des néoplasmes.

Contre-Indication du Radiomagnésium. — Aucune.

Prix au public: Boîte de 96 dragées: 22 fr. 75.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer avec un peu d'eau 4 à 8 dragées par jour. A prendre moitié avant le coucher et moitié au réveil, ou un quart d'heure avant chaque repas, suivant indication du Médecin.

La dose de 4 dragées peut être continuée indéfiniment, mais on peut également l'interrompre huit jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 466-4.

Laboratoires RHEMDA (fondés en 1914).

S. MOGAN, Pharmacien, 51, r. d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).
Tél.: Wagram 58-89. R. C. Seine 255 068 B.

RADIO SALIL

Suractivé.

Composition. — Salicylate de Glycol, Salicylate de Méthyle, Capsicine, Menthol, suractivés sous l'influence de la radio-activité du Mésothorium.

Action. — Analgésique, révulsive, résolutive. Combat l'élément douleur, efficacement et rapidement, grâce à la suractivation des éléments actifs.

Indications. — Toutes douleurs aiguës: rhumatismes, goutte, sciatique, lumbago, névralgies faciales et intercostales, foulures, etc... Comme révulsif, dans la congestion des voies respiratoires.

Présentation. — Crayon fondant, pour usage externe, d'un emploi pratique, ne tachant ni les mains ni le linge, et sans odeur désagréable.

Mode d'emploi. — Applications *loco dolenti*, non suivies de frictions. Recouvrir légèrement de coton ou de flanelle. Avant chaque application, nettoyer la peau à l'alcool.

Laboratoires UROMIL - L. BÉLIÈRES, D^r en Ph¹²
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).
(Tél.: Provence 04-00.)

RADIOTÉTÉTRANE GÉRARD

Composition. — Tétra-iodo-phénol-phtaléine disodique.

Mode d'action. — Opacifie la vésicule biliaire aux Rayons X.

Avantage. — Stable, de composition constante, non toxique, goût agréable.

1° A. Forme dragées : grâce à son enrobage spécial, la dissolution intestinale et la visibilité vésiculaire sont assurées.

2° B. Forme colloïdale : préparation liquide faite pour les malades ne pouvant absorber les dragées.

3° C. Forme poudre : préparation à faire dissoudre dans un demi-verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz.

4° Formes ampoules : pour injection intraveineuse.

Indications. — Examens radiologiques de la vésicule biliaire.

Forme et mode d'emploi :

1° A. Dragées : 15 à 20 au cours du repas. Visibilité maxima entre la 14^e et la 16^e heure : 28 fr. 85.

2° B. Forme colloïdale : mélanger le contenu des deux flacons immédiatement avant l'absorption. Absorber la totalité du liquide (environ 80 cc.) : 28 fr. 85 (dose unique).

3° C. Forme poudre : faire dissoudre dans un tiers de verre d'eau pure et ajouter eau de Seltz ou eau de Perier : 23 fr. 10 (dose unique).

4° D. Forme colloïdale grand modèle, créée pour l'application de la méthode Sandström : 57 fr. 65.

5° E. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 3 gr. pour application de la méthode de Sandström : 46 fr. 15. Faire dissoudre chaque tube dans 1/3 de verre d'eau et ajouter q. s. d'eau de Seltz ou d'eau de Perier.

6° G. Forme poudre : la boîte de 3 tubes de 2 grammes pour application de la méthode de Sandström : 32 fr. Faire dissoudre chaque tube dans 1/3 de verre d'eau et ajouter q. s. d'eau de Seltz ou d'eau de Perier.

7° F. Forme intraveineuse : Faire dissoudre dans 50 cc. d'eau bidistillée et injecter très lentement : 14 fr. 75.

Enregistrés au L. N. C. M. : Dragées — N° — 111-3.

Liquide — N° — 111-2. Poudre — N° — 111-8.

Laboratoire du Dr LAURENT-GÉRARD

40, r. de Bellechasse — PARIS (VII^e). — (Tél. : Inv. 78-44.)

RADONOL

Produits radio-actifs au Radon maintenu à teneur constante et sans aucune trace de radium dans les médicaments.

Le Radon est le seul corps radio-actif absolument inoffensif.

ADHÉSIF RADONOL

Radon : 1 000 millimicrocuries.

Prix de la boîte de 1 adhésif : 40 fr. 40.

Radon : 600 millimicrocuries par adhésif.

Prix de la boîte de 2 adhésifs : 60 fr. 60.

Toutes myalgies rhumatismales. Troubles trophiques consécutifs aux fractures.

HUILE RADONOL

Radon : 800 millimicrocuries par ampoule.

Prix de la boîte de 5 ampoules : 82 fr. 85

Instillation vésicale, pansement vaginal, lavement rectal, pansement local.

Traitement des affections gynécologiques et ano-rectales et des algies viscérales et pelviennes.

Traitement des ulcères et des prurits.

OVULE RADONOL

Radon : 400 millimicrocuries par ovule.

Prix de la boîte de 5 ovules : 60 fr. 60.

Traitement des métrites, annexites, névralgies pelviennes, vaginites, vaginisme.

SUPPOSITOIRE RADONOL

Radon : 400 millimicrocuries par suppositoire.

Prix de la boîte de 5 suppositoires : 60 fr. 60.

Toutes algies viscérales et pelviennes.

SUPPOSITOIRE ANO-RADONOL

Radon : 400 millimicrocuries par suppositoire.

Prix de la boîte de 5 suppositoires : 60 fr. 60.

Affections ano-rectales d'origine inflammatoire.

Tous nos produits sont soumis au Contrôle de l'Institut du Radium de Paris, Laboratoire Curie (Service des mesures) qui a établi :

1° Que la radio-activité (teneur en Radon) indiquée sur l'étiquette est exacte ;

2° Que cette teneur reste constante pendant un temps illimité ;

3° Que l'excipient ne contient aucune trace de radium.

Numéros d'enregistrement au L. N. C. :

Ovule Radonol : 1953/1.

Suppositoire Radonol : 1953/2.

Huile Radonol : 1953/3.

Adhésif Radonol : 1953/4.

Suppositoire Ano-Radonol : 1953/5.

Laboratoires VIRAO

110, boulevard Haussmann — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-95.)

RANGOL

Forme. — Comprimés.

Formule :

Gardénal, Tartrate borico-potassique, NaBr, Extraits de datura, jusquiame, gelsé-mium, cratægus, ballote, passiflore, valériane stabilisée, pancréas.

Indications :

Irritabilité du sympathique, angor, névroses, insomnies, spasmes.

Posologie :

2 à 8 comprimés par 24 heures par doses fractionnées.

Prix. — 20 francs.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 403-26.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

RAPHABIL

Association des principes actifs du suc de *Raphanus sativus niger* et d'acide déhydrocholique.

Propriétés. — Action cholérétique, cholécystokinétique. Drainage du cholécyste. Propriétés laxatives par excitation du péristaltisme intestinal.

Indications. — Insuffisance hépatique et foie torpide. — Insuffisance biliaire. — Atonie et stase vésiculaires. — Troubles digestifs gastriques qui en dérivent : sensation de pesanteur gastrique, ballonnement, somnolence après les repas, difficile digestion des corps gras, mi-graines, etc. — *Constipation.* — Selles irrégulières.

Posologie et mode d'emploi. — Dose moyenne : 1 à 3 dragées 2 fois par jour, après les repas. Dans les cas de constipation opiniâtre, prendre le matin à jeun 2 dragées de Raphabil.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

RAPHARÈNE

Composition. — Extrait fluide glycériné de *Raphanus sativus* *barbiens* (procédés d'extraction du D^r H.-R. Olivier, permettant l'action des principes actifs de la plante à l'état frais).

Propriétés. — Étudié par tubage duodénal, il excite la contraction vésiculaire, fait apparaître la bile B, décuple la sécrétion de la bile A hépatique.

Médication cholagogue et cholérétique au plus haut degré. Il combat la constipation chronique essentielle par suppléance de l'insuffisance hépatique biliaire. Aucune accoutumance ni irritation.

Indications. — Tous états morbides hépatiques ou vésiculaires (Lithiase et stases biliaires, insuffisance hépatique), Angiocholites, Convalescence des maladies infectieuses. Traitement de choix du foie des coloniaux.

Posologie. — Une cuillerée à entremets ou deux pilules un quart d'heure avant les deux principaux repas, 10 jours par mois. Pour les enfants, une cuillerée à café ou une pilule dans les mêmes conditions.

Prix :

Rapharène liquide : 31 fr. 20.

Rapharène pilules : 20 fr. 80.

Laboratoires JOURNET

18 et 20, rue Vavin — PARIS (VI^e)

(Tél. : Danton 70-07.)

RAVIX

Lait en poudre Guigoz irradié, 300 unités internationales de Vitamine D pour 100 gr. de poudre.

Soumis aux radiations ultra-violettes en couche extrêmement mince, il conserve, du fait de son conditionnement sous vide, son pouvoir antirachitique pendant plusieurs mois. (Délai d'utilisation mentionné sur la boîte.)

En raison de son activation par les U.V., il présente une légère odeur d'ozone, témoin de son irradiation, néanmoins il est bien accepté par les nourrissons.

Indications. — Rachitisme, prérachitisme, convalescence, débilité.

Mode d'emploi. — 5 gr. de poudre pour 25 à 30 gr. d'eau tiède ou froide, jamais bouillante.

Posologie. — a. Préventive : 20 à 30 gr. de poudre par jour.

b. Curative : 50 à 80 gr. de poudre par jour, dose à ne pas dépasser, sauf pour les adultes.

Pour les bébés, compléter avec le lait habituel.

Le traitement curatif est de 6 à 8 semaines.

Voir :

Lait en poudre GUIGOZ.

Lait Déchloruré GUIGOZ.

Lait Dextrosé Malté GUIGOZ.

Babeurre GUIGOZ.

Littérature et échantillons :

LE LAIT GUIGOZ

2 et 4, rue Catulle-Mendès, PARIS (XVII^e). (Tél. : Wagram 66-76 et 77.)

RÉALPHÈNE

Composition. — Ether phosphorique du glucose (2 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé et d'éllixir) et Acétylaminooxyphénylarsinate de chaux ou de soude (5 cgr. par mesure ou cuillerée de granulé ou d'éllixir).

Indications. — Asthénie, Anorexie, Amaigrissement, Convalescences, Anémies, Surmenage, Entérites chroniques.

Présentation. — Granulé, éllixir.

Posologie :

Adultes : Granulé et éllixir : 2 à 4 mesures ou cuillerées par jour au début des repas.

Enfants : Granulé : 1 à 2 mesures au début des repas.
Une semaine de traitement sur deux.

Nourrissons : Granulé : 1 à 3 demi-mesures par jour.
4 jours de traitement sur 8.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

RECONSTITUANT MARY

Propriétés thérapeutiques. — Tonique de premier ordre ; grande richesse thérapeutique.

Nature à base de Noix vomique, Arrhénal, Kina, Coca, Kola, Colombo, Gentiane, etc.

Traitement curatif des anémies, lymphatisme, anorexie, convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 verres à madère au milieu du repas. Demi-dose pour enfants.

Prix : 25 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n^o 742-0.

Laboratoire P. TAVERNIER

32, rue de l'Ouest — PARIS (XIV^e).

RECRESAL

Composition. — Orthophosphate monosodique.

- Indications.** — 1° Toutes les maladies infectieuses aiguës.
 2° Faiblesse constitutionnelle ; anémie, rachitisme, scrofulose, tuberculose, y compris la tuberculose osseuse.
 3° Etats d'épuisement général, physique ou psychique, par suite de surmenage, spécialement aussi chez les enfants en âge scolaire ; stimulation de la capacité de rendement physique et mental.
 4° Stimulation énergétique de la guérison après interventions chirurgicales et gynécologiques.

Posologie. — Comprimés de Recresal : 3 fois par jour
 1 à 3 comprimés 1/4 d'heure après le petit déjeuner et le déjeuner de midi.

Présentation :

Petite boîte : 30 comprimés : 8 fr. 35.

Grande boîte : 60 comprimés : 15 fr. 60.

Laboratoire RECRESAL

Pharmacie Normale L. BÉLIÈRES,

Docteur en Pharmacie,

19, rue Drouot — PARIS (IX°).

RECT'ACOLITOL

Pansement recto-sigmoïdien.

Composition. — Sous-gallate de Bismuth ; carbonate de Bismuth ; carbonate de Calcium ; Ferripyrine ; Extrait de Jusquiame ; Extrait de Cupressus ; Antipyrine ; Oxyquinoléine ; Mucilage végétal.

Présentation. — Granulé fondant permettant la préparation d'un lavement crémeux.

Propriétés thérapeutiques. — Pansement protecteur antiseptique, antiparasitaire, cicatrisant, sédatif. Traitement local par lavement des affections inflammatoires, infectieuses ou parasitaires des segments terminaux de l'intestin.

Indications. — Recto-sigmoïdites, recto-colites, rectites, ano-rectites, hémorroïdes internes.

Posologie. — Affections ano-rectales : une cuillerée à potage mélangée à 5 cuillerées à potage d'eau chaude. Affections recto-sigmoïdiennes : 2 cuillerées à potage mélangées à 10 cuillerées à potage d'eau chaude.

Enfants : quart ou demi-dose selon l'âge.

Prix : 20 fr. 80.

LANCOSME, 71, Avenue Victor-Emmanuel-III — PARIS (VIII°).

(Tél. : Élysées 17-46.)

RECTAGINE

Suppositoires décongestifs pelviens.

Composition. — Argent colloïdal, Hydrargyre, campholéo sulfonate de sodium et Extrait de Jusquiame.

Indications. — 1° *Hémorroïdes*, rectites, prurit anal, oxyures.

2° *Chez l'homme*: Agit sur les complications de la blennorragie, sur l'urètre, les testicules, les vésicules séminales, la prostate, etc.

3° *Chez la femme*: Action complémentaire des crayons Leucagine dans le traitement des métrites à tous stades; médication de tous les états congestifs ou inflammatoires de l'utérus, des trompes et des ovaires.

Posologie. — Introduire un suppositoire au moment du coucher, pendant 10 jours consécutifs, ou tous les 2 jours suivant le cas.

La boîte de 10 suppositoires : 17 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 535-11.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 73-92.)

RECTOLINE

Pommade lanolinée à base d'Œsculine adrénalinée et d'Orthocaïne, livrée en tube avec canule spéciale.

Pansement hémorroïdicure parfait.

Prop. thér. — Action calmante, décongestionnante, hémostatique et directement curatrice. Absorption facile, inodore, incolore. Application méthodique *loco dolenti* et toujours aseptique.

Prix : 16 francs, complète.

Tube de rechange : 13 fr. 40.

Laboratoire de la Varilaxine.

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

RECTOPANBILINE

Formes. — Solution pour lavement et suppositoires.

Définition. — Lavement établi d'après les dernières données scientifiques et les travaux du Dr Bensaude amenant, en quelques minutes, sans réaction nocive, par un mécanisme physiologique, une évacuation complète de tout le gros intestin. — Non irritant, non douloureux, non toxique, non salissant. — Concourt, en outre, à la guérison durable de la *Constipation* en rétablissant la biligénèse normale grâce à sa teneur en *Panbiline*. (Voir *Panbiline*.)

Composition. — Est une *Panbiline* avec prédominance d'Extrait de *Bile fraîche* additionnée, dans les suppositoires, de glycérine solidifiée.

Indications. — Toutes les modalités de *Constipation* médicale. En s'opposant à l'*Auto-intoxication intestinale*, supprime ses nombreuses manifestations pathologiques (troubles digestifs, nerveux, nutritifs, cutanés, etc.). Est le meilleur moyen d'entraver le développement de l'*Artériosclérose*, dont le point de départ est aujourd'hui rattaché universellement à l'*Auto-intoxication intestinale* (Huchard, Chauffard, etc.). Résout parfaitement le problème posé par Metchnikoff dans ses travaux sur la *vieillesse précoce*.

Autres indications : Hémorroïdes, Vers intestinaux, Etats où la défécation doit se faire sans efforts, Hernies, Grossesse, Accouchements.

Posologie. — Un ou 2 suppositoires par jour ou 1 à 3 cuillerées à café de solution dans 160 gr. d'eau bouillie chaude à prendre en lavement à garder quelques minutes. — *Enfants* : demi-dose.

N° d'Enregistrement au L. N. C. : 469-3-4.

Prix au public :

Frcs : 15 le pot de Rectopanbiline.

Frcs : 12,50 la boîte de suppositoires.

Laboratoires du Docteur PLANTIER
ANNONAY (Ardèche).

RECTO PANSEMENT

AMIBIASINE

Ampoule lavement de 125 cc.

Composition. — Le Recto Pansement Amibiasine est un composé gélose Amibiasine à 5 % d'Agar Agar et 20 % d'Amibiasine normale.

Propriétés. — L'action désinfectante, calmante et cicatrisante de l'Amibiasine y est mise à profit. La gélose maintient l'Amibiasine en contact intime avec la muqueuse rectale congestionnée ou ulcérée.

Calme le ténésme, les coliques intestinales.

Le Recto Pansement : *panse, désinfecte, cicatrise.*

Indications. — Rectocolites diffuses ou localisées, hémorragiques ou purulentes, Entérocologie, colites légères ou graves, diarrhées profuses des tuberculeux, des cancéreux, des anémiés, des vieillards. Dysenteries aiguës et chroniques, parasitaires ou microbiennes. Dermatoses d'origine digestive. Eczéma, Colibacillose, etc. Diarrhées rebelles, ténésme. Rectites de toutes origines.

Mode d'emploi. — *a.* Faire prendre au malade un lavement évacuateur à l'eau bouillie salée à 7 gr. par litre. *b.* Deux heures après administrer le Recto Pansement comme un lavement après avoir eu soin de liquéfier le contenu de l'ampoule en la chauffant au bain-marie. Une ampoule de 125 cc. en lavement tous les 2 jours. Compléter le traitement local par 3 comprimés d'Amibiasine quotidiennement.

La boîte (une ampoule de 125 cc.) : 12 fr. 75.

(Taxe d'Armement comprise.)

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e).

RECTOSEPTAL

(Anciennement RECTOSEPTOL.)

Suppositoires anti-infectieux permettant de réaliser l'imprégnation créosotée suractivée.

Action bactéricide sur toute la flore pathogène.

Composition :

	Ad.	Enf.
Créosote pure.....	0 gr. 50	0 gr. 30
Sulfate double d'orthoxyquinoléine et de potassium.....	0 gr. 02	0 gr. 012
Essences antiseptiques.....	0 gr. 0	0 gr. 024
Camphre	0 gr. 05	0 gr. 03
Ephédrine base.....	0 gr. 005	0 gr. 003

Indications. — Toutes affections broncho-pulmonaires et bacilloles ; prophylaxie des complications pulmonaires de la grippe, de la rougeole et de la coqueluche et des accidents pulmonaires post-opératoires.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

La boîte de 8 supp. : *Enfants*, 16 fr. ; *Adultes*, 19 fr.

Supprime toute intolérance gastrique.

Aucune action irritante sur la muqueuse rectale.

Laboratoires DEROL

154, avenue Malakoff — PARIS (XVI^e).

RECTOSOL

Suppositoires

Antihémorroïdaires.

A base d'iodorésorcinosulfite de Bismuth avec excipient Rectoline.

Indications. — Hémorroïdes internes et leurs complications.

Dose et mode d'emploi. — Introduire un ou deux suppositoires le matin, une heure environ avant la selle, après l'application de la Rectoline, ou le soir en se couchant lorsque les hémorroïdes sont congestionnées et douloureuses par suite de la fatigue de la journée.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGERES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

RÉNOCARDINE

Le cardiotonique de la soixantaine.

Indications. — Cardiopathies décompensées, Insuffisance myocardique, Néphrites et Cirrhoses, Œdèmes et Ascites, Urémie et toutes insuffisances cardio-rénales.

NI toxicité. — NI accoutumance. — NI accumulation.

La Renocardine est un cardio-tonique d'entretien et un diurétique rénal aussi actif que la théobromine, mais ne provoquant ni céphalée ni intoxication urique.

Composition. — Dragées d'extraits physiologiquement titrés, de plantes fraîches stabilisées :

Adonis vernalis. Pyrole. Fleur de genêt. Orthosiphon stamineus.

Doses. — Deux dragées au début des deux repas.
Traitement pour 8 jours : 18 francs.

Littérature et échantillons.

Enregistré au L. N. C. M. n° 487-5.

Laboratoires PERROCHON

A. ABADIE, D^r en Pharmacie.

TOURS. (Tél. 54.65.)

RÉNOLINE

Cachets.

Bleu de Méthylène.....	0,01
Salicylate de Phénol	0,50
Buchu pulvérisé.....	0,07
Benzoate de lithine	0,20
Bicarbonate de soude.....	0,10
Benzoate de soude.....	0,10

Pour 1 cachet.

Indications. — Antisepsie vésico-rénale,
Diathèse urique et ses conséquences.

Doses. — 2 cachets par jour.

Prix : 17 fr. 35,

Laboratoires LECONTE

12, rue des Petits-Carreaux — PARIS (II^e).

RENOVITASE

Maladies de la Nutrition. — Maladies arthritiques.

Composition :

Sulfate de calcium.....	0,052	Sulfate de magnésium	0,091
— cuivre.....	0,028	— manganèse	0,071
— fer.....	0,072	Pour 1 cc. quantité en milligramme.	

Oléate métallique parfaitement osmosable grâce à la dilution extrême de ses composants, réveille l'activité des hormones qui lui sont associées.

Formes : Voie buccale : Capsules (étui de 20) et Elixir.

Voie intramusculaire : Ampoules de 2 et de 5 cc. Boîte de 6 et de 12.

Voie intrarectale : *Huile Rénovitase*, lavement de 10 cc. à conserver 5 à 6 heures. *Pansements :* Pommade en pot de 30 et 90 grammes ; pour coupures et brûlures (effet rapide et indolore).

Indications : Rhumatismes chroniques — Goutte — Rhumatisme déformant — Asthme thyroïdien — Fibrome — Goitre — Infantisme — Métrorrhagies — Retards menstruels — Psychose — Certaines Dermatoses — Consolidation de Fractures — Anémie — Convalescence — Artériosclérose — Emphyseme — Hémorrhoides. — Grossesse.

Posologie : Au début des deux principaux repas, pendant 10 jours, une Capsule ou une cuillerée à soupe d'Elixir. Après 10 jours, arrêter 5 jours avant de faire une nouvelle dizaine.

Tous les 3 jours, ou tous les 2 jours (suivant le cas), une injection intrarectale de 10 cc. ou une piqûre intramusculaire de 2 ou de 5 cc. (faite très lentement avec aiguille de 9/10^e). Les deux pour intensifier.

En pansement, la pommade. Pour les brûlures, elle supprime la douleur rapidement et évite les cicatrices. S'applique aussi pour toutes blessures, coupures.

L. N. O. M. N° 1024-2.

Laboratoires des HORMOMÉTALIONS

50, avenue Jacqueminot, MEUDON (Seine-et-Oise). (Tél.: Obs. 13-33.)

RENOXYL

Toutes insuffisances rénales.

Comprimés contenant l'extrait de salsepareille.

Propriétés thérapeutiques. — Provoque la diurèse, active l'élimination de l'urée, augmente l'excrétion de l'acide urique.

Indications. — Néphrites chroniques, azotémie, uricémie, albuminurie, migraines, céphalées, asthénie.

Présentation. — Boîte de 50 comprimés titrés à 5 cgr. de principe actif.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 comprimés par jour administrés en deux fois au moment des principaux repas.

Enfants : demi-dose.

Prix au public : 15 fr. 90.

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

RÉSOCAÏNE

Spécifique du Coryza et des affections douloureuses du Nez et des Sinus.

(Sédation et décongestion immédiates.)

Forme. — Pommade nasale, en tube spécial pour injections nasales.

Composition. — Adrénaline physiologique ; Bismuth sous-gallate ; Essence de Niaouli ; Cocaïne ; Chlorhydrate d'amyléine ; Résorcine ; Menthol ; Essence de Thym ; Excipient stérilisé.

Indications. — Coryza, sinusites, obstructions nasales, rhume des Foins, ozène, surdité. Antisepsie du nez et de la gorge.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, plusieurs fois par jour.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

RÉSOLUTIF RUBY

Cataplasme ouaté pour pansements humides stériles.

Propriétés. — Emollient, analgésique, aseptique, instantané.

Indications. — Furoncles, Anthrax, Abscess, Orgelets, Panaris, Plaies infectées, Fluxions dentaires, Nettoyage des plaies terreuses par agglutination.

Le **RÉSOLUTIF RUBY** stérilisé en boîtes fer-blanc est le seul moyen rapide d'obtenir un pansement humide rigoureusement stérile.

Mode d'emploi. — Imbiber le Résolutif avec de l'eau chaude stérile et placer la couche émolliente de gaze en contact avec la partie malade. Recouvrir avec l'imperméable et un bandage de préférence en crêpe.

Prix de vente en pharmacies :

	Carré.	Petit.	Moyen.	Grand.
<i>Résolutif en boîte carton.</i>	10 × 10 $\frac{1}{2}$ m	20 × 15 $\frac{1}{2}$ m	25 × 22 $\frac{1}{2}$ m	50 × 22 $\frac{1}{2}$ m
La boîte	2 fr. 00	2 fr. 75	4 fr. 25	7 fr. 00
<i>Résolutif stérilisé, boîte fer-blanc.</i>	De 5 carrés de 7,5 × 7,5 $\frac{1}{2}$ m.			
La boîte	7 fr. 00			

Laboratoires des Pansements RUBY
M. PACCARD, Docteur en pharmacie
VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

RÉSYL

Éther glycéro-gaiacollique
CIBA

ANTISEPTIQUE PULMONAIRE, ANTICATARRHAL.

Non caustique, libérant du gaiacol à l'état naissant. Puissant modificateur des sécrétions bronchiques. Sous son influence la bronchorrhée diminue, les bacilles se raréfient, l'état général et les signes stéthoscopiques s'améliorent.

Indications. — Tuberculose pulmonaire avec ou sans température, Bronchites, catarrhe bronchique et toutes les affections de l'appareil respiratoire en général.

Sirop, Comprimés, Ampoules.

Doses. — *Sirop* : 2 à 6 cuillères à café par jour.

Comprimés : 2 à 6 par 24 heures.

Ampoules : Une tous les 2 jours.

Médecine Infantile. — Chez les nourrissons, XXV à CXX gouttes de sirop mélangées aux biberons.

Formuler. — Flacon sirop grand modèle.

— — petit —

Tube de 20 comprimés.

Boîte de 12 ampoules.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

RÉTHRAGINE

(Bougies antiblennorragiques radifères.)

Traitement local bactéricide et radio-actif des affections urétrales aiguës et chroniques chez l'homme et chez la femme. (1 bougie dans l'urètre tous les 1 ou 2 jours.)

Présentation :

Bougies Réthragine « H » pour les hommes ;

Bougies Réthragine « F » pour les femmes.

Il existe deux concentrations radifères : 1 et 2 micros.

(Pour les femmes, 1 micro seulement.)

Prescrire : *hommes* : Bougies Réthragine « H » à 1 ou 2 micros ; *femmes* : Bougies Réthragine « F ».

Prix :

La bougie Réthragine H. 1 micro, 13 frs ; 2 micros. 16.50

La boîte de 5 bougies Réthragine H. (1 micro)... 60 —

La boîte de 5 bougies Réthragine H. (2 micros) .. 75 —

La bougie Réthragine F. (1 micro) 13 —

Enreg. au Lab. de Cont. sous les n° 535-11, 12, 13 et 14.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

RÉTROPITUINE CARRION

Composition. — Extrait injectable de lobe postérieur d'hypophyse, titré physiologiquement en unités internationales (deux, cinq et dix unités en ce qui concerne, respectivement, la Rétropituite n° 2, n° 5 et n° 10).

Formes :

Ampoules de 1 cc. (Rétropituite 2 et 10).

Ampoules de 10 cc. (Rétropituite 5).

Indications :

N° 2 : Inertie utérine au cours des accouchements.

N° 10 : Inertie utérine à la délivrance. Hémorragies post-partum. Métrites hémorragiques. Ménorragies. Prévention des hémorragies post-opératoires. Atonie de la musculature de l'estomac, de l'intestin et de l'appareil urinaire. Ulcère gastro-duodénal. Diabète insipide.

N° 5 : Hémoptysies des tuberculeux.

Posologie et mode d'emploi. — Injection sous-cutanée ou intramusculaire de 1 cc. (Rétropituite n° 2) ; de 0 cc. 5 à 1 cc. (Rétropituite n° 10). Injection intraveineuse lente (Rétropituite n° 5).

Présentation et prix :

La boîte de 1 ampoule n° 2 ou 10 : 5 fr. 80.

— de 4 ampoules n° 2 ou 10 : 20 fr. 70.

— de 6 — n° 2 ou 10 : 28 fr. 65.

— de 3 — n° 5 : 19 fr. 05.

Enregistré au L. N. C. n° 514-71 et 126.

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-St-Honoré — PARIS (VIII°).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

REVISCENTYL

Masculin (M). Féminin (F).

Médication polyhormonale sthénique et de croissance.

Comprimés renfermant un mélange de laitances et d'œufs de poissons marins, d'extrait orchitique (M) ou ovarien (F), d'extrait d'anté-hypophyse et de glycérophosphate de magnésie — en comprimés de couleur différente pour chaque sexe.

Indications. — Croissance des adolescents pubères, Compensation chez les femmes célibataires par vocation ou obligation, Surmenage, Asthénie, Sénilité précoce des deux sexes.

Contre-indication. — L'hypertension élevée.

Posologie. — Dans le premier cas : 4 comprimés par jour, 2 de chaque couleur, 1 + 1 comprimé, 10 minutes avant chacun des repas de midi et du soir, pendant 10 jours par mois, intercalés d'égales périodes d'un traitement polyvitaminique et polyhormonal.

Dans les autres cas : 2 comprimés tous les jours, un de chaque couleur, pendant un mois, 10 minutes avant le petit déjeuner du matin. Cesser un mois, reprendre un mois, pendant le temps nécessaire.

Prix public : 40 fr. la boîte de 60 comprimés.

Dr DENARD

Docteur en médecine et en pharmacie,
125, Grande-Rue — OULLINS (Rhône).

RÉVULSIF ADRIAN

Composition :

A base de terpènes retirés de diverses essences aromatiques et en particulier de l'essence de serpolet (ne contenant ni essence de moutarde, ni teinture de capsicum).

Présentation :

Révulsif médical et chirurgical.

Indications :

1° Révulsif médical :

- a. Affections des voies respiratoires : bronchites, trachéites, asthme, grippe, etc.
- b. Douleurs rhumatismales et névralgiques.

2° Révulsif chirurgical :

Préventif des complications pulmonaires par emploi systématique chez tous les opérés, avant et après l'intervention.

Posologie et mode d'emploi :

1° Révulsif médical :

En badigeonnage avec un pinceau sur le dos ou la poitrine du malade (voies respiratoires) ou sur la région douloureuse (douleurs rhumatismales ou névralgiques). Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

2° Révulsif chirurgical :

Badigeonnages le matin ou la veille de l'opération et quelque temps après l'opération en avant et en arrière de la cage thoracique. Recouvrir d'ouate ou de flanelle.

Prix :

Le flacon révulsif médical : 10 francs.

— révulsif chirurgical : 14 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. n° 523-43.

Société Française de Produits pharmaceutiques

Anc^e ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

RÉVULSIF FISCH

(Anciennement Procipha.)

Forme. — Liquide, incolore, aromatique.

Composition :

Acétate de Bornyle.....	7,00
Carvacrol	2,00
Limal	2,00
Benzylidène Acétone.....	6,00
Thymol.....	1,80
Dipentène.....	10,00
Acétate de Terpényle	5,00
Éthanol	62,00
Essence de térébenthine rectifiée.....	4,20

Pour 100 grammes.

Indications. — Rhume, Laryngite, Bronchite, Maladies des voies respiratoires aiguës et chroniques ; Affections rhumatismales et névralgiques.

Mode d'emploi. — Badigeonner avec un pinceau la surface à révélsur. Pour bains de pied, 1 à 3 cuillerées à café.

Enfants : diluer à 50 p. 100 avec alcool ou eau de Cologne.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 659-15.

Prix : 12 fr. 25.

Laboratoires FISCH & S. à. r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS :

104, faubourg Poissonnière (X°). (Tél. : Trudaine 92-52.)

RÉVULSIF FOUCHÈRE

Formes :

Liquide (adultes).

Pommade (enfants et bébés).

Composition :

Liquide Benzylidène acétone, Thym rouge, Niaouli. (En badigeonnages.)

Pommade Capsicine, Eugénol, Essence de thym, Essence niaouli, Essence de térébenthine, Gaïacol.

Indications. — Affections des voies respiratoires et rhumatismales.

Laboratoire de Thérapeutique Générale du S. E.

**A. FOUCHÈRE, Pharmacien,
RIVE-DE-GIER.**

RÉVULSIF LIQUIDE BOUDIN

Propriétés thérapeutiques :

- 1° Il produit en une minute une révulsion intensive ;
- 2° Etant liquide, il peut être appliqué très rapidement sur une très large surface ;
- 3° Après le badigeonnage, le malade ne pouvant l'arracher, est forcé d'en subir les effets ;
- 4° Il ne colore pas et n'abîme pas la peau, peut être renouvelé et appliqué plusieurs fois par jour ;
- 5° absorbé par la peau, il agit efficacement sur les régions profondes qu'il décongestionne très vite ;
- 6° il ne contient aucun produit nuisible pour les reins ;
- 7° il n'entre dans sa composition ni cantharide, ni produit caustique ou acide.

Indications thérapeutiques :

- 1° Maladies aiguës des voies respiratoires : Rhume, Laryngite, Bronchite, Congestion pulmonaire, Fluxion de poitrine, Pleurésie, Pneumonies Broncho-Pneumonie ; —
- 2° Maladies chroniques, des voies respiratoires : Asthme, Emphysème-Catharrhe, Bronchite chronique, Tuberculose pulmonaire ; —
- 3° Douleurs, Rhumatismes, Névralgies, Torticolis, Lumbago, Points de côté, Rhumatismes aigu et chronique, Arthrites, Névralgies de toutes sortes.

Mode d'emploi :

- 1° Dans les maladies aiguës ou chroniques des voies respiratoires, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif le dos et la poitrine du malade. Laisser sécher et appliquer flanelle ou ouate ;
- 2° Dans les douleurs, rhumatismes, névralgies, badigeonner deux fois par jour avec le pinceau imbibé du Révulsif toute la région douloureuse ou malade et la recouvrir ensuite de flanelle ou d'ouate. Pour les enfants dont l'épiderme est plus sensible que chez les grandes personnes, on peut additionner le Révulsif d'eau de Cologne ou d'alcool par partie égale.

Laboratoire BOUDIN

9, avenue Jean-Jaurès

JOINVILLE-LE-PONT (Seine).

(Tél. : Gravelle 23-15.)

RÉVULSIF MANOR

Présentation. — Liquide incolore, d'odeur agréable.

Composition. — Essences complètes extra-distillées, hexahydrothymol et hydrate de térébenthène.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires. Toutes les algies, superficielles ou profondes, musculaires ou nerveuses.

Mode d'emploi. — Badigeonnage sur la poitrine et sur le dos pour les voies respiratoires et *loco dolenti* pour les algies.

Particularités : Le *Révulsif Manor* ne produit jamais la moindre irritation de l'épiderme, pas même chez la femme, ni chez le nourrisson. Il convient donc pour tout le monde. Sa grande activité est due à ce qu'il imprègne complètement les voies respiratoires par pénétration rapide à travers la peau et par inhalation de ses vapeurs.

Antiseptique, Analgésique; Balsamique modificateur des sécrétions bronchiques.

Prix : le grand flacon, 12 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. 1671-3.

Laboratoires MANOR

SAINT-GERMAIN-DU-BOIS (Saône-et-Loire).

Tél. 35.

RÉVULSIF MILKO

Innovation thérapeutique.

Composition. — Essences naturelles. Terpènes, Alcool. (Ne renferme pas de produits phénoliques, d'essences de moutarde ou de capsicum, prurigineux.)

Présentation. — 3 concentrations différentes :

N° 1. *Pour bébés* (nourrissons et jeunes enfants) : 7 fr. 15.

N° 2. *Pour enfants* (de 5 à 13 ans environ) : 8 fr. 15.

N° 3. *Pour adultes* : 9 fr. 85.

Le *Révulsif Milko* détermine une vaso-dilatation intense sans provoquer de phlyctènes. Ne tache ni n'altère les téguments, d'où répétition à volonté des badigeonnages. Pas d'action lacrymogène ni sternutatoire. Odeur agréable.

Action secondaire : Antisepsie pulmonaire par absorption cutanée des essences et élimination bronchique.

Indications. — Rhume, Bronchite, Broncho-pneumonie, Coqueluche, Pleurite, Pleurésie.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE

Médaille d'Or Strasbourg 1927.

RHAGADINE BRACQUEMOND

Enregistré au Laboratoire National
de Contrôle des Médicaments.

Forme et composition. — Pommade en tubes. Composé organique à base de kératine. Excipient gras.

Propriétés thérapeutiques. — Régénérateur de l'épiderme. Cicatrisant. Calmant aseptique et non toxique.

Indications thérapeutiques. — Crevasses des seins, érythèmes des nouveau-nés, fissures anales, écorchures, brûlures, ulcères variqueux, plaies atones, toutes irritations et érosions cutanées.

Échantillons sur demande :

Pharmacie ROUSSEAU

71, avenue de Villiers — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 73-94.)

RHÉANTINE LUMIÈRE

Vaccinothérapie polyvalente Antigonococcique.

Constitution. — Stock vaccin polyvalent, forme de 24 souches différentes de gonocoques, rigoureusement stérilisées et desséchées à froid par des procédés spéciaux, divisées ensuite en sphérules kératinisées.

Propriétés. — Seule la méthode vaccinothérapique, qui agit par voie humorale, est susceptible d'assurer la destruction des germes infectieux dans les localisations à distances (vessie, testicules, utérus, ovaires, rein, articulations, etc.), où il est impossible de les atteindre par des médications locales.

Elle est toujours parfaitement tolérée, même par les malades les plus délicats.

La Rhéantine Lumière est un vaccin anti-gonococcique dont l'absorption, par voie buccale, constitue l'originalité propre.

Indications. — Affections gonococciques locales et métastatiques chez l'homme et chez la femme. Rhumatisme et arthrite blennorragiques, orchites, cystites, pyélites, épидidymites, ophtalmies d'origine gonococcique, etc.

Dose courante. — 4 sphérules par jour, 2 le matin et 2 le soir, une heure avant les repas, dans une gorgée d'eau.

Formuler. — Boîte de Rhéantine Lumière.

VACCINS-AUTOGÈNES. — L'expérience a montré que l'efficacité de la Rhéantine Lumière est très étendue, mais qu'elle ne saurait s'appliquer à des infections associées à des espèces très éloignées des cultures représentées dans le stock vaccin.

Les Laboratoires Lumière préparent des vaccins autogènes et fournissent le matériel nécessaire pour le prélèvement et l'expédition du pus.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45 rue Villon — LYON.

RHINADROL

(Baume nasal.)

Forme pharmaceutique et composition. — Vaseline semi-liquide, avec Camphre, traces de Menthol, baume du Pérou, Soufre colloïdal, Adrénaline huileuse et essences.

Propriétés. — Décongestionnant, calmant, bactéricide.

Avantages. — Consistance *semi-liquide*, introduction d'adrénaline à l'état huileux, ce qui assure une *homogénéité* parfaite du baume.

Indications. — Toutes inflammations de la muqueuse nasale. Toutes *rhinites* et à titre préventif contre les maladies contagieuses.

Présentation. — En tube avec embout pour faciliter l'introduction dans les narines. (Tube de 20 gr. environ.)

Prescription. — Un tube *Rhinadrol* Falvy.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences.

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Étoile 18-26.

RHINALATOR

Inhalateur nasal décongestif.

La désoxynoréphédrine est un vaso-constricteur volatil de la série adrénalinique, voisin de l'éphédrine.

Avantages :

a) *Cliniques.* — Sa volatilité permet son emploi à l'aide d'un inhalateur de poche, et lui assure une pénétration intégrale des cavités nasales et une action douce et uniforme.

b) *Pharmacodynamiques.* — La désoxynoréphédrine agit aussi vite, aussi fort et plus longtemps que l'éphédrine.

c) *Thérapeutiques.* — Le *Rhinalator* arrête l'écoulement nasal, dissipe la céphalée, rétablit le tonus physique et intellectuel.

d) *Pratiques.* — Le *Rhinalator* permet un traitement discret et régulier. Son emploi facile et agréable est particulièrement appréciable chez les *enfants*, qui répugnent aux instillations nasales.

Indications. — CORYZA, RHUME DES FOINS, SINUSITES et toutes inflammations de la muqueuse et du rhinopharynx (voir *Corydrane*).

Mode d'emploi. — 5 à 6 inhalations par jour suffisent à dissiper la congestion des muqueuses.

UNION CHIMIQUE ET BIOLOGIQUE

5 et 7, rue Claude-Decaen, PARIS (XII^e). (Did. 37-93)

RHINAMIDE

Forme. — Solution.

Composition. — Solution aqueuse de para-amino-phényl-sulfamide à 0,04 p. 100 éphédrinée et ultracainée en sérum physiologique de pH 7.

Propriétés pharmacodynamiques. — Chimiothérapie antibactérienne sulfamidée des infections rhino-pharyngées. Antiseptique et décongestionnant.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Adénoïdites, Otorrhées tubaires, Réactions sinusiennes et Sinusites.

Mode d'emploi. — En instillations ou mieux en pulvérisations nasales très fréquentes (10 à 15 par jour).

Prix : En flacon compte-gouttes de 45 cc. : 18 fr. 35.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 62-30.)

RHINAQUINTINE LESCÈNE

Anaquinine gouttes nasales.

Composition. — Baume du Pérou, Thymoforme, Eucalyptol, Thymol, Ephédrine (à faible concentration). Décoction huileuse de Jaborandi.

Forme. — Flacon avec stilli-compte-gouttes stérilisable à l'alcool comme un thermomètre (breveté), sans caoutchouc et sans verre, permettant aux gouttes de pénétrer sans pression dans le nez et le cavum et sans blesser les sujets rebelles. Supprime le compte-gouttes qui reporte les germes du nez dans le produit à instiller.

Indications. — Rhumes, Rhume des foins, Coryza des nouveau-nés (facilite les tétées). Rhinites, Sinusites, Ozène, Adénoïdites, Toux, Grippe, Coqueluche, Laryngites, Croup, Faux-croup.

Désinfection du rhino-pharynx dans les maladies contagieuses. Prophylaxie des contagions. Désinfection du cavum avant et après ablation des végétations. Eclaircit la voix des chanteurs et des orateurs.

Mode d'action. — Sédatif puissant. Décongestionnant doux. Détersif non irritant. Nettoie les muqueuses, draine les sinus et le cavum. Empêche la stagnation du pus. Débouche le nez d'une façon douce et prolongée et facilite l'action des inhalations.

Évite la sécheresse des muqueuses (climats secs, chauffage central).

Indiquée en injections intratrachéales dans toux laryngées, asthme, croup, laryngites striduleuses.

Mode d'emploi. — Affections aiguës : 2 à 8 gouttes dans chaque narine 2 à 8 fois par jour, Injections intratrachéales : 2 à 4 cc. en une fois.

Affections chroniques : 2 à 3 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, r. de Vouillé. (Tél. : Vaugirard 08-19.) LIVAROT (Calvados).

RHINARSÉNOL LIQUIDE

Composition. — Novarsenobenzol Codex, Acide Acétylaminooxyphényl - Arsénique, Teinture de Coca.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique des angines de toute nature (angines de Vincent, rouges, hépatiques, amygdaliennes, phlegmoneuses, etc.), pyorrhées alvéolaires, gingivites, stomatites.

Mode d'emploi. — En collutoire, gargarismes et instillations nasales.

Prix : 16 fr. 85 (taxe arm. compr.).

Autre présentation. — Rhinarsenol Pommade pour le nez.

Prix : Le tube, 13 fr. 75 (taxe arm. compr.).

Laboratoires Gaston ROZE,

Docteur en pharmacie,

2, allée de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise).

DÉPOT GÉNÉRAL :

Laboratoires Ch. VERGELOT, Docteur en pharmacie,
6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18.)

Enregistré au Labor. de contrôle sous les N^{os} 680-7-8-9.

RHINASPIR

Poudre soluble et non caustique en étui saupoudreur pour aspirations et pulvérisations nasales.

Composition. — Adrénaline au 1/100, Scruroforme, Aristol, Benzonaphtol, Salicylate de soude, Lactose, Acide borique, Terpinéol, Essence de pin.

Propriétés. — Décongestionne et antiseptise la pituitaire, fluidifie, puis tarit les sécrétions.

Indications. — Coryza aigu et chronique, obstruction nasale par hypertrophie des cornets, ozène, sinusites.

Mode d'emploi. — 5 à 6 fois par jour, priser une pincée ou mieux la projeter dans chaque fosse nasale avec le lance-poudre Rhinaspir.

Prix de l'étui :

10 francs pour 8 à 10 jours de traitement.

Dépôt général pour la France :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

RHINE

Pommade nasale, spécifique du rhume de cerveau et des affections des voies respiratoires.

Tonique et antiseptique puissant, décongestionnant, sédatif énergique modificateur de l'épithélium nasal et pulmonaire.

Agit : 1° *par son corps gras*, qui, tapissant la surface des muqueuses, les protège en arrêtant les germes nocifs de l'air ; 2° *par ses vapeurs sédatives, décongestionnantes, antiseptiques*, qui détruisent ces germes en rendant à l'épithélium sa vitalité naturelle ; prévient par là les maladies épidémiques.

Tonique et sédatif dans les bronchites et oppression de toutes natures : ramène le flux naturel des narines desséchées.

Emploi. — Gros comme un pois dans chaque narine en pinçant les narines et aspirant par petits à-coups, afin de répandre le produit sur toute la surface épithéliale ; conserver sans se moucher le plus longtemps possible ; se moucher quand c'est devenu nécessaire et répéter 5 ou 6 fois de suite, puis en augmentant les intervalles ; ne pas oublier de se garnir les narines en se couchant.

Pour les enfants en bas âge, l'onction extérieure des narines et du sinus frontal est suffisante ; l'onction de la poitrine dans les bronchites est recommandée.

Prescrire : RHINE, un tube.

G. FLEURY, Pharmacien

Place du Marché — BRESLES (Oise).

RHINO-AMPHOGEL RONCHÈSE

Gelée molle à l'ampho-vaccin rhino-pharyngien.

Composition. — Le Rhino-Amphogel n'est pas une pommade. C'est une gelée molle, non grasse, contenant une forte proportion (75 %) de bouillon-vaccin rhino-pharyngien) (pneumocoques, pneumobacilles, entérocoques, streptocoques, micrococci catarrhalis, coquebaccilles de Pfeiffer, staphylocoques).

Indications. — Affections du nez, Rhino-prophylaxie de la grippe et du coryza.

Avantages. — La gelée non grasse ne fond pas au contact des muqueuses, elle est absorbée lentement d'une façon remarquable et assure ainsi la protection continue du rhino-pharynx. Sa présentation sous forme de gelée confère à ce produit des qualités d'ordre pratique (badigeonnages faciles à faire dans la journée) et d'ordre économique (le tube assure un long usage).

Mode d'emploi. Le Rhino-Amphogel s'applique en pansement nasal. Introduire le produit dans les narines à l'aide d'un porte-coton joint à la boîte. Par un mouvement circulaire en tapisser les muqueuses. Renouveler l'application 4 à 5 fois par jour.

Très grande activité. — Innocuité absolue.

En tube de 25 grammes environ.

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse

A.-D. RONCHÈSE, Docteur en pharmacie.

21, Bd de Riquier — NICE.

Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e). — Tél. : Turb. 72-34.

RHINO-ANTIPIOL

Crème immunisante pour le traitement préventif et curatif des affections du Rhino-pharynx et la prophylaxie des maladies contagieuses.

Composition. — Crème adhérente à base de fil-trats et autolysats immunisants associés à un complexe calmant, balsamique et décongestionnant.

Indications. — Coryza, Rhinites aiguës ou chroniques, Sinusites, amygdalites, Rhume des foins, Prophylaxie des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — Introduire un peu de crème dans les narines, 3 ou 4 fois par jour. Faire pénétrer par un léger massage en reniflant doucement. Le tube muni d'un embout pour l'introduction dans les narines : 10 fr. 75.

**Laboratoire de Biologie Médicale
et de Dermothérapie.**

8, avenue Walkanaer — NICE.

RHINO-BOROSTYROL

Composition : Huile au Borostyrol : 100 + Ephédrine basique 1 % + Larocaïne 0,50 %.

Formes. — Huile : flacons pour pulvérisation, rhinocapsules.

Propriétés. — Analgésique, antiseptique, cicatrisant et vaso-constricteur à effets durables, malgré que la teneur en éphédrine soit faible.

Avantages. — Jamais d'incidents ou accidents dus aux doses élevées d'Ephédrine.

Indications thérapeutiques. — Coryza, Sinusites, Rhume des foins.

Posologie. — Les pulvérisations nasales 3 à 6 fois par jour donnent les meilleurs résultats; à défaut : Instillations de quelques gouttes dans chaque narine, 3 à 4 fois par jour.

Prix : le flacon de 25 grammes : 12 fr. 55 (15 jours de traitement).

La boîte de 24 capsules : 12 fr. 55 (8 jours de traitement)

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A Bruxelles : **LE MARINEL**, Pharmacien,

4, avenue Orban.

RHINO-COLLOÏDOL

Emulsion nasale antiseptique, décongestionnante, calmante et bactéricide.

Composition. — Chlorhydrate de phénylméthylaminopropanol naturel de l'*Ephedra vulgaris*, Essences antiseptiques déterpénées, Acide borique, excipient spécial émulsionnant.

Indications. — Affections nasales (coryza aigu, rhume des foins, sinusite, ozène et suppurations nasales).

Affections de la gorge (Angines, végétations, polypes, pharyngite).

Affections des bronches (asthme, toux, catarrhe).

Mode d'emploi. — Se moucher une narine après l'autre. Mettre ensuite l'émulsion, gros comme un petit pois, à l'entrée de chaque fosse nasale. Masser légèrement et renifler doucement. Remettre de cette émulsion plusieurs fois dans la journée en très petite quantité.

Laboratoires du VIOPHAN

91, rue de Monceau — PARIS (8°).

RHINODROPS BÉRAL

Capsules nasales à l'huile d'Ephedra chlorétonée.

Propriétés. — *Antiseptiques et Décongestifs, inoffensifs.* Assurent la perméabilité des fosses nasales. Préservent des complications naso-pharyngées.

Indications. — *Toutes inflammations, congestions et obstructions nasales. Insuffisances respiratoires des Adénoïdiens et des Déformés du naso-pharynx. Toutes affections aiguës susceptibles de se compliquer d'infection naso-pharyngée.*

Mode d'emploi. — Couper l'extrémité du Rhinodrops et en vider la moitié dans chaque narine. (Faire incliner la tête du côté injecté.)

Formuler : *Rhinodrops Béral*, une boîte.

La boîte de 18 Rhinodrops : 11 fr. 45.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli — PARIS

RHINOFLUINE

Solution isotonique et stérilisée d'extrait de Jaborandi.

Forme. — Ampoules (instillateur spécial dans les boîtes).

Indications thérapeutiques. — Action élective sur les terminaisons sensitives des nerfs trijumeau et pneumogastrique au niveau des muqueuses oculaire, nasale et laryngo-trachéale.

Rôle essentiel: Régulation de la sensibilité des troubles congestifs et sécrétoires.

1° En Rhinologie. — La Rhinofluine doit être utilisée en instillations dans les cas suivants :

Congestions et Obstructions Nasales

(Vaso-motrices).

Rhino-Pharyngites

Rhinites Atrophiques — Ozène

Rhume des foins

et Rhino-Bronchites Asthmatiques

Céphalées Rhinogènes

Il est nécessaire dans l'Ozène et dans les Coryzas spasmodiques (rhume des foins en particulier) de combiner ce traitement local avec le traitement général par les produits de jaborandi (Néopancarpine ou Vaso-Neurine) qui constituent le traitement de fond.

2° En Ophtalmologie. — La Rhinofluine est employée en instillations. Elle réalise une décongestion rapide de la muqueuse conjonctivale (disparition de la rougeur et de la tuméfaction) et atténue l'hypersécrétion lacrymale (larmolement). Par son action sur les terminaisons sensitives et la décongestion ainsi réalisée, les phénomènes douloureux orbitaires et périorbitaires sont rapidement atténués (picotements, cuisson, tension douloureuse, névralgies, migraine ophtalmique, céphalalgies).

Mode d'emploi :

Les instillations de Rhinofluine peuvent être pratiquées 2 ou 3 fois par jour si nécessaire.

Pour les yeux, il sera toujours préférable de faire l'instillation de I à II gouttes dans le coin de l'œil, le soir, avant de s'endormir, si l'on ne fait l'instillation qu'une fois par jour. L'action de la Rhinofluine provoque en effet une contraction de la pupille qui peut gêner momentanément l'accommodation. La solution est parfaitement tolérée par la muqueuse oculaire et n'a aucun effet toxique.

Pour le nez et la gorge, les instillations peuvent être renouvelées 2 à 3 fois par jour (III à IV gouttes chaque fois dans chaque narine).

Les gouttes instillées tombant dans la gorge peuvent être avalées.

Prix : 19 fr. 10.

Laboratoire de Pathologie générale de Paris
5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI°).
(Tél. : Auteuil 35-25.)

RHINO-GLOTTYL

Composition. — A base d'extraits huileux totaux d'Erysimum, Belladone, Euphorbia pilulifera, Ephedra, avec adjonction d'essence de Niaouli et d'Amyléine.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique. Puissant décongestif. Antispasmodique.

Indications. — Coryzas, Rhinites, Sinusites, Laryngites, Trachéites, Maladies infectieuses (grippe, rougeole, scarlatine, etc.), Asthmes, Rhume des foins, Insuffisances respiratoires. Toutes manifestations congestives des voies respiratoires supérieures.

Formes :

- 1^o *Solution huileuse* (Instillations et pulvérisations nasales. Injections intra-trachéales).
- 2^o *Capsules nasales* (Couper l'extrémité effilée de la capsule et en vider le contenu dans les deux narines).

Durée moyenne des unités de vente :
10 à 15 jours.

Prix : 17 francs.

Laboratoires R. DENIS

20, rue du Laos — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suffren 75-60.)

RHINOL

A base de Menthoforme, éther, non irritant, dérivé du menthol et du formol.

1° OUATE RHINOL. — Véritable filtre nasal, spécifique du coryza, Céphalée, Rhume des foins. Indispensable en temps d'épidémie, et dans tous les cas de grippe, influenza, bronchite, enrrouement.

La boîte 4 fr. 35.

2° POMMADE RHINOL. — Vaseline au menthoforme, eucalyptol, essences volatiles. Mêmes indications.

Le tube avec canule : 7 fr. 65.

3° COMPRIMÉS RHINOL. — A base de menthoforme, borate de soude, baume du Pérou, essences de pin et d'eucalyptus.

Inhalations, gargarismes, pulvérisations, dans tous les cas de rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, maux de gorge, amygdalites, laryngites, trachéites, trachéo-bronchites.

La boîte de 24 comprimés : 15 fr. 90. — 1/2 boîte : 8 fr. 50.

Laboratoire du Docteur DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 13-03.)

RHINO-LACTÉOL

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés : 180 milliards pour 100 grammes.

Propriétés. — Il ne provoque aucune irritation, quelle que soit la fréquence des prises. Son innocuité jointe à son efficacité en font une médication de choix.

Indications. — *Enfants, adultes.*

Coryza, Suppurations nasales et auriculaires, Rhinites, Catarrhes, Ozène.

Présentation. — Poudre.

Mode d'emploi :

A titre préventif : une prise au lever et au coucher et deux ou trois prises dans la journée.

A titre curatif : une prise toutes les demi-heures.

Commencer le traitement dès les premiers symptômes.

Laboratoire du D^r BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

RHINO-LIPOSEPTINE

Solution concentrée de l'antitoxine du Professeur Lemoine pour pulvérisations dans le nez et la gorge.

Composition. — Extrait éthéré de levures de saccharomycètes. — Possède toutes les propriétés curatives des vaccins les plus actifs.

Indications. — En pulvérisations ou instillations dans le nez et la gorge dans tous les cas de maladies infectieuses où ces cavités sont atteintes : Angines, Coryza, Rhinopharyngites, Ozène, Sinusites, Grippe, Bronchites, Diphtérie, Rougeole, Scarlatine.

Mais ne présente aucun des inconvénients du menthol, pas d'irritation des muqueuses.

Mode d'emploi. — La Rhino-Liposeptine se présente en solution huileuse et en Capsulines auto-rhino-injectables. Pulvériser ou instiller plusieurs fois par jour.

En flacon ou en boîte de 20 Capsulines.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os}

Solution 590-8. Capsuline 590-25.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

RHINO-ORARGOL

Complexe colloïdal électrique Or et Argent.

Deux formules :

1^o **RHINO-ORARGOL simple** (étiquette bleue) : *Orargol*, 0,1 p. 100.

Flacon de 20 gr. : 17 francs.

2^o **RHINO-ORARGOL éphédriné** (étiquette verte) : *Orargol*, 0,1 p. 100 ; Éphédrine naturelle, 0,5 p. 100 ; Baume du Pérou, 0,25 p. 100.

Flacon de 20 gr. : 19 francs.

Indications. — Rhinites aiguës et chroniques. Sinusites. Désinfection du nez et du rhino-pharynx. Prévention des maladies infectieuses.

Mode d'emploi. — En instillations ou pulvérisations dans les fosses nasales avec l'instillateur *Amicros* (joint à chaque flacon) ou tout autre pulvérisateur.

SEDO-ORARGOL

Baume nasal *Amicros* à base d'*Orargol*, 0,2 p. 100 ; Éphédrine naturelle base, 1 p. 100 ; Baume du Pérou, 0,50 p. 100.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois dans chaque narine une ou plusieurs fois par jour.

Tube de 15 gr. environ : 15 francs.

Laboratoire AMICROS

177, rue de Courcelles — PARIS.

RHINO-SULFORGAN

Composition. — A base de soufre organique naturel, à l'état *sulfinique*, c'est-à-dire entièrement neutre non oxydé.

Avantages. — Assimilable, non congestif, non irritant. Le *Rhino-Sulforgan* fournit à la muqueuse infectée le soufre nécessaire à sa guérison. (Le pus appelle le soufre : Dr LERMOYEZ.)

Indications:

- 1° Tous états infectieux O. R. L. ;
- 2° Débilité rhino-bronchique ;
- 3° Traitement préparatoire et complémentaire de toute cure thermale sulfurée ;
- 4° Prophylaxie de la grippe et des maladies contagieuses.

Posologie:

- 1° En pulvérisations nasales, 2 à 8 fois par jour ;
- 2° En tampons d'ouate, imbibés du produit, 2 à 8 fois par jour ;
- 3° Traitements spéciaux : instillations intra-trachéales, insufflations tubaires à la sonde d'Itard, méthode de PROETZ, etc.

Prix: 16 fr. 35.

Laboratoires SOUFFRICE

16, rue de Gramont — PARIS (2°).
(Tél. : Richelieu 66-12.)

RHINO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Ducloux.

Vaccination locale.

Composition. — Lysat des germes pathogènes du rhino-pharynx.

En application sur la muqueuse nasale et pharyngée, détermine une immunité cellulaire locale.

Indications. — Coryza, rhino-pharyngites, adénoïdites, Angines, Prophylaxie des complications des maladies contagieuses (Grippe, Rougeole, Coqueluche, Diphtérie, etc.).

Posologie. — En instillations ou mieux en pulvérisations locales, 3 à 4 fois par jour. (Le Rhino-Vaclydun n'est pas injectable.)

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 2 cc.

Prix : 19 francs.

Nécessaire Rhino-Vaclydun contient 2 ampoules de lysat-vaccin et un petit pulvérisateur spécial.

Prix : 20 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII°).
(Tél. : Carnot 78-11.)

RHIZOTANIN CHAPOTOT

Composition. — Tanin de rhizome de fraisier extrait à l'eau, évaporé dans le vide à 0°. Phosphates et glycérophosphates de chaux et de magnésie. Cardamome.

Formes. — Cachets pour *adultes*. Poudre pour *enfants*. Granulé pour *adultes et enfants*.

Indications. — Tuberculose pulmonaire. Etats tuberculeux et prétuberculeux. Anémies. Bronchites chroniques (diminution des sécrétions et de l'expectoration). Amélioration rapide des accidents diarrhéiques quelle qu'en soit l'origine. Néphrites albuminuriques.

Posologie. — *Adultes* : 4 à 6 cachets ou 2 à 4 cuillerées à café de granulé par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées mesure de poudre ou à 4 1/2 cuillerées à café de granulé par jour.

Prix : 14 fr. 80.

Laboratoire CHAPOTOT

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 28-90 et 30-65.) — R. C. 231 917 B.

RHOCYA

Rhodanate de potassium pur.

(Solution titrée : 1 goutte = 1 centigramme.)

Le rhodanate de potassium possède toutes les propriétés biologiques des iodures et des préparations iodées, *sans contenir d'iode dans sa molécule* et sans en présenter les inconvénients (iodisme, réactions congestives ou thyroïdiennes).

Aucune toxicité. Ni intolérance, ni accoutumance.

Pas d'iode, donc pas d'iodisme. (Thèse Géraud, Paris 1936.)

Indications. — *Rhumatismes chroniques.* — Puissement effet analgésique, décongestif et trophique dans :

- 1° Les polyarthrites déformantes chroniques ;
- 2° Les séquelles des pseudo-rhumatismes infectieux, en particulier gonococciques ;
- 3° Les rhumatismes diathésiques.

Hypertension artérielle. — Abaissement des chiffres manométriques (Mx et Mn) dans les deux tiers des cas. Action directe sur l'athérome artériel.

Emphysème. — Asthme vieilli, séquelles respiratoires des gazés.

Scléroses viscérales. — Sénescence précoce, polyscléroses, scléroses par intoxications chroniques endogènes (goutte, oxalémie) ou exogènes (saturnisme, hydrargyrisme, bismuthisme, éthylisme). Lésions scléro-gommeuses de la syphilis tertiaire.

Oreillons. — Agit sur la localisation parotidienne et sur les localisations secondaires (orchite).

Ethylisme chronique. — La cure de Rhocya entraîne le dégoût des boissons alcooliques.

Posologie. — X à XX gouttes avant les 3 repas, 3 semaines par mois.

Société d'Applications Pharmacodynamiques

39, Bd de la Tour-Maubourg — PARIS (VII^e.)

(Invalides 43-60 et 43-61.)

RHODARSAN

Dioxy-diamino-arsénobenzène-méthylène-sulfoxyrate de sodium.

Teneur minimum en arsenic : 19 p. 100. Donne, avec l'eau distillée, des solutions neutres, injectables par voie veineuse exclusivement.

Présentations :

Doses unitaires de : 0 g. 15 — 0 g. 30 — 0 g. 45 — 0 g. 60 — 0 g. 75 — 0 g. 90. Prix suivant dosage.

Indications :

Syphilis, Symbioses fuso-spirillaires, Angines, Pian, Protozooses, Charbon, Sodoku.

Posologie et mode d'emploi. — Séries d'injections graduées de 0 g. 15 à 0 g. 90.

Applications en poudre ou collutoires comme topique local.

Le Rhodarsan est contrôlé biologiquement par rapport au Standard de la Société des Nations et rigoureusement conforme au Codex 1938.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODAZIL

Benzoate de Benzyle. Antispasmodique non toxique.

Indications :

Asthme vrai, Hypertension, Dysménorrhée, Hoquet, Coqueluche, Spasmes divers, Mal de mer, Vomissements du nourrisson.

Présentations :

Solution alcoolique à 25 % (flacon de 30 cm³).

Prix : 13 francs.

Posologie :

Adultes : Une demi-cuillerée à café de solution, à renouveler plusieurs fois par jour.

Enfants : IV gouttes de solution par année d'âge.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODIACARBINE

Ex-pâte Specia granulée antidyssentérique.

Indications. — Entéro-colites cryptogénétiques, colites diverses. Formes subaiguës et chroniques de la dysenterie amibienne.

Présentations.

Boîte de 150 grammes de granulés. Prix : 29 francs.

Tubes de 20 comprimés. Prix : 14 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi. — Amibiase : Cure de 20 jour : un jour sur deux 1 à 3 cuillerées à café de granulés (ou 1 à 3 comprimés) aux deux principaux repas ; le jour intermédiaire, un sel arsenical (Stovarsol).

Colites : cures de 4 à 5 jours, 1 à 2 cuillerées à café aux 2 principaux repas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

RHODOBORYL

Présentation. — Poudre blanche, très soluble dans l'eau à laquelle elle communique une belle couleur rose. Génératrice d'oxygène naissant.

Mode d'action. — Antiseptique, astringent, décongestionnant et sédatif.

Indications. — Infections des muqueuses : Gorge (angines, pharyngites, laryngites, amygdalites) ; Bouche (stomatites, gingivites, aphtes) ; Nez (coryza, ozène, rhinites) ; Prévention des maladies contagieuses.

Mode d'emploi. — En lavages ou en gargarismes : une cuillerée à café par verre d'eau tiède.

Prix : 13 fr. 05

Laboratoire MAUOHANT

J. EURY, Docteur en Pharmacie.

GENNEVILLIERS (Seine).

RHOFÉINE

Association d'acide acétylsalicylique (0 g. 50) et de caféine (0 g. 05) pour un comprimé (tubes de 20) ou un cachet (étuis de 10).

La caféine ajoute à l'aspirine ses propriétés tonicardiaques.

Indications. — Grippe, États fébriles, Migraines, Névralgies.

Posologie. — 1 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures.

Prix de vente :

Tube de 20 comprimés.. 6 fr. 40

Etui de 10 cachets 5 fr. 80

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« **SPECIA** »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

RHUMOFAN

Cachets.

Composition :

Acide phénylcinchoninique	0,25
Soufre colloïdal Dausse.....	0,20
Magnésium (sels).....	0,15
Lithium (sels)	0,10

Pour 1 cachet.

Indications. — Rhumatismes : goutteux, articulaires, musculaires, aigus ou chroniques Arthritisme, Artériosclérose, Sciatique, Névrites et toutes manifestations uricémiques.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour, progressivement puis dégressivement, pris seuls ou 2 par 2 dans un verre d'eau ou d'eau minérale, soit le matin à jeun de préférence (pris à la dose de 1 ou 2 cachets pour traitement de base des états chroniques : 20 jours de traitement : repos égal et recommencer) ; soit au début des principaux repas de préférence (pris à la dose de 4 à 6 cachets par jour ; états aigus).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1407-2.

Prix : Les 20 cachets, 20 fr. 25. Taxe d'armement comprise.

Laboratoires OPOS.
Pharmacien HOMPS,

Bureaux : 33, rue Rempart-Matabiau — TOULOUSE.
(Tél. : 253-97.)

Usine : 1 et 3, rue Soumet — CASTELNAUDARY.
(Tél. : 3-10.)

RICIGONOL

Traitement de l'infection blennorragique et de ses complications

Complexe savonneux d'acridine suractivé par le Cristal violet, et débarrassé des inconvénients par la présence du chlorure de platine.

Mode d'action. — Antiseptique puissant très diffusible, action élective à l'égard du gonocoque. Décongestif, sédatif. Aucun accident veineux, pas de coup de soleil, pas de nausée.

Action certaine sur la toxine gonococcique. Disparition rapide de la douleur. Augmente la résistance du malade. Evite l'urétrite postérieure. Permet de commencer plus vite les soins locaux.

Indications. — Affections gonococciques et leurs complications, Epididymites, Rhumatismes.

Présentation. — Ampoules de 5 cc. en boîtes de 4.

Posologie et mode d'emploi. — Une injection, de préférence intraveineuse, le premier et le deuxième jour, puis une injection tous les deux jours.

Prix : 31 fr. 85.

Laboratoire TERRASSE

2, Rond-Point du Centre — LA GARENNE-COLOMBES (Seine).
(Tél. : Charlebourg 22-84).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 795-6.

RICILAX**Formule :**

Ricinoléate de magnésie... 1 gr.
Diacétyldioxyphénylisatine 2 mmg.
Pour 1 cachet.

Combinaison nouvelle d'huile de ricin et d'oxyde de magnésie.

LAXATIF DOUX

Avantages. — Contient uniquement l'acide ricinoléique ; dépourvu de ricinine et de ricine qui sont toxiques.

Chaque composant renforce l'action du produit auquel il est associé, l'acide ricinoléique agissant immédiatement et l'oxyde de magnésie prolongeant l'effet laxatif.

Aucune action congestive sur le tractus et les glandes digestives, ni sur les organes du petit bassin. Peut être administré à tous les malades, en particulier : enfants, femmes enceintes, nourrices.

Indications. — Constipation sous toutes ses formes, banales ou spasmodiques, et toutes leurs conséquences. Entérocolite muco-membraneuse. Colites. Appendicite chronique.

Formes. — *Adultes* : Cachets.

Enfants : Granulé sans isatine.

Mode d'emploi et doses :

Adultes : 1 cachet le soir au coucher.

Enfants : 1/2 cuillerée à café par 3 années d'âge de granulé.

Posologie pouvant être modifiée suivant les tempéraments.

Prix : 14 francs pour 20 jours de traitement.

Laboratoire ROUX

60, route de Châtillon — MALAKOFF.
(Tél. : Alésia 12-55.)

RIODINE

$(C^{10} H^{12} O^3)^2 (I H)^2 C^2 H^2$.

Composition. — Ether glycérique iodé de l'acide ricinoléique contenant environ 20% d'iode.

Forme. — Flacon de 50 perles. Chacune représentant l'action de 0,20 cgr environ d'iodure alcalin.

Propriétés thérapeutiques. — Médicament iodo-organique type, directement et totalement assimilable.
Action prolongée et durable sans iodisme.

Pour obtenir une *action rapide et intensive*, prescrire la **Néo-Riodine** : mêmes applications.

Indications. — Artériosclérose, myocardites chroniques, hypertension, etc. Emphysème pulmonaire, bronchites chroniques, asthme, etc... Obésité, rhumatisme chronique, scrofule, syphilis, et dans toute affection où la médication iodée ou iodurée est indiquée.

Doses. — 2 à 6 perles par jour avant les repas.

Prix : 15 fr. 30

LABORATOIRES du D^r P. ASTIER

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 24-52.)

ROB OBERLIN

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	3 mgr.	6 mgr.	1 cgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 02	0 gr. 04	0 gr. 06
Arséniat de soude	1/2 mgr.	1 mgr.	1 mgr. 1/2

Adultes : 1 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 4 cuillerées à entremets par jour.

Enfants de 5 à 10 ans : 2,3 et jusqu'à 4 cuillerées à café par jour.

Le **Rob Oberlin** se vend en flacons d'environ 420 cc.

ROB CABANÈS

Contenance pour	Une cuillerée à café.	Une cuillerée à entremets.	Une cuillerée à soupe.
Bi-iodure de mer- cure	1 mgr.	2 mgr.	3 mgr.
Iodure de sodium.	0 gr. 004	0 gr. 008	0 gr. 012

En moyenne, 1 cuillerée à café par jour et par année d'âge, soit :

Un an : 1 demi-cuillerée à café 2 fois par jour.

Deux ans : 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Trois ans : 1 cuillerée à café 3 fois par jour.

Quatre et cinq ans : 1 cuillerée à entremets 2 fois par jour.

Six à sept ans : 1 cuillerée à soupe 2 fois par jour.

Le **Rob Cabanès** se vend en flacons d'environ 280 cc.

Leur présentation est discrète.

Laboratoire OBERLIN

J. TINARDON, Pharmacien de 1^{re} classe
de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 14-73.)

ROBRODYNE

Reconstituant général.

Élixir d'un goût agréable, qui pour 100 cc. d'excipient liquide contient :

Teinture de noix vomique.....	0,20
— d'orange amère	0,50
— d'orange douce	0,50
— cannelle	0,50
Méthylarsinate de soude	0,08
Glycérophosphate de soude.....	1 gr.

Indications. — Faiblesse générale ; Convalescence ; Anémie, Croissance.

Doses :

2 verres à liqueur par jour avant les repas.

Prix. — 17 fr. 85.

Enreg. au Lab. Nat. de Contrôle sous le n° 1403-3.

L. ROBERT, pharmacien.

Rue des Halles — NIORT (Deux-Sèvres).

(Tél. : n° 70.)

ROCHE-POSAY (LA)

Laboratoires des produits dermiques R. P.

Composition. — Produits aux sels silicatés naturels de La Roche-Posay spécialement préparés et gradués par des dosages de titane et de sélénium pour le traitement des affections de la peau, depuis les eczémas aigus, prurits rebelles, dermatoses irritables jusqu'aux soins et entretien des peaux sensibles.

Nomenclature et Prix :

- | | | |
|----------------------------------|---------------------|-----------|
| 1. Sels de bains R. P..... | Paquet 1 bain | 5 fr. 30 |
| Sels de bains R. P..... | Paquet 2 bains | 9 fr. » |
| Sels de bains R. P. | Boîte de 30 sachets | 12 fr. » |
| 2. Savon dermique R. P..... | Le pain | 8 fr. 50 |
| 3. Poudre dermique R. P..... | La boîte | 12 fr. » |
| 4. Pâte à l'eau R. P..... | Le pot | 16 fr. » |
| 5. Lotion blanche R. P..... | Le flacon | 16 fr. » |
| 6. Cérat inaltérable R. P..... | Le tube | 10 fr. 50 |
| Cold-cream naturel R. P..... | Le tube | 11 fr. 50 |
| 7. Cold-cream naturel R. P..... | Le pot | 14 fr. 75 |
| Cold-cream naturel R. P. | Le grand pot | 26 fr. 50 |
| 8. Cold-cream salicylé R. P..... | Le tube | 11 fr. 50 |
| 9. Poudre pour le visage R. P. | Grande boîte | 28 fr. » |

Laboratoires des **PRODUITS DERMQUES R. P.**

LA ROCHE-POSAY (Vienne).

RODILONE

(1.399 F.)

Di (p. acétylaminophényl) sulfone.

Chimiothérapie anti-infectieuse polyvalente.

Indications. — Gonococcies aiguës ou chroniques (traitement par voie buccale à associer aux lavages), Pneumococcies, traitement et prévention des Complications pneumococciques, Infections à méningocoques, Staphylococcies et Streptococcies.

Présentations et Posologie :

Comprimés : Dosés à 0 gr. 50 (tubes de 20).

Adultes : 2 à 6 comprimés par 24 heures (7 à 14 jours de traitement).

Enfants : 1 à 2 comprimés par 24 heures.

Prix de vente : Le tube de 20 comprimés : 20 fr. 80.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône,
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

ROGERMA

Traitement cytophyllactique des affections de la peau et des muqueuses.

Phagocytogène, reconstituant cellulaire.

Indications. — Anthrax, Brûlures, Plaies atones, Ulcères variqueux, Blépharites, Conjonctivites, Otites externes et moyennes.

Traitement adjuvant de choix des néoplasmes.

Mode d'emploi. — Pur et tiède en pansements très humides.

Présentation :

Flacon courant	16 fr. 80.
Grand flacon (1 litre)	32 fr. 65.
Flacon ophtalmique	18 fr. 35.
Flacon otorhino.....	16 fr. 30.

Échantillons :

Laboratoire ROGERMA

LENS (Pas-de-Calais).

ROMARÈNE

Présentation. — Granulé aromatique fondant de saveur agréable.

Composition. — Association de végétaux cholérétiques (*romarin*, *taraxacum*, *combretum*) et de sels alcalins (*citrate de soude*).

Action thérapeutique:

Cholérétique: stimule la fonction hépatique, accroît la sécrétion biliaire.

Cholofluidifiant: modifie la nature de la bile et facilite son drainage.

Stomachique: résout les syndromes gastro-hépatiques.

Favorise la *diurèse* et la *régularité intestinale*.

Évite les réactions vésiculaires.

Indications:

Insuffisances hépatiques de toutes natures, cholémie, congestion du foie, hépatisme, ictères bénins, cholécystites, asthme hépatique, etc...

Syndromes gastro-hépatiques, dyspepsies, gastralgies, flatulences, état saburral, etc...

Cures d'entretien hépatique.

Mode d'emploi :

Croquer ou dissoudre dans une boisson chaude.

Adultes: 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants: 1/2 à 2 cuillerées à café par jour.

Bébés: quelques granulés dans le lait.

Indications hépatiques : à jeun ou entre les repas.

Indications gastro-hépatiques : après les repas.

Cures d'entretien hépatique : 15 à 20 jours par mois.

Durée de consommation d'une boîte : 8 à 15 jours.

Prix : 18 fr. 80.

Laboratoire BEAUFOUR

Docteur en Pharmacie,

Licencié ès-Sciences,

Ancien Interne des Hôpitaux de Paris.

DREUX (E.-et-L.).

(Tél. : 145.)

ROSALAX

Pilules laxatives.

Thiophytothérapie de la constipation et de ses troubles associés.

Composition et actions. — Bourdaine, Cascara, Scammonée, Mucilage de Roses (laxatifs synergiques), Hyposulfite de Soude (désensibilisant, cholagogue, antiseptique intestinal), Belladone à faible dose (antispasmodique), Quinquina (tonique intestinal).

Le Rosalax entraîne une exonération physiologique douce et régulière.

Indications. — Constipation chronique sous toutes ses formes, Troubles associés de la constipation, Intoxications intestinales et dermatoses, inappétence, fétidité de l'haleine, migraines, etc.

Posologie. — 1 pilule au repas du soir ou au coucher, 2 ou plus en cas de constipation rebelle et selon les susceptibilités individuelles.

Le Rosalax est un produit de prescription exclusivement médicale.

Laboratoires ROSA, Pharmacien,

Ancien Interne des hôpitaux de Paris,

11, rue Roger-Bacon — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Étoile 09-63.)

ROSASEPTOR

Poudre émolliente, tonique, décongestionnante et antiseptique. Spécifique de l'inflammation oculaire ainsi que de la bouche, des amygdales et du pharynx.

Indications. — Conjonctivites, Blépharites, Iritis, Chalazions, Orgelets, Ophtalmies, etc.

Mode d'emploi. — Le contenu d'un sachet ROSASEPTOR dans la valeur d'un verre d'eau bouillie chaude donne environ 150 gr. d'une solution stérilisée, antiseptique, **tonique** et émolliente pour lavages, compresses et bains d'yeux et traitement des stomatites, abcès dentaires, angines, pharyngites, etc.

La boîte de 10 sachets : 10 francs, pour 1 semaine de traitement.

La boîte de 20 sachets : 18 fr. 50, pour 2 semaines de traitement.

Dépôt général :

Laboratoire ASEPTOR

21, rue de Lyon — PARIS (12^e).

ROZIODE

Iode colloïdal organique complètement assimilable.

Variété d'iode à l'état de molécules extrêmement fines, de diffusion très rapide. — Ni toxique, ni irritant.

Propriétés. — D'une assimilabilité organique complète, d'une puissance thérapeutique rapide et augmentée. Agit comme l'iode et les iodures, sans en avoir les inconvénients. Pas d'iodisme.

Indications. — États congestifs, Hypertension, Hyperviscosité sanguine, Artériosclérose, Scrofule, Lymphatisme, Asthme, Angine de poitrine, Eczémas, Dermatoses.

Formes et prix : Dragées Roziode 18 fr. 75
Pommade Roziode 15 fr. 60
Ovules Roziode..... 22 fr. 90

Mode d'emploi. — *Dragées :* Adultes : 4 à 6 par jour. *Enfants :* demi-dose.

Pommade : Dermatoses, Anthrax, Fissures anales, Blépharites, Conjonctivites.

Ovules : Un ovule le soir, maintenu par un tampon de coton hydrophile.

Laboratoires Gaston ROZE, Docteur en Pharmacie,
2, allée de Chelles — LE RAINCY (Seine-et-Oise).

DÉPOT GÉNÉRAL :

Laboratoires Ch. VERGELOT, Docteur en Pharmacie.
6, rue de Navarin, Paris (IX^e). (Tél. : Trudaine 50-18.)
Enregistré au Labor. de contrôle sous les N^{os} 680-7-8-9.

RUBIADERM

Pommade dans laquelle le **Rubiazol** est incorporé à un excipient représenté par des phospholipides. Par son principe actif, détermine la stérilisation rapide des lésions septiques du revêtement cutané ; l'excipient, qui est soluble dans l'eau, assure une pénétration immédiate et intime de l'élément stérilisant dans toutes les parties de la région infectée.

Indications. — Plaies superficielles et anfractueuses, Dermites septiques, Trajets fistuleux, Furoncles, Anthrax, Abscesses, Brûlures, etc.

Mode d'emploi. — D'une façon générale, on l'appliquera en couche épaisse ; si la plaie est anfractueuse, veiller à ce que toutes les parties soient bien imprégnées de Rubiaderm.

Prix au public : 16 fr. 95.

ECTIAZOL, solution alcoolique pour lésions infectées et revêtement cutané.

Prix au public : 13 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

RUBIAZOL

Carboxy-sulfamido-chrysoïdine.

Colorant azoïque sans aucune toxicité.

Première application de la chimiothérapie antibactérienne.

Indications. — A une action préventive et curative sur toutes les infections aiguës ou chroniques provoquées par le streptocoque, le staphylocoque, le colibacille, etc.

Présentations :

Flacon de 40 comprimés à 0 gr. 20.

Boîte de 5 ampoules de 5 cc. de Rubiazol (voie intramusculaire).

Posologie :

Adultes : De 6 à 12 comprimés par jour, ou 2 ou 3 ampoules de 5 cc.

Enfants : 1/2 dose.

Dans les affections présentant un caractère de haute gravité, administrer 15 à 20 comprimés par jour auxquels on peut associer 2 à 3 ampoules.

Prix :

Le flacon de 40 comprimés : 21 fr. 20.

La boîte de 5 ampoules : 27 fr. 55.

Voir aussi **Rubiaderm** et **Collubiazol**.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

RUBROPHÈNE

Chimiothérapie des tuberculoses non pulmonaires.

Composition. — Triméthoxy-aurine (Triméthoxy-dioxy-oxotritane) = $C^{22} H^{30} O^6$, colorant synthétique original, ni azoïque, ni sulfoné, ni amidé, ni aurique.

Action. — *Action élective* sur toutes tuberculoses non pulmonaires, mais sans contre-indications d'ordre pulmonaire.

A lui seul, le *Rubrophène* guérit souvent, améliore toujours. Il est le meilleur adjuvant des traitements orthopédiques, car il raccourcit l'évolution, en moyenne, de 50 p. 100. Il permet bien souvent des traitements conservateurs.

De plus : rapide amélioration de l'état général (poids, température, richesse globulaire, sédimentation).

Toxicité nulle. Grande marge thérapeutique. Pas de sensibilisation. Parfaite élimination. Pas de cyanose. Le *Rubrophène* colore les urines et parfois le pus.

Indications :

- 1° *Tuberculose des parties molles* : adénites prises à tous stades ; tuberculoses rénale, vésicale, épидidymaire ; tuberculoses péritonéale, intestinale ; synovites tuberculeuses ; fistules anales.
- 2° *Tuberculoses osseuses, articulaires* (ostéites, Pott, coxalgie, etc.) ; rhumatismes tuberculeux.
- 3° *Tuberculoses cutanées* : tuberculides, lupus érythémateux et lupus tuberculeux ; acnés indurées.
- 4° *Tuberculoses oculaires* franches ou dont l'étiologie s'avérerait difficile à affirmer.

Conduite du traitement :

Assurer de préférence le traitement général uniquement par dragées et y adjoindre des applications locales chaque fois que possible.

Augmenter les doses jusqu'au seuil d'activité utile.

Ne pas s'effrayer des réactions focales possibles, voire même générales, toujours sans gravité et qui, témoins de la spécificité du *Rubrophène*, impliquent un pronostic amélioré.

Pallier aux incidents digestifs éventuels sans cesser le traitement.

Ne pas s'attendre, malgré un emploi correct, à des guérisons immédiates, mais persévérer avec patience (une fonte caséuse, une réaction fibro-sante ne peuvent disparaître du jour au lendemain).

Posologie :

Adultes : *Dragées.* Tous les jours, en une fois, au petit déjeuner, donner d'abord 4 à 6 dragées. Atteindre rapidement 8 ou 10 dragées par jour.

En cas de diarrhée, de nausées : potion chlorhydro-peptique, ou bien répartir la dose aux principaux repas ou, provisoirement, la diminuer ou alterner avec les injections.

Ampoules injectables pour intraveineuses en cas de diarrhée rebelle, ou pour traitements locaux. 1 ampoule chaque fois. Dissoudre à *chaud* (sur une flamme) dans 5 cc. d'eau bidistillée. Ne pas injecter à jeun.

Enfants : *Dragées.* Commencer par : Nourrissons, 1 dragée écrasée ; de 3 à 10 ans, 3 dragées ; de 10 à 16 ans, 4 dragées.

Ampoules : 1/6, 1/3 ou 2/3 d'ampoule, selon l'âge.

Traitement local. — N'est qu'un adjuvant.

Injection d'une ampoule de solution dans les trajets fistuleux à chaque pansement (tous les 2 ou 3 jours) :

Application de pommade, au moins durant la nuit, sur les lésions cutanées.

Présentation :

Boîte de 100 dragées à 0 gr. 15.

Boîte de 10 ampoules de poudre, dosées à 0 gr. 30 de Rubrophène + Bisulfite de soude, et 10 ampoules d'eau bidistillée.

Tube de 50 grammes de pommade à 5 p. 100.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,
25, boulevard de La Tour-Maubourg,
PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 60-77.)

RUTONAL

Phényl-méthyl-malonylurée.

Hypnotique et anti-épileptique succédané du gardénal, destiné aux malades intolérants ou résistants à ce médicament.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 20 (tubes de 20).... 11 fr. 70
— à 0 g. 05 (tubes de 30).... 6 fr. 90

Indications :

Épilepsie, Chorée, Convulsions, États anxieux, Constitution épileptoïde.

Posologie. — *Adultes* : Deux à quatre comprimés à 20 ctg. par 24 heures.

Enfants : Deux à quatre comprimés à 5 ctg. par 24 heures.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

RYTHMOSYSTOL

Marrube blanc, 3/4; Adonis vernalis, 1/4.

Formes : *Dragées, Gouttes.*

Propriétés. — Régularisation du Rythme cardiaque (*extrasystoles*). Pas d'accumulation. Pas de contre-indications, aucune toxicité.

Posologie. — *Dragées* : 10 par jour.
Gouttes : LX par jour.

Enreg. au Lab. Nat. de contrôle des Médic., n^{os} 103-1 et 2.

Prix : 16 fr. 65. Durée 4-6 jours.

COMTE, Pharmacien

60, rue Saint-Guilhem
MONTPELLIER

SABURRASE

Présentation. — Granulé soluble.

Propriétés thérapeutiques. — Possède une action légèrement laxative sans modifier brutalement le pH intestinal, comme la plupart des laxatifs salins. A cette action sur l'intestin s'ajoute celle des composés magnésiens sur le foie et les voies biliaires.

Un antiseptique puissant libère progressivement du guéthol dans l'intestin et en assure la désinfection totale, sans troubler la concentration hydrique du milieu.

Indications thérapeutiques. — Médicament des affections du tractus digestif, des intoxications générales et des syndromes hépato-biliaires.

(Dyspepsies, Constipation, Gastro-entérites, Insuffisance hépato-biliaire, Intoxications générales, Suites de grippe, etc...)

Mode d'emploi. — Prendre le matin, à jeun, une ou deux cuillerées à café dissoutes dans un demi-verre d'eau.

L. N. C. M. n° 43-10.

Laboratoires PÉPIN et LÉBOUCQ

COURBEVOIE (Seine).

(Tél. Défense 09-71.)

SACCHAROL ROSSO

Émulsion stable homogène à 70 p. 100 d'Huile de paraffine de la plus haute viscosité.

Traitement rationnel et inoffensif de la constipation chronique.

Le *Saccharol* est un lubrifiant ; son action est purement mécanique : il agit sur le bol fécal et ne provoque aucune sécrétion anormale. Il n'a aucune influence nocive sur la muqueuse de l'intestin. Il n'est pas assimilable et est dépourvu de toute toxicité.

Le *Saccharol* contient le maximum d'huile de paraffine d'une pureté parfaite, résistant à 39°, ce qui lui permet

a. De ne pas se liquéfier à la chaleur de l'organisme et de demeurer longtemps et sans changement dans le tube intestinal ;

b. De s'émulsionner à la masse fécale, qui s'évacue avec elle sans suintement.

Le *Saccharol* est souverain contre la constipation habituelle, les auto-intoxications, les embarras gastro-intestinaux, l'obésité et toutes les affections nécessitant un rééducateur intestinal. C'est le remède idéal, tant pour les adultes que pour les enfants.

Le *Saccharol* est une émulsion très soluble dans toutes les boissons : lait, eau, café, thé, etc., et d'un goût extrêmement agréable.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour.

(Pure ou délayée dans le liquide préféré.)

(Les doses indiquées sont à prendre le matin au réveil de préférence, avant le petit déjeuner.)

Ce traitement doit être continué pendant deux à trois semaines, jusqu'à ce que l'intestin ait repris son fonctionnement normal. Ce résultat ayant été obtenu, les doses de *Saccharol* pourront être réduites et diminuées progressivement, jusqu'à suppression complète.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : 32 francs le grand flacon (500 gr.) :

18 francs le petit flacon (250 gr.).

Produits Biochimiques Rosso

Laboratoire CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-38.)

SACNEL

(Lotion)

Composition. — Soufre colloïdal, acide dithiosalicylique, oxydes de zinc et de titane, extrait d'hamamélis, excipient aqueux.

Propriétés. — Par son action sur les cellules à cystéine des couches profondes de la peau, le SACNEL remédie aux troubles du métabolisme du soufre, il est antiphlogistique, non irritant.

Indications. — Traitement de l'acné (acné juvénile, acné ponctuée, rosacée, séborrhéique) et toutes affections pour lesquelles l'emploi du soufre est indiqué.

Forme. — Un flacon contenant 100 grammes environ de lotion très homogène.

Mode d'emploi. — Le SACNEL s'applique à l'aide d'un coton le soir avant le coucher. Il sèche, ne tache pas le linge, son odeur est agréable. Enreg. au Lab. Nat. de Contrôle des Médicaments sous le N° 1-11.

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS (IV^e).

SAINT-ARÉ

(Même minéralisation que Carlsbad)

Sulfatée sodique à 6 ‰.

Chlorurée, bicarbonatée, magnésienne, calcique.

Propriétés :

Cholagogue, diurétique, hypotensive.

Indications thérapeutiques :

Syndromes vésiculaires et hépato-coliques.

Alcalose. Insuffisance hépatique. Dyspepsie biliaire. Stase du côlon droit.

Traitement à domicile.

Société des Eaux Minérales de Decize
(Nièvre)

Bureau à Paris

10, rue de La Barouillère — PARIS (6^e)
(Tél. : Suf. 36-59.)

SALANTALE

Vaccins polyvalents polymicrobiens antiseptiques.

Antivirus. Antigènes.

Formes et indications :

AURICULO-SALANTALE

Vaccin glycérimé. Flacon pipette auriculaire.

Affections purulentes otogènes.

CYSTO-SALANTALE

Pommade-Vaccin. Traitement par frictions cutanées.

Cystites, Pyélonéphrites, Colibacilloses.

GINGIVO-SALANTALE

Gelée pour massage gingival.

Gingivites, Stomatites, Pyorrhées et autres affections buccales.

OPHTALMO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube. Ni irritante, ni caustique, ni toxique.

Orgelets, Blépharites, Conjonctivites purulentes et autres suppurations.

OTO-SALANTALE

Pommade auriculaire en tube avec canule pour le conduit auditif. Furoncles et affections purulentes du conduit auditif, Eczéma impétigineux, Otites externes, Pansements postopératoires.

OVULES SALANTALE

Odeur agréable. Désodorisants. Ne tachent pas le linge.

Leucorrhées et autres affections purulentes des voies génito-urinaires.

Pour fillettes : ovule petit format.

POMMADE SALANTALE

Applications par larges pansements et vaccination par voie cutanée.

Furoncles, Anthrax, Panaris, Plaies infectées, Suppurations postopératoires et autres affections purulentes. Prophylactique de la Mastite.

RECTO-SALANTALE

Pommade calmante et décongestive, en tube avec canule rectale.

Affections du rectum et de l'anus, Hémorroïdes.

RHINO-SALANTALE

Pommade nasale en tube avec embout. Soulagement immédiat.

Rhumes, Grippe, Sinusites et autres Inflammations rhino-pharyngées.

SUPPO-SANTALE

Action calmante et décongestive.

Hémorroïdes, Fistules et Fissures anales.

TRACHO-SALANTALE

Pommade ophtalmique en tube avec canule breveté à l'usage oculaire. Affections trachomateuses.

Echantillons et Littérature sur demande.

Laboratoires SALANTALE — STRASBOURG. Téléphone 253-26.

SALBINE DU D^r FAYÈS

Pommade réalisant l'action simultanée de ZnO porphyrisé et du Soufre précipité.

Indications. — Eczéma, Prurits, Folliculites, Intertrigo, Cicatrisant des plaies ou brûlures superficielles, en particulier après diathermo-coagulation.

Les applications locales deux ou trois fois par jour n'irritent jamais, ce qui permet un usage prolongé.

Ne tache pas le linge.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

G. de MONTMOROT, Pharmacien
2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).
Usine : 10, rue Petit — PARIS (XIX^e).

SALÈNE SALÉNAL CIBA

ANALGÉSIIQUES EXTERNES.

Le Salène, mélange des éthers méthyl et éthylglyco-salicyliques, possède à un haut degré les propriétés analgésiques du salicylate de méthyle, mais a sur ce dernier l'avantage de son absence d'odeur et de toute action irritante.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu ou chronique, Lumbago, Torticolis, Névrite rhumatismale, Goutte, Sciatique, etc.

Doses. — Le Salène se formule magistralement, pur ou en liniment, par 5 ou 10 gr. (frictions). Le Salénal, onguent au Salène, s'emploie aussi en frictions ou applications *largà manu*.

Formuler : 1 flacon Salène.
1 tube Salénal.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

SALIBRA

Complexe Phospho-Chloruré
du tonus en Ampoules.

Composition. — Phosphates acides et Chlorures de calcium, magnésium, sodium, potassium, lithium, manganèse.

Indications. — Anémies, Asthénies, Surmenages. Convalescences, Grippe, Fatigues.

Tous états Alcalosiques (Dermatoses, Asthme, etc.). Phosphaturie, Colibacillurie, Décalcification.

Rhumatisme chronique, Déminéralisation, Grossesse. Rachitisme, Tuberculoses, Sénilité.

Tous les états psychiques.

Tonique général puissant.

Forme. — Ampoules buvables de 4 cc.

Posologie. — 1 à 2 amp. p. jour pendant les repas.

Prix : 23 francs. **Durée :** 10 jours.

Enreg. L. N. C. M. n° 1229-3.

Laboratoires du SALIBRA

1, rue des Jardins — ASNIERES. (Tél. : Grés. 27-94.)

SALICURE

Sel naturel des EauxMères de Lons-le-Saunier (Salines de Montaignu, (Jura).

Indications. — Cure hydrominérale hyperchlorurée, sodique, magnésienne et bromurée.

Nourrissons et enfants : Lymphatisme, Troubles de croissance, Rachitisme, Prétuberculeuse, Paralysies infantiles, Tuberculoses osseuses ou ganglionnaires.

Adultes : Anémie, Dépression, Surmenage, Troubles endocriniens, Rhumatisme, Arthrites et Périarthrites, Varices, Ostéomyélites, Troubles trophiques des fractures, Tuberculoses osseuses ou génitales.

Gynécologie : Métrites et Salpingo-Ovarites chroniques, Fibromes, Dysménorrhées, Stérilité, Déviations utérines.

I. — BAINS

	Eau	Salicure	Température	Durée
Nourrissons	30 litres	250 à 500 gr.	36°	5 minutes
Enfants	100 litres	750 à 1 kg. 500	32° à 37,5	5 à 15 minutes
Adultes	200 litres	1 à 3 kg.	32° à 37,5	5 à 15 minutes

II. — TRAITEMENTS LOCAUX

	Salicure	par litre d'eau	Température	Durée
Bains locaux	25 à 300 gr.		de 20 à 40°	10 à 30 minutes
Compresses	25 à 300 gr.		de 20 à 45°	1 à 3 heures
Plaies	7 à 20 gr.		36°	Renouveler souvent
Injectons	100 à 200 gr.		40 à 50°	Très lentement

Prix : Boite 1 kilog : 10 fr. 60.

Laboratoire A. LUCIEN, Pharmacien, 19, r. du Bac, PARIS (7^e).
(Tél. : Littré 55-03.)

SALICYLATE DE SOUDE CLIN

Toutes les préparations de Salicylate de Soude Clin sont à base de Salicylate de soude cristallisé, d'une pureté chimique absolue, exempt de phénols et d'acides libres.

Le dosage rigoureux, la composition toujours fixe, la stabilité, l'excipient adéquat assurent l'activité et facilitent la tolérance locale ou générale.

Indications et Formes.

Salicylothérapie : Rhumatisme articulaire aigu et ses complications. Rhumatisme chronique. Arthralgies, myalgies, névralgies. Affections biliaires. Encéphalite, chorée et zona. Sclérose en plaques. Psoriasis. Affections oculaires.

Voie buccale : *Solution de salicylate de soude du Docteur Clin.* — 2 grammes par cuillerée à soupe. Excipient d'un goût agréable et permettant une tolérance parfaite. Le flacon de 300 cc.

Capsules glutinisées de salicylate de soude Clin dosées à 0 gr. 50 par capsule.

Voie veineuse : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 5 o/o* Ampoules de 20 cc. (1 gr. par ampoule), de 40 cc. (2 grammes par ampoule), de 60 cc. (3 gr. par ampoule).

Solution de Salicylate de Soude Clin glucosé à 10 o/o. (Formule du docteur René Benard) : Ampoules de 10 cc. et 20 cc., boîtes de 3 ampoules.

Médication sclérosante (Méthode du professeur Sicard) : *Solution de Salicylate de Soude Clin à 20, 30 ou 40 o/o*, en ampoules de 3 cc. Boîte de 6 ampoules.

Polysalicylates Clin (Formule du Docteur Lutembacher)

Solution buccale — 0, 75 par cuillerée à soupe.

Ampoules 10 et 20 cc. à 5 o/o.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.

20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SALICYLATE SURACTIVÉ « ANA »

Définition. — Solution, en eau de mer, de Salicylate de Soude chimiquement pur, en milieu calco-magnésien thiosulfaté.

Présentations :

- a. Solution : 1/2 cuillerée à café (incluse dans chaque boîte) ou LXX gouttes = 1 gr. de Salicylate de Soude;
1 cuillerée à café = 2 gr.
- b. Dragées glutinisées à 0 gr. 50 (ne se dissolvant que dans l'intestin).
- c. Ampoules pour injections intraveineuses = 1 gr. par ampoule de 10 cc.

Indications. — Toutes les indications du Salicylate de Soude.

Posologie. — Identique à celle du Salicylate de Soude.

Avantage. — Suractivation (170 p. 100).
Goût agréable, Tolérance parfaite, Concentration forte.

Prix adapté (32 gr. de Salicylate suractivé par flacon) :

Solution	18 fr. 20
Ampoules	18 fr. 20
Dragées : le flacon de	
64 dragées.....	18 fr. 20

Laboratoires ANA

M. VIENNE, Pharmacien

18, avenue Daumesnil — PARIS (XII^e).

(Tél. : Did. 16-49.)

SALICYLNA

Dragées de Salicylate de Soude chimiquement pur, dont le mode de préparation spécial supprime les inconvénients habituels de la médication salicylée.

Trois avantages :

- 1° *Pureté chimique absolue*, assurant une efficacité régulière maxima ;
- 2° *Tolérance parfaite*, l'enrobage spécial des dragées évitant tout contact avec l'estomac ;
- 3° *Commodité d'emploi*, le dosage rigoureux (0 gr. 50 ou 0 gr. 25) permettant toutes les modalités de prescription.

Salicylna, 0,50. Étui de 80 dragées : 20 francs.

Salicylna, 0,25. Étui de 120 dragées : 20 francs.

Laboratoire du Docteur LAVOUE

RENNES (Ille-et-Vilaine).

SALIFORMIODE BOUCHEREAU

Chimiquement : Méthylidosalicylate d'Hexaméthylène-amine et de sodium. Nouveau dérivé aminé iodosalicylé cristallisé, atoxique, hydro-soluble, d'action antiseptique très supérieure à celle de la formine et du salicylate de soude, d'une tolérance parfaite.

Indications. — *Spécifique des Rhumatismes aigus et infectieux, des arthrites, polysynovites et sciatiques.*

Formes. — 1° *Ampoules* dosées à 0,70 par 10 cc.

a. Pour injections intra musculaires ;

b. Pour injections intra veineuses.

2° *Gouttes* contenant 20 % de produit actif spécialement pour antiseptie hépato-rénale.

SALIFORMIODE SOUFRÉ

Pour rhumatismes chroniques et arthroses.

Formes. — 1° *Ampoules* à 0,45 saliformiode et 0,20 d'un Thiosulfate aminé pour 10 cc. en injections intra musculaires profondes.

2° *Gouttes* contenant 20 % de produit actif spécialement pour antiseptie hépato-rénale.

Saliformiode. Boîte 6 ampoules 10 cc. I. M. et I. V. 39 fr.

Saliformiode soufré. Boîte 6 ampoules 10 cc. 39 fr.

Gouttes. Saliformiode simple et soufré. 18 fr. et 19 fr.

Enregistrées au Laboratoire de Contrôle, 1621-3-4, etc.

Laboratoire de Chimie thérapeutique.

P. BOUCHEREAU,

Docteur en Pharmacie, lauréat de la Faculté de Paris.
57, Boulevard A.-Briand — CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).
(Tél. : Pompadour 197.)

SALI-RECTAL

Composition :

Salicylate de Soude	0 gr. 50
Carbonate de Chaux	0 gr. 20
Beurre de Cacao	Q. S.

Toutes douleurs et rhumatismes aigus et chroniques.

Agit par voie d'absorption intestinale, plus active que la voie stomacale.

Aucune intolérance ni contre-indication, même en cas de rhumatismes blennorragiques.

Aucune influence sur la prostate.

Prix : 30 fr. 60 la boîte.

Laboratoires TRICA

A. WEBER, Pharmacien de 1^{re} classe,
21, rue de la République — SAINT-MANDÉ (Seine).

Dépôt et vente en gros :

7, rue Chaptal — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 80-42.)

SALITROPINE AGUETTANT

Contre tous les états infectieux aigus, localisés ou généralisés.

Composition essentielle. — Salicylate de Soude, Formine, en milieu glucosé.

Indications principales. — Pneumonie, Broncho-pneumonie, Grippe aiguë, Encéphalite aiguë et phlegmo-neuse, Fièvre puerpérale, Erysipèle, Rhumatisme polyarticulaire aigu et Maladie de Bouillaud, Infection des voies biliaires et urinaires, Etats typhiques et paratyphoïdiques, Colibacillozes.

Formes :

Ampoules de 5 et 10 cc. dosées à 0,10 de chaque composant par cc. **Comprimés** dosés à 0,165 de chaque composant.

En pharmacies : Boîtes de 6 amp. 5 cc.

— 6 — 10 cc.

— 8 tubes de 6 comprimés.

Posologie. — **Ampoules :** 1 à 2 par jour de 5 ou 10 cc. en injections intramusculaires ou de préférence intraveineuses, ou par voie rectale. Enfants, demi-dose.

Comprimés : dose moyenne, 6 par jour avant les repas ; pour les enfants, demi-dose.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. n° 130-8 et 9.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-63.)

SALSANOS

Complexe sodique.

Minéro-organique effervescent.

Composition. — Après effervescence la répartition des sels de sodium est approximativement:

Citrate trisodique naissant ($C^4H^5O^7Na^3$ $IIIH^2O$)	50
Tartrate naissant ($C^4H^4O^4Na^22H^2O$)	35
Sulfate (SO^4Na^2)	5,5
Phosphate (PO^4Na^3)	5,5

Propriétés. — Spécifique des troubles de l'équilibre acide-base. Met à la disposition de l'organisme les éléments ioniques et les tampons permettant la reconstitution et le maintien de la réserve alcaline.

Indications. — Acidose, Alcalose, Arthritisme, Artériosclérose, Lithiases hépatique et rénale, Goutte, Hyperviscosité sanguine, Constipation.

Doses. — Une à deux cuillerées à café dans un demi-verre d'eau le matin à jeun.

Prix : Le flacon 19 fr. 10 (15 jours de traitement).

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Charlebourg 39-70.)

SAL-SODYL

Sal-Sodyl N (Normal).

Sal-Sodyl S (Sulfaté).

Sal-Sodyl B (Bromuré).

Présentation. — Boîte de 30 prises de sel anhydre et pur.

Composition et indications. — *Sal-Sodyl N*: Phosphate, Citrate, Sulfate et Bicarbonate de Soude. Spécialement indiqué pour le traitement des gastrites, gastro-entérites et surtout hyperchlorhydries.

Sal-Sodyl S (Sulfaté) : Pour les hépatiques avec ralentissement des fonctions intestinales. Action particulièrement remarquable dans le syndrome gastro-entéro-hépatique.

Sal-Sodyl B (Bromuré) : Pour le traitement des dyspepsies nerveuses et des troubles spasmodiques viscéraux.

Traitement. — *Adultes* : à jeun ou au début des repas à la dose de 1 ou 2 prises dissoutes dans un demi-verre d'eau.

Enfants : 1 demi-prise.

Bébés : 1 quart de prise.

Prix : 16 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 496-27.

Laboratoire du SERPENT,

5, boulevard Gambetta, à GRENOBLE (Isère).
(Tél. : 16-40.)

SALUBRINE

(Solution)

Antiseptique puissant.

Composition :

Formolsulfonate de soude...	6,5	Essence de Thym.....	0,06
Thymol.....	0,02	Alcool à 90°.....	2,40

pour 100 gr. mmes.

Mode d'action :

Au contact des tissus vivants, la Salubrine possède une action antiseptique supérieure à celle du formol, car, à l'inverse de ce dernier corps, le formolsulfonate de Na n'exerce aucune action coagulante sur les tissus, ce qui facilite la pénétration de l'antiseptique (A. Lumière et Seyewetz).

Non-toxicité de la Salubrine :

Un chien de 4 kg. 100 supporte 5 gr. en injections intraveineuses sans inconvénient (Pohl).

L'administration *per os* au lapin de 1 gr. 50 de formolsulfonate de Na durant 15 jours consécutifs n'entraîne aucun trouble (Loeb).

Le formolsulfonate de Na est préparé dans nos laboratoires à l'état pur suivant le procédé breveté J. Eury (Brevet français n° 673753)

Indications. — Traitement des plaies, furoncles, panaris, injections vaginales.

Mode d'emploi. — Pour les usages médicaux, chirurgicaux et obstétricaux : 1 à 2 cuillerées à soupe par litre d'eau.

La Salubrine existe également sous forme de comprimés.

2 comprimés Salubrine = 1 cuillerée à soupe de Salubrine liquide.

Prix : 8 fr. 70

Laboratoire MAUCHANT

J. EURY, Docteur en pharmacie

GENNEVILLIERS (Seine). (Tél. Grés. 05-21.)

SALVACID

Association de Bile, de Cholestérine, de Sauge et de Para-Thyroïde.

Indications thérapeutiques. — Aigreurs, Hyperacidité, Aérophagie, Gastrites. Spécifique des Ulcères d'estomac et du duodénum.

Mode d'emploi. — 2 comprimés dragéifiés après les 3 principaux repas et 1 comprimé en plus après les repas complémentaires, soit avec un peu d'eau, soit avec une tasse de tisane chaude.

Ne jamais les croquer (grande amertume). Ne jamais les avaler à jeun.

Conservation cinq années.

50 comprimés. Prix : 21 fr. 20.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 417.

Laboratoires MIALHE

8, rue Favart — PARIS (2°).

Tél. : Richelieu 35-10.

SALVÉ

A base de poudre grise (Hg cum creta), 1 centigramme par comprimé et 3 centigrammes par cachet et de carbonate de bismuth. Traitement bismutho-mercuriel. Médication dissimulée.

Indications. — Hérédo-syphilis, Traitement d'entretien, Insuffisance hépatique et ses manifestations, Constipation habituelle de l'enfant, acétonémie, Dermatoses (eczéma, prurigo, strophulus), Helminthiase et plus particulièrement oxyurase.

Comprimés : avant 6 mois : 1/2 comprimé par jour.

6 mois à 1 an : 1 compr. en 2 fois.

1 an à 2 ans : 3/2 compr. par jour.

2 ans à 4 ans : 2 comprimés par jour.

4 ans à 15 ans : 3 comprimés par jour.

Adultes : 4 comprimés par jour.

Délayer les comprimés dans un peu d'eau ou de lait, avant les repas.

Cachets : Traitement arsénico-bismutho-mercuriel.

Adultes : 2 cachets par jour.

Comprimés : 14 fr. 55.

Cachets : 16 fr. 50.

Laboratoire RICHER, Docteur en Pharmacie
45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien — PARIS.
(Tél. : Provence 34-87.)

SALVEBYL

(Granulé)

Fluidifiant et excitant de la sécrétion biliaire à base de poudre grise (Hg cum creta), hyposulfite de soude et d'extraits végétaux : artichaut, boldo, romarin, etc.

1 cuillerée à café contient 0,005 de poudre grise.

Indications. — Insuffisance hépatique, Migraines, Constipation chronique, Dyspepsie, Calculs biliaires, etc..., Eczéma, Urticaire, Prurigo strophulus.

Posologie. — *Enfants :* 1 cuillerée à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires RICHER

Docteur en Pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien —
PARIS.

(Tél. : Provence 34-87.)

SALVENASE LEGOUX

Usage féminin.

Composition :

Traitement interne.

A. Comprimés non enrobés se désagrégeant très rapidement, constitués de :	Extraits secs.	Marron d'Inde (stabilisé). Cupressus. Hamamelis. Viburnum. Boldo. Surrénales. Thyroides. Ovaires.
	Poudre de glandes.	

B. Granulé aromatisé soluble dans l'eau de citrate de soude pur.

Traitement externe.

Sels pour bains { Sulfate de potasse et d'alumine.
à base de : { Hydrochlorate de soude.
{ Carbonate de soude acide.

Indications. — Affections du système veineux. Traitement complémentaire de la cure aux eaux ou à défaut son meilleur succédané. (Bagnoles-de-l'Orne, La Léchère.)

Mode d'emploi :

Traitement interne. { 1^o Matin à jeun, 1 cuillerée à café pleine de granulé, dissous dans un demi-verre d'eau.
(Prix : 19 fr.) { 2^o A chaque repas de midi et du soir, prendre 2 à 3 comprimés.

Traitement externe. { 1 bain ou 2 par semaine dans lequel on aura fait dissoudre le contenu d'une boîte Salvenase (sels pour bains).
(Prix : 4 fr. 95)

Unité de vente { traitement interne, pour 10 jours,
{ traitement externe, pour 1 bain.

N^o d'inscription au Lab. de Contrôle :

Traitement interne. { Comprimés 146-4.
{ Granulé .. 146-5.
Traitement externe..... 146-6.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, Pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Charlebourg 20-79.)

SALYFRÈNE

« **Salicylate de Soude Actif, Toléré, Agréable.** »

Deux formes : Solution, Dragées glutinisées.

Composition. — Chaque demi-cuiller à café-Mesure (LXXX gouttes) renferme :
Salicylate de Soude 1 gr.

(Recristallisé très pur)

Extrait de Frêne 0 gr. 37
(Plante Fraîche stabilisée)

Extrait de Reine des Prés 0 gr. 03
(Glucosides Salicylés).

Extrait de Pommes Reinettes 0 gr. 33
(Laxatif doux).

Avantages. — Salicylate extrêmement pur, activé par des extraits végétaux diurétiques. Saveur très agréable remplaçant totalement le goût nauséux du Salicylate. Gouttes concentrées permettant de mieux fractionner les doses.

Prix adapté : 20 fr. les 30 gr. Salicylate.

Indications. — Toutes celles du Salicylate de Soude.

Mode d'emploi. — De 4 à 10 mesures par jour, toujours bien dilué (Eau alcalinisée ou Lait chaud).

Petites doses : LX gouttes (= 0 gr. 50 Salicylate) de 3 à 5 fois par jour.

Nouvelle Forme. — Dragées Glutinisées à 0 gr. 50 Salicylate. Les seules Dragées Glutinisées renfermant des extraits diurétiques « entourant » et « divisant » le Salicylate, et reconstituant la forme. Gouttes dans l'intestin. (Traitements ambulatoires. Cures de complément.)

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 996-1-2.

Laboratoires du SALYFRÈNE

210, Avenue de Toulon — MARSEILLE.

Téléphone : Gar. 01-93.

SALYPTOL NARTY

Traitement de la Grippe, de la Coqueluche et des maladies des Voies respiratoires.

Composition. Propriétés. — Extrait balsamique aux principes actifs de l'eucalyptus et du pin maritime, Bromoforme-Codéine, Belladone d'Aconit et d'Opium, Hypnal, Excipient glycéro-balsamique sucré.

Calmant énergique de la toux, Antifébrifuge, Anti-bronchitique, Anti-grippal.

Indications. — Rhumes, Laryngite, Trachéite, Bronchites aiguës et chroniques, Affections pulmonaires, Grippe et toutes ses formes, Coqueluche.

Formes. Posologie. — *Elixir (adultes)* : 4 à 5 cuillerées à dessert par 24 heures.

Gouttes (enfants) : jusqu'à 10 ans, X gouttes par jour et par année d'âge ; jusqu'à 1 an, I goutte par jour et par mois.

Elixir : 22 fr. 50. 20 cuillerées à dessert.

Gouttes : 17 francs. 600 gouttes.

Laboratoires Georges **TINARD**

134, bd Pereire — PARIS (XVII^e). Wag. 56-16.

SALYSÉRUM

Médication salicylée avec anesthésie locale.

(Communication à l'Académie de Médecine.)

Indications. — Toutes algies rhumatismales, Rhumatisme aigu ou subaigu, Rhumatisme musculaire, Goutte, Sciatique, Lumbago, Torticolis, Pleurodynie, Rhumatisme gonococcique.

Forme. — Ampoules de 5 cc. d'acide salicylique indolore.

Doses. — 2 à 4 ampoules chaque jour, injectées au point douloureux.

Prix : 26 fr. la boîte de 5 ampoules de 5 cc.

Laboratoires **DROUET et PLET**

RUEIL-MALMAISON (Seine-et-Oise).

(Tél. : 32.)

SANALEPSI RUSSI

Pilules et gouttes.

Composition. — Chaque pilule ou XXV gouttes contiennent :

Ethylphénylmalonylcarbamide.....	0,05
Rhamnus pursh	0,10
Extraits antispasmodiques (Datura, Scopolia, Valériane)	0,04
Saccharine	0,002

Indications. — Epilepsies ; états spasmodiques ; troubles nerveux légers (agitation, insomnie, états d'angoisse, etc.).

Particularités thérapeutiques. — Action synergique des composants ; faible toxicité ; élimination rapide.

Doses :

Adultes : de 1 à 6 pilules (ou de XXV à CL gouttes) par jour.

Enfants : de V à L gouttes.

Suivant l'ordonnance médicale.

Prix :

Gouttes	26 fr. 50
Pilules, petit modèle.....	9 fr. 50
Pilules, grand modèle.....	26 fr. 50

Laboratoires SASSÉ

78, boulevard Beaumarchais — PARIS (XI^e).

SANARGOL

Composition :

Argent colloïdal, hexaméthylène tétramine recristallisée dans l'alcool, salicylate de phényle, charbon de peuplier porphyrisé, charbon animal activé.

Une seule forme : granulé friable, aromatisé à l'anis.

Indications :

Désinfection intestinale, vésicale et biliaire. Fermentations, entéro-colites, flatulence, intoxications d'origine exogène et endogène. **Colibacillose**
Affections rénales, vésicales : cystites, néphrites.

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café à la fin des repas.

Enfants : 1/3 à 1/2 de la dose.

Un flacon suffit pour un traitement de 15 jours.

Le **SANARGOL** ne constipe pas.

Enr. au L. N. C. M. n° 1389-1.

Laboratoires BARDOU

13, quai Ragobert — JOIGNY (Yonne).

SANARTERYL

Hypotenseur.

2 formules : Masculine et Féminine.

Composition. — Gui, Belladone, Cratægus, Hamamelis, peptone iodée, phényléthylmalonylurée, Orchitine ou Ovarine, Renine.

Thérapeutique. — Hypotenseur, sédatif des troubles cardio-vasculaires et nerveux des hypertendus, antispasmodique neurotonique. Ménopause.

Posologie. — Une cuillerée à soupe 1 quart d'heure avant les repas de midi et du soir.

Prix : 28 francs. Contenance : 180 cc.

L. N. C. M. n^{os} 1051-3 pour M, 1051-4 pour F.

Laboratoire SANARTERYL

P. COLLIOT, Pharmacien

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SANAS

Composition :

Extrait glycéринé concentré de foies frais de morue. Produit vitaminé, facteurs A et D, sans trace d'huile ; ne contient aucune substance irradiée artificiellement.

Préparation :

Sur les lieux mêmes de la pêche, dans les laboratoires du *Sanas*, à Saint-Pierre-Miquelon (Banc de Terre-Neuve).

Formes :

- 1^o Gouttes ;
- 2^o Ampoules pour boisson. Spécialement indiquées pour les colonies et pays chauds.

Avantages :

Sans odeur ou saveur désagréables.
Contient sous un faible volume les principes actifs des foies frais. Se prend aussi bien l'été que l'hiver.

Indications :

Toutes celles de l'huile de foie de morue. Rachitisme, Prétuberculose, Anémie, Convalescence des maladies infectieuses, Adénopathies, Inappétence.

Posologie :

Enfants : Dose journalière : II à IV gouttes par année d'âge.

Adultes : Dose journalière : L à LX gouttes.

Mode d'emploi :

Une demi-dose journalière avant chacun des deux principaux repas, dans un peu de lait, de bière, de vin, de potage ou mélangée à un aliment quelconque.

Prix du flacon : 17 fr. 75.

A. WELCKER et Cie

22, r de l'Est — BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. : Molitor 03-39.)

SANDOPTAL

Acide isobutyl-allyl-barbiturique.

Forme. — Comprimés dragéifiés dosés à 20 cgr. d'isobutylallylmalonylurée.

Propriétés. — Assure un sommeil paisible et naturel, d'une durée normale, suivi d'un réveil eusthénique. Index thérapeutique élevé. Tolérance parfaite, également par les personnes âgées, les affaiblis, les convalescents.

Indications. — Toutes les insomnies.

Posologie. — Une dragée le soir avant de se coucher. Cas rebelles : 2 ou 3 dragées (maximum 4) à la fois.

Présentation. — Tubes de 10 dragées. Pour hôpitaux et cliniques : flacons de 100 et 500 dragées.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SANÉDRINE

Chlorhydrate d'Ephédrine lévogyre.

Indications :

Asthme bronchique, Fièvre des foins, Hypotension, Dysménorrhée, Prévention des accidents allergiques.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 025 (tubes de 20).	Prix : 11 fr. 70
Solution aqueuse à 3 % Flacons de 30 cm ³ —	23 fr. 50
Solution huileuse à 2 % Flacons de 15 cm ³ —	17 fr. 50

Posologie et mode d'emploi :

Deux à six comprimés à 25 mg. par 24 heures, en prises espacées.

S'abstenir chez les hypertendus et les prostatiques.

Pour l'administration par voie parentérale : ampoules de 1 cm. renfermant : Sanédrine (0 g. 02), et Rénaleptine (0 g. 0002) — (boîtes de 10 amp.).

Pour l'usage externe : solution aqueuse de Sanédrine à 3 %, solution huileuse de Sanédrine Base à 2 %.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SANEX-INHALANT

Indications. — Traitement des affections aiguës et chroniques des voies respiratoires supérieures : Coryza, Rhinite, Laryngite, Trachéite, Coqueluche, Grippe, Ozène, Angine.

Composition. — Essences aromatiques et balsamiques rendues très volatiles par l'addition d'un solvant (Pin sylvestre, Thym, Lavande, Pinène, Niaouli). Ne contient pas de créosote.

Propriétés. — Décongestionne et aseptise la muqueuse rhinobronchique, atténue l'inflammation et réduit rapidement les sécrétions et l'expectoration.

Mode d'emploi. — Quelques gouttes sur le mouchoir plusieurs fois par jour et dans un verre d'eau chaude en inhalations.

Prix. — Le tube : 10 francs.

Échantillon sur demande aux

Laboratoires PILLIER

8, 10, rue Masséna — NICE (A.-M.)

SANGUIL

Reconstituant complet.

Composition. — Association de glycéro-phosphate de chaux, phosphate trical-cique, fluorure de calcium, nucléinate de manganèse, oxalate de fer, méthyl-arsinate de soude, kola totale, noix vomique totale, surrénale.

Action thérapeutique. — Stimule la cellule nerveuse. Excite la nutrition. Régénère les globules sanguins. Tonifie l'organisme. Assure la reminéralisation complète par ses fixateurs opothérapiques.

Formes :

Cachets, la boîte de 42 : 19 francs.

Granulé de goût agréable, la boîte : 16 fr.

Mode d'emploi :

Cachets : Un cachet avant chacun des trois repas.

Granulés :

Moins de 12 ans : deux cuillerées à café par jour.

De 12 à 18 ans : trois cuillerées à café par jour.

Adultes : trois cuillerées à dessert par jour.

A prendre au début des repas.

Enreg. au L. N. C. sous les n^{os} 158-1 et 158-2.

Laboratoires Ch. BRÉSIL

12, rue Saint-Gilles — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 67-05.)

SANOCRYSINE DE MOLLGAARD

Thiosulfate d'or et de sodium.

OLÉO-SANOCRYSINE : (*Voir lettre O*).

Indications. — Tuberculose pulmonaire, cutanée, ganglionnaire, etc. Asthme bronchique, Maladies rhumatismales.

Forme. — Ampoules à doses progressives de 0 gr. 01 à 1 gramme, plus 1 ampoule appropriée d'eau bi-distillée stérilisée.

Mode d'emploi. — En injections intraveineuse ou intramusculaires (Leuret).

Posologie. — On débute par des doses faibles en augmentant progressivement selon la tolérance du malade, dosant et espaçant les injections suivant la méthode adaptée.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX
(Tél. : 80-989).

Dépositaire pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, pharmacien, 39, rue Fondaudège
BORDEAUX

SANOFORMINE

Composition. — Bicarbonates alcalins, trioxyméthylène, sulfate de cuivre, fluorure de sodium, menthol et essences aromatiques.

Forme. — Comprimés de dissolution facile et rapide dans l'eau tiède ou froide.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, bactéricide, désodorisant puissant, astringent, décongestionnant et analgésique.

Indications thérapeutiques et posologiques. —
1° Toilette intime : 1 à 2 comprimés par litre ;
2° Métrites, leucorrhée, salpingites, etc., 2 à 3 comprimés par litre.

La boîte de 50 comprimés. Prix : 18 fr. 50.
15 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Passy 51-12.

A BRUXELLES :

LE MARINEL, Pharmacien,
4, avenue Orban.

SANOGYL

Pâte antispirillaire pour prévenir et traiter les Pyorrhées alvéolaires, Gingivites, Stomatites simples, mercurielles, bismuthiques, etc.

Prix : 7 fr. 40.

SANORAM

Antiseptique puissant, en comprimés : ne coagule pas l'albumine. Recommandé en Chirurgie générale, traitement des brûlures, soins de la bouche, toilette intime, etc.

Prix : 5 fr. 30.

H. VILLETTE et C^{ie}, Pharmaciens

Marques de « La Biothérapie »

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e)

(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SANOQUINOL

A base d'Atoquinol (Cf. ce mot), d'hexaméthylène-tétramine, de chlorure de magnésium, citrate de soude et benzoate de lithine.

CIBA

MÉDICAMENT ANTI-ARTHRITIQUE.

CURES PROLONGÉES D'ÉLIMINATION URATIQUE.

Action thérapeutique. — Exerce sur l'organisme une action lixivante caractérisée par la mobilisation lente et prolongée des dépôts uratiques, une stimulation de la fonction hépatobiliaire et de la fonction rénale, l'augmentation de la sécrétion de la bile et une diurèse abondante, éliminatrice des déchets de l'organisme.

Indications. — Toutes les manifestations de l'arthritisme. A titre préventif ou hygiénique, chez les sujets à complexion pléthorique, les obèses, herpétiques et rhumatisants. Après les maladies infectieuses.

Doses. — 1 à 4 cuill. à café de granulé p. j. (aux repas).

Formuler. — Flacon de 20/30 doses.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND.

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON

(Tél. : Moncey 43-26.)

SANTAL MIDY

Composition. — Essence de Santal pure obtenue par la distillation du bois de Santal citrin de Mysore, préférable au Copahu, au Cubèbe et à l'essence de térébenthine.

Forme. — Capsules.

Caractéristiques. — Pureté de l'essence et dosage élevé (0 gr. 25) par capsule.

Indications. — Blennorrhagie, Inflammation de la vessie, Néphrite suppurée, Catarrhe de la Vessie, Catarrhe vésical des vieillards, Maladie de Bright, Cystite aiguë, Coliques néphrétiques.

Doses. — Dès que la maladie est déclarée, 10 à 12 capsules le premier jour. Augmenter de 3 à 4 capsules les deuxième et troisième jours. Diminuer progressivement la dose.

Diviser les doses en quatre parties que l'on prend à distance égale et au moins un quart d'heure avant les repas.

Prix : 21 fr. 75 le tube de 40 capsules.

Laboratoires GRIMAULT
VIAL et C^{ie}, successeurs
 8, rue Vivienne — PARIS (II^e).
 (Tél. : Gut. 27-03.)

SANTAL MONAL

au Bleu de Méthylène.

Forme. — Capsules gélatineuses.

Composition. — Chaque capsule contient :

Essences balsamiques	0 gr. 16
Bleu de Méthylène.....	0 gr. 02

Propriétés. — Antigonococcique, Antiseptique, Analgésique, Diurétique, le plus actif et le mieux toléré des produits préconisés pour le traitement des affections des Voies urinaires.

Indications. — Blennorrhagie, Cystites, Pyuries, Prostatites, Colibacillose urinaire.

Particularités. — Colore les urines en bleu.

Doses. — 6 à 10 capsules par jour.

Le flacon de 50 capsules : 22 fr. 45.

Laboratoires MONAL
 13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).
 (Tél. : Invalides 52-73.)

SANTAMIDE

Infections à gonocoques, à colibacilles, à streptocoques ou à staphylocoques.

Forme. — Capsules gélatineuses :

Composition :

Essence de Santal.....	0,12
Baume de Gurgum	0,12
Para-aminophénysulfamide	0,25
pour 1 capsule	

Propriétés. — Puissant bactéricide, d'action élective sur le *gonocoque*, analgésique, Balsamique, Décongestif, Diurétique.

Indications. — Gonococcies aiguës et chroniques, Pyuries, Pyélonéphrites, Cystites, Prostatites, Infections à colibacilles, à streptocoques ou à staphylocoques, Cervicites.

Posologie :

Gonococcies : les 1^{er}, 2^e, 3^e jours : 2 capsules 6 fois par jour ;

Les 3^e, 4^e, 5^e jours : 2 capsules 4 fois par jour ;

Les 6^e, 7^e, 8^e jours et jours suivants : 2 capsules 2 fois par jour.

Infections à streptocoques, à staphylocoques et à colibacilles : 4 à 6 capsules par jour à intervalles réguliers.

Prix : 25 fr. 50 le tube.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Inv. 52-73.)

SANTHÉOSE

Composition. — Théobromine d'une pureté parfaite, de préparation rigoureusement identique. S'administre seule ou associée.

Propriétés. — Diurétique cardio-rénal, complètement inoffensif, d'une efficacité remarquable et d'une fidélité constante.

Six formules.

Santhéose pure. — Affections cardio-rénales, Artériosclérose, Albuminurie, Urémie. (Dose 0 gr. 50 et 0 gr. 25.)

Santhéose Caféinée. — Asthénie, Asystolie, Œdèmes, Maladies infectieuses. (Dose 0 gr. 50.)

Santhéose Lithinée. — Presclérose, Arthritisme, Goutte, Gravelle. (Dose 0 gr. 545.)

Santhéose Phosphatée. — Sclérose cardio-rénale, Anémie, Convalescences Intoxications. (Dose 0 gr. 75.)

Santhéose Scillitique. — Hydropisies d'origine cardiaque. (Dose 0 gr. 55.)

Santhéose Spartéinée. — Etats asystoliques et Atonie cardiaque. (Dose 0 gr. 525.)

Forme. — Se présente en cachets ayant la forme d'un cœur. Boîtes de 24 cachets.

Mode d'emploi — 1 à 4 cachets par jour entre les repas.

Prix : 17 fr. 50 et 18 francs.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 104-1, 2, 3, 4, 5 et 6.

Traitement. — Selon prescription médicale.

Laboratoire de la SANTHÉOSE

4, rue du Roi-de-Sicile — PARIS (IV^e). (Tél. : Arc. 95-60.)

SANTONIA VENOT

Vermifuge énergique pour la destruction des vers intestinaux, quelle qu'en soit l'espèce (sauf le ver solitaire).

Formule :

Santonine.....	0 gr. 01
Calomel.....	0 gr. 02
Semen-contrà, riche en essence.....	0 gr. 10

Par comprimé (tube de 12 comprimés). Prix : 7 francs.

Indications. — Le SANTONIA VENOT est le remède rêvé pour la destruction des oxyures, ascaris, tricocephales, ankylostomes, etc.

Mode d'emploi :

Enfants à partir de 3 ans : 1 comprimé le matin pendant 3 jours.

De 6 à 12 ans : 1 comprimé le matin pendant 6 jours.

Adultes : 2 comprimés le matin pendant 6 jours.

Faire plusieurs séries de traitement.

Laboratoires VENOT

139, avenue E.-Zola. — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 31-75.)

SAPOLAN

Onguent de Naphte spécial.

Spécifique des Prurits. — Eczémas.

Psoriasis. — Lichens. Prix : 12 francs.

Sapocrème. — Crème de SAPOLAN, Adoucissante, antiprurigineuse, Dermite aiguë. Prix : 13 fr. 65.

Sapocade. — (Sapolan et Huile de Cade.) Psoriasis, Séborrhée, Sycosis. Prix : 13 fr. 40.

Lait de Sapolan. — Erythèmes.

Lait de Soufre Sapolan. — Acné. } Prix : 14 fr. 80

Lait de Cèdre Sapolan. — Pityriasis et Séborrhée du cuir chevelu. } et 22 fr. 90.

Poudre de Sapolan. — Dermite aiguë. 13 fr. 65.

Savon de Sapolan. — Savon surgras au Sapolan : Peaux irritables. Prix : 5 fr. 80.

L. N. C. M. : 20-7, 1, 3, 2, 9, 8, 4, 11.

Laboratoire du D^r R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 65-97.)

Détail : Ph^{ie} 116, bd Haussmann et ttes ph^{ies}.

SAPOLINOL

Complexe stérile et rigoureusement atoxique de savons purs et huiles essentielles déterpénées.

Composition. — Le *Sapolinol liquide chirurgical* contient en dissolution intégrale 40 p. 1.000 d'essences antiseptiques, sans traces de terpènes.

Propriétés générales. — **Antiseptique physiologique remarquable**, cicatrisant, cytophyllactique et absolument inoffensif, quelle que soit la dose employée.

Présentations diverses :

Prix :

Taxe d'armement comprise.

1° Sapolinol liquide chirurgical :

- | | |
|---|-----------|
| a. Flacon Grand Modèle, dit Hôpital.. | 21 fr. 25 |
| b. Flacon Petit Modèle, dit Normal.. | 12 fr. 75 |
| c. Flacon Stilligoutte, dit Toilette... | 15 fr. 30 |

2° Sapolinol crème. En tube.....

7 fr. 45

3° Sapolinol ovules. En boîtes de 6...

12 fr. 75

4° Sapolinol pain.....

5 fr. 10

5° Sapolinol dentifrice. Flacon Stilligoutte

12 fr. 75

Indications et mode d'emploi.

Sapolinol liquide.

I. *Traitement des plaies*: A. Solution de *Sapolinol* dilué à 10 p. 100, en applications recouvertes d'un pansement. B. Solution à 50 p. 100 pour les plaies de petite étendue et très infectées.

II. *Gynécologie et hygiène journalière*: 1 à 2 cuillérées à soupe de *Sapolinol* dans un bock de 2 litres d'eau bouillie, plus ou moins chaude suivant le cas.

Sapolinol crème. — Ne contient aucun corps gras, indiquée dans toutes les dermatoses, enfants et adultes.

Sapolinol ovules. — Décongestionnant remarquable. En application le soir et suivis le matin d'une injection.

Sapolinol dentifrice. — Quelques gouttes sur la brosse à dents assurent nettoyage et désinfection parfaite de la cavité buccale. Chez tous, enfants et adultes, il est indispensable à l'entretien des appareils de prothèse.

Laboratoires du SAPOLINOL

38-40, cours Richard-Vitton — LYON.

SAPOREX

(Liquide).

Composition : Savon liquide, neutre, stérile, impeccable, associé au THYMOL, glycérine et essences aromatiques naturelles et déterpénées

Formule :

Essence de Lavande.....	0,35	Glycérine chimique pure à 30°.	5,00
Essence de Thym.....	0,13	Santal.....	0,07
Essence de Citronnelle.....	0,08	Thymol.....	0,10
Essence de Verveine.....	0,07	Savon liquide Q. S. P. 100	

Indications. — *Gynécologie. Obstétrique :* 1 cuillerée à soupe par litre d'eau en irrigations et savonnages.

Oxyurases : 1 cuillerée à café dans un verre d'eau tiède, en petit lavement, savonnage de la région anale. (Traitement 5 jours, Repos 5 jours.)

Désinfection et pansement des plaies : (Vives, atones, brûlures) : dilution 10 à 20 %.

Constipation : Lavement antiseptique et désodorisant. 1 cuillerée à soupe par litre d'eau.

Séborrhée, grasse et sèche : 1 cuillerée à soupe pour un verre d'eau.

Acnés (juvénile et rosacée), Sueurs profuses : Onction au Saporex pur jusqu'à absorption (application au coucher pendant 8 à 10 jours).

Prurits, Furoncles : Dilution 10 % en lavages ou compresses chaudes.

Toilette intime. Toilette des bébés (Préventif de l'érythème fessier).

Désinfection de la bouche et des dents : quel. gout. dans un verre d'eau.

Flacon G. M. (500 gr.) : 21 francs.

Flacon P. M. (250 gr.) : 13 francs.

Produits aux principes actifs de Saporex : Ovules Saporex (Voir Ovules). Bloc Saporex (savon solide). Dentifrice Saporex. Baume Saporex. Conditions spéciales à MM. les Docteurs.

Laboratoires SAPOREX, 184, route de Genas — LYON (III^e)

(C. C. Postaux : 96-04 LYON. — Tél. : Villeurbanne 93-88.)

SAPOSIDE

Composition. — Saponine du gayac, non hémolytique et non toxique.

Indications. — Fixe la cholestérine, en favorise l'élimination. Accélère la résorption du calcium. Arthritisme, Dermatoses, Sang lourd, hypervisqueux. Hypertension.

Forme :

1° Ampoules de 5 cc. à 2/1 000^e, injectables.

2° Flacon de solution à 4 % ingérable.

Posologie :

1° SAPOSIDE Ampoules : 2 à 3 ampoules de 5 cc par semaine. 27 fr.

L. N. C. M : 20-16.

2° SAPOSIDE Gouttes : XXV gouttes 2 fois par jour pendant 3 semaines : 25 fr. (3 semaines).

L. N. C. M : N° 20-17.

Laboratoire du Dr R. CAVAILLÈS

29, rue Singer — PARIS (XVI^e). (Tél. : Aut. 65-97.)

SAPROXYL

Composition et propriétés. — Complexe glucidique agissant physiologiquement sur les infections, fermentations et putréfactions intestinales, en favorisant le développement de la flore acidogène normale et en plaçant les bactéries de la putréfaction dans un milieu acide défavorable (pH trop bas).

Forme. — Comprimés.

Indications. — Entérites (aiguës, subaiguës ou chroniques). Gastro-entérites. Côlites (ascendante ou transverse). Fermentations intestinales. Diarrhées. Infections intestinales spécifiques : Fièvres typhoïde et paratyphoïde, Dysenteries, Salmonelloses, Cholérines, etc...

Posologie :

Trois fois 6 comprimés par jour, avalés avec un peu d'eau avant les repas. Au fur et à mesure de l'amélioration, diminuer progressivement jusqu'à la dose d'entretien : 3 fois 2 comprimés par jour.

Prix : La boîte de 140 comprimés environ (8 à 18 jours) : 16 fr. 45.

Laboratoire PHYGIÈNE

7, rue Lucien-Jeannin — LA GARENNE (Seine).
(Tél. : Charlebourg 39-70.)

SARCOPTOL

Solution complexe à base de soufre colloïdal, acide-B-oxynaphtylortho-oxymétatoluïque, savons, essences.

Indications. — Séborrhée et états séborrhéiques, Epidermodermites microbiennes, Eczéma chronique et impétigineux, Prurit, Prophylaxie de la Furunculose, Parasiticide. Spécifique de la gale, qu'il guérit en une seule application sans frotte et sans bain.

Avantages. — Ne tache ni le linge ni la peau, d'une odeur agréable. Ni toxique, ni irritant, supprime instantanément les démangeaisons.

En flacons de 60 grammes : 16 fr.
— 120 — 30 fr.

Laboratoire du Sarcptol

177, rue de Courcelles — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Étoile 29-54.)

SARIDON

Composition : Formule nouvelle :

Phényldiméthylisopropylpyrazolone .	0 g. 15
Acétylparaphénétidine	0 g. 25
Allylisopropylacétylcarbamide	0 g. 06
Triméthylxanthine	0 g. 05

Pour un comprimé.

Propriétés. — Jugule la douleur, supprime les maux de tête, apaise la fièvre, calme l'éréthisme nerveux. Aucune possibilité d'accumulation, aucun danger d'accoutumance, aucun risque de toxicomanie.

Indications. — Algies, névralgies, migraine, grippe, rhumatisme, maux de dents, sinusite, otite, etc...

Posologie. — 1 à 3 et même 4 comprimés par jour. A prendre avec un peu d'eau ou de liquide quelconque.

Enfants : 1/4 à 1/2 dose suivant l'âge.

Boîte de 10 comprimés.

Enr. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 504-63.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 91-10.)

SATURALGINE

Comprimés calcaires fluorurés friables.

Propriétés thérapeutiques. — Produit absorbant et alcalin, neutralisant l'acide chlorhydrique. Sédatif des douleurs gastriques. En cas de diarrhée, espace les selles et leur rend leur consistance normale.

Indications. — Toutes les gastralgies et tous les troubles dyspeptiques liés à l'hyperchlorhydrie. Les fermentations anormales de la digestion accompagnées ou non de diarrhée.

Posologie et mode d'emploi. — 1 comprimé à la fin des repas. Sucrer ou délayer dans un peu d'eau. Ensuite 1 ou 2 comprimés au moment des douleurs.

La boîte : 12 francs.

Laboratoire Central de la Bastille

F. BAYLOT

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e)

(Tél. : Archives 38-31.)

SCILLARÈNE

Adopté par les Hôpitaux de Paris.

Composition. — Glucoside cristallisé, principe actif du Bulbe de la Scille.

Formes. — Comprimés à 0 mgr. 8 de substance active, solution à 0 mgr. 8 pour XX gouttes ; ampoules pour injections endoveineuses ou intramusculaires profondes de 1 cc. à 0 gr. 0005 ; suppositoires dosés à 1 mgr.

Propriétés. — Produit pur d'action invariable. Cardiotonique et diurétique général et *azoturique*. Pas d'irritation rénale ou gastrique. Pas d'accumulation.

Indications. — 1° Cœur sénile ; 2° maintien de la compensation ; 3° puissant diurétique dans les néphrites, *le diurétique azoturique vrai*.

Posologie. — 1/2 à 1 ampoule par jour, 1 à 2 suppositoires, 1 comprimé ou XX gouttes 2 à 8 fois par jour.

PRODUITS SANDOZ

B. Joyeux, Docteur en Pharmacie
20, rue Vernier — PARIS (XVII^e).

SCILLITRINE

Composition. — Chaque dragée contient :
II gouttes de la solution alcoolique de Trinitrine à 1/100^e, 2 cgr. d'Extrait de Scille stabilisé, 1 cgr. de Poudre de Scille stabilisée et 1 cgr. de Phényléthylmalonylurée.

Propriétés. — Antispasmodique par la Trinitrine et la Phényléthylmalonylurée. Diurétique et toni-cardiaque par la Scille.

Noyau mou. — Ces substances sont réunies dans un noyau mou qui en permet l'absorption *per orale* lorsqu'on *croque lentement* les Dragées. A cette absorption *per orale* succède une action immédiate.

Posologie. — Elle est double du fait de l'existence du Noyau mou.

1. *Croquer lentement* de 2 à 4 dragées de Scillitrine en 10 minutes pour juguler les crises.
2. *Absorber*, aux repas, 3 dragées de Scillitrine, *pro die*, pendant 15 jours par mois pour faire disparaître les Troubles fonctionnels des hypertendus.

Indications :

- 1^o *Les crises* : Crises d'Angor, d'Hypertension paroxystique, de Tachycardie paroxystique, d'Aérogastrie, d'Aérocolie, d'Asthme, d'Anxiété, Crises des faux cardiaques, des Basedowiens ;
- 2^o *Traitement d'entretien des hypertendus* chez lesquels l'absorption par voie gastrique fait disparaître les troubles fonctionnels.

Présentation. — Boîte contenant 45 dragées. Durée moyenne : 1 mois.

Prix : 22 francs.

Laboratoire PERRIER

12, rue Henner — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 51-03.)

SCLERANA

Ancienne dénomination: **SCLEROSERUM ANA**

MÉDICATION SCLÉROSANTE

(Formule de Vendel.)

Composition. — Solution à diverses concentrations de chlorhydrolactate double de quinine et d'urée ANA.

Présentations commerciales et concentrations à employer :

I^o Sclerana hydrocèle (30 %).

Indications : Hydrocèles, Hygromas, Bursites, Affections kystiques, Abscesses froids.

II^o Sclerana Varices (25 %).

Indications : Varices (dilutions diverses), Fistules (diluer à 10 %), Hydarthroses (diluer à 5 %), Trachomes, Prurit anal et génital (diluer à 2 %).

III^o Sclerana O. R. L. (7,50 %).

Indications : Rhinites congestives.

IV^o Sclerana Hémorroïdes (5 %).

Indications : Hémorroïdes, Fissures anales.

Posologie. — Réclamer aux Laboratoires ANA l'opuscule édité par leurs soins.

Propriétés. — Activité, Innocuité, Fidélité des résultats.

Prix de chaque traitement :

Varices.....	54 fr. 35.
Hémorroïdes	36 fr. 90.
O. R. L.	36 fr. 90.
Hydrocèles	36 fr. 90.

Laboratoires ANA

M. VIENNE, Pharmacien

18, avenue Daumesnil — PARIS.

(Tél. : Did. 16-49.)

SCLÉROLYSINE DUCATTE

Thérapeutique de l'Artériosclérose et de l'Athérome.

Solution colloïdale de phosphatides organiques. Médication hypotensive dissolvante des dépôts artériels.

Action thérapeutique. — Est indiquée dans le cas d'artériosclérose confirmée, chez tous les sujets qui présentent les petits symptômes de la pré-sclérose. Prescrite toutes les fois que la tension artérielle est élevée, la *Sclérolysine* réussit à diminuer l'hypertension puis à la faire disparaître.

Posologie. Mode d'emploi :

Trois formes : *Solution*, en flacon de 100 gr. *Ampoules* de 2 cc., en boîte de 8, *Dragées* de 1 gr. 25, en flacon de 20.

Solution : 2 à 4 cuillerées à café par jour, une *demi-heure* avant chacun des trois repas, dans un peu d'eau.

Ampoules : Une injection sous-cutanée chaque jour pendant 15 jours.

Continuer le traitement *per os* avec la solution en alternant l'un et l'autre

Dragées : 2 à 4 dragées par jour, une *demi-heure* avant les repas. Cette forme facilite l'usage de la *Sclérolysine* et en assure une bonne conservation dans tous les pays chauds.

Aucune contre-indication.

Durée minimum du traitement : Séries de 1 à 3 mois.

Prix : *Solution* ou *ampoules*, 25 francs ; *Dragées*, 23 francs.

Enreg. au L. N. C. M. nos 240-11 à 240-13.

Laboratoires DUCATTE

191, rue Saint-Honoré — PARIS. (Tél. : Opéra 68-80.)

SCLÉROSÉROL

Hypotenseur, Diurétique

Spécifique de l'Artériosclérose.

Composition. — Acide thyminique, Théobromine, Lactose, Extrait de Gui, Silicate de Soude.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes, Rétention chlorurée, Athérome, Scléroses organiques et Préscléroses.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Dose :

3 à 6 par jour. Avaler les comprimés avec une gorgée de liquide et sans les écraser.

Prix : 18 fr. 75.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 219-12.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale
40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

SCLÉROSÉRUM ANA

Médication Sclérosante

Voir **SCLÉRANA**

SCUROCAÏNE

Chlorhydrate du para-aminobenzoyl-diéthylaminoéthanol.

Le moins toxique des succédanés de la cocaïne.

Solutions : en ampoules stérilisées à divers titres, additionnées ou non de Rénaleptine, pour usages anesthésiques.

Anesthésie par infiltration. Anesthésie dentaire.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

SEDABIOS

Présentation. — En boîtes de 3 ampoules de 2 cc. (15 fr. 30). et en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. (30 fr. 60).

Principes actifs. — Bromhydrate des alcaloïdes totaux de l'opium renfermant 50 p. 100 de morphine, bromhydrate de scopolamine et bromure de sodium.

Indications. — Préanesthésique puissant, présente de très grands avantages en chirurgie. Analgésique et sédatif du système nerveux, hypnotique puissant. En médecine, est indiqué dans tous les phénomènes douloureux, insomnies, etc.

Mode d'emploi. — En injections hypodermiques soit intraveineuses ou intramusculaires à la dose de 1/2 ampoule, soit 1 cc., ou d'une ampoule entière de 2 cc.

En chirurgie, il est bon de faire une injection intraveineuse 45 minutes avant l'opération, et dans le cas où celle-ci se prolonge, en faire une autre 45 minutes après le début de l'intervention.

Tenir compte de ce que l'injection intraveineuse agit beaucoup plus vite que l'injection intramusculaire.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-49.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV°).

(Tél. : Turbigo 40-83.)

SÉDACÔNES

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 363-38.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Papavérine, allylisopropylmalonylurée, cupressus sempervirens.

Propriétés pharmacodynamiques. — Spasmodytique, sédatif de la douleur, décongestif.

Indications. — Toutes les douleurs du petit bassin et de la région ano-rectale : douleurs des règles et de la zone génitale chez la femme ; douleurs prostatiques chez l'homme ; spasmes et crises douloureuses de la musculature lisse ; Sédatif hypnotique, assure un sommeil calme et un réveil normal.

Posologie. — Un à deux suppositoires par jour suivant l'intensité de la douleur.

La boîte de 6 suppositoires : 15 fr. 30.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII°).

(Tél. : Lab. 62-30.)

SÉDACRINE

Gouttes

A base de Sédum acre, Polygonum hydropiper et Pœonia avec comme excipient :

Extrait stabilisé de marrons d'Inde et Hamamélis.

Indications. — Toutes affections du système veineux.

Mode d'emploi. — De XX à XXX gouttes avant chacun des deux repas.
Prix : 15 francs.

Laboratoire de la VARILAXINE
SURGÈRES (Charente-Inférieure).
(Tél. : 59.)

SEDANGOR

Dragées à noyau mielleux.

Formule :

Erythrite tétranitrée.....	0,001
Trinitrine à 1 %.....	0,025
Caféine	0,015
Théobromine	0,01
Phosphate sodique.....	0,01
Chl. éthylmorphine.....	0,0032
Excipient spécial.....	Q. S.

P. 1 dragée à noyau mielleux.

Indications. — Hypertension artérielle et ses manifestations. *Angor Pectoris*, Asthme cardiaque, Œdème pulmonaire, Aortites, etc.
L'érythrite tétranitrée renforce et prolonge l'action immédiate, mais fugace de la trinitrine.

Posologie. — Croquer les dragées par une à la fois.

Dose maxima : 10 par jour, 3 en cinq minutes.

Présentation. — Etui de 60 dragées.

Prix au public : 22 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 1025-6.

M. GADREAU, Docteur en pharmacie,
Ex-interne des Hôpitaux de Paris
SAVIGNY-SUR-ORGE (Seine-et-Oise).
(Tél. Juvisy 398.)

SÉDAORTINE

Préventif et curatif de l'angine de poitrine.

Composition. — Dragées rouges à noyau pateux contenant exactement par dragée :

Trinitrine en solution au centième.....	III gouttes.
Codéine	1 cgr.
Phényléthylmalonylurée	15 mgr.
Caféine	3 cgr.
Benzoate de soude	10 cgr.

Excipient sucré, Q. S. pour une dragée.

Propriétés. — La Sédaortine est un médicament *préventif* d'abord et toujours *curatif* de l'Angine de Poitrine, elle calme toutes les douleurs voisines du cœur et de l'aorte.

Indications thérapeutiques. — Angine de poitrine, spasmes artériels, aortites douloureuses, insuffisance ventriculaire gauche (Cf. *Journal de Médecine de Paris*, avril-mai 1935).

Mode d'emploi. — Croquer une de ces dragées :

1° Le matin dès le réveil.

2° Avant tout effort physique.

3° Avant l'horaire des douleurs (s'il en existe un).

4° Pendant une douleur.

Dose moyenne : 5 à 6 dragées par 24 heures. Après amélioration, continuer pendant un an à prendre 1 à 2 dragées par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1444-9.

En boîte de 30 dragées.

Laboratoires BEAUXIS-LAGRAVE

72, quai de Jemmapes — PARIS (X^e) (Tel. : Botzaris 38-78.)

SÉDARTHRYL

Médication synergique du rhumatisme articulaire et des arthrites.

Salicylate de Sodium .	18 gr. 1629	Azotate de Potasse	6 gr.
Salicylate de Potassium	3 gr. 782	Iodure de Sodium	4 gr. 50
Salicylate de Calcium .	4 gr. 4392	Antipyrine	4 gr. 50
Teinture de Colchique	2 gr.	Sirap d'écorces d'o-	
Benzoate de Sodium ..	2 gr.	range amère.....	200 gr.
Benzoate de Lithine..	2 gr.	Glycerine.....	45 gr.
Aspirine	0 gr. 25	Eau distillée q. s. p....	310 cc.

Flacon pour 10 jours de traitement. Prix : 26 fr. 50.

Particularités. — Association hyperactive des 3 salicylates, aux diurétiques et à l'iodure de Sodium.

Emploi. — *Cas chroniques* : 3 fois par jour 2 cuillerées à café, au milieu des repas.

Cas aigus : De 8 à 12 cuillerées à café dans des tisanes bien sucrées.

Dragées : Salicylate 0 gr. 50 par dragée. Iode, soufre, glycérophosphate de soude et Hoang-Nan surajoutés.

Indications. — Rhumatisme articulaire aigu et surtout chronique, douleurs articulaires. Arthrites rhumatismales et tuberculeuses.

Inscrit au Labor. National de Contrôle N° 742-18.

P. TAVERNIER, Docteur en Pharmacie,
32, rue de l'Ouest — PARIS

SÉDASTHMINÉ

Composition :

Kl.....	0,10
Poudre thébrique.....	0,005
Camphre.....	0,03
Benzoate de Soude.....	0,05
Extrait sec Polygala.....	0,01
— Lobélie.....	0,005
— Grindélia.....	0,01
Caféine.....	0,02

Pour une capsule.

Propriétés. — Active la circulation pulmonaire, désencombre les bronches, désasphyxie le malade, fluidifie l'hypersécrétion bronchique, facilite l'expectoration antispasmodique.

Indications. — Asthme et toutes dyspnées asthmatiformes, emphyseme, bronchites chroniques, gazés de guerre, tuberculeux, touseurs et cracheurs chroniques.

Présentation et prix. — Un étui de 40 capsules, enrobées dans du gluten toluisé.

Posologie et mode d'emploi. — Avaler sans croquer 2 capsules matin, midi et soir.

Prix : 16 francs.

Laboratoire Central de la Bastille.

F. BAYLOT.

3, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 38-31.)

SEDATAN

(ex-Sédotan)

Dragées

Composition. — Extrait de Gui stabilisé, Cholélate de Soude, Bromhydrate d'Yohimbine, Phényléthylbarbiturate de Quinine.

Indications. — Hypertension ; Spasmes cardiaques douloureux ; Eréthisme, palpitations, angoisses, points, céphalées des hypertendus.

Posologie. — 4 à 6 dragées par jour, avant les repas ; prendre pendant 10 à 12 jours, interrompre 5 jours et reprendre.

Prix : 20 francs. L. N. C. 1219-3.

Établissements pharmaceutiques

M. et P. LEDENT

MONTREUIL-SUR-MER (Pas-de-Calais).

(Tél. : 1-60.)

SÉDATONYL

Traitement de choix des déséquilibres Vago-sympathiques et Psycho-Endocriniens.

Forme. — Gouttes.

Composition. — X gouttes contiennent :

Phényléthylmalonylurée	0,01
Hyposulf. de Magnésium	0,075
Extrait fl. de <i>Cratægus</i>	0,05
Extrait glyc. de Matière Cérébrale	0,025
Extrait glyc. de Moelle épinière	0,025
Extrait glyc. Orchitique	0,020

Propriétés thérapeutiques. — Par son action à la fois sédatiue, tonique et reconstituante du Système nerveux, ainsi que par le choix judicieux de ses composants, le **Sédatonyl** représente la médication la plus complète pour le traitement de toutes les dystonies neuro-végétatives et des états dépressifs. En effet, le **Sédatonyl** réalise dans une même préparation une action sédatiue par la **Phényléthylmalonylurée**, régulatrice du tonus vago-sympathique et reminéralisatrice par l'**Hyposulfite de Magnésium**, toni-cardiaque par le **Cratægus Oxyacantha**. Il est de plus tonique et reconstituant par la présence d'extraits opothérapiques antiasthéniques (substance cérébrale, moelle épinière, orchitique).

Avantages. — La présentation du **Sédatonyl** sous forme liquide et rigoureusement stabilisée permet une absorption plus rapide de la **Phényléthylmalonylurée**, qui se trouve mieux assimilée et agit à des doses moins élevées. De plus, cette forme « gouttes » permet une posologie plus souple et mieux adaptée à chaque cas particulier.

Indications. — Anxiété, Hyperémotivité, Angoisses, Palpitations, Troubles cardio-vasculaires, Vertiges, Insomnies et cauchemars, Surmenage, Dépressions nerveuses, Troubles de la vie génitale et toutes Asthénies physiques et psychiques.

Posologie moyenne.

Adultes : XV à XXX gouttes trois fois par jour ;

Enfants : V à XV gouttes trois fois par jour suivant l'âge. A augmenter ou à diminuer suivant l'effet produit.

Prix : Le flacon de 24 cc. : 25 francs (toutes pharmacies).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1907-1.

Les Laboratoires « MÉDICIA »

7, Impasse de la Sous-Préfecture — ROANNE (Loire.)

SÉDATUSSINE

Composition :

Poudre de racine d'aconit.....	0,03	ctg.
Extrait de Belladone.....	0,01	—
Dionine.....	0,01	—
Bromhydrate de Codéine.....	0,01	—
Extrait de Drosera	0,02	—

Pour 1 comprimé.

Indications. — Par l'action synergique de ses cinq composants qui agissent sur toute l'étendue de l'appareil respiratoire, c'est le médicament spécifique de la *Toux*, quelle qu'en soit la cause : *Affections du Larynx*, de la *Trachée*, des *Bronches*, des *Bronchites*, crises dyspnéiques asthmatiformes, crises d'asthme ; *Tuberculose pulmonaire* ou *Maladies déterminant des toux réflexes*. C'est le complément indispensable de toute cure hydrominérale à Cauterets, Luchon, Amélie-les-Bains, Le Mont-Dore, La Bourboule, Bagnères-de-Bigorre, Ax-les-Thermes, etc.

Posologie :

Chez l'*Adulte* : de 2 à 5 comprimés par 24 heures.

Chez l'*Enfant* : au-dessus de 10 ans seulement : de 1 à 2 comprimés suivant l'âge. Prix : 16 fr. 80.

Laboratoires de la SÉDATUSSINE :

A. JOURDIN

6, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Passy 92-54.)

SEDHÉPATINE

Cholagogue.

2 formes : Poudre et Granulé.

Composition. — Kaolin, bismuth, sulfate de magnésie, Boldo, Artichaut.

Thérapeutique. — Cholagogue, Sédatif des affections des voies Duodéno-Hépatobiliaires, traitement simultané des « Affections du carrefour », Constipation d'origine hépatique.

Posologie. — Une à quatre cuillerées à café, le matin à jeun ou 1/4 d'heure avant les deux principaux repas.

L. N. C. M. : Poudre n° 1051-1, granulés n° 1051-2.

Prix : 16 francs.

Laboratoire de la SEDHÉPATINE

P. COLLIOT, Pharmacien,

124, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).

Tél. : Ségur 09-30.

SED'HORMONE

*Reconstitution des hormones bromées neuro-sédatives
par le Dibromocholestérol.*

Composition. — Le Dibromocholestérol est un composé bromé organique ; possédant pour l'hypophyse et les centres nerveux une affinité particulière, il exerce, à la dose de quelques centigrammes, une action neuro-sédative supérieure à celle de plusieurs grammes de bromure. Actif à faible dose, il n'expose jamais aux inconvénients et aux dangers des bromures. Il ne crée pas d'accoutumance. Son action, remarquable dans les grands syndromes d'excitation et contre l'insomnie, vient probablement de ce que son affinité pour l'hypophyse lui permet d'assurer dans les meilleures conditions la reconstitution des hormones bromées d'origine hypophysaire, qui sont la forme active du brome dans l'organisme (Zondek et Bier).

Indications. — Hyperexcitabilité nerveuse. Insomnie. Anxiété. Tous les grands syndromes d'excitation. Les manifestations convulsives, et notamment les crises épileptiques et leurs équivalents. L'énurésie.

Le médicament peut encore être utilisé comme anesthésique de base.

Formes. — Dragées dosées à 2 cgr. de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 6 par jour.

Le tube de 30 dragées : 18 fr. 35.

Suppositoires dosés à 10 cgr. de brome sous forme de Dibromocholestérol : 1 à 3 par jour.

La boîte de 8 *suppositoires* : 20 fr. 40.

Sirop dosé à 0 gr. 017 de Dibromocholestérol, soit 5 mgr. de brome par cuillerée à café.

Chez le nourrisson : 1 à 6 cuillerées à café par jour.

Le flacon de 150 cc. : 25 fr. 50.

Ampoules injectables de 8 cc. dosées à 10 cgr. de brome sous forme de dibromocholestérol, 1 à 2 ampoules par injection et 1 à 3 injections par jour.

La boîte de 10 ampoules de 8 cc. : 40 fr. 80.

Laboratoires AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65).

SÉDIBAÏNE

Comprimés glutinisés.

Composition. — Extrait de Strophantus, Phényléthylmalonylurée, Extrait de Jusquiame, Extrait de Cratægus, Extrait de Ballote, Extrait de Valériane, Poudre de Belladone.

Indication. — Sédatif nerveux, tonique cardiaque.

Posologie. — 2 à 4 comprimés par jour, de préférence avant les repas ou le soir au coucher.

Prix : 17 fr. 40 les 33 comprimés (8 à 20 jours de traitement).

Laboratoires de l'ARGYROPHÉDRINE

20, avenue Jean-Jaurès
SURESNES (Seine).

Tél. : Longchamp. 17-37.

SEDLITZ CHANTEAUD

Composition. — Granulé effervescent composé de Sulfate de Magnésie parfaitement déshydraté, rendu légèrement effervescent par l'addition d'une petite quantité d'Acide tartrique et de Bicarbonate de soude.

Indications. — Dépuratif, Laxatif, Purgatif.

Doses et mode d'emploi :

Laxatif : 1 cuillerée à café.

Purgatif : 1 à 2 cuillerées à soupe.

Se prend à jeun dissous dans un peu d'eau.

Prix de vente au public : 11 fr. 75.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

CHAMBOURCY (Seine-et-Oise).

SÉDOBROL « ROCHE »

Extrait de bouillon végétal concentré
achloruré et bromuré.

Tablettes. — 1 tablette = 1 g. NaBr.
(Boîte de 30)

Mode d'emploi et doses. — *Adultes* :
1 à 5 tablettes par jour.

Enfants : 1/2 à 2 tablettes par jour, selon
l'âge.

Dans une tasse d'eau très chaude, on fait
dissoudre une ou deux tablettes de *Sédobrol*
« Roche » : on prépare ainsi instantané-
ment un bouillon particulièrement savou-
reux que l'on peut prendre à n'importe
quel moment de la journée.

Propriétés thérapeutiques. — Médica-
ment sédatif, hypnotique et calmant
donnant des résultats certains et permet-
tant d'imposer un *traitement bromuré*
intensif *dissimulé*, tout en rendant agréa-
ble le régime déchloruré.

Indications thérapeutiques. — Insom-
nies, névralgies, excitabilité, irritabilité,
gastralgies, dyspepsies, palpitations, car-
diopathies, migraines, spasmes, convul-
sions, chorée, névroses, épilepsie, etc.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des
Médicaments sous le n° 504-31.

PRODUITS

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SÉDO-CARÉNA

Composition. — Aminophylline, phényl-éthyl-malonylurée, chlorhydrate de papavérine.

Propriétés. — *L'aminophylline* dilate les coronaires et assure l'irrigation normale du myocarde ;

La phényl-éthyl-malonylurée, à petite dose, apaise l'irritabilité neuro-végétative ;

La papavérine calme la fibre myocardique et les spasmes vasculaires.

Indications thérapeutiques :

Troubles du rythme : Palpitations, extra-systoles.

Cœurs irritables : Instabilité cardiaque, anxiété, insomnies, troubles cardiaques réflexes de l'aérogastrie et de l'aerocolie.

Algies précordiales : Oppressions douloureuses, barres thoraciques.

Spasmes vasculaires : Douleurs des aortites thoraciques et abdominales, douleurs des artérites, claudication intermittente.

Petits signes du brightisme et de l'hypertension artérielle : Eblouissements, céphalées, vertiges.

Tolérance indéfinie, aucune contre-indication.

Posologie. — 2 à 6 comprimés par jour.

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.)

SÉDOFOLLINE

Composition et propriétés. — 1° *Folliculine* ovarienne :

Dosage garanti, activité constante. — 2° *Extrait ovarien spécial :* Action naturellement synergique de toutes les hormones ovariennes à l'exclusion de l'hormone lutéinique. — 3° *Thyroidine* (faible dose) : Synergie thyro-ovarienne. — 4° *Sédobenzyl* (non toxique) : Sédatif et antispasmodique.

Forme. — Dragées friables à enrobage soluble, dosées à raison de 12 unités physiologiques.

Indications. — Tous les troubles de la fonction ovarienne.

Dosage. — Chaque dragée est dosée à raison de 12 unités physiologiques de Folliculine.

Mode d'emploi. — 2 à 8 dragées par jour, loin des repas. Dose moyenne : 4 dragées par jour.

Traitement. — 8 jours de traitement, 8 jours de repos jusqu'à résultat satisfaisant. Continuer chaque mois pendant les 8 jours précédant l'époque présumée des règles.

Prix : 22 fr. 50 pour 10 jours. — L. C. M. n° 563.

Laboratoires ODILIA

E. LACOMBE, pharmacien

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

SÉDOGASTRINE

Sédatif gastrique.

Formes. — Granulé, comprimés (avec bonbonnière de poche).

Composition. — 1° *Substances neutralisantes :*

Hydroxyde de magnésium, Carbonate de calcium léger, précipité à froid.

2° *Substances modératrices de la sécrétion :*

Phosphate de sodium, Phosphate de calcium.

3° *Substance calmante et antispasmodique :*

Poudre de Ciguë à dose inoffensive, mais suffisamment active.

Propriétés thérapeutiques :

Sédation des phénomènes douloureux gastriques.

Réparation de la muqueuse de l'estomac.

Pas de constipation.

Pas d'accoutumance.

Indications. — Hypersécrétion.

Hyperacidité.

Dyspepsies douloureuses.

Spasmes.

Ulcères.

Posologie. — Après les repas et au moment des douleurs, prendre :

Granulé : 1 à 2 cuillerées à café.

Comprimés : quatre à six jusqu'à sédation.

Prix : 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

SÉDOGASTROL

Forme.

Poudre homogène, absorbante, aromatisée à la badiane.

Composition.

HOANG-NAN (*Strychnos Gauthierana*) pulv. Belladone pulv., Carbonates alcalins (Ca, Mg, Na), Magnésie hydratée, Kaolin porphyrisé, Essence de badiane.

Propriétés. Avantages.

SÉDATIF et **ANALGÉSIQUE**, non stupéfiant, ni hypnotique. **TONIQUE MUSCULAIRE** par la présence de **HOANG-NAN** (*Strychnos GAUTHIERANA*), 6 fois moins toxique que la noix vomique.

CICATRISANT, NEUTRALISANT. Aucune action laxative ni constipante. Aucune contre-indication. Emploi prolongé sans aucun inconvénient.

Indications thérapeutiques.

Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Gastrites, Hypersécrétion, Gastralgies, Aérogastrie, Ulcères, Vomissements de la grossesse.

Posologie et mode d'emploi.

Après les repas et au moment des douleurs, prendre : une cuillerée à café, dans un 1/2 verre d'eau. — Doses pouvant être renouvelées ou renforcées à n'importe quel moment et toutes les 2 ou 4 heures.

Lab. Nat. Contrôle 518-6. — Prix : 15 fr. 75.

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sévres — PARIS (VII^e).

SÉDO-GYNŒSTRYL

Solution contenant :

Di-Hydro-Folliculine.....	1/10 ^e de mgr.
Bromure de Sodium.....	0 gr. 50
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 02

Pour 1 cc.

Propriétés thérapeutiques. — La Di-Hydro-Folliculine agit sur le dysfonctionnement ovarien ; les produits associés remédient aux troubles nerveux concomitants.

Indications. — Nervosisme, Anxiété, Insomnies des aménorrhéiques, Phénomènes douloureux des dysménorrhéiques.

Présentation. — Flacon de 10 cc.

Posologie. — Dose quotidienne : L gouttes (1 cc.) en plusieurs prises, à n'importe quel moment de la journée.

Maintenir chaque mois pendant 10 à 12 jours le traitement, que l'on commencera 7 jours environ après la fin des règles précédentes.

Prix au public : 22 fr. 25 le flacon de 10 cc.

Voir aussi **Gynœstryl**, **Benzo-Gynœstril** et **Benzo-Gynœstryl 5**.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

SÉDO-HYPOTENSEUR DAUSSE

Composition. — Comprimés de composés organiques nouveaux: le phényl-éthyl-barbiturate de yohimbine et le phényl-éthyl-barbiturate de quinine.

Propriétés thérapeutiques. — Baisse de pression par vaso-dilatation ; action cardiotonique, action sédative. Cette préparation réalise pour la première fois un effet hypotenseur artériel concomitant d'un renforcement cardiaque et d'une sédation des troubles nerveux qui compliquent l'hypertension.

Indications. — Tous les cas d'hypertension artérielle (artériosclérose, spasmes vasculaires, palpitations, éréthisme cardiaque, extra-systoles, angoisse, angine de poitrine).

Mode d'emploi. — 2 à 3 comprimés par jour, 1 avant chaque repas, par périodes de 8 à 12 jours, avec intervalle d'une semaine entre 2 cures.

Pas de contre-indication autre que l'hypotension artérielle.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV°).

(Tél. : Turbigo 63-40.)

SÉDOL

Composition :

Chlorhydrate de morphine.....	0,006
Bromhydrate de Scopolamine.....	0,0002
Sérum physiologique spartéiné Q. S.	
p. une ampoule de 1 cc.	

Mode d'emploi et doses. — 1° **Ampoules :** 1 à 3 injections hypodermiques par 24 heures ;

2° **Comprimés (Pérosédol) :** 1 à 3 par 24 heures.

3° **Suppositoires :** voir « Supposédol ».

Propriétés thérapeutiques. — Beaucoup plus actif que la morphine employée seule, suppression des inconvénients de cette dernière.

Indications. — Tous phénomènes très douloureux : Cancers, Crises tabétiques, Maladie de Parkinson, Anesthésie chirurgicale, Accouchements, Suites opératoires, cachexies tuberculeuses.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 6 ampoules.

Tube de 12 comprimés.

(Pérosédol)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII°).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SÉDONEUROL DEHAUSSY

« Calme sans déprimer. »

Composition. — Phényl-éthyl-malonylurée, Tartrate borico-potassique, Atropine et correctifs variant suivant les comprimés :

Comprimés jaunes : Caféine 0,015

Comprimés roses : Strychnine.... 0,0002

Médication synergique permettant un effet thérapeutique équivalent, avec une dose moindre de phényl-éthyl-malonylurée.

Évite l'action dépressive de ce produit grâce aux correctifs. Pour éviter l'accoutumance à ces derniers, administrer 8 jours les comprimés jaunes, 8 jours les comprimés roses.

Indications :

Déséquilibres vago-sympathiques : Anxiété, agitation, hyperémotivité, désordres psychiques frustes, Instabilité des basedowiens et des hypertendus, etc.

Algies paroxystiques : migraines, angine de poitrine.

États convulsifs. Épilepsie et ses équivalences : Maladie de Parkinson et Parkinsonisme, Absences et vertiges, Asthme rebelle, etc.

Chez l'enfant et le nourrisson : manifestations spasmodiques du croup, des laryngites striduleuses et aiguës, coqueluche, tétanie, chorées, tics, vomissements spasmodiques du nourrisson, etc.

Posologie :

Déséquilibres vago-sympathiques : 2 comprimés fractionnés dans la journée.

États convulsifs. Épilepsie : Commencer par 4 comprimés et augmenter progressivement la dose jusqu'à suppression des crises.

Enfants : 1/2 comprimé par année d'âge.

Nourrissons (tolérance parfaite) : 1/2 comprimé jusqu'à 6 mois, 1 comprimé de 6 mois à un an, en deux prises.

Un comprimé = 2 cgr. et demi de phényl-éthyl-malonylurée.

Petit modèle : 13 fr. 50 — Moyen modèle : 27 fr. 80

Grand modèle : 51 fr. 20

Laboratoire DEHAUSSY
50, rue Nationale — LILLE.

SÉDOPEPTINE

Pansement gastrique sédatif.

Composition. — Bismuth, kaolin colloïdal, silice colloïdale, muqueuse gastrique, bromure de sodium, gomme sterculia, hydroxyde d'aluminium colloïdal.

Indications. — Hyperacidité, Dyspepsies douloureuses, Spasmes pyloriques, Pyrosis, Ulcus.

Posologie et mode d'emploi. — Croquer 1 ou 2 cuillerées à café de granulé au moment des douleurs. Renouveler la prise, si besoin est, dans les 24 heures.

Prix : La boîte, 15 fr. 90.

Laboratoires de la **SÉDOPEPTINE**

Echantillons :

Laboratoires du **D^r Debat**

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

SEDOPROSTYL

Traitement de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications.

Composition. — Association d'Extrait d'Hammélis et d'Extrait de Belladone, de Chlorure de Magnésium.

Agit sur les trois causes de l'affection : l'hypertrophie de la prostate, l'élément congestif de la glande, l'état spasmodique du sphincter lisse.

Indications. — Traitement médical rationnel de l'hypertrophie de la prostate et de ses complications. Troubles urinaires aigus ou chroniques.

Posologie. — De 3 à 5 dragées immédiatement avant le petit déjeuner et de 1 à 3 dragées, si nécessaire, avant le repas du soir.

Prix : 21 fr. 75 le flacon de 80 dragées.

Laboratoires **GRIMAULT**

VIAL et C^{ie}, successeurs

Spécialités Pharmaceutiques Phargène
8, rue Vivienne — PARIS (II^e). (Tél. : Gut. 27-03.)

SÉDORHINOL

Médication décongestive et antiseptique des voies respiratoires supérieures.

Pommade nasale, Inhalation, Bains de gorge.

Indications. — Coryzas, rhinites, sinusites, adénoïdites, angines et amygdalites, laryngites, rhino-bronchites, otites.

Trois formes. — A) *Sedorhinol mixte*, comprend dans une même boîte :

1° Un tube de pommade nasale (canule) baume semi-liquide : adrénaline huileuse, stovaine benzoate de soude, essences aromatiques.

2° Comprimés inhalants : association d'essences de plusieurs espèces aromatiques (thym, romarin, lavande, menthe), bicarbonate et perborate de soude.

Ces comprimés solubles entièrement et progressivement en 4/5 minutes dans de l'eau à 75° permettent une inhalation et un bain de gorge, à la demande.

B) *Pommade de Sedorhinol* : seul baume nasal pour antisepsie et décongestion des fosses nasales, pré et post-opératoire.

C) *Comprimés de Sedorhinol* : Séparément employés pour inhalations, bains de gorge et de bouche (toutes affections de la muqueuse bucco-pharyngée).

Prix : Comprimés : 17 fr. 20 — Pommade : 10 fr. 40 — Mixte : 20 fr. 80
Durée moyenne du traitement 10 jours.

Laboratoires A. REGAGNON

276, rue Lacourbe — PARIS (XV°). (Tél. : Vaugirard 26-30.)

SÉDORMID « ROCHE »

Le grand médicament des petits Insomniaques et des petits anxieux.

Composition. — Allylisopropylacétylcarbamide.

Propriétés. — Sédatif hypnogène doux, de toxicité atténuée, non barbiturique.

Indications. — Toutes les insomnies légères, de quelque nature qu'elles soient (Surmenage, Préoccupation, Convalescence, etc.), Angoisse, Appréhension, Anxiété, Symptômes hypernerveux.

Posologie et modes d'emploi. — *Dose sédatif* : 1 comp. 2, 3 ou 4 fois dans la journée. — *Dose hypnogène* : 1 ou 2 comprimés le soir au moment de se coucher.

Comprimés dosés à 0 g. 25 (boîte de 20).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-32.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV°). — Tél. : Arch. 91-10.

SÉDOSALYL

Médication spécifique du Rhumatisme.

A base de salicylate de soude chimiquement pur en milieu alcalin.

Association avec le Phénylcinchoninate de soude et le Campho-Sulfonate de pipérazine destiné à combattre le collapsus cardiaque.

Deux formes :

- 1° *Granulé* : Les produits actifs sont associés au bicarbonate de soude qui évite l'intolérance gastrique. La saveur nauséuse du médicament est masquée par un excipient aromatique de goût agréable.
- 2° *Dragées* : Mêmes principes actifs sous une forme plus pratique. Un enrobage spécialement étudié permet aux dragées d'éclater seulement à leur arrivée dans l'intestin.

Composition. — Salicylate de soude chimiquement pur, Phénylcinchoninate de Soude, Camphosulfonate de Pipérazine, Bicarbonate de soude.

Chaque cuillerée à café et chaque dragée contiennent 0 gr. 50 de salicylate de soude pur.

Indications. — Rhumatisme aigu et chronique, Maladie de Bouillaud, Arthralgies, Diathèse urique, Névralgies, Douleurs articulaires, Infections hépatiques, Angiocholites.

Doses et Mode d'emploi :

- 1° Rhumatisme articulaire aigu : de 8 à 16 cuillerées à café, ou 2 dragées 4 à 8 fois par 24 heures.
- 2° Cure d'entretien (10 à 20 jours par mois) : 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 3° Rhumatisme chronique : de 4 à 8 cuillerées à café ou 2 dragées de 2 à 4 fois par 24 heures.
- 4° Affections urinaires et hépatobiliaires : 2 à 4 cuillerées à café ou 1 dragée de 2 à 4 fois par 24 heures.

Nota. — Une ou deux cuillerées à café ou dragées de *Sédosalyl* devront être prises dans 1/2 verre d'eau de Vichy ou mieux de Tisane (régliste, frêne ou reine des prés).

Prix : *Granulé* : 18 fr. 75. *Dragées* : 20 fr. 80.

Laboratoire du SÉDOSALYL

C. ROUX, Docteur en Pharmacie,

0, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine).

(Tél. : Alésia 12-55.

SÉDOSINE

Solution.

Association végétale hyperactive.

Composition. — Extraits de : Passiflore, Jusquiame, Cratægus.

L'action antispasmodique de la Jusquiame utilisée à doses minimes est considérablement renforcée par la présence de la Passiflore et du Cratægus (H. Leclerc).

Indications. — Etats spasmodiques, Excitation nerveuse, Insomnie, Neurasthénie, Psychasthénie, Mélancolie.

Posologie :

Contre l'insomnie : 2 à 3 cuillerées à café prises en une seule fois avant de se coucher.

Sédatif nerveux : Dose moyenne : 1 à 3 cuillerées à café ou davantage dans le courant de la journée, suivant tolérance du malade.

La *Sédosine* se prend en nature, ou mieux dans un peu de tisane.

Prix : 20 fr. 40.

Laboratoires **LICARDY**

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-SUR-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

SÉDOTONINE GROS

Composition. — Extrait de Strophantus, phényléthylmalonylurée, extrait d'anémone.

Indications. — Médication tonicardiaque et antispasmodique. Traitement de l'hypertension artérielle. Sédatif général.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par jour, à prendre à intervalles espacés : 1 au réveil et 1 avant les deux principaux repas. A croquer ou à avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 60

(durée moyenne de l'unité : 15 jours).

Laboratoires **GROS**

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.
(Tél. : 60-55.)

SÉDOTYOL

Pommade antiprurigineuse et anesthésique.

Pommade non toxique, absolument inoffensive, ne contenant aucun produit du genre de la cocaïne, ni des tableaux A et B.

Indications. — Toutes les lésions épidermiques prurigineuses ou douloureuses : prurits, urticaire, piquûres d'insectes, brûlures, éruptions, zona, etc.

Action. — Le SÉDOTYOL calme instantanément le prurit et la douleur.

Mode d'emploi. — En larges applications *loco dolenti*, renouvelées selon les besoins.

Présentation :

Le tube : 14 fr. 30.

Le 1/2 tube : 8 fr. 40.

Laboratoires du Docteur DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

Tél. : Lab. 72-73 (4 lignes groupées).

SEIGNET'FRUITS

Composition. — Limonade aux sels de fruits, Extraits végétaux et Eau diurétique. Goût réputé. Purgé sans nausées ni coliques.

Propriétés thérapeutiques. — Purgatif et laxatif.

Indications. — Désinfection de l'estomac, du foie, de l'intestin. Purgation douce (opérations, accouchements).

Mode d'emploi :

Adultes : Purgatif. Un flacon le matin à jeun.

Enfants : 1/4 à 1/2 flacon, suivant l'âge.

Laxatif : Un verre à bordeaux au réveil ou au coucher un jour sur deux.

Prix : 8 fr. 05.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

SEL DE HUNT

Alcalin type

Régulateur normal de l'Acidité gastrique et des Fonctions digestives.

Indications.— Dyspepsies, Gastralgies, Hyperchlorhydrie, Hyperacidité, Fermentations acides de l'Hyper et de l'Hypo-Chlorhydrie.

Forme. — Granulé friable.

Posologie. — Une à une cuillerée et demie à café dans 1/2 ou 1/4 de verre d'eau. Pour les légers malaises ne nécessitant que de petites doses, on peut à la rigueur prendre le *Sel de Hunt* à sec.

Prix au public : 11 fr. 50 le flacon.

Enregistré au L. N. C. M., sous le n° 64-1.

Laboratoire ALPHONSE BRUNOT

16, rue de Boulainvilliers — PARIS.

(Tél. : Auteuil 20-21.)

SEL D'EWALD

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments.

Médication alcaline, sédative des douleurs d'estomac.

Le Sel d'Ewald se présente sous la forme d'un granulé assimilable, de saveur agréable, constitué par un mélange de : Citrate de soude, Kaolin, Carbonate de Bismuth, Carbonates de Chaux et Magnésie.

Le Sel d'Ewald trouve son application dans le traitement des : Gastralgies, Dyspepsies douloureuses, Hyperchlorhydrie, Fermentations acides, Ulcères de l'Estomac, Spasmes, Pyrosis, Vomissements de la grossesse.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café de granulé délayé dans 1/4 de verre d'eau avant les repas ou au moment des crises.

Le Sel d'Ewald ne contenant aucun toxique est absolument inoffensif et il ne constipe pas.

BRACQUEMOND et Cie,

Docteurs en Pharmacie,

105, rue de Normandie — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Défense 05-54.)

SEL DIGESTIF BÉ ME CÉ

Poudre ultra-tamisée, à l'état moléculaire.

Forme. — *Poudre. Tablettes.*

Composition :

Bic. de Soude sursaturé...	2 gr. 50
Magnésie hydratée.....	0 gr. 50
Carb. de Chaux léger.....	1 gr. 50
Lactose pulv.....	0 gr. 50
Par cuillerée à café ou 2 tablettes.	

Indications. — Hyperacidose gastrique aiguë.
Tous les états dyspeptiques. Vomissements incoercibles.

Doses. — *Poudre* : une cuillerée à café après chaque repas dans 1/4 de verre d'eau. *Tablettes* : sucer 2 tablettes après chaque repas et en cours de journée si besoin.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).
(Tél. : Ségur 69-13.)

SÉLÉNALGINE

Composition. — Écorce stabilisée de Viburnum prunifolium, Acide acétylsalicylique.

Indications. — *Règles douloureuses*, Dysménorrhées.

Posologie. — Dysménorrhées habituelles : 2 dragées par jour pendant les deux jours qui précèdent les règles.

A l'apparition des premières douleurs : 2 dragées suivies de deux autres à une demi-heure d'intervalle, si l'effet ne s'est pas fait sentir.

Prix : 18 francs l'étui de 24 dragées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 978-2.

Laboratoire QUIN

CONTRES (Loir-et-Cher).

SÉLÉNIOL

Description. — Complexe colloïdal électrique à base de sélénium en ampoules de 3 cmc. (4 par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sélénol est une solution limpide de couleur brune ; sous cette forme il n'est pas toxique et possède une affinité notable pour les cellules néoplasiques dont il provoque la liquéfaction, il améliore les troubles fonctionnels et relève l'état général.

Indications. — 1 à 3 ampoules par semaine en injections intramusculaires profondes ou intraveineuses, dans le traitement des affections néoplasiques.

Prix : 41 fr. 60 pour 8 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

SELOR

**Complexe auro-médicamenteux assimilable
par voie buccale (cachets).**

SELOR N° 1.

Composition. — Chlorure d'or, codéine, extrait d'aconit, poudre de belladone, terpine, composé solide contenant du bromoforme, acide acétyl-amino-oxyphénylarsinique, ergostérine irradiée, extrait de quinquina, pepsine amylacée, sels de chaux.

Propriétés et Indications. — Actif, facilement maniable, ne causant pas d'accidents.
Par sa quadruple action:

1° Spécifique ; 2° Reconstituant ; 3° Calmant de la toux ; 4° Eupeptique ;

est indispensable au traitement de toutes les maladies pulmonaires, aiguës ou chroniques, tuberculeuses ou non.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 37 francs la boîte de 30 cachets.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-12.

SELOR N° 2.

Composition. — Est celle du SELOR N° 1, mais sans calmant de la toux.

Indications. — Outre le traitement des affections pulmonaires ne nécessitant pas l'emploi de calmant de la toux, les SELOR N° 2 sont employés efficacement dans le traitement des RHUMATISMES CHRONIQUES.

Mode d'emploi. — 3 cachets par jour ou suivant indication médicale.

Prix : 34 francs la boîte de 30 cachets.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 938-13.

Laboratoires des Produits L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV°).

(Tél. : Vaugirard 21-10.)

SELS DE BAINS R. P.

de La Roche-Posay.

Aux sels polysilicatés naturels de La Roche-Posay.

Indications. — Indispensable à toutes les peaux malades ou fragiles. Permet le lavage des lésions, en particulier, avant et après pansement. Enveloppements sédatifs.

Employés avec le « Savon dermique R. P. » écartent tout danger d'infection secondaire.

Mode d'emploi. — Un paquet pour un grand bain. 2 à 6 cachets dans l'eau bouillie à 40° pour bains locaux.

Pour les peaux simplement fragiles ou pour les bébés : 1 sachet pour une cuvette.

Toujours poudrer ensuite avec Poudre Dermique R. P.

Présentation et Prix :

Sels de bains R. P. Le paquet 1 bain 5 fr. 30 ; 2 bains 9 fr.

— — — Boîte de 30 sachets..... 12 fr.

Savon Dermique R. P. Le pain 8 fr. 50

Poudre dermique R. P. La boîte..... 12 fr.

Laboratoires des **PRODUITS DERMQUES R. P.**
LA ROCHE-POSAY (Vienne).

SELS-MAGS

Composition. — Sulfate sec de magnésie, sulfate sec de soude, citrate monosodique, sel halogène du magnésium, phosphate de soude, etc.

Propriétés. — Favorise la sécrétion et l'excrétion de la bile, réalise le drainage des voies biliaires.

Indications. — Toutes congestions du foie et de la vésicule biliaire, jaunisse, cholécystite, angiocholécystite, dyspepsies, aérophagies, constipation, migraines, hypocondrie, vertiges, prurits, urticaire, langue sale, eczéma, etc.

Posologie et mode d'emploi. — 2 comprimés le matin dans un verre d'eau chaude ou dans 1/2 verre d'eau avant le repas de midi. La dose peut être augmentée ou diminuée suivant les prédispositions individuelles. Aucune contre-indication.

Présentation et prix. — Une boîte comprimés effervescent : 19 fr. 65.

Faire suivre d'une cure de BOLCITOL.

G. LESOURD, Pharmacien

88, rue Duhesme — PARIS (XVIII^e).

SELUNIC

Sel de fruits. Sel de santé.

Composition. — Sels de soude, formant, à l'addition d'eau, un citro-tartrate de soude. Une cuillerée à café dans un verre d'eau représente environ 5 grammes de citro-tartrate de soude.

Forme. — Poudre blanche granulée très fine, sans aucun goût ni parfum et ne contenant aucun sel minéral.

Propriétés. — Régulateur simple et efficace de la santé, son effet repose sur les propriétés bienfaisantes des fruits frais.

Indications et mode d'emploi. — **Maladies du foie et des intestins.** — Une cuillerée à café dans un verre d'eau à jeun.

N. B. — Plus l'eau sera chaude, plus l'action sera rapide.

Estomac, Impuretés du sang, maux de tête. — Une cuillerée à café dans un verre d'eau une demi-heure après les repas.

État bilieux, indigestion, excès de table. — Une cuillerée à dessert dans un verre d'eau en se couchant, renouvelée le matin au réveil.

Désaltérant et rafraîchissant. — Contre la soif, état févreux, etc... Presser une tranche de citron dans un verre d'eau et y faire couler une cuillerée à café. Boire par gorgées.

Des doses proportionnées en feront pour les enfants un moyen agréable de remédier à leurs petits maux.

Obésité. — Une cuillerée à café dans de l'eau tiède, matin et soir, combat l'embonpoint et aide à conserver au corps sa souplesse naturelle.

Comme breuvage. — Dans l'eau : en fait une boisson hygiénique et désaltérante.

Dans le vin et le cidre : une pincée combat l'excès d'acidité et produit une boisson de table pétillante.

Présentation. — En flacons de 240 grammes : 20 francs.
Le modèle « Week-End » de 40 grammes : 7 francs.

SELUNIC, grâce à son Citrate de Soude, liquéfie le Sang.

Remise spéciale aux Médecins.

Laboratoire GLYCO-M.

Georges MIQUEL, pharmacien de 1^{re} classe.

1, avenue Lowendal — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 16-85.)

SEL VIAL**(Achloruré)**

Débilité rénale.

Affections cardiaques.

Affections du Tube digestif.

Laboratoires VIAL

4, place de la Croix-Rousse — LYON.

Tél. : Burdeau 28-07.

SÉNÉCINE

Élixir emménagogue, régulateur de la fonction menstruelle, le plus efficace sédatif.

Composition. — Extrait fluide de séneçon, teintures de racines et semences d'angélique, calamus, myrrhe, cannelle, arnica, alcoolat de garus.

Indications thérapeutiques. — Aménorrhées, dysménorrhées, ménorragies.

S'emploie avec succès pour calmer les douleurs de la menstruation, ramener et régulariser les époques.

Cet élixir d'un goût agréable est facilement supporté par les estomacs les plus délicats.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un peu d'eau.

En cas de retard habituel, on prend progressivement de 2 à 4 cuillerées à café par jour de *Sénécine* pendant les 8 jours qui précèdent l'époque présumée des règles. On continue le traitement pendant toute la durée des crises douloureuses.

Prix : Le flacon, 21 fr. 30.

DÉPOT : Pharmacie FOUCAULT

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.
(Tél. : Molitor 01-14.)

SENEÇONINE

Médication régulatrice de la circulation pelvienne.

Décongestif sédatif pelvien.

Équilibrant du système nerveux végétatif pelvien.

Composition.

Extrait fluide de Seneçon ;	Extrait fluide de Gelsémium ;
Extrait fluide de Viburnum ;	Extrait fluide de Cimicifuga ;
Extrait fluide de Piscidia ;	Alcoolature d'Anémone.

Présentation. — Elixir de goût agréable, atoxique. Sans analgésique chimiques. Sans opothérapiques.

Action thérapeutique et indications.

Chez la femme :

Calme les douleurs, régularise le flux menstruel, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux.

Troubles de la circulation utéro-ovarienne, *Aménorrhées, Dysménorrhées, Règles déviées, Congestion, Néuralgies pelviennes, Migraines cataméniales, Douleurs du post-partum, Déséquilibre vaso-moteur de la Ménopause, Troubles psychiques.*

Doses et mode d'emploi.

Médication régulatrice : 1 cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. Commencer le traitement 10 jours avant la date présumée des règles.

Médication sédatrice : Prendre, dès les premiers symptômes précurseurs de la période menstruelle, 3 à 6 cuillerées à café par jour, les premières cuillerées à 3 heures consécutives.

Chez l'homme :

Calme les douleurs, relâche les fibres lisses du sphincter vésical, décongestionne le petit bassin, équilibre le système nerveux. *Prostatisme vasculaire, Inflammation, Hypertrophie et sclérose de la prostate.* Toutes douleurs, tenesme, contractures, spasmes divers, irradiations périnéales, troubles circulatoires, Hémorroïdes.

Doses :

Une cuillerée à café avant chaque repas dans un peu d'eau. En cas de crise aiguë, 1 cuillerée à café toutes les heures, maximum 6 par jour.

Prix. — Flacon, dose pour un traitement : 18 fr. 35.

(Taxe d'armement comprise).

Laboratoire A. BESNIER

Ex-interne des Hôpitaux de Paris

1, rue Raynouard — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 20-34.)

SEPTAZINE

(48 R. P.)

Benzyl-Amino-Benzène-Sulfamide.

Chimiothérapie antistreptococcique et anti-infectieuse, non colorante, bien tolérée par les voies digestives, non toxique.

Présentation. — Comprimés dosés à 0 g. 50 divisibles en deux (tubes de 20.) Prix: 13 fr. 75.

Indications. — Erysipèle, Angines, Otites, Prévention et traitement de la fièvre puerpérale, des complications de la Scarlatine, Grippe et complications, Colibacilloses.

Posologie :

Adultes : 1 comprimé dans un demi-verre d'eau 4 à 8 fois par jour.

Nourrissons : 2 comprimés par jour.

Grands enfants : 2 à 6 comprimés par jour.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SEPTICARBONE

Charbon antiseptique intestinal.

Composition. — Oxyquinoléinate de bismuth, charbon suractivé, gomme Sterculia.

Indications. — Diarrhées, Entérites, Colites, Fermentations, Intoxications alimentaires, Infections gastro-intestinales, biliaires et hépatiques, Aérophagie, Flatulence.

Posologie et mode d'emploi :

Affections aiguës : 4 à 6 cuillerées à café par jour, ou 8 à 12 comprimés.

Affections chroniques : 1 à 2 cuillerées à café par jour, ou 2 à 4 comprimés.

Croquer à sec ou délayer le granulé dans un peu d'eau avant ou pendant les repas. Avaler le comprimé sans le laisser fondre.

Prix :

Granulé, la boîte..... 19 fr. 10

Comprimés, l'étui..... 19 fr. 10

Laboratoires du SEPTICARBONE

Échantillons : Laboratoires du D^r Debat,

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 72-73, 4 lignes groupées.)

SEPTICEMA

Défense de l'organisme contre les affections aiguës médicales et chirurgicales.

Composition. — Agissant comme stimulant du foie et provoquant le drainage des toxines.

Acide nucléinique d'origine végétale solubilisé par catalyse. Agent d'hyperleucocytose.

Chlorure de magnésium stimulant biologique de 1^{er} ordre favorisant la Phagocytose.

Présentation. — Boîte de 7 ampoules injectables avec 250 cc. de sérum phytologique : 35 fr. 70.

Laboratoire COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

SEPTICÉMINE CORTIAL

Composition. — Di-formine, iodobenzo-méthylée, corps cristallisé, dialysable, injectable, atoxique, *indolore*. Aucune réaction locale ou générale.

Propriétés. — Antisepsie intégrale, interne et externe, diffusion extrême jusque dans le liquide céphalo-rachidien (Maloëns). Microbicide et antitoxinique : éliminateur hépatique et rénal. Agit non seulement dans les infections définies, mais dans les formes associées.

Indications. — **Infections aiguës médicales :** Grippe, encéphalite, broncho-pneumonie, fièvre typhoïde et paratyphoïde, Entérites aiguës, Fièvres éruptives, Paludisme, Affections rhinopharyngées.

Infections chirurgicales. — Septicémies, pyohémies, infections puerpérales. Pyélonéphrites, Appendicite, Erysipèle, Anthrax, Ostéomyélites, Péritonite tuberculeuse.

Forme. — Ampoules de 4 cc. et 10 cc.

Injectations intraveineuses ou intramusculaires *indolores*.

Doses. — Septicémies à marche rapide, infections graves : 10, 20 cc. et plus dans les 24 h. Infections à marche lente : 4 à 10 cc. dans les 24 h.

Chez l'enfant en lavement à garder, 4 cc. dans 50 gr. d'eau bouillie sucrée.

S'emploie aussi en applications locales et pulvérisations, pure ou étendue de sérum. Urologie, Gynécologie, Suppurations, Tumeurs ouvertes. Ulcérations de l'amygdale, Rhinites.

Stomatologie : Pulvérisations alvéolaires et gingivales. Injections intragingivales, circonscrivant le foyer infectieux.

Prix :

La boîte de 8 ampoules de 4 cc. : 27 fr. 50 ;
de 10 cc. : 47 francs.

La boîte de 4 ampoules de 10 cc. : 24 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

SEPTICOLINE

Composition. — Se prescrit sous deux formes :

Chaque cuillerée à café de granulé fondant contient :

1^o *Forme naphtolée* :

Argent colloïdal	0,01	Formine	0,15
Peroxyde de magnésie.....	0,10	Charbon animal pur.....	0,25
Benzonaphtol.....	0,15	Charbon activé	0,25

2^o *Forme simple* : même formule sans benzonaphtol.

Indications. — *Antiseptie gastro-intestinale, biliaire et rénale* : Appendicite chronique, Aérophagie, Colibacillose, Colites et Typhlocolites, Entérites, Grippe à forme intestinale, Etats intestinaux infectieux, Fermentations intestinales, Cholécystites, Intoxications, Urticaire, Cystites, Prostatites.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 cuillerées à café après chaque repas.
Enfants : 1/2 dose.

Présentation. — Deux formes. *Prescrire* : simple ou naphtolée.

Granulé fondant anisé en boîte métallique (8 à 10 jours de traitement par boîte).

Prix : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. n° 1903.

Laboratoires ROUGEYROLLES

Place de la République et rue Robertie. — GRAMAT (Lot)

(Tél. : 77.)

SEPTIDERME

Le traitement **Septiderme** est un traitement ambulatoire des **Ulcères variqueux**, d'application facile et indolore, basé sur la théorie actuelle qui considère ces lésions comme microbiennes, surtout streptococciques, à développement favorisé par le déficit circulatoire.

Composition :

Septiderme liquide, solution d'Iodobismuthate d'oxy-quinoléine, antiseptique, antimycosique.

Pâte Septiderme A vitaminée, poreuse, sans vaseline, à spécificité antistreptococcique et à pouvoir cicatrisant intense.

Pâte Septiderme B également vitaminée, poreuse et antistreptococcique, mais décongestionnante et désensibilisante.

Bande Septiderme d'élasticité très étudiée.

Demander la littérature au

Laboratoire TIXIER

SAINT-QUENTIN (Aisne).

SEPTODRAINOL

Puissant dissolvant de l'acide urique. Antiseptique urinaire et biliaire.

Forme. — Granulés effervescents.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Congestions du foie, Lithiase rénale et biliaire, etc.

Composition :

Tartrate de pipérazine	0 gr. 33
Salicylate de Lithine.....	0 gr. 50
Formiate de Lithine.....	0 gr. 50
Benzoate de Lithine	1 gr.
Urotropine	5 gr.

pour 100 gr. de Saccharine.

Effervescent.

Posologie. — 3 cuillerées à café par jour à prendre avant les repas. Etats aigus : 3 cuillerées à soupe par jour, dont une le matin à jeun.

Prix : 18 fr. 75.

Pharmacie LEMAITRE

46, rue de Trévis, PARIS (IX^e). (Tél. : Pro. 86-41.)

Enregistré au L. N. C., n° 320902.

SEPTOGONE

Chimiothérapie anti-infectieuse par voie buccale.

Composition. — Association synergique de l'aminophénylsulfamide et du plus actif des dérivés de l'Acridine, la Brunacrine (du Progone), 0 gr. 30 de sulfamide par comprimé.

Propriétés. — Activité optima due à la présence de brun d'acridine qui permet d'obtenir des résultats rapides et durables en n'administrant que de faibles doses de sulfamide.

Indications. — Toutes les affections à gonocoques, streptocoques, méningocoques, staphylocoques, pneumocoques, colibacilles.

Posologie. — 6 à 9 comprimés par jour en trois fois, aux repas. Pendant la durée du traitement, il est recommandé de n'utiliser aucun purgatif sulfaté, d'interrompre les cures d'or, d'arsenic, de bismuth, de mercure, et de proscrire l'usage de l'antipyrine et du pyramidon.

Prix : l'étui de 36 comprimés dragéifiés : 17 fr. 25.

Laboratoires S. F. E. A. T.

15, rue Catulienne — SAINT-DENIS (Seine).

(Tél. : Plaine 13-31).

Porte : 4 gr. (8 comprimés) et au besoin
 1 comprimé par 2 heures (12 comprimés)
 1 comprimé par 2 heures (12 comprimés)
 1 comprimé par 2 heures (12 comprimés)

le

0 A 10 ans : 2 gr. (4 comprimés) et au besoin

animales. Septicémies streptococciques. Méningites
 Maladie de Nicolas-Favre. Chancre mou. Infections
 compliquées ou non. Gonococcies (et complications)

streptococciques. Infections purpérales localisées,
 lymphangites streptococciques tropicales.

La septicémie peut être causée dans : Fièvre des
 mères gazeuses. Complications infectieuses de la
 grippe ou d'autres affections. Rhumatismes infectieux
 secondaires. Suppurations pulmonaires et pleurales.
 Pneumococcies. Abscès du pommier. Trachome.

Le septicisme peut également être causé : Affec-
 tions typiques. Infections purpérales secondaires.
 Grippe. Fièvre adénosée et ses complications

Exemples de posologie :

Adulte par jour : 4 à 6 gr. par jour.
 1 gr. par jour.

SEPTOPLIX

(1162 F ou Paraminophénylsulfamide)

Traitement des streptococcies, méningococques, gonococcies, pneumococcies, infections urinaires, etc.

Présentation :

Comprimés dosés à 0 gr. 50 (tube de 20).

Suppo-Septoplix dosés à 1 gr. (boîte de 10 suppositoires).

Septoplix-injectable : ampoules de 20 cc. de solution à 0 gr. 8 p. 100 pour injections intrarachidiennes, intrapleurales, intra-articulaires. (boîte de 3 ampoules).

Exoseptoplix poudre et solution (Voir *Exoseptoplix*).

Posologie. — Schématiquement, trois posologies :

Faible : 0 gr. 50 à 1 gr. 50 par jour (1 à 3 comprimés).

Moyenne : 2 gr. à 3 gr. 50 (4 à 7 comprimés).

Forte : 4 gr. (8 comprimés) et au-dessus.

Posologie infantile :

Nourrissons : 1/4 de la dose d'adulte.

3 à 6 ans : 1/2. " "

6 à 10 ans : 3/4. " "

Indications :

Le Septoplix, ou 1162 F, est très actif dans : Erysipèle (complicé ou non), Gonococcies (et complications), Maladie de Nicolas-Favre, Chancre mou, Infections urinaires, Septicémies streptococciques, Méningites streptococciques et méningococciques, Suppurations streptococciques, Infections puerpérales localisées, Lymphangites streptococciques tropicales.

Le Septoplix paraît très actif dans : Fièvre de Malte, Gangrènes gazeuses, Complications infectieuses de la grippe ou d'autres affections, Rhumatismes infectieux secondaires, Suppurations pulmonaires et pleurales, Pneumococcies, Abscesses du poulmon, Trachome.

Le Septoplix paraît partiellement actif dans : Affections typhiques, Infections puerpérales septicémiques, Grippe, Fièvre aphteuse et ses complications.

Exemples de posologie :

Érysipèle non compliqué : posologie faible : 0 gr. 75 à 1 gr. par jour.

Érysipèle compliqué : posologie forte : 4 à 6 gr. par jour.

Suppurations (pulmonaires, pleurales) ou infections localisées (annexites) : posologie moyenne : 3 gr.

Méningites : posologie forte : jusqu'à 0 gr. 15 par kilo,

Associer médication orale et injections intrarachidiennes (20 cc. chez les adultes, 10 cc. enfants, 5 cc. nourrissons, après avoir retiré même quantité de liquide céphalo-rachidien).

Septicémies streptococciques, infections puerpérales, septicémiques : posologie très forte (ne pas arrêter la dose forte dès la chute de température).

Affections gonococciques, Infections urinaires, Maladie de Nicolas-Favre : 4 gr. les premiers jours, puis 3 et 2 gr. les jours suivants.

Tolérance. — Les troubles que l'on peut observer : fatigue, céphalée, cyanose, troubles sanguins, cessent avec arrêt de la médication.

Pour éviter ces troubles : prendre des doses fractionnées (en 6 fois dans la journée) ; boire abondamment des eaux alcalines ; ne pas associer de médicaments à base de soufre ; rester alité pour les posologies fortes ; ne pas s'exposer au soleil.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SÉRÉNOL

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur des troubles de l'hypertonie nerveuse par déséquilibre neuro-végétatif.

Indications. — Emotivité, Etats anxieux, Insomnies, Neurasthénies, Migraines, Vertiges, Palpitations, Syndrome solaire, Certains prurits.

Formes. — Liquide, Comprimés, Suppositoires.

Composition :

Peptones	0,03
Hexaméthylène-tétramine	0,05
Phényl-éthyl-malonylurée.....	0,01
Teinture de Belladone	0,02
Teinture de Cratægus	0,10
Extrait fluide d'anémone.....	0,05
Extrait fluide de Passiflore	0,10
Extrait fluide de Boldo	0,05
Excipient	Q. S.

pour une cuillerée à café.

La cuillerée à café contient 1 cgr. de Phényl-éthyl-malonylurée, le comprimé 1/2 cgr. et le suppositoire 3 cgr.

Doses et mode d'emploi :

Doses moyennes par 24 heures : 1 à 3 cuillerées à café ou 2 à 5 comprimés ou 1 à 3 suppositoires.

Les doses de liquide et de comprimés indiquées sont des doses moyennes ; elles peuvent dans certains cas, et sur avis médical, être portées dans les vingt-quatre heures à 8 ou 10 cuillerées à café, à 12 ou 16 comprimés, donc à 8 ou 10 centigrammes de Phényl-éthyl-malonylurée si elles sont ordonnées à « doses filées » (Lhermitte, Gallot), c'est-à-dire très fractionnées dans le temps.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

SERICRINE-REY

Complexe Endocrino-Sérique.
Médication Hormostimulatrice,
Anti-Hémorragique - Récalcifiante.

Présentation. — Deux formes :

Pour l'*adulte* : ampoules buvables de 5 cc.

Pour l'*enfant* : ampoules buvables de 3 cc.

Composition. — Extraits hépatique, splénique, médullaire, surrénal, hypophysaire. Nucléinates de fer et de manganèse.

Indications thérapeutiques. — Toutes anémies, quelle que soit leur origine. Toutes carences et déficiences de l'organisme. Convalescences de maladies aiguës ou infectieuses ; états hémorragiques (préventif et curatif), asthénies avec dépressions physique et nerveuse (neurasthénie, anémie cérébrale), accidents de la croissance et de la puberté, troubles de la calcification, bacillooses et états prétuberculeux.

Posologie :

Adultes : 2 ampoules (*adultes*) par jour.

Adolescents : 1 ampoule (*adultes*) par jour.

Enfants : de 7 à 15 ans : 2 ampoules (*enfants*) par jour ; de 3 à 7 ans : 1 ampoule (*enfants*) par jour.

Aucune contre-indication.

Absence totale d'accidents sériques.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous les n^{os} 302 6/1 et 302 6/2.

Laboratoires REY

DIJON (Tél. : 22-12).

SÉRIFER

Traitement des déficiences sanguines par le fer vitalisé rendu assimilable après absorption par des Levures vivantes.

Composition. — Ions fer et manganèse, Sérum de cheval, Hormones antianémiques de foie frais, Arsenic organique.

Indications. — Toutes déficiences sanguines, Anémies diverses, Chlorose, Lymphatisme, Etats hémorragiques, Suite d'Opérations, Paludisme.

Forme. — Délicieux granulé chocolaté.

Posologie :

Adultes : 2 ou 3 cuillerées à café par jour avant les repas.

Enfants : Demi-doses.

Prix : 19 fr. 05.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON & Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

SÉROBIOL

Forme. — Ampoules buvables de 5 cc.

Formule. — Extraits de foie, rate. Acide phosphorique. Nucléinate de manganèse. Phosphate acide de sodium, Vitamine B tirée des levures. Sérum de cheval. Sérum de mouton.

Indications. — Carence, déficiences organiques, anémies, pré-tuberculose, convalescences.

Posologie :

Adultes : 1 ampoule matin et soir aux repas, dans un peu de liquide.

Enfants : 1 ampoule par jour.

Enreg. au Lab. Nat. de Contr. sous le n° 403-8.

La boîte de 10 ampoules : 22 francs.

Laboratoire **HOCQUETTE**

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.

(Tél. : Diderot 04-71.)

SÉROCALCINE

Composition. — Poudre d'os frais, vitamines A et D, rigoureusement titrées en unités biologiques anti-rachitiques, phosphatides cérébraux, extraits parathyroïdiens totaux, chlorophylle pure à pouvoir phyto-sensibilisateur extrême.

Propriétés. — Régulateur rapide du métabolisme calcique, reminéralisant, recalcifiant, activant de l'uréogénie, anti-toxique.

Indications. — Hypo-calcémie et hypo-phosphaturie, retards de croissance ou d'ossification, dystrophie osseuse, rachitisme, fractures, ulcères gastriques, cataracte post-opératoire.

Présentation et prix :	{	25 francs la boîte de 25 cachets.
		25 — — — de granulés.
		20 — — — d'ampoules.

Posologie. — Un cachet midi et soir au moment du repas ou 3 cuillerées à café de granulé par jour.

Les Laboratoires Lorrains de Produits purs.

ÉTAIEN (Meuse), — (Tél. : 74.)

SÉRO-COMPRIMÉS I. M.

Etuis de 40 et 100 comprimés de Sérums des-séchés.

Prophylaxie des affections de la gorge : 3 à 4 comprimés par jour.

Traitement local des angines courantes, pharyngites, porteurs de germes, etc. : 1 à 2 comprimés toutes les heures et le soir au coucher.

SÉROLACTYL

(Autopulvérisable) I. M.

En pulvérisateurs de 5 gr. de sérums des-séchés, lactosés.

Prophylaxie des affections rhino-pharyngées : 2 pulvérisations par jour.

Traitement local des rhinites, rhino-pharyngites, sinusites, Coryzas tenaces, etc... : 4 à 5 pulvérisations par jour.

SÉRO-LIQUIDE I. M.

En flacons de 30 gr. de sérums liquides, gly-cérinés.

Prophylaxie des affections oto-rhino-pharyngées : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

Traitement local des otites, sinusites, rhinites, rhino-pharyngites, etc... : 4 à 5 instillations ou pulvérisations par jour.

N. B. — Dans la diphtérie, les injections de sérum constituant la base du traitement, n'employer ces trois produits qu'à titre complémentaire (prévention et convalescence).

Durée d'utilisation des 3 produits : 10 années.

TUBERCULINE I. M.

pour cuti et percuti-réaction

(Voir le texte.)

Laboratoires des
PRODUITS BIOLOGIQUES I. M.

S. SAVIGNEUX, pharmacien.

18, cours Suchet — LYON.

SÉRODAUSSE

(Sérum activé de taureau.)

Ce sérum contient les hormones circulantes des jeunes animaux mâles et les anticorps des poisons séniles.

Le médicament est indiqué contre l'asthénie des personnes âgées ; il améliore leur capacité de travail physique et intellectuel et produit une orientation de leur caractère vers l'optimisme.

Il s'administre tous les mois, pendant six jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule dans un demi-verre d'eau, sucrée ou non, 30 minutes avant le petit déjeuner. Chez certains sujets, une dose mensuelle de 3 ampoules, prises à raison d'une ampoule tous les deux jours, est suffisante.

SÉRODAUSSE OVARIEN

(Sérum activé de génisse.)

Ce sérum contient, comme le précédent, les hormones circulantes des jeunes animaux femelles et les anticorps des poisons de Carrel.

Il est indiqué contre l'asthénie des femmes âgées et contre les troubles de la ménopause physiologique, chirurgicale ou radiologique. Chez les femmes en état de déficit ovarien, il fait disparaître les bouffées de chaleur, les vertiges et les sueurs.

Même posologie, même mode d'emploi que le Séro-dausse ordinaire.

SÉRODAUSSE INFANTILE

(Sérum de jeune bovidé en croissance.)

Ce sérum contient les facteurs internes de la croissance. Il produit une augmentation de la taille et du poids chez les enfants dont le développement est retardé.

Il s'administre tous les mois, pendant 5 à 10 jours consécutifs, à la dose quotidienne d'une ampoule le matin à jeun, 30 minutes avant la première prise d'aliments, dans un quart de verre d'eau sucrée.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e). (Tél. : Turbigo 63-40.)

SÉROGLOBINE

Dynamogène complet.

Composition :

Sérum musculaire de cheval.....	3 gr.
Extrait hémopoiétique de foie frais de veau.....	0,30
Arrhénal.....	0,04
Hypophosphite de sodium.....	0,30
Glycérophosphate de magnésium à 50 p. 100.....	0,40
Chlorure de manganèse.....	0,10
Écorce de Quinquina.....	0,60
Noix de Kola.....	1 gr.
Véhicule délicieux au Rancio des Papes. Q. S. pour.....	100 gr.
(Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 440-14.)	

Posologie. — Un verre à liqueur à chaque repas pour les adultes.
Demi-dose pour les enfants à partir de 10 ans.

Indications. — Toutes les carences organiques, Toutes les anémies, Amaigrissement, Épuisement, Anorexie, Tuberculose, Convalescence, Déphosphorisation.

Prix : 24 francs la bouteille de 430 grammes, pour un traitement de 10 jours.

Laboratoires AUBERY

AVIGNON (Vaucluse).

SÉROMA-REY

Composition. — 100 grammes de *Séroma* contiennent :

Protéines sériques.....	90 gr.	90
Calcium.....	0 gr.	05
Fer.....	0 gr.	30
Manganèse.....	0 gr.	15

Indications. — Surmenages, Fatigue cérébrale, Chocs Moraux, Dépression, Hémorragies, Hémophilies, Hémoptysies.

Doses moyennes :

Adultes : 1 cuillerée à café de Granulé deux fois par jour, un quart d'heure avant les repas.

Enfants : demi-doses.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 302-3.

Laboratoires REY

DIJON (Tél. : 22-12.)

SEROXEMA

Complexe séro-opothérapique. Traitement par voie buccale.

Composition. — Sérum de jeunes taureaux, activé par transfusion; organes opothérapiques sélectionnés (dessiccation sous vide à basse température).

Indications. — Troubles anaphylactiques, états de déficience hépatique ou de déséquilibre endocrinien, action spécifique sur la plupart des dermatoses : prurits (même généralisés); Eczémas secs, suintants, squameux; Eczématides, Herpès, Herpès des muqueuses, Urticaires, Dartres, Intertrigo, certains Psoriasis, Acné, Prurigo, Erythèmes des enfants, Lichen, Maladie de Quinck, Asthme.

Présentation. — Flacons de 60 dragées, pour une cure.

Amélioration sensible dès la première cure; le traitement complet exige un usage prolongé (repos de 20 jours entre chaque cure).

Doses moyennes.

De 1 à 2 ans, 2 dragées par jour fondues dans un peu de lait.

De 2 à 5 — 3 — — — —

De 5 à 10 — 4 — — — —

De 10 à 16 — 5 — — — —

Adultes : 6 — — — —

En 3 fois; le matin à jeun et
avant les 2 principaux
repas.

Nouveau prix en France : 25 fr. 50.

Laboratoires du SEROXEMA

G. BARTHET, Pharmacien

1, rue de Phalsbourg — PARIS (XVII^e). (Tél. : Wag. 02-76.)

SÉRU

*Médication à base d'extrait total et concentré des
Galbules de Cupressus Sempervirens.*

Indications. — Vaso-constricteur et tonique puissant du système veineux. Spécifique efficace, sûr et constant des varices, ulcères variqueux, périphlébites, hémorroïdes, varicocèles, des troubles de la ménopause, bourdonnements d'oreilles, prostatites.

Présentation et mode d'emploi :

Gouttes de Séru : XXX gouttes 2 fois par jour.

Durée moyenne du flacon : 12 jours. Prix : 14 fr. 50.

Pommade de Séru : Prix 15 francs.

Suppositoires de Séru : prix 18 francs.

Laboratoires TACHOT

103-105, rue Saint-Lazare — PARIS.

(Tél. : Trinité 04-49.)

SÉRUM ANTI-ASTHMATIQUE

de HECKEL

Composition. — Le sérum de Heckel a pour base l'adrénaline physiologique des glandes surrénales, stabilisée dans un soluté isotonique.

Mode d'emploi. — Au moment de la crise, une injection sous-cutanée d'une demi-ampoule ou d'une ampoule.

Action. — L'excitation du pneumo-gastrique spasme les bronches et cause la crise d'asthme. Le sérum de Heckel, en excitant le grand sympathique, annihile l'action du pneumogastrique et le spasme cesse.

Indications. — Toutes les formes d'asthme, au moment des crises. Il est contre-indiqué chez la femme au terme de sa grossesse, chez les cardiaques, les hypertendus et chez les sujets présentant un foyer de gangrène pulmonaire.

Présentation. — Sérum de Heckel pour adultes, 12 ampoules de 5 centicubes.

Prix : 24 fr. 50.

Sérum de Heckel infantile, 12 ampoules de 2 centicubes.

Prix : 17 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — (Tél. : Carnot 78-11.)

SÉRUM ANTITYPHOÏDIQUE

du Professeur Rodet.

Sérum de chevaux immunisés.

Actif contre le bacille d'Eberth et le Para A.

Partiellement contre le Para B.

Documentation. — Communication Académie de Médecine (9 mars 1915, 4 juillet 1915, 3 juin 1919).

Journal de Médecine de Lyon (5 novembre 1925).

Pas de contre-indications, il n'y a que des conditions de moindre efficacité.

La gravité n'est pas une contre-indication, au contraire. Commencer le traitement dès que le diagnostic est posé ou même seulement probable.

Posologie. — Pour la conduite du traitement, suivre avec soin les indications données sur l'imprimé joint aux ampoules.

Le traitement normal correspond à une série de trois ampoules : 20 cc., puis 15 cc., puis 10 cc.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON.

(Tél. : Franklin 24-63.)

SÉRUM DE JOUSSET

Sérum antibacillaire.

Sérum de chevaux immunisés contre les toxines du bacille de Koch. Combat l'infection, non les lésions. Traitement de choix des primo-infections (s'aider pour le diagnostic de la cuti-réaction) : enfants : typhobacillose, pleurésie séro-fibrineuse, pleuro-péritonite des jeunes, polyarthrite tuberculeuse aiguë, hémoptisie, spléнопneumonie tuberculeuse, etc., rechutes survenant parfois au cours d'une tuberculose précocement traitée par l'Allergine.

Si après une semaine d'observation la température reste régulière ou peu oscillante, aborder la sérothérapie.

Contre-indication à l'emploi en injections. — Température irrégulière (oscillation atteignant 3°). Asthmatiques, Emphysémateux.

Aucune contre-indication à l'emploi en lavements.

Posologie. — Injections hypodermiques, face antérieure de la cuisse, 3 à 6 cc. par kilog. de poids du sujet, répartis en trois injections à deux jours d'intervalle ou lavements quotidiens à conserver, inoffensifs, de 2 à 3 cc. par kg. pendant 6 à 8 jours, le soir. Fortes doses salicylate si arthralgies 12^e jour.

Demandez notice explicative aux Dépositaires généraux.

Les Laboratoires BRUNEAU et Cie

17, rue de Berri — PARIS (VIII^e).

SÉRUM FRAISSE

FERRUGINEUX

Voir :

Ampoules ferrugineuses Fraisse.

SÉRUM FRAISSE

NÉVROSTHÉNIQUE

Voir :

Ampoules névrosthéniques Fraisse.

SÉRUM OLIVIÉRO

Equisérine

Sérum normal de cheval, créé en 1906.

Le *Sérum normal de cheval* possède de nombreuses propriétés qui en font un agent thérapeutique de tout premier ordre. Son action est des plus manifeste dans les *Anémies*, les *Asthénies*, les *Consumptions*, les *Hémorragies*.

Son action est héroïque et nettement spécifique dans le pansement des plaies à cicatrisation rebelle, dans les *brûlures*.

Ampoules buvales de 10 cc., 1 par jour ; de 2 cc., 2 à 4 par jour. Peuvent s'employer en pansements. Ces ampoules contiennent du sérum pur, sans addition d'antiseptique ou de conservateur quelconque.

Prix amp. de 10 cc. la boîte : 23 fr.

— 2 cc. — 21 fr.

Comprimés. — Capsules. — Prix : 21 fr.

Sérum desséché pour pansements. Prix : 15 fr.

Laboratoire OLIVIÉRO

BOULOGNE-SUR-SEINE. Tél. : Molitor 27-06.

SÉRUM POLYVALENT

de Leclainche et Vallée.

Provient de chevaux solidement immunisés contre les variétés les plus multiples et les plus virulentes des germes capables de produire la suppuration des plaies et les grandes septicémies courantes : streptocoque, staphylocoque, colibacille, pyocyanique, etc.

Indications et mode d'emploi. — Sérothérapie interne (voie intramusculaire, intraveineuse, sous-cutanée, rectale) : Septicémie et Pyohémies.

Posologie. — *Dose d'attaque* : 1^{er} jour, 80 cc. ; 2^e jour, 80 cc. ; 3^e jour, 60 cc.

Dose d'entretien : 30 cc.

En injection intramusculaire. Dans les cas très graves, recourir à l'injection intraveineuse.

Présentation. — Sérum injectable : boîte de 2 ampoules de 10 cc.

Prix : 26 fr. 50.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

SÉRUMS CLIN

Les sérums thérapeutiques Clin, antimicrobiens et antitoxiques, sont purifiés par *électro-osmose*, procédé n'altérant en rien leur efficacité et leur conférant les avantages suivants : disparition ou diminution des accidents de choc et des accidents sériques, très grande stabilité et très longue conservation. S'emploient en injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses, ou localement.

SÉRUM CLIN ANTICOLIBACILLAIRE

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Indications. — Toutes les infections à colibacilles ou à association colibacillaire : Colibacilloses, pyélonéphrites, appendicite aiguë et ses complications, péritonites (avec le sérum antigangréneux), fièvre urinaire, périostite.

Doses. — Variables suivant le degré d'infection (de 10 à 60 cc. par jour pendant 4 à 5 jours).

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Ce sérum existe également sous forme *non purifiée*, pour l'administration par voie buccale.

SÉRUM CLIN ANTIDIPHTÉRIQUE

Sérum antitoxique et antimicrobien purifié. Sérum concentré en unités antitoxiques, mais d'une teneur normale en protéides. Hyperimmunisation des chevaux à l'aide de toxine diphtérique et de corps microbiens provenant de diphtéries graves et malignes récentes.

Formes. — Délivré en ampoules de 10 cc., sous deux concentrations :

1° Ampoules de 10 cc. à 1.000 U. A. par cc., soit 10.000 U. A. par ampoule.

2° Ampoules de 10 cc. à 500 U. A. par cc., soit 5.000 U. A. par ampoule.

3° Ampoules de 2 cc. à 1.000 U. A. par ampoule, en boîte de 2 ampoules pour usage préventif.

Posologie. — Se référer à notices plus détaillées.

SÉRUM CLIN ANTIGANGRENEUX

(Préparé d'après la méthode de H. VINCENT et G. STODEL.)

Sérum antigangréneux multivalent.

Indications. — Gangrène gazeuse, phlegmons, abcès gazeux, traumatisme avec gros délabrement musculaire, fractures ouvertes, appendicites graves, péritonite, gangrène pulmonaire, diabétique, etc...

Doses. — Préventives : 10 à 20 cc. ; curatives : 20, 30, 40 cc.

SÉRUM CLIN ANTISTREPTOCOCCIQUE MULTIVALENT

(Préparé d'après la méthode du Prof. H. VINCENT.)

Sérum équin hyperimmunisé contre les diverses races sélectionnées de streptocoques variés et très virulents.

Indications. — Toutes les infections graves, locales ou générales et septicémies à streptocoques.

Doses. — Variables suivant la gravité de l'infection, de 20 à 100 cc. (par voie sous-cutanée, intramusculaire ou intraveineuse).

Agir vite, suffisamment longtemps.

Forme. — Boîte de 1 ampoule de 10 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SÉRUMS ET VACCINS

du

Laboratoire de Sérothérapie S. A.**BERCHEM-SAINT-AGATHE****(BRUXELLES)**

Sérum antitétanique préventif : 10 cc.,
3.000 unités internationales.

Sérum antitétanique curatif : 10 cc.,
10.000 unités internationales.

Sérums : antidiphtérique, antigangré-
neux polyvalent, antistreptococcique,
antistaphylococcique.

SÉRUM-VÉGÉTAL

Du docteur Cuguillère.

Composition. — Le sérum-végétal du docteur Cuguillère à base d'essences d'ail rendues indolores par un procédé spécial ne présente aucune toxicité sur l'organisme, tout en possédant un pouvoir bactéricide très puissant contre le bacille de Koch.

Il renferme en outre de la *myrrhe* lui conférant des propriétés balsamiques remarquables et des sels de chaux à l'état naturel dans les végétaux et de ce fait entièrement assimilables.

Références scientifiques. — Le sérum a été expérimenté au Château Savignac, à Saint-Denis-de-Piles (Gironde), sous le haut patronage de M. le Marquis de Castellane.

Les guérisons cliniques des bovidés traités furent constatées par l'éminent vétérinaire M. Faure; c'est à l'hôpital Bichat que le célèbre anatomo-pathologiste le docteur H. Martin-Roux reconnaît ces guérisons sur les pièces examinées.

L'Académie de Médecine reçoit en séance publique du 10 mars 1908 le compte rendu complet des travaux effectués sur le sérum-végétal du docteur Cuguillère.

Depuis, le sérum est employé avec le plus grand succès et il recueille chaque jour un nombre d'adeptes de plus en plus considérable.

Indications. — Le Sérum-Végétal du docteur Cuguillère est le traitement de choix et quasi spécifique des tuberculoses osseuses et ganglionnaires. Il guérit souvent en quelques injections des coxalgies, des maux de Pott remontant à plusieurs années et même compliqués de mauvais état général et de fistulisations. Il donne également des résultats remarquables dans toutes les formes de tuberculoses.

Un traitement de trois mois à raison d'une à deux injections de 5 cc. par semaine, hypodermiques profondes (*adultes*), et d'une cuillerée à potage de sirop iodotannique associé à de l'arrhénal (et surspécification « vitaminé » sur l'ordonnance, à 4 000 unités internationales, *pro die*), est suivi:

Cliniquement: par une amélioration de tous les signes stéthoscopiques et une reprise de l'état général.

Radiologiquement: par une régression des images pathologiques.

Bactériologiquement: par la diminution des B.K. par champ.

Chimiquement: par l'élévation du cholestérol et de la courbe de séroflocculation de Vernes.

Hématologiquement: par une amélioration très rapide de la formule sanguine.

Echantillons permettant un essai loyal et littérature ouvrage édité par la Lib. Norbert-Maloine de Paris, in-8°, 140 p.: *Traitement phytothérapique de la Tuberculose*

Laboratoire de PHYTOTHÉRAPIE

du Dr Cuguillère. (1)

Docteur en médecine, Ancien externe des Hôpitaux, Pharmacien de la Faculté de Paris, membre de la Société Botanique de France

19, rue des Chalets — TOULOUSE.

SERVO-FREINYL

Médicament type de la spasmothilie
et des états spasmodiques.

Propriétés Thérapeutiques. — 1^o Action sédative purement symptomatique par la *phényléthylmalonylurée*. 2^o Modificateur humoral par les *borotartrates* et les *ions calciques* et *magnésiens*. 3^o Régulateur endocrinien par la *parathyroïdine* et de carence par la *vitamine D*.

Indications. — *Enfants difficiles et hypomaniaques*; Tics. États ohé-ré-formes. Instabilité.

Chez l'adulte: Terrain comitial, équivalents comitiaux. Névroses, Dysphorie. États spasmodiques.

Présentation. — Granulé d'un goût très agréable.

Formule.

Borotartrate de magnésie	0,35
Borotartrate de calcium	0,35
Carbonate de calcium	0,125
Phényléthylmalonylurée	0,015
Parathyroïdine	1/2 mm.
Ergostérine irradiée	500 U. I.
Extrait de pisoidia	0,005 par cuillère à café.

Posologie. — *Enfants*..... 3 cuillerées à café.
Adolescents 3 cuillerées à dessert.
Adultes 3 cuillerées à dessert.
 (Doses moyennes que le médecin adapte à chaque cas particulier.)
 Durée moyenne : 10 jours.
 Enregistré au L. N. C.

Laboratoire d'Applications Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien

52, rue de Cambrai — LILLE (Nord).

SETI

Ampoules jumelées de Soufre et d'Iode
en milieu magnésien.

Propriétés thérapeutiques. — Les ampoules jumelées SETI permettent d'injecter une solution aqueuse magnésienne de Soufre et d'Iode ; c'est l'application de la méthode de Sulfoiodothérapie préconisée par André LERI et DEDET pour lutter contre le Rhumatisme chronique et ses complications — pratique, efficace, sans danger et indolore.

Indications. — Rhumatismes chroniques. Arthrites. Névralgies rebelles, Périphlébites, Asthme.

Mode d'emploi. — Le médecin, dans une seringue de 5 cc., aspirera 2 cc. de chacune des solutions, il agitera le liquide jusqu'à décoloration. Il fera l'injection intramusculaire profonde de la solution incolore obtenue en suivant très exactement la technique indiquée. Le SETI s'injecte aussi par voie intraveineuse.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Oie, Pharmaciens,

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e)

(Tél.: Montmartre 75-01-75-02.)

SETIPYRINE

Complément du traitement SETI et NEO-SETI.

Le médicament de la douleur.

Antirhumatismal complet.

Deux formes : cachets et suppositoires.

Propriétés thérapeutiques. — Les cachets de *Sétipyrine* associent la médication de fond à la médication anti-algique : ils combattent l'effet et la cause.

Indications. — Rhumatismes et toutes ses manifestations douloureuses, Névralgies de toute origine, Goutte, Arthrite, Sciatique, Migraines, Lumbago.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets ou 2 à 4 suppositoires par jour.

Dose maximum à fixer par le médecin.

Laboratoires BRISSON

Dr DÉDET et Cie, Pharmaciens,

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

SICOVAIRE

Indications. — Troubles de la puberté ou de la ménopause chirurgicale ou naturelle.

Aménorrhées, dysménorrhées.

Agit dans tous les cas de déficience ovarienne, avec insuffisance ou excès de folliculine.

Composition. — Extrait d'ovaire.

Forme. — Ampoules buvables.

La boîte de 6 ampoules de 5 cc. : 16 fr. 50.

La boîte de 18 ampoules : 47 fr.

Posologie. — Une ampoule par jour avant le repas dans de l'eau sucrée, après les règles, ou la période présumée des règles s'il y a absence de règles.

L. GUÉRET, Pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

SIDÉRANYL

Spasmolytique Magnésien

(Borotartrate de Magnésium).

Propriétés Thérapeutiques. — Le type de la médication à la fois sédative et stimulante, respectant intégralement les fonctions mentales. — Sédatif cortical par le *borotartrate*. — Spasmolytique par l'action inhibitrice du *magnésium* sur la fibre musculaire lisse. — Vitalisant, cytophylactique et excito-sécrétoire par le même *magnésium*.

Indications. — Médication de choix des troubles nerveux, relevant à la fois de l'asthénie et de l'hyperesthésie par *carence magnésienne*. Encéphalopathie avec agitations. — Troubles psycho-névropathiques de la ménopause (éréthisme, états d'excitation). — Dyssomnies (mentisme du premier sommeil).

Et surtout : para-épilepsie, crises nerveuses fonctionnelles.

Présentation. — Solution pour *Adultes* et *Enfants*, 15 p. 100.

Sirop pour Nourrissons, 6 p. 100.

(Durée moyenne : 10 jours)

Formule. — Borotartrate de Magnésie.

Posologie. — Solution : *Adultes*..... 2 à 3 cuillerées à soupe.

Adolescents..... 2 à 3 — à dessert.

Enfants..... 1 à 2 —

Matin, Midi, Après-Midi.

Sirop *Nourrissons* : 1 à 3 cuillerées à café selon l'âge.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.

Enregistré au L. N. O.

Laboratoire d'Applications

Biologiques LABIOLA

P. CORDONNIER, Pharmacien,

52, rue de Cambrai. — LILLE (Nord).

SILGUINE

Composition. — Chaque comprimé contient :

0,05 Extrait sec stabilisé de gui de pom-
mier.

0,01 Extrait sec d'aubépine.

0,10 Poudre de prêle.

0,03 Extrait de glandes endocrines mâles.

Action. — La « SILGUINE », à base de produits végétaux particulièrement assimilables, abaisse la tension artérielle, augmente la diurèse, tonifie le cœur. Elle comble le déficit des sécrétions endocrines particulièrement important au moment de la ménopause. Elle sature l'organisme de silice et empêche l'apparition de lésions athéromateuses et de l'artériosclérose.

Indications. — Tous les symptômes de l'« Automnose », hypertension artérielle, artério-sclérose, céphalées, somnolence, vertiges, bourdonnements d'oreilles, troubles oculaires, troubles de la circulation, dyspnée nocturne, dyspnée d'effort, hémorragies, hémorragies cérébrales, accidents rénaux, accidents cardiaques.

Mode d'emploi. — 1 à 2 comprimés, avant chaque repas, 20 jours par mois.

Prix : 16 francs.

G. RÉAUBOURG et Cie,

Docteur en Pharmacie,

115, rue de Paris,

BOULOGNE-SUR-SEINE.

R. C. Seine 265.702 B.

SILICYL

Médication de base et de régime des carences siliceuses et des états artérioscléreux, empêchant la transformation des éléments élastiques et striés de l'endartère, c'est-à-dire la lésion initiale et les altérations consécutives hypertrophiques, hyperplasiques et dégénératives, avec imprégnation secondaire calcaire ou cholestérinée d'un placard athéromateux ou d'une sténose oblitérante.

Principe. — L'adrénaline ne produit plus de lésions athéromateuses chez les sujets soumis à l'action du silicate de soude (Professeur Goujet, P. M. 1911). — L'injection intraveineuse, inoffensive, abaisse la tension artérielle et ramène à la normale la viscosité sanguine. (Professeurs Sartory, Scheffer et Pélissier, *Acad. Sciences*, Août 1920.)

Composition. — Silicates de formule $\text{Si}^4 \text{O}^{2-} \text{Na}^+$ et K^+ stables solubles, purs, sans excès de base, bien tolérés et de fabrication très spéciale.

Emploi et doses. — La médication doit être prolongée, de façon tenace et persistante par périodes de 20 jours par mois.

GOUTTES : Seule préparation titrée à 25 p. 100 de SiO_2 , X à XXV gouttes aux repas, matin, midi et soir.

COMPRIMÉS : Titrés à 0,40 de sel de soude et de potasse ; 1 à 2 comprimés, au repas, 3 fois par jour.

AMPOULES : Voie intraveineuse, 1 ampoule par 48 heures (Action rapide : préscléreux, angor.).

Résultats. — Abaissement de la tension Mm et Ma, Viscosité ramenée à la normale. Elimination chlorurée. Diurèse. Action anti-athéromateuse. Hypotension. Disparition de la Dyspnée d'effort et des symptômes cérébraux. Euphorie et augmentation de la vitalité générale.

Indications. — 1° Action minéralo-tissulaire ; Bacilliose, Consolidation accélérée des fractures. Surdit   (ionisation). Etats   lastopathiques.

2° Art  rioscl  rose, Hypertension, Aortite, Ath  rome aortique, Scl  rose r  nale, Angine de poitrine, Endart  rite obl  t  rante progressive. Prophylaxie de l'ath  rome et de l'h  morrhagie c  r  brale, Troubles c  r  braux, Migraines, Vertiges, Paresse intellectuelle, Bourdonnements, etc. Otite scl  reuse, Scl  rose auriculaire, Troubles oculaires, Presbytie, Fatigue et Scl  rose cardiaque, An  mie siliceuse.

Gouttes : 32 cc.	21 fr. 75
Ampoules : (5 cc. \times 6).....	17 fr. 40
Comprim��s : (50 comp.).....	21 fr. 95
Drag��es.....	21 fr. 95

D  POT, Paris : **Pharmacie P. LOISEAU**

61, boulevard Ma  sh  rbes — PARIS.

  CHANTILLONS — LITT  RATURE

Laboratoire CAMUSET

18, rue Ernest-Rousselle — PARIS.

(T  l. : Gobelin 00-70.)

SILIGONE

Hypotenseur Antisléreux.
Médication Silico-Phytothérapique.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Mode d'emploi. — 4 à 6 comprimés par jour, 15 à 20 jours par mois de préférence à jeun et un bon moment avant les repas.

Composition. — Silicate sodique, Ballote, Yohimbine (0,00066 par comp.), anémone pulsatile.

Action. — Abaisse la tension, régularise la circulation, dilate les artérioles, diminue la viscosité sanguine, s'oppose au processus sclérosant.

Indications. — Hypertension quelle qu'en soit la cause, angiospasmés, artério-sclérose, athérome, vertiges, sclérose rénale et auriculaire, angine de poitrine, etc.

Prix. — L'étui de 50 comprimés : 18 fr. 70.

Concessionnaires :

Laboratoires R. BERNARDO
47, avenue de la République
VILLENEUVE-LE-ROI (Seine-et-Oise).

SILIPLASTINE

Deux formes :

1° Siliplastine.

2° Siliplastine au goudron solubilisé 4 p. 100.

Indications :

1° Les dermatoses suintantes, les dermites irritatives, toutes les lésions que les pommades grasses « échauffent ».

2° *La Siliplastine au goudron solubilisé* s'adresse au traitement des dermatoses sèches, des eczémas, eczématides, eczémas séborrhéiques.

Avantages. — La Siliplastine, très agréable à appliquer, ne graisse pas et ne tache pas le linge ; elle s'enlève facilement à l'eau bouillie tiède.

Présentation. — Le tube : 14 fr. 30.

Le 1/2 tube : 8 fr. 30.

Siliplastine au goudron solubilisé.

Le 1/2 tube : 9 francs.

Laboratoires du D^r F. LEBAT
60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Laborde 72-73.)

SILISODE

Forme. — Granulé.

Composition. — Une cuillerée à café contient :

Silicate de soude : 0 gr. 40.

Benzoate de lithine : 0 gr. 10.

Dose. — Une cuillerée à café avant les repas, 15 à 20 jours chaque mois.

Action. — Hypotensive, antisléreuse.

Indications. — Hypertension sous toutes ses formes. Artério-sclérose. Aortites, Angine de poitrine, Athérome.

Laboratoires MICHELS

4 bis, rue du Colonel-Moll — PARIS (XVII^e)
(Tél. : Galvani 73-50, 51.)

SILYMAR

(Pilules)

Composition. — Extraits hydro-alcooliques de *Silybum Marianum*, de *Teucrium Scorodonia*, de *Paullinia Cupana*.

Propriétés. — Tonique vasculaire dépourvu de toute toxicité, bien toléré par les voies digestives, ne produisant pas d'accoutumance ; remède spécifique de l'hypotension, agissant en réparateur parfait du tonus des fibres musculaires lisses, en équilibrant les fonctions neuro-végétatives.

Indications. — Toutes les affections causées ou caractérisées par une déficience tensionnelle (hypotension idiopathique permanente, hypotension orthostatique, états vago-toniques, migraines, urticaires, asthme liés au choc anaphylactique, hypotensions de la tuberculose, des maladies infectieuses, des affections hépato-biliaires, des hémorragies, de la dysenterie, des intoxications digestives, des névroses, des néphrites, des dystrophies endocriniennes. Préservatif de la naupathie.

Posologie — Dose moyenne : 1 pilule avant chacun des 3 repas pendant 10 jours, dose que l'absence de toxicité du *Silymar* permet de doubler et de continuer aussi longtemps que le médecin le juge nécessaire.

Prix : 18 francs.

Laboratoire E. LANCOSME

71, Avenue Victor-Emmanuel-III. — PARIS (VIII^e)

SINAPLASME

**Cataplasme sinapisé instantané
du docteur Jean Faure.**

Le premier en date. Le plus régulier.
Le moins cher.

Mode d'action. — Agit comme un cataplasme de farine de lin sinapisé et non comme un sinapisme.

L'enveloppe contenant un Sinaplasme
double : 2 francs.

La boîte contenant trois Sinaplasme
double : 6 francs.

Docteurs FAURE et DUSSUEL

Pharmaciens de 1^{re} Classe

AIX-LES-BAINS — Tél. : 7-48.

SINAPOL

Pommade révulsive aux essences (en tubes)

Composition. — Essence de Sinapis Nigra, Teinture d'euphorbia resinifera, Eucalyptol, Goménol, Gaïacol, Menthol.

Indications. — Toutes celles des cataplasmes et enveloppements sinapisés, des sinapismes ou autres applications révulsives. Affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires, douleurs, rhumatismes, névralgies, etc...

Posologie. — SINAPOL, 1 tube, étendre en onction *très légère*, puis recouvrir de coton cardé ou flanelle. Pour les épidermes spécialement sensibles, étendre au préalable une petite couche de vaseline, puis faire l'application de SINAPOL comme il est dit plus haut.

Laboratoires DEODAX

R. RENAUD * ❀

ANOULD (Vosges).

SINASEPTIC

Sinapise. — Aseptise.

Mélange de 5 essences balsamiques, d'essence de Moutarde noire, de Camphre, de Menthol et de Gaïacol en dilution huileuse.

Action sinapisante et vaso-dilatatrice.

Action antiseptique par absorption cutanée et élimination par les voies respiratoires.

Indications. — Angine, Laryngite, Bronchite aiguë ou chronique, Pneumonie, Broncho-pneumonie. Formes respiratoires de la Grippe, Congestion pulmonaire. Certaines formes de Tuberculose.

Révulsion préventive post-anesthésique.

Emploi. — Appliquer au pinceau et recouvrir de ouate. Pour les enfants et les peaux sensibles, diluer avec de l'huile ordinaire.

Laboratoire M. COGNACQ

9, Place Beaugrenelle — PARIS (XV°).

(Tél. Vau 41-51.)

SINUSYL

Indications. — Toutes désinfections nasales. Sinusites, Coryza, Rhinites, Ozène, Rhume des foins.

Composition. — Résorcine, Camphre, Myrtol, Essence de violettes, Excipient huileux.

Forme et mode d'emploi. — Se fait :

En *huile* pour instillations nasales.

En *huile éphédrinée* à 1 p. 100, en pulvérisations.

En *pommade* dans un tube spécial ;

En *rhino-capsules* pour auto-instillations.

Employer également en période d'épidémie.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1852-2.

Laboratoires Pierre CHATEAU

M. COGNACQ, Pharmacien,

9, Place Beaugrenelle — Paris (15°).

(Tél. : Vaugirard 41-51.)

SIPHURYL

(Orthosiphon Longuet)

Composition. — Extrait d'Orthosiphon Stamineus, *en gouttes aromatisées* (LX gouttes = 0,50 extrait sec) ou *comprimés* (1 comp. = 0,25 ext. sec).

Remplacelatisane impratique et peu agréable.

Indications. — Diurétique hépato-rénal, sans aucune contre-indication.

Éliminateur d'eau, urée, acide urique et chlorures, Oligurie, Arthritisme, Lithiase rénale, obésité.

Doses :

LX gouttes dans 1/2 verre d'eau, 3 fois par jour ou 2 comprimés 3 fois par jour.

Prix : 17 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS. (Tél. : Roquette 21-95.)

SIROP BERTHÉ

Composition. — A base de codéine, 15 milligrammes de codéine par cuillerée à soupe de 20 grammes de sirop ; 11 milligrammes environ par cuillerée à entremets, 4 milligrammes par cuillerée à café.

Indications. — Préparation d'un goût agréable qui s'emploie contre les rhumes et les autres affections des voies respiratoires, maladies nerveuses, souffrance et insomnie dues à une maladie quelconque.

Mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à soupe, 1 à 6 cuillerées à café.

Enfants au-dessous de 3 ans, on prépare une petite potion en additionnant une cuillerée à café de sirop Berthé de deux cuillerées à soupe d'eau. On donne dans les 24 heures autant de cuillerées à café de cette potion à l'enfant que cela est nécessaire pour le calmer.

Enfants au-dessus de 3 ans, une 1/2 cuillerée à café par année d'âge.

Prix : le flacon 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

Tél. : Pro. 21-55 et 21-58.)

SIROP BRAHMA

Composition. — Thiocolum, benzoate de soude, codéine, chlorhydrate d'éthylmorphine, aconit, belladone, grindélia.

Action. — Antiseptique puissant, régularise les sécrétions, les diminue. Calme rapidement la toux.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires, rhumes, bronchites, grippe, laryngites, coqueluche, tuberculose au début.

Mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à soupe par 24 heures, 1 heure avant ou 2 heures après manger, pur ou mieux dans de la tisane. Pour 4 à 5 jours de traitement.

Laboratoire G. COULLOUX

116, rue du Pont — AUXERRE (Yonne). Tél.: 0-21.

SIROP CASSIBOR

Sirop à base de teinture d'aconit, substances pectorales, séné, cassis et borate de soude.

Goût agréable, ne fatigue pas l'organisme, ne constipe pas.

Mode d'emploi :

Adultes : 3 à 5 cuillerées à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à café par année d'âge.

Indications. — Prescrit contre rhumes, angines, bronchites, gripes et névralgies. C'est le sirop type pour les enfants.

On l'emploie également après les opérations chirurgicales chez les malades enrhumés.

Le flacon : Prix : 13 fr. 90.

Durée moyenne de l'unité de vente : une semaine environ.

Établissements FUMOUBE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SIROP DE CRÉOSOTE VACHERON

Composition. — 0 gr. 15 de créosote par cuillerée à soupe.

Propriétés thérapeutiques. — Antibacillaire et antiseptique puissant des bronches et du poumon.

Avantages. — De saveur agréable, nullement caustique, très bien toléré par l'estomac. Excellent sirop pectoral.

Indications. — Rhumes de toutes natures, bronchites aiguës et chroniques, toux rebelles, catarrhes, laryngites, grippe, influenza, etc...

Mode d'emploi. — *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures, à prendre dans l'intervalle des repas.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et O. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON.

(Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP DE GAÏARSOL

Composition. — Méthylarsinate de Gaïacol.

Indications. — Calme immédiatement la toux, Désinfecte les voies respiratoires, Stimule la résistance organique. Tolérance absolue, assimilation parfaite.

La toux, les affections pulmonaires, les complications broncho-pulmonaires des maladies infectieuses.

Forme. — Sirop.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : de 8 ans et plus : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour.

Enfants de moins de 8 ans : selon l'âge, par cuillerée, ou fraction de cuillerée à café.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

SIROP DE GLYCÉROPHOSPHATES VACHERON

Au Gaïacol de synthèse cristallisé
et aux glycérophosphates de chaux, de soude et de potasse.

Composition. — Cette préparation contient par cuillerée à soupe :

0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé.

0 gr. 30 de glycérophosphates.

Avantages et Propriétés thérapeutiques. — Ce sirop possède le même pouvoir antibacillaire que le sirop Vacheron au Gaïacol (*voir plus loin*), et en plus l'action reconstituante des phosphates organiques.

Indications. — Affection des voies respiratoires, chez les anémiques, les lymphatiques, les rachitiques et contre la tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP DE LA MATERNITÉ

Sirop de Cassia ac., 60 gr. ; sirop de fleur de pêcher, 20 gr. ; sirop de pomme Reinette, 18 gr. ; teinture d'orange douce, 2 gr.

Dose et mode d'emploi. — Jusqu'à 2 mois 1/2 cuill. à café, au-dessus de 2 mois 1 à 2 cuill. à café.

Propriétés thérapeutiques. — Laxatif pour enfants, pouvant être donné à tout âge. Pas de coliques.

Indications. — Constipation, Embarras gastrique. Pas de contre-indications.

Dépôt : Laboratoires H. NOGUÈS
7, rue Galvani — PARIS.

SIROP DE LOVEL

Iodo-phosphaté tannique.

1 cuillerée à soupe contient :

Iode métalloïdique, combiné aux roses rouges	0 gr. 02
Extr. tannique des roses de Provins et de Ratanhia	0 gr. 20
Phosphate monocalcique cristallisé.....	0 gr. 25

Posologie :

Adultes : 1 à 2 cuillerées à soupe matin et soir.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Indications. — Lymphatisme, rachitisme, carie des os, affections scrofuleuses, maladies dues à l'anémie et à la débilitation générale.

Préparation très recommandée aux enfants.

Durée moyenne de l'unité de vente : 7 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON — (Tél. : Franklin 36-80.)

SIROP D'EUCALYPTINE

Antiseptique pulmonaire, Calmant de la toux,
Orexique, Phagocytogène.

Composition :

Essence déterpénée d'Eucalyptus	0,025
Phénolsulfonate de Sodium	0,15
Camphosulfonate de Sodium.....	0,25
Gaïacolsulfonate de Potassium	2,50
Codéine	0,10
Bromoforme	0,10
Teinture de Belladone et Aconit	0,50
Pour 100 grammes.	

Indications. — Toutes pneumopathies aiguës ou chroniques, gripes et complications pulmonaires, broncho-pneumonie, bronchite, coqueluche trachéo-bronchique, toux spasmodique, d'irritation ou catarrhales.

Posologie :

Adultes : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café ou à dessert selon l'âge.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

Téléph. Kléber 71-33.

SIROP DUBOIS au CRÉOSAL

Composition. — Le Créosal réunit dans sa composition le Galacol, l'Acide Phosphorique et le Calcium, que la Thérapeutique a toujours associés.

Propriétés et indications. — Récalcifiant puissant. Accélérateur de la Nutrition. Sédatif de la toux quelle qu'en soit l'origine. L'emploi du SIROP DUBOIS au CRÉOSAL est tout spécialement indiqué au début et au cours des gripes, bronchites, affections pulmonaires.

Forme. — Sirop de goût très agréable, malgré haute teneur en principes actifs.

Posologie et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

Enfants (de 10 à 15 ans) : 2 à 4 cuillerées à café.

Le SIROP DUBOIS au CRÉOSAL se prend de préférence dans une infusion ou de l'eau très chaude, à distance des repas.

Durée moyenne des unités de vente : de 5 à 10 jours.

Prix de vente au public :

Le flacon : 13 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.

SIROP DU D^r LAGNOUX

au valérianate de caféine.

Spécifique contre

la **Coqueluche**

et les **Toux quinteuses.**

Grâce à un procédé spécial de fabrication, ce sirop, contrairement à ce qu'on pourrait croire, possède un *goût délicieux* et est accepté par les enfants les plus difficiles.

Qualités thérapeutiques. — Antispasmodique, sédatif, tonicardiaque, dépourvu de toxicité.

Posologie :

Enfants : de 6 mois à 1 an : 3 à 4 cuillerées à café par jour ; de 1 an à 4 ans : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Le flacon : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n^o 1689-7.

Laboratoires du D^r J. LEFÈVRE

Docteur en médecine, Pharmacien,

Ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Paris.

200, faubourg Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 01-09.)

SIROP ET PÂTE PECTORALE ROBIN

(Formule du D^r Bousquet)

Composition. — Chlorhydrate d'éthylmorphine (Méthylcodéïne), non stupéfiant. Teintures de Drosera et d'Aconit, Bromoforme, Eau distillée de laurier-cerise.

Indications :

Sirop : Sédatif rapide de la toux et de l'oppression.

Pâte : Pharyngites, Laryngites.

Formes. — Sirop et Pâte de goût agréable.

Sirop : 1 cuillerée à potage renferme 0 gr. 01 de chlorhydrate d'Éthylmorphine, II gouttes Bromoforme, VI gouttes Teinture de racine d'Aconit, VI gouttes Teinture de Drosera, 0 gr. 75 eau distillée de laurier-cerise.

Pâte : 10 grammes renferment 0 gr. 015 de chlorhydrate d'Éthylmorphine.

Posologie :

Sirop : 4 à 8 cuillerées à potage par jour (*adultes*) ;

2 à 4 (*enfants* au-dessus de 10 ans).

Pâte : une vingtaine de bonbons (*adultes*). Moitié pour les *enfants*.

Prix : Sirop : 17 fr. 55 ; boîte : 6 fr. 90.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55,38-75.)

SIROP FAMEL

Antiseptique. — Lactocréosote soluble. Cicatrisant non caustique, bien toléré.

Calmant. — Codéïne, Aconit.

Récalcificateur. — Lactophosphate de chaux.

Doses et mode d'emploi. — *Adultes* : 1 cuillerée à soupe le matin avant déjeuner et une le soir au coucher ; délayer dans infusion chaude non sucrée. En cas de besoin, troisième cuillerée à midi.

Enfants : de 8 à 14 ans : par cuillerée à café ; de 5 à 8 ans : par demi-cuillerée à café ; au-dessous de 5 ans : ajouter dans une tasse à café d'infusion de grains d'orge une demi-cuillerée à café de sirop et donner ce mélange à raison de une ou plusieurs cuillerées par jour, suivant les indications du médecin.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, puissant antiseptique du poumon.

Indications thérapeutiques. — Affections des bronches et du poumon : bronchites chroniques, tuberculose, rhumes négligés, toux. Comme adjuvant dans la grippe, coqueluche, rougeole, scarlatine, pour écarter les dangers de complications pulmonaires.

Prix : 12 fr. 75.

Laboratoires P. FAMEL

16-22, rue des Orteaux — PARIS (XX^e).

SIROP GIRARD

Iodo-tannique

Iode, Tannin, Lactophosphate de chaux.

Mode d'emploi :

Adolescents : 1 cuillerée à soupe avant chaque repas.

Enfants : 1 cuillerée à dessert avant chaque repas.

Propriétés thérapeutiques :

Tonique, reconstituant, reminéralisateur, dépuratif.
Goût agréable. Assimilation parfaite. Le meilleur succédané de l'huile de Foie de Morue.

Indications :

Adénopathies, Lymphatisme, Scrofule, Engorgements ganglionnaires, Hypertrophies amygdaliennes, Végétations adénoïdes, Débilité, Rachitisme, Troubles de croissance et de formation, Toutes convalescences.

Prix : 17 francs.

Pour un traitement de 15 à 20 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — Paris (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-3.

SIROP GRIBELL

Composition. — Baume du Canada « *Prunus virginiana* », Aconit, Codéine, Phosphate de chaux soluble, Baume de Tolu.

Indications. — Toutes les affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour, pur ou dans de la tisane pectorale chaude.

Le flacon : 11 fr. 45.

PATE GRIBELL

Même composition. — Mêmes indications.

La boîte : 4 fr. 20.

SIROP GRIBELL POUR ENFANTS

Formule spéciale ne renfermant aucun principe opiacé.

Mode d'emploi. — Jusqu'à 7 ans, 3 à 5 cuillerées à café par jour. Au-dessus de 8 ans, par cuillerée à dessert, suivant l'âge.

Le flacon : 9 fr. 40.

Laboratoires BELIÈRES

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

SIROP HERCELL

Composition :

Bi-iodure d'Hg	0,005
KI.....	0,25
Extrait végétal de Larrey.....	0,20
Par cuillerée à soupe.	

Forme. — Sirop stabilisé.

Indications. — Toute la thérapeutique par l'Hg dissimulé.

Médicament d'entretien. Tonique et dépuratif bi-iodé.

Doses :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : par cuillerée à café suivant l'âge.

Prix : 22 francs le flacon de 310 cc.

Durée du flacon : dix jours environ.

Enr. au Lab. Nat. de cont., sous le n° 1356-1.

G. MAHÉ, Pharmacien.

85, rue de Trignac

SAINT-NAZAIRE-PENHOET (L.-I.) — Tél. : 115.

SIROP IODOCALCIUM

La forme moderne du sirop iodotannique.

Association iodocalcique assimilable.

Composition :

Gluconate de calcium.....	0 gr. 10
Chlorure de calcium.....	0 gr. 10
Iode en combinaison organique.	0 gr. 01

Par cuillerée à café.

Indications. — Toutes celles de l'iode et de la chaux. Etats de fatigue physiologique de l'enfance et de l'adolescence, lymphatisme, pré-tuberculose, tuberculoses osseuses et ganglionnaires, micropolyadénopathie, etc.

Posologie :

Enfants : au-dessus de 2 ans : 1/2 à 1 cuillerée à café 2 fois par jour.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à dessert, 2 fois par jour.

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France.

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

SIROP LAXATIF GOBEY

Ses principes actifs, exclusivement végétaux, sont incorporés à un sirop à base de sucres de fruits.

Action douce et constante, saveur agréable.
Convient aux enfants et aux vieillards, aux opérés et pendant la grossesse.

Prix : 12 fr. 75.

Il existe également des dragées laxatives Gobey.

Flacon de 50 dragées, prix au public : 9 fr. 55.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

SIROP LECŒUR

Rhus aromatica, Noix vomique, Belladone, Quinquina, Acide phosphorique ; Glycérophosphates calciques, magnésiques, potassiques et sodiques.
Contre l'incontinence d'urine.

Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau, avant les repas ou le coucher.

De 2 à 5 ans : 1 cuillerée à café le 1^{er} et le 2^e soir, 2 cuillerées à café les soirs suivants.

De 5 à 10 ans : 1 cuillerée à dessert les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à dessert les soirs suivants.

Plus de 10 ans : 1 cuillerée à soupe les 2 premiers soirs, 2 cuillerées à soupe les soirs suivants.

Adultes : 1 cuillerée à soupe matin et soir pendant 2 jours, 2 cuillerées à soupe matin et soir les jours suivants.

Prix : 17 fr. 50 le flacon de 187 cc.

Enreg. au L.N.C.M. n° 532-2.

Laboratoires GAVIN, *

VIMOUTIERS (Orne). — Tél. : 22.

SIROP MAUCHANT

(Anciennement dénommé **Bircol Mauchant**.)

Composition et mode d'action. — Le Sirop Mauchant est à la fois :

Sédatif par la Belladone, la Codéine (7 mgr. par cuillerée à bouche), l'Aconit, le Bromure de Sodium.

Expectorant par le Benzoate de sodium, l'Erysimum.

Goût agréable le faisant accepter facilement, même par les enfants.

Indications. — Toutes affections broncho-pulmonaires, bronchites, rhumes, coqueluches, gripes.

Posologie :

Adultes : 4 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Enfants : 1 à 4 cuillerées à café suivant l'âge.

A prendre entre les repas, au moins une heure avant ou deux heures après, pur, ou de préférence dans une tasse d'infusion d'espèces pectorales.

Prix : 12 fr. 55.

• **Laboratoire MAUCHANT**

GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grés. 05-21.)

SIROP MINÉRAL SULFUREUX CROSNIER

Au monosulfure de sodium inaltérable et goudron.
Approbation scientifique de l'Académie de Médecine de Paris.

Indications thérapeutiques. — Succédané avantageux des eaux sulfureuses. Affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, lymphatisme, dermatoses, hydrargyrisme, bismuthisme.

Posologie :

Adultes : 1 cuillerée à soupe de sirop 2 à 3 fois par jour, 1 heure avant ou 2 heures après les repas.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à dessert : de 7 à 14 ans : 2 à 3 cuillerées à café pour ceux de 2 à 6 ans.

Prix : 12 fr. 80. — **Durée moyenne** : 8 à 10 jours.

Voir : « **SUFROL** » **CROSNIER**.

Comprimés ayant les indications du sirop.

Échantillons :

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

SIROP MIREILLE

Le plus agréable au goût, le plus actif pour le traitement polyvalent des affections de l'appareil respiratoire.

Calmant, sédatif de la toux, hypnotique, balsamique, antiseptique, diurétique, expectorant, émollient, sudorifique, à base de bromhydrate de codéine, terpène, aconit, belladone, benzoate de soude, etc.,.

Se prend à toute heure, aucune contre-indication, pas de toxicité, pas d'intolérance, pas d'accoutumance.

Prix au public : 15 francs.

Laboratoires LEGENDRE

Section DS. — HOUILLES (S.-et-O.).

Avec Dépôts Généraux pour la vente en gros :

France et Colonies :

O. C. P., 71, rue du Temple — PARIS (III^e).

Belgique :

M. RAMLOT

72, rue de l'Escaut — BRUXELLES-MARITIME

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1045-2.

SIROP MORLAS

Pour nouveau-nés et enfants.

Iodo-lactate de Hg : 0,001. Fowler 1/10 mgr. par cuillerée à café.

Tonique et spécifique discret pour les petits malades à hérédité douteuse (végétations, glandes, eczéma, convulsions, hérédosyphilis, etc.).

Doses :

Jusqu'à 1 an : 1 cuillerée à café par jour.

De 1 à 3 ans : 2 cuillerées à café, etc...

Échantillons sur demande.

Prix : 16 francs.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1606-9.

Laboratoire MOURÉ

COTARD, Pharmacien,

Passage des Princes — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 82-56.

Dépôt général :

O. C. P., Paris et ses succursales.

SIROP NOGUÈS

Composition :

Alcoolature d'aconit	} <i>aa</i>	0,030
Teinture de belladone		
Teinture de grindelia		0,075
Bromoforme.....		0,016
Codéine.....		0,009
Benzoate de soude.....		0,079
Sirop de Tolu, Desessartz, laurier-cerise.....		Q. S.
pour une cuillerée à bouche.		

Dose et mode d'emploi. — 4 à 5 cuillerées à bouche par 24 heures.

Propriétés thérapeutiques. — Calmant de la toux, incisif, pectoral.

Indications. — Toux quinteuses, bronchites, toutes affections des bronches.

Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

SIROP PECTONAX

Présentation. — En flacon (20 fr. 40).

Principes actifs. — Bromhydrate de codéine, Alcoolature de racines d'aconit, Thiocol (Sulfogaïacolate de potasse), Bromoforme, Benzoate de sodium, Sirop d'eau de laurier-cerise.

Indications. — Affections des voies respiratoires, Rhumes, Laryngites, Trachéites, Bronchites aiguës ou chroniques, Bronchopneumonies, Pneumonies, Coqueluche, Grippe et Complications.

Mode d'emploi. — Adultes : 4 à 5 cuillerées à bouche par jour.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-41.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

SIROP PECTORAL GOBEY

Contient des extraits végétaux sans opium ni dérivés de celui-ci.

Donne toute sécurité, même chez les jeunes enfants.

Indications. — Bronchite aiguë, toux grippales et nerveuses, laryngites striduleuses, séquelles de coqueluche.

Prix au public : 12 fr. 75.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

SIROP POLÉRY

Composition :

Sirop d'érysimum composé	46 gr.
Sirop de polygala	23 —
Codéine.....	0,04
Chl, d'éthylmorphine	0,02
Bromure de sodium.....	0,40
Benzoate de soude	1,75
Eau de laurier-cerise	5,75
Teinture d'aconit	0,75
Teinture de belladone.....	0,95
Sirop simple codex q. s.	100 gr.

Propriétés. — Spécifique des irritations chroniques de la gorge, Antispasmodique, Calmant de la toux, Expectorant, Décongestif de l'appareil pulmonaire supérieur.

Indications. — Toux d'irritation, toux rebelles et chroniques, bronchites, grippe, catarrhe, asthme, enrouements, trachéites, pharyngites, laryngites, toux des tuberculeux.

Présentation et prix. — Le flacon de 240 grammes : 17 francs.

Posologie :

Adultes : 3 à 4 cuillerées à soupe dans les 24 heures, loin des repas.

Enfants : au-dessus de 10 ans, par petites cuillerées à dessert.

L. N. C. n° 1483-2.

Laboratoires Biochimiques de l'Est

J. FRECHIN, Docteur en Pharmacie, Ancien élève de l'Institut Pasteur,
LURE (Haute-Saône).

SIROP RAMI

Au Bromoforme. Spécifique de la toux.

« Le remède d'élection de la muqueuse pharyngée. »

Composition. — Bromoforme-Codéine-Aconit-Tolu-Laurier-Cerise.

Mode d'action. — La formule du sirop Rami, judicieusement équilibrée, en fait un auxiliaire précieux dans le traitement des affections broncho-pulmonaires et un sédatif remarquable du système nerveux et de la toux spasmodique.

Indications. — Laryngites, Pharyngites; Trachéo-bronchites aiguës et chroniques, Coqueluche, Asthme et Emphysème.

Doses par 24 heures. — *Adultes*: 3 à 5 cuillerées à soupe, une à une, espacées, le plus loin possible des repas.

Enfants au-dessus de 5 ans: 3 à 5 cuillerées à café, une à une, espacées, le plus loin possible des repas.

Enfants au-dessous de 5 ans: en mettre une cuillerée à café dans trois cuillerées à café d'eau ou d'infusion, et donner ce mélange par deux cuillerées à café toutes les heures ou toutes les deux heures suivant l'âge.

Prix: 14 fr. 10 le flacon.

Pâte Rami. — Hors de chez soi, elle remplace le Sirop. Elle est plus spécialement destinée aux maux de gorge et aux enrouements, et très appréciée pour la souplesse et la sonorité qu'elle donne à la voix.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 443-1.

LABORATOIRES FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine). (Tél.: Pereire 00-32.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge et le G^a-D. de Luxembourg:

Sirop Rami, 53, rue du Poinçon, Bruxelles.

SIROP « ROCHE » AU THIOCOL

1 cuillerée à soupe de Sirop « Roche » = 1 g. de Thiocol « Roche ».

1 g. de Thiocol « Roche » = 0 g. 52 de gaiacol cristallisé.

Doses et mode d'emploi. = *Adultes*: 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. *Enfants*: 2 à 4 cuillerées à café selon l'âge.

Prop. théér. — Antiseptique pulmonaire, Phagocylogène, Eupeptique, Orexique.

Indic. théér. — Toutes les affections broncho-pulmonaires: Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 504-51.

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e). — Tél.: Archives 91-10.

SIROP SÉDATIF DE L'ENFANCE

Neurocalcium

Composition. — Associe aux vertus sédatives connues depuis longtemps du bromure de calcium les qualités antispasmodiques plus récemment mises en évidence du chlorure et du gluconate de calcium.

Indications. — Tous les syndromes nerveux, spasmodophilie, troubles de la dentition, convulsions, cris, terreurs nocturnes, etc.

Gluconate de calcium 0 gr. 10

Chlorure de calcium..... 0 gr. 10

Bromure de calcium..... 0 gr. 05

Par cuillerée à café.

Posologie. — *Enfants du 1^{er} âge* : 1 à 4 cuillerées à café,
Après 3 ans : 1 à 4 cuillerées à dessert et plus en cas d'accidents aigus.

Il existe une forme granulée plus active. (Voir *Neurocalcium*.)

Laboratoires Biologiques de l'Île-de-France

19, avenue d'Orléans — PARIS (XIV^e).

SIROPS HENRY MURE

Rigoureusement dosés à 2 gr. de sel chimiquement pur par cuillerée à potage et 0 gr. 65 par cuillerée à café de sirop d'écorces d'oranges amères irréprochable.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Potassium.
Maladies du Système Nerveux : Epilepsie, Hystérie, Chorée, Névroses.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Sodium.

Maladies de l'Estomac : Gastralgies, Crampes, Contractures.

Sirop HENRY MURE au Bromure de Strontium.

Maladies du système nerveux sympathique : Estomac, Reins, Intestins.

Sirop HENRY MURE Polybromuré.

Potassium, sodium, ammonium.

Action décuplée des Bromures en association.

Epilepsie, Névroses.

Prix : 18 fr. 70.

L. N. C. 428-5.6.7.8.

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH,
Pharmacien

18, rue des Écoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 18-54.)

SIROP au SOLUCAMPBRE DELALANDE

Pectoral et Eupnélique.

Composition. — Solucamphre, Ephédra total, Codéine et Dioninum, Constituants essentiels du sirop Desessartz (Ipéca et Séné).

Actions thérapeutiques. — Calme immédiatement la toux, relève le cœur et facilite la respiration. Facilite l'expectoration.

Indications. — Toux en général, et en particulier la toux des bronchiteux, la toux spasmodique (coqueluche) et la toux des tuberculeux.

Posologie :

Adultes : de 2 à 4 cuillerées à soupe par jour. Chez les chroniques, des doses moindres suffisent.

Enfants : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix du flacon : 19 fr. 50.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 18-33.)

SIROP TEYSSÈDRE

au Bromure de Calcium pur
Médecine du nourrisson.

Indications thérapeutiques. — Colique des nouveau-nés, Insomnies, Cris et pleurs prolongés, Crispations nerveuses, Vomissements, Diarrhée, Prurit dentaire, Accident de la première dentition, Affections convulsives, etc.

Doses. — Sommeil agité, Nervosité : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Dentition : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Convulsions (pendant les accès), 1 cuillerée à café toutes les 5 minutes.

Convulsions (après les accès), 1 cuillerée à café toutes les 3 heures.

(Se méfier des imitations).

Prix de vente au public : 6 fr. 75 le flacon.

Laboratoire TEYSSÈDRE

74, faubourg d'Angoulême — LIMOGES.

SIROP TINARDON

Iodo-tannique phosphaté.

Contenant pour 100 cc. :

Iode bi-sublimé	0 gr. 15
Extrait sec de ratanhia	1 gr. 10
Lactophosphate de chaux....	2 gr. 25
Sirop d'orange. Q. S. pour 100 cc.	

Posologie. — 2 ou 3 cuillerées à soupe suivant l'âge. (Le flacon contient environ 30 cuillerées à soupe.)

Indications. — Lymphatisme, Adénopathies, croissance difficile.

LABORATOIRE OBERLIN J. TINARDON

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Pharmacie de Paris.

17, rue Cadet — PARIS (IX^e).
(Tél. : Trudaine 14-73.)

SIROP VACHERON

au Gaïacol de Synthèse.

Composition. — Une cuillerée à soupe contient 0 gr. 15 de gaïacol de synthèse cristallisé titrant 100 p. 100 de gaïacol absolu.

Avantages. — Le gaïacol est en solution complète et en dilution étendue, par conséquent sans action sur les fonctions digestives.

Propriétés thérapeutiques. — Calme la toux rapidement. Diminue et facilite l'expectoration. Détruit les germes morbides.

Indications. — Rhumes, Gripes, Bronchites aiguës ou chroniques, Laryngites, Catarrhe pulmonaire, Coqueluche.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 à 4 cuillerées à soupe par jour dans un demi-verre de tisane, lait ou eau à prendre dans l'intervalle des repas.

Enfants : De 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Durée moyenne de l'unité de vente : 10 jours.

Prix public : 16 francs.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

SISTOMENSINE

CIBA

EXTRAIT OVARIEN LIPOIDIQUE.

Action physiologique. — Régularise la fonction menstruelle et limite le flux cataménial. Agit efficacement sur les douleurs dysménorrhéiques.

Indications.

- I. — Flux menstruel trop abondant, ménorragie essentielle des jeunes filles.
- II. — Règles trop fréquentes ou de trop longue durée.
- III. — Douleurs et malaises liés à un flux trop abondant.
- IV. — Troubles de la ménopause, naturelle ou chirurgicale (en association avec l'Agomensine).

Comprimés — Ampoules.

Doses. — 3 à 6 comp. par 24 h. — 1 amp. tous les 2 jours.

Formuler. — Flacon de 40 comprimés.

Flacon de 100 —

Boîte de 4 ampoules.

(Voir LUTOCYCLINE.)

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND
103-117, Boulevard de la Part-Dieu. — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

SITERGOL

Propriétés thérapeutiques et Indications. — Anémies, convalescences, surmenages, fatigues, croissance des enfants.

Composition. — Vitamines A, B, E, P et D. Éléments minéraux et phosphorés tels qu'ils se présentent dans le germe du blé.

Présentation. — En cachets à ouvrir.

Mode d'emploi. — La poudre doit être absorbée délayée dans un liquide tiède.

Posologie :

Adultes : 3 fois par jour, aux repas.

Enfants : 2 fois par jour, aux repas.

Bébés : Le contenu d'un cachet réparti dans les biberons de la journée.

Prix : La boîte de 24 prises : 26 francs.

Laboratoires des PRODUITS L. CHAUVIN

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

(Tél. : Vaug. 21-10.)

SODAMINE

Salicylate de soude cristallisé ...	8 gr. 75
Benzoate d'urotropine	4 gr. 12
Acétate ammoniacque	2 gr.
Essence d'anis	0 gr. 055
Extrait de belladone	0 gr. 033
Teinture aconit	1 gr. 10
Teinture drosera	1 gr. 10
Glycérine	33 gr.
Eau	Q. S. pour 100 cc.

Indications. — Rhinites, sinusites, otorrhées, expectorations purulentes, suites de broncho-pneumonies, pharyngites, laryngites, trachéites.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 3 cuillères à café par jour au moment des repas dans un verre d'eau, de tisane ou grog.

Enfants : 1 à 2 cuillères à café selon l'âge.

Présentation et prix. — Un flacon de 90 cc. : 12 fr. 25.

Capsules glutinisées.

Posologie. — 2 capsules avant les 3 repas, soit 6 par jour, avec une gorgée d'eau.

Prix : 15 fr. 30.

Laboratoires COUSSINET

122, Champs-Élysées — PARIS.

SODERGYL

Modificateur de la Viscosité sanguine.

Composition :

Citrate de soude	12 gr.
Sulfate de soude sec	3 gr. 5
Bicarbonat de soude	4 gr.
Phosphate de soude sec	6 gr.
<i>Hyposulfite de magnésie</i>	1 gr. 50

Forme. — Granulé soluble.

Indications. — Etats congestifs, Hypertension, affections du système veineux, migraines, constipation.

Doses :

Le Sodergyl, *granulé citaté, sulfaté sodique et magnésien*, se prend à la dose de 2 à 4 cuillerées à café par jour avant les repas.

Durée de la boîte : 10 jours environ.

Prix : 15 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1082-3.

A. MIRONNEAU, Pharmacien.

CHEF-BOUTONNE (Deux-Sèvres). (Tél. : 18.)

SODERSÉINE

Indication. — Coqueluche.

Composition. — Bismuth colloïdal obtenu par électrolyse.

Forme. — Solution sans saveur et d'une innocuité absolue (ce qui en rend l'emploi facile même chez les nourrissons).

Doses journalières :

<i>Enfants</i> jusqu'à 6 mois.....	100 gr.
— de 6 mois à 2 ans.....	150 —
— de 2 ans et au-dessus	200 —

(Échelle de doses sur le flacon.)

Prix du flacon de 500 gr. : 12 fr. 25.

J. DEPRUNEAUX, Pharm. de 1^{re} classe,
23, r. du Parc — FONTENAY-SOUS-BOIS (Seine)
(Tél. : Tremblay 12-04.)

SODÉSYL

Paquets de Bourget.

Estomac — Foie — Intestin.

Préparation intégrale de la solution de **Bourget**.

Sulfate de soude.	} Chaque paquet dosé pour obtenir un verre de la solution de Bourget.
Phosphate de soude.	
Bicarbonate de soude.	

Forme. — Paquets.

Emploi et dose. — 1 paquet le matin à jeun dans un verre d'eau de Vichy tiédie au bain-marie.
Enfants : demi-dose adultes.

Indications. — Toutes les applications de la solution de *Bourget* : insuffisance hépatique, congestion du foie, hyperchlorhydrie, gastro-entérite de l'enfance, intoxication intestinale et toutes affections du tube digestif.

Prix : 14 fr. 50.

« Jamais d'insuccès. »

Laboratoire du **SODÉSYL**

R. JACQUET, Docteur en Pharmacie.
VIERZON (Cher).

SODOLACTINE

(Estomac.) Δ 0,38.

Poudre soluble, n'agissant ni comme un alcalin, ni comme un absorbant, ni comme un isolant. De goût très agréable, la *Sodolactine* est le médicament de choix dans la plupart des affections stomacales.

La *Sodolactine* ne modifie pas le chimisme du contenu gastrique, elle *facilite physiquement l'évacuation de l'estomac*.

(Thérapeutique clinique de Martinet, p. 1125.)

Posologie :

Une mesure dans une tasse à *thé* d'infusion ou d'eau tiède.

Après les repas : Hyperchlorhydrie, Dyspepsies hypersthéniques, Aigreurs, Brûlures, Ulcérations, Affections atteignant l'orifice pylorique, Vomissements et nausées de la grossesse, Vomissements des nourrissons (1 cuillerée à café dans un biberon de 120 cc. d'eau bouillie, faire prendre 1 à 2 cuillerées à soupe de cette solution après chaque tétée.)

Avant les repas (un quart d'heure) et le matin à jeun : Hypochlorhydrie, Dyspepsies simples, Dilatations, Atonies gastriques, Digestions laborieuses, Mal de mer.

Remarque importante. — La *Sodolactine* agissant d'une façon physique et non chimique, bien respecter la concentration indiquée : *une mesure par tasse à thé de liquide*.

(A titre indicatif : une tasse à thé 120 cc. ou 8 cuillerées à soupe.)

Prix : 14 fr. 40.

Laboratoires GERDA

163, boulevard Croix-Rousse — LYON.

SODOTHIOL

Composition:

Solution stérilisée pure, isotonique, injectable, de thio-sulfate de sodium (Hyposulfite).

Forme pharmaceutique:

Ampoules de 2 centicubes préparées pour injections hypodermiques, intramusculaires, ou intraveineuses si le médecin le juge utile.

Indications thérapeutiques:

Affections du foie et de la vésicule. — Insuffisance, Lithiase, Coliques hépatiques, Cholécytite calculeuse, Angiocholite lithiasique, Cholémie, Ictère émotif ou catarrhal, Hépatisme, Ascite, etc.

Manifestations arthritiques. — Lithiase rénale, Coliques néphrétiques, Gravelle, Anurie calculeuse, Calculs vésicaux, Rhumatismes chroniques noueux et déformants, Ankyloses fibreuses articulaires, et toutes manifestations arthritiques justiciables de la médication soufrée.

Accidents cutanés récidivants. — Eczémas, Prurits, Dermites, Acnés, Dyshidrose palmaire.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaires, Accidents sériques, Accidents d'origine mercurielle, arsenicale, etc., et toutes manifestations anaphylactiques.

Etats congestifs chroniques des muqueuses respiratoires. — Bronchites chroniques, fétides, Pharyngites chroniques.

Mode d'emploi:

A. *Cure d'assaut.* — 10 injections, une tous les jours.
B. *Cure de fixation.* — 10 autres injections 15 jours, puis deux mois plus tard.

C. *Cure d'entretien.* — 10 injections six mois, puis un an après la première série.

Coliques hépatiques ou néphrétiques. — Les doses peuvent être portées à 2 ou 3 ampoules par jour en période de grande crise.

Dans les cas de *Rhumatismes chroniques* noueux ou déformants et quelques affections cutanées récidivantes, la *Cure d'assaut* comprendra 20 injections à raison d'une par jour, complétée d'une *Cure de complément A bis* après 15 jours de repos.

Manifestations anaphylactiques. — Urticaire chez l'adulte: 2 ampoules chaque jour, en une seule injection, pendant 10 jours. Autres cas d'anaphylaxie, désensibilisation: doses ordinaires.

Le SODOTHIOL étant dépourvu de toute toxicité, son usage pourrait, s'il en était besoin, être prolongé pendant tout le temps jugé nécessaire.

Prescrire:

Sodothiol: 1 boîte d'ampoules.

Prix, la boîte de 10 ampoules: 21 fr. 75.

Enr. L. N. C. M. n° 553-5.

Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE

1 et 3, rue de Malherbe—BEAUVAIS (Oise) (Tél.: 0-50).
Echantillons et Littérature médicale sur demande.

SOJAMINOL

Antianémique complet par acidaminothérapie végétale. Met l'organisme en état d'opérer la synthèse sanguine.

Composition :

Protéolysat de Soja hispida...	0gr,10
— de légumineuses...	0gr,05
Gluconate de fer.....	0gr,05
— de cuivre.....	0gr,002
Bitartrate d'aminotoluyléthyl-carbinol	0gr,01
Pour un comprimé.	

Indications : Toutes les anémies.

Anémies par spoliation sanguine, par carence martiale. Anémies consécutives aux maladies infectieuses et parasitoses sanguines et intestinales.

Anémies de l'enfance, de la formation, de la grossesse. Inappétence, amaigrissement, fatigue générale.

Déficiences organiques. Asthénie.

Présentation : Comprimés dragéifiés pouvant se déliter rapidement dans l'eau.

Mode d'emploi :

Adultes : 6 comprimés par jour.

Enfants : 4 comprimés par jour.

A prendre au moment des repas.

Dose d'entretien pour reconstituer les réserves hématopoiétiques : moitié des doses ci-dessus.

Prix :

L'étui de 60 comprimés : 22 fr. 50.

Laboratoire du Neurotensyl

J.-P. PETIT, pharmacien,

72, boulevard Davout, PARIS (XX^e).

(Tél. : Did. 55-01.)

SOJA « SOYOLK »

Farine intégrale de Soja désodorisée et stabilisée.
Saveur agréable, inaltérable.

Analyse. — Protéines végétales, 43 p. 100 ; Matières grasses, 20 p. 100 ;
Hydrates de carbone solubles, 13 p. 100 (*absence d'amidon*), lécithine.

Vitamines naturelles A. B. D. E.

Valeur alimentaire. — 100 gr. = 370 calories.

1 cuiller à café rase de *Soja-Soyolk* pèse 2 gr. 50 = 9 calories.

1 cuiller à soupe rase de *Soja-Soyolk* pèse 7 gr. 50 = 27 calories.

Indications et mode d'emploi :

Adultes : **Diabète** (ration restreinte d'hydrates de carbone). **Infection intestinale.** Colites, Colibacilluries (le *Soja* acidifie urines et fèces, sans engendrer de toxines).

Incorporer 5 à 10 p. 100 de *Soja-Soyolk* aux aliments (potages, purée).

Nourrissons : **Intolérances au lait, Dyspepsie, Eczéma.**

Dans les *troubles aigus*, utiliser dès le 2^e mois le biberon suivant (de valeur calorique : 86 cal. p. 100) : Pour 100 gr. de préparation effectuée à l'eau *Soja-Soyolk*, 7 gr. 50 (1 cuillerée à soupe rase) ; Crème de riz : 10 gr. (1 cuillerée à soupe rase) ; Sucre : 5 gr. (1 morceau).

Saler légèrement, cuire à feudoux et malter à l'aide d'une cuiller à café d'extrait de malt.

Dans les *troubles chroniques* et pour une alimentation exclusive de longue durée, il faut additionner la préparation d'un peu de lait. Dans ce cas utiliser le **Végé lact** qui est l'aliment complet du régime lacté restreint.

La boîte de 350 gr. Prix : 8 fr. 50.

SOJALOSE

Aliment exclusivement végétal, sans lait, sans sucre.

Farine d'un biscuit de blé contenant 45 p. 100 de *Soja-Soyolk*.

Composition. — Pour 100 : Matières protéiques, 27 ; Hydrates de carbone, 42 ; Matières grasses, 12 ; Sels calciques, 6.

Valeur alimentaire : 1 cuiller à café de *Sojalose* = 1 cuiller à soupe de lait de vache = 10,3 calories.

Indications :

Enfant bien portant : préparée au lait et sucrée, la *Sojalose*, riche en matières azotées, facilite le sevrage. Pour une bouillie de 100 gr., utiliser :

Sojalose : 1 cuiller à soupe (8 gr.) ; Lait de vache : 2 cuillers à soupe, 1 morceau de sucre ; Eau : Q. S. p. 100. (Valeur calorique = 75 calories p. 100.)

Enfant malade, atteint d'eczéma ou de troubles gastro-intestinaux vers le 8^e mois, la *Sojalose* préparée à l'eau peut être utilisée après le *Végé lact*.

Adultes : Alliée ou non à la farine de *Soja-Soyolk*, la *Sojalose* permet de varier l'alimentation des *diabétiques*. Bouillies, potages, entremets pour Colitiques, Convalescents et Vieillards.

Sojalose : la boîte de 350 gr. : 9 francs. La boîte métal de 1 kg. : 24 fr. 50.

Prix spéciaux par quantité.

LABORATOIRES BOUTROUX,

fournisseurs de l'Assistance Publique,

25, rue du Général-Foy — PARIS (VIII^e). (Tél. : Lab. 08-51.)

SOL-BI FRAISSE

Bismuth Lipo-Soluble.

Composition. — Campho-Carbonate de Bismuth.

Indications. — Anti-Syphilitique. Traitement d'attaque, aussi actif que l'Arsénobenzol.

Forme. — En ampoules de 2 cc. (boîte de 6 ampoules).

Posologie. — 2 ampoules par semaine dans le tissu musculaire.

Prix : Boîte de 6 ampoules : 18 fr. 35 (2 à 3 semaines de traitement).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 370-9.

Laboratoires FRAISSE Père et Fils

8, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

SOLHERMOL

« MÉTÈRE »

Composition :

Mercure en solution huileuse colloïdale contenant 0,15 mgr. de métal par cc.

Indications :

Toutes les Indications du Mercure dans le traitement anti-syphilitique. Traitement mixte arsenico-mercuriel. Manifestations tertiaires. Traitement d'entretien ou de consolidation.

Posologie :

Ampoules de 5 cc. ou 2 cc. pour injections intramusculaires, 2 injections par semaine, 10 piqûres par série. En même temps prendre 2 capsules par jour de Solhermol-capsules par la bouche.

Laboratoire MÉTÈRE

24, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Molitor 03-91.)

SOLUBÉOL

Composition. — Solution aqueuse d'huiles essentielles provenant exclusivement de produits de distillation de plantes fraîches, sans adjonction d'aucun produit de synthèse.

Formule par cc. :

Cupressus sempervirens.....	0,0175	Hyssopus officinalis.....	0,0025
Citrus bigaradia.....	0,0275	Lavandula officinalis.....	0,0025

Sérum physiologique q. s. pour 1 cc.

Indications. — Toutes les affections et infections des bronches et des poumons :

a. Affections aiguës : trachéite, bronchite, broncho-pneumonie, congestion pulmonaire, abcès du poulmon, gangrène pulmonaire.

b. Affections chroniques : bronchite chronique, emphyseme pulmonaire, dilatation des bronches.

Tuberculose pulmonaire subaiguë et chronique.

Agent de désinfection générale.

Présentation :

A. Ampoules de 3 cc. Boite de 8 ampoules.

— 5 cc. —

— 10 cc. —

Injectons sous-cutanées, intramusculaires, ou intraveineuses en cas d'urgence.

B. Gouttes (solution alcoolique).

— (essences pures).

C. Suppositoires Adultes Boite de 8 suppositoires.

Enfants —

Bébé —

Enregistré au L. N. C. M. sous les nos 938-8, 9, 10.

L. CHAUVIN, Pharmacien

3, rue de Vouillé — PARIS (XV^e).

SOLUCALCINE

Chlorure de calcium pur et stable.

Composition. — Préparée à partir du calcium et de l'acide chlorhydrique purs, cette solution concentrée est stable et ne présente pas d'oxychlorures, même à la longue.

XXX gouttes de la solution contiennent 1 gramme de chlorure de calcium.

Action. — Le chlorure de calcium est un recalcfiant, un antihémorragique, un déchlorurant, un anti-hémoclasique.

Indications. — Tuberculose et pré-tuberculose. Hémorragies internes. Hémorragies opératoires, chirurgicales et obstétricales (traitement préventif), Spasmophilie, Tétanie, Eclampsie, Urticaire, Asthme, Rhume des foins.

Accidents post-sériques. Ascite, Œdèmes.

Posologie et mode d'emploi. — Doses faibles comme recalcfiant.

Doses fortes comme antihémorragique et déchlorurant.

Doses moyennes pour les autres indications.

Doses faibles : 1 gr., soit XXX gouttes par jour, en deux fois.

Doses fortes : 4 à 6 gr., soit CXX à CLXXX gouttes par jour en deux fois.

Faire tomber les gouttes dans 1/4 de verre d'eau très sucrée ou de vin à prendre pendant les repas.

Prix : 17 francs.

Laboratoires du Docteur COIRRE

5, boulevard du Montparnasse — PARIS. (Tél. : Ségur 02-79.)

SOLUCALYPTINE LE BRUN

Solution non huileuse se dissociant *in vivo* en donnant les produits du métabolisme intermédiaire normal dans l'organisme, d'où tolérance parfaite évitant les inconvénients des excipients huileux.

Composition par cc. :

Eucalyptol	0 gr. 15
Gaïacol.....	0 gr. 03
Camphre	0 gr. 10

Formes et posologie :

Ampoules de 2 cc. gaïacolées ou non gaïacolées, pour injections sous-cutanées ou intramusculaires.

Adultes : 2 à 4 centimètres cubes par jour.

Enfants : 1 à 2 centimètres cubes —

Nourrissons : 1/2 à 1 centimètre cube —

Avantages :

Injection facile et indolore.

Tolérance parfaite.

Absence absolue de réaction locale.

Propriétés et indications thérapeutiques :

Les mêmes que celles de
l'EUCALYPTINE LE BRUN.

Toutes infections broncho-pulmonaires
médicales ou chirurgicales.

Laboratoires LE BRUN

5, rue de Lübeck — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Kléber 71-33.)

SOLUCAMPHRE

ASSOCIATIONS DIVERSES

Solucamphre adrénaliné. — *Solution d'adrénaline naturelle à 0,50 p. 1 000 dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules 2 cc. : 17 fr. 85. Gouttes : 19 fr. 40.

Une ampoule ou LX gouttes correspondent à 0 gr. 001 d'adrénaline, 0 gr. 20 de camphre.

Cardiotonique dans les états dépressifs. Antichoc.

Solucamphre caféiné. — *Camphosulfonate de caféine, à 15 p. 100 en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules 2 cc. : 17 fr. 85. Gouttes : 19 fr. 40.

Une ampoule ou LX gouttes correspondent à 0 gr. 20 de Caféine, 0 gr. 20 de Camphre.

Cardiotonique vrai, Augmentation de l'activité fonctionnelle du cœur par meilleure irrigation, Augmentation de la diurèse.

Solucamphre cholestériné. — *Cholestérine 2,50 p. 100 ; Lécithine, 2,50 p. 100 en suspension colloïdale dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 12 ampoules 2 cc. : 27 fr. 55.

A utiliser en remplacement des huiles Cholestérinées et Lécithinées. Dans le traitement de la prébacillose et dans les états de prédispositions acquises (Asthénie, Surmenage, Amaigrissement, etc.).

Solucamphre éphédriné. — *Camphosulfonate d'éphédrine naturelle en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 85. Gouttes : 19 fr. 40. Comprimés : 13 fr. 75.

Une ampoule, XXX gouttes ou 2 comprimés correspondent à 0 gr. 04 d'Ephédrine, 0 gr. 20 de Camphre.

Cure et prophylaxie :

1° De la crise d'asthme, de la dyspnée et des spasmes bronchiques ;

2° De la dépression circulatoire (anesthésie) ;

3° Des accidents allergiques (Rhume des foin, urticaire, eczémas aigus, etc.).

Solucamphre gaïacolé. — *Camphosulfonate de Gaïacol et de Strychnine, en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 85.

Une ampoule correspond à 0 gr. 025 de Gaïacol, 1/2 milligramme de Strychnine, 0 gr. 20 de Camphre.

Traitement des affections des voies respiratoires, bronchites, pneumonies, gangrène pulmonaire, etc...

Solucamphre quininé. — *Camphosulfonate de Quinine 30 p. 100 en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 27 fr. 55. Comprimés : 24 fr. 50.

Une ampoule ou 3 comprimés correspondent à 0 gr. 418 de Quinine base, 0 gr. 20 de Camphre.

Traitement des grands états fébriles. Traitement spécifique de la pneumonie. Injection *seulement* par voie intramusculaire.

Solucamphre spartéiné. — *Camphosulfonate de spartéine en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 85. Boîtes de 6 ampoules de 5 cc. : 25 fr. 50. Gouttes : 19 fr. 40. Comprimés : 13 fr. 75.

Une ampoule de 5 cc. correspond à 0 gr. 05 de Spartéine et 0 gr. 50 de Camphre.

Une ampoule de 2 cc., 5 comprimés ou XXX gouttes correspondent à 0 gr. 05 de Spartéine et 20 gr. de Camphre.

Tonicardiaque puissant, particulièrement indiqué dans le traitement des troubles cardiaques d'origine nerveuse (arythmie, asystolie, palpitations, etc.).

Solucamphre Strychniné. — *Camphosulfonate de Strychnine en solution dans le Solucamphre.*

Prix : boîtes de 6 ampoules de 2 cc. : 17 fr. 85. Gouttes : 19 fr. 40.

Une ampoule correspond à 0 gr. 001 de Strychnine, 0 gr. 20 de Camphre.

CXX gouttes correspondent à 0 gr. 001 de Strychnine, 0 gr. 80 de Camphre.

Toutes les défaillances cardiaques avec asthénie et adynamie, torpeur. Neurosthénique indiqué dans les convalescences.

Laboratoires Michel DELALANDE

16, rue Henri-Regnault — COURBEVOIE (Seine).

(Tél. : Défense 18-33.)

SOLUCAMPHRE DELALANDE

Dérivé du camphre naturel, soluble dans l'eau, succédané de l'huile camphrée.

Avantages. — Injection facile et indolore. Résorption immédiate, d'où action plus vive et plus vigoureuse. Injection intraveineuse sans danger. Toxicité nulle. Le Solucamphre à base de Camphosulfonate de pipérazine a une action beaucoup plus prolongée que le camphosulfonate de soude et se rapproche à ce point de vue de l'huile camphrée.

Action physiologique. — L'action du Solucamphre rappelle en tous points celle du camphre.

Il agit sur le myocarde en renforçant les contractions et sur le pneumogastrique en régularisant celles-ci.

Mode d'emploi:

Ampoules : 2 à 8 cc. par jour en médecine. 2 cc. en intraveineuse, 10 à 15 cc. en chirurgie.

Gouttes : XXV à C gouttes par jour dans un peu d'eau sucrée.

Présentation. — Boîtes de 6 ampoules de 1 cc., 2 cc. et 5 cc., gouttes et comprimés.

Prix : 6 ampoules de 1 cc., 12 fr. 25 ; 6 ampoules de 2 cc., 15 fr. 80 ; 6 ampoules de 5 cc., 22 fr. ; Gouttes, 17 fr. 35 ; Comprimés, 13 fr. 75.

SOLUDAGÉNaN

(dérivé sodé du Dagénan-693)

Antibactérien polyvalent injectable.

Indications. — Mêmes indications que le *Dagénan* (voir ce produit). A utiliser plus particulièrement dans les cas où il y a lieu de ménager la susceptibilité gastrique des malades.

Présentation. — Solution à 33,3 p. 100. Ampoules de 3 cc. (1 ampoule = 1 gr. de 693.) Boîtes de 10. Pour hôpitaux et cliniques : boîtes de 50 ampoules.

Posologie. — 1° *Dagénan* + *Soludagénan* : à la dose de *Dagénan* la mieux tolérée, ajouter la quantité de *Soludagénan* nécessaire pour atteindre la dose journalière voulue en 693.

2° *Soludagénan* seul (pour le cas exceptionnel d'intolérance complète au *Dagénan*) : 2 à 3 ampoules par jour ou plus dans les cas graves.

Injections intramusculaires profondes. La voie intraveineuse ou intra-rachidienne peut être exceptionnellement utilisée sous réserve de diluer la solution par addition de sérum physiologique de façon à obtenir une concentration de 10 à 5 p. 100

Prix de vente : 30 francs.

Société Parisienne d'expansion chimique
« SPECIA »

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

SOLUDERM

Solution.

Usage externe.

Veratrol	0 gr. 0048
Acide salicylique	1 gr. 96
Métadioxybenzine	0 gr. 0004
Hydrate de chloral	0 gr. 016
Acide carbolique	0 gr. 98

Indications. — Dermites et épidermites microbiennes ou parasitaires, c'est-à-dire : intertrigos rétro-auriculaires, inguinaux, sous-mammaires ; épidermites, épidermophyties, impétigo, érythème fessier du nourrisson, prurits anaux, pityriasis versicolor et certains pityriasis du cuir chevelu, pieds sportifs, prurits, acné.

Mode d'emploi. — Imprégner les parties malades deux à quatre fois par jour à l'aide d'un tampon de coton largement imbibé de Soluderm.

Laboratoires ODINOT

21, rue Violet — PARIS (XV^e).

(Tél. : Ség. 69-13.)

SOLUPHÉDRINE

(Solution aqueuse)

Action décongestive et analgésinante rapide, intense, durable.
Toxicité nulle.

Action régulière sans aucun palier sur la muqueuse nasale qui présente à son égard une grande tolérance.

Grande diffusibilité.

Composition — 1° Une petite proportion bien déterminée de phényl propionate d'éphédrine ; action immédiate sur la muqueuse nasale ; 2° une proportion plus grande de gluconate d'éphédrine : action lente et très prolongée ; 3° un mélange à partie égale de phénylpropionate et de gluconate de paraminobenzol diéthyl-amino-éthanol : action anesthésique rapide intense et de longue durée.

Présentation :

1° En flacon compte-gouttes (Frs. 18,75).

2° Avec pulvérisateur spécial (Pulvo-Soluphédrine) (Frs. 26).

3° 1 flacon de recharge pour Pulvo (Frs. 16,15).

Mode d'emploi :

En instillation : 4 à 5 gouttes dans chaque narine 2 à 3 fois par jour (enfants au-dessous de 5 ans : demi-dose).

En pulvérisation (Pulvo-Soluphédrine) : pulvériser dans chaque narine 3 à 5 fois par jour.

Indications : Prophylaxie et traitement des affections nasales : Coryza, rhume des foins, sinusites, catarrhe rhino-pharyngien, grippe, états asthmatiformes.

Publicité strictement médicale.

Laboratoires M. de RIVE.

J.-O. MOITY, Docteur en médecine, Docteur en Pharmacie, ancien interne des hôpitaux de Paris.

Services Commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert — PARIS (XX^e).

SOLU-PLASTOL

Composition. — Mêmes principes actifs que le *Dermo-Plastol* (acide orthoxybenzoïque, huiles essentielles d'origine végétale, huile pyrogénée, tuménol, poudres absorbantes), mais incorporés à un excipient aqueux exempt de corps gras.

Indications. — 1° Remplace comme pansement de jour le *Dermo-Plastol* dans les eczémas et les dermatoses analogues ;

2° Spécialement indiqué dans le cas où les corps gras sont mal supportés (intolérance de certains malades à l'égard de la vaseline par exemple).

Forme. — En tube de 60 grammes.

Posologie. — Appliquer en couche *peu épaisse*. Le nettoyage de la peau s'obtient facilement en lavant l'endroit malade avec précaution, au moyen de coton hydrophile imbibé d'eau tiède (ne pas frotter).

Laboratoires DUMESNIL

10, rue du Plâtre — PARIS.

SOLUPROTINE « ROCHE »

Solution à 10 p. 100 de Protéine Solubilisée (Peptone de Caséine « Roche ») de composition constante, stérilisée et inaltérable.

Indications. — Toutes celles de la Protéinothérapie.

Posologie. — Injections intramusculaires.

États aigus : doses croissantes de 1/4 à 1 cm³, tous les 2, 3 ou 4 jours.

États subaigus et chroniques : de 1/2 à 2 cm³, tous les 2, 3 ou 4 jours.

Injections endoveineuses. — De 1/4 à 1/2 cm³ dans 10 cm³ de sérum physiologique pour une injection tous les 3 ou 4 jours.

Boîte de 12 ampoules de 1 cm³.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-34.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e) — Tél. : Archives 91-10.

SOLUSEPTAZINE

p (γ phényl-propyl) amino-phényl
sulfamide α — γ disulfonate de sodium.

Dérivé soluble de la *Septazine*. Solution aqueuse injectable à 6 p. 100 de sel. Toxicité nulle, activité très marquée sur le streptocoque. Médication complémentaire des traitements par la *Septazine*.

Indications. — Mêmes indications générales que la *Septazine* : érysipèle, streptococcémies, fièvres puerpérales, scarlatines graves, phlegmons, angines graves, phlébites, gripes compliquées d'infections pleuro-pulmonaires.

Présentations. — Ampoules de 5 et 10 cc. (boîtes de 5 ampoules), pour hôpitaux et cliniques (boîtes de 25 ampoules).

Mode d'emploi et Posologie. — Injections intramusculaires 10 à 20 cc. en 1 fois ou Injections intraveineuses 20 cc. en 1 fois pouvant être renouvelées 2 à 3 fois par jour.

Enfants : 20 à 30 cc.

Nourrissons : 20 cc. en 2 fois.

Traitement mixte avec la *Septazine* dans les cas graves.

Prix de vente :

Boîte de 5 amp. 5 cc. 16 fr.
Boîte de 5 amp. 10 cc. 26 fr. 50

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPÉCIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

SOLUTION CARDOSOL

Composition par 100 grammes.

Berberis vulgaris.....	0,4138
Carduus marianus	0,4229
Chelidonium majus	0,4653
Fumaria officinalis.....	0,4080
Hydrastis Canadensis.....	0,4850
Mentha piperita	0,3930
Mercurialis annua.....	0,3765
Taraxacum	0,5355
Glycérine.....	4,5000
Soluté alcalin.....	92

Propriétés thérapeutiques. — Calme et décongestionne.

Indications principales. — Lithiase biliaire, Rénale, Intestinale ; Coliques hépatiques ou néphrétiques, Insuffisance hépatique ou rénale, Angiocholite, Cholécystite, Cholémie, Ictère, Cystite, Pyélonéphrite calculeuse, Rhumatisme biliaire.

Mode d'emploi. — Se prend par verre à porto :

1° Le matin au réveil ; 2° Vers 9 heures ; 3° Vers 16 heures ; 4° Le soir au coucher.

Prix. — Le flacon : 16 francs.

Laboratoire du CARDOSOL

Michel BAGROS, Pharmacien,

32, rue Mortinat — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 34-23.)

SOLUTION DU D^r DEBAT

Bactéricide et Mitogénétique.

Cette solution cicatrisante stable possède un pouvoir stimulant sur la multiplication cellulaire comparable à celui des sucs embryonnaires.

Cette formule répond aux deux exigences de la réparation des tissus ; assurer l'asepsie de la plaie, provoquer une reconstruction rapide.

Indications. — Plaies traumatiques ou chirurgicales, Plaies variqueuses et affections cutanées à cicatrisation lente, Ulcérations, Perte de substances, Escarres, Lésions infectées.

Mode d'emploi. Nettoyer la lésion à l'eau bouillie, appliquer une compresse imbibée de Solution du D^r Debat ; renouveler le pansement chaque jour.

Toutefois, pour éviter l'arrachement trop fréquent des bourgeons, on pourra laisser la compresse en place pendant 2 ou 3 jours, en prenant soin de l'humecter avec la solution toutes les 24 heures.

Présentations :

En flacons de 150 cc. : 8 fr. 50.

En flacons de 250 cc. : 12 fr. 50.

Échantillons.

Laboratoires du D^r F. DEBAT

60, rue de Monceau — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 72-73.)

SOLUTION DU Dr J. JACOBSON

Composition :

Solution huileuse d'éther benzyl cinnamique.

Forme : Ampoules de 1 cc.

Indications :

Lésions inflammatoires tuberculeuses : ganglionnaires, articulaires, testiculaires, buccales, laryngées, vésicales, et non tuberculeuses : salpingites, périviscérites. Trachome, opacités cornéennes, certains cas de surdité

Posologie et mode d'emploi :

1 injection intramusculaire quotidienne pendant 12 jours. Faire trois séries séparées par deux intervalles de 15 à 18 jours.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 24 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. n° 514-73.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

SOLUTION DU Dr WATELET

A l'extrait sec de quinquina sans alcool ni sucre.

Composition. — 0 gr. 50 extrait sec des meilleurs quinquinas sauvages, par cuillerée à soupe.

Propriétés. — Tonique par excellence.

Indications. — Anémie, Anorexie, Convalescence.

Doses :

Adultes : 1 cuillerée à soupe avant les repas.

Enfants : 1 cuillerée à café avant les repas.

Prix : 17 fr. 85.

Laboratoires BLANCHOT

15, avenue du Parc-Montsouris

PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gob. 03-09.)

SOLUTION HEPATOUM

Composition. — Solution alcalino-glycérinée d'un macéré de plantes fraîches.

Mentha piperita.....	0 gr. 215	Anemona hepatica....	1 gr. 500
Curcuma xanthoriza ..	0 gr. 015	Ononis spinosa.....	0 gr. 705
Ocimum basilicum ...	0 gr. 573	Piscidia erythrina.....	gr. 058
Corydalis formosa.....	0 gr. 601		

Eau minérale naturelle du bassin de Vichy, Glycérine Codex et excipient spécial pour extraction des principes actifs Q. S. pour 100 grammes.

Atoxique, goût très agréable. Cholagogue complet (cholérétique, cholécystokinétique à action douce). Sédatif. Déplétif.

Indications. — Toutes affections douloureuses ou congestives du foie, de la vésicule biliaire, des reins, de la vessie. La *Solution Hepatoum* est la médication spécifique de la Lithiase biliaire ; guérit la colique, élimine le calcul. Par son action décongestive, la *Solution Hepatoum* agit également sur les douleurs menstruelles.

Posologie. — *Adultes* : par verre à madère. *Enfants* : par verre à liqueur. *Crises aiguës* (Coliques hépatiques, néphrétiques, menstruelles) : 1 verre de 5 en 5 minutes jusqu'à l'obtention du calme.

Laboratoire HEPATOUM

150, rue de Paris — PANTIN (Seine).

(Tél. : Botzaris 12-25.)

SOLUTION HUILEUSE AU NESTOSYL

Anesthésie de surface par contact

Caractéristiques. — Voir à la rubrique Nestosyl.

Indications. — 1) Anesthésie des muqueuses ou des plaies : cathéters et bougies exploratrices ou dilatatrices, cystite, cautérisations, rectoscopie, changement de pansements, etc. ; et, d'une façon générale, tous examens et interventions superficielles d'urologie, gynécologie, oto-rhino-laryngologie, stomatologie et soins cliniques. 2) Analgésie des Plaies, brûlures, démangeaisons, inflammations, éruptions et excoriations, soit comme médication d'urgence avant l'emploi continu de la pommade, soit comme médication à suivre, dans les cas où l'excipient huileux est plus particulièrement indiqué (certains eczémas rebelles aux pommades, douleurs de la dentition chez les enfants, dents cariées, otites, etc...).

Posologie. — Anesthésie des canaux : Instiller quelques cmo. dans le canal quelques minutes avant d'introduire l'instrument enduit lui-même de solution. Anesthésie de la vessie : instiller quelques cmo. (dose générale suffisante : 15 à 20 cmo.). Anesthésie des plaies et muqueuses : nettoyer et sécher la région à insensibiliser et la recouvrir de solution par badigeonnage, pulvérisation, aspersion, instillation, mèche ou compresse ; pour obtenir un effet prolongé, maintenir en contact par un pansement. Anesthésie rectale : une cuillerée à entremets introduite avec une poire suivant les besoins. Anesthésie vaginale : tampon vaginal imbibé de solution.

Prix : 16 fr. 30. — L. N. C. 581-2.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII*).

(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr. : Labobod — Paris.

SOLUTION PAUTAUBERGE

Composition.

Par cuillerée	{ créosote pure de hêtre.....	0 gr. 10
à potage	{ chlorhydro-phosphate de chaux.....	0 gr. 50

Action. — A l'action antiscarrhale, antiseptique et cicatrisante de la créosote, elle joint l'action tonique et récalcifiante du chlorhydro-phosphate de chaux, le plus assimilable des sels de chaux.

Grâce à sa forme de solution complète et bien diluée, elle est toujours bien supportée par l'estomac.

Indications. — Toutes les affections broncho-pulmonaires : bronchite chronique — rhumes — catarrhes — complications de la grippe — pré-tuberculose — tuberculose — coqueluche.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à potage par jour.

Enfants au-dessus de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à dessert par jour

Enfants au-dessous de 5 ans : 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Mode d'administration. — De préférence avant les repas dans un demi-verre d'eau sucrée ou gazeuse, de café léger ou de bière.

Prix : 9 fr. 50 le flacon de 350 cc. (6 à 10 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 26-47.)

SOLUTION QUINQUINA BARDET

Solution d'Extraits secs de Quinquinas.

Adoptée par le Ministère des Colonies.

Composition. — Solution, *sans sucre et sans alcool*, contenant 0 gr. 50 de principes actifs par cuillerée à soupe et titrant au minimum 10 p. 100 d'alcaloïdes totaux.

Propriétés thérapeutiques. — Teneur constante en principes actifs assurant une action rapide et fidèle. Tonique de premier ordre. Fébrifuge à forte dose.

Indications thérapeutiques. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Convalescences ; Lymphatisme. Pyrexies diverses, Paludisme en particulier.

Mode d'emploi et doses :

Tonique : *Adultes* : 1 cuillerée à soupe ; *Enfants* : 1 à 2 cuillerées à café, au début des 2 repas principaux.

Fébrifuge : *Adultes* : 4 à 5 cuillerées à soupe ; *Enfants* : 4 à 8 cuillerées à café par 24 heures.

Laboratoire National de Contrôle 518-5.

Échantillons et Littérature :

LABORATOIRES BARDET

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e) :

SOLUTION SCHOUM

Du Docteur de Lannoïse.

FOIE, REINS, VESSIE

Composition. — Solution chloroformée et glycerinée d'extraits de plantes décongestives, cholagogues et calmantes (menthe, bugrane, basilic, corydalis, etc.) dans eau minérale naturelle du bassin de Vichy (et non eau bicarbonatée).

Propriétés. — SCHOUM est le spécifique de toutes les affections cellulaires du foie, des reins, de la vessie et de l'utérus comme calmant et décongestif. Il calme en quelques minutes les crises hépatiques, néphrétiques, vésicales ou menstruelles ; il peut même les prévenir.

Décongestif et antitoxique, il donne des *résultats absolus* dans les lithiases biliaires et rénales ainsi que dans leurs complications ; ces résultats sont obtenus par désagrégation, puis dissolution des calculs qui se transforment en sable facilement entraîné.

L'urémie et l'albuminurie de *cause rénale* sont jugulées en quelques jours.

Mode d'emploi. — 6 verres à madère par jour pendant 12 jours, puis descendre à 4 verres pendant 1 semaine. Dans les cas graves ou très anciens, prolonger la dose de 6 verres pendant 15 à 18 jours ; enfin, en cas d'urgence, 1 flacon par jour à raison d'un verre toutes les 2 heures, pendant plusieurs jours.

N. B. — Douce d'une saveur particulièrement agréable, d'une innocuité absolue et garantie, la SOLUTION SCHOUM a donné depuis 40 ans des résultats remarquables ; elle constitue la boisson de choix, « utile et agréable », des fébricitants et des anuriques. C'est enfin le « préventif » recommandé pour l'appareil hépatique des colonaux.

Laboratoire SCHOUM

Maurice PY, Pharmacien de 1^{re} classe,

15, rue de la Sablière — BÉCON-LES-BRUYÈRES
(Seine).

(Tél. Défense 12-33.)

SOLUTION TISCH

CURE HÉPATO- ALCALINE

Composition. — Solution alcaline à base de sucres de plantes fraîches, reconnues pour leurs vertus cholagogues, hépatiques et stomacales.

Originalité. — Préparation très agréable, ne contient ni sucre, ni alcool, ni opium ou dérivé, ni iodure ou composé iodé.

Le seul produit du genre réalisé scientifiquement : solution préparée et filtrée mécaniquement, remplissage et capsulage automatiques des flacons : toutes conditions nécessaires à une asepsie rigoureuse.

Indications et posologie. — Se prend par verre à madère, soit 50 gr.

Affections du foie : de 2 à 6 verres par jour.

Crises douloureuses (foie, estomac, reins) : par verre tiédi, de 10 en 10 minutes, jusqu'à cessation des douleurs.

Stimulant hépato-biliaire : 1 verre le matin à jeun.

Eupeptique : 1 verre 1/2 heure avant le repas.

Accélération des fonctions digestives : un verre 2 à 3 heures après le repas.

En résumé, toutes les indications de la cure alcaline.

Présentation. — Grand flacon de plus de 500 cc.

Le « Tisch » est de prescription strictement médicale.

Laboratoire National de Contrôle : n° 1.555-4.

Laboratoires Paul HARDY,
Docteur en Pharmacie

Ex-Interne des Hôpitaux de Paris, prix Flon 1922,
Lauréat de la Faculté de Pharmacie,
ancien Chef de Laboratoire.

42, boulevard Saint-Marcel — PARIS (V°).

(Tél. : Gob. 36-96.)

SOLVURIC

Forme. — Granulé effervescent à base de formine et benzopyruvate de soude et de lithine.

Indications. — Arthritisme, Goutte, Gravelle, Artériosclérose, Antisepsie urinaire.

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau.

Prix : 17 fr. 75.

Laboratoire MAUCHANT
à GENNEVILLIERS (Seine)
(Tél. : Grésillons 05-21.)

SOMNICONES

Suppositoires hypnotiques, sédatifs et antipasmodiques.

Composition. — Chaque Somnicone contient :

B.-éthyl-mal-urée	0 gr. 20
Scopolamine	1/10 ^e milligr.
Extrait de Valériane	0 gr. 10

Propriétés. — Assurent un sommeil calme, tranquille et réparateur sans mauvais réveil et sans aucun trouble des fonctions digestives. Action lente et progressive. Calmants électifs des centres hypnogènes.

Indications. — Insomnies au cours des affections les plus variées : Algies de toutes natures (Sciatique, Douleurs tabétiques, Névralgies). Excitations cérébrales, Douleurs méningées, Préoccupations obsédantes, Nervosisme, Céphalées, Vomissements d'ordre central, Mal de mer, etc.

Posologie. — Un Somnicone en se couchant. Si l'effet semble insuffisant, en introduire deux ensemble ou l'un après l'autre.

Formuler : Somnicones. Une boîte.

Prix : 15 francs.

Laboratoire BÉRAL
194, rue de Rivoli — PARIS.

SOMNIFÈNE « ROCHE »

Dialcoyl-barbiturates de diéthylamine.

Le plus maniable des hypnotiques.

C. F. trav., observ., serv. des Professeurs Raviart, Abadie, Claude, Crouzon, Laignel-Lavastine, Weiss, Étienne, Anglade, Roger, Perrens, Cloëtta, Gelma, Combemale, Fredet, Cleisz, Gayet, S. Banus et des Dr^s Perlis, Vullien, Assoignon, Kindler, Boisière, Jourdan, Journiac, de Teys-sieu, Hamant, Bénech, Redonnet, G. et D. Bardet, etc., etc.

Indications thérapeutiques. — Toutes les insomnies simples ou compliquées, Agitation, Délires, Convulsions, Troubles mentaux, Troubles nerveux, Épilepsie, Tétanos, etc.

SOMNIFÈNE « ROCHE » Gouttes

Flacon de 12 cm³.

Solution aromatisée pour atténuer la saveur spéciale du produit, ne pouvant être utilisée pour injections, permettant de *donner à chacun sa dose*, que l'on peut ainsi augmenter ou diminuer à volonté.

Doses habituelles. — XXX à XLV et LX gouttes (et plus) dans 1/2 verre d'eau ou de tisane, 1/2 heure avant de se coucher ou dans la nuit.

Enfants : V à X et XV gouttes (selon l'âge).

SOMNIFÈNE « ROCHE » Ampoules

Ampoules de 2 cm³. (Boîte de 6)
pour injections intramusculaires.

1 à 3 ampoules (Intolérance gastrique, refus du malade, agitation intense, troubles mentaux, etc.)

Ampoules de 5 cm³. (Boîte de 3)
pour injections endoveineuses.

Delirium tremens, Éclampsie, Tétanos, État de mal épileptique, etc.

Enregistrés au Lab. Nat. de Contr. des Médicaments
sous les n^{os} 504-36 (gouttes), 504-35 (ampoules).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

SOMNOTHYRIL

Traitement de l'Insomnie.

Composition :

Diéthylmalonylurée	0 gr. 20
Analgésine.....	0gr. 05
Thyroidine	0 gr. 001
Salicylate d'Ésérine.....	0 gr. 0002

Par pilule.

Caractéristiques. — Seuil d'activité thérapeutique fort éloigné du seuil de toxicité. Pas d'accoutumance, sommeil calme et réveil agréable.

La diéthylmalonylurée arrive à réaliser, à doses *réduites* et *aloxiques*, un effet hypnotique rapide et sûr, grâce à l'action *sensibilisatrice* de l'ésérine, qui prépare l'état *vagotonique* favorable au sommeil.

Indications thérapeutiques. — *Toutes insomnies* : Insomnies rebelles, Anxiété, Excitation.

En psychiatrie : Mélancolie, Psycho-neurasthénie.

Mode d'emploi. — Avaler sans sucer ni croquer, avec un demi-verre d'eau ou mieux de tisane chaude, une pilule le soir, un peu avant le coucher, 2 heures environ après le repas.

En cas d'efficacité insuffisante, porter le lendemain la dose à 2 pilules prises simultanément.

Posologie en deux temps. — Toutefois, dans certains cas où l'état d'excitation du malade (non fébrile) résiste à l'administration de doses même massives d'hypnotique, on procédera comme suit :

1° Vers les 5 heures du soir, absorption d'une pilule qui agira surtout comme *calmant de l'excitation vago-sympathique*.

2° A l'heure habituelle du coucher, absorption d'une seconde pilule de *Somnothyril*.

Tube de 20 pilules pour 12 à 20 jours de traitement.

SOMNOTHYRIL-SUPPOSITOIRES

Hypnotiques et sédatifs.

Leur composition est la même que celle déjà éprouvée des pilules, soit : *diéthylmalonylurée* à dose réduite et renforcée par la présence de traces d'*ésérine* et de *thyroidine* sensibilisatrices. Cette association synergique est en outre complétée par un hypnotique actif à très faible dose : le *phényléthylbarbiturate de quinine*, et par un décongestif : le *campho-sulfonate de Ca*.

Indications. — Insomnies, États anxieux, adjuvants du traitement de la douleur.

Posologie. — Adultes seulement. Un suppositoire le soir au coucher, ou deux sur avis du médecin.

Laboratoires CANTIN

PALaiseau (Seine-et-Oise).

SONAGAR

Composition :

Association de farine de son et d'agar-agar aromatisée avec essence de légumes.

Propriétés thérapeutiques :

Aliment laxatif doux, Educateur et régulateur de l'intestin avec action nutritive marquée.

Indications :

Paresse intestinale. Spasmes de l'intestin.

Mode d'emploi :

Une cuillerée à bouche tous les soirs dans le potage.

Prix : 15 francs.

SONAMEL

Présenté sous forme de cubes de pain d'épices.

Composition :

Sonamel adultes : son, miel, bourdaine désamérisée, faible dose de phénol-phtaléine. Aromatisé à l'anis.

Sonamel enfants : son, miel, manne, traces de bourdaine, angélique.

Indications :

Constipation, atonie intestinale, légère insuffisance hépatique.

Mode d'emploi :

Adultes : Un cube, le soir après dîner.

Enfants : Un demi, ou un cube-enfant.

Prix : 13 francs.

Laboratoire MICHELON

Docteur en pharmacie

20, boulevard Heurteloup — TOURS.
(Tél. : 308.)

SONÈNE

Son purifié.

Propriétés. — Action émolliente régulière sur l'intestin.

Indications. — Traitement végétal, préventif et curatif de la constipation.

Mode d'emploi. — Le *Sonène* se présente sous formes de cachets, de poudre et de granulés.

Dose journalière. — 1 à 3 cachets par jour, ou 1 à 3 cuillerées à café de poudre, ou 2 à 6 cuillerées à soupe de granulés.

Boîte de 36 *Cachets*. Boîte de 100 *Cachets*.

Poudre. — *Granulés.*

Enregistrés au L. N. C. M. sous les numéros
Poudre 590-20; Cachets 590-12; Granulés 590-19.

Laboratoires de la LIPOSEPTINE

2, place des Vosges — PARIS.

(Tél. : Archives 44-59.)

SONÉRYL

Butyl-éthyl-malonylurée.

Action hypnotique très sûre, propriétés sédatives marquées, sans effets toxiques ni phénomènes d'accoutumance.

Indications. — Insomnies de toute nature, même celles qui sont provoquées par la douleur.

Présentation :

Comprimés à 0 g. 10, le tube de 20 : 7 fr. 50

Posologie et mode d'emploi. — Deux comprimés à 10 ctg. le soir au coucher. Répéter cette dose dans la nuit en cas de besoin.

Dose maximum (adultes) : 6 comprimés par 24 heures.

SONÉRYL SODÉ

Dragées à 0 g. 15 pour la narcose préparatoire aux anesthésies générales par l'éther (Méthode de Desplas-Launoy, Chevillon.) Ampoules unitaires de 1 g. de poudre pour solution destinée à l'injection intraveineuse (anesthésie de base).

Prix de vente :

Dragées, le flacon : 17 fr. 50 — l'Ampoule : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e). (Tél. : Balzac 22-94.)

SOPODES

Désodorisation intégrale.

Le *Sopodès* supprime instantanément toutes les odeurs d'origine organique, animales, végétales, sans aucune émanation irritante ou nocive.

Indications. — Odeurs humaines, transpiration, hyperhydrose plantaire (à employer sec). Plâtres malodorants (*Sopodès* glissé sous la bande, à sec). Désodorisation des déjections, pansements, etc. Salles d'hôpitaux, chambres de cliniques et de malades, locaux d'habitation et médicaux.

Sopodès supprime les odeurs de tabac, de cuisine, de lessive, de lavabo et en général toutes les émanations malodorantes.

Présentation et Mode d'emploi. — Pastilles, concentré en poudre, concentré liquide :

Pastilles : (boîte de 100 : 30 fr.), briser une pastille dans un récipient contenant 1/4 de litre d'eau.

Poudre : (boîte de 125 grs. : 35 fr.), 1 à 2 gr. de poudre dans un récipient contenant un peu d'eau.

Liquide : (flacon de 1/8^e de litre : 25 fr.), 2 cc. ou 1/2 cuil. à café dans un récipient contenant un peu d'eau.

Augmenter ces doses suivant le cubage du local à désodoriser.

L'action est en ordre décroissant suivant que l'on emploie de l'eau chaude, tiède ou froide.

Pour les odeurs de cuisine, faire l'une des opérations prescrites avec de l'eau chaude avant toute émanation culinaire.

Produits SOPODES

21, rue Chaptal — PARIS (IX^e) (Tél : TRI. 49-52.)

SOPORALOSE

Composition. — Chloralose et dérivés cinnamiques.

Propriétés. — Agit comme sédatif à la fois sur le système nerveux encéphalique et sur la moelle.

Provoque un sommeil calme suivi d'un réveil euphorisant.

Atoxique, même aux doses très élevées.

Élimination totale et rapide.

Aucune action sur la circulation, la digestion, la respiration.

Indications. — Toutes insomnies : des surmenés, des nerveux, des intellectuels, des anxieux.

Pas de contre-indication. Peut être prescrit même aux organismes déficients par suite de sa complète inaction sur le cœur, les reins, le foie, l'estomac.

Convient même aux cardiaques, rénaux, hépatiques, dyspeptiques, artério-scléreux, vieillards, tuberculeux, affaiblis.

Posologie. — La dose à prendre varie de 1 à 3 cachets. Dose moyenne : 1 cachet.

Prix. La boîte de 12 cachets : 12 fr. 75.

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Archives 03-29 et 42-40.)

SOPORIGENE

Composition :

Cachets de butyl-éthyl-malonylurée, dosés à 0 gr. 20, en milieu alcalin.

Action thérapeutique. — Hypnotique, analgésique.

Avantages :

Le moins toxique des barbituriques, ne laisse au réveil aucune sensation désagréable, procure un sommeil parfait.

Indications. — Toutes les insomnies nerveuses et douloureuses.

Mode d'emploi :

1 à 2 cachets par jour au maximum, dans un peu d'eau, une 1/2 heure avant le sommeil, à une heure de distance des repas.

Présentation : en boîtes de 10 et 2 cachets.

Inscrit au L. N. C. n° 161-4.

Laboratoire du Dr Ch. DENSMORE

25, rue Dagorno — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 56-71 et 72.)

Fournisseur des hôpitaux et des grands réseaux de chemins de fer.

SORBOCALCION

Calcium soluble vitaminé.

Sels calciques solubles (saccharates et sucrate) associés au phosphore végétal organique, à la papaine et à la vitamine D cristallisée.

Médication calcique scientifique respectant les données physiologiques modernes sur la digestion, l'assimilation et la fixation du Calcium.

Cachets. — 2 à 3 par jour pendant 15 jours.

Granulé. — *Enfants :* 2 à 3 cuil. à café par jour.

Adultes : 2 à 3 cuil. à soupe par jour aux repas.

Indications. — Troubles calciques, Croissance, Allaitement, Rachitisme, Fractures, Prétuberculose, Hémorragies, Acidose, États neurospasmodiques.

Enregistré au Lab. de Cont. sous le n° 535-44 et 60.

Prix : cachets (boîte de 36 cachets) ou granulé 24 fr.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

SOUTENSA

(Traitement pathogénique des hypertensions.)

Composition. — Association de Nitrate de Pilocarpine et de Silicate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — Agit sur le syndrome endocrino-sympathique et parasympathique par l'effet vaso-dilatateur du nitrate de pilocarpine et sur les vaisseaux eux-mêmes et sur les troubles humoraux par le silicate de soude.

Unit l'action vaso-dilatatrice à l'action cardiotonique.

Indications. — Toutes les hypertensions et particulièrement les hypertensions essentielles, humorales et nerveuses.

Soulagement rapide des troubles des hypertendus.

Préparation pharmaceutique. Posologie. — Pastilles contenant chacune :

Nitrate de Pilocarpine..... 2 mgr. 5

Silicate de Soude..... 30 cgr.

Une pastille matin et soir, un quart d'heure avant les repas. Ne pas dépasser 5 pastilles par 24 heures.

Séries de 8 à 10 jours de traitement séparées par un repos d'une semaine.

Prix, le tube de 20 pastilles : 16 francs.

Laboratoire ARMORIL

7, rue de l'Armorique — PARIS (XV^e). (Suffren 53-70.)

SPARTÉINE HOUDÉ

C¹⁵ H²⁶ N¹.

Propriétés :

- 1^o Toni-cardiaque énergique et progressif. Agit plus rapidement que la digitaline (1/2 heure après l'absorption). Régulateur du rythme cardiaque. Renforce l'impulsion systolique après l'action de la digitale. Pas d'accumulation (POUCHET). Augmente la pression moyenne (SOULA).
- 2^o Sur le rein : Diurétique déchlorurant (MERCIER, BALANSARD et SIGAL).
- 3^o Action antitoxique et antitoxinique marquée (BILLARD, PERRIN et CUENOT, DUJARRIC DE LA RIVIÈRE).

Indications :

- a. *Cardiaques* : Insuffisances cardiaques au début (dyssystolie et hyposystolie). Préparation à la cure digitalique. Tonique d'entretien après celle-ci. Défaillances myocardiques des maladies infectieuses (typhoïde, diphtérie, pneumonie). Palpitations nerveuses, arythmies légères, tachycardies, tachyarythmies. Fibrillation auriculaire. Préventif des troubles cardiaques dans la rachianesthésie (RAMOND).
- b. *Rénales* : Rétention chlorurée et œdèmes.
- c. *Générales* : Dans la diphtérie, associée au sérum ou employée seule (Mme FRONTARD). Tétanos. Cure de désintoxication des morphinomanes. Delirium tremens. Intoxications phalloïniques ou par venin de vipère.

Présentation. — Granules à 2 cgr. de sulfate de spartéine cristallisé.

Posologie. — 4 à 8 granules par jour en 2 ou 4 fois, avant les repas. Sans toxicité, ces doses peuvent être largement augmentées jusqu'à 12 granules et plus, le maximum étant de 30 cgr. *pro die* (Codex 1937).

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

SPARTO-CAMPHRE

Composition. — Solution aqueuse de campho-sulfonates de spartéine (à 5 p. 100) et de sodium (à 15 p. 100,) représentant 1,75 p. 100 de spartéine base.

Propriétés. — Celles du *camphre* et de la *spartéine*. Réalise une véritable synergie médicamenteuse. Les effets thérapeutiques propres du camphre et de la spartéine s'y trouvent associés et renforcés. Action immédiate et prolongée.

Indications — Traitement d'urgence du collapsus cardiaque, des états adynamiques des maladies infectieuses, pneumonies, bronchopneumonies, typhoïdes, gripes, etc...

Traitement préventif et curatif des accidents cardio-vasculaires des anesthésies générales, locales et de la rachianesthésie, du choc opératoire.

Indiqué également dans tous les états de déséquilibre du système nerveux vago-sympathique.

Posologie. — Injections sous-cutanées ou de préférence intramusculaires, 1 à 3 ampoules de 2 cc. par jour.

Formes. — Dragées et ampoules de 2 cc. ou de 5 cc.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS.

SPARTOPHÉDRINE BÉRAL

Ampoules de 2 cc. dosées à 3 cgr. d'Éphédrine et 5 cgr. de Spartéine par centicube.

Représentent la préparation injectable d'Éphédrine la plus appropriée à la pratique courante.

Posologie et mode d'emploi. — Pour injections hypodermiques, musculaires ou veineuses.

1 à 2 centicubes en une fois.

2 à 4 centicubes par jour.

Prescrire : Spartophédrine Béral, une boîte.

Prix : 16 francs.

Laboratoire BÉRAL

194, rue de Rivoli, PARIS.

SPASA

Comprimés glutinés.

Présentation. — En tube d'aluminium de 25 comprimés. (15 fr. 30.)

Principes actifs. — Phényléthylmalonylurée, Extrait de Cratægus, Extrait de jusquiame, Extrait de belladone, Extrait d'anémone.

Indications. — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Troubles névralgiques et névrosiques, Spasmes, Asthme, Palpitations, Algies, Insomnie, Migraine.

Mode d'emploi. — 1 comprimé au moment de la douleur. 3 par jour si nécessaire. Ne pas prendre plus de 4 comprimés par 24 heures. Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-26.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél.: Turbigo 40-83.)

SPASÉDOL

Composition :

Phénylpropionate de morphine ..	0 gr. 004
Isobutyrate de morphine	0 gr. 004
Bromométhylate d'homatropine..	0 gr. 0015
Chlorhydrate de papavérine.....	0 gr. 040

pour une ampoule injectable d'un cc. Le suppositoire (**Suppospasédol**) ne contient que 0gr.0005 de brom. d'homatropine.

Propriétés et avantages. — Le phénylpropionate et l'isobutyrate de morphine ont une *toxicité plus faible* que le chlorhydrate, bien que leur *action* soit *plus puissante*. Enfin, le bromométhylate d'homatropine et le chlorhydrate de papavérine sont des *spasmolytiques remarquablement actifs*.

Le **Spasédol**, ne provoquant ni nausées ni vomissements et ne diminuant pas la diurèse, *doit remplacer la morphine dans toutes les affections douloureuses spasmodiques*.

Indications. — *Coliques hépatiques, néphrétiques, saturnines, spasmes viscéraux, vomissements d'origine spasmodique, crises d'asthme rebelles, dyspnées angoissantes, douleurs angineuses, œdème aigu du poumon, infarctus du myocarde, hypertonie et tranchées utérines, anxiété, etc...*

Posologie. — *Adultes* : une demi ou une ampoule (ou suppositoire), à répéter au besoin 2 ou 3 fois par 24 heures.

Enfants, nourrissons (doses à répéter 2 fois par 24 heures si nécessaire).

De 5 à 15 ans : 1/2 ampoule ou 1/2 suppositoire.

De 3 à 5 ans : 3/10 de cc.

3 ans : 2/10 de cc.

Au-dessous de 1 an : 1/10 de cc.

Boîte de 12 ampoules.

Boîte de 10 suppositoires.

(Le **Suppospasédol** ne fait pas partie du tableau B.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
" THÉRAPLIX "

98, rue de Sèvres - PARIS (VII^e) (Tél.: Ségur 13-10.)

SPASMACOL

(NORMACOL ATROPINÉ)

Préparation associant le pouvoir antispasmodique de la Belladone aux propriétés émollientes et évacuantes du Normacol, mucilage parfait.

L'effet utile et maximum de l'alcaloïde est obtenu remarquablement, au point voulu, grâce :

- 1° A la forme pharmaceutique de petits grains très menus demeurant indépendants, même après gonflement, et répartis sur toute la surface du bol intestinal.
- 2° Aux propriétés émollientes du mucilage-Normacol, véhicule adéquat de l'alcaloïde.

Forme. — Granulé dragéifié en grains très menus.

Dosage. — 1/4 de mgr. d'Atropine-sulfate par cuill. à café rase.

Indications. — Toutes gastro-entéropathies avec spasmes.

Emploi. — 2 ou 3 cuill. à café aux repas ou en dehors des repas. Mettre le granulé sur la langue, puis l'avaler au moyen d'une gorgée de liquide.

Prix : 17 fr. 35.

Laboratoire NORGAN

Pierre ALEXANDRE, Pharmacien

21, rue de Madrid — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 08-00.)

SPASMALGINE « ROCHE »

Antispasmodique vrai.

Composition. — 1 ampoule ou 1 comprimé ou 1 suppositoire contient :

1 centigramme	PANTOPON « ROCHE » (Opium total injectable).
2 centigrammes	PAPAVÉRINE « ROCHE » (Alcaloïde de l'opium le moins toxique à propriétés spasmolytiques spéciales).
1 milligramme	ATRINAL « ROCHE ». (Ester sulf. d'atropine, sans action sur le centre para-sympathique).

Propriétés. — Les propriétés antagonistes des éléments entrant dans la composition de la *Spasmalgine « Roche »* expliquent la *toxicité atténuée* de ce médicament prouvée par l'expérimentation et la clinique.

Indications thérapeutiques. — Tous les états spasmodiques, et notamment coliques hépatiques et néphrétiques, spasmes du larynx, de l'intestin, de l'estomac, coliques, sueurs, diarrhées des tuberculeux, dysménorrhée, angine de poitrine, toux spasmodique, excitation ante- et post-opératoire, accouchements laborieux, tous états d'hyper-excitation, etc.

Doses et modes d'emploi :

Voie buccale <i>Comprimés</i> (Flacon de 20).	{	Dose moyenne : 1 à 2 comprimés par jour.
		Dose forte : 2 à 4 comprimés par jour.
Voie hypodermique ou intramusculaire. <i>Ampoules</i> (Boîte de 6).	{	Dose moyenne : 1 à 2 ampoules par jour.
		Dose forte : 2 à 4 ampoules par jour.
Voie rectale <i>Suppositoires</i> (Boîte de 6.)	{	Dose moyenne : 1 à 2 suppositoires par jour.
		Dose forte : 2 à 4 suppositoires par jour.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 504-38 (*comprimés*).
504-37 (*ampoules*), 504-67 (*suppositoires*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e).
(Tél. : Archives 91-10.)

SPASMALONE

Composition. — Allylisopropylmalonylurée (anti-spasmodique et analgésique).

Diméthylaminoantipyrine (analgésique classique).

Cratégus (sédatif du système nerveux, cardiaque et vasculaire).

Médicament du spasme par excellence. Sédatif du système nerveux. Analgésique puissant et rapide.

Indications. — *Tous les spasmes :* Laryngite striduleuse, spasme de la glotte, de l'œsophage, Hoquet, Crampes d'estomac, Coliques de toute nature, Règles douloureuses, Coliques du post-partum, etc..., etc..., Palpitations, Éréthisme cardiaque, Angine de poitrine. *Toutes les algies.*

Présentation. — Le Spasmalone est présenté sous forme de solution concentrée aromatisée, qui se prend dans de l'eau sucrée,

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour (1/2 doses pour les enfants). Ces doses peuvent être augmentées et même doublées sans inconvénients.

Dans les crises très douloureuses, donner 2 cuillerées à café en une fois.

Prix : 19 fr. 50.

Laboratoires du MALONE

J. VINCENT, pharmacien

ANCENIS (Loire-Inférieure). Tél. : 18.

SPASMIDÉNAL JOLLY

Synergie Phyto-Barbiturée atoxique.

Sympathoses et cardiosympathoses.

Deux formes :

Comprimés. Suppositoires

Extrait Aubépine	0,02	0,06
Extrait Valériane stabilisée	0,08	0,24
Extrait Gelsemium titré	0,003	0,01
Complexe de Méthylglyoxalidine et de Phényl-éthylmalonylurée	0,013	0,04

Posologie :

Hypnotique : 2 comprimés avant le dîner et 2 au coucher, ou bien 1 à 2 suppositoires.

Sédatif : Comprimés en doses filées, 1 toutes les deux heures ou suppositoires : 1 matin et soir.

Indications. — Grands anxieux ; tous dysfonctionnements neuro-végétatifs, tachyarythmies, éréthisme cardiaque, etc.

Prix :

La bonbonnière de 50 comprimés : 20 francs.

La boîte de 10 suppositoires : 18 francs.

Enregistré au L. N. C. M., N^{os} 40-8 et 40-9.

Laboratoires JOLLY

28, avenue Carnot, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (Seine-et-Oise).

(Tél. : 83.)

SPASMINE JOLLY

Phytothérapie atoxique des névropathies et des cardiopathies.

Combinaison physiologique stabilisée de Valériane fraîche et d'Aubépine.

Odeur et saveur agréables.

Le plus actif des hypnotiques doux.

Formes. — Liquide et Comprimés.

Composition :

Intrait de Valériane..... 0 gr. 10

Extrait d'Aubépine..... 0 gr. 10

Par comprimé ou cuillerée à café.

Posologie :

Sédatif : 1 à 2 comprimés ou cuillerées à café matin et soir.

Hypnotique : 2 à 6 comprimés ou cuillerées à café le soir.

1/2 dose pour les enfants.

Action. — Par l'Aubépine, la Spasmine Jolly exerce sur le sympathique une action inhibitrice qui est prolongée et renforcée par la Valériane ; elle obtient et maintient l'équilibration du système neuro-végétatif et régularise le fonctionnement du muscle cardiaque. Aucune accoutumance. Aucune contre-indication.

Indications. — Angor, anxiété, petits nerveux, émotivité, éréthisme cardiaque, tachycardies, extra-systoles, hypertension, aérophagie, syndromes solaires, spasmes, prurit nerveux, mal de mer, énurésie, etc.

Comprimés : le tube de 30 13 francs.

Élixir : le flacon de 25 cuillerées à café 18 fr. 50.

Laboratoire JOLLY

28, av. Carnot — ST-GERMAIN-EN-LAYE
(S.-et-O.) (Tél. : 83.)

L. N. C. M. 40-1 et 40-7.

SPASMOCALCYL

Spasmolytique Calcique (Boro-Tartro-Iodo-Bromé).

États convulsifs de l'enfant.

Propriétés Thérapeutiques. — Le plus complet des sédatifs minéraux. Modérateur de l'excitabilité générale et neurotrophique par ses *ions calciques*.

Triplement sédatif. — 1^o Par sa molécule *iodée* sur la fonction thyroïdienne; 2^o par sa molécule *bromée* sur l'excitabilité nerveuse; 3^o par son *borotartrate* sur le cortex et sur l'équilibre acido-basique.

Protecteur de la cellule nerveuse par sa *vitamine B*.

Indications. — Médication de choix des états neurotiques, organiques ou fonctionnels, relevant de la diathèse spasmogène. — Crises nerveuses, crises tétaniques. — Équivalents comitiaux. — Crises viscérales. — Troubles du sommeil. — Hyperexcitabilité neuro-musculaire. — Alcalose urinaire. — Phosphaturie. — Carie dentaire.

Présentation. — Sirop. — Durée moyenne: 15 jours.

Formule. — Une cuillerée à café contient :

Borotartrate de calcium...	0,20	Iodure de calcium	0,06
Bromure de calcium.....	0,12	Peptones de levures de Bière (Vit. B.)	

Posologie. — *Adultes* : 1 cuillerée à dessert 2 à 3 fois par jour.

<i>Enfants</i> : 1	—	café	—
<i>Nourrissons</i> : 1/2	—		—

Matin, Midi et Soir.

Aucune toxicité. — Pas de contre-indications.
Enregistré au L. N. C.

Laboratoire d'Applications
Biologiques LABIOLA.

P. CORDONNIER, Pharmacien
52, rue de Cambrai. — LILLE (Nord).

SPASMOCARBINE

(Formocarbline Antispasmodique).

Composition. — En plus des éléments de la **Formocarbline naphtolée** (charbon animal, formine, benzonaphtol), chaque cuillerée à café contient : 1/2 cgr. extrait de belladone, 1/2 cgr. poudre stabilisée de belladone, 1/2 cgr. extrait de jusquiame, 12 cgr. 5 bromure de magnésium, 2 cgr. extrait de cratægus, 2 cgr. extrait de passiflore.

Forme pharmaceutique. — Granulé sucré, aromatisé, très fondant, se désagrégant rapidement dans l'eau.

Propriétés. — Antiseptique interne de choix. Antispasmodique. Sédatif nervin, cardiaque et vasculaire.

Indications. — *Affections gastriques* : Hyperchlorhydrie, spasmes gastriques, aérophagie.

Affections intestinales : Constipation spasmodique. Coliques intestinales avec spasmes douloureux. Colites, entérocolites, flatulences, auto-intoxication.

Affections hépatiques, Hépto-rénales et syndromes associés. Angiocholites, lithiase biliaire, insuffisance hépatique. Sensibilité vésiculaire. Syndrome entéro-rénal et entéro-hépatique.

Troubles digestifs des angineux.

Posologie. — La dose habituelle est de 1 cuillerée à café à la fin de chacun des 2 principaux repas, cette dose pouvant être augmentée ou diminuée au gré du médecin.

La **Spasmocarbine** se prend à sec (croquer le granulé) ou délayée dans une petite quantité d'eau.

Prescrire : Spasmocarbine : 1 boîte.

Prix : la boîte : 16 fr. 30.

Enreg. au Lab. Nat. de Contr. sous le n° 553-7.

Echantillons et littérature médicale sur demande.

**Laboratoire de MÉDECINE
EXPÉRIMENTALE**

1 et 3, rue de Malherbe — BEAUVAIS (Oise).
(Tél. : 0-50).

SPASMOFLORINE

Comprimés.

Antispasmodique, Sédatif nerveux.

Formule :

Phényl-Ethyl-Malonylurée	0 gr. 01
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 05
Peptone de viande.....	0 gr. 03
Bromhydrate de quinine.....	0 gr. 01
Extrait de cratægus.....	0 gr. 02
Extrait de passiflore.....	0 gr. 02
Extrait de saule	0 gr. 02
Extrait de boldo.....	0 gr. 01
Extrait de valériane	0 gr. 01

Pour 1 comprimé.

Indications. — États spasmodiques, Déséquilibre vago-sympathique, Insomnies, Angoisses, Palpitations, Syndromes solaires, Troubles nerveux de la puberté et de la ménopause.

Mode d'emploi. — 1° Comme régulateur du système nerveux : 2 à 6 comprimés par jour, par doses fractionnées au début des repas.
2° Contre l'insomnie : 2 à 4 comprimés le soir.

Présentation. — Tube de 40 comprimés.

Inscrit au L. N. C. M. sous le n° 1244-10.

Laboratoires R. et M. GUIGNARD

Docteurs en Pharmacie et en Médecine,

38, rue du Louvre — PARIS (1^{er}). (Tél. : Cent. 01-35.)

SPASMONAL GROS

Composition. — Papavérine, phényléthylmalonylurée, Diurocalcine.

Propriétés. — Analgésique, antispasmodique et diurétique.

Indications. — Hypertension artérielle. Crises douloureuses angiospasmodiques, Tachycardies, Palpitations, Insomnie nerveuse, Troubles de la ménopause.

Forme. — Dragées.

Doses. — 3 dragées par 24 heures : 1 au réveil, 1 dans le courant de l'après-midi, 1 au coucher. Avaler avec un peu d'eau.

Prix : 15 fr. 60. **Durée moyenne de l'unité :** 15 jours.

Laboratoires GROS

13, place Delille — CLERMONT-FERRAND.

(Tél. : 60-55.)

SPASMONEURAL

Sédatif nerveux utilisant de faibles doses de Phényléthylmalonylurée renforcées par des antispasmodiques végétaux.
(Formule Méglin modifiée.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Belladone	0,001
Extrait de Jusquiame	0,02
Extrait de Valériane	0,06

pour une dragée friable.

Indications :

Spasmes viscéraux, musculaires et vasculaires. Palpitations, Angor, Gastronévroses, Toux nerveuses, Dyspnées spasmodiques (asthme, laryngite striduleuse). Tremblements, Artériospasmes, Migraines, Vertiges, Mal de mer.

Nervosisme, Anxiété,angoisses, Insomnies, Prurits, Neurotonies de la menstruation et de la ménopause.

Syndromes convulsifs, Spasmophilie, Chorée, Tics, Mal comitial.

Posologie :

Enfants : 2 à 10 ans, 1 à 3 par 24 heures (à écraser dans la confiture).

Adultes : 1 à 8 par 24 heures (avaler avec une infusion).

Prix du flacon (50 dragées) : 18 fr. 50.

Laboratoire du SPASMONEURAL

Jean LE COULANT, Pharmacien.

239, cours de l'Yser — BORDEAUX. Tél. : 922-64.

SPASMORYL

(Formule communiquée à la Société de Thérapeutique.)

Traitement des spasmes digestifs et des complications mécaniques et spasmodiques de la lithiase hépatique et rénale.

Formule. — Chlorure de calcium, suractivé et fixable par le thiosulfate de magnésium en milieu marin.

Présentations. — 1° Intraveineux ;

2° Intramusculaire.

Indications :

Spasmes digestifs : œsophagiens, gastriques, pyloriques, duodénaux, coliques et leurs complications ; dysphagie, régurgitations, atonie et dilatation gastrique, gastrites hypochlorhydriques, lenteur des digestions, renvois, vomissements, hoquet, spasmes pyloriques, colites, entéro-colites, coli-bacillose, constipation spasmodique.

Accidents spasmodiques et mécaniques des lithiases : coliques vésiculaires, coliques hépatiques, cholécystites chroniques, coliques néphrétiques, calculs et spasmes vésicaux, prostatites.

Posologie :

Intraveineux : 2 injections par semaine (pousser très lentement).

Intramusculaires : Injection profonde tous les deux jours.

Prix :

Intraveineux : 36 fr. 90

Intramusculaires : 30 fr. 40.

Laboratoires « ANA »

M. VIENNE, Pharmacien,

18, avenue Daumesnil — PARIS. (Tél. : Did. 16-49.)

SPASMOSÉDINE

Antispasmodique — Sédatif nerveux.
(Thérapeutique cardio-vasculaire.)

Composition :

Phényléthylmalonylurée	0 gr. 015
Bromhydrate de quinine	0 gr. 05
Extrait de <i>Cratægus</i> stabilisé ...	0 gr. 05
Excipient Q. S. pour 1 comprimé	glutinisé.

Présentation :

Flacon de 40 comprimés glutinisés.

Indications et posologie :

a) *Palpitations, extrasystoles, instabilité cardiaque.*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 jours par mois).

b) *Tous les troubles fonctionnels consécutifs aux spasmes vasculaires, en particulier chez les hypertendus (céphalée, bourdonnements d'oreilles, éblouissements, vertiges, etc.).*

1 ou 2 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (10 à 15 jours par mois).

c) *Angine de poitrine et algies précordiales.*

1 à 3 comprimés au début de chacun des deux principaux repas (pendant 10 à 15 jours par mois).

Avaler avec un peu d'eau, sans sucer ni croquer.

Laboratoires DEGLAUDE

Médicaments cardiaques spécialisés.

Digibaïne, Cardibaïne, Théoxanthine, etc.

15, boulevard Pasteur — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 79-59.)

En Belgique : O. B. V. P.

47-57, rue François-Bossaerts — BRUXELLES.

SPÉCIFIQUE BEJEAN

La préparation antigoutteuse et antirhumatismale la plus efficace et la plus inoffensive. Elle réussit dans les cas où les autres médicaments ont échoué.

Composition. — Contient comme principes actifs : 1 gr. de teinture de colchique et 0 gr. 20 d'iodure de potassium par cuillerée à café.

Indications. — Goutte aiguë ou chronique, Rhumatismes, Sciatique, Névralgies et, en général, toutes les manifestations douloureuses ou fluxionnaires se portant sur les articulations, les muscles et les viscères et qui soient d'origine goutteuse ou rhumatismale.

Doses. — *Cas aigus* : 3 cuillerées à café par jour, dans une infusion de feuilles de frêne ou un peu d'eau sucrée, jusqu'à sédation de la douleur.

Cas chroniques : 1 ou 2 cuillerées à café par jour pendant une semaine sur deux ou pendant douze jours.

Pour les enfants et les vieillards, les doses ci-dessus devront être réduites de moitié.

La médication devra être suspendue en cas de diarrhée ou autres troubles intestinaux.

Prix : 42 fr. le flacon de 100 cc.

Dépôt général :

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS
Tél. : Archives 03-92.)

SPÉCIFIQUE ELDÉ

Composition. — Solution stabilisée de Bromoforme et Drosera. Une cuillerée à café renferme : 1 goutte de Bromoforme et 10 egr. de teinture de Drosera.

Indications. — Toutes les Toux sèches et quinteuses, Coqueluche, Rougeole, Grippe, Trachéites saisonnières.

Posologie. — *De 6 mois à 1 an :* une à deux cuillerées à café au maximum dans une tasse d'infusion de violettes que l'on fera prendre dans les 24 heures.

1 à 2 ans : trois à quatre cuillerées à café par 24 heures.

2 à 5 ans : quatre à huit cuillerées à café par 24 heures.

5 à 10 ans : quatre à huit cuillerées à dessert par 24 heures.

Au-dessus de 10 ans : quatre à huit cuillerées à soupe par 24 heures.

Le flacon : 14 fr. 85.

J. BARAIGE

Docteur en médecine,
Pharmacien de 1^{re} classe,

24, rue Paul-Bert — PARIS (XI^e).
(Tél. Roquette 21-22.)

SPÉCIFIQUE ET APPAREIL LANCELOT

L'usage de l'Appareil et du Spécifique Lancelot est une modification avantageuse de l'inhalation de la fumée, des poudres anti-asthmiques.

Le Spécifique contient tous les principes actifs de ces poudres, et rend les muqueuses respiratoires moins sensibles aux actions nuisibles extérieures.

Composition. — Nitrite de soude, 12,5 ; Résorcine, 0,125 ; Sulfate d'atropine, 0,10 ; Eau de laurier-cerise, 0,20 ; Sulfate d'hyosciamine, 0,05 ; Chlorhydrate de pilocarpine, 0,20 ; Chlorhydrate de benzoylpseudotropine. Excipient : Q. S. p. 100 grammes.

Indications. — Asthme, Emphysème, Coryzas et Toux spasmodique, Asthme des foin, Séquelles d'intoxication par les gaz.

Mode d'emploi. — Le Spécifique Lancelot s'emploie en pulvérisations avec l'Appareil Lancelot.

Spécifique : 18 francs le flacon de 20 grammes environ.
Appareil : 50 francs.

Bon de premier essai à prix spécial sur demande.

Laboratoire LANCELOT

100 ter, avenue de Saint-Mandé — PARIS (XII^e).
(Tél. : Did. 49-04.)

SPECTROL

Sérothérapie spécifique des anémies.

Composition. — Sérum frais hémopoïétique de cheval, prélevé sur des animaux mis en état de rénovation sanguine.

Propriétés thérapeutiques. — Agent d'hémo-poïèse.

Indications. — Toutes anémies, hémophilie, états hémorragipares, convalescences, déficiences organiques.

Présentation. — Sirop agréable à prendre.

Posologie. — Une cuillerée à potage le matin à jeun, dans un demi-verre d'eau froide ou tiède (jamais chaude). Une à deux cuillerées à potage dans un demi-verre d'eau avant les deux principaux repas.

Le sérum pris dans ces conditions est rapidement évacué dans le duodénum et ne se peptonise pas.

Prix : 19 fr. 25.

DESOHIENS, Docteur en Pharmacie
9, rue Paul-Baudry, Paris (8^e). — (Tél.: Élysées 40-26.)

SPIROCHTAN

Bismuthique à faible dose, hydrosoluble, indolore, associé au Mercure (catalyseur) et à l'Arsenic (antianémiant).

Formule :

Pentanoldioate mét hyloate de bismuth	0 gr. 0333
Oxycyanure de mercure	0 gr. 0003
Arséniate de soude	0 gr. 00134
Eau distillée, Q. S. pour	1 cc.

Ampoule de 1 cc.

Posologie. — Traitement d'attaque : 1 cc. tous les jours. Traitement d'entretien : 1 cc. tous les 4, 5 ou 6 jours. Séries de 20 piqûres.

Avantages. — Cette synergie métallique exalte l'activité du Bismuth grâce à l'action catalytique du mercure, permettant une thérapeutique spirillicide intensive et peu toxique avec de petites doses de Bi. Enfin, l'anémie bismuthique est compensée par l'arsenic agissant ici comme tonique.

La boîte de 10 ampoules . 20 francs.

Boîte spéciale de 10 ampoules au 1/5 pour enfants : 16 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle : n° 535-30 et 31.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e). (Tél.: Odéon 73-92.)

SPIROGYL

Onguent gingival à base d'Antivirus fuso-spirochétique.

Pour le traitement des stomatites, gingivites rebelles, pyorrhées alvéolaires graves.

A employer 3 fois par jour en massage des gencives.

Prix : le tube : 9 fr. 55.

H. VILLETTE et C¹⁰, Pharmaciens
Marque de la Biothérapie

5, rue Paul-Barruel — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 11-23.)

SPLÉNIQUE (Extrait)

du docteur Bayle.

L'Académie de Médecine a décerné en 1931 le prix Boggio au Dr Bayle pour ses travaux cliniques et expérimentaux, sur l'action de la rate dans la tuberculose.

Tuberculose, Anémies, Déficiences organiques
(voir **COLLOIDOGÉNINE**).

Maladies infectieuses
(voir **POLYVALINE**).

Ces deux produits, préparés selon les indications précises de l'auteur de la méthode, sont **LES SEULS** qui peuvent se réclamer du nom et des travaux du Dr Bayle.

Ils permettent d'appliquer l'opothérapie splénique avec le maximum de résultats.

SPLÉNOCRISINES

Extraits de rate désalbuminés à hautes concentrations.

Formes. — 5 ampoules de 3 cc.

Splénocrisine « 15 » « 30 » et « 60 » correspondant à 15, 30 et 60 grammes de glande fraîche par ampoule.

Splénocrisine « 15 ».....	23 fr. 35
— « 30 ».....	36 fr. »
— « 60 ».....	53 fr. ■

Indications. — Eczémas, Dermatoses prurigineuses, Asthme, Anaphylaxie, Tuberculoses.

Posologie. — Une ampoule par jour en injection intramusculaire, par série de 10 à 15 injections.

Affections anciennes : débiter à 15 gr.

— récentes : à 30 gr.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

SPLÉNOGASTRINE

Complexe opothérapique gastrosplénique.

La *Splénogastrine* couple en une association judicieusement établie la méthode de Castle et les indications hématopoiétiques de l'opothérapiquesplénique (Travaux de l'Ecole de Toulouse sur la rate, (Soula), avec la médication cuivro-ferreuse.

Indications. — Toutes les anémies : graves, secondaires (tuberculose, paludisme, rhumatisme, cancer, saturnisme), légères ou moyennes, consécutives aux accouchements, aux interventions chirurgicales, aux hémorragies, aux traitements radiothérapique, bismuthique ou arsénobenzolique.

Présentation. — Sous les deux formes complémentaires suivantes réunies dans la même boîte et qui doivent être prises concurremment :

1^o Complexe opothérapique gastrosplénique : ampoules buvables de 5 cc.

2^o Pilules de fer et de cuivre.

Posologie. — Dans les anémies graves : 2 ampoules et 4 pilules par jour.

Dans les anémies de moyenne intensité : 1 ampoule et 2 pilules par jour au moment des repas. (30 francs pour 6 à 12 jours de traitement).

Laboratoires des Lipides J. OLIVE, pharmacien.

14, rue des Minimes — PARIS (III^e). Tél. : Archives 03-94.

SPLENOMEDULLA

Opothérapie Splénique et Médullaire associée.

Indications. — Anémie, Chlorose, Leucémie, Paludisme, Rachitisme, Lymphatisme, Troubles de croissance.

Emploi. — a. Par voie gastrique : Extrait fluide ou sirop. Ampoules buvables.

b. Par voie hypodermique : Ampoules injectables pour injections intramusculaires quotidiennes.

Doses :

Adultes : Sirop 2 cuillerées à soupe par jour.

Ampoules buvables 1 tube par jour, matin et soir.

Enfants : Sirop 1 cuillerée à café matin et soir.

Voir la notice pour indications plus détaillées.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 722-4, 722-5, 722-23.

Laboratoires CHAIX

8 et 10, rue Alphonse-Bertillon

(ancienne rue de l'Orne) — PARIS (XV^e).

Tél. : Vaugirard 16-11.

SPLÉNYL

(Vitaminé.)

Composition. — Le SPLÉNYL est un reconstituant général à base de : rate, foie, muqueuse gastrique, surrénale, acides aminés et vitamines B ; sa formule, rigoureusement étudiée, en fait une médication réellement active et que son prix de vente très bas rend accessible à tous les malades.

Indications thérapeutiques. — Le SPLÉNYL est le type du reconstituant général, indiqué dans toutes les Anémies, Convalescences, la Tuberculose, l'Epuisement, l'Amaigrissement, les Maladies par carence, etc...

Présentation et posologie. — Le SPLÉNYL est vendu sous deux formes : *Ampoules ingérables* de SPLÉNYL de 5 cc. (boîtes de 6, 12 et 30 ampoules) et *Sirop de Splényl* (flacon de 190 cc.).

Adultes : 2 à 4 ampoules ou 2 à 4 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Enfants : 1 à 2 ampoules ou 1 à 2 cuillerées à soupe de sirop par jour.

Prix : Sirop 23 fr. 35.

Ampoules, Boîte de 6 : 13 fr. 80 ; boîte de 12 : 24 fr. 45

boîte de 30 : 59 fr. 40.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Danton 08-11.)

STADRHINE

Anciennement Stovoléine.

Baume nasal aseptique, vaso-constricteur, anesthésique, non toxique, même pour les enfants.

Composition. — Acide borique, Stovaine, Solution d'Adrénaline à 1/1000, Essence de Géranium rosat.

Propriétés. — Décongestionne et lubrifie la muqueuse nasale.

Indications. — Effet incontestable et rapide dans tous les cas de rhinite aiguë spasmodique. Souveraine dans le coryza chez l'adulte et chez l'enfant. Aucune contre-indication.

Emploi. — Après avoir mouché l'une et l'autre narine alternativement, gros comme un petit pois dans chaque narine, 3 fois par jour.

Présentation. — Tube d'étain avec embout fixe

Prix : 8 fr. 70.

L. N. C. 314-36.

Laboratoires ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

STAL-KOSAL

« La poudre qui calme ».

Coréine bismuthée.

Pansement gastro-intestinal.

Poudre et tablettes.

Formule. — Coréine (mucilage pur) et carbonate de bismuth, chimiquement pur, associés au kaolin et au Ca^{++} .

Indications. — Toutes les Gastrites et toutes les Colites. Toutes les inflammations du Cœcum.

Mode d'emploi :

Poudre : Une cuillerée à soupe *bien délayée* dans un demi-verre d'eau légèrement tiède, le matin au lit et à jeun. Une deuxième cuillerée à soupe le soir, une heure avant le dîner.

Et une cuillerée à dessert au moment des douleurs.

Tablettes : dès l'apparition des douleurs, prendre 2 tablettes. Si après quelques minutes les douleurs persistent, prendre une demi-tablette de 5 en 5 minutes jusqu'à sédation.

Prix : 22 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès — BOULOGNE-SUR-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

STALYSINE

Vaccin curatif antistaphylococcique.

Indications. — Furunculose, anthrax, acné, ostéomyélites, zona et toutes affections d'origine staphylococcique.

Double supériorité : Action directe sur le microbe pas de réaction fébrile.

Formes : Buccale, *la plus pratique* (10 ampoules de 3 cc.). Une ampoule le matin à jeun dans un peu de liquide non sucré.

Injectable, *la plus rapide et la plus sûre*. Une ampoule de 1 cc. par jour.

Filtrat, pour applications sur les foyers ouverts (6 ampoules de 3 cc.).

Prix : 10 ampoules, 27 fr. 30. — 5 ampoules, 14 fr. 30.

Pour cliniques et hôpitaux : boîtes de 50 ampoules

Laboratoires du **D^r P. ASTIER**

42, rue du Docteur-Blanche — PARIS.

(Tél. : Auteuil 24-52.)

STANION

Description. — Étain colloïdal en capsules et en ampoules.

Capsules : contiennent 0,gr. 05 d'étain colloïdal avec enrobage glutinisé (50 capsules par flacon).

Ampoules : contiennent 3 cc. de solution isotonique d'étain colloïdal électrique (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — L'étain colloïdal s'emploie dans le traitement de toutes les staphylococcies, où il permet d'obtenir la régression de l'œdème, suppression de l'inflammation et de la douleur, retour à la température normale, assèchement des foyers, expulsion aisée des bourbillons ; les récidives sont évitées.

Indications. — 1 à 2 ampoules par jour dans le traitement des staphylococcies, soit au voisinage de l'abcès, soit dans la fesse.

Capsules : 4 à 10 par jour dans le traitement des furunculoses, folliculite, anthrax, phlegmons, panaris, abcès tubéreux, pyodermites, sycosis, septicémies staphylococciques.

Prix : Ampoules : 34 fr. 30 pour 2 à 4 jours de traitement.

Capsules : 28 fr. 60 pour 5 à 12 jours de traitement.

Laboratoires **CH. COUTURIEUX**

18, avenue Hoche — PARIS. (Tél. : Carnot 18-75.)

STANNOBARDANE HENRY

L'*Étain* sous forme de *Peptonate* produit les effets suivants :

- 1^o Soulage la douleur dès le début du traitement ;
 - 2^o Arrête la marche de l'inflammation, fluidifie le pus et fait résorber le bourbillon sans qu'il soit besoin d'exercer une pression.
 - 3^o Produit rapidement la guérison ;
 - 4^o Empêche la formation de nouveaux foyers.
- Il existe deux préparations à base de *Peptonate d'étain* :

- 1^o Le **Stanno-Bardane Henry** (*Peptonate d'étain* + *Extrait de Bardane stabilisée*) ;
Le *Stanno-Bardane Henry* est présenté sous deux formes :

A. *Stanno-Bardane-gouttes* (LX gouttes répondant à 0 gr. 018 d'étain pur).

Doses. — LX gouttes à 1 cuillerée à café 3 fois par jour dans un liquide. Le flacon : 18 francs. Traitement : 5 jours.

B. *Stanno-Bardane-pilules* (chaque pilule répondant à 0 gr. 015 d'étain pur).

Doses. — 3 pilules par jour. Le flacon : 20 francs pour un traitement de 15 jours.

- 2^o Le **Peptonate d'Étain Henry** (solution sans *Extrait de Bardane* permettant un traitement *interne* et *externe*. Dosage en étain pur : 0 gr. 015 par XX gouttes).

Doses. — De XX à XL gouttes 3 fois par jour. Le flacon : 20 francs pour 10 jours.

En *lavages*, employer 1 cuillerée à café pour 100 gr. d'eau distillée, l'eau ordinaire provoquant un précipité.

Laboratoires HENRY

39, rue de Sclessin — LIÉGE.

STANNO-SUFROL CROSNIER

Composition :

Étain, Oxyde d'étain, Soufre actif, Bardane stabilisée, Extrait splénique.

Indications :

Furonculose et Affections à staphylocoques.

Posologie :

2 à 3 comprimés et plus à chaque principal repas.

Prix : 10 fr. 70 la boîte de 40 comprimés.

Échantillons :

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS
(Tél.: Avron 35-04.)

STANNOXYL

Composition. — Oxyde d'étain et étain métallique absolument purs (d'après les travaux de Frouin).

Indications. — Furonculose et toutes affections à staphylocoques, Acné, Anthrax, Abscess du sein chez les nourrices, etc.

Propriétés. — Traitement pratique et rapide : l'ingestion quotidienne de 4 à 8 comprimés fait disparaître l'inflammation et les douleurs et arrête l'évolution de la maladie.

Formes. — Pour l'usage interne : comprimés, cachets, ampoules. Pour l'usage externe : liquide, pommade.

Posologie. — Comprimés : 4 à 8 par jour.

Autres formes. — Suivant indications du médecin.

Prix : Comprimés : 19 fr. 90 ; Ampoules : 29 fr. 60 ; Cachets : 22 fr. 45 ; Liquide : 23 fr. 45 ; Pommade : 18 fr. 35.

Enregistrés au L. N. C. n° 507-26, 60, 15, 16, 17.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 20-60.)

STAPHYLAGONE

Vaccin antistaphylococcique, antitoxique et antimicrobien composé de :

Corps microbiens + lysat + *anatoxine*.

Indications. — Vaccination pré-opératoire et traitement de toutes les suppurations et *infections rebelles* à Staphylocoques. Zona.

Posologie. — Une injection sous-cutanée tous les deux ou trois jours, de 1/2 à 2 cc. progressivement.

Les 6 ampoules. Prix : 32 fr. 65.

Enregistré au L. N. C. n° 514-14.

Littérature et échantillons :

Produits Biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré—PARIS.
(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes.)

STAPHYLASE

du Docteur DOYEN

Solution concentrée des principes actifs des levures de bière et de vin.

Indications. — Acné, Furunculose, Anthrax, Ostéomyélite, Impétigo, Angines, Bronchites, Pneumonies, Gripes, Coryza, Stomatites, Dyspepsie, Entérites.

Doses. — *Adultes* : 4 à 12 cuillerées à soupe par jour. *Enfants* : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Associée à l'iodure de potassium et au bromure de potassium, la Staphylase a la propriété d'annihiler les effets secondaires de ces produits.

Prix : 23 fr. 50 le flacon de 300 gr.

Laboratoires LEBEAULT

BESINS et Cie, pharmaciens

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

STAPHYLO-COCCINE FRAQUET

Extrait protoplasmique de la levure de bière isolé de sa membrane cellulaire. La levure est ainsi de digestion plus facile, d'action plus prompte à doses moindres.

Propriétés thérapeutiques. — Agent de la phagocytose. Abaisse la glycémie.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Angine, Maladies infectieuses, Dermatoses, Diabète, Acidose.

Doses et mode d'emploi.

Adultes : 2 à 5 cuillers à soupe par jour.

— : 4 à 10 comprimés —

Enfants : Moitié de ces doses au moins suivant l'âge.

Prix au public :

Solution : 17 fr. 65. Comprimés : 17 francs.

Laboratoire des Produits SOIENTIA

D^r E. PERRAUDIN, pharmacien,
21, rue Chaptal — PARIS (Tél. : Trinité 29-29.)

STAPHYLOTHANOL

Hydroxyde de Bismuth radifère.

Indications thérapeutiques. — Toutes les staphylococcies : Furoncles, Anthrax, Abscess tubéreux de l'aisselle, Ostéomyélites, Ostéites, etc.

Se recommande dans les cas rebelles à toute autre médication.

Posologie et Présentation :

Adultes : 1 ampoule de 2 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 21 fr. 60.

Boîte de 10 suppositoires 18 fr. 45.

Enfants : 1 ampoule de 1 cc. tous les 3 jours ou 1 suppositoire tous les 2 jours.

Boîte de 6 ampoules 15 fr. 60.

 Boîte de 10 suppositoires..... 15 fr. 40.

Laboratoire G. FERMÉ

 22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Europe 49-50.)

STAPHYLO-VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Duchon.

Composition. — Lysat de Staphylocoques.

Indications. — Furunculose, Anthrax, Abscess et lymphangites du sein, Pleurésies purulentes à Staphylocoques, Staphylococcémies.

STREPTO-VACLYDUN

Composition. — Lysat de Streptocoques hémolytiques.

Indications. — Érysipèle, Lymphangites, Pleurésies purulentes à streptocoques, grandes infections à Streptocoques.

Posologie. — Ces lysats vaccins s'emploient à la dose de 1/2 cc. pour la première injection, les suivantes à 1 cc. tous les jours jusqu'à apyrexie, puis tous les deux jours. Mêmes doses pour enfants et adultes.

Présentation. — En boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Prix : 27 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Carnot 78-11.)

STAPROLYSAT

Vaccin neurotrope.

Indications. — Tous les accidents du système nerveux, central ou périphérique auxquels on attribue une origine infectieuse. Séquelles des staphylococcies.

Névrites, Polynévrites, Névralgies, Névraxies, Radiculites, Myélites, Encéphalite et ses séquelles, Sclérose en plaques, Tabès, Parkinson, Herpès, Zona. Ulcères gastriques et duodénaux.

Composition. — Autolysat neurotrope de *Staphylocoque* et de *B. Prodigiosus*.

Forme. — Ampoules de 1 cc., à doses progressivement croissantes divisées en quatre séries.

Série I. — 6 ampoules numérotées de Dose 1 à Dose 6, dosées de 0 cc. 02 à 0 cc. 75 d'autolysat neurotrope.

Série II. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1, d'autolysat neurotrope.

Série III. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 2 d'autolysat neurotrope.

Série P. — 6 ampoules semblables, dosées à 0 cc. 1 d'autolysat renforcé par 5 milliards de corps microbiens *pyocyaniques*.

Mode d'emploi. — Une injection *intramusculaire* tous les 2 ou 3 jours. Injecter en tous cas, sans arrêt, les 3 premières séries et *au besoin* la série P. Dans les cas aigus, difficiles ou rebelles, on choisira les injections *intramusculaires* de série P (sans passer par les premières séries) ou les injections intraveineuses prudentes de séries I et II. Associer le traitement iodé. (Nous demander renseignements, voir *Iodassium* et *Iodosulfène*.)

Les trois premières séries sont en général indolores et apyrétiques. La série P employée dès le début provoque une réaction fébrile légère (38° à 39°).

Les trois premières séries : 32 francs l'une.

Série P : 36 francs.

Enreg. au Lab. de Cont. sous les n^{os} 535-26, 61, 62 et 29.

Nota. — En prescrivant, bien spécifier la série demandée et rappeler :

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

STAVAFER

(Ancienne dénomination **STOVAFER**)

Granulé

Médication reconstituante à base d'acide oxyacétylamino-phénylarsinique, Fer, Mg, Soude, Chaux, Manganèse.

1 cuillerée à café contient 0,05 d'acide oxyacétyl amino-phénylarsinique.

Indications. — Asthénie, Anorexie, Anémie, Maladies infectieuses et parasitaires.

Mode d'emploi. — *Enfants*, à partir de 3 ans : 2 cuillerées à café par jour.

Adultes : 3 cuillerées à café par jour.

Prix de vente : 20 fr. 80.

Laboratoires RICHER

Docteur en pharmacie

45, Faubourg Saint-Denis — 1, rue d'Enghien
PARIS (Tél. : Provence 34-87.)

STÉAROL

Antiseptique général.

NEUTRE

STÉRILISÉ

Détruit tous germes Pathogènes, respecte la cellule vivante.

Action triple : *Détergène, Antiseptique, Cicatrisante.*

Composition. — Complexe de savon liquide neutre stérilisé, très fluide, avec présence de formol et d'essences aromatiques déterpénées parmi lesquelles *thym* et *lavande*. (pH = 7.)

Indications :

Plaies de brûlures : Employer pur, pouvoir analgésique puissant.

Plaies vives : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Plaies atones : solution à 50 p. 100 en lavages et compresses.

Soins gynécologiques : *Accouchement, métrites.* Emploi de la solution : 1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie, en injections et savonnages externes. Désinfection vulvaire.

Constipation, traitement des oxyures : Lavements avec la solution, 1 cuillerée à bouche par litre d'eau bouillie.

Prurits, Acné, Furonculose : Solution au 1/10 en lavages et compresses.

Lavage des oreilles : Brossage des dents, *Gargarismes* : Solution au 1/10.

Désinfection des mains et des régions pileuses par savonnage avec une solution étendue sans irritation consécutive.

Prix. Petit modèle : 10 francs. Grand modèle, 16 francs.

Laboratoires du STÉAROL

5, rue Émile-Combes — SAINT-ÉTIENNE (Loire).

STÉRAMINE

Crème antiseptique hydrosoluble.

Composition. — Crème onctueuse stéaro-sodique contenant 1 p. 100 de Clonazone Daufresne, libérant lentement dans la plaie de l'hypochlorite naissant.

Indications. — Plaies récentes ou infectées, brûlures, engelures, ulcères variqueux.

Mode d'emploi. — Appliquer une fois par jour une couche de 2 à 3 millimètres d'épaisseur et recouvrir d'un pansement sec.

Avantages. — Action antiseptique prolongée, pansement propre et sans odeur, cicatrisation rapide.

Échantillons médicaux sur demande.

Laboratoire Pharmaceutique.
DAUFRESNE

42, rue Thiers — LE HAVRE.

STÉRANDRYL

Propionate de Testostérone.

Composition. — Éther-sel de l'hormone testiculaire cristallisée, obtenue synthétiquement.

Voie intramusculaire.

Le *Stérandryl* est une solution huileuse de propionate de testostérone.

a) Boîte de 2 ampoules de 1 cc. 25 mgr.

b) Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 10 mgr.

c) Boîte de 4 ampoules de 1 cc. 5 mgr.

Indications. — Hormone dynamogénique, Traitement du prostatisme avec ou sans rétention. Castrés chirurgicaux ou fonctionnels. Insuffisants génitaux. Retards puberté, Syndrome adiposo-génital.

Posologie. — On variera la posologie suivant les cas à traiter en se basant sur les directives puisées dans la littérature du *Stérandryl*.

Voie percutanée. Pour les traitements d'entretien : **Ecto-Stérandryl** (alcoolat de testostérone titré à 5 mgr. par cc.).

(Voir **Acéto-Stérandryl**).

Prix au public :

Boîte de 5 ampoules de 1 cc. 10 mgr. : 66 fr. 30.

Boîte de 4 ampoules de 1 cc. 5 mgr. : 40 fr. 80.

Ecto-Stérandryl, le flacon de 10 cc. : 51 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL
89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).
(Tél. : Littré 58-43.)

STÉROGYL

STÉROGYL 10 et 15

Solution huileuse de Vitamine D₂ cristallisée, chimiquement pure.

Indications thérapeutiques. — Le *Stérogyl* est le traitement de tous les états rachitiques, des troubles du métabolisme du calcium, des déperditions en chaux et en phosphates, des états ganglionnaires, des anémies pré-tuberculeuses et gravidiques, de la carie dentaire. Facilite la consolidation des fractures. Remplace l'huile de foie de morue dans toutes ses indications.

Présentation et posologie (voie buccale) :

Flacon de 10 cc. contenant 5 mgr. de vitamine D₂ (X gouttes : 0 gr. 0002)

Jusqu'à 1 an : X gouttes par jour.

De 1 à 10 ans : X à XX gouttes.

Au delà de 10 ans et chez l'adulte : XX à XXX gouttes.

Boîte de 1 ampoule de 2 cc. contenant 10 mgr. de vitamine D₂.

Boîte de 1 ampoule de 3 cc. contenant 15 mgr. de vitamine D₂.

Pour une *dose unique* à prendre en une seule fois.

Prix au public :

Boîte de 1 ampoule de 2 cc. : 25 fr. 50.

Boîte de 1 ampoule de 3 cc. : 32 fr. 65.

Flacon de 10 cc. : 19 fr. 05.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e). (Tél. : Littré 58-43.)

STILLARGOL

Solution de protéinate d'argent convenable, aux concentrations de 1, 2, 5, 10 p. 100.

Antiseptique puissant, ne donnant pas sur le linge de taches indélébiles comme le nitrate d'argent. Son emploi, qui a été étendu aux cas les plus variés de la pratique médicale et chirurgicale, ne donne des résultats satisfaisants que si le protéinate d'argent est très pur.

Présentation. — En flacons compte-gouttes M. S. à pointe mousse de 30 cc. D'où les avantages suivants :

1^o *Commodité* : Point n'est besoin de couper les pointes du flacon.

2^o *Sécurité* : Aucun risque de blesser le patient par les petites aspérités résultant d'une ouverture défectueuse de la pointe.

Usages. — *Oculistique* : Désinfection de l'œil, quelques gouttes, 2 ou 3 fois par jour de STILLARGOL à 2, 5, 10 p. 100, suivant les cas :

— Conjonctivites, Blepharites.

Abstétrique : Désinfection des yeux du nouveau-né, avec 2 gouttes de STILLARGOL à 1 ou 2 p. 100.

Rhino-pharyngologie : Coryza, Rhinites, Sinusites, etc., STILLARGOL à 1, 2 ou 5 p. 100.

Affections de l'oreille : STILLARGOL à 5 ou 10 p. 100.

Pédiatrie : Désinfection nasale, oculaire et auriculaire.

Prix : 1^o/₁₀, 2^o/₁₀ : 14 fr. 70. — Prix : 5^o/₁₀, 10^o/₁₀ : 15 fr. 80.
20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

1, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51 12.

LE MARINEL, pharmacien

4, avenue Orban — BRUXELLES

STIMULAXINE

Stimule le foie, relaxe l'intestin.

Cholagogue et laxatif doux.

Indications. — Insuffisance hépato-biliaire, cholécystites, lithiase, entérocólite, constipation chronique, dermatoses, hémorroïdes.

Composition. — Extraits végétaux, cholagogues et cholérétiques, adjuvants du péristaltisme intestinal : curcuma xanthorriza, boldo, artichaut, podophyllin, rhamnus pursh.

Extraits opothérapiques : bile desséchée et dépigmentée, poudre de glandes intestinales.

Antiseptiques : ferments lactiques.

Antispasmodique : extrait de belladone.

Posologie. — De 1 à 6 dragées par jour, selon les indications du médecin traitant. Demi-dose pour les enfants. La boîte contient soixante dragées, soit en moyenne un traitement de trois à dix semaines.

Inscrite au Laboratoire National de Contrôle.

LABORATOIRES BARTIER

ARMENTIÈRES (Nord).

(Tél. : 254.)

STINERGYX

Tonique endocrino-mangano-phosphoré
(sans arsenic).

Paresse physique et psychique.

Composition. — Cortico-surrénale, androïque, cérébral, Thyroïde ; Manganèse, Acide Phosphorique.

Indications. — Médication de la paresse physique et psychique, Asthénies dites essentielles, Apathie, Stimulant sexuel.

Avantage. — L'acide phosphorique ainsi enrobé est d'une tolérance parfaite pour les muqueuses digestives. Ce complexe bio-chimique tonifie puissamment la cellule nerveuse et élève rapidement le rendement intellectuel.

Ce produit se classe moins comme un médicament que comme un aliment souvent nécessaire dans les étapes de la vie scolaire et cérébrale.

Présentation. — Comprimés.

Posologie :

Enfants : 1 à 3 comprimés (avaler ou écraser).

Adultes : 2 à 4 comprimés (avaler).

De préférence 1/2 heure avant les repas.

Enregistré L. N. C.

Laboratoire d'Applications

Biologiques **LABIOLA**

P. GORDONNIER, pharmacien, 52, rue de Cambrai — LILLE

STOMAROL

Estomac de porc desséché et délipoidé
(Méthode de Castle.)

Composition. — Le Stomarol est un Extrait d'estomac de porc desséché et délipoidé selon un procédé spécial qui permet de conserver intégralement au produit les ferments résolutifs de la viande tels qu'ils se trouvent dans un estomac normal.

Présentation. — Forme poudre, insoluble, sans mauvais goût, dont :

16 gr. 50 représentent 100 gr. estomac frais de porc.

Indications. — Le Stomarol est recommandé dans tous les cas d'insuffisance gastrique et particulièrement dans l'anémie pernicieuse accompagnée d'achylie.

Posologie :

Adultes : 20 à 30 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à soupe).

Enfants : 10 à 15 gr. par jour (2 à 3 cuillerées à dessert).

Mode d'emploi. — A prendre au début des repas délayé dans : potage, lait, purée de légumes, confiture, etc.

Prix : 32 francs.

Laboratoire Albert ROLLAND

4, rue Platon — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 67-73, 74.)

STOMOBROL

Sédatif et Curatif puissants des Gastropathies, Troubles dyspeptiques douloureux.

Propriétés thérapeutiques. — *Pansement véritable de la muqueuse gastrique par le Kaolin.*

Antiseptique : par le Carbonate de bismuth.

Absorbant : par le Carbonate de chaux léger et la Magnésie hydratée.

Sédatif : par le bromure de sodium, la belladone, la codéine.

Musculopoiétique : par la noix vomique qui rétablit les contractions normales de l'estomac rendues indolores par la belladone.

Reconstituant : par le phosphate tricalcique et la strychnine (*noix vomique*) dans les états dépressifs consécutifs aux gastropathies.

Indications. — Dyspepsies, hypersthénies, gastralgies, pyrosis, ulcères, aérophagies, anorexies d'origine digestive. Entérites aiguës et chroniques.

Présentation et mode d'emploi. — *Poudre :* 1 à 2 cuillerées à café délayées dans un peu d'eau après les repas ou au moment des douleurs.

Littérature et échantillons sur demande.

Prix : 17 francs.

Laboratoires CLAVERIE

Place Carnot — ROMAINVILLE (Seine).

(Tél. : Botzaris 10-10.)

STOPRAL

Analgésique, sédatif, antipyrétique, régulateur nerveux. Strictement atoxique. Formule établie pour adultes seulement. Comprimés à avaler ou à déliter dans l'eau auparavant.

Indications. — Douleurs de la goutte, de l'arthritisme. Névralgies.

Règles douloureuses, spasmes douloureux.

Fièvre, malaises généraux, grippe, maladies fébriles.

Migraines, céphalées, coryza.

Le STOPRAL ne provoque aucune fatigue des voies digestives.

Exerce sur le cœur une action tonique.

Agit rapidement.

Ne présente pas de contre-indication.

Doses. — Pour adultes seulement :

Un comprimé dans 1/2 verre d'eau au moment de la douleur, à n'importe quel moment de la journée. Un second comprimé peut être utile quelques heures après le premier, un troisième est rarement utile et constitue la dose maxima.

Prix : 13 francs.

Échantillon grandeur normale sur demande (15 comprimés).

Laboratoire d'Hygiène et Thérapeutique appliquées.

47, rue Bokanowski — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 00-15.)

STOVARSOL

Acide 4-oxy-3-acétylamino-phényl-1-arsinique.

Forte teneur en arsenic (27,2 p. 100). S'administre par la voie buccale.

Indications. — Traitement des diarrhées toxi-infectieuses, cryptogénétiques, paraitaires et des tuberculeux. Amibiase, Lambliase, Spirochétoses intestinales, Syphilis, Pian.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 25. Le flacon de 30 23 fr. 50

Comprimés à 0 g. 05. Le flacon de 70 13 fr. 50

Comprimés à 0 g. 01. Le flacon de 200 11 fr. 40

Posologie et mode d'emploi :

Doses moyennes. — Adultes : 50 ctg. à 1 g. par 24 heures. Enfants : 1 à 2 ctg. par 24 heures et par kilogramme de poids.

Le Stovarsol sodique, soluble, convient aux injections hypodermiques (paralysie générale).

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône.

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

STOVÉDRINE

Pommade. Solution.

Pommade nasale atoxique.

Formule normale :

Stovocaïne	1	p. 100
Ephédrine (Chlorh.)	5	p. 100

Formule B. B. déconcentrée :


Stovocaïne.....	1	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	1,25	p. 100


Solution aqueuse pour pulvérisations :

Formule :

Stovocaïne.....	1	p. 100
Ephédrine (Chlorh.).....	5	p. 100
Chlorétone	1	p. 100

La *Stovédrine* est une association de Stovocaïne (Chlorhydrate d'Amyléine) et d'Ephédrine *naturelle* à un taux de concentration indispensable pour combattre efficacement les affections aiguës et chroniques de la pituitaire.

Indications. — Coryza, Sinusite, Céphalées,  Obstruction nasale, Asthme, Rhume des Foins.

Posologie. — *Pommade*: Introduire gros  comme un pois dans chaque narine. Masser pour répartir la pommade.

Solution: Pulvériser à une ou deux reprises, 3 fois par jour, dans chaque narine, la solution de *Stovédrine*.

Prix :

Pommade	14 fr. 80
Solution avec pulvérisateur	26 fr. 50
Solution (flacon rechange).....	18 fr. 35

Laboratoires LICARDY

38, boul. Bourdon, NEUILLY-SUR-SEINE
(Tél. : Maillot 17-75.)

STRAGOL MERLET

Aromaticothérapie.

Composition. — Association d'huiles essentielles rigoureusement pures et naturelles, sélectionnées pour leur action stimulante, désinfectante, digestive, carminative et même cicatrisante.

Indications. — Aérophagie, dyspepsie, hoquet.

Mode d'emploi :

Gouttes : V à X gouttes sur un morceau de sucre. Ne pas omettre d'agiter avant usage.

Non toxique.

Pastilles : 1 pastille correspond à une goutte.

Laboratoire MERLET

24, bd Jean-Jaurès

BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Molitor 03-91.)

STREPTODERME

N'est pas une pommade-vaccin.

Traitement des Strepto-staphylococques cutanées.

Formule. — Résorcine, Ac. salicylique, Oxyde jaune, Ichtyol du Tyrol, Oxyde de zinc, Talc. Excipient gras enlevable à l'eau.

Indications. — Après lavage avec le **Microderme**, **Solution au 1/20**, appliquer le **STREPTODERME** sur les Pyodermites, Eczéma impétiginé, Dermoépidermites streptostaphylococciques, Parakératoses, Eczématides microbiennes, Intertrigo, Lichénification infectieuse, Dysydrose streptococcique et même mycosique, Ulcère de jambe, furoncles, etc.

Contre-indication. — *Ne pas associer le Streptoderme à une médication iodée externe (formation de HgI²).*

Prix du tube de 70 gr. : 14 fr. 30.

LABORATOIRES BOUTROUX

25, rue du Général-Foy, PARIS (8^e). (Laborde 08-51.)

STRONGÉNOL

Granulé soluble basé sur des notions de conception nouvelle.
1° Action anti-anémique des *proto-sels de fer* assurée par des traces de sels de cuivre.

2° Augmentation de l'acidité chlorhydrique stomacale par cation électif.
Développement de propriétés anti-anémiques par cet acide.

3° Absorption intégrale du *phosphate de calcium colloïdal naissant* et de son *phosphore* en présence d'un sel alcalin à radical organique. Rétention tissulaire *catalysée par la vitamine D.*

Indications. — Anémies pernicieuses, Troubles de la croissance et de la minéralisation, Rachitisme, Caries Dentaires, Hypocalcémie et toutes carences calciques, Tuberculose, Faiblesse, Surmenage, Phosphaturie, Convalescence, Fractures.

Grossesse, Allaitement, Neurasthénie, Splénectomie.

Traitement préliminaire aux interventions chirurgicales.

Posologie. — *Nourrissons et enfants* : 1 à 3 cuillerées à café par jour.

Adolescents : 1 à 3 cuillerées à dessert.

Adultes : 1 à 3 cuillerées à soupe.

Prix de la boîte : 18 fr. 75. — **Triple boîte** : 47 francs.

Diffusion strictement médicale.

Enregistré au L. N. C. M., n° 598.

Laboratoires M. de RIVE.

J.-O. MOITY, Dr en Médecine, Dr en Pharm., ancien interne des hôpitaux de Paris:

Services commerciaux : 11 bis et 13, rue Levert, Paris (20°).

STRONTIODE

Le *Strontiode* est une préparation nouvelle, dans laquelle nous avons associé la médication iodée et la médication silicique, en y adjoignant un élément synergique : l'Ion Strontium.

Nous avons pu réaliser une suspension colloïdale stable d'acide silicique d'une très grande dispersion, et par suite facilement assimilable par l'organisme.

Formule :

Acide Silicique Colloïdal.....	1 gr. »
Acide Phosphorique.....	0 gr. 30
Chlorure de Sodium.....	1 gr. 20
Iodure de Sodium.....	7 gr. 50
Iodure de Strontium.....	0 gr. 50
Véhicule Q. S. pour.....	100 gr.

Deux gouttes de *Strontiode* correspondent à 0.001 d'acide silicique colloïdal et 0.008 d'iode combiné.

Indications : Artériosclérose et ses suites.

Hypertension, Troubles cardiaques, Aortite, Angines de poitrine, Troubles cérébraux (Vertiges, Angoisses, Céphalées; Insomnies, Diminution de la mémoire), Troubles auriculaires (Bourdonnements d'oreille, Surdité, Paresse auditive), Troubles oculaires (Mouches volantes, Affaiblissement de la vue), Troubles de la circulation en général et en particulier troubles de la ménopause, maladie de Raynaud, etc...

Posologie : VI gouttes 3 fois par jour, après les principaux repas, dans un peu d'eau pendant six semaines, repos de 15 jours et reprendre la cure 4 semaines.

Prix : 19 fr. 10. — Enr. L. N. C. n° 1134-8.

Laboratoires de l'ATOSPIRINE et du STRONTIODE

19, rue du Bac — PARIS. (Tél. : Littré 55-03.)

STROPHANTINE CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,0001 de Strophantine cristallisée
extraite de *Strophantus gratus*.

Synonyme : **Ouabaïne**.

Indications. — Affections mitrales, Dyspnée, Oppression, Œdèmes, Asystolie, Cardiopathies des enfants et vieillards, Lésions cardiaco-aortiques. Artériosclérose avec ou sans néphrites.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur.

Le flacon de 50 granules.

STROPHANTUS CATILLON

Forme : GRANULES DE CATILLON

à 0,001 Extrait titré de *Strophantus*.

Indications. — Asystolie, Oppression, Dyspnée, Œdèmes, Affections mitrales, Cardiopathies enfants et vieillards.

Posologie. — 2 à 4 granules par jour, comme tonique du cœur, *diurétique*.

En cas urgent, on peut donner 10 à 20 granules pour forcer la diurèse.

Le flacon de 50 granules.

Prix de l'Académie de médecine.

Laboratoire CATILLON

3, boulevard Saint-Martin — PARIS.

STRY-CALCIUM AGUETTANT

Nom nouveau du

STRYL-CAL AGUETTANT

Première association stable de *Strychnine* et *Gluconate de Calcium*.

Tolérance parfaite de la *Strychnine*.

Indication. — Tonique musculaire et recalcifant par l'action stimulante de la *Strychnine* et les propriétés de l'ion Calcium assimilable.

Action. — Evite sûrement les effets souvent violents de la *Strychnine*, ne surmène pas le foie. Le *Stry-Calcium* est donc sans danger pour les distoniques sympathiques, nerveux, convalescents, déprimés, particulièrement faibles et sensibles, souvent hépatiques.

Posologie. — 1 à 2 ampoules par jour. Commencer par une demi-ampoule.

Forme. — Ampoules injectables (2 cc. = 0,002 de *Strychnine*, et 0,20 de *Gluconate*). Conditionnements. et prix spéciaux aux hôpitaux.

Enreg. au lab. Nat. de Cont. des Méd. sous le n° 130-10.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON (Rhône).

(Tél. : Franklin 24-63.

STRYCHNAL

Sulfate d'éthylbétaine de l'acide Strychnique, 10 fois moins toxique que la *Strychnine*.

Asthénie, Anémie, Anorexie, Paralysies post-diphthériques, Névrites, Surmenage, Paralysie du nerf optique.

Granules à 0,01, 2 à 4 par jour (flacon de 50 : 17 fr.).

Ampoules à 0,01, 1 à 2 par jour (boîte de 12 : 20 fr.).

Gouttes (Phospho-Strychnal : association Strychnal, 0,005 ; acide phosphorique, 0,15 ; Glycérophosphates, 0,24 pour XX gouttes), XL à LX gouttes par jour : 16 fr. 50.

Arsi-Strychnal (Strychnal et cacodylate), 1 à 2 par jour : 20 francs.

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI°).

STRYCHNARSITOL ROBIN

Injectable.

Glycérophosphate de soude, nucléinate de soude et méthylarsinate de strychnine.

Ampoules injectables de 2 cc.

Dose et mode d'emploi.

Une injection Hypodermique de 2 cc. par 24 heures.

Indications.

Coup de fouet à l'organisme, Asthénie, Convalescence.

Prix : 20 fr. 15.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — Paris.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

STRYCHNEURON

Thérapeutique anti-épileptique Strychno-barbiturique.

Présentation. — Gouttes, solution $\frac{1}{4}$.

Composition. — Phényléthylmalonylurée, Strychine, Paullinia.

Indications. — *Epilepsie* (l'adjonction de Strychnine prévient le Syndrome dépressif barbiturique), agitation éthylique.

Démorphinisation, certains états psycho-névropathiques et dépressifs.

Propriétés. — Sous forme liquide, le Phényléthylmalonylurée permet une posologie plus souple et, à dose moindre, se montre plus actif. La Strychnine exerce une action tonique sur la cellule nerveuse ; les centres respiratoires et vaso-moteurs sont stimulés. L'extrait de Paullinia tonique et euphorique complète cette action.

Posologie. — X... à LX gouttes par 24 heures.

2 gouttes = 0 gr. 01 Phényléthylmalonylurée et 0 gr. 00012 de Sulfate de Strychnine.

Le flacon de 20 grammes (800 gouttes) durée moyenne : 20 jours.

Enregistré L. N. C.

Bibliographie. — Communications à la Société Médico-Psychologique de Paris, 2 février 1933, 22 décembre 1938 et 27 février 1939. *Société de Biologie*, 29 janvier 1938. Thèse 1939.

**Laboratoire d'Applications
Biologiques LABIOLA.**

P. CORDONNIER, Pharmacien, 52, rue de Cambrai, Lille (Nord)

STRYCHNOPHYL

Gouttes Strychno-Phosphatées-Magnésiennés.

Acide phosphorique ; Phosphate disodique ; Chlorure de Magnésium ; Sulfate de Strychnine, 1 milligramme par dose de XXX gouttes.

Indications. — Toutes Asthénies, Surmenage, Neurasthénie, Atonies Gastro-intestinales, Dépression, Convalescence des maladies infectieuses, Arthritisme, Alcalose, Etats pré-néoplasiques, etc...

Doses et mode d'emploi. — Sauf indications contraires du médecin :

Adultes : XXX gouttes dans un peu d'eau au début ou au cours des repas de midi et du soir.

Enfants : demi-doses.

Présentation. — Flacon pour 15 jours de traitement :

Prix : 14 fr. 50.

Dans les cas où la Strychnine est contre-indiqué prescrire :

STHÉNOPHOS

Gouttes Phosphatées-Magnésiennes.

Même composition sans Strychnine, mêmes doses.

Laboratoires CREUZÉ

74, rue de Lourmel — PARIS (XV°).

(Tél. : Vaug. 30-05.)

STRYCHNOTONINE

Composition :

Méthylarsinate de Calcium..... 0 gr. 0030

Chlorhydrate de Strychnine 0 gr. 0005

Pour 1 dragée.

Synergie peu toxique et maniable.

Action. — Tonique général et nervin, dynamogène, activant la nutrition, favorisant l'hématopoïèse, eupnéique, stomachique.

Indications. — Asthénie, Psychasthénie, Mélancolie, Surmenage, Adynamie des vieillards, Convalescences, États neuro-anémiques, Polynévrites, Hypotensions, Atonies digestives, Enurésie.

Posologie. — 1 à 3 dragées à chacun des 3 repas.

Cures de 1 semaine, séparées de 1 semaine de repos.

N. B. — Des tableaux facultatifs de doses croissantes et décroissantes, échelonnées sur 3 semaines, adaptées selon l'âge, sont annexés au mode d'emploi.

Présentation. — Flacon de 100 dragées.

N'est délivré que sur ordonnance.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII°).

(Tél. : Ségur 60-77.)

SUC DURHAM

(Sirop.)

Formule :

Suc musculaire de bœuf	31,5
Sérum de sang de bœuf hémolysé (pour 100 gr.)...	1,5

Préparation. — La concentration du suc musculaire de bœuf est réalisée non pas par évaporation, mais par *congélation fractionnée* à 15°. Le Suc Durham contient donc : les vitamines, les bases hexoniques, les catalases de la viande crue.

La conservation est assurée par simple addition de sucre et de glycérine.

Indications. — Convalescence, Suites de pleurésie ou de pneumonie accompagnées ou non d'amaigrissement, *Chloro-anémie*, *Neurasthénie*, dépression nerveuse, surmenage physique et intellectuel.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 à 6 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 2 à 6 cuillerées à entremets.

Enfants (3 à 7 ans) : 2 à 6 cuillerées à café par jour, soit pur, soit étendu d'un peu d'eau de Vals Perle n° 3.

Prix : 19 fr. 60.

Laboratoire MAUCHANT

GENNEVILLIERS (Seine).

(Tél. : Grés. 05-21.)

SUCRE ÉDULCOR

dît le Sucre des Diabétiques.

Très ancienne préparation, très connue, recommandée aux Diabétiques par tout le Corps Médical. Une pastille suffit pour sucrer une tasse de café, thé, grog, etc...

Prix : la petite boîte : 6 fr. 75.

La grande boîte : 17 fr. 75.

LITHARSYNE

Indications. — Traitement du diabète et de l'arthritisme par le Chlorhydro-Méthylarsinate de Lithine.

Posologie : Gouttes : XXV gouttes avant les repas de midi et du soir dans un peu d'eau.

Comprimés : 6 par jour (3 avant chaque repas).

Prix : 12 fr. 90.

Laboratoires E. FERRÉ

J. LEROY, Pharmacien

19, rue Grégoire-de-Tours — PARIS (V^{le}).

Détail : 142, bd St-Germain — (Tél. : Danton 98-45.)

SUCRE « VITA D »

Juxtaposition de saccharose et vitamine D cristallisée (calciférol).

Composition :

Vitamine D.. 10 000 unités internationales.

Saccharose.. 100 grammes.

Chaque morceau de sucre pèse 5 grammes et contient 500 U. I. de Vitamine D.

Propriétés. — Associe les propriétés anti-rachitiques de la Vitamine D aux propriétés toni-nutritives du saccharose.

Le morceau de sucre « Vita D » est dosé rigoureusement à 500 U. I. de Vitamine D.

Indications. — Rachitisme, tous les cas de décalcification et de déminéralisation de l'organisme, Poussées dentaires chez l'enfant, Caries dentaires chez l'enfant et chez l'adulte, Fractures, Grossesse, Allaitement, Convalescences.

Présentation. — Le sucre « Vita D » se présente sous forme de morceaux de sucre de 5 grammes (boîtes de 320 gr. net).

Posologie et mode d'emploi :

Remplace, à quantité égale, les qualités nutritives et caloriques du sucre ordinaire.

Peut être facilement mélangé aux biberons du nourrisson ou croqué par les enfants et adultes.

Nourrissons : 1 à 4 morceaux par 24 heures dans les biberons.

Enfants de 1 à 10 ans : 4 à 8 morceaux par 24 heures.

Enfants au delà de 10 ans et adultes : 8 à 10 morceaux par 24 heures.

Laboratoires Français du Sucre

M. CURIE, Pharmacien

40, rue François-1^{er} — PARIS (VIII^e).

SUFROL CROSNIER

(Comprimés.)

Composition. — Complexe de Soufre sous ses 3 formes actives : Hydrogène sulfuré naissant, Hyposulfites alcalins, Soufre micellaire ; Térébenthine colloïdale.

Indications. — Toutes les indications du soufre, en particulier affections subaiguës ou chroniques des voies respiratoires, laryngites, pharyngites ; lymphatisme ; dermatoses ; arthritisme ; rhumatisme chronique ; goutte.

Posologie :

Adultes : 2 à 3 comprimés au début des deux principaux repas.

Enfants : 1/2 doses.

Prix : 10 fr. 70 l'étui de 40 comprimés.

Échantillons :

Laboratoires CROSNIER

44, rue de Lagny — MONTREUIL-PARIS.

(Tél. : Avron 35-04.)

SUISERYL

Composition. — Sérum normal de porc.

Propriétés. — Thérapeutique biologique des infections d'origine intestinale à colibacilles, entérocoques, paratyphiques, proteus, perfringens, pyocyaniques, etc.

Indications. — *Colibacilloses :* Entérites, Entérocrites, Diarrhées infantiles, Diarrhées saisonnières, Pyélonéphrites gravidiques, Pyélites, Cystites.

Typhoïdes et Paratyphoïdes.

Forme. — Boîte de 6 ampoules de 10 cc.

Posologie. — 1 à 3 ampoules par jour, par voie buccale, loin des repas.

Prix : 26 fr. 50.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

SULFAGONE

(Nouvelle formule.)

Composition :

4-Amino-phényl-sulfamide	0 gr. 25
Extrait concentré de foie correspondant à pulpe fraîche....	0 gr. 55
Pour 1 comprimé.	

Forme. — Comprimés glutinisés.

Indications : — *A titre préventif :* Erysipèles, Phlegmons, Abscesses, Otites, Angines, mastoidites, Septicémies à streptocoques, Méningites à streptocoques et à méningocoques, pneumococcies. Infections gonococciques aiguës ou chroniques. Infections dentaires, colibacilluries.

A titre curatif : Prévention de l'infection puerpérale et des accidents du post-abortum. Interventions pour affections septiques. Epidémies.

Posologie : — (Ne jamais absorber plus de deux comprimés à la fois.)

Traitement curatif : 2 à 20 comprimés par jour.

Traitement préventif : 2 à 12 comprimés par jour.

Enfants : 1/2 dose.

Nourrissons : 1/4 de dose.

Incompatibilités. — Purgatifs salins (Sulfate Na ou Mg.) médicaments chryso ou arsénothérapiques, antipyrine.

Présentation et prix. — Le flacon de 30 comprimés : 22 fr. 45.

Enregistré au L. N. C. M. N° 514-123.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

SULFAMIDO-SUPPO

Composition. — Association Paramino-Benzène sulfamide et camphre du Japon par voie rectale.

Propriétés thérapeutiques. — *Traitement préventif et curatif* de tous les états infectieux médicaux et chirurgicaux. Septicémies, pneumonies, méningites, gonococcies, cystites, pyélites, colibacillose, angines septiques, etc.

Présentation. — Suppositoires :

Adultes. Enfants. Nourrissons.

Paramino-benzène sulfamide	0,50	0,25	0,12
Camphre	0,05	0,03	0,015

Posologie. — 2 à 3 suppositoires par jour.

Faire administrer un lavement évacuateur avant l'introduction du *Sulfamido-Suppo*.

S'abstenir de prescrire des médicaments sulfatés pendant la durée du traitement.

Laboratoire REBOUL

62, avenue de Paris — VILLEJUIF (Seine).

SULFAMYD

Paraminobenzénésulfamide.

Comprimés dosés à 0 gr. 25.

Prix : Le flacon de 40 comprimés : 15 francs.

Indications. — Infections à Streptocoque, Staphylocoque, Pneumocoque, Méningocoque, Gonocoque et Coli-Bacille.

Posologie. — Doses moyennes de 4 à 12 comprimés par jour. Cette dose étant fractionnée au cours des 24 heures. Pour les enfants, proportionnez les doses suivant le poids.

Échantillons et littératures envoyés gratuitement sur simple demande.

Laboratoires LAFFORT

JOUE - LES - TOURS (Indre-et-Loire).
(Tél. 38.)

SULFAN

Forme. — Comprimés à sucer lentement.

Composition. — Monosulfure de sodium, Borate de soude, Extrait d'Erysimum, Teinture d'Aconit, sucre et réglisse.

Propriétés. — Type par excellence du gargarisme sec fondé sur l'action élective du soufre, de ses vapeurs et de ses dérivés sur les muqueuses et les ganglions des voies respiratoires. Agent essentiel de métabolisme.

Indications. — Toutes les affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx, du pharynx, du larynx, de la trachée et des grosses bronches. Tous états infectieux ou toxi-infectieux.

Posologie. — 2 à 5 comprimés par jour.

Prix : le tube de 24 comprimés : 10 fr. 40.

Échantillons et Littérature :

Laboratoire DALAYEUN, pharmacien

15, rue de Paris — SANNŌIS (Seine-et-Oise).
(Tél. : 19.)

SULFAPYRIDINE ZIZINE

Médication anti-infectieuse.

Forme. — Comprimés dosés à 0 gr. 30 de principe actif.

Composition. — Para-aminophénylène-sulfo-2-amino-pyridine. Poudre alcaline pour en faciliter la tolérance.

Propriétés thérapeutiques. — Action bactériostatique directe sur le microbe, et indirecte par ralentissement et suppression de sa fonction de reproduction.

Indications. — Toutes les infections en général, mais en particulier : les infections pulmonaires à pneumocoques et germes associés, les gonococcies et leurs complications, les méningites à pneumocoques, méningocoques, bacille de Pfeiffer, les infections à staphylocoques (anthrax, septicémies), les infections puerpérales, les colibacilloses.

Posologie. — 1 gr. 50 à 6 grammes suivant la gravité.

Diviser la dose quotidienne en six ou huit prises qui seront administrées à intervalles réguliers, la prise initiale devant être au moins double des prises fractionnées suivantes.

Incompatibilités. — Purgatifs salins.

Certains traitements chimiothérapiques (en particulier arsenic et mercure).

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie — Ex-interne en pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Facultés de Médecine de Paris et Bordeaux.

24-26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).
(Tél. : Diderot 28-96 et Dorian 75-52.)

SULFARSÉNOL

Adopté par les Hôpitaux.

Dioxydiaminoarsénobenzène diméthylène sulfite de sodium. Teneur en arsenic : 19 p. 100.

Injections (au choix du médecin) : Intraveineuses, sous-cutanées, intramusculaires.

Indications. — Syphilis, Hérédosyphilis, Angine de Vincent, Aphtes, Athrepsie, Anorexie des nourrissons, Blennorragie, Dermatoses chroniques, Dysenterie amibienne, Eléphantiasis, Enurésie, Erysipèle, Fièvre de Malte, Goitre endémique, Infection puerpérale, Paludisme, Typhoïde, Variole, Zona.

Doses :

A	B	C	D	E	1	2	3	4
5 milgr.	1 ctgr	1,5	2	3	6	12	18	24
5	6	7	8	9	10	11	12	13
30	36	42	48	54	60	72	84	96 ctgr.

Voir *Arsénos-Solvant* :

Durée moyenne des unités vente :

On considère généralement que 12 ctgr. sont éliminés en 24 heures.

Laboratoires de Biochimie Médicale.

Ch. DESGREZ, Docteur en pharmacie.

19-21, rue Van-Loo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 26-62 et 04-30.)

SULFARSIODE

Composition et dosage :

Iode.....	0 gr. 006 par cc.
Arsenic.....	0 gr. 002 —
Soufre allylique	0 gr. 004 —
1 cc. représente XLII gouttes.	

Indications :

Troubles ganglionnaires et lymphatiques, adénite, affections cutanées, asthme, arthritisme, engelures, accidents spécifiques héréditaires ou acquis.

Posologie :

Bébé, selon l'âge, VI à XII gouttes par jour.

Adolescents — X à XX — —

Adultes — XV à XXX — —

A prendre en 2 fois dans un peu d'eau sucrée au milieu des repas, par périodes de dix jours.

Forme et prix : Gouttes : 19 francs le flacon.

L. N. C. n° 1207-4.

Préparé par le Dr ROGER, Pharmacien.

Echantillons et vente en gros :

Lab. PERRIN — 11, quai Saint-Clair — LYON

Dr A. IMBERT, Pharmacien — (Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire pour Paris : E. MOREAU, Pharmacien
13, rue des Nonnains-d'Hyères — (Tél. : Turbigo 87-05.)

SULFEX

Traitement synergique.
Séborrhées, Acnés, Folliculites.

Forme. — Lotion.

Composition. — Soufre, Borate de soude, Chlorure mercurique, Éther, Camphre dans excipient glycé-
riné aromatisé.

Indications. — Kérose, Acnés, Comédons, Folliculites, Eczématides, Séborrhée.

Posologie. — Tamponner les parties malades le soir avant de se coucher.

Nota. — Dans les cas rebelles, ajouter au traitement externe le traitement interne suivant : *prendre deux fois par jour une mesure de SULFEX POUDRE dans un peu d'eau après les repas.* (Chaque boîte de poudre est accompagnée d'une mesure.)

Prix: Lotion : 19 fr. 80. Poudre : 19 fr. 80.

Le flacon vente est suffisant pour un traitement moyen d'environ 3 semaines.

Laboratoire du SULFEX

13, rue Docteur-Mazet — GRENOBLE. Tél. : 19-84.

SULFHYDRAL CHANTEAUD

Composition. — Granules contenant chacun 1 cgr. de Sulfure de Calcium pur. Au contact des liquides organiques dégage de l'hydrogène sulfuré naissant.

Présentation. — Boîtes de 10 tubes contenant chacun 20 granules.

Indications. — Antiseptique très actif des voies aériennes et digestives. Angine, Grippe, Rhume, Rougeole, Scarlatine, etc.

Mode d'emploi, doses. — Sans danger. Non toxique. On peut sucer les granules ou les dissoudre dans de l'eau plus ou moins chaude pour gargarisme ou boisson.

Enfants : Jusqu'à 5 granules par jour.

Adultes : Jusqu'à 12 ou 15 granules par jour.

Prix de vente : 14 fr. 30.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien
CHAMBOURCY (Seine-et-Oise).

SULFIODE

Iodothioformazide stabilisé, réalisant la plus haute teneur en Soufre et Iode combinés.

Composition. — Corps nouveau, contenant 60 p. 100 d'Iode, 15 p. 100 de Soufre, parfaitement labile.

Propriétés. — Ni intolérance ni accidents d'iodisme. Seul toxique plus de cinquante fois supérieur à la dose thérapeutique, Corps stable, à haute solubilité dans l'eau.

Indications. — Puissant traitement des Rhumatismes chroniques de toutes natures, Arthrites, Arthroses. En outre, toutes les indications de l'Iode et du Soufre, ensemble ou séparément : Toutes Scléroses, Asthme, Emphysème, Hypertension, etc...

Forme et posologie. — Ampoules de 2 cc. à 0,05 d'Iodothioformazide, pour injections sous-cutanées, intramusculaires ou intraveineuses. (Ce dernier mode étant plus actif.) Ne provoquent aucune réaction.

Une injection tous les deux ou trois jours. Série de 12 injections, 2^e et 3^e séries à 1 et 2 mois d'intervalle.

Per os : Comprimés à 0,05 d'Iodothioformazide, 1 à 6 par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-19.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

SULFBIOL AGUETTANT

Antianaphylactique, antitoxique, anti-choc.

Granulé. — Groupement de soufre et d'Hyposulfite alcalin.

Ampoules. — Plasma naturel isotonisé, renforcé d'Hyposulfite, Anti-choc.

Indications principales. — Déséquilibres humoraux.

a. Insuffisance hépatique, Foie torpide, Langue saburrale, Inappétence, Lassitude, Maux de tête au réveil.

Intoxication intestinale et ses conséquences, Acné, Urticaire, Strophulus infantile, Prurigos, Psoriasis.

b. Inflammations chroniques du tube digestif (Pharyngite chronique, Entérocologie), et de l'arbre respiratoire (Asthme, Rhinite, Bronchite catarrhale).

c. Rhumatisme articulaire chronique, Algies musculaires, Névralgies.

Action. — Apport au foie de la molécule de soufre nécessaire à sa fonction thiopexique ; destruction des indols, scatols et poisons d'origine intestinale. Dissolution des floculats par l'hyposulfite.

Doses. — *Granulé* à croquer ou faire dissoudre. Matin et soir, une cuiller à dessert (enfants : une cuiller à café).

Ampoules en injection intramusculaire ou intraveineuse, ou en lavement à garder le soir au coucher. 3 à 6 par semaine.

Enreg. au Lab. Nat. de Cont. des Méd. sous les n°s 130-11 et 12.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

SULFOBYL

Forme. — Dragées glutinisées.

Composition :

Soufre colloïdal	0,02
Extrait de bile	0,05
Extrait de foie	0,05
Entérokinase	0,02
Extrait de pancréas	0,02
Urotropine	0,05
Aloïne	0,005

Par dragée.

Action thérapeutique :

Excite la sécrétion biliaire et la fonction antitoxique, assure la digestion parfaite des différents aliments, combat les infections intestinales et la constipation, évite le choc hématoclasique de Widal.

Indications :

Insuffisances du foie et de l'appareil digestif, constipation, auto-intoxication intestinale, arthritisme, dermatoses, etc.

Mode d'emploi :

Adultes : 2 dragées après chaque repas avec un peu d'eau.

Enfants : 1 dragée.

Avaler sans croquer. — Prix : 12 fr. 45.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien.

CHAMBOURCY (Seine-et-Oise).

SULFOCAÏNE FAYÈS

Pastilles.

Composition. — Soufre naissant, Cocaïne, les alcaloïdes de la Belladone et de l'Aconit, arom. à l'essence de menthe et menthol.

Indications. — Affections aiguës du pharynx et du larynx, Séquelles d'amygdalites, état congestif pharyngien des chanteurs, pharyngite des fumeurs.

Mode d'emploi. — 4 à 8 pastilles par 24 heures. Une pastille = 1 cuillerée à café de potion.

Laboratoires des Produits Sulfureux du Dr FAYÈS

G. de MONTMOROT, Pharmacien

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Usine : 10, rue Petit — PARIS (XIX^e).

SULFOCALCYL

Composition. — Gouttes stabilisées à base de soufre et de calcium ionisés.

Action rapide, sédatif puissant.

Aucune toxicité, sans alcaloïde ni opiacé.

Indications: — *Toux quinteuses, coqueluche, trachéites, toux nerveuses, asthme, prurit laryngé, spasme glottique.*

Posologie. Mode d'emploi. — A prendre loin des repas, dans une infusion très sucrée (violettes, fleurs pectorales).

De 1 à 2 ans 4 à 5 gouttes 3 ou 4 fois par jour.

De 2 à 4 ans 8 à 12 — 4 ou 5 —

De 4 à 8 ans 15 à 25 — 4 ou 5 —

De 8 à 12 ans 30 à 35 — 4 ou 5 —

Adolescents 40 à 50 — 4 ou 5 —

Adultes 60 à 80 — 5 ou 6 —

Prendre, suivant l'âge, le nombre de gouttes indiqué, pour obtenir un résultat rapide.

Prix : 18 francs.

Durée moyenne du traitement de l'unité de vente : 4 à 20 jours suivant les cas.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 681-3.

Laboratoire L. ROY

29, avenue Charras — CLERMONT-FERRAND

SULFOCRÈME LILESS

Composition. — Crème non grasse, contenant 20 p. 100 de Soufre précipité, desséchant et formant poudre adhérente à la peau.

Indications. — Séborrhée, acné et toutes les manifestations des peaux grasses et dermatoses redevenables d'un traitement soufré.

Mode d'emploi. — Appliquer la crème à la toilette du soir, en massant la peau à chaque apport, pour favoriser sa pénétration ; les couches peuvent être légères dans les cas bénins et épaisses dans les cas rebelles.

La peau se nettoie avec des tampons d'ouate imbibés d'eau chaude ou par simple lavage.

Le jour, une couche légère reste invisible sous un soupçon de poudre de riz.

Prix : 16 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. sous n° 659-12.

Laboratoires FISH C^{ie}, S. à r. l.

Mer Rouge — MULHOUSE (Ht-Rhin).

Agence à PARIS : 104, faubourg Poissonnière (X^e).
(Tél. : Trudaine 92-52.)

SULFODERMOL FLAHAUT

Composition. — Hyposulfites benzoïnés chimiquement purs.

Forme. — Cachets.

Indications. — Eczémas, Etats séborrhéiques et dermatoses associées, Acné, Pityriasis, Psoriasis, Alopécies, Furunculose, Impetigo, Sycosis, Urticaire, Troubles de la Nutrition soufrée des rhumatisants chroniques.

Mode d'emploi. — Un cachet avec un 1/2 verre d'eau avant chacun des trois repas. La boîte 30 cachets.

Prix : 14 francs.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

SULFOÏDOL ROBIN

Soufre colloïdal.

Granulé. Ampoules. Pommade.

Doses et mode d'emploi. — Granulé : 2 cuillers-mesures 2 fois par jour. Chaque cuiller contenant 10 cgr. de soufre colloïdal. — Injectable : 1 injection par jour dans les cas graves. Dans les cas ordinaires, 1 injection tous les 2 ou 3 jours.

Indications. — Troubles de la nutrition sulfurée. Pharyngites chroniques, Bronchites chroniques. Antisepsie de l'intestin. Rhumatismes aigus et chroniques. Arthritisme. Syphilis.

Prix : *Granulé* : 18 fr. 05. — *Ampoules* : 20 fr. 15.
Pommade : 1/15, 2/15, : 15 fr. 90; 12 fr. 75.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 37-85.)

SULFOLAX

Laxatif doux, toni-hépatique, antitoxique.

Composition. — Soufre de l'Ichthyol, Extraits biliaires, Artichaut, Boldo, Combretum, Evonymine verte, Cascara, Agar-Agar.

Posologie. — 1 ou 2 comprimés au repas du soir.

Indications. — Constipation, Insuffisance hépatique, Auto-intoxications et tendances toxémiques, Manifestations du Neuro-Arthritisme.

Innocuité absolue, Aucun toxique, Aucun drastique.
Pas d'accoutumance.

Prix du flacon de 60 comprimés : 12 fr. 25.

Laboratoires du VAGOSÉDYL

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

G. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

SULFOLIVE

Composition. — Pommade à base d'Huile d'Olive concrétisée par catalyse et de soufre en combinaison organique avec l'Huile d'Olive.

Propriétés et Indications. — Spécifique du Rhumatisme et de toutes les douleurs articulaires par pénétration du soufre *in loco*. Analgésique. Indiqué également pour les dermatoses dans lesquelles la combinaison Soufre-Huile d'Olive a son application.

Mode d'emploi. — Le *Sulfolive* fond aussitôt au contact de la peau et pénètre par léger massage.

Grand tube. — Petit tube.

Enr. au L. N. C. n° 1679-2.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.
19, rue de Pontevès — MARSEILLE. (Tél. C. 71-30).

ARNOUX-BERENQUIER, Pharmacien.

(Voir *Boldolive*, *Suppolive* et *Dermolive*.)

SULFOMALÉYL

Maléyl para-amino-benzène sulfamide calcoïque.

Corps nouveau de toxicité nulle. Traitement chimiothérapique des streptococcies, gonococcies, staphylococcies, méningococcies, colibacilloles et des états infectieux en général.

Le traitement maleylé se fait à doses décroissantes en commençant par les doses fortes.

Doses moyennes : Nombre de comprimés par jour :

	Cas bénins.	Cas graves.
Adultes.....	3 à 6	6 à 10
Enfants de 5 à 10 ans ...	2 à 4	4 à 6
Enfants de 1 à 5 ans ...	1 à 2	2 à 4
Au-dessous	0,50	1

Doses susceptibles d'être élevées dans les cas désespérés.

Prix des tubes de 20 comprimés à 0 gr. 50 : 22 francs.

Laboratoires GOUIN

20, rue des Ecoles — PARIS (V^e).

(Tél. : Danton 81-53.)

SULFORGAN

Soufre organique naturel assimilable.

A haute teneur en soufre (13 p. 100 de soufre à l'état sulfinique), le *Sulforgan* recharge les tissus et liquides humoraux en soufre organique.

Composition. — Huile soufrée organique dans un véhicule approprié.

Avantages. — A doses thérapeutiques, le *Sulforgan* est parfaitement bien toléré.

Il ne présente aucune contre-indication. Piqûres indolores, sans aucune réaction fébrile.

Indications. — Douleurs rhumatismales récentes ou chroniques, lithiases hépatiques et rénales et leurs complications, maladies de la peau (eczéma, psoriasis, etc...), affections nerveuses (paralysies, névrites, zona), affections chroniques (ostéites, fistules, etc...), Infections intestinales. Toutes les affections gynécologiques.

Présentation, Posologie et prix. — *Ampoules de 2 cc.* Une ampoule intramusculaire tous les deux jours, tous les jours dans les cas aigus. 31 fr. 20 la boîte de 6 ampoules.

Pilules : 2 à 6 par jour, 15 fr. 60 la boîte de 50 pilules.

Pommade : 12 fr. 50 le tube de 35 grammes environ.

Ovules : 22 francs la boîte de 6 ovules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1279-1-2-3-8.

Laboratoires du Soufre Organique.

16, rue de Gramont — PARIS (II^e).

Tél. : Richelieu 83-83.

SULFO-RHINOL DU D^r FAYÈS

Baume nasal au Soufre précipité naissant aromatisé à la teinture de benjoin.

Indications. — Affections aiguës et chroniques du rhino-pharynx; modificateur des sécrétions nasales en particulier dans l'ozène. Préventif en cas d'épidémies.

Propriétés. — L'H²S naissant, qui se produit dans les voies aériennes supérieures, permet une inhalation prolongée de ces vapeurs à action bactéricide incontestable.

Mode d'emploi. — Gros comme un pois dans chaque narine matin et soir.

**Laboratoires des Produits Sulfureux
du D^r FAYÈS**

G. de MONTMOROT, Pharmacien

2 et 4, place Gambetta — PARIS (XX^e).

Usine : 10, rue Petit — PARIS (XIX^e).

SULFOSALYL

Complexe médicamenteux à base de Soufre, Polysalicylates et Calcium associés à l'Opothérapie. Capsules glutinisées ne se dissolvant que dans l'intestin. Aucune sursaturation gastrique.

Traitement de fond total des *Rhumatismes chroniques* par modification du terrain.

Composition. — Pour une capsule glutinisée :

Salicylate de Sodium....	0,20	Gluconate de Calcium..	0,05
Salicylate de Potassium..	0,01	Thiosinamine.....	0,005
Salicylate de Calcium...	0,006	Poudre de Thyroïde...	0,001
Hyposulfite de Sodium..	0,10	Poudre de Parathyroïde..	0,0001

Indications. — Tous les Rhumatismes chroniques, Arthrites, Arthroses, Algies rhumatismales (compléter le traitement par Histalgine en piqûres intradermiques). Rhumatisme articulaire aigu (dans les cas de Salicylo-résistance).

Posologie. — 8 à 15 capsules et plus par 24 heures. De préférence, pas plus de 2 capsules à la fois. Avaler sans croquer.

Traitement très prolongé (plusieurs mois) dans les cas de Rhumatismes déjà évolués.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1001-16.

Laboratoires de Thérapeutique Antirhumatismale SAREIN

14, avenue Perrichont — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Jasmin 00-37.)

SULFOSINE « LEO »

Pyrétothérapie

Suspension huileuse de soufre à 1 et 2 p. 100.

(Huile soufrée stérilisée.)

Indications. — Paralyse générale. Syphilis nerveuse et autres affections syphilitiques ou non du système nerveux central, telles que la démence précoce, la Schizophrénie, l'Encéphalite épidémique chronique, etc...

Forme. — Deux dosages :

1^o Faible : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 1 p. 100 de soufre.

2^o Fort : Ampoules de 1, 2, 5 et 10 cc. à 2 p. 100 de soufre.

Deux séries : 1^o Une boîte de 10 ampoules de 10 cc. 2^o Une boîte de 10 ampoules assorties : 2 de 1 cc. ; 3 de 5 cc. ; 5 de 10 cc.

Sulfosine anesthésique à 1 et 2 p. 100 et comme ci-dessus.

Mode d'emploi. — En injections intramusculaires profondes.

Posologie. — Pour la solution à 1 p. 100 la dose initiale dans le premier traitement est de 1 à 2 cc. ; on augmente ordinairement chaque dose de 1 cc. jusqu'à 8 à 10 cc. La dose de début pour la solution à 2 p. 100 est également de 1 à 2 cc.

Valentin AAGE MOLLER

149, rue du Palais-Gallien — BORDEAUX (Tél. : 80-989).

Dépôt pour la France et Colonies :

Jean DEDIEU, Pharmacien

39, rue Fondaudège — BORDEAUX.

SULFO-THIORINE

Soufre-Hyposulfite de Soude agréable au goût, granulé

1° Affections des voies respiratoires (Subaiguës ou chroniques)
Tous les catarrhes muqueux ou purulents du nez, de la gorge et des bronches.

Oxène, adénoïtes et amygdalites subaiguës ou chroniques. Pharyngites et laryngites trainantes. Trachéobronchites récidivantes. Dilatation des bronches. Expectorations tenaces (la Sulfo-Thiorine fluidifie, puis assèche les sécrétions). Bronchites persistantes des gazés. Tuberculose pulmonaire torpide non fébrile.

La cure de SULFO-THIORINE prépare et complète la cure thermique par les eaux sulfureuses ; en cas d'impossibilité de faire la cure aux sources thermales, elle peut à la rigueur y suppléer.

2° Auto-intoxication intestinale chronique et des affections qui en découlent :

Accidents anaphylactiques, acné, eczéma, urticaire, etc..

Laxatif léger. — Désinfectant sûr.

3° Maladies par ralentissement de la nutrition.

Arthritisme, goutte, rhumatisme chronique, etc...

4° Adjuvant indispensable des traitements par les sels d'or, de mercure, de bismuth, d'arsenic.

Renforce leur action. — Empêche les phénomènes d'intoxication.

Posologie

Adultes : 1 ou 2 cuillerées à café 3 fois par jour au début des repas, à croquer ou à délayer dans un peu d'eau (diminuer la dose en cas de diarrhée très abondante).

Enfants : 1 à 3 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Prix : P. M. 14 fr. 45 — G. M. 37 fr. 35.

Laboratoire de la Sulfo-Thiorine

39, rue Fondaudé — BORDEAUX. (Tél. : 820-04.)

SULFOXYL

(Hydrogène sulfuré à l'état naissant.)

Propriétés. — Médication sulfureuse active, régulière, pouvant être réalisée partout et à toute époque de l'année.

Quatre formes. — a. *Pastilles* ; b. *Granulé* : composition stable, saveur très agréable, aucun goût sulfureux lors de l'ingestion. c. *Comprimés inhalants* : très fort dégagement sulfureux instantané ; d. *Ampoules buvables* : 1 ampoule permet d'obtenir immédiatement 1 litre d'eau sulfureuse synthétique, très économique.

Indications. — Infections du rhino-pharynx. Toutes infections catarrhales, trainantes, rebelles et récidivantes des voies respiratoires. Toutes affections traitées par les médications Arsenicales, Bismuthiques, Mercurielles, etc. (accroît leur tolérance et débloque les réserves toxiques accumulées par l'organisme).

Posologie et prix :

Pastilles. — États aigus : 4 à 10 par jour ; états chroniques : 2 à 5 par jour. **Enfants :** 1 à 5 par jour.

Granulé. — 4 à 9 cuillerées à café par jour suivant l'âge.

Inhalant. — 1 à 3 comprimés dans un verre d'eau.

Ampoule. — Diluer 1 ampoule dans un litre d'eau ; en prendre 1/2 verre matin et soir.

Les Laboratoires du LUGOCALCION — OULLINS (Rhône).

SULFUR CONCENTRÉ DAX

Soufre colloïdal par voie buccale.

Composition. — Soufre colloïdal, 0 gr. 10 pour une ampoule de 10 cc. ; 3 ampoules par boîte.

Posologie. — Agiter légèrement puis diluer l'ampoule dans 250 cc. d'eau (1/4 de litre). De la dilution : 2 cuillerées à soupe au coucher et au lever. C'est donc une AMPOULE-SEMAINE.

Avantages. — Etat colloïdal, véritable pseudo-solution conservant les mouvements browniens. Pas de mauvaise odeur. Pas de mauvais goût.

Indications. — *Arthritisme* : Rhumatisme aigu et chronique, lumbago, Dermatoses (eczéma, acné), Bronchite emphysémateuse, catarrhe. — *Oto-rhino-laryngologie* : faire 4 ou 5 inhalations avec une ampoule diluée, y associer le traitement par voie buccale. — *Adjuvant du traitement syphilitique* (Hg As Bi) : forcer les doses : 6 cuillerées à soupe par jour.

Enregistré au L. N. C., n° 336-2.

**Laboratoire MORELLET, Pharmacien,
Docteur en Pharmacie**

**Ex-Interne des Hôpitaux de Paris.
BAGNOLES-DE-L'ORNE.**

SULFUREUX POUILLET

Approuvé par l'Académie de Médecine.

MÉDICATION SULFUREUSE A DOMICILE

Le *Sulfureux Pouillet* pour boisson est une poudre sulfureuse amorphe créée par M. Pouillet, l'éminent professeur de Chimie aux Arts et Métiers à Paris.

Mode d'action. — Au contact de l'eau, formation de Monosulfures de sodium et de calcium à l'état naissant.

Indications thérapeutiques. — Les propriétés sont celles des eaux minérales sulfureuses naturelles prises à la source.

Son action est merveilleuse dans les Rhumes au moment de l'expectoration, Catarrhes pulmonaires ou Bronchites, Affections du Larynx, Granulations de la Gorge, Pharyngites, **Extinctions de voix**, Fatigue des cordes vocales, Catarrhes nasopharyngiens, dans l'Ozène et autres maladies du nez et de la gorge, les Diathèses arthritiques, herpétiques, rhumatismales et en lavements contre les oxyures.

L'effet désensibilisateur et curatif est certain dans l'Eczéma, l'Acné et toutes les affections de la peau.

L'emploi simultané de la boisson et du bain sulfureux prévient et guérit les intoxications par métaux lourds (Hg, Bismuth, Plomb, Or, etc.).

Le *Sulfureux Pouillet* s'emploie en boisson, en bains et en comprimés inhalants. Il est des plus efficaces en *inhalations* et pulvérisations.

Mode d'emploi :

- 1° *Boisson* : 1 mesure pour un verre d'eau ou de lait tiède, le matin à jeun ou matin et soir.
- 2° *Pour oxyures* : 5 jours de suite un lavement de un verre d'eau tiède avec une mesure de poudresulfureuse ; à garder quelques minutes. Répéter 3 séries de 5 jours avec intervalles de 8 à 10 jours.
- 3° *Pour inhalations* : 1 mesure ou mieux 1 ou 2 comprimés dans un verre d'eau très chaude.
- 4° *Pour pulvérisations* : se servir d'un pulvérisateur pour solutions aqueuses.
- 5° *Pour prévenir ou guérir l'intoxication par les métaux lourds* : Hg, Bis, Or, Pb : un verre d'eau sulfureuse le matin ou matin et soir. Bains sulfureux.

SULFUREUX POUILLET

pour bains et lotions.

Un flacon pour un bain d'adulte.

Un demi-flacon pour un bain d'enfant.

1 cuillerée à café pour 2 litres d'eau (pour lotions).

Prix et durée moyenne :

Boisson : 14 fr. 05, 20 jours. — Bain : 6 fr. 25.

Comprimés inhalants : 14 fr. 60, 15 jours.

Laboratoire POMPANON

62, rue du Cardinal-Lemoine — PARIS (V°).

(Tél. : Trudaine 95-69.)

SULFURINE DU D^r LANGLEBERT

A base de soufre associé au carbonate sodique.

Présentation :

- a. Boîte pour bains contenant des tablettes cristallines nécessaires pour un bain entier. Chaque boîte contient, en outre, un comprimé permettant de parfumer le bain à volonté.
- b. Savon.

Indications thérapeutiques :

- a. *Bain*. — Bain soufré alcalin, sans odeur ou parfumé, réalisant à domicile le bain hygiénique par excellence. Tonique, fortifiant. Beauté et souplesse de la peau. Dermatoses, rhumatismes, blessures, diabète, lymphatisme, scrofule, rachitisme, convalescence.
- b. *Savon*. — Le meilleur des savons de toilette complète l'heureuse action de la sulfurine pour bains.

Posologie. — Bains : une boîte entière pour un bain d'adulte. 2 ou 3 tablettes pour un bain local. Un quart de boîte pour un petit bain d'enfant.

Savon pour la toilette journalière.

La boîte	6 fr. 40
Le savon	7 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 523-38.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

SULFURION

Description. — Complexe colloïdal isotonique, non toxique et indolore, à base de soufre, en ampoules de 3 cc. (4 ampoules par boîte).

Action thérapeutique. — Le Sulfurion libère les ankyloses dans le rhumatisme chronique, diminue les nodosités, permet le retour au fonctionnement des articulations et remédie à l'insuffisance sulfurée. En même temps les phénomènes douloureux disparaissent et le retour à la santé s'établit.

Indications. — 1 ampoule de 3 cc. tous les 2 ou 3 jours, dans toutes les formes de rhumatisme aigu ou chronique, simple, fibreux, osseux, partiel, blennorragique, et dans toutes les insuffisances sulfurées, goutte, acné, pharyngites chroniques, etc.

Prix : 34 fr. 30 pour 8 à 12 jours de traitement.

Laboratoires Ch. COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

SULFURYL MONAL

Médication Sulfureuse. — 2 Usages, 5 Formes.

Cinq formes. — Pastilles, Granulé, Comprimés inhalants, Bain inodore, Savon.

Usage interne. — Pastilles et granulé agréables à sucer ou à croquer.

Usage externe. — Comprimés inhalants pour inhalations, humages, gargarismes, pulvérisations, etc. Bain tonique inodore ; Savon, soins de la peau, dermatoses.

Composition. — Synthèse des eaux minérales sulfureuses.

Propriétés. — Antiseptique et antitoxique, stimule les échanges. Permet d'instituer d'une façon active partout, et en toute saison, la médication sulfureuse interne et externe.

Indications. — Affections de la gorge et des voies respiratoires, Grippe, Coqueluche, Lymphatisme, Rhumatismes, Syphilis, Maladies de la peau, Etats infectieux et post-infectieux.

Doses. — *Usage interne :* Croquer ou sucer 2 à 6 pastilles par jour ; Croquer ou prendre délayé dans un peu d'eau 1 à 3 cuillerées à café de granulé 4 fois par jour (forme recommandée pour les enfants).

Usage externe. — Inhalations, gargarismes, etc. : un comprimé dans un récipient d'eau chaude toutes les 2 minutes.

Bain : un paquet SULFURYL MONAL pour bains (adulte) et 1/2 paquet (enfant). Savon au SULFURYL MONAL pour la toilette des peaux délicates.

Prix. — Sulfuryl Monal :

Pastilles. Le tube.....	16 fr. 30
Granulé. La boîte	16 fr. 30
Comprimés inhalants. Le flacon.	16 fr. »
Bain (sans odeur). La boîte..	7 fr. 15
Savon. Le pain.....	7 fr. 15

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

SULFYPÈNE

Solution Forminée d'*Hyposulfite de soude* cristallisé chimiquement pur à 20 p. 100.

Spécifique des états de choc.

Ampoules de 10 cc.

Pour injections intra-veineuses.

Composition. — Hyposulfite de soude chimiquement pur avec adjonction de traces d'Hexaméthylènetétramine qui vient renforcer l'action de l'Hyposulfite de soude en favorisant, à dose infinitésimale, l'élimination des déchets.

Indications. — *Prurits, Eczémas, Urticaires, Dermites.* Déficiences hépatiques, Syndromes entéro-rénal et entéro-hépatique.

Contre-indications. — Néphrites albuminuriques et cardiopathies non compensées.

Mode d'emploi. — Une injection intra-veineuse chaque jour ou tous les deux jours. On peut doubler la dose comme traitement d'attaque dans les cas sévères au cours de la première journée.

Sulfypène forme buccale.

Hyposulfite de soude chimiquement pur en tubes de 0 gr. 50.

Mode d'emploi. — Au début de chaque repas, verser le contenu d'un tube dans une cuillerée à soupe d'eau qui sera absorbée au cours du repas.

Laboratoire du SULFYPÈNE

P. Colomb, Pharmacien-Directeur

43, rue de Lancry — PARIS (X^e).

SULSOD

Désinfection intestinale par osmose. Carence soufrée.

Comprimés renfermant 0,44 de SO_4Na^2 anhydre pur.

Indications. — Toutes maladies de l'appareil digestif, et conséquences : constipation, entérite, diarrhée, infections intestinales, aérophagie, affections cutanées. Adjuvant dans le traitement des affections hépatiques, biliaires, rénales, colibacillose, pyélo-néphrites.

Action. — Soluble très lentement dans l'intestin, détruisant les bactéries par plasmolyse. Absence de toxicité.

Emploi. — Généralement associé au LEPTAB à raison de 5 Sulsod et 1 leptab à la fin des repas. On peut augmenter les doses si nécessaire.

Présentation. — 2 modèles, sous boîtes métalliques :

9 fr: 40 (8 jours) : 27 francs (1 mois).

Enregistré au L. N: C: sous n° 1039-4.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e).

(Tél. : Turbigo 51-12.)

SUNALCOL

Solution alcool-acétonique

à 2 p. 100 de **Chlorhydrate d'ortho-oxyquinoléine**.

Propriétés. — Puissant antiseptique cutané dépourvu de toute toxicité et de causticité. Très pénétrant, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

Supplante la Teinture d'Iode dans tous ses emplois antiseptiques et antimycosiques.

Indications. — Asepsie du champ opératoire. Désinfection des plaies traumatiques. Traitement des dermites microbiennes, des mycoses, des levurides.

Stomatologie. — Tous les usages de la teinture d'iode comme antiseptique et désodorisant.

Mode d'emploi. — S'emploie à l'état pur, seulement en applications externes (badigeonnages).

Présentation :

Forme normale. — Non colorée, ne tache pas.

Forme chirurgicale. — Colorée, pour la désinfection des champs opératoires.

Flacons de 25 cc., 125 cc., 500 cc.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des E^{ts} KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien — 19, rue Franklin — PARIS (XVI^e)

Service commercial : 15, rue de La Baume — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Elysées 99-51.)

SUNOXIDON

Composition :

Salicylate d'oxyquinoléine.....	0 gr. 110
6-Méthyl-5-Sulfo-8-Oxyquinoléine.....	0 gr. 035
5-Sulfo-8-Oxyquinoléine.....	0 gr. 130
Diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone.....	0 gr. 160
Hexaméthylène tétramine.....	0 gr. 065

pour 1 cachet.

Propriétés. — Action calmante et antithermique de la diméthylamino-phényl-diméthylpyrazolone (Pyramidon) associée aux propriétés antiseptiques et anti-infectieuses de l'oxyquinoléine et de l'acide salicylique, sans phénomènes secondaires (sueurs, malaises).

Indications. — Élévations thermiques quelle qu'en soit la cause. Algies de toutes natures (névralgies intercostales, douleurs articulaires, algies viscérales et génitales en particulier). Gripes. Angines.

Le *Sunoxidon* est particulièrement indiqué comme antithermique et antialgique chez les tuberculeux.

Mode d'emploi. — Dose usuelle (adultes) : 2 à 3 cachets par jour (espacés dans la journée). On peut prescrire jusqu'à 4 ou 5 cachets, mais seulement en cas de nécessité.

En cas de cures régulières, entrecouper ces cures de périodes d'arrêt de 10 jours par mois.

Marque R. A. L.

Produits spécialisés des E^{ts} KUHLMANN

S. THIERY, Pharmacien, 19, rue Franklin. — PARIS (XVI^e).

Service commercial : 15, rue de La Baume. — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Elysées 99-51.)

SUNOXOL

Sulfate neutre d'ortho-oxyquinoléine.

Propriétés. — Antiseptique non toxique, non caustique, non irritant pour usage général. Ne coagule pas les albumines, stimule les moyens de défense de l'organisme. Inaltérable.

Indications. — Antisepsie en dermatologie, otorhino-laryngologie, stomatologie, gynécologie, obstétrique.

Présentation et mode d'emploi.

I. Comprimés de Sunoxol à 0 gr. 50.

1 comprimé à 0,50 dans 1 litre d'eau (0,5 p. 1.000) :
Asepsie générale, soins intimes.

2 comprimés à 0,50 dans 1 litre d'eau (1 p. 1.000) :
Irrigations rhino-pharyngiennes. Lavages des plaies complexes. Injections vaginales. Gargarismes (voir aussi ci-dessous).

2 comprimés à 0,50 dans 100 cc. d'eau (1 p. 100) en :
lotions, badigeonnages.

Tube de 10 comprimés à 0 gr. 50.

II. Comprimés de Sunoxol à 5 centigrammes pour Bains de bouche.

Sunoxol 5 centigr.

Excipient aromatisé. Q. S. P. 1 comprimé.

1 à 2 comprimés par verre d'eau pour bains de bouche et gargarismes.

Flacon de 25 comprimés à 5 centigrammes.

III. Ovules au Sunoxol à 0 gr. 20 par ovule.

Boîte de 6 ovules.

IV. Pommade au Sunoxol à 1 p. 100.

Impétigo, eczéma, intertrigo, prurits, brûlures, engelures, hémorroïdes.

V. Pansements au Sunoxol sur adhésif.

Marque R. A. L.

**Produits spécialisés des E^{ts} KUHLMANN
S. THIERY, Pharm., 19, r. Franklin—PARIS (16^e)**

Service commercial :

15, rue de La Baume — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Élys. 99-51.)

SUPAMIDE

Suppositoires anti-infectieux.

Composition. — Sulfamide, 0 gr. 40 ; Hexaméthylène-tétramine, 0 gr. 20.

Préventifs des affections post-opératoires, Chirurgie, Gynécologie oto-rhino, Accouchements, etc.

Curatifs de toutes les affections microbiennes recélant : strepto, staphylo, pneumo, coli, typhiques, gonos, etc.

Doses :

Bébés : 1/3 à 1 suppositoire par jour.

Enfants : 1/2 à 2 suppositoires par jour.

Adultes : 2 à 6 suppositoires par jour.

Très pratiques pour les malades difficiles ou intolérants et pour les enfants.

Existe également en **COMPRIMÉS**
(mêmes dosages).

Laboratoire COUDERT

19, avenue Payret-Dortail — PLESSIS-ROBINSON.

SUPPABAÏNE

Ouabaïne rectale.

Composition. — Ouabaïne pure, un demi-milligramme. Phényléthylmalonylurée et belladone à petites doses.

Forme. — Petits suppositoires faits d'un excipient très délitescant.

Propriétés. — Cardiotonique puissant et antidyspnéique.

Avantages. — Facilité d'emploi, *très grande activité* (Thèses de Paris 1922, 1937 et nombreux essais), moins brutale que la voie intraveineuse, absorption en 20 minutes.

Indications. — Toutes défaillances cardiaques, affections pulmonaires aiguës s'accompagnant d'une défaillance du myocarde (pneumonie, broncho-pneumonie, asthme, etc...). Maladies douloureuses syncopales (coliques hépatiques, néphrétiques).

Mode d'emploi. — 1 à 3 par jour. Dans certains cas, deux suppositoires à quelques instants d'intervalle.

Prix : 17 fr. 70 la boîte de 8.

Laboratoires RENAUD

Ed. RENAUD,

Docteur en Médecine, Docteur en Pharmacie

2, place de la Duchesse-Anne

NANTES (Loire-Inférieure). Téléphone 112-17.

SUPPARGYRES

du Docteur FAUCHER

Traitement de la Syphilis acquise ou héréditaire, récente ou ancienne
Méthode simple sous forme discrète, *voie recto-portale (voie rectale)*,
active et sans inconvénient à tous les âges et dans tous les états (gros-
sesse, fatigue, voyage, etc.).

Forme. — *Adultes.* — Suppositoires à 0 cgr. 04 de Hg vif préparé
mécaniquement à froid pour obtenir une division absolue. Nourris-
sons : 0 cgr. 01 et enfants de 1 à 10 ou 11 ans : 0 cgr. 02.

Dose. — 1 le soir en se couchant. Suivre le traitement 30 à 40 jours.
repos de 8 ou 10 jours ou davantage et recommencer.

Nota. — Hg vif est et reste supérieur à tous les sels, toujours instables
Le seul anti-syphilitique *indiscutable et indiscuté*. Sa véritable voie
d'absorption est la *voie rectale* parce que tous les capillaires de l'in-
testin vont au foie qui vitalise et rend Hg actif. On mélange à une
solution d'arséno-benzol des tréponèmes vivants : *Ils vivent*. Mais si
l'on ajoute au mélange une trace d'**EXTRAIT de FOIE**, les tréponèmes
sont foudroyés. **Peuvent être prescrits comme désinfectants ou**
hépatogènes. (Expériences de Levaditi.)

Prix, Taxe d'état comprise :

Adultes : 16 fr. 80. — Enfants : 14 fr. 40. — Nourrissons : 14 fr. 40.

Laboratoires du Docteur TISSOT

L. ÉCHEMAN, Pharmacien

34, boulevard de Clichy — PARIS. (Tél. : Mont. 01-91.)

SUPPOALGOS

Composition :

Extrait de belladone	0,015
Extrait de jusquiame	0,025
Extrait de piscidia.....	0,025
Pyramidon	0,30
Citrophénétidine.....	0,50
Chlorhydrate d'éthyl morphine...	0,03
Beurre de cacao	Q. S. pour 3 gr.

Actions thérapeutiques. — Spécifique de l'élément
douleur. Antispasmodique, Hypnotique, Analgésique,
Sédatif, Antithermique.

Indications. — Névralgies, Douleurs tabétiques, rhu-
matismales et utérines. Spécifique des règles doulou-
reuses, Accès d'asthme et d'emphysème, Coliques
intestinales, Néphrétiques, Hépatiques, Angines,
Otites, Mastoïdites, Hémorroïdes, Prostatites, Insom-
nie causée par la douleur.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6 : 17 francs (Impôt compris).

Enregistré au L. N. C. n° 1874.

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOCAMPHYL

Composition :	<i>Adulte.</i>	<i>Enfant.</i>	<i>Bébé.</i>
Sulfocamphonate de soude.	1 gr.	0,50	0,25
Beurre de cacao. Q. S. P.	3 gr.	2 gr.	1,40

Actions thérapeutiques. — Stimulant des affections pulmonaires et cardiaques et du système nerveux. Antispasmodique.

Indications. — Les mêmes que celles de l'huile camphrée. Adynamie, Collapsus cardiaque, Pneumonie, Broncho-pneumonie. États de shock traumatiques et opératoires.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance. — La boîte de 10 :

Adultes : 18 fr. 50. — *Enfants* : 16 fr. 50. — *Bébés* : 13 fr. 50. — (Impôt compris.)

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON.

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOGLANDINES

Suppriment les piqures et leurs ennuis.

Traitement des déficiences glandulaires par **suppositoires d'extraits d'organes frais** et de **lécithine** (0 gr. 50 par suppositoire) qui tonifie le système nerveux et régularise l'assimilation.

Nos dosages sont en organes frais et non en poudres.

Les boîtes sont de 10 suppositoires : Un au coucher.

Nous exécutons toutes formules sur prescription, avec lobe antérieur, corps jaune, folliculine, mamelle, moelle, rate, etc.

Formule

Prix à titre indicatif.

1	Ovaire	1 gr.	Insuffis.; Ménop.; Ovariot.	23 fr.
1 M Orc.	Testicule frais ..	1	Insuffisances orchitiques.	23 fr.
	Lécithine végét ..	0,50	Médication de complément.	
2	Surrénale	0,25	Défic. sexuelle, surmenage	22 fr.
	Testicules	0,50	Toutes psycho-asthénies	
3	Thyroïde	0,05	Défic. et Instabilité, Obésité	21 fr.
4	Testicules	2 gr.	Impuissance	38 fr.
M	Prostate.....	0,20	Prostatite	
	Gl. Interstitielle .	0,30	Neurasthénie sexuelle	
	Hypophyse	0,20	Sénilité précoce	
	Yohimb.; Nucléin. Mn.			
5 F	Hypophyse	0,25	Troubles interglandulaires	30 fr.
	Thyroïde	0,05	et adiposo-génitiaux	
	Ovaire	0,70		
5 M Hy- po- thyr. Orc.	Hypop. tot. fr ...	0,25	Insuffisances orchitiques, obé- sité, déséquilibre ménopau- sique.....	30 fr.
	Glande th. fr ...	0,05		
	Test. frais.....	0,70		
	Lécithine végét ..	0,50		
6	Cortico-surrénal	0,50	Hypotension, Interv. chirurg.	24 fr.
7	Parathyroïde.....	0,02	Tr. du Métab. calcique, etc.	27 fr.
8	Post-hypophyse 6. U.	1	Hypoviscosité sanguine	38 fr.
A	Thyroïde	0,01	Asthme 1 à 2 suppositoires par jour	32 fr.
	Hypophyse	0,10		
	Surrénale	0,05		
	Ext. belladone ..	0,01		
	Ext. Lobelia.....	0,01		
	Ext. Euphorbia .	0,04		
	Chl. Ephédrine .	0,08		
	Iodure caféine ..	0,10		

C	Post-hypophyse 5 U. I. Parathyroïde..... 0,05 Thyroïde 0,02	Constipation chronique Stase, Atonie, Parésie intest. 1 tous les 2 jours	29 fr.
D	Foie et rate aa.. 5 gr. Thyroïde 0,02 Surrénale 0,10 Caséinates fer et Cu.	Toutes affections cutanées : Eczéma, Psoriasis Prurit, Urticaire	24 fr.
V Y	Foie..... 10 gr. Sels biliaires 0,05 Peptone sèche... 0,01	Tous les troubles de la fonction hépatique	29 fr.

SUPPOGLANDINES INFANTILES

J F	Ovaire 0,20 Hypophyse 0,10 Surrénale 0,10 Lécithine 0,25 Caséinates de cuivre + fer aa..... 0,001 Nucléinate de Mn. 0,001	Troubles et retard de la puberté et de la croissance. Insuffis. glandul. des fillettes Troubles adiposo-génitaux Instabilité et nervosisme	23 fr.
J G	Testicule..... 0,15 Hypophyse 0,10 Surrénale 0,10 Lécithine, Caséinate, Nucléinate (Voir J. F.)	Troubles de la puberté des jeunes garçons Adynamie des fillettes Troubles adiposo-génitaux Enurésie Inattention scolaire des ner- veux.	23 fr.
R I	Thyroïde 0,01 Parathyroïde..... 0,01 Thymus 2 gr. Hypophyse 0,10 Lécithine ; Caséinates. Nucléinate (Voir J. F.)	Retard de développement physique et psychique Cryptorchidie, Ectopie Enurésie, Crétinisme Rachitisme infantile Inattention scolaire des apa- thiques.	28 fr.
As. I	Thyroïde 5 mg Hypophyse..... 0,10 Surrénale 0,05 Foie..... 3 gr. Chl. éphédrine... 0,01 Ext. belladone... 0,002 — lobélie..... 0,007 — Euphorbe... 0,005 Lécithine 0,25	Asthme infantile. Coqueluche. 1/2 à 2 par jour	27 fr.

Laboratoire du DELTA

84, rue de Rochechouart — PARIS. (Tél. : Trudaine : 45-18.

SUPPO-GYNALS

Analgésique sédatif, local et général.

Forme. — Suppositoires.

Composition. — Antipyrine, chlorhydrate de morphine, extraits de belladone, de jusquiame et de sénéçon, beurre de cacao.

Propriétés thérapeutiques. — Calment instantanément les douleurs qui précèdent les règles et, en général, celles qui ont pour siège les organes pelviens, les règles douloureuses, contractions utérines, hémorroïdes, fistules, etc...

Mode d'emploi. — Dès le début des douleurs, introduire dans l'anus un Suppo-Gynal. Dix minutes après, deuxième suppositoire. (Il est bon d'employer les suppo-gynals dès le début des douleurs. Plus on tarde, moins l'effet est sûr.)

En raison de leur faible teneur en morphine, les Suppo-Gynals ne font pas partie du tableau B.

Prix. — La boîte de 6 : 17 fr. 35.

La boîte de 3 : 9 fr. 20.

Laboratoires LÉES

Directeur : Docteur Pierre Rolland.

Dépôt : 127, boulevard Saint-Michel — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 22-01.)

SUPPOLIVE

Composition. — Le *Suppolive* en suppositoire de 4 grammes n'est que de l'Huile d'olive neutre extra-pure solidifiée et saturée par procédé catalytique des Laboratoires du Pugetol (Oléostat : nom déposé). Il ne renferme ni glycérine, ni gélatine, ni beurre de cacao.

Propriétés. — Réalise le lavement d'Huile d'Olive Vierge adoucissant et riche en vitamines. — Pansement intestinal.

Indications. — Colites, constipation chronique, amibiase, rectocolites, hémorroïdes, stase intestinale.

Forme Belladonnée : 1 suppositoire de 4 grammes contient :

Huile d'Olive hydrogénée (Oléostat).....	3 gr. 97
Extrait de Belladone	0 gr. 01
Extrait de Jusquiame.....	0 gr. 02
Total	4 gr.

Antispasmodique.

Dose : 1 ou 2 suppositoires le soir ou un suppositoire au coucher et un autre le lendemain matin.

Boîte de 12 suppositoires *adultes*. Boîte de 12 suppositoires *enfants*.
Enregistré au L. N. C. sous le n° 1679.

Les Laboratoires du PUGETOL

Toutes les applications thérapeutiques de l'Huile d'Olive.
19, rue de Pontevès — MARSEILLE (Tél. C. 71-30).
ARNOUX-BERENGUIER, Pharmacien.
(Voir *Boldolive*, *Dermolive* et *Sulfolive*.)

SUPPONÉRYL

Composition.

Butyl-éthylmalonylurée (« Sonéryl », nom déposé). 0gr,20
 Camphre..... 0gr,10
 Beurre de cacao Q. S. P. un suppositoire.

Propriétés. — Hypnotique, analgésique, calmant, sans aucune action dépressive.

Indications. — *Toutes les insomnies* : des vieillards, des anxieux, des maladies fébriles, toutes les insomnies nerveuses tenaces, provoquées ou entretenues par la douleur (suites d'interventions).

Hypoalgésie opératoire et obstétricale.

N. B. — Le *Supponéryl* ne contenant aucun alcaloïde (morphine ou autre) peut être administré en toute sécurité après les opérations abdominales.

Posologie. *Adultes* : — Un ou deux *Supponéryl* par 24 heures. *Enfants* : de 7 à 12 ans, un demi-*Supponéryl* et un entier à partir de 12 ans.

Boîte de 10 suppositoires.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
 (Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SUPPOPIRINE SEOLO

Suppositoires à l'aspirine.

(Pureté absolument garantie.)

Propriétés thérapeutiques. — Analgésique, antithermique, contient en outre un anesthésique non toxique. Supprime les inconvénients dus à l'absorption de l'aspirine par voie buccale. Combat en même temps la constipation nuisible dans tous les états fébriles.

Présentation :

Adultes : 0 gr. 50 et 1 gr. d'aspirine par suppositoire.

Enfants : 0 gr. 25 et 0 gr. 50 d'aspirine par suppositoire.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires ou plus par jour selon avis médical. Pour les enfants au-dessous de 5 ans, ne pas employer sans avis médical préalable.

Prix : 15 fr. 30.

Laboratoires SEOLO

J.-P. PINTA, Pharmacien.

6, rue Adolphe-La-Lyre — COURBEVOIE.

Tél. : Wag. 62-71.

SUPPOPULMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	Adult.	Enfants.		Bébés.
		N° 2	N° 1	
Créosote.....	0,50	0,25	0,10	0,05
Tanin.....	0,50	0,25	0,10	0,05
Scuroforme	0,10	0,05	0,02	0,01
Beurre de cacao. Q. S..				
pour.....	3 gr. 60	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antiseptique pulmonaire, Anticatarrhale, Stimulant de l'état général, Suppositoires indolores et non caustiques.

Indications. — Toux rebelles, Bronchites aiguës et chroniques, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Tuberculoses suspectées et confirmées, Gangrène pulmonaire, Préventif des affections grippales et des complications pulmonaires, Anti et post-opératoire.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les 24 heures.

Prix et contenance.

La boîte de 10. *Adultes* : 20 francs. *Enfants* : 18 fr. 50 et 17 fr. 50. *Bébés* : 16 fr. 50. (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON

(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOQUINOL

Suppositoires anti-Infectieux et anti-pyrétiques pour nourrissons, enfants et adultes.

Composition et formes. — 3 présentations :

	Enfants.	Nourrissons.
Diméthylaminoanalgésine.....	0,10	Jusqu'à 2 ans 1/2.
Sulfamide.....	0,15	0,05
Chi. de quinine chim. pur.....	0,15	0,08
Argent coll. à petits grains.....	0,08	0,05

Adultes. — Les doses enfants sont doublées.

Sulfamide..... 0,30

Diméthylaminoanalgésine..... 0,20

Indications. — Toutes les Pyrexies à Pneumo, Strepto, ou Méningocoque, pulmonaires, intestinales, rhumatismales. Préviens la Septicémie.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire matin et soir.

Aucune contre-indication.

Prix : } rose pour nourrissons.

La boîte de 6 supp. } orange pour enfants et adultes.

Laboratoire THIERS

LE RAINCY (Seine-et-Oise).

SUPPO-SÉDOL

Composition :

Chlorhydrate de morphine.....	0,006
Bromhydrate de scopolamine.....	0.0002
Spartéine.....	0,02

Beurre de cacao Q. S. pour un suppositoire.

Toutes les indications du Sédol (ampoules et comprimés, voir à Sédol) : sédation de la douleur intense, pré-anesthésie et suites opératoires, accouchement. Les **Suppo-Sédol** sont, toutefois, plus particulièrement indiqués dans les :

Affections gynécologiques, règles douloureuses, prostatites, cystites, hémorroïdes, rectites, en un mot dans toutes les affections douloureuses des organes du bassin. Efficaces pour combattre les menaces d'avortement, les **Suppo-Sédol** sont aussi utilisés avec succès dans le mal de mer.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures.

Boîte de 10 suppositoires.

N. B. — *Le Suppo-Sédol ne fait pas partie du tableau B.*

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THERAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

SUPPOSITOIRES ALMINE LOUVEAU

Composition pour 100 gr. :

Intrait de Marron d'Inde.....	1 gr.
Dithymol bi-iodé.....	2 gr.
Galacol-Phénol-Menthol, aa.....	0 gr. 20
Camphre Japon.....	1 gr.
Carbonate de Bismuth.....	5 gr.
Oxyde pur de Zinc.....	30 gr.
Excipient spécial. Q. S. p.....	100 gr.

Cette masse pour 20 suppositoires.

Propriétés. — Décongestifs et résolutifs remarquables. Action rapide, soulagement immédiat ne contenant aucun toxique.

Indications. — Hémorroïdes externes et internes. Prostatites, Rectites, Fissures, Prurit.

Posologie et mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir au coucher jusqu'à résultat satisfaisant.

Prix : 18 francs la boîte de 10.

Laboratoires A. LOUVEAU

Pharmacien de 1^{re} classe

78, boulevard des Batignolles — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Wagram 65-49.)

SUPPOSITOIRES AMIBIASINE

Extrait mou de *Garcinia Mangostana* 0 gr. 0996

Extrait mou de *Simarouba* 0 gr. 0498

Beurre de Cacao Q. S. pour 2 gr.

Propriétés. — Calmant du ténésme, du prurit anal, décongestionnant, désinfectant, cicatrisant de la muqueuse ano-rectale, vermicide, antihelminthique. Non toxique.

Indications. — Toutes affections d'origine parasitaire (amibes, lamblas, trichomonas, etc.), oxyures, ascaris, tricocephales, prurit anal, ténésme rectal, rectites de toutes natures et origines.

Posologie :

Adultes : Un suppositoire chaque soir en se couchant. Série de 10 suppositoires. **Enfants :** Un suppositoire tous les deux jours.

Première série de 5 suppositoires, repos 10 jours.

Deuxième série de 5 suppositoires, un tous les 2 jours.

Administration. — Mouiller légèrement le suppositoire et l'introduire le plus profondément possible.

Remarque. — La sensation de chaleur ou de fourmillement éprouvée parfois tient à l'action des principes actifs sur une muqueuse altérée. Ne pas s'en inquiéter.

Prix de la boîte de 10 suppositoires : 15 fr. 90.

(Taxe d'armement comprise.)

Laboratoires de l'AMIBIASINE

69, rue de Wattignies — PARIS (XII^e). Tél. : Dorian 75-52.

SUPPOSITOIRES AU NESTOSYL

Anesthésie superficielle par contact.

Caractéristiques. — Voir à la rubrique *Nestosyl*.

Indications. — Suppression rapide de la douleur; antiseptisme et décongestion, dans : Hémorroïdes internes, Prurit anal, Fistules, Fissure, Plaies anales ou rectales, Prostatite, Cystite, Ténésme, Règles douloureuses, etc.

Posologie. — Délai nécessaire à l'action du suppositoire : 1/2 heure environ. Renouveler l'introduction d'un suppositoire chaque fois que le besoin s'en fait sentir. Si l'affection est à la fois interne et externe, employer en outre à l'extérieur la *Pommade au Nestosyl*. Dans les pays tropicaux où le suppositoire est inutilisable, y substituer la *Solution huileuse* introduite avec une poire.

Prix : 18 francs la boîte de 12 suppositoires.

L. N. C. 581-3.

Laboratoires P. BAUDE

72, rue Saint-Dominique — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 96-46.) — Adr. télégr : Labobod — Paris

SUPPOSITOIRES CALMOPELVINE

Médication idéale de toute algie de la sphère pelvi-uro-génitale.

Composition. — Extrait de belladone ; Extrait thébaïque ; Camphre ; Extrait d'anémone ; Extrait d'hamamélis, Chlorydrate de para-amino-benzoyl ; Diétyl ; Amino-éthanol ; Onguent hydrargyrique double ; Calmopelvine (Thiosulfonates de sodium).

Propriétés. — Aucune toxicité, aucune irritation pour les tissus, administration facile, très puissant décongestionnant, fondant et cicatrisant.

Indications. — Blennorragies aiguës, cystites aiguës, blennorragies chroniques, prostatites aiguës et chroniques, hypertrophie de la prostate, adénome, rétention, cancer de la vessie, endoscopie, affections du rectum et toutes affections gynécologiques.

Posologie. — Introduire dans le rectum un suppositoire tous les matins ou tous les soirs en suivant les indications du médecin traitant.

Laboratoires CALMOPELVINE-CALMOVARINE

81, rue Réaumur — PARIS (II^e).

(Tél. : Central 37-91)

SUPPOSITOIRES CALMOVARINE

Analgésiques et Sédatifs.

Composition. — Extractum viburnum Prunifolium, Extractum belladonæ, Novocaïnum, Extractum opii, Pomatum hydrargyricum gallicum, Extractum artemisiæ officinalis, Beurre de cacao.

Propriétés. — Pouvoir anesthésique presque immédiat, Aucune toxicité, Aucune irritation pour les tissus, Administration facile, Décongestionnant fondant et cicatrisant.

Indications. — Métrites, Salpingites, Salpingo-ovarites, Dysménorrhées, Règles douloureuses, Ovaires sclérokytiques, Adhérences douloureuses, Hémorroïdes, Fissures anales, Spinctéralgies, Spasmes douloureux, Toutes affections et complications des appareils génitaux et urinaires chez la Femme, Douleurs du petit bassin, Blennorragie, Cystite, Prostatite, Affections de l'appareil urinaire chez l'homme.

Posologie. — Introduire dans le rectum tous les matins ou tous les soirs un suppositoire. Cas très douloureux : un suppositoire matin et soir suivant avis du médecin traitant.

Laboratoire CALMOVARINE

81, rue Réaumur — PARIS (II^e).

(Tél. : Central 37-91.)

SUPPOSITOIRES CHAUMEL

Suppositoires à la Glycérine solidifiée et à tous les principaux médicaments, pour adultes et pour enfants.

Mode d'emploi. — Mouiller légèrement le suppositoire, en le trempant dans l'eau chaude, puis l'introduire dans l'anus par la pointe. Lorsqu'il est complètement enfoncé, le pousser profondément avec le doigt, jusqu'à ce qu'on ne sente plus le contact du suppositoire.

Indications. — Prescrits contre la constipation chez l'adulte et chez l'enfant.

Les Suppositoires Chaumel à la glycérine solidifiée se préparent également aux principaux médicaments pour leur administration par la voie rectale.

Prix : *Adultes*, 8 fr. 55 ; *Enfants*, 6 fr. 40.

Durée moyenne : 12 applications.

Établissements FUMOUZE

78, faubourg Saint-Denis — PARIS

(Tél. : Provence 21-55 et 21-58.)

SUPPOSITOIRES CORBIÈRE

Composition. — A base d'Arsénobenzol.

Mode d'emploi. — Un suppositoire chaque soir après une selle spontanée ou provoquée par un lavement évacuateur.

Continuer le traitement 24 jours, cesser deux semaines et reprendre une nouvelle série.

Indications. — Syphilis à toutes les périodes. Syphilis viscérale.

Hérédo-Syphilis. — Angine de Vincent. — Dysenteries amibiennes.

Présentation. — Chaque boîte contient 6 suppositoires et ne porte aucune indication de nature à gêner le secret professionnel.

Suppositoires pour adultes à 0 gr. 10 d'arsénobenzol.
Prix : 19 francs.

Suppositoires pour enfants, à 0 gr. 03 id.
Prix : 17 francs.

Suppositoires pour nourrissons, à 0 gr. 01. id.
Prix : 16 francs.

Laboratoire pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS. — (Tél. : Carnot 78-11.)

SUPPOSITOIRES DE CAMPHOCALYPTOL

Adultes. Enfants. Nourrissons.

Imprégnation créosotée par voie rectale.

Propriétés. — Antithermiques, bactéricides (pneumocoques), vermifuges (oxyures).

Composition. — *Adultes* : Créosote, 0,25 ; eucalyptol et camphre, aa 0,05 ; stovaine, 0,005 pour 1 suppositoire.

Enfants : Le tiers environ de ces doses.

Nourrissons : Le quart.

Indications. — Affections pulmonaires aiguës ou chroniques, Gripes, Bronchites, Infections à pneumocoques et pour prévenir les accidents anesthésiques. Vermifuge efficace contre les oxyures.

Emploi. — Un suppositoire matin et soir ou plus.
Suppositoires de Camphocalyptol-Quinine pour adultes, pour enfants.

Prix uniforme : La boîte 18 fr. 35.

[L. N. C. 314-42, 43, 47, 45 et 48.

Laboratoire ECHEMAN

26, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

SUPPOSITOIRES EUCALYPTINE

**Antiseptique pulmonaire,
Antithermique, Anti-oxydant.**

Composition :

Chaque suppositoire répond à la formule :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants</i> (au-des- sus de 2 ans)	<i>Nourris.</i>
Eucalyptol.....	0,12	0,08	0,05
Acide phénique neige	0,01	0,006	
Camphre	0,05	0,03	0,02
Gaïacol	0,05	0,03	0,02
Codéine	0,01	0,006	
Larocaïne.....	0,001	0,0006	
Beurre de cacao	Q. S.	Q. S.	Q. S.

Pour 1 suppositoire.

Avantages. — Remplacent l'injection lorsqu'elle est impossible (notamment chez l'enfant) : éloignement, pusillanimité du malade, etc.

Posologie :

Adultes : 1 à 4 suppositoires par jour.

Enfants : 1 à 2 suppositoires par jour.

Nourrissons : 1 à 2 suppositoires par jour.

Indications. — Celles de l'*Eucalyptine*, c'est-à-dire les affections aiguës ou chroniques des voies respiratoires. Grippe, Pneumonie, Broncho-pneumonie, Coqueluche, certaines formes de tuberculose, Maladies infectieuses.

Laboratoire LE BRUN

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

Tél. : Kléber 71-33.

SUPPOSITOIRES HYMEL

Traitement mercuriel d'entretien dissimulé.

2 Titrages :

Adultes : 0,06 Onguent napolitain, soit 0,03 Hg. métal.

Enfants et Nourrissons : 0,03 Onguent napolitain, soit, 0,015 Hg. métal.

Originalité. — Préparés entièrement à froid, ce qui assure une exacte répartition de mercure dans le produit fini. Aussi ils sont très *bien tolérés*, ne causant ni ténésme, ni diarrhées, ni coliques.

Présentation dissimulée. — Sans indication de maladies, ni de nature de produit actif.

Posologie. — Un le soir au coucher, pendant 20 jours de suite.

Prescription. — De préférence, intercaler une période de 20 jours d'Elixir Hymel entre deux périodes de suppositoires Hymel.

Laboratoires A. DUTEIL

90, avenue de Saint-Ouen — PARIS

SUPPOSITOIRES LOGEAI

Composition:

Marron d'Inde.....	0,04
Genêt	0,01
Cupressus.....	0,01
Jusquiame	0,012
Teskra.....	0,012
Lanoline anhydre.....	0,015
Extrait total d'hamamélis.....	0,33
Sulfoichtyolate de soude.....	0,33

Pour 1 suppositoire.

Indications. — Hémorroïdes internes et rectite concomitante Prostatites.

Propriétés :

ATOXIQUES : Ni stupéfiant, ni adrénaline.

ANALGESIQUES : Décongestion rapide et durable de la média-veineuse.

ASTRINGENTS : Action tonique et régénératrice de la fibre lisse.

ANTI-SEPTIQUES : Action antiseptique de l'huile sulfitée sur la muqueuse rectale.

Mode d'emploi. — Introduire matin et soir, après lavage, un suppositoire Logeais par le petit bout pour ne pas augmenter l'irritation locale.

Prix au public : 14 fr. 65.

Laboratoires des Spécialités Scientifiques LOGEAI

22 bis et 24, rue de Silly — BOULOGNE-SUR-SEINE.

(Tél. : Auteuil 40-15 et 40-16.)

SUPPOSITOIRES MICTASOL

Réalisent la décongestion pelvienne et la sédation rapide des symptômes subjectifs et fonctionnels.

Composition :

Malva purpurea	0,50
Stovaïne.....	0,01
Extrait de Jusquiame.....	0,05
Ichtyol	0,25

Indications thérapeutiques. — Prostatisme vasculaire, rétentions, incontinence, cystites, séquelles de blennorragie, hémorroïdes.

Posologie. — 1 ou 2 par jour.

Laboratoire du MICTASOL

5, rue de Lubeck — PARIS (XVI^e).

SUPPOSITOIRES MIDY

(Adrénostyptiques.)

Adrénaline	0 gr. 00015
Stovaïne	0 gr. 025
Anesthésine.....	0 gr. 025
Extrait de Marron d'Inde frais stabilisé	0 gr. 05
Extrait d'Hamamelis.....	0 gr. 01

Pour un suppositoire.

Dose et mode d'emploi. — Introduire 1 ou 2 suppositoires par jour, aux instants les plus propices, soit le matin 1 heure avant d'aller à la selle, c'est-à-dire avant le moment où l'expulsion des matières fécales refoule et congestionne les hémorroïdes ; soit le soir en se couchant, lorsque les hémorroïdes sont douloureuses, congestionnées par la fatigue et la station verticale.

N. B. — Action d'autant plus active qu'un lavement évacuant (de 100 gr.) à une température de 45°, aura précédé l'introduction de SUPPOSITOIRES MIDY.

Propriétés thérapeutiques. — Décongestionnants, Astringents, Anesthésiques, Calmants, Antiseptiques.

Indications. — Traitement rationnel des hémorroïdes externes et internes.

Prix : 16 francs.

Durée du traitement : une semaine.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram, PARIS (XVII^e). — Tél.: Wagram 51-10 et 11

SUPPOSITOIRES PACHAUT

Huile de Palma Christi, Glycérine,
Beurre de Cacao.

Traitement de la CONSTIPATION

S'introduisent par la grosse extrémité. Leur forme bi-conique spéciale permet, sous l'effet des contractions du sphincter, une ascension dans le rectum.

Présentation :

1^o Boîte de 12 suppositoires pour *adultes*.

2^o Boîte de 12 suppositoires pour *enfants*.

Prix :

Adultes : 12 fr. 25. — Enfants : 9 fr. 40.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n^o 1796-1.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS

(Tél. : Provence 49-77.)

SUPPOSITOIRES PAUTAUBERGE

Composition. — Chaque suppositoire contient :

	<i>Adultes.</i>	<i>Enfants.</i>
Créosote de hêtre.....	0 gr. 40	0 gr. 125
Para-Amino-benzoate butylique.....	0 gr. 01	Néant.
Camphre du Japon.....	0 gr. 025	0 gr. 01
Gluconate de Calcium.....	0 gr. 50	0 gr. 25
Excipient au beurre de cacao.....	Q. S.	Q. S.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique puissant et antithermique par sa créosote, reminéralisateur par son gluconate de calcium.

Indications. — Affections broncho-pulmonaires aiguës et chroniques de l'enfant et de l'adulte.

Action curative spécifique dans les affections à pneumocoques.

Action préventive des complications pleuro-pulmonaires de la grippe et des complications pulmonaires post-opératoires.

Posologie. — *Adultes* : un suppositoire matin et soir.

Enfants à partir de 2 ans : un suppositoire d'enfant matin et soir.

Nourrissons : 1/2 suppositoire d'enfant le soir.

Prix de la boîte : *Adultes*, 17 francs. — *Enfants* : 15 francs
(5 jours de traitement).

Laboratoires PAUTAUBERGE

10, rue de Constantinople — PARIS (Tél. : Laborde 26-47.)

SUPPOSITOIRES PELVINAL

Toutes algles pelviennes.

Composition :

Onguent napolitain.....	0,05
Extrait thébaïque	0,02
— de belladone	0,01
— de jusquiame.....	0,01

pour un suppositoire.

Triple action rapide, *loco dolenti*. Sédatrice,
décongestive, antiseptique.

Indications :

Métrites, Salpingites, Congestion utéro-ovarienne,
Cellulites diffuses, Règles douloureuses, Suites
de couches, Prostatites, Cystites, Urétrites posté-
rieures, ténésme, etc.

Prix : 13 fr. 30.

Laboratoire **FOSSET**

MONTFERMEIL (Seine-et-Oise).
(Tél. : 11.)

SUPPOSITOIRES PEPET

(Beurre de Cacao — Glycérine)
pour Bébés, pour Garçonnetts,
pour Adultes.

CONSTIPATION. HÉMORROÏDES

La boîte : 17 francs.

La 1/2 boîte : 10 fr. 15.

Laboratoires **Henry ROGIER**

56, boulevard Péreire.

PARIS

(Tél. : Wagram 33-70.)

SUPPOSITOIRES PYRAX

Médication sédative et antithermique de choix, complétée par une action tonique diurétique et désinfectante.

Aspirine, Quinine, Caféine.

Administration facile chez l'enfant.

Médication précieuse chez l'adulte.

Ne fatigue pas l'estomac. Respecte le foie.

Soutient le cœur. Favorise le rein et la fonction respiratoire.

Trois dosages : *Bébés* jusqu'à 3 ans. — *Enfants* au-dessus de 3 ans et *adultes*.

Présentation. — 3 étuis de 2 suppos par boîte.

Posologie. — 1 à 3 par jour.

Prix la boîte de six :

Bébés : 9 fr. — *Enfants* : 9 fr. 75. — *Adultes* : 12 fr.

Échantillons :

Laboratoire CHAVIALLE

70, Grande-Rue — SÈVRES (Seine-et-Oise).

(Tél. : Observatoire 01-83.)

SUPPOS LÉMARY

Adultes : Boîtes de 10 suppos Hg double, 0,04 par suppos.

Enfants : Boîtes de 12 suppos Hg double, 0,02 par suppos.

Nourrissons : Boîtes de 12 suppos Hg double, 0,01 par suppos.

Un suppositoire chaque jour en se couchant.

Prix : 14 fr. 80.

Les suppositoires sont présentés sous double enveloppe de Rhodembal, antisepsie parfaite, étiquette discrète : reconstituants, dépuratifs, toniques.

Autres produits Lémery : **Cartouches Lémery**,
Ampoules Lémery à 3 dosages.

Cy-Hg, 0,01 pour 1 cc. de solution stérilisée ;

Cy-Hg, 0,01 pour 2 cc. de solution stérilisée ;

Cy-Hg, 0,01 pour 3 cc. de solution stérilisée.

Pilules Lémery (Voir *Pilules Lémery*).

Produits du Dr Henri PHILIPPE

36, quai Fulchiron — LYON.

SUPPOS SÉDABIOS

Présentation. — En boîtes de 3 (10 fr. 20).
et en boîtes de 10 suppositoires (30 fr. 60).

Principes actifs. — Même composition
que le SÉDABIOS, mais à doses dimi-
nuées.

Indications. — Toutes les indications du
SÉDABIOS : Préanesthésie et suites
opératoires, Affections douloureuses, Pros-
tatite, Cystite, Hémorroïdes, Rétention
et affections gynécologiques.

Mode d'emploi. — 1 à 3 supposit. par jour.
Enregistré au L. N. C. sous le n° 900-50.

Laboratoires PROBIOS

8, rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

SUPPOTHERMOS LAGOUTTE

Suppositoires.

Composition :

	Adultes.	Enfants.	Bébés.
Bromhydrate de qui- nine	0,25	0,10	0,05
Amidopyrine	0,25	0,10	0,05
Phénacétine.....	0,25	0,10	0,05
Citrate de théine ...	0,10	0,05	0,02
Beurre de cacao. Q.			
S. pour	3 gr.	2 gr.	1 gr. 40

Actions thérapeutiques. — Antithermique et analgé-
sique.

Indications. — Toutes les fièvres en général, Grippe,
infections purulentes, Courbatures fébriles, Maux de
tête.

Mode d'emploi. — 2 à 3 suppositoires dans les
24 heures.

Prix et contenance :

La boîte de 6. *Adultes* : 14 francs. *Enfants* : 12 francs.
Bébé : 10 francs (impôt compris).

Laboratoires LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON
(Tél. : Moncey 14-35.)

SUPPOTONIC LAGOUTTE

Suppositoires.
Composition :

	Adultes.	Enfants.
Méthylarsinate de soude.	0,05	0,025
Méthylarsinate de strychnine	0,001	Néant.
Nucléinate de soude ...	0,05	0,02
Nucléinate de manganèse	0,05	0,02
Glycérophosphate soude	0,10	0,05
Beurre de cacao. Q. S.		
pour.....	3 gr.	2 gr.

Actions thérapeutiques. — Tonique reconstituant.
Antidéperditeur.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Rachitisme, Phosphaturie, Cachexies chroniques, Convalescences, Tuberculose pulmonaire, Dyspepsies atoniques, Paralyties d'origine périphérique.

Mode d'emploi. — 1 suppositoire le soir pendant 10 jours.

Prix et contenance

La boîte de 10. *Adultes* : 17 francs. *Enfants* : 13 fr. 50 (impôt compris).

Laboratoire LAGOUTTE

85, cours Albert-Thomas — LYON. — Tél.: Moncey 14-35.

SUPPOVITA

Suppositoires à la vitamine A.

Composition :

	Adultes :	Enfants :
Vitamine A	5 000 U. I.	4 000 U. I.
Excipient ... Q. S. p.	2 gr. 60	1 gr. 40

Propriétés. — Permet l'assimilation de la presque totalité de la vitamine introduite.

Supprime les inconvénients dus à l'administration de la vitamine A par voie buccale et par voie intramusculaire.

Indications. — Affections ulcéreuses du tube digestif. Etats de dénutrition. Hyperthyroïdie. Troubles de la croissance. Troubles oculaires. Déficiences du système nerveux. Affections des voies respiratoires. Affections de l'appareil circulatoire. Infections. Cicatrisations de toutes sortes.

Posologie. — 1 à 3 suppositoires par 24 heures, selon avis médical.

Prix. La boîte de 10 (adultes) 30 fr.
La boîte de 12 (enfants) 30 fr.

LABORATOIRES DU SUPPOVITA

S. Ricquier, pharmacien.

56, boulevard de la République, Saint-Cloud (S.-et-O.).
(Tél. : Val-d'Or 08-17.)

SUPRALGYL

Spécifique de la douleur

Association Hormono-Analgésique.

Forme. — Élixir Antinévralgique, Antithermique de goût et de saveur agréables.

Indications. — Migraines, Névralgies, Algies diverses, Règles douloureuses, Sciatiques, Névrites, Douleurs rhumatismales, Rages de dents.

Composition :

Pyramidon	0 gr. 205
Salicylate d Antipyrine.....	0 gr. 205
Caféine	0 gr. 152
Extrait de Glandes lymphatiques	0 gr. 150
Extrait de Moelle osseuse.....	0 gr. 150
Extrait de cervelle	0 gr. 150
Excipient aromatique q. s. pour une dose.	

Posologie. — 2 cuillerées à café au moment des douleurs, jusqu'à 6 par jour, à intervalle des repas.

Avantages. — Action rapide et sûre, constante. Pas d'accoutumance. Pas d'accumulation.

Prix au public : 15 francs (flacon de 10 doses).

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1550-2.

Laboratoires BARBESSOU

10, allées Damour — BORDEAUX.

SUPRASTHENYL

(Elixir)

Arséniate de soude.....	0 gr. 0025
Sulfate de strychnine.....	0 gr. 0015
Sulfogaïacolate de potasse.....	0 gr. 50
Lactophosphate de chaux.....	0 gr. 75
Excipient aromatisé.....	Q. S.

Pour une cuillerée à soupe d'Elixir.

Indications. — Convalescence des affections broncho-pulmonaires, Asthénies post-grippales. Asthénies de toutes natures, Tonique des poumons, Puissant antiseptique des voies respiratoires, Reconstituant énergétique.

Posologie. — *Adultes* : 2 cuillerées à soupe par jour avant les repas.

Adolescents : au-dessus de 15 ans, 2 cuillerées à dessert.

Prix : 18 fr. 50.

N. B. — Se prend pur ou dilué dans un peu d'eau.

Laboratoire OMNITHER

33, rue Barthou — ANGOULÊME (Charente).

SUR-BI-CAL

Formule du Dr Martin du Theil.

Forme. — Cachets.

Composition. — Phosphate bicalcique, 0 gr. 50 ;
Solution d'adrénaline au millième, 1 goutte pour
1 cachet.

Propriétés. — Particulièrement assimilable en
raison de sa solubilité dans tous les acides faibles,
y compris les acides de fermentation.

Indications. — Toutes les indications des phos-
phates de chaux.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 cachets par jour
au milieu des repas.

Enfants : 1 cachet par jour.

On peut aussi délayer le contenu du cachet dans un
peu d'eau ou de lait.

Prix : 18 fr. 50 (40 cachets pour 20 jours.)

Enreg. au L. N. C. N° 563.

Laboratoires LACOMBE et Cie

42, rue du Mont-Cenis — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 25-51.)

SUROXYDAL

Dinitrophénol 1. 2. 4. : spécialisé.

(Pureté, Activité constante, Inaltérabilité, Dosage précis.)

Complété par le Carbonate de Manganèse.

Fonction acide bloquée : Tolérance digestive assurée.

Catalyseur d'oxydations offert en quantité proportionnée aux besoins accrus.

Dosage démultiplié permettant la précision dans la progression des doses.

(Dose faible : 1 dragée. Dose moyenne : 2 dragées. Dose forte : 3 dragées.)

Mode d'action : Activateur des oxydations agissant, proportionnellement à sa concentration, dans toutes les cellules de l'organisme (aux doses usuelles, suroxydations de 10 à 30 %) avec parallèlement : 1. Hyper-assimilation des substances nutritives ; 2. Libération intracellulaire d'énergie chimique directement utilisée pour réaliser les synthèses créatrices de matière vivante (mitoses) et de produits de sécrétion ; 3. Dégagement de gaz carbonique et de chaleur.

Indications majeures :

I. Avec régime de Suralimentation pour maintenir le poids.

1. *Effet Thermogène et Thermolytique* : Réchauffement des Peaux Hypothermiques par hypercirculation artérielle périphérique : Acrocyanose. Erythème induré. Maladie de Raynaud.

Eutrophie globale des membres atteints de Séquelles de Paralysie infantile.

2. *Effet Cytogène* : Accélération de 30 % des Mitoses cellulaires.

A. Cicatrisations des plaies. Brûlures. Ulcères. Engelures.

B. Bourgeonnement du Cal conjonctif dans les fractures.

C. Réépidermisation des lésions d'impétigo.

3. *Effet Carbogène* : Amplification des mouvements thoraciques de ventilation par excitation du centre respiratoire bulbaire par le gaz carbonique. Régularisation respiratoire pendant l'anesthésie générale. Prévention de la congestion passive des bases post-anesthésique ou de décubitus.

II. Avec régime de restrictions sous-carboné :

Effet adipolytique : Cure de l'obésité : en plus du régime, emploi indispensable pour empêcher la fatale diminution progressive des Combustions. (Infra-métabolisme).

Contre-indications :

Générales : toutes les tares viscérales notables.

Particulières : Fragilité rénale (s'abstenir s'il y a antécédents de néphrite, traces d'albumine. Analyse périodique des urines).

Deux présentations :

1) *Présentation magistrale pour poids adultes* : Tubes de 42 comprimés pour poids de 50 à 60 Kgs, 60 à 70, 70 à 80, 80 à 90, 90 à 100, 100 et plus.

Prix : 17 fr. 35, 18 fr. 35, 19 fr. 40, 20 fr. 40, 21 fr. 40, 22 fr. 45.

Doses : Débuter au moins pendant une semaine par la dose faible : une dragée à la fin du repas de midi.

2) *Présentation Standard pour tous poids* : Tube dosé par dix kilogs (200 comprimés à un centigramme de Dinitrophénol.)

Prix : 20 fr. 40.

Doses : Autant de fois un comprimé (dose faible) ou deux comprimés (dose moyenne habituelle) ou trois comprimés (dose forte) que le sujet pèse de fois dix kilogs.

Ne pas dépasser le maximum de vingt comprimés, même si le poids dépasse 70 kgs.

Enregistré au L. N. C. M. n° 1536/2 — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Laboratoires C. LE FOLLET

NOZEROY (Jura). — (Tél. : Nozeroy-5.)

Echantillon. Littérature. Feuilles de régime à 1000 calories.

Service de la Revue de l'Obésité. Conditions spéciales pour balance portative (Pèse-personnes).

SURPARINE

Spasmolytique de choix.

Composition :

1 comprimé 0 gr. 06 de Perparine — 0 gr. 002 de Novatropine
 1 ampoule 0 gr. 04 de Perparine — 0 gr. 0015 de Novatropine
 1 suppositoire 0 gr. 04 de Perparine — 0 gr. 0015 de Novatropine
 0 gr. 015 d'acide phényléthylbarbiturique.

Mode d'action et avantages. — L'antispasmodique par excellence. La Perparine, d'effets comparables à ceux de la Papavérine, est 3 fois moins toxique pour une activité triple. Sans action sur le système nerveux central ne déterminant pas d'accoutumance, d'effet prolongé, sans réaction atonique secondaire, elle est administrable par voie buccale. La Novatropine, pour une toxicité 50 fois moindre, produit l'effet total de l'atropine.

Indications. — Tous les spasmes. Spasmes du pylore et du cardia, vomissements, ulcus gastriques et duodénaux, hyperacidité, colites aiguës, constipation spasmodique, coliques hépatiques, cholécystites, crises d'asthme, spasme glottique, angiospasme, dyspnée paroxystique, angoisse, coliques néphrétiques, cystites, spasmes du col vésical, dysménorrhée, etc. Hoquet. Rétention gazeuse post-opératoire.

Références. — Communication à l'Académie de Médecine du 19 décembre 1933.

Posologie. — Dominée par deux notions : absence pratique de toxicité, nécessité de doses importantes dans les syndromes paroxystiques, 1^o *Etat de crises* : essentiellement, ampoules injectables, 3 à 10 *pro die* associées au besoin à quelques suppositoires ;

2^o *En dehors des états de crises* :

Comprimés : 3 à 5 par jour.

Ampoules : 1 à 3 par jour.

Suppositoires : 1 à 3 par jour.

Il s'agit là de doses moyennes, qui peuvent être sensiblement augmentées selon les indications du médecin.

Posologie infantile. — a. *Nourrissons* : dans les vomissements habituels on donnera 1/4 comprimé dissous dans du lait avant chaque tétée, ou l'on fera une injection de 0 cc. 2 sous-cutanée. Dans ces deux cas on pourra répéter ces doses 3 à 4 fois par jour.

b. *Enfants* : jusqu'à 1 an, 1/4 comprimé ou 0 cc. 2 en injections sous-cutanées 3 à 4 fois par jour.

De 2 à 5 ans, 2 à 6 demi-comprimés ou 0 cc. 4 en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

De 6 à 12 ans, 2 à 4 comprimés ou 1 cc. en injections sous-cutanées 3 fois par jour.

Présentation :

20 comprimés ; 100 comprimés ; 5 ampoules.

6 suppositoires : 30 suppositoires.

SYNTHESIS

R.-L. MATHIVAT

Docteur en pharmacie, Ex-Interne des hôpitaux de Paris

66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 30-52 et 32-91.)

SURPAVER

*Chlorhydrate de papavérine
pur associé au benzoate de benzyle.*

Propriétés physiologiques :

Antispasmodiques agissant tous deux par leur groupement benzyle. Aucune toxicité sur le cœur ni les reins.

Indications :

Tous les spasmes de la musculature lisse. Spasmes bronchiques, vésicaux, du pylore. Cholécystites, Angiospasmes. Colites aiguës. Angine de poitrine. Hypertension.

Présentation :

Tube de 20 comprimés dosés à 0 gr. 04 de Chl. de papavérine et V gouttes de solution de benzoate de benzyle à 20 p. 100 par comprimé.

Posologie :

4 à 6 comprimés par jour suivant prescription.

Laboratoires J. LAVALLE

Docteur en Pharmacie

245, rue de Vaugirard — PARIS (XV^e).
(Tél. : Suf. 78-88.)

SURRASTHÉNINE

Composition. — La Surrasthénine est à base d'Exo-Surrénine Byla, de quinine, de nucléinates, d'hypophosphites et de glycérophosphates, dont les propriétés toniques et reconstituantes sont universellement connues.

Indications thérapeutiques. — La Surrasthénine, médicament stimulant et tonique par excellence, est le véritable spécifique de *toutes les asthénies*, et notamment de l'asthénie post-grippale.

Posologie. — De goût très agréable, la Surrasthénine se prend dans un peu d'eau, *au milieu des repas du matin et de midi*, à la dose de 2 ou 3 cuillerées à dessert par jour pour les adultes, et de 2 cuillerées à café pour les enfants.

Prix : 23 fr. 35.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée
Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, avenue de l'Observatoire — PARIS (XIV^e).
(Tél. : Danton 08-11.)

SURVAL

**Puissant reconstituant général
dans toutes les formes de l'anémie.**

Formule :

Extrait surrénal	0 gr. 03
Sulf. strychnine	0 gr. 0004
Phosphure de zinc	0 gr. 0002
Triodure d'arsenic	0 gr. 002
Lactose	Q. S.

Pour 1 dragée à 0 gr. 30.

Indications. — Anorexies, Amaigrissements, Convalescences, Dépressions nerveuses et sexuelles, Retard de croissance, Insuffisance surrénale, Sénilité précoce, fatigabilité.

Posologie :

12 à 18 ans : 3 dragées par jour.

Adultes : 6 dragées par jour.

Enregistré au L. N. C sous le n° 1965 1.

Laboratoires KERCKOVE

Place Charles-Roussel — TOURCOING.

SYLCASE

Silicium, Calcium.

Formule du Docteur CRETIN.

Rachitisme, Décalcifications, Croissance, Fractures, Carie dentaire, Allaitement.
Evite l'hypertension.

Présentation. — Comprimés, granulés, poudre, ampoules injectables.

Posologie. — 1 à 5 comprimés ou cuillers à café par jour suivant l'âge, 1 ampoule par jour.

Littérature et échantillons :

Laboratoires GRYSA

7, rue Saint-André — LE MANS (Sarthe).

C. LÉTANG

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Paris.

SYMPATHOCRINE

Médication Sympathico-régulatrice en Élixir.

Formule :

Ethylphénylmalonylurée.....	0,20
Extrait fluide de Passiflore	2,00
Alcoolé de Crataegus	2,00
Teinture de Jusquiame.....	0,80
Thyroïde (extrait glyciné).....	0,02
Ovaires (— —).....	1,00
Surrénales (— —).....	0,10
Excipient et parfum Q. S. pour 100 cc.	

Indications. — Troubles de la tonicité nerveuse, Etats anxieux, Emotivité, Troubles circulatoires, Palpitations, Vertiges, Rééducation du Sommeil.

Emplol. — 1 à 2 cuil. à café au moment du coucher.
Prix : 20 francs.

Laboratoire **BIOSEDRA**

E. Estrader, Docteur en pharmacie
37, rue Brochant — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 10-23.)

SYMPATHORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance sympathique.

Formule :	Salicylate d'ésérine.....	1/10 de mgr
	Lobe postérieur d'hypophyse	0,002
	Camphre monobromé.....	0,10
	Glycérophosphate de Manganèse	0,02
	Valérianate de Zinc	0,025
	Extrait de Basilic	0,01
	Extrait de Ballote	0,01
	Extrait de Passiflore	0,03
	Poudre de Guarana	0,015
	Poudre de Fenugrec désodorisé	0,03
	Poudre de Jusquiame.....	0,015
Par comprimé dragéifié.		

Indications. — SYMPATHICOTONIE. Hyperémotivité, Hyperactivité, Hyperesthésie, Fausse angoisse, Agitation, Tremblements, Sommeil capricieux, Spasmes, Instabilité des fonctions gastro-intestinales, Douleurs épigastriques, précordiales, neurotonie à prédominance sympathique.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.
Prix : 18 fr. 75 (40 dragées par boîte).

Pour les Vagotoniques, voir : VAGORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le N° 988-1
Laboratoire **FOSSET**

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél. : 11.)

SYMPATHYL

Synergie médicamenteuse constituant, non pas seulement un sédatif, mais un régulateur complet des dystonies organo-végétatives.

Forme. — Comprimés.

Indications principales. — Émotivité, Irritabilité, Anxiété, Éréthisme cardiaque, Angor, Spasmes, Asthmes, Troubles thyroïdiens, Séquelles d'hystérectomie et d'ovariotomie, Syndromes solaires et toutes insomnies d'origine neuro-végétative.

Composition :

Extrait spécial de cratægus	0,060
Extrait de boldo	0,010
Phényléthylmalonylurée	0,012
Hexaméthylènetétramine	0,060
Peptone polyvalente	0,030

Pour 1 comprimé.

Posologie. — 3 à 8 comprimés par jour, de préférence avant les repas.

Prix : 19 francs le tube de 40 comprimés.

INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

SYNCORTYL

Acétate de désoxycorticostérone.

Solution huileuse d'hormone cortico-surrénale synthétique titrée en milligrammes.

Indications. — Toutes insuffisances surrénales, Maladie d'Addison, Adynamie, Infections anergisantes, Intoxications chroniques, États de shock quelle que soit leur origine.

Présentation. — Boîte de 4 ampoules de 1 cc. contenant chacune 2 mgr. de désoxycorticostérone.
Boîte de 4 ampoules de 1 cc. contenant chacune 5 mgr. de désoxycorticostérone.

Voie intramusculaire.

Prix au public :

Boîte de 4 ampoules titrées à 2 mgr. : 80 francs.

Boîte de 4 ampoules titrées à 5 mgr. : 160 francs.

Laboratoires du D^r ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

SYNCRINES CHOAY

Nature. — Associations opothérapiques correspondant aux principaux syndromes glandulaires.

Formes pharmaceutiques et posologie :

Cachets et Comprimés, en tubes hermétiques :
2 à 4 par jour.

Ampoules injectables, désalbuminées, stérilisées : 1 cc. tous les 2 jours.

Nomenclature des principales formules :

- 1..... Pluriglandulaire F.
- 1 *bis.*.. Pluriglandulaire M.
- 2..... Surréno-Hypophysaire.
- 2 *bis.*.. Thyro-Hypophysaire.
- 3..... Thyro-Surréno-Hypophysaire.
- 3 *bis.*.. Thyro-Surréno-Ovariennne.
- 4..... Thyro-Ovariennne.
- 4 *bis.*.. Surréno-Ovariennne.
- 5..... Thyro-Orchitique.
- 5 *bis.*.. Surréno-Orchitique.
- 6..... Hypophyso-Orchitique.
- 6 *bis.*.. Hypophyso-Ovariennne.
- 7..... Thyro-Hypophyso-Ovariennne.
- 7 *bis.*.. Thyro-Hypophyso-Orchitique.
- 8..... Pluriglandulaire digestive.
Peptosthénine (Voir ce mot).
- 9..... Surréno-Hypophyso-Ovariennne.
- 10..... Placento-Mammaire.
- 11..... Ovaro-Mammaire.
- 12..... Spléno-Médullaire.

Boîte de 24 cachets ou de 30 comprimés.

Boîte de 6 et de 12 ampoules.

Laboratoire CHOAY

48, av. Théophile-Gautier — PARIS (XVI^e)

(Tél. : Auteuil 44-09 et 44-10.)

SYNERGYL VADAM

Reconstituant général.

Ampoules injectables et granulé.

Formules :

Injectable.

Nucléinate de soude	0,01
Glycérophosphate de soude.....	0,09
Cacodylate de soude.....	0,05
Sulfate de strychnine	0,001
Sérum physiologique.....	1 cc. 1/2

Granulé.

Glycérophosphate de chaux	2
Méthylarsinate de soude.....	0,50
Sulfate de strychnine	0,01
Sucre et e. o. a., quantité suffisante pour	200

Présentation. — Boîte de 12 amp. de 1 cc. 5. Prix: 18 fr.
B^{te} de 200 gr. de granulé. Prix: 16 fr. 50.

Indications. — Faiblesse générale et fatigue passagère.

Posologie. — *Injectable* : par voie hypodermique, 1 ampoule tous les 2 jours.

Granulé : 1 cuillerée à café avant les 2 principaux repas, croquée ou écrasée dans un peu d'eau ou de vin.

Laboratoires D.DRY
JANVILLE (Eure-et-Loir).

SYNTHAGÈNE

Chimiothérapie antibacillaire.

Médication antitoxinique et immunisante. Innocuité absolue. Action rapide. Maximum d'efficacité. Aucune contre-indication.

Indications. — Toutes les formes de la tuberculose : pulmonaire, osseuse, rénale, génitale, ganglionnaire, scrofule, lupus bacillaire, états prétuberculeux et toutes déficiences de l'état général : traitement curatif et préventif.

Posologie. — Une piqûre intramusculaire par jour en séries de 30 piqûres.

Prix :

La boîte de 6 ampoules : 40 francs.

Coffret de 30 ampoules : 190 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, boulevard Jean-Jaurès
BOULOGNE-SUR-SEINE.
(Tél. Auteuil 11-86.)

SYNTHÉMA

L'Hématopoiétique intégral.

Composition. — Une dragée contient :

0,150 de muqueuse gastrique spécialement préparée; 0,020 de protoxalate de fer; 0,0002 de sulfate de cuivre; 0,001 d'hypophosphite de manganèse.

SYNTHEMA réalise ainsi la synthèse des grands principes hématopoiétiques de l'organisme sain.

Mode d'action et avantages. — 1° SYNTHEMA reconstitue et catalyse la fonction hématopoiétique. — 2° SYNTHEMA augmente la qualité hématique par élévation rapide du taux de l'hémoglobine. — 3° SYNTHEMA suractive le métabolisme général, et, partant, fortifie l'organisme. Action particulièrement rapide.

Indications. — Anémies secondaires de toute origine, médicales, chirurgicales, obstétricales. Asthénies, surmenage, convalescences. Anorexies, amaigrissement, lymphatisme, rachitisme, troubles de croissance. Cachexies.

Aucune contre-indication. Pas d'intolérance.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 dragées après chac. des trois princip. repas.

Enfants : jusqu'à 6 ans : 3 dragées par jour ;

jusqu'à 12 ans : 5 dragées par jour.

Présentation. — Boîte de 100 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE. M. Lefebvre, Pharmacien,
25, bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e). (Tél. : Segur 60-77.)

SYNTROPAN « ROCHE »

Composition. — Phosphate de l'ester-3-diéthylamino-2,2-diméthyl-propylique de l'acide tropique.

Propriétés. — Antispasmodique puissant, d'action qualitativement voisine de celle de l'atropine, sans action sur la pupille (mydriase), sur la sécrétion salivaire et sur la pression sanguine.

Indications. — Tous les Spasmes, estomac, pylore, cardia, Constipations spasmodiques, Coliques, Dysménorrhée, Ulcères, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Comprimés* à 2 cg. : 1 à 3 par jour. — *Ampoules* de 1 cm³ à 1 cg. : 1 à 3 par jour. — *Suppositoires* à 3 cg. : 1 à 2 par jour selon les cas.

Ampoules (boîte de 6). Comprimés (flacon de 20). Suppositoires (boîte de 6).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les N^{os} 504-66 (comprimés), 504-68 (ampoules), 504-69 (suppositoires).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV^e). — (Tél. : Arch. 91-10.)

SYPHONÉOL

Pilules de protoiodure Hg, arrhénal, Fer, Quinquina.

Propriétés thérapeutiques. — Cure d'entretien de la syphilis, Anémie, Asthénie, Action régulatrice sur le métabolisme. Cure préventive des néoplasmes (théorie de Pfeiffert). Paludisme. Ulcères variqueux.

Posologie. — 1, 2 ou 3 pilules par jour 1 heure avant le repas, midi et soir.

Prix : 16 francs le flacon de 30 pilules.

Pharmacie BAUDE
SAINT-AUBERT (Nord).
(Tél. : 16.)

SYSÉROS

Composition. — Hoang-Nan, Berce, Cascarille,

Indications. — Le *Syséros* est un stimulant de la sécrétion et de la motricité de l'appareil génital. Le *Syséros* est d'une efficacité certaine dans le traitement de l'impuissance. Aphrodisiaque le plus énergique, le plus rationnel avec absence complète de toxicité.

Posologie. — De 6 à 8 pilules par jour, avant les repas. Cette dose, le cas échéant, pourra être élevée jusqu'à 10 pilules, sans qu'on ait à craindre d'effet nocif de cette augmentation.

Le tube compte-pilules contient 60 pilules dragéifiées.

Prix : 30 francs.

L. N. C. 428-10

Laboratoire du Docteur A. VERMERSCH

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54)

TABLETTE PERROUD

La « Tablette Perroud » est certainement la forme la plus pratique, la plus agréable, la plus efficace d'administration du Bismuth. A sa pureté, sa division, son adhérence, elle joint l'agrément : le goût n'est pas offusqué, les réflexes fâcheux évités. Par un procédé spécial, de petites quantités de sucre et de Cacao diastasé favorisent l'adhérence.

Composition. — 50 gr. de corps crépissant par tablette de 10 bâtons contenant chacun 5 gr.

Doses. — Plus fortes elles seront, plus rapides les résultats. — *Minimum* : dans l'*Hyperchlorhydrie*, 2 bâtons avant chaque repas ; dans l'*Ulcère*, 4 bâtons le matin à jeun ; dans les *Colites*, 1 à 4 bâtons par jour. — Contre les *Oxyures*, médicament puissant (le prospectus indique les doses suivant l'âge). — Dans toutes les gastropathies : *Gastrite*, *Gastralgie*, *Hypersécrétion*, dans les *fermentations intestinales*, à petites doses seule ou associée, la « Tablette Perroud » rendra toujours de réels services.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoire PERROUD

163, boulevard de la Croix-Rousse — LYON
(Anciennement 3, rue Sébastien-Gryphe.)

TABLETTES du Docteur LE TANNEUR

Anti-migraineuses.

Pour la cure *durable* de l'*Etat migraineux*.
Diathèse.

Complexe. — Acétyl-salicylique, Glycéro-Phosphate Ca, Magnésie hydr., Bicarbonate Na.

Une ou 2 tablettes par jour délayées dans un demi-verre d'eau sucrée, ou de préférence dans une infusion chaude.

Enfants : demi-dose.

La boîte de 2 tubes. Cure d'un mois.

Prix : 18 fr. 75.

Laboratoires TACHOT, Pharmacien.

103, rue Saint-Lazare — PARIS

TABLETTES HOVA

Composition. — Dialysés de HOUBLON et de VALÉRIANE.

Propriétés. — Sédation inoffensive et progressive du système nerveux.

Indications. — Toutes les affections d'origine nerveuse : surexcitations, insomnie, neurasthénie, troubles de la ménopause, angoisses, cure de désintoxication.

Avantages. — Produit naturel d'une innocuité parfaite, dispensant de l'emploi du chloral, des bromures et des dérivés barbituriques.

Posologie. — 1° Sédatif :

Enfants : 1 à 2 tablettes trois fois par jour.

Adultes : 2 à 4 tablettes quatre fois par jour.

2° Hypnotique :

Adultes : deux fois 3 tablettes le soir dans l'intervalle d'une heure.

Ces doses peuvent être élevées et prolongées sans inconvénient.

Produit ZYMA

Dépôt général

Laboratoires LOBRU

92, rue Bobillot — PARIS (XIII^e).

TABLETTES SÉDATIVES ROBIN

(Formule du Docteur BOUSQUET)

Composition. — Comprimés, dosés à 0,02 Chlorhydrate d'Ethylmorphine (méthylcodéine, non stupéfiant).

Indications. — Toux et douleur de toute nature.

Posologie. — Dose quotidienne : 3 à 4 tablettes (*adultes*).

Prix : 22 fr. 30.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

TABLETTES ZEVA

Formule. — Extrait stabilisé d'ovaire. Extraits secs d'hydrastis, hamamélis, viburnum, bourdaine, kola, Excipient spécial.

(Aucune incompatibilité comme avec les mélanges d'extraits fluides et de teintures.)

Présentation. — Tablettes de 1 gr. équivalentes à 0 gr. 03 d'extrait ovarien et environ XL gouttes du mélange d'extraits fluides. Goût agréable. Conservation parfaite.

Posologie. — 1 à 4 par jour, 15 à 20 jours par mois. (Aucune contre-indication.)

Indications. — Dysménorrhée, Aménorrhée, Ménopause, Suites d'ovariotomie, Varices, Phlébites, Hémorroïdes.

Prix : 16 fr. 30.

Laboratoire H. CLUZEL

60, cours Emile-Zola — LYON-VILLEURBANNE
Médaille d'Or Strasbourg 1927.

TACHYGASTRINE DUCLOY

**Accélérateur physiologique des sécrétions
gastriques totales.**

Forme. — Ampoules buvables.

Composition. — Acide fumaro-protocétrarique-Albumoses-chlorures de sodium-magnésium-calcium.

Propriétés thérapeutiques. — *Eupeptique complet excitant : des nerfs gustatifs et sécrétoires par l'acide fumaro-protocétrarique amer et antinauséux ; de la sécrétion acide par les alcalins choisis ; de la sécrétion peptique par l'albumose.*

Indications. — **Toutes les insuffisances sécrétoires de l'estomac :**

Primitives : Dyspepsies et gastrites qui s'accompagnent d'hypoepsie ou d'apepsie, d'hypochlorhydrie ou d'anachlorhydrie, d'achylie, atonie gastrique — cancer de l'estomac.

Secondaires : Intoxication cancéreuse quelle que soit la localisation du néoplasme ; — dyspepsie et anorexie des tuberculeux, des chloroanémiques, des névropathes, des enfants débilités ou rachitiques, des femmes enceintes, des brightiques anorexiques, des convalescents, des nourrices ; *diarrhées gastrogènes* des achyliques, des gastro-entérostomisés, des nourrissons ; — anorexie et dyspepsie des nourrissons ; — anaphylaxies.

Contre-indication. — Hyperchlorhydries et hypersécrétions.

Posologie :

Adultes : Une ou deux ampoules avant les repas.

Prendre le médicament *dix minutes avant les repas* matin, midi et soir ou midi et soir seulement ; dans une demitasse à thé (50 à 60 cm.) d'eau bien chaude ou mieux de bouillon de viande ou de légumes non salé.

La cure peut être continuée plusieurs mois ou renouvelée sans inconvénients.

Nourrissons : V gouttes 2 à 3 minutes avant chaque tétée dans une cuillerée à café d'eau.

Enfants : De 5 à 12 ans accomplis : VIII gouttes par année d'âge, 5 minutes avant les repas principaux.

A partir de 12 ans : comme chez l'adulte.

Prix : 31 francs.

**Laboratoires DUOLOY et Cie
ARQUES (Pas-de-Calais).**

TÆNIFUGE BARDET

Médaille d'Or, Strasbourg 1924.

Diplôme d'Honneur, Paris 1931.

Composition. — Préparation liquide à base d'Aspidium Filix Mas, obtenue par un procédé mécanique à l'état colloïdal, lui conférant un maximum d'activité.

Indications. — Médication anthelminthique complète : Tænias, Ascarides, Oxyures, Ankylostomes, Tricocéphales et tous parasites intestinaux.

Présentation. — Dans la même boîte se trouvent :

a) Le Tænifuge proprement dit; b) Le Purgatif.

Posologie. — **Tænias** — La veille, alimentation lactée. Absorber à jeun en 2 fois, à 20 minutes d'intervalle, le Tænifuge aux doses suivantes :

Adultes : la totalité du contenu du flacon.

Adolescents de 15 à 20 ans : 8 à 10 cuillerées à café.

Enfants de 10 à 15 ans : 6 à 8 cuillerées à café.

Enfants de 3 à 10 ans : 2 à 6 cuillerées à café.

Une heure après, prendre le Purgatif mélangé à une infusion tiède, aux doses respectives suivantes : contenu du flacon, 4 à 5, 3 à 4, 1 à 3 cuillerées à café.

Tous les autres vers. — Pendant 4 à 5 jours consécutifs, donner le Tænifuge le matin à jeun aux doses suivantes :

Adultes : 1 cuillerée à soupe ;

Adolescents de 12 à 20 ans : 1 cuillerée à dessert ;

Enfants de 3 à 12 ans : 1 à 2 cuillerées à café.

Le 5^e ou 6^e jour, administrer le Purgatif à jeun, aux doses ci-dessus. Renouveler le traitement, plusieurs fois s'il y a lieu, à intervalle de 10 jours maximum.

Formuler : « TÆNIFUGE BARDET ».

Laboratoire National de Contrôle 518-1 et 2.

Échantillon et Littérature détaillée :

LABORATOIRES BARDET

Fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

TÆNIFUGE CASTEL

Cachets

Composition :

Cachet Rose (Laxatif).

Cascara sagrada pulv...	0 gr. 30	Scamonnée résine pulv..	0 gr. 20
Podophylline.....			0 gr. 02

Pour 1 Cachet.

Cachets Gris (Tænifuges).

Filleine pulv.....	2 gr. 50	Calomel chimiquement	
Oxyde stanneux pur....	2 gr.	pur.....	0 gr. 30
Etain pulv. pur.....	2 gr.	Thymol.....	0 gr. 10
		Aspidium pulv.....	2 gr.

Pour 9 Cachets.

Indications. — Destruction et expulsion des ténias de toute espèce.

Présentation. — Tube aluminium contenant 1 cachet rose (laxatif) et 9 cachets gris (Tænifuges).

Mode d'emploi (*Adultes* seulement). — Médicament très bien supporté, efficace et inoffensif. Après un repas du soir peu abondant, prendre le cachet rose avec une infusion. Dès le lendemain matin, l'effet laxatif obtenu, absorber de 10 minutes en 10 minutes chacun des 9 cachets gris avec un peu de café, d'eau ou d'infusion. Ne prendre aucun purgatif huileux ni aucun aliment avant le repas de midi qui sera normal.

Prix : 22 francs.

Laboratoires CASTEL, 1, place Bouquerie — NIMES

A. CASTEL, Pharmacien. Ingénieur-Chimiste, Licencié ès Sciences.

TÆNIFUGE DU D^r JACQUÈME

Composition :

Liquide en capsules à base d'*Aspidium Filix Mas* et de Podophyllin en solution huileuse chloroformée par procédé spécial.

Indications :

Expulsion radicale du Tænia.

Avantages :

Aucune toxicité. Absorption de 4 capsules seulement pour adultes. Enfants, petites capsules spéciales dont le nombre varie de 3 à 12 ans. Indiquer l'âge.

Mode d'emploi :

Au repas du soir prendre seulement un demi-litre de lait sucré, le lendemain matin avaler les capsules avec un demi-verre d'eau.

Effet : deux heures au maximum.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 641-2

Préparé par

E. LARROUYET, Pharmacien

Laboratoires CHIARINI

68, bd du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE

(Tél. : 3-95.)

TÆNIFUGE FRANÇAIS DU D^r E. DUHOURCAU

Composition. — Extrait chloroformo-huileux de Fougère mâle des Pyrénées, comprenant le purgatif. Présenté en capsules.

Indications. — Ankylostomiase, Teniasis, Parasites intestinaux.

Caractéristiques. — Pas de traitement préalable, pas de diète, pas de purgatif, pas d'arrêt de travail, absorption particulièrement simple, *non toxique*.

Mode d'emploi. — Absorption de capsules le matin à jeun, en 10 minutes, avec *aussi peu de liquide que possible*. Action généralement deux heures après. Si malaise ou nausées, absorption d'un peu de café ou de thé.

Doses. — *Adultes* : 12 capsules. *Enfants* de 7 ans à 11 ans : autant de capsules que d'années d'âge et une en plus.

Prix : 15 fr. 80.

Unité de vente : 1 traitement pour adultes.

N° d'inscription au Laboratoire de Contrôle : 146-2.

Laboratoires du D^r E. DUHOURCAU

LEGOUX frères, pharmaciens.

6, rue Louis-Blanc — LA GARENNE (Seine).

(Tél. : Charlebourg 20-79.)

TÆNIFUGE KIRN

En capsules

*à base de filicine, principe actif de la fougère mâle
dissous dans son huile grasse.*

Tænifuge le plus actif, ne présentant pas les dangereux inconvénients des ténicides, comme la pelletièreine.
(Travaux de thèse de Kirn et Schmidt).

Capsules Kirn. — Capsules à l'extrait vert éthéré de fougère mâle, mais caractérisées par ce fait unique que le titre du principe actif, la filicine, est toujours stable et uniforme ; sans calomel.

Mode d'emploi. — 1° Avant-veille, purgation ; 2° la veille, diète presque absolue (lait) ; 3° le matin à jeun l'absorption, de 5 en 5 minutes, des 12 capsules du flacon avec un peu de sirop d'éther ou un grog, suivie à nouveau d'une légère purgation.

Résultat certain si ces indications sont scrupuleusement observées.

Enfants : Capsulines Kirn, spécialement dosées.

Médication sans similaires.

Prix : *Adultes* : 23 francs. — *Enfants* : 18 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

62, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-S/S. (Tél. : Auteuil 11-86.)

TÆNIFUGE LARIX

(en 5 capsules).

Expulsion du *Tænia* en 2 heures.

Composition. — Extrait de fougère mâle, calomel, éther et chloroforme. Prix : 13 fr. 50.

Indications. — *Tænia*s, ankylostomes, parasites intestinaux.

Posologie. — *Adultes* : les 5 capsules, une toutes les 2 minutes.

Jeunes gens au-dessus de 16 ans : 4 capsules.

Enfants âgés de 10 ans : 3 capsules. Ne pas en donner aux enfants âgés de moins de 10 ans.

Une demi-heure après l'absorption de la dernière capsule, 10 à 15 gr. sulfate de soude (*enfants*) ou 10 à 15 gr. eau-de-vie allemande (*adultes*).

La veille s'être tenu à la diète depuis midi, sauf café, thé, lait. Si nausées pendant l'absorption des capsules, prendre limonade ou champagne. Observer diète hydrique durant la journée d'évacuation du *Tænia*. Durée du traitement : 24 heures.

Laboratoires Félix ABADIE

20, rue Thiers — TARBES (Htes-Pyr). (Tél. : 1-39.)

TAMAR INDIEN GRILLON

Laxatif végétal doux et agréable.

Présentation. — Bonbons chocolatés à la pulpe de tamarin et au séné ; ne renferme aucun produit chimique, n'irrite pas l'intestin.

Recommandé aux femmes et aux enfants.

Doses. — Un bonbon le soir en se couchant.

Enfants : un bonbon ou 1/2 bonbon en prenant le repas du soir.

Société du TAMAR INDIEN GRILLON

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

TAMARINE

Délicieuse confiture laxative à base de Casse muette et de Tamarin, infaillible dans tous les cas de constipation et de stases intestinales. Pas d'accoutumance.

Posologie :

Enfants au-dessus de 5 ans : 1/2 cuillerée à café.

Adultes : 1/2 à 1 cuillerée à café à la fin du repas du soir.

Prix : 14 fr. 75.

Laboratoire de la TAMARINE

4, route du Médoc

LE BOUSCAT, près Bordeaux.

TAMPOL « ROCHE »

Pansement gynécologique idéal.

Le *Tampol « Roche »* est constitué par un ovule derrière lequel est comprimée une certaine quantité de laine aseptique, non absorbante, contenue dans une capsule de gélatine et portant à son extrémité un cordonnet. (Boîte de 6.)

Mode d'emploi. — Plonger pendant 3 à 4 secondes environ le *Tampol « Roche »* dans de l'eau bouillie à peine tiède, puis, la malade ayant pris la position gynécologique, introduire ce pansement jusqu'au fond du vagin et le maintenir en place quelques minutes. Au bout de ce temps, la dissolution de la gélatine s'est effectuée, la laine s'est développée en tous sens : le *tamponnement vaginal est parfait.*

N. B. — Il ne faut jamais se servir pour l'introduction du *Tampol « Roche »* d'huile ou de corps gras qui empêchent la dissolution de la capsule de gélatine.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 504-42.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie
10, rue Crillon — PARIS (IV°). — (Tél. : Archives 91-10.)

TANNO-CALCINE

Médication reminéralisante.

Gluconate de Ca, Phosphate de Ca. Extrait hépatique, Tannin purifié.

2 formules :

TANNO-CALCINE A contenant 0,05 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

TANNO-CALCINE B contenant 0,15 de Tannin lavé à l'alcool et purifié.

Indications. — Convalescence, Grippe, Surmenage, Tuberculose, Croissance, Lymphatisme, Adénopathie.

2 cachets par jour.

Prix : 15 francs.

Laboratoires A. DANIEL-BRUNET

2, bd Jean-Jaurès — BOULOGNE-s-SEINE
(Tél. : Auteuil 11-86.)

TANNURGYL

du Docteur **LE TANNEUR**

Sel de Vanadium non toxique.

Tonique général puissant avec modification humorale profonde.

Indications. — Colibacillose, Déficience organique.

Posologie :

Adultes : 10 à 50 gouttes par repas.

Doses élevées et progressives nécessaires.

Enfants : demi-dose.

Nourrissons : 1/4 de dose dans le biberon.

Prix : Grand flacon : 23 francs. Petit flacon : 14 francs.

Durée : 20 à 30 jours.

Renseignements médicaux : **Dr LE TANNEUR**

87, avenue Borriglione — NICE.

Lab. Tachot. Pharmacien

103, rue Saint-Lazare — PARIS

TAPO

Ferments lactiques.

Spécifiques des affections gastro-intestinales.

Forme. — Cultures liquides.

Composition. — Excipient : Bouillon de Viande peptoné. Principe actif : Ferments lactiques sélectionnés.

Propriétés thérapeutiques. — Au point de vue curatif, le **Tapo** modifie rapidement le terrain infecté, augmente la résistance du malade en apportant une aide indispensable à la leucocytose organique et détruit les conséquences de l'infection.

Au point de vue préventif, le **Tapo** met l'organisme en état de non réceptivité tant par la résistance qu'il augmente que par la destruction des microorganismes qui assiègent l'individu continuellement.

Indications. — Gastrites, Entérites, Entérocolites, Intoxications alimentaires, Diarrhées chroniques, Dysenteries, Insuffisance hépatique, Appendicite chronique, Néphrites colibacillaires, Albuminurie, Impétigo, Eczéma, Furunculose, Pyodermites, enfin dans toutes les maladies fébriles aiguës (Grippe, Fièvres typhoïde et para-typhoïde) *comme agent anti-infectieux.*

Posologie. — De 1 à 2 flacons-ampoules par 24 heures (ou plus dans les cas d'infections marquées) pur ou dans un peu d'eau. Le traitement est de trois boîtes, on peut le continuer comme préventif en cas de récurrence.

Le **Tapo** est d'une conservation indéfinie ; ne s'altère pas sous l'action de la chaleur et du froid : c'est donc le produit d'élection pour les colonies et les pays chauds.

Laboratoire MADYL

14, rue de Miromesnil — PARIS.

(Tél. : Anjou 09-83.)

TARTRATE BORICO- POTASSIQUE PACHAUT

Tubes dosés de tartrate borico-potassique chimiquement pur à faire dissoudre au moment de l'emploi.
Conservation parfaite.

Indications. — Épilepsie, troubles névropathiques.

Présentation. — En boîtes de 30 tubes dosés à :
0 gr. 50, 1 gr., 2 gr., 3 gr., 4 gr., 5 gr., 6 gr.

Posologie. — Dose moyenne : 4 à 5 gr. par jour pour les adultes. Dépourvu de toute toxicité, doit être pris chaque jour sans interruption jusqu'à guérison.

Mode d'emploi. — Faire dissoudre le contenu d'un tube dans un verre d'eau, à prendre en 2 ou 3 fois dans les 24 heures.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. : Provence 49-77.)

TARTROBOROL

Composition. — Tartrate borico-potassique.

Indications. — Traitement des Maladies nerveuses :
Épilepsie, Hystérie, Névroses, Danse de Saint-Guy, Affection de la moelle épinière, Convulsions, Vertiges, Eblouissements, Fatigue cérébrale. Migraines, Insomnie, Spermatorrhée, etc.

Posologie. — Comprimés dosés à 0 gr. 50., 2 gr. par jour pour les enfants, soit 4 comprimés ; 4 gr. par jour pour les adultes, soit 8 comprimés. Jusqu'à 10 gr. par jour, chez les adultes sans aucun danger.

Les prendre avant les repas du matin, de midi et du soir. Faire dissoudre le nombre de comprimés fixé dans un verre d'eau sucrée ou non, chaude ou froide, ou dans une infusion et avaler.

La solution n'a aucun mauvais goût.

En flacon de 60 comprimés. Prix : 14 fr. 55.

L. N. C. 428-3.

Laboratoire du Docteur VERMERSON

18, rue des Écoles — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 18-54.)

TAXOL

Composition :

Poudre de muqueuse intestinale	0 gr. 05
Extrait biliaire.....	0 gr. 10
Agar-Agar	0 gr. 05
Ferments lactiques.....	0 gr. 05

Pour un comprimé.

Forme. — En comprimés de 0 gr. 35.

Propriétés thérapeutiques. — Régulateur physiologique de l'intestin. Aucune accoutumance.

Indications. — Constipation, Entérite chronique, Entérocolite, Dermatoses.

Doses et mode d'emploi. — De 1 à 6 comprimés par jour. Commencer le traitement par deux comprimés par jour après un des repas, ou au coucher. Augmenter ou diminuer la dose suivant l'effet produit. Avaler sans mâcher.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

TEINTURE DE COCHEUX

(Origine 1832)

Goutte, Arthritisme, Rhumatisme.

Composition. — Teinture alcoolique de colchique d'automne privée de son principe drastique ; c'est la mieux supportée des préparations à base de **Colchicine**. Elle n'occasionne aucun trouble.

Au Congrès de la Goutte, à Vittel, en 1935, plusieurs rapporteurs ont parlé de la « Colchicine, spécifique de la Goutte ».

En reconnaissant, il y a peu de temps, l'action désensibilisatrice très efficace de la Colchicine, on a établi scientifiquement la valeur thérapeutique de la Teinture de Cocheux empiriquement adoptée jusqu'alors.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau sucrée, à jeun. Souvent il est bon de prolonger la cure.

En pharmacie : flacon de 180 cc. et demi-flacon.

Enreg. au Lab. Nat. Cont. Méd. sous le n° 130-2.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. (Tél. : Franklin 24-36.)

TENEBRYL GUERBET

Di-iodo méthane sulfonate de sodium (68,6 p. 100 d'iode).
Moyen de contraste organique iodé soluble pour urographie intraveineuse, pyélographie instrumentale et explorations radiologiques diverses.

Pour urographie intraveineuse.

Chez l'adulte :

Solution A, 50 cc. à 30 p. 100 : normale forte.

Solution B, 25 cc. à 45 p. 100 : normale.

Solution C, 20 cc. à 35 p. 100 : faible.

Chez l'enfant :

Solution A à 30 p. 100 : 1 cc. par kilo.

Pour pyélographie instrumentale.

Solution D à 20 p. 100, ampoules de 10 et 20 cc. : normale.

Solution A, à 30 p. 100, ampoules de 10 et 20 cc. : normale forte.

Prix :

Solution A, 10 cc. : 22 fr. 45 ; 20 cc. : 35 fr. 70 ;

50 cc. : 81 fr. 60.

Solution B, 25 cc. : 71 fr. 40.

— C, 20 cc. : 61 fr. 20.

— D, 10 cc. : 15 fr. 30 ; 20 cc. : 25 fr. 50.

Laboratoires A. GUERBET et Cie

22, rue du Landy — SAINT-OUEN (Seine).

(Tél. : Montmartre 22-56.)

TENSÉDINE

Médication sédatrice, antispasmodique et régulatrice
du tonus artériel.

Forme. — Comprimés dragéifiés.

Composition. — Pour un comprimé :

Crème de tartre soluble	0,15
Aminophylline	0,03
Ether trinitrique de la glycérine.....	1/2 goutte
Phényléthylmalonylurée	0,005
Bromure d'acétylcholine.....	0,0025
Extrait de pancréas.....	0,20
Extrait de muscle strié	0,05

Indications. — Hypertension artérielle et ses troubles fonctionnels. Troubles vaso-moteurs et spasmes vasculaires. Artério-sclérose, Aortites, Artérites. Troubles de la circulation périphérique. Troubles de la ménopause. Maladie de Raynaud.

Posologie :

Dose moyenne : 2 comprimés au début de chacun des trois repas. Dose d'entretien : 3 comprimés par jour, une semaine sur deux.

Prix : 22 fr. 45 le tube.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, av. de Ségur — PARIS (VII^e). (Tél. : Inv. 52-73.)

TENSOL

Composition. — Association synergique de médicaments hypotenseurs (Cholalate de soude, Silicate de soude, Iode organique). Sédatifs antispasmodiques (dérivés barbituriques, Benzoate de Benzyle), Tonicardiaque, Diurétique (Spartéine, Carbonate de Lithine).

Présentation et doses. — Médication par voie buccale, 4 à 6 comprimés par jour, par 2 à la fois.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension, Arthritisme, Asthme et tous les accidents secondaires qui en découlent, d'origine artérielle, cardiaque, cervicale, rénale, nerveuse et pulmonaire.

L'étui de 48 comprimés : 17 fr. 80.

Laboratoire d'Actino-Biologie

LAURENÇON et Cie, Pharmaciens

11, rue François-Giraud,

VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône).

TENSOPAN

Traitement des états hypertensifs.

Action antispasmodique et calmante.

Action diurétique déchlorurante.

Action hypotensive constante.

Formule :

Extrait d'ail	0,05
Ortosiphon.....	0,10
Phényléthylmalonylurée	0,01

Pour une dragée soluble dans l'intestin seulement.

Posologie. — 2 dragées avant les 2 principaux repas, traitement de 10 jours, repos ; faire 2 séries par mois.

Les Laboratoires VENOT

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV^e).

(Tél. : Suffren 31-75.)

TENSORYL

Médication hypotensive.

Composition. — Complexe végeto-minéral à base d'éléments hypotenseurs et régulateurs de l'appareil cardio-vasculaire, présenté en pilules glutinisées renfermant :

Silicate de soude	0,10
Nitrite de soude	} \tilde{a} 0,05
Poudre de scille	
Extrait stab. Cratægus.....	} 0,03
— — Gui	
— — Muguet	

Indications. — Hypertension en général, Spasmes artériels, Angine de poitrine, Artério-sclérose et ses complications.

Emploi. — Une ou deux pilules avant chacun des trois repas pendant 10 jours par mois.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 27-3.

Prix : 17 fr. 60 l'étui de 60 pilules.

Laboratoires DESCOURAUX

52, boulevard du Temple — PARIS — (Roq. 49-22.)

DESCOURAUX et Fils, Pharmaciens,
Docteur en Pharmacie.

TERBINTHIOL THOMAS

Présentation et composition. — Capsules à base de sulfure de térébenthène ($C^{10}H^{14}S$), soit 19 % de soufre inoxydé (Thèse de Paris, D^r Lefèvre, 11 juillet 1934).

Propriétés. — Le TERBINTHIOL apporte à l'organisme du soufre organique inoxydé indispensable au métabolisme cellulaire et à la neutralisation de toxines et déchets.

Principales indications thérapeutiques :

Toutes carences soufrées.

Cholagogue. Cholérétique.

Infections hépatiques et vésiculaires.

Lithiases biliaires et rénales.

Infections de l'appareil urinaire. Gonorrhée. Colibacillose.

Manifestations anaphylactiques (Asthme, urticaire, rhume des foins).

Rhumatismes et tous états uricémiques.

Posologie et mode d'emploi. — *Dans les cas aigus* : 6 capsules par jour en trois fois aux repas.

En dehors des cas aigus : 3 capsules par jour en trois fois aux repas, 20 jours consécutifs par mois.

Remarque. — Faire continuer le traitement malgré les éructations qui pourraient être signalées et qui ne constituent pas un signe d'intolérance.

Prix : 16 francs les 50 capsules.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 650-10.

Laboratoires THOMAS

33, faubourg Montmartre — PARIS.

(Tél. Provence 49-77.)

TERCODAL

Traitement symptomatique des toux, bronchite, catarrhe, asthme, Emphysème.

Formule :

<i>Sirop.</i>	
Benzoate de soude.....	4,16
Codéthyline	0,042
Anesthésine	0,04
Peptone	1,666
Teinture racine aconit...	0,833
Teinture drosera	0,833
Teinture de belladone.....	0,833
Sirop de tolu	45, gr.
Sirop capillaire	45, gr.
Excipient.. Q. S. pour...	100 gr.

Prix : 17 fr. 50.

Comprimés.

Ephédrine	0,003
Terpine	0,10
Aconit (extrait)	0,001
Codéthyline.....	0,003
Excipient Q. s. p. un comprimé terminé à ..	0,35

Prix : 13 fr. 50.

Posologie :

Sirop : *Adultes* : 3 à 4 cuillerées à soupe par jour.

Adolescents : 10 à 17 ans, 3 cuillerées à dessert.

Comprimés : avaler sans croquer 5 à 6 compr. entre les repas par jour.

Enfants à partir de 5 ans : 2 à 3 comprimés par jour.

Laboratoires UNIS-SPÈS

14, rue Demarquay — PARIS (X^e).

TERKAL MONAL

Sédatif de la toux.

Forme. — Dragées.

Composition. — Carbonate de gaïacol terpino-codéiné associé au fluorure de calcium nucléiné et aux extraits de plantes béchiques.

Propriétés. — Calmantes, Expectorantes, Antiseptiques, Reminéralisatrices.

Indications. — Toux, Bronchites, Affections broncho-pulmonaires.

Doses. — 4 à 6 dragées par jour entre les repas. Avaler sans croquer.

Le flacon de 30 dragées : 14 fr. 30.

Laboratoires MONAL

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.)

TERPINE BOVEIL

Granulé fondant, entièrement soluble, d'un goût agréable, d'un dosage précis et constant.

Chaque cuillerée à café contient :

Terpine pure	0,250
Benzoate de soude de benjoin	0,175
Codéine	0,005
Orthoforme	0,001

Propriétés. — Permet, sous un volume réduit, de donner une dose très élevée de produits actifs. Peut être formulée aux enfants, aux nourrices et aux vieillards.

■ Excellent fluidifiant des sécrétions bronchiques. Jugule très rapidement toutes les affections du larynx et de la trachée ; donne complète satisfaction dans le traitement des toux quinteuses et spasmodiques. *C'est le médicament des voies respiratoires.*

Indications. — Rhumes, gripes, bronchites, catarrhes, emphysèmes, trachéites, antiseptique urinaire.

Posologie. — *Adultes* : 6 à 8 cuillerées à café par jour, à prendre soit pure, à laisser fondre dans la bouche, soit mieux dans un liquide chaud : eau, infusion ou lait.

Enfants : par 1/2 cuillerée à café selon l'âge.

Prix : 12 fr. 50.

L. N. C. n° 19-3.

Laboratoires A. CARON,
9, place des Terreaux — LYON.

TERPINE GONNON

Présentation et composition. — *Elixir* : Terpine et sirop de Tolu (1 verre à liqueur = 0 gr. 20 de terpine).

Granulé : Terpine, Phosphate de codéine, Aconit, Tolu, Polygala, Erysimum et galacosulfonate de potassium.

Pilules : Terpine, 0 gr. 10 ; Codéine, 0 gr. 005 ; Benzoate de soude, 0 gr. 15.

Pâte : Terpine, aconit, benzoate de soude, Tolu, Terpinol.

Pastilles : Terpine 0 gr. 05 et Tolu.

Propriétés thérapeutiques. — Augmente et fluidifie la sécrétion bronchique.

Posologie :

Prix public.

Elixir : 2 à 4 verres à liqueur par jour (pour 8 jours environ). 24 fr. 50

Granulé : 5 à 6 cuillerées à café par jour (pour 8 jours environ). 14 fr. 75

Pilules : 4 à 6 pilules par jour (pour 12 jours environ)..... 11 fr. »

Pâtes : 15 à 20 morceaux par jour (pour 4 jours environ)..... 7 fr. »

Pastilles : 8 à 10 pastilles par jour (pour 6 jours environ)..... 7 fr. »

Indications. — Toux, rhumes, catarrhes, bronchites, emphysème.

Employée aussi avec succès contre les maladies des voies urinaires et contre les affections du système nerveux.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. — (Tél. : Franklin 36-80.)

TERPINE GRANULÉE BARON

Composition. — Terpene pure et benzoate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antisep-tique des voies respiratoires, facilite l'expectoration et tarit les sécrétions bronchiques ; diurétique et antiseptique urinaire.

Indications. — Rhinites, Laryngo-Trachéites, bronchites aiguës, subaiguës, chroniques ; Catarrhe bronchitique des emphysémateux ; Bronchorrée ; Dilatation des bronches ; Coqueluche ; Cystites ; Infections urinaires, etc...

Doses. — 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : demi-dose.

Prix : 15 francs les 125 grammes.

Laboratoire FLAHAUT

74, rue Monge — PARIS (V^e).

(Tél. : Gobelins 39-44.)

TERPOXYL EXTERNE

du Docteur Barinque.

Liquide générateur d'oxygène à l'état naissant à la température et au contact des muqueuses.

Composition. — Solution alcoolique faible de terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00384 pour 10 gr.

Propriétés. — Bactéricide désinfectant et désodorisant parfait pour toutes plaies, même cancéreuses, cicatrisant rapide, atoxique et non caustique.

Indications. — Plaies, Ulcères variqueux, Gerçures des seins, Blennorrhagies, Affections de la peau, de la gorge. Angines, Coryzas, Otites, Pyorrhées alvéolaires, etc.

Posologie. — En solution de concentration croissante depuis 1/10 de TerpoxyL externe pour 9/10 d'eau bouillie ou distillée jusqu'à 1/2 ou pur suivant la sensibilité de la muqueuse traitée.

Prix du flacon : 19 francs.

OVULES au TERPOXYL

ou TERPOVULES.

Antiseptiques — Cicatrisants — Désodorisants.

Indications. — Leucorrhée, Métrites, Salpingites, etc.

Prix de la boîte de 8 : 18 francs.

TERPOXYL INTERNE

du Docteur Barinque.

Cède son oxygène à l'état naissant au-dessus de 35° C.

Composition. — Solution alcoolique faible de Terpènes peroxydés. Oxygène actif : 0 gr. 00096 pour 10 gr.

Propriétés. — Anti-thermique, anti-toxique, bactéricide, tonique et vitalisant.

Indications. — Toutes dépressions ; choc hémoclasique ou autres ; Pneumonie (régression fébrile rapide). Grippe. Toutes maladies infectieuses.

Posologie. — *Fièvre intense* : XV gouttes toutes les heures dans 1/2 verre d'eau sucrée ; espacer avec la régression fébrile.

Tonique : XV gouttes, quatre fois par jour.

Prix du flacon : 13 fr. 50.

Durée : 12 à 15 jours.

Échantillons et Littérature :

Laboratoires JOLLY

28, av. Carnot, SAINT-GERMAIN-EN-LAYE (S.-et-O.).

(Tél. : 83.) — L. N. C. M. 40-2-3-4.

TÉTRANITROL ROUSSEL

Composition :

Comprimés de Tétranitrates d'Érythrol à
1, 2, 5 mmgr. et 1 centigramme.

Indications :

Hypertension : Angine de poitrine,
asthme cardiaque, œdème pulmonaire.

Doses et mode d'emploi :

Laisser fondre les comprimés sur la langue
(de 1 à 15 mmgr. par 24 heures).

Comp. à 1-2-5 mmgr. et 1 centgr.

Prix : 12 fr. 50 ; 15 fr. ; 18 fr. ; 25 francs.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 62-27.)

THALASSOTONINE INFANTILE

Ampoules injectables et buvables de 10 cc.

Composition :

Gluconate de Calcium	0,50
Glycérophosphate de Magnésium	0,05
Nucléinate de Sodium	0,005
Eau de mer isotonique	10 cc.

Présentation. — Boîte de 5 ampoules de 10 cc.

Prix : 16 francs.

Indications. — *Troubles de la digestion ou de la nutrition* : vomissement, gastro-entérites, diarrhée, athrepsie, anorexie, chute de poids ou croissance difficile, intolérances alimentaires.

Trouble du métabolisme phosphocalcique : Spasmophilie, retard de dentition, fragilité osseuse, maladies de peau, intoxications endogène ou exogène, syndromes hémorragique

Posologie. — Une injection intra-musculaire, indolore tous les jours ou tous les 2 jours aux nouveau-nés. Peut se prescrire par voie buccale, à raison d'une ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée avant les repas, la bouillie ou la tétée.

Laboratoires DIDRY
JANVILLE (Eure-et-Loir).

THALOSSOTONINE VADAM

Ampoules injectables de 5 cc.

Composition :

Nucléinate de soude	0,01
Glycérophosphate de soude	0,09
Cacodylate de soude	0,05
Sulfate de Strychnine.....	0,001
Eau de mer isotonique	5 cc.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 5 cc.
Prix : 20 francs.

Indications. — Asthénie. Surmenage physique et intellectuel, neurasthénie, convalescence de maladies infectieuses, amaigrissements, dermatoses.

Posologie. — Une injection intramusculaire tous les jours ou tous les 2 jours.

Laboratoires DIDRY

JANVILLE (Eure-et-Loir).

THAOLAXINE

(Laxatif-régime.)

Combinaison d'agar-agar et d'extraits de rhamnées.
Paillettes, cachets, comprimés, granulé.

Doses et mode d'emploi. *Paillettes*, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas ; *cachets*, 1 à 4 cachets à chaque repas ; *comprimés*, 2 et 8 comprimés à chaque repas ; *granulé*, 1 à 4 cuillerées à café à chaque repas (spécialement préparé pour les enfants).

Propriétés thérapeutiques. — Exonérateur de l'intestin, agit en augmentant le volume et l'hydratation des fèces.

Indications. — Spécifique de la constipation habituelle.

Prix :

Thaolaxine paillettes { La boîte : 16 fr. 50.
La boîte triple dose : 35 francs.

Société Industrielle de Thérapeutique Scientifique Appliquée.

**Laboratoires du Docteur Pierre ROLLAND
et DURET et RÉMY réunis**

15, rue des Champs — ASNIÈRES (Seine).
Tel. : Grésillons 37-34, 2 lignes groupées.)

THEBAÏL

Opium essentiel.

Propriétés. — Le *Thébaïl* (opium essentiel), qui exclut de sa composition les alcaloïdes convulsivants et stupéfiants de l'opium et qui n'en conserve que les alcaloïdes soporifiques et calmants, donne la puissance maxima de l'opium, avec toutes les efficacités pacificatrices que l'on attend de ce précieux agent. Enfin, son activité physiologique est rigoureusement dosée *in vivo*.

Formes thérapeutiques. — Le *Thébaïl* est présenté sous 2 formes :

1° En ampoules isovisqueuses indolores dosant par cc. :

Thébaïl 2 cgr.

équivalent à Chl ^{te} de morphine.....	1	—
extrait d'opium.....	5	—

2° En suppositoires dosant :

Thébail 2 cgr.

Posologie pour les adultes:

Ampoules 1 à 2 par 24 heures.

Suppositoires .. 1 — —

Dépôt : Laboratoires NOQUÈS

7, rue Galvani — PARIS.

THEINOL

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle
des Médicaments, sous le n° 363-9.

Forme. — Élixir.

Composition. — Théine en combinaison salicylique, Salicylate d'Antipyrine.

Propriétés pharmacodynamiques. —

Permet le travail intellectuel dans un cerveau débarrassé des algies de toute origine. Régulateur des fonctions nerveuses.

Indications. — Migraines. — Névralgies. —

Douleurs rhumatoïdes. — Crises gastro-intestinales. — Dysménorrhées.

Mode d'emploi. — Deux cuillerées à dessert à une heure d'intervalle l'une de l'autre.

Le flacon de 120 cm³ : 17 fr. 35.

Laboratoires A. BAILLY

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

THÉÏSINE DUBAT

Granulé de Théobromine pure et Extrait de maïs.

Propriétés thérapeutiques. — Diurétique idéal dans les affections du cœur et des reins. Action certaine, constante, durable ; toxicité nulle ; pas de céphalées, pas d'intolérance. *Granulé* de goût agréable préféré aux cachets et aux solutions par les enfants et les vieillards.

Indications. — Toutes celles de la théobromine, insuffisance cardiaque, endocardite, myocardite, fléchissement du cœur dans l'artériosclérose, affections cardiorénales, mal de Bright, albuminurie, néphrite, maladies infectieuses et tous les cas d'insuffisance urinaire.

Doses. — 2 à 8 cuillerées à café par jour.

Cuillerée à café = $\left\{ \begin{array}{l} 0 \text{ gr. } 25 \text{ théobromine pure.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ extrait de maïs.} \\ 0 \text{ gr. } 05 \text{ phosphate de soude.} \end{array} \right.$

Prix : 17 fr. 35.

Échantillons sur demande.

LABORATOIRE DU D^r DUBAT

80, rue du Faubourg-Saint-Denis — PARIS.

(Tél. : Provence 13-03.)

THÉOBROMINE INVAR

Produit soumis au **contrôle physiologique** le plus rigoureux ; donne les plus sûres garanties de *pureté chimique* et d'*activité constante*.

Action. — Diurétique puissant.

Indications. — Néphrites, cardiopathies, artériosclérose, arthritisme.

Formes. — Pure, caféinée, lithinée, phosphatée, en boîtes de 24 cachets à 0,50.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e)

(Tél. : Archives 18-67.)

THÉOBROMOSE DUMESNIL

Théobrominate de lithium cristallisé pur.

Propriétés. — 1° En raison de sa solubilité, la *Théobromose* agit plus rapidement que la théobromine et à des doses 4 fois moindres ; 2° En raison de cette solubilité et des faibles doses thérapeutiques nécessaires, elle est toujours bien tolérée.

Indications. — Dans tous les cas où l'on veut obtenir une action diurétique (urémie, artériosclérose, etc...).

Formes. — *Solution* 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.
Comprimés, 2 à 6 par jour.

et **CACHETS DE THÉOBROMOSE « N »**
(forme nouvelle).

Formule :

Théobrominate de lithium	0,25
Citrate de calcium	0,25
Citrate d'hexaméthylènetétramine	0,25
par cachet (1 à 3 par jour).	

Indications. — La *Théobromose « N »* permet d'obtenir, outre une action diurétique puissante, l'antisepsie du système réno-vésical et une désintoxication générale.
Enreg. au Lab. Nat. de Contr. des Médic. sous les nos 1-7, 1-5 et 1-13.

Laboratoires DUMESNIL
10, rue du Plâtre — PARIS (IV^e).

THÉOBRYL « ROCHE »

Composition. — Allylthéobromine injectable (0 g. 10 Théobryl Roche = 0 g. 50 théobromine).

Propriétés. — Prépare, supplée ou continue l'action de la digitale.

Indications. — Toutes les insuffisances cardiorénales, les cardiopathies artérielles, l'asystolie des vieillards, toutes les néphrites et surtout les néphrites hydropigènes, œdèmes viscéraux, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Voie injectable : Adultes* : 1/2 à 1 ampoule 2 à 4 fois par jour. *Enfants* : 1/4 ou 1/2 doses.

Voie buccale : Adultes : X gouttes 4 à 8 fois par jour. *Enfants* : V gouttes 2 à 4 fois par jour dans une tisane diurétique quelconque.

Ampoules de 2 cm³. (boîte de 6) ; gouttes (flacon de 40 cm³).

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les Nos 504-44 (ampoules), 504-45 (gouttes).

Produits F. Hoffmann-La Roche et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

THÉOCARDINE LALEUF

Composition. — Association : *Théobromine et Crino-cardine.*

Propriétés et Indications. — Diurétique puissant, déchlorurant de premier ordre. Action toni-cardiaque s'exerçant sur la contractilité du myocarde.

Toutes les indications de la *THÉOBROMINE*, en tenant compte toutefois que la *THÉOCARDINE LALEUF* agit mieux, plus vite, à doses beaucoup plus faibles, sans provoquer de phénomènes d'intolérance.

Remède de choix du *CARDIO-RÉNAL*.

Forme. — Dragées à noyau glutinisé.

Trois formules différentes : Simple, Digitalique, Sparteinée.

Posologie et mode d'emploi. — De 2 à 8 dragées par 24 heures (suivant avis du médecin traitant).

Durée moyenne des unités de vente : 15 jours.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 22 fr. 50.

Laboratoires LALEUF

Georges DUQUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

THÉOPHYLLINE BRUNEAU

Médication rénale, cardiaque et pulmonaire.

Théophylline pure solubilisée par un produit non caustique, non toxique et à dessein thérapeutiquement inactif.

L'absence de tout solvant à base d'amines ou de glycols assure à la *THEOPHYLLINE BRUNEAU* une tolérance parfaite ainsi bien par voie rectale ou buccale que par voie intraveineuse ou intramusculaire.

Indications :

Affections cardiaques et vasculaires : insuffisance cardiaque, asthme cardiaque, sclérose pulmonaire, oppression douloureuse des cardiaques.

Affections rénales : œdème cardiaque et rénal, oligurie des maladies infectieuses, tous les cas d'insuffisance du débit urinaire.

Affections pulmonaires : crises d'asthme, respiration de Cheynes-Stocke, paralysie respiratoire, dyspnée d'origine centrale.

Posologie :

Comprimés (0 gr. 10 de Théophylline pure par comprimé) : 1 ou 2 comprimés 3 à 4 fois par jour.

Suppositoires (0 gr. 35 de Théophylline pure par suppositoire) : 1 suppositoire tous les matins pendant 3 ou 4 jours et ensuite 1 suppositoire tous les 2 jours.

Ampoules (0 gr. 24 de Théophylline pure par ampoule) :

Voie intramusculaire : 1 ampoule pendant 3 jours et ensuite 1 ampoule tous les 2 jours.

Voie intraveineuse : 1 injection d'une ampoule que l'on peut, en cas d'urgence, renouveler dans la journée.

Les Laboratoires BRUNEAU et C^{ie}

Docteurs en pharmacie

17, rue de Berri. — PARIS (VIII^e)

THÉOPHYLLINE CARÉNA

La théophylline étant insoluble, les formes les plus employées sont :
 La Théophylline-éthylène-diamine, ou aminophylline (*Caréna*).
 La Théophylline calcique (*Caréna-Calcium*).

Propriétés thérapeutiques :

Antalgique cardiaque (angine de poitrine, infarctus du myocarde).
Diurétique sans toxicité (oliguries, œdèmes).
Eupnéique (dyspnées, asthme, Cheyne-Stokes).

La théophylline-éthylène-diamine est le plus puissant dilateur des artères coronaires (voir *Aminophylline* et *Caréna*).

Présentations :

Théophylline-éthylène-diamine :

Comprimés, gouttes, suppositoires (voir *Caréna*).

Ampoules intramusculaires et intraveineuses (voir *Caréna injectable*).

Théophylline calcique :

Comprimés, ampoules intraveineuses (voir *Caréna-Calcium*).

Associations :

Avec l'*Ouabaïne* (voir *Caréna-Ouabaïne*).

Avec la *Papavérine* (voir *Sédo-Caréna*).

Avec la *Trinitrine* (voir *Trinitrine Caréna*).

SOCIÉTÉ D'APPLICATIONS PHARMACODYNAMIQUES

39, Bd de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e) (Invalides 43-60.)

THÉOSALVOSE

Composition. — Cachets de Théobromine chimiquement pure, extraite du cacao.

Propriétés. — Diurétique d'une innocuité complète, d'un pouvoir remarquable, d'une fidélité constante.

Indications. — Artériosclérose, Affections cardiaques et rénales. Albuminurie, Intoxications, Urémie, Uricémie, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Hydropisie, Maladies infectieuses, Scarlatine.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cachets dosés à 0 gr. 50 ou 4 à 8 cachets dosés à 0 gr. 25 par jour.

Formes. — Théosalvose pure, digitalique, strophanthique, spartéinée, scillitique, barbiturique, caféinée, phosphatée, lithinée.

Prix : 16 fr. 50, 20 francs et 22 fr. 50.

Laboratoires André GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

THÉOSTÈNE SCILLITIQUE

Formule :

Théobromine chimiquement pure.....	0,30
Poudre de scille stabilisée.....	0,10
Extrait sec de jaborandi.....	0,02

Action. — Diurétique cardio-rénal à action renforcée, puissant et sûr
Agit quand la *Théobromine* se montre insuffisante.

Ne donne jamais de céphalées.

Indications. — Urémie, Uricémie, Artériosclérose, Albuminurie, Dyspnée cardiaque, Œdèmes, Goutte, Gravelle, Rhumatismes, Scarlatine et toutes les maladies infectieuses, Anurie toxémique, etc.

Posologie. — 2 à 3 cachets par 24 heures avant les repas.

THÉOSTHÈNE SIMPLE

Théobromine spéciale chimiquement pure, en cachets dosés à 0 gr.50.
Toutes les indications de la théobromine.

Posologie. — 2 à 4 cachets en 24 heures.

Laboratoires R. BERNARDO

47, avenue de la République, VILLENEUVE-LE-ROI (S.-et-O.).
(Tél. : 202.)

THÉOVERINE LALEUF

Composition. — Chaque dragée contient très exactement :

Théobromine pure	0,15
Papavérine chlorhydrate.....	0,01

Propriétés et indications. — Antispasmodique et hypotenseur remarquable. Grâce à son action vaso-régulatrice et dilatatrice, la THÉOVERINE rétablit une circulation normale et évite le retour des crises angineuses.

La THÉOVERINE présente une action favorable à l'augmentation de la Diurèse.

Spécialement indiquée dans :

Angine de poitrine (traitement symptomatique). — Artériosclérose. — Insuffisance aortique. — C'est le médicament par excellence des Cardio-Rénaux.

Forme. — Dragées.

Posologie et mode d'emploi. — De 3 à 6 dragées par jour suivant les indications du médecin traitant.

Maximum : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — 15 à 20 jours.

Prix de vente au public : Etui de 50 dragées : 20 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

THÉOXANTHINE

Association Théobromine crist. pure-Phosphate disodique
en comprimés *glutinisés*.

Le complexe Théobromine-Phosphate disodique constitue la forme de choix pour l'administration de la Théobromine. Mais la combinaison, assez instable, est en partie dissociée par l'acidité du suc gastrique. Pour obvier à cet inconvénient, nous avons préparé ce complexe sous forme de comprimés glutinisés. L'enrobage de gluten, se désagrégeant seulement dans le duodénum, libère le principe actif en milieu alcalin où l'association Théobromine-Phosphate disodique est beaucoup plus stable. On obtient ainsi, au cours de la traversée intestinale, une absorption lente et continue de la Théobromine solubilisée par le Phosphate disodique. Il en résulte une activité sensiblement accrue et une tolérance parfaite.

Composition : { Théobromine cristallisée pure 0 gr. 25
Phosphate disodique 0 gr. 10
Excipient Q. S. pour 1 comprimé glutinisé.
Flacon de 40 comprimés.

Indications. — Toutes celles de la Théobromine. Activité plus grande à dose moindre. Tolérance parfaite.

Posologie. — 2 à 8 comprimés par jour.

Échantillons et Littérature:

Laboratoires DEGLAUDE

15, bd Pasteur — PARIS (XV^e). (Tél. : Suffren 79-59.)

THÉRAMINE

Thérapeutique générale de l'Histamine

Première application par les « microdoses »

Traitements des états allergiques et des ulcères gastro-duodénaux.

Composition.

Soluté isotonique et de pH constant de bichlorhydrate d'histamine (B-imidazol-éthyl-amine).

Boîtes de 20 ampoules de 1 centicube comprenant 10 ampoules numérotées de 1 à 10, de concentration croissante (0 γ , 01 à 5 γ), et 10 ampoules (n° 11) contenant chacune 10 γ .

Contrôle rigoureux par un dosage double, biologique et colorimétrique.

Indications.

Désensibilisation spécifique des États allergiques : *Asthme, Urticaire, Œdème de Quincké, Migraines, Intolérances digestives d'origine hépatovésiculaire ou colique, etc.*

Traitement biochimique des Ulcères gastro-duodénaux agissant non seulement sur la *crise douloureuse*, mais vraisemblablement aussi sur la *maladie ulcéreuse* elle-même.

Posologie et mode d'emploi.

Injection sous-cutanée indolore tous les 2 jours suivant l'ordre numérique des ampoules. Délai de 4 à 12 semaines entre chaque série. L'effet thérapeutique apparaît habituellement entre la 8^e et la 12^e injection.

Médication atoxique : l'activité de la *Théramine* n'est pas le fait, en effet, d'une concentration élevée en produit chimique, mais elle est liée au pouvoir désensibilisant de doses toutes largement *infra-toxiques*, progressivement croissantes et calculées pour élever sans heurt le seuil de sensibilité allergique de l'organisme.

Posologie identique à tous les âges.

Aucune contre-indication.

Prix : 38 francs.

Laboratoires DEHAUSSY

50, rue Nationale — LILLE.

THIGÉNOL « ROCHE »

Solution aqueuse d'oléo-sulfonate de sodium, ni toxique, ni caustique, sans odeur désagréable et ne laissant pas de taches indélébiles sur le linge.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique, analgésique, kératoplastique, décongestionnant et puissamment résolutif.

Indications thérapeutiques. — Dermatologie, Oto-rhino-laryngologie, Ophtalmologie, Médecine générale, Erysipèle, Brûlures, Fissures, Rhumatismes, etc.

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100) en applications externes.

Toutes les affections gynécologiques :

Thigénol « Roche » pur ou en solution glycinée (10 à 15 p. 100).

Ovules « Roche » au *Thigénol*.

Tampol « Roche », pansement gynécologique idéal (Voir page spéciale).

Enregistrés au Lab. Nat. de Contrôle des Méd. sous les n^{os} 504-46 (*liquide*), 504-47 (*ovules*), 504-42 (*tampol*).

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e). — (Tél. : Archives 91-10.)

THI-LIP AGUETTANT

Pyrétothérapie.

Soufre en solution huileuse spécialement préparée.

Forme. — Ampoules injectables dosées à 1 p. 100 de soufre.

Propriétés. — Agent pyrétogène sans action nocive. Les injections sont immédiatement suivies d'une élévation de température. Celle-ci peut atteindre et dépasser 39° 5. La fièvre tombe dès qu'on interrompt les injections. Réactions douloureuses très faibles ou nulles.

L'amplitude du choc thermique varie largement avec les individus.

Tous les agents pyrétogènes sont soumis à cette relativité.

Les ampoules ne cristallisent pas à la température normale.

Emploi. — Injections intramusculaires profondes (dans la cuisse).

On injecte généralement une série de doses progressives allant jusqu'à 10 cc. à des intervalles de 3 à 6 jours. Mais cette règle doit être adaptée aux réactions et à l'état général du malade. On peut prolonger le traitement avec quelques injections de 10 cc.

On reprend le traitement après une interruption de plusieurs mois.

La boîte contient 10 ampoules de 1 à 10 cc.

Sur demande : boîte de 6 ampoules de 10 cc.

(Aux hôpitaux : prix et conditionnements spéciaux.)

Enregistré au Lab. Nat. Cont. des Médic. n^o 130-14.

Laboratoire N. AGUETTANT

36, quai Fulchiron — LYON. — (Tél. : Franklin 24-63.)

THIOBYL BOURCET

Composition. — Médication polyvalente (peptones, sulf. magn., hyp. de Na, extr. mou boldo, d'artichaut) enregistrée au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les Nos 754-3 et 754-4.

Indications. — Toutes les affections du foie et des voies biliaires.

Formes pharmaceutiques. — Granulé et dragées.

Mode d'administration du granulé. —

Adultes : 1 cuillerée à café le matin à jeun ou 1/2 cuillerée à café 1/2 heure avant les repas (syndr. hépato-vagotoniques). —

Enfants : 1/4 à 3/4 de cuillerée à café suivant l'âge.

Mode d'administration des dragées. —

Adultes : 4 dragées le matin à jeun ou 2 dragées avant les deux repas. — *Enfants* : 1 à 3 dragées suivant l'âge en une fois ou à dose fractionnée avant les repas.

Le flacon de granulés a une durée de 24 jours de traitement pour les adultes.

Le flacon de dragées a une durée de 14 jours de traitement pour les adultes.

Laboratoires du QUINA BOURCET

Échantillons :

7, avenue du Doyenné,
LYON-SAINT-JEAN.

Tél. 25-35.

THIOCITRAN THÉVENOT

Granulé soluble.

Citrates — Soufre — Magnésium — Peptone.

Composition. — Citrate de chaux, hyposulfite de magnésium, sulfate de magnésie, oxyde de magnésie, peptone et amidon soluble.

Propriétés. — Cholagogue et antianaphylactique, Régulateur des Fonctions gastro-intestinales, Dépuratif, Tonique.

Indications. — Affections du foie et des voies biliaires, Troubles digestifs, Constipation, anaphylaxie, dermatoses, urticaires, arthritisme.

Mode d'emploi. — 1 à 3 cuillerées à café par jour, soit à jeun le matin, soit 1/2 heure avant chaque repas. *Enfants* : 1/2 dose.

Prix de la boîte de 125 gr. : 18 francs.

Laboratoire THÉVENOT
DIJON.

THIOLCOL « ROCHE »

Dérivé du gaiacol, inodore, ni toxique, ni caustique, soluble dans l'eau.

1 g. de Thiocol « Roche » = 0 g. 52 de gaiacol cristallisé.

Doses et modes d'emploi :

SIROP « ROCHE » au Thiocol.

(1 cuill. à soupe = 1 g. Thiocol « Roche »)

Adultes : 2 à 4 cuill. à soupe par jour.

Enfants : 2 à 4 cuill. à café, selon l'âge.

CACHETS « ROCHE » de Thiocol.

(1 cachet = 0 g. 50 Thiocol « Roche »)

2 à 4 cachets par jour.

COMPRIMÉS « ROCHE » de Thiocol.

(1 comprimé = 0 g. 50 Thiocol « Roche »)

2 à 4 comprimés par jour.

Propriétés thérapeutiques :

Antiseptique pulmonaire, Phagocytogène, Eupeptique, Orexique.

Indications thérapeutiques :

Toutes les affections broncho-pulmonaires, Tuberculose, Bronchites aiguës et chroniques, Grippe, Pneumonie, Coqueluche, Scrofule, Anémie, Rachitisme, Dyspepsies, Entérites, Diarrhées, etc.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-50 (*poudre*), 504-51 (*sirop*), 504-48 (*cachets*), 504-49 (*comprimés*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

THIOCUTOL ROBIN

Composition : Principe actif : Disulfure de dibenzoyle, antiprurigineux local, cicatrisant, antiseptique.

Indications : Dermatoses en général, indications particulières suivant les formes.

Formes :

Adhésif : Solution chloroformique de caoutchouc à 10 % de disulfure : remplace le collodion dans toutes ses applications ; propre, bien toléré. Prurit cutané, Dermites prurigineuses, eczémas secs, séborrhéides, trichophyties ; Onychomycoses, Folliculites, Furoncles débutants, Acanthosis de la face et de la nuque ; Névrodermites, lésions cutanées des varices. Applications tous les 3 à 6 jours pour les lésions sèches et peu inflammatoires (pas sur les muqueuses).

Crème : Pommade crémeuse à 10 % de disulfure : lésions inflammatoires et suintantes, sycosis, intertrigos, prurit ano-vulvaire, épidermophyties inguinales ; onctions pendant quelques jours accompagnées ou non d'applications de poudre (une fine couche de crème et poudrage).

Poudre : Mélange de stéarates de zinc et de magnésie à 20 % de disulfure, en boîte poudreuse : Intertrigos, plaies de scarification, herpes génital, eczéma. Avec ou sans application d'adhésif ou de crème.

Trousse : Comprend les trois formes précédentes pour applications restreintes. Particulièrement pratique pour acné juvénile.

Prix : *Adhésif :* flacon, 16 francs ; *Crème :* tube, 16 francs ; *Poudre :* boîte, 14 francs ; *Trousse :* 18 francs.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — Paris. — (Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

THIODACAÏNE MIDY

Boîte de 4 ampoules injectables.

Composition :

Thiocarbamide	20 mmg. (42 % de soufre actif, soit 1 cgr.)
Iodazine M	100 mmg. (64 % d'iode libre, soit 6 cgr. 4)
Dunacaine	100 mmg.

Pour une ampoule de 20 cc.

Dose et mode d'emploi. — Série de 1 à 6 injections *locali*, une injection tous les 2 ou 3 jours.

Jamais d'accident de résorption.

Propriétés thérapeutiques. — Sédation immédiate et définitive de la douleur rhumatismale.

Indications. — Arthrites et péri-arthrites, Algies rhumatismales, Névrites, Lumbagos, Sciatiques, Algies cervico-brachiales, Névralgies intercostales, Coxarthrie, Talalgie, Lipo-arthrite sèche du genou.

Prix : 27 fr. 25. Durée du traitement : 10 à 20 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.

(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

THIODÉRAZINE MIDY

Ampoules et gouttes.

Composition. — Thiocarbamide (soufre organique), Iodazine M. (iode organique), Pipérazine.

Propriétés thérapeutiques. — Amélioration du terrain rhumatismal, Suppression de la douleur et de l'impotence.

Indications. — Rhumatisme chronique généralisé, Arthrites, Arthroses, Rhumatisme chronique localisé, Périarthrites, Coxarthrie, Rhumatisme vertébral, Spondylose rhyzomélisque ankylosante, Rhumatisme déformant des mains et des pieds. Toutes névrites et myalgies rhumatismales.

Mode d'emploi :

1° *Ampoules* : série de 8 à 15 injections tous les jours ou tous les deux jours, intramusculaires, sous-cutanées ou intraveineuses. Jamais d'accident de résorption.

2° *Gouttes* : XX à XXX gouttes deux fois par jour. La cure peut être poursuivie sans aucun inconvénient pendant plusieurs mois, avec une semaine d'interruption tous les mois.

Prix : Ampoules : 25 francs. Gouttes : 18 fr. 35.

Durée du traitement. — 10 à 20 jours.

Laboratoires MIDY

67, avenue de Wagram — PARIS.
(Tél. : Wagram 51-10 et 11.)

THIOFÈNE ROBIN

Composition. — Solution huileuse de *Thiofène* (C^4H^1S : 38 p. 100 de soufre).

Indications. — *Antiprurigineux* : Psoriasis et maladie de Duhring.

Analgésique : Complications arthropathiques du psoriasis. Douleurs concomitantes ou consécutives du zona. Douleurs articulaires du Rhumatisme chronique.

Formes. — Capsules à 0 gr. 05.

Ampoules de 1 cc. à 0 gr. 10.

Posologie. — Capsules : 4 à 6 par jour, pour les adultes.

Ampoules (injections intramusculaires) : 1 à 3 par jour ou tous les deux jours. 1, deux jours consécutifs au début du zona.

Prix. Boîte de 30 capsules : 31 fr. 85 ;
10 ampoules : 26 fr. 50.

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS. (Tél. : Odéon 08-55 et 38-75.)

THIO-GOUDRON

Composition. — Pâte de zinc alliée au soufre et au goudron de houille rigoureusement *purs*.

Antiprurigineux et décongestionnant.

Indications. — Eczémas torpides et chroniques, Dartres et dermatoses.

Emploi. — Étendre sans masser une couche mince sur les lésions, recouvrir sans serrer d'une seule épaisseur de toile usée ou de gaze. Pour le nettoyage, employer un coton imbibé d'huile de paraffine.

Prix : 11 fr. 50 le tube de 35 gr.

Laboratoires CEBE

J. CHOL, Pharmacien, ex-interne en pharmacie des hôpitaux de Lyon.

SAINT-JUST-SUR-LOIRE (Loire).

(Tél. : 18.)

Échantillons sur simple demande.

THIONAIODINE

(Comprimés glutinisés de)

Composition. — Complexe I-S-Mg associé aux sels de Lithine et à la Vitamine B₁.

Formule. — Chaque comprimé contient :

S ² O ³ Mg.....	0 gr. 20
NaI stabilisé Logeais....	0 gr. 04
Théobrominate de Lithine.	0 gr. 02
Benzoate de Lithine	0 gr. 02
Vitamine B ₁	45 U. I. = 0 mgr.15

Propriétés. — *Antialgiques* de l'iodure de sodium ; *Neuro-sédatives* de l'ion magnésium ; *Antinévritiques et antialgiques de la Vitamine B₁* ; *Antirhumatismales*, par le soufre labile de S²O³Mg et l'iode de NaI ; *Désensibilisantes*, antianaphylactiques, neurosédatives, stimulantes de l'activité hépatique par S²O³Mg ; *Uricolytiques* des sels de Lithine.

Indications :

- 1° *Toutes algies rhumatismales et rhumatismes chroniques* : cure d'entretien et de complément de la maladie rhumatismale chronique entre les séries de *Thionaiodine injectable*, préparatoire à la cure hydro-minérale (eaux sulfureuses) et complément de celle-ci, arthritisme, etc.
- 2° *Voies respiratoires* : pharyngites, bronchites chroniques, scléroses bronchiques, asthme, emphyseme, catarrhe naso-pharyngien, traitement préparatoire à une cure d'eaux thermales sulfureuses et son complément ;
- 3° *Insuffisance hépatique et maladies anaphylactisantes* : diarrhées post-prandiales, désintoxication par formation de sulfo-conjugués, toxémies d'origine intestinale, migraines récidivantes.
- 4° *Maladies de la nutrition*, et en particulier les troubles de la nutrition sulfurée, arthritisme, goutte, auto-intoxications etc.

Doses. — De 4 à 6 comprimés par jour aux repas.

Prix. — L'étui de 40 comprimés : 20 fr. 40.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle sous le n° 602-10

Laboratoires Jacques LOGEAIS
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

THIONAÏODINE LOGEAI'S injectable.

Pour le traitement de la *maladie rhumatismale chronique*, et plus particulièrement de la *douleur rhumatismale*.

Formule. — Complexe iode-soufre-magnésium, sous forme de combinaison en solution aqueuse de NaI Logeais et de S^4O^6Mg , à l'exclusion de tout autre analgésique et de tout stupéfiant.

1° *Thionaïodine A* intramusc. 2 % NaI et 1 % S^4O^6Mg .

2° *Thionaïodine B* intrav. 5 % NaI et 5 % S^4O^6Mg .

3° *Comprimés* (voir : *Thionaïodine comprimés glutinisés* de).

Formes :

<i>Thionaïodine A</i>	{ 6 ampoules de 5 cc	19 fr. 05
	{ 6 — 10 cc	27 fr. 50
<i>Thionaïodine B</i>	{ 6 ampoules de 10 cc	32 fr. 25
	{ 4 — 20 cc	27 fr. 50

Propriétés. — Grâce à ses trois principes actifs : anti-rhumatismal (S), antialgique (NaI) et neuro-sédatif (Mg), la *Thionaïodine* réalise la médication injectable la plus puissante de tous les syndromes douloureux aigus ou chroniques et spécialement de la douleur rhumatismale.

Tolérance parfaite. Atoxicité absolue.

La *Thionaïodine A* en injections intramusculaires lentes est parfaitement indolore et dénuée de réactions secondaires.

Indications. — *Rhumatisme chronique*, et plus particulièrement *douleur rhumatismale*.

Thionaïodine A : toutes douleurs rhumatismales, sciatiques, rhumatisme chronique, algies rhumatismales, arthrites et périarthrites douloureuses, etc.

Thionaïodine B : tous syndromes douloureux aigus ou chroniques, zonas, névrites, névralgies faciales, cervico-brachiales, intercostales, algies postencéphaliques, radiculalgies, etc.

Posologie :

Thionaïodine A : de 5 à 20 cc. par jour, dans une masse musculaire quelconque, jusqu'à sédation rapidement obtenue.

Thionaïodine B : de 10 à 40 cc. par jour, en intraveineuses très lentes. Peut être administrée aux enfants : demi-doses jusqu'à 10 ans ; deux tiers de doses de 10 à 15 ans.

Contre-indications. — Celles de l'iode chez certains bacillaires et celles des intraveineuses.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle :

Solution A : n° 602-5 ; Solution B : n° 602-6.

Laboratoires Jacques LOGEAI'S
ISSY-LES-MOULINEAUX — PARIS
(Tél. : Michelet 07-50 et 51.)

THIOPHÉOL « INAVA »

(Thiophène, Eucalyptol.)

*En solution huileuse injectable.***SANS DOULEUR NI RÉACTION****Indications :****RHUMATISMES CHRONIQUES**

Dermatoses, Parasitoses, Infections pulmonaires chroniques.

Mode d'emploi :

1 à 4 ampoules de 1 cc. à 10% de Thiophène chaque jour en injections intramusculaires.

EFFET RAPIDE, AUCUNE TOXICITÉ**Prix :** 25 fr. 50 (10 ampoules de 1 cc.).

Enregistré L. N. C. M. n° 760-22.

Laboratoire INAVA**E. GUIGNIER, Pharmacien.**

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

THIOPHYL**Composition.** — Association à la médication sulfureuse (H^2S) et à l'étain, antistaphylococciques, des équilibrants humoraux Ca, Mg, K, Na, du charbon activé et de la magnésie calcinée légère.**Avantages :** Disparition rapide de la douleur. Régression des phénomènes inflammatoires dès le 3^e jour.**Indications.** — Furunculose et toutes affections à staphylocoques, Anthrax, Acné, Folliculites.**Posologie et Mode d'emploi.** — Prendre entre les repas ;

3 fois une pilule le premier jour.

Augmenter d'une pilule par jour et par prise, jusqu'à 3 fois 3 pilules par jour du 6^e au 12^e jour.**Présentation et Prix.** — Le flacon de 100 pilules pour une cure complète : 23 fr. 35.**Laboratoires G. BEYTOUT**

12, boulevard Saint-Martin — PARIS.

(Tél. : Nord 76-85.)

THIOPON

Composé naturel soufré à caractère éthyléno-sulfinique. Catalyseur d'assimilation soufrée et générateur de glutathion.

Le S du Thiopon est un soufre naturel entièrement neutre non oxydé. Partie intégrante d'une molécule organique, il tire ses remarquables propriétés de l'extrême mobilité de sa molécule, mobilité due à la présence de nombreuses liaisons éthyléniques, ce qui lui confère le pouvoir de fixer son soufre pour ainsi dire à l'état naissant sans réaction ni choc sur la cellule vivante.

Aucune contre-indication. Aucune toxicité. Injections indolores et athermiques.

Indications. — **Rhumatismes** et douleurs rhumatoïdes. **Affections pulmonaires**, bronchites chroniques. **Affections des muqueuses : Gynécologie, O. R. L.** Traitement préparatoire et complémentaire des cures thermales sulfurées. **Dermatoses. Insuffisances hépatiques et surrénaliennes.** Adjuvant des traitements par les sels d'or, bismuth, mercure, arsenic. Intoxications diverses.

Présentation. Posologie.

Ampoules : Boîte de 6 ampoules de 2 cc. Chaque ampoule contient 48 mgr. de S sous forme d'huile soufrée naturelle éthyléno-sulfinique.

Prix : 30 fr. 50.

Injections intra-musculaires tous les 2 jours.

Pilules : Boîte de 50 pilules. Chaque pilule contient 3 mgr. 6 de S sous forme d'huile soufrée naturelle éthyléno-sulfinique.

Prix : 18 fr. 50.

Adultes : 2 à 6 par jour. — Enfants : 1 à 2 par jour.

Pommade : Tube de 32 à 35 gr. Chaque tube contient 11 gr. d'huile soufrée naturelle éthyléno-sulfinique.

Prix : 16 fr. 25.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n^{os} 672-2-3-4.

Laboratoire Emile ROUX

Ancien Interne, Lauréat des Hôpitaux de Paris,
26, rue des Petits-Champs — PARIS (II^e).
(Tél. : Richelieu 86-09.)

THIOSÉDAL BORNE

Composition. — Sirop et Comprimés.
1 cuillerée à café contient : Thiocol, 0,10 ctgr.;
Dionine, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.
1 comprimé contient : Thiocol, 0,10 ctgr.;
Dionine, 0,005 mmg.; Extrait Jusquiame,
0,01 ctgr.

Action pharmacologique. — Par le Thiocol antiseptique pulmonaire, par la Dionine sédatif puissant de toutes les Toux.

Indications. — Toutes affections broncho-pulmonaires, Toux nerveuses et d'irritation, Toux des cardiaques, Insomnies, spasmes, Tuberculose, bronchites chroniques, Asthme, Emphysème.

Avantages. — Sans accoutumance, sans constipation, sans intolérance gastrique.

Mode d'emploi :

Adultes. — Sirop : 3 fois 2 cuillerées à café par jour.

Comprimés : 3 fois 2 comprimés par jour.

Toux rebelles :

3 cuillerées à soupe par jour.

3 fois 3 comprimés par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour selon l'âge.

Présentation. — Sirop : flacon de 30 cuillerées à café : 17 fr. 35.

Comprimés : boîte de poche de 40 comprimés : 16 fr. 30.

Produits enregistrés au Laboratoire National de Contrôle.

Laboratoires M. BORNE, Pharmacien,
Fournisseurs des Hôpitaux et des Ministères
des Colonies et de la Marine.

79, rue de Paris — SAINT-DENIS (Seine).
(Tél. : Plaine 24-30.)

THIOSOTE LAMBIOTTE FRÈRES

Sirop concentré à base de sulfo-créosotate de potassium et de teintures de Lobélie et de Drosera.

Propriétés thérapeutiques. — Bactéricide, dynamogène, sclérogène, modificateur des échanges respiratoires.

Indications. — Affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi :

Adultes : 4 cuillerées à dessert par jour.

Enfants : A partir de 3 ans : (4 cuillerées à café par jour, à prendre de préférence comme édulcorant d'une boisson chaude (lait, tisane, etc.).

Nourrissons : XXV à L gouttes par jour selon l'âge par prise de V à X gouttes mélangées au lait.

Prix : 18 fr. 85.

Littérature et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS.

124, avenue Rogier — BRUXELLES.

THIOXYOL

Du Docteur P. BOURGGRAFF

Composition. — Sodium thioélaïdinosulfonate, Zincum Oxydatum calibré chimiquement pur 999 pour 1000 prix liquida depurata.

Propriétés. — Le *Thioxyol* pâte réductrice très active.

Indications. — Eczémas secs, squameux, jambiers pré ou post-ulcéreux. Eczémas. Psoriasis, parakératoses, prurit circonscrit avec lichénification, trychophytie.

Mode d'emploi. — Après détersion à l'éther, appliquer en couche très mince et ne laisser sur les lésions que 24 heures au maximum. Surveiller l'action.

Demander les brochures des Docteurs

P. et R. BOURGGRAFF :

Ulcères Variqueux et Eczémas pré et post-ulcéreux.

Littérature sur demande aux

Laboratoires du PRATIOIEN

HUSSIGNY-GODBRANGE (Meurthe-et-Moselle)

THORIX (THORIUM X RHEMDA)

En injections hebdomadaires intramusculaires indolores.

Ses indications. Sa posologie.

Rhumatisme sous toutes ses formes, Goutte, Sciatique, Spondylose Rhizomélisque : 10 piqûres consécutives à raison d'une par semaine, activité augmentant progressivement de 100 à 300 unités par 50 unités, ne pas dépasser l'activité 300.

Leucémie. Lymphadénie, Maladie de Hodgkin : 5 piqûres consécutives à raison d'une par semaine. 2 à 400, 1 à 450, 2 à 500 unités.

Prix suivant dosage.

Le THORIX (médicament à décroissance rapide) se prépare une fois par semaine.

Les ampoules sont livrées le mercredi à Paris et banlieue, et le jeudi en Province.

Il est donc indispensable de passer les commandes **le lundi au plus tard**.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous le n° 466-11.

Laboratoires RHEMDA

Fondés en 1914.

S. MOGAN, Pharmacien,

51, rue d'Alsace — COURBEVOIE (Seine).

Tél. : Wagram 58-89, Défense 18-41. — R. C. Seine 255-068 B.

THYMÉPHÉDRINE

Gouttes nasales à l'éphédrine.

Formule :

Ephédrine 0,01

Thymol..... 0,4

Gaïacol 0,05

Essence Niaouli 2

Excipient..... Q. S. pour 100 gr.

Indications. — Toutes les affections rhinopharyngées, rhume, grippe, rhume des foins, coqueluche.

Posologie. — IV à VIII gouttes dans chaque narine de 4 à 8 fois par jour. Aspirer fortement.

Prix : 16 francs.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).
(Tél. : Lon 04-61.)

THYRÉNINE GRÉMY

Principes actifs totaux de la glande thyroïde.
Produit rigoureusement dosé, toujours identique à lui-même ; conserve indéfiniment ses propriétés, renferme tous les principes actifs du corps thyroïde ; exclusivement thyroïdien, sans parathyroïdes.

Indications thérapeutiques. — Tous les cas d'insuffisance thyroïdienne, myxœdème de l'enfant, de l'adulte et post-opératoire, signes nerveux, respiratoires, cutanés, menstruels, etc.

Formes pharmaceutiques :

- 1° Pilules dosées à 2 cgr. de principes actifs. Correspondant à 0 gr. 20 de glande fraîche.
- 2° Tablettes pour enfants, dosées à un cgr. de principes actifs correspondant à 0 gr. 10 de glande fraîche.
- 3° Gouttes : X gouttes équivalent à 1 pilule, soit 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.
- 4° Ampoules : 1 cc. correspond à 0 gr. 20 de glande fraîche, ou 2 cgr. d'extrait.

Prix : 22 fr. 45. — Ampoules : 28 fr. 05.

Enregistré L. N. C., n° 608-45-46.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 48-43.)

THYROCRÉINE GRÉMY

Médication polyglandulaire thyro-ovarienne.

Principes actifs totaux purifiés et stabilisés des organes suivants pris à l'état frais :

Corps jaune de l'ovaire 0 gr. 20

Glande thyroïde 0 gr. 005 d'extrait.

2 à 6 pilules par jour pendant 20 jours.

Indications thérapeutiques. — Insuffisance ovarienne et insuffisance thyroïdienne associées. — Éveil des fonctions ovariennes au moment de la puberté. — Myxœdème fruste. — Basedow de la Ménopause. *Obésité* de la ménopause.

Rhumatisme chronique déformant de la ménopause.

Prix : 22 fr. 45.

Enregistré L. N. C., n° 608-47.

Laboratoires GRÉMY

14, rue de Clichy — PARIS.

(Tél. : Trinité 48-43.)

THYROÏDINE BOUTY

Composition. — Poudre de corps thyroïde desséché à froid sous vide profond. Cette poudre est standardisée et biologiquement contrôlée selon les conditions exigées par le Laboratoire national de Contrôle des médicaments qui procède, pour chaque lot numéroté, aux essais et titrage en iode tyroxinien.

Chaque produit porte le label du contrôle de son lot de poudre.

Indications. — Myxœdème, Crétinisme, Hypothyroïdisme, Incontinence d'urine. Certaines formes de somnolence pathologiques. Narcolepsie. Tous les cas où le métabolisme basal doit être activé. Obésité. Rhumatismes.

Œdèmes, Néphrites, Néphroses lipoidiques, Troubles de la circulation sanguine, Thrombose, Embolies, Engelures, Erythrocyanose.

Formes. — Dragées, Ampoules (hypodermie), Liqueur.

Posologie :

Adultes: de 1 à 3 dragées par jour (dosage d'une dragée = 0 gr. 10 de corps thyroïde desséché).

Enfants: prescrire la liqueur, dont une cuillerée à café contient 0 gr. 02 de corps thyroïde desséché.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

THYROXINE « ROCHE »

Thyroxine synthétique préparée suivant les données de Harington et Barger.

Ampoules (boîte de 6) : une ampoule de $1\text{ cm}^3 = 1$ milligr. de thyroxine.

Comprimés (flacon de 30) : un comprimé = $1/2$ milligr. de thyroxine.

Solution (flacon de 15 cm^3) : $1\text{ cm}^3 = 2$ milligr. de thyroxine.

Indications :

Obésité générale, Myxoedème, Goitre, Cachexie strumiprive, Troubles de la croissance et du développement, Oligurie.

Modes d'emploi et doses :

Voie buccale : 1 à 2 comprimés ou X à XV gouttes par jour et plus.

Voie intramusculaire : $1/2$ à 1 ampoule par jour et plus.

Les injections peuvent être aussi endoveineuses et même sous-cutanées, celles-ci déterminant une légère sensation de tension qui disparaît rapidement.

Enregistrés au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous les n^{os} 504-52 (*ampoules*), 504-53 (*comprimés*), 504-57 (*solution*).

Produits

F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 91-10.)

TIODINE COGNET

$C^2S\ N^2H^{12}I$

Propriétés. — Réalise l'Association *Iode-soufre*. par la Thiosinamine Iodée, combinaison organique soluble. Pas d'iodisme. Pas de contre-indications. **L'Anti-scléreux.**

Composition. — Combinaison cristallisée, soluble dans l'eau, de l'iode (47 %), avec la thiosinamine.

Indications. — Toutes celles de l'iode et du soufre ensemble ou séparément. **Toutes scléroses.** Hypertension. **Rhumatisme chronique.** Tabes, Scléroses médullaires, Asthme, Emphysème, Syphilis, etc.

Formes et posologie. — Pilules (Tiodine : 0 gr. 05 par pilule). *Adultes* : 3 à 6 par jour. *Enfants* : 1 à 2 par jour. Ampoules (Tiodine 0 gr. 20), 1 tous les 2 jours (voie intramusculaire, de préférence).

Prix au public: Pilules — Le flacon : 15 fr. 50.
Ampoules — La boîte : 17 francs.
16 jours de traitement environ.

Laboratoires des Produits COGNET

Armingeat et C^{ie}

43, rue de Saintonge — PARIS (ARC. 15-16).

LA TISANE ÉTHIOPIENNE

(Formule du D^r Audet.)

La plante totale. Le dépuratif vivant.

Composition. — *Triticum repens*, *Solanum dulcamara*, *Rhamnus frangula*, *Cichorium intybus* fol., *Saponaria officinalis*, *Cichorium alba* rad., *Betula alba*, *Glycyrrhiza glabra*, *Ribes nigrum*, *Equisetum arvense*, *Vitis vinifera*, *Uva-ursi*, *Cassia acutifolia*.

Propriétés. — Action décongestive, diurétique et laxative.

Indications. — S'adresse à tous les congestifs hépatiques et aux entéro-rénaux, aux rhumatisants chroniques, aux migraineux, à tous les ralentis de la nutrition.

Présentation. — Feuilles, écorces et racines, de récolte toujours récente, renfermées dans un sac intérieur qui en garantit la fraîcheur et la durée d'action et présentées en une boîte de carton luxe.

Mode d'emploi. — En infusion chaque soir au coucher :
1 cuillerée à soupe de plantes pour une tasse d'infusion.

Durée d'infusion de deux à dix minutes suivant effet à rechercher.
Tisane exclusivement réservée à la prescription médicale.

Laboratoire de la TISANE ÉTHIOPIENNE

32, rue de l'Alouette. — SAINT-MANDÉ (Seine).

TISANE HÉPATIQUE DAUSSE

Composition. — Combretum et Boldo, associés aux stomachiques végétaux.

Propriétés thérapeutiques. — Médication cholagogue, provoquant par drainage la désinfection des voies biliaires.

Indications. — Lithiase biliaire, cholécystites, congestion hépatique, ictère et tous accidents de l'hépatisme.

Mode d'emploi. — 1 à 2 tasses à café, le soir au moment de se coucher.

Laboratoires DAUSSE

4, rue Aubriot — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 63-40.)

TISANE HÉPATIQUE LAHAYE

Phytothérapie hépato-biliaire.

Composition et action :

Cholérétique, grâce à la présence de boldo, de romarin et de menthe.

Cholagogue, par l'adjonction de bourdaine en faible quantité.

Diurétique, par l'action bien connue de l'Uva-Ursi.

Sédative, grâce aux vertus d'une plante de l'Inde : L'Andropogon Schoenanthus.

Infusion très parfumée et agréable au goût. Chaque tasse d'infusion peut être additionnée de sucre ou de glycérine.

Indications. — Insuffisances hépatique et biliaire, Jaunisse, Lithiase biliaire, Fièvre bilieuse hématurique. Entéro-colite muco-membraneuse. Constipation opiniâtre. Migraines. Dermatoses par dyshépatie. Hypercholestérinémie. Rétentions azotées.

Doses et mode d'emploi. — 1 pincée de plantes pour une tasse d'infusion. 3 à 4 tasses par jour selon les cas.

La boîte : 7 fr. 25. La triple boîte cure : 15 fr. 85.

Laboratoire J.-B. LAHAYE

145, rue des Bourguignons — BOIS-COLOMBES.

TONIBIASÉ

Deux présentations :

ÉLIXIR (Adultes).

Composition. — Phosphore, Iode, Arsenic, Manganèse, Vin de Muscat.

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescence, Amaigrissement, Manque d'appétit, Tuberculose.

Posologie moyenne. — 1 cuillerée à soupe avant chacun des deux principaux repas.

La contenance du flacon *Elixir* est de 1/2 litre environ.

Prix public: 18 fr. 90.

SIROP (Enfants).

Composition. — Fer, Arsenic, Manganèse, Iode, Tanin, Phosphate et Glycéro-phosphate de chaux, Sirop à la Framboise.

Indications. — Manifestations du lymphatisme, Rachitisme et Scrofule.

Posologie. — Avant les trois repas :

Adultes et adolescents : 1 cuillerée à soupe.

Enfants : 1 cuillerée à dessert.

Flacon *Sirop* : 310 cc.

Prix public: 18 francs.

Tonibiase est enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1495.

Laboratoire de GUYENNE

Pharmacie MONSÉGU

PONT-DE-LA-MAYE (Gironde).

TONICARDINE GONNON

Composition :

	Par granule.
Adonidine	0 gr. 002
Convallamarine.....	0 gr. 02
Extrait de Strophantus ...	0 gr. 001
Extrait de Scille	0 gr. 004

Propriétés thérapeutiques.

Tonifie le muscle cardiaque et les artères, active la circulation sanguine et la diurèse sans élever la pression artérielle.

Indications :

Artério-sclérose, néphrites, hydropisies, angine de poitrine, myocardites infectieuses et toutes les cardiopathies asystoliques.

Avantages :

Dosage régulier. Effets thérapeutiques absolument certains et constants. Pas d'accumulation. Pas d'accoutumance. Ne provoque pas l'insomnie comme la caféine, ni la céphalée comme la théobromine.

Médicament de choix dans les intervalles du traitement digitalique et dans le cas où la digitale est nuisible et impuissante, lorsque le myocarde faiblit et que l'imperméabilité rénale augmente.

Posologie :

2, puis 3 ou 4 granules par jour loin des repas (pour 20 jours environ).

Prix public : 22 fr. 80.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON

(Tél. : Franklin 36-80.)

TONIKÉINE CHEVRETIN

Sérum neuro-tonique.

Ampoules contenant chacune :

Sulfate de strychnine.....	1 mgr.
Cacodylate de soude	0,05
Glycérophosph. soude (Codex 1908).....	0,20
Eau de mer diluée Q. S. P.	5 cc.

Propriétés thérapeutiques. — Possède les propriétés stimulantes de l'eau de mer, auxquelles s'ajoutent celles des autres éléments dont l'action tonique et reconstituante est bien connue.

Indications. — *Etats de dépression nerveuse et organique, Convalescences, Neurasthénie, Entérites, Tuberculose.*

6 ampoules de 5 cc. Prix : 15 francs.

12 ampoules de 5 cc. Prix : 24 francs.

Laboratoires L. LEMATTE et G. BOINOT

52, rue La Bruyère — PARIS (IX^e).

(Tél.: Trinité 44-31. Télégr. Chevrematte-90 — Paris.)

TONIMALT MONT BLANC

Caractéristiques et composition. — Le TONIMALT est un aliment tonique, stimulant et reconstituant, composé d'*extrait de malt, lait des Alpes, sucre blanc et miel, cacao pur, sels minéraux divers.*

Par contre, *il ne contient ni œufs, ni produits dérivés des œufs, dont la présence peut parfois provoquer des troubles digestifs, ou des intolérances. De ce fait et grâce au malt qu'il renferme, il est toujours parfaitement toléré, même par les hépatiques.*

Propriétés et avantages. — Les principales propriétés nutritives biologiques, diététiques, etc., ainsi que les avantages essentiels du TONIMALT sont : *une présentation commode, une conservation prolongée, une dissolution rapide et complète dans la plupart des liquides chauds ou froids; une saveur agréable, une valeur nutritive incomparable, une digestibilité remarquable, un pouvoir calorifique élevé correspondant à plus de 4 000 calories par kilogramme; une valeur biologique indiscutable.*

Principales indications. — Le TONIMALT MONT BLANC convient à tous les âges ; *aux enfants et aux adolescents, aux intellectuels et aux surmenés, et aux travailleurs manuels, aux jeunes mères, aux personnes âgées, fatiguées, aux malades, débilités.*

Mode d'emploi. — Le TONIMALT se consomme suivant le goût de chacun, au petit déjeuner, au goûter, ou à toute autre heure de la journée. Il s'absorbe soit pur, c'est-à-dire en paillettes, soit de préférence dilué dans un liquide chaud ou froid (lait, thé, café, etc.) dans lequel il se dissout instantanément. 2 à 3 cuillerées à café constituent une dose normale qu'il n'y a aucun inconvénient à augmenter si un régime de suralimentation est indiqué. *Sucre à volonté et éviter de faire bouillir.*

Vente. — Pharmacies, herboristeries et maisons d'alimentation.

Échantillons, littérature et prix sur demande.

Compagnie générale du LAIT, RUMILLY (Haute-Savoie).

TONI-PECTORAL ADRIAN

Bonbon pectoral et stimulant à base de chlorure de magnésium et parfumé à l'anis.

Présentation. — Pâte pectorale, forme boursier.

Indications thérapeutiques. — Produit béchique, calmant et antiseptique par l'action de ses constituants (réglisse, benzoate de soude, cachou, menthol, extrait thébaïque). Tonique général, grâce à l'action du chlorure de magnésium.

Posologie. — Chaque bonbon contient un dixième de milligramme d'extrait thébaïque et 1 centigramme de chlorure de magnésium. 20 bonbons en moyenne par 24 heures pour les adultes.

La boîte : 5 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. n° 523-31.

Société Française de Produits Pharmaceutiques

Anc^t ADRIAN et Cie

9 et 11, rue de la Perle — PARIS (III^e).

(Tél. : Archives 97-80, 81, 82.)

TONIQUE FAVROT

Élixir reconstituant.

Composition :

Teinture de noix vomique	0,15
Arrhénal.....	0,02
Nucléinate de soude	0,04
Glycéro soude	0,30
Phosphate de soude	0,10
Acide phosphorique	0,10
Excipient.....	Q. S. p. une cuillerée à soupe.

Propriétés et Indications. — Stimulant des échanges nutritifs. Faiblesse générale, anémie, débilité, surmenage, dépression nerveuse, etc.

Posologie. — Une cuillerée à soupe avant les 2 repas.

Échantillons et littérature.

Laboratoire Docteur M. FERRÉ

L. MOREAU, pharmacien.

6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TONIQUE GONNON

Aux Phosphoglycérates de soude, chaux et potasse.

Propriétés thérapeutiques. — Assimilation parfaite et certaine du phosphore, stimulant de l'appareil nerveux, il accélère la nutrition de tous les organes.

Indications. — Anémie, convalescence, neurasthénie, grossesse, médication infantile par excellence.

Forme et Posologie :

	<u>Prix public</u>	
	<u>Vin</u>	<u>Sirop</u>
<i>Vin et sirop</i> : 2 à 4 cuill. à soupe par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).....	16 fr. 20	16 fr. »
<i>Granulé</i> : 2 à 4 cuill. à café par jour (1 cuill. = 0 gr. 20 de phosphoglycérates associés).....		11 francs.
Demi-dose pour les enfants.		

Durée moyenne de l'unité de vente :

Vin : 8 jours. — Sirop : 6 jours. — Granulé : 12 jours.

Produits GONNON

J. et C. GONNON, Pharmaciens

14, rue Victor-Hugo — LYON. (Tél. : Franklin 36-80.)

TONIQUE NEDA

Composition :

Phosphore ..	{ Nucléinate de soude	0,03
	{ Glycérophosphate de soude..	0,20
Arsenic	Arséniate de soude.....	0,003
Strychnine .	Teinture de Noix vomique ..	0,30
Caféine	Teinture de kola	1
Catalyseur...	Sulfate de manganèse.....	0,02
Stomachique.	Elixir de Garus	1,50

Par cuillère à soupe.

Propriétés. — Tonique, Digestif.

Indications. — Asthénie, surmenage, convalescence, anémie, neurasthénie, inappétence.

Présentation. — Élixir en flacon de 400 cc. pour 15 jours de traitement : 20 francs.

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à soupe à chacun des deux principaux repas.

Laboratoires DANEY

134, cours de Verdun — BORDEAUX (Gironde).

(Tél. : 27-10.)

TONIQUE « ROCHE »

Composition. — Acide phosphorique, strychnine, kola, arsylène « Roche », manganèse.

Propriétés. — Reconstituant des forces physiques et stimulant de l'activité cérébrale. Redonne entrain, bonne humeur et optimisme.

Indications. — Prétuberculose, Anémies, Convalescences, Asthénie, Neurasthénie, Surmenage, Adénopathies, etc.

Posologie et modes d'emploi. — *Adultes* : 4 à 6 cuillerées à café par jour dans un liquide quelconque.

Enfants (de 8 à 15 ans) : 1/2 doses.

Flacon de 120 cm³.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N° 504-54.

Produits F. HOFFMANN-LA ROCHE et Cie

10, rue Crillon — PARIS (IV^e).

(Tél. : Arch. 91-10.)

TONIVEININE

Médication spécifique des affections veineuses.

Composition. — Association de *Sylbium marianum*, galbules de *Cupressus*, *Echinops viscosus*.

Avantages. — Effets stimulants sur les fibres lisses des veines, vaso-constricteurs et hémostatiques. Légère excitation de la sécrétion biliaire. Action générale sur la circulation veineuse.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Troubles de la puberté et de la ménopause.

Posologie. — XX à XLV gouttes matin et soir. X gouttes pendant la grossesse.

Dès que les symptômes pénibles sont amendés, le docteur prescrira les doses diminuées 20 jours par mois.

Prix : 12 fr. 75 le flacon de 30 cc. avec compte-gouttes.

Laboratoires BLANCHOT

15, avenue du Parc-Montsouris — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 03-09.)

Échantillons et littérature sur demande.

TONUDOL

Comprimés, granulé, injectable.

Nucléarsinate de manganèse associé aux hypophosphites de chaux et de fer.

Dose et mode d'emploi. — 2 comprimés, 1 mesure ou cuillerée à café de granulé avant chaque repas.

Injectable : 1 ampoule de 1 cc. tous les jours ou tous les 2 jours en injection intramusculaire profonde.

Indications. — Reconstituant de l'organisme indiqué dans les Surmenages, les Troubles de la Nutrition et de la Croissance, la Chlorose et l'Anémie.

Fortifie sans provoquer d'excitation.

Prix. Ampoules : 22 fr. 45. — Comprimés : 17 fr. 85.
Granulé : 17 fr. 85.

Laboratoires LIOARDY

38, boulevard Bourdon — NEUILLY-s-SEINE.
(Tél. : Maillot 17-75.)

TOPHISTA

(Histamine injectable)

Composition et caractéristiques : Solution à 1/4000 de Chlorhydrate d'Histamine, présentée en ampoules de 1 cc. contenant chacune un quart de milligramme de produit actif ; solution inaltérable, pratiquement indolore et sans adjonction d'aucun anesthésique local.

Indications : Toutes les manifestations douloureuses du rhumatisme chronique.

1° Les myalgies, lumbagos, torticollis.

2° Les manifestations douloureuses des arthrites sèches.

3° La goutte chronique.

4° Les séquelles douloureuses des traumatismes articulaires.

5° Les névralgies, sciatique, les séquelles douloureuses du zona.

6° Et enfin, d'une façon générale, toutes les douleurs vagues.

Contre-indications : 1° Les arthrites, les rhumatismes infectieux aigus ou subaigus.

2° Chez les sujets âgés, artérioscléreux, l'hypertension artérielle.

Résultats : Le plus souvent immédiats, après la première injection.

Dose et mode d'emploi : Injections intradermiques sur les points où la douleur est le plus vivement ressentie ; une ampoule le premier jour ; si la réaction vaso-motrice n'est pas intense, deux ampoules le deuxième jour. Continuer les jours suivants, sans jamais dépasser cette dose jusqu'à disparition complète des douleurs.

Présentation et prix : Boîte de 6 ampoules de 1 cc. avec une aiguille intradermique : 25 francs.

Laboratoires du TOPHOL

4, rue de la Liberté et 3, rue Condillac, à GRENOBLE.

TOPHOL

(C¹⁰H¹¹N²⁰.)

Acide phénylquinolique³ carbonique⁴.

Indications :

Toutes les manifestations douloureuses de la diathèse urique : Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Goutte, Gravelle, Arthrites fébriles et déformantes, Névralgies, Sciatique, Lumbago.

Posologie et mode d'emploi :

Présenté en cachets et comprimés dosés à 0 gr. 50. Suivant le cas, le TOPHOL se prend à la dose de 1 à 6 cachets ou comprimés par jour, dans de l'eau alcaline, aux repas.

Dès l'effet obtenu, diminuer progressivement la dose de 1 à 2 cachets ou comprimés par jour.

Echantillons et littérature sur demande aux

Laboratoires du TOPHOL

3, rue Condillac — GRENOBLE (Isère).

TOTAL MAGNÉSIEN

Composition. — Chlorure de magnésium déshydraté en association synergique avec les sels halogénés du magnésium.

Indications. — Asthénie, impuissance, sénilité, entérite, insuffisance hépatique, cholécystite, dermatoses, verrues, hypertrophie prostatique.

Présentation et prix :

Granulé : Un flacon de 60 grammes : 15 fr. 60.

Comprimés : Un flacon de 100 comprimés : 17 fr. 20.

Dragées : Un flacon de 100 dragées : 17 fr. 20.

Posologie :

Granulé : 2 cuillères-mesures par jour, diluées dans un peu de liquide.

Comprimés : 2 par jour.

Dragées : 4 par jour.

La cuillère-mesure jointe au flacon de TOTAL MAGNÉSIEN représente, pleine, environ 0 gr. 60.

Laboratoires du Total Magnésien.

24, boulevard Sébastopol — PARIS.

(Tél. : Turbigo 62-30, lignes groupées.)

TOTAL-TONIC

Le plus complet et le plus énergique
des Reconstituants.

Forme. — Élixir.

Action. — Immédiate sur les systèmes nerveux, osseux, musculaire, glandulaire et sur le plasma sanguin.

Indications. — Toutes défaillances de l'organisme, Amaigrissement, Asthénie, Anorexie, Anémies, convalescences, maladies de la nutrition, bronchites chroniques et prébacillose, neurasthénie, etc.

Composition. — Chaque cuiller à soupe contient :

Fer (citrate ammoniacal)	0,05
Manganèse (sulfate)	0,0375
Phosphate de soude	0,50
Acide phosphorique officinal	0,25
Méthylarsinate de soude	0,015
Extrait de quinquina.....	0,25
Teinture de noix vomique	0,25
Teinture de coca.....	1,25
Extrait fluide de kola	0,32

Le TOTAL-TONIC réalise une association nouvelle complète et moderne des éléments indispensables à l'organisme défaillant.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Une cuiller à soupe avant le repas de midi et du soir dans un peu d'eau, de vin ou de lait.

Adolescents (14 à 18 ans) : Une cuiller à dessert aux mêmes heures et de la même façon.

Enfants (au-dessus de 10 ans seulement) : Une cuiller à café dans un peu d'eau ou de lait avant le repas de midi et du soir pendant 12 jours ; arrêter 5 jours et terminer le flacon aux mêmes doses.

Prix : 18 fr. 20.

Laboratoires B. O. L.

M. BERGER

29, faubourg de Bourgogne — ORLÉANS.

Dépôt général : Office commercial pharmaceutique, 71, rue du Temple, PARIS (III^e) — et ses succursales.

TOT' COBRA

(Cobra total.)

Soluté colloïdal injectable de venin de cobra *non filtré*.

Indications. — *Traitement des algies en général* (néoplasiques, rhumatismales, sciatiques, trigéminales, radiculaires, etc.).

Action vaso-dilatatrice des capillaires (traitement de certaines affections vasculaires du fond de l'œil, de l'hypertension artérielle, de certains syndromes azotémiques et hyperpolypeptidémiques, de la migraine, de l'épilepsie, de l'éclampsie).

Action sur l'état général des cancéreux et des tuberculeux.

Mode d'emploi. — En injections dans les muscles du triceps brachial, à raison d'une ampoule tous les trois jours.

Prix : Boîte de 6 ampoules de 1 cc. : 26 francs.

— 12 — 1 cc. : 46 fr. 75.

Contenant chacune 1/10^e de mmg. de Venin, soit 1 unité souris.

Laboratoire R. GALLIER

1 bis, place du Président-Mithouard, PARIS (VII^e).
(Tél.: Suffren 46-57.)

TOT'HAMÉLIS

Composition. — Hamamélis administré en nature, avec la totalité des principes actifs de la plante *fraîche* stabilisée.

Propriétés thérapeutiques. — Médication de base de l'insuffisance veineuse. Tonique de la fibre lisse et modificateur de la viscosité sanguine.

Indications. — Stases veineuses, Varices, Hémorroïdes. États congestifs, Hypertension.

Posologie. — *Comprimés* : 6 par jour, aux repas. *Cachets* : 2 par jour, aux repas. *Suppositoires* (Hémorroïdes) : 1 à 2 par 24 heures.

Prix :

Comprimés, Cachets : 17 francs.
(pour 15 jours de traitement).

Suppositoires
(boîte de dix) : 17 francs.

INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).
(Tél. : Vaugirard 30-07.)

TOT'HARLEM

Forme et présentation. — Capsules de 0 gr. 20 d'huile de Haarlem vraie, pure, d'origine, associée au Boldo. Artichaut et Salicylate d'hexaméthylène-tétramine,

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique hépatique et urinaire. Décongestif, cholagogue et rénal, fluidifiant la bile et dissolvant les calculs.

Indications :

Foie : Lithiases biliaires, Ictères, Angiocholites, Angiocholécystites, Cholécystites, Colibacillooses (toutes affections du foie).

Reins : Lithiases rénales, Pyélonéphrites, Gravelle, Goutte, Uricémie, Colibacillurie (toutes affections rénales).

Posologie :

Affections aiguës : 2 à 4 capsules par jour.

Affections chroniques : 1 à 2 capsules au milieu des principaux repas.

Prix : 18 fr. 50.

Échantillons sur demande à :

Laboratoires SAPOREX

184, route de Genas — LYON (III^e).

TOT'HEMA

HÉMATOPOIÉTIQUE TOTAL.

Composition. — *Tot'Héma* renferme sous une forme assimilable la totalité des éléments nécessaires à la régénération sanguine, associés à un tonique de la cellule nerveuse, soit :

- 1° Acides aminés (histidine et tryptophane) obtenus par photoclastase d'un lysat globulaire désalbuminé (communication à l'Académie de médecine de Paris, 21 mai 1935) ;
- 2° Caséinates de fer, de cuivre, de manganèse (sels ionisables) ;
- 3° Inositohexaphosphate de chaux et magnésie.

Indications. — Toutes les anémies et déficiences organiques simultanées ou consécutives.

Présentation :

- 1° Granulé sucré agréable au goût.
- 2° Comprimés friables.

Mode d'emploi. — *Granulé* : Dose moyenne : 2 cuillerées à café par jour aux repas. Cette dose peut être augmentée sans inconvénient (hémorragies). Pour les jeunes enfants elle peut être ramenée à deux demi-cuillerées à café ; pour les nourrissons une demi-cuillerée à café dissoute dans un biberon.

Comprimés : Dose moyenne : 6 comprimés par jour.

Prix :

Granulé : (pour 12 jours de traitement : 23 r. 50.
Comprimés : 20 francs.

INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).
 (Tél. : Vaug. 30-07.)

TOT'HÉMA

Forme **COMPRIMÉS.**

(Présentation complémentaire.)

(Voir **TOT'HÉMA** granulé)

Composition :

Lysat globulaire photoclasé	0gr,10
Caséinate de fer	0gr,10
— de manganèse	0gr,005
— de cuivre	0gr,001
Inosito hexaphosphate de chaux et magnésie	0gr,10

(Pour un comprimé.)

Avantages. — Médication apportant à l'organisme, en proportions équilibrées, sous une forme pratique, la totalité des éléments nécessaires à la régénération sanguine : *histidine, tryptophane* (lysat globulaire) minéraux assimilables.

Conservation indéfinie sous tous les climats.

Indications. — Toutes les anémies, convalescences, surmenages.

Mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour, aux repas.

Prix : la boîte de 60 comprimés, 20 francs.

INNOTHÉRA

(Laboratoire CHANTEREAU)

26 bis, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

TOTI-PHOS

Ampoules buvables — Ne doivent pas être injectées.

Médication phosphorée à base de sels acidifiants ou Radicaux acides phosphotés (c'est-à-dire non saturés). Remplacent avantageusement l'acide phosphorique dont ils possèdent toutes les propriétés et aucun des inconvénients.

Principes actifs. — Phosphate di-acide de Calcium, Phosphate di-acide de magnésium, Phosphate di-acide de sodium, phosphate di-acide de lithium.

Le *Toti-Phos* ne contient aucun antistixateur du calcium (ni Fer, ni Manganèse).

Indications. — Reconstituant général, Fatigue, *Surmenage physique et intellectuel*, Convalescence, Décalcification, Anémies, Asthénies, *Colibacilloses*. Trouble provenant de la déminéralisation : grossesse, allaitement, dentition, *Troubles nerveux*. Etats dépressifs, Neurasthénie, Anxiété. *Etats arthritiques*, Rhumatismes avec décalcification, Tuberculose, Urticaire.

Le *Toti-Phos* est curatif et préventif.

Mode d'emploi. — Le *Toti-Phos* se présente en ampoules buvables de 5 cc. à prendre au milieu du repas avec un peu d'eau édulcorée par un sirop de fruit ou de vin blanc.

Dose. — *Adultes* : 2 à 4 ampoules par 24 heures, suivant avis du médecin. *Enfants* : 1 à 2 ampoules par 24 heures selon l'âge.

Prix : 21 fr. 50.

Enregistré au L. N. C. M. n° 403.45
Littérature sur demande.

Laboratoire du TOTI-PHOS
6, Rue Parrot — PARIS (XII^e)

TOT'OLEA

Thérapeutique Hypotensive et Diurétique.

Composition. — A base d'extrait total de feuilles fraîches d'olivier préparé à froid.

Indications. — Hypertension artérielle et ses manifestations habituelles. Troubles circulatoires de la ménopause et de la cinquantaine.

Posologie. — 4 comprimés par jour pris à raison de 2 le matin à jeun et 2 le soir en se couchant : prendre en même temps une grande tasse d'infusion chaude légère.

Éventuellement commencer par 6 comprimés par jour.

Aucune contre-indication.

Prix : Le flacon de 50 comprimés : 22 francs.

Laboratoires DERNIS

12, rue Lamartine — PARIS. (Tél. : Tru. 09-64.)

TRACHÉDRINE

GOUTTES

Composition. — Teintures antispasmodiques (gelsémium, drosera, ballote, thym, serpolet) associées à l'Orthotormiate d'Ethyle éphédriné et à la Cinnaméine du Baume du Perou.

L'avantage de cette préparation sur les similaires est dû en grande partie à son absence presque totale d'odeur et de saveur.

Indications thérapeutiques. — Toux spasmodique et quinteuse en général. Coqueluche. Grippe. Toux rebelles et nerveuses. Asthme, Toux émétisante, Toux laryngée, Médication symptomatique de l'adénopathie trachéo-bronchique.

Mode d'emploi. — A absorber loin des repas dans un liquide tiède, sucré de préférence : tisane bechique, eau, grog ou lait.

Adultes : XL à L gouttes à renouveler 3 fois le 1^{er} jour. — 4 fois le 3^e jour. — 5 fois à partir du 6^e jour.

Ne pas dépasser 6 fois par 24 heures.

Enfants : V gouttes de 1 à 2 ans. — VIII gouttes de 2 à 3 ans. — X gouttes de 3 à 5 ans.

XV gouttes de 5 à 7 ans. — XX gouttes de 8 à 10 ans.

A renouveler 3 fois par jour.

Augmenter ces doses de 11 gouttes par jour, jusqu'à doubler les doses initiales, comme doses maxima.

Prix : 17 fr. 10

Laboratoires de CINNAMATHÉRAPIE

C. ROUX, Docteur en Pharmacie

60, route de Châtillon — MALAKOFF (Seine). (Tél. : Alésia 12-55).

TRAITEMENT AMBULATOIRE du Praticien.

Indications. — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué sur les ulcères de jambes par le médecin. Au moment des périodes aiguës des affections suivantes : phlébites, septicémie veineuse, périphlébites ou ulcères trop infectés, il serait prudent de surseoir à l'application du traitement.

Propriétés. — L'application de cette méthode suivant les concepts de P. Bourggraff assure :

- 1° La reprise obligatoire de l'activité du malade dès l'institution du traitement ;
- 2° La suppression complète des douleurs dues à l'ulcère de jambe, et partant la disparition de l'insomnie ;
- 3° La guérison rapide de l'ulcère (dans la généralité en quelques semaines).

Présentation. — Le traitement ambulatoire du Praticien est présenté dans un coffret contenant :

- 1 flacon *Axyol* (Poudre noire) ;
- 1 pot grand modèle *Bioxyol* (pâte blanche) ;
- 1 pot grand modèle *Oxythyol* (pâte grise) ;
- 1 Bande du Praticien.

Prix du coffret : 130 fr. 45.

Avis important. — Chacun des éléments énoncés ci-dessus peut être prescrit séparément. Prière de se reporter aux textes correspondants.

Technique. — Le Traitement ambulatoire du Praticien doit être appliqué en suivant rigoureusement les instructions de la littérature publiée à ce sujet par les Laboratoires du Praticien.

Cette littérature est tenue par les Laboratoires à la disposition du Corps Médical, auquel elle est strictement réservée.

Les conditionnements ne contiennent aucun mode d'emploi.

Prière d'adresser les demandes, sur papier à en-tête, aux

**Laboratoires du Praticien,
HUSSIGNY-GODBRANCE (M.-et-M.).**

TRAITEMENT COMPLET NUTRIMENT

Le traitement normal comporte 6 ampoules *Hippohémo* encadrées par 4 ampoules *Hépatosuc*.

Les boîtes spéciales pour le traitement complet présentent les ampoules dans l'ordre où elles doivent être ingérées à la dose de 2 par jour pour les adultes dans un peu d'eau sucrée froide, une demi-heure avant les principaux repas. Pour les enfants, diminuer la dose de moitié.

Indications générales. — Anémies diverses et toutes déficiences organiques.

Indications spéciales :

- a) *Hippohémo*, asthénie, anorexie, convalescence, surmenage, suites opératoires, état hémorragiques, hémophilie, etc., cicatrisation des plaies et des brûlures (compresses locales). Rôle protecteur vis-à-vis des infections et des intoxications par action trophophylaxique.
- b) *Hépatosuc* stimulant de l'hématopoïèse dans les insuffisances hépatiques et spléniques, désensibilisation, désamination et amélioration de l'uro-poïèse, action antitoxique après divers traitements spécifiques et contre les états nerveux et les manifestations cutanées consécutives : eczéma, zona, purpura, etc.

NOTA. — Dans les cas nettement accusés ou suspects d'insuffisance hépatique, prescrire en outre une boîte de 6 ampoules *Hépatosuc* qui seront ingérées en alternance avec les 6 ampoules *Hippohémo*.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 1826-1 et 1826-2.

Prix de vente au public : La boîte de 10 ampoules de 10 cc. : 30 fr. 60.

NOTA. — Voir *Hippohémo* et *Hépatosuc*.

Laboratoire des NUTRIMENTS

34, rue Pigalle — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 18-18.)

TRANSITOL

Produit entièrement nouveau pour le traitement de toutes les constipations.

Composition :

Paraffines amorphes suraffinées et émulsionnables *in vivo* 70 gr.
Saccharure d'hespéridées.....Q. S. p. 100 —

Propriétés essentielles. — Viscosité inégalable (à l'Engler, 6° à 50°) supprimant tout suintement ou fuite anale.

Composition absolument neutre ($pH = 7 = pH$ intestinal.) Absence d'accoutumance. Réduction progressive des doses au cours du traitement. Pouvoir maximum de rééducation du transit intestinal. Absence de tout produit irritant.

Goût très agréable. Tolérance parfaite.

Toutes les Constipations, quel que soit leur mécanisme et quelles que soient leurs causes :

Entérite aiguë ou chronique, Appendicite, Sigmoïdite, Hémorroïdes, Interventions chirurgicales
Colite acide, Rectite, Obstacles mécaniques,
Colite muco-membraneuse, Grossesse (allaitement).

Toutes les fermentations et putréfactions intestinales et leurs conséquences, Tous les syndromes anaphylactiques d'origine intestinale.

Posologie :

Doses d'attaque. *Adultes* : 4 à 8 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Enfants : 2 à 6 cuillères à café par jour, pendant 3 à 5 jours.

Doses d'entretien. *Adultes* : 2 à 6 cuillerées à café, par jour.

Enfants : 2 à 4 cuillerées à café par jour.

Le pot de 200 grammes : 20 fr 65.

Enregistré au Lab. de Cont. des Médic. sous le n° 1812-1.

Laboratoires GRANGER

3, boulevard Jean-Jaurès — CLICHY (Seine).

(Tél. : Per. 22-74.)

TRAPHÉINE

Indications. — Puissant tonique : action rapide dans tous les cas de convalescence, anémies, prétéuberculose.

Forme. — Granulé fondant.

Composition. — Association synergique : Acide phosphorique-Ko'a caféinée avec catalyseur de chlorure de magnésium par milieu marin.

Posologie :

Adultes : deux fois par jour aux principaux repas, une cuillerée à soupe dans un verre d'eau ordinaire.

Enfants : deux cuillerées à café de la même façon, suivant avis du médecin.

Aucune des contre-indications habituelles chez les hépatiques.

Prix de la boîte pour un traitement d'une semaine : 16 fr. 50.

La TRAPHÉINE se vend également en comprimés, de même formule et de mêmes indications, au prix de 10 francs les 20 comprimés.

L. GUÉRET, Pharmacien

89, rue Martre — CLICHY (Seine).

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le n° 1248-2.

TRASENTINE

Chlorhydrate de l'ester diéthylamino-éthyllique
de l'acide diphenylacétique.

CIBA

ANTISPASMODIQUE D'ACTION NERVEUSE
ET MUSCULAIRE.

Puissant antispasmodique de synthèse, agissant par voie nerveuse et musculaire, possédant à la fois l'activité physiologique des alcaloïdes de la belladone (atropine) et de la papavérine sans aucun de leurs inconvénients (mydriase, tachycardie, sécheresse des muqueuses) et avec une toxicité très atténuée.

Traitement le plus efficace de tous les phénomènes algiques ou des troubles fonctionnels liés au spasme. Sans effets stupéfiants, ne déterminant pas d'accoutumance, la Trasentine peut être administrée aussi longtemps que persiste l'état douloureux ou dysfonctionnel.

Indications. — Tous états spasmodiques viscéraux.

Tube digestif : Spasme de l'œsophage, du pylore. Gastralgie, entéralgie, cœlialgie. Constipation spasmodique, ténésme rectal. Coliques hépatiques, vésiculalgie. Hoquet, cholécystite.

Voies respiratoires : Laryngospasme. Asthme bronchique. Toux spasmodique.

Voies urinaires : Spasme urétral et vésical. Colique néphrétique. Cystite.

Gynécologie, Obstétrique : Dysménorrhée. Hypertonie utérine. Spasme du col. Vomissements de la grossesse. Spasmes vasculaires. Spasmes infantiles. Affections neurologiques.

COMPRIMÉS — AMPOULES — SUPPOSITOIRES

Doses. — *Adultes.* — Voie buccale : 1 à 2 comp. 2 à 3 fois par jour. Voie sous-cutanée : une ampoule. Voie rectale : 1 à 2 suppositoires par jour.

Enfants. — 1/4 ou 1/2 dose de l'adulte suivant l'âge

Formuler. — Flacon de 20 comprimés.

Boîte de 5 ampoules.

— 5 suppositoires.

Laboratoires CIBA — O. ROLLAND

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON
(Tél. : Moncey 43-26.)

TRÉPALLIX

Composition. — Lactate de mercure en solution stabilisée par un procédé de laboratoire, associé à l'arséniate de soude.

Avantages. — Le lactate présente sur les autres sels d'hydrargyre les avantages suivants :

Ne s'accumule pas dans l'organisme ;

Est le moins toxique et, en particulier, le mieux toléré par le tube digestif ;

Est *anti-diarrhéique*.

Indications. — Syphilis acquise, ancienne : Traitement d'entretien et de consolidation.

Syphilis héréditaire : Médicament complémentaire.

Médication d'attaque dans la syphilis massive du nourrisson, dans la syphilis avec organopathies spéciales (hépatiques, nerveuses, oculaires), dans la syphilis larvée.

Gouttes Trépallix A pour adultes, adolescents, enfants jusqu'au poids de 10 kg.

Lactate correspondant à 0,529 de l'ion métal de P. A. 200.

Arséniate de soude : 0 gr. 10 pour 100 grammes.

Posologie « pro die ».

Lactate *pro die*. Arséniate de soude *pro die*

Ad. 25 à 50 gttes 1 ctg. à 2 ctg. 0,001 à 0,002

Adol. 20 à 40 — 8 mg. à 1 ctg. 6 0,0008 à 0,0016

Enf. 5 à 25 — 2 mg. à 1 ctg. 0,0002 à 0,001.

En deux ou trois prises dans un demi-verre d'eau sucrée ou non, aux repas.

Un flacon de *Trépallix A* contient 24 cc., correspondant à 0gr. 126 de métal et 0 gr. 024 d'arséniate de soude par flacon.

Gouttes Trépallix N pour nourrissons jusqu'au poids de 10 kg.

Lactate correspondant à 0,1058 de l'ion métal de P. A. 200.

Arséniate de soude : 0 gr. 01 pour 100 grammes.

Posologie. — II à V gouttes par kg. et par jour, en 2 ou 3 prises, dans un peu d'eau sucrée ou dans du lait.

Enfants de	en 2 ou 3 prises <i>pro die.</i>	Lactate Hh <i>pro die.</i>	Arséniate de soude <i>pro die.</i>
3 kg. à 3 kg. 250	8 à 15 gouttes	0 mg. 6 à 1 mg. 2	0,00003 à 0,00006
3 kg. 500	9 à 18 —	0 mg. 7 à 1 mg. 4	
4 kg. 250	10 à 22 —	0 mg. 8 à 1 mg. 8	
5 kg.	12 à 25 —	1 mg. à 2 mg.	
5 kg. 500	15 à 28 —	1 mg. 2 à 2 mg. 2	0,00006 à 0,00011
6 kg.	18 à 30 —	1 mg. 4 à 2 mg. 4	
7 kg.	20 à 35 —	1 mg. 6 à 2 mg. 8	
7 kg. 500	22 à 38 —	1 mg. 8 à 3 mg.	
8 kg.	25 à 40 —	2 mg. à 3 mg. 2	0,0001 à 0,00016
8 kg. 400	28 à 42 —	2 mg. 2 à 3 mg. 4	
8 kg. 700	30 à 44 —	2 mg. 4 à 3 mg. 5	
9 kg.	32 à 45 —	2 mg. 6 à 3 mg. 6	
9 kg. 500	34 à 47 —	2 mg. 8 à 3 mg. 8	
9 kg. 850	36 à 49 —	2 mg. 9 à 3 mg. 9	0,00014 à 0,00016

Un flacon de *Trépallix N* contient 24 cc., correspondant à 0 gr. 025 de métal et à 0 gr. 0024 d'arséniate de soude par flacon.

Prix. — 18 fr. 75 le flacon de 24 cc. de chaque préparation, ce qui équivaut à une dépense journalière maxima de :

0 fr. 45 à 1 fr. 50 pour les doses prescrites aux nourrissons.

0 fr. 75 pour la dose de XXV gouttes aux enfants.

1 fr. 20 pour la dose de XL gouttes aux adolescents.

1 fr. 50 pour la dose de L gouttes aux adultes.

SYNTHÉSIS — R.-L. MATHIVAT, Docteur en Pharmacie, Ex-interne des hôpitaux de Paris, 66, rue de la Pompe — PARIS (XVI^e).

Tél.: Trocadéro 30-52 et 32-91.

TRÉPARSOL

Acide formyl méta-amino para-oxy-phényl-arsinique.

Indications. — Syphilis, à tout âge et à toute période. Hérédosyphilis, Dysenterie amibienne, Protozooses intestinales, Diarrhée des tuberculeux, Entérocolites diverses (d'origine parasitaire ou infectieuse), Pian et toutes spirochètoses.

Présentation et Prix :

Tube de 30 comprimés pour Adultes : Prix : 26 francs.

— 15 — — : Prix : 16 francs.

— 40 comprimés pour Enfants : Prix : 16 francs.

— 60 comprimés pour Nourrissons : Prix 13 fr. 50.

Posologie et mode d'emploi :

Adultes : 1 à 4 comprimés par jour.

Enfants : 1 à 2 centigr. par jour et par kilog.

Traitement discontinu (3 à 4 jours consécutifs par semaine) et progressif (débuter par des doses faibles).

L. N. C. 463-1.

Laboratoires L. LECOQ et F. FERRAND

14, rue Aristide-Briand — LEVALLOIS-PERRET.

Dépôt :

Pharmacie générale LECOQ et FERRAND

54, Chaussée-d'Antin — PARIS.

TREPHONYL

Composition. — Foie foetal, Extraits embryonnaires, Sérum hémopoïétique.

Indications. — Constitue la médication de choix de toutes les anémies. Accélère la croissance et assure la régénération des tissus. Toutes les anémies, toutes les déficiences organiques, toutes les cachexies.

Formes :

1° Boîte de 6 flacons-ampoules de 10 cc.

2° Coffret de 18 flacons-ampoules de 10 cc.

3° Sirop, flacon de 300 gr.

Posologie. — *Adultes* : 1 ou 2 ampoules de 10 cc. par jour voie buccale.

Enfants : 1 ampoule par jour, voie buccale.

Sirop : 1 à 3 cuillerées à soupe par jour.

Prix : La boîte : 25 francs. Le coffret : 68 fr. 35.
Le flacon de sirop : 25 francs.

Laboratoires du Dr ROUSSEL

97, rue de Vaugirard — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 68-22, 23 et 24.)

TRÉPOSITOIRES

Suppositoires à base de Tréposan

(Succinate de bismuth).

Indications. — Syphilis, Tabes, Paralysie générale, Parasitose intestinale, Oxyures.

Composition. — *Adultes* : 0 gr. 20 de succinate de bismuth par suppositoire.

Enfants : 0 gr. 10 de succinate de bismuth par suppositoire.

Nourrissons : 0 gr. 05 de succinate de bismuth par suppositoire.

Posologie. — *Infections spécifiques* : 3 trépositoires par semaine, le soir au coucher.

Parasitose intestinale : 1 trépositoire le soir pendant 10 jours consécutifs, repos de 5 jours, puis nouvelle série de 10.

Prix : les trépositoires sont présentés en boîte de 10.

Adultes : 15 francs.

Enfants : 13 francs.

Nourrissons : 11 francs.

Laboratoires MARONNEAU-MOREL

43 et 45, rue des Fauvelles — COURBEVOIE (Seine).

TRICALCINE

A base de sels calciques rendus assimilables, phosphates tribasiques, carbonates et autres sels de chaux et magnésie nécessaires à l'organisme.

Propriétés thérapeutiques. — Recalcification de l'organisme (Formule et théorie de Ferrier-Sergent).

Indications. — Tuberculoses pulmonaire, osseuse, péritonite tuberculeuse, Rachitisme, Lymphatisme, Scrofulose, Grossesse, Allaitement, Troubles de la dentition, Fractures.

Doses et mode d'emploi. — Tricalcine pure.

Adultes :

Poudre : 1 cuiller-mesure.

Cachets : 1 cachet.

Comprimés : 1 comprimé.

Granulés : 2 cuillers-mesures.

Tablettes chocolat : 2 tablettes.

Tricalcine adrénalinée : 1 cachet.

— méthylarsinée : 1 cachet.

— fluorée : 1 cachet.

Tricalcine Irradiée : 1 cachet ou
1 cuillerée à café de granulés.

Avant
ou
pendant
chacun
des trois
repas.

Tricalcine injectable : 1 ampoule par jour, pendant 12 jours.

Tricalcine Opothérapique (1) 2 drag. ou 2 cuillers à café de granulés aux 3 repas.

Enfants : moitié de ces doses.

Prix au public : poudre, granulés, cachets, chocolat : comprimés : de 14 à 17 fr. 25; Méthylarsinée, adrénalinée, florée et opothérapique : 18 fr. 75.

Irradiée : 22 fr. 75. Injectable (12 amp.) : 20 fr. 50.

Pour traitement de 3 semaines à 1 mois.

(1) *La formule de la Tricalcine opothérapique a été établie d'après les travaux les plus récents des auteurs français et étrangers sur le métabolisme du calcium. Cette formule d'association pluriglandulaire est composée des meilleurs fixants endocriniens du calcium : Association Parathyroïdes, Surrénales, Thymus, Foie, Rate, Moelle osseuse.*

Laboratoire des Produits SCIENTIA

Dr E. PERRAUDIN, pharmacien

21, rue Chaptal — PARIS.

(Tél : Trinité 29-29.)

TRIDYNOL

Composition. — Cinnamate de soude, Collargol, Acide nucléinique.

Indications. — Traitement des tuberculoses, Médication spécifique des états infectieux (Salpingites, Entérites, Suppurations, Cachexie).

Leucopoiétique puissant.

Propriétés. — Augmentation des globules blancs, surtout des lymphocytes. Les cires bacillaires sont dissoutes par les lipases des globules blancs ; les bacilles, s'agglutinant, diminuent et souvent disparaissent après 6 à 10 mois. La diathermie transpulmonaire, selon nos techniques, active l'action du *Tridynol*.

Tous les avantages des sels d'or sans aucun de leurs inconvénients.

Posologie. — 5 dragées par jour à doses fractionnées à 8 h., 10 h., 12 h., 3 h., 7 h., sans s'occuper des repas.

Combiné aux rayons ultra-violets, le *Tridynol* à doses réduites est très efficace dans les états cachectiques et infectieux des enfants.

Laboratoires JOURNET

18 et 20, rue Vavin — PARIS (VI^e).

(Tél. Danton : 70-07.)

TRIGLANDINE

Composition. — Thyroïde, hypophyse, ovaire (glandes totales desséchées sous vide profond à basse température).

Indications. — Par l'administration de ces trois glandes nobles, rétablit l'équilibre d'ensemble du système endocrinien.

Asthénies endocriniennes féminines. — Puberté, stérilité, troubles de l'appareil génital, hypertension de la ménopause et des dysendocriens, rhumatismes endocriniens, troubles de la circulation.

Aménorrhée, olygoménorrhée, ménorrhagies.

Formes. — Dragées, Ampoules de 1 cc. et 3 cc.

Posologie. — 1 à 3 dragées (ou 1 ampoule de 1 cc. ou 3 cc.) par jour, pendant 10 jours par mois environ.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

TRIGOSTHÈNE

(Cachets bleus apéritifs et analeptiques.)

Composition. — Association intime de Trigonelle Fenugrec, Rhubarbe et Gentiane, stabilisée au fluorure de Na et catalysée au sulfate de protoxyde de Manganèse (*procédé Angla*).

Propriétés. — Toni-reconstituant de valeur. Convoyeur d'oxygène et fixateur des graisses. Stimulant des fonctions nutritives *permis même aux hépatiques*. Ne constipe jamais.

Indications. — Débilisations de toute étiologie. Anémie, Anorexie, Amaigrissement, Etats pulmonaires chroniques, Lymphatisme, Grossesse et Allaitement, Convalescences, Suite d'affections coloniales, etc.

Posologie :

2-3 cachets et plus par jour aux repas.

Boîte de 30 cachets.

Littérature et échantillons à volonté :

Produits Spécialisés « Angla » — Monte-Carlo,
« La Barbiflore en thérapeutique. »

TRINIBAÏNE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine à 1/100..... II gouttes (3 cgr.).

Ouabaine cristallisée 1/10 de milligr.

Propriétés et Indications. — Remède de la défaillance du ventricule gauche. La *Trinibaïne* réalise à la fois la médication d'urgence et la médication d'entretien. C'est le remède d'urgence par excellence de l'angine de poitrine de décubitus et de l'œdème pulmonaire aigu.

Forme. — Dragées rouges à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

Prix. — L'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement) : 21 fr. 30.

S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e)

Tél. : Trocadéro 62-24.

TRINITRAL LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :
 Trinitrine au centième..... II gouttes (3 cgr.).
 Phényléthylmalonylurée 0,01
 Extrait apocynum cannabinum..... 0,003

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur à action immédiate.
 Sédatif puissant des algies cardiothoraciques et des spasmes vasculaires.

Diurétique et cardiotonique.

Médicament de choix des angoisses précordiales, des crises douloureuses d'origine aortique ou cardiaque, des troubles fonctionnels de l'hypertension, de l'aérophagie.

Forme. — Dragées jaunes à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées au moment ou en prévision de la crise.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, 1 à 3 fois par jour.

Prix : 21 fr. 30 l'étui de 60 dragées (de 20 à 60 jours de traitement).
 S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, Docteur en Pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Trocadéro 62-24.)

TRINITRINE CAFÉINÉE DUBOIS

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... II gouttes (3 centigr.).

Caféine..... 2 centigrammes.

Propriétés et indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Médicament de choix de l'Angine de Poitrine, l'Asthme cardiaque, l'Œdème pulmonaire.

Forme. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et par là même une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées (à quelques minutes d'intervalle), au moment des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente. — De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Prix de vente au public :

Étui de 60 dragées : 17 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e).

(Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE-CARÉNA

Composition { Trinitrine au centième..... 11 gouttes.
Aminophylline 5 cgr.

Propriétés :

La *trinitrine* est vaso-dilatatrice et hypotensive ; elle agit rapidement, mais assez *brèvement*.

Caréna augmente le débit coronarien et assure l'irrigation *persistante* du myocarde.

Trinitrine-Caréna associe donc l'action instantanée de la trinitrine à l'activité synergique, mais plus prolongée et toni-cardiaque de *Caréna*. Elle *calme* les algies cardiaques et *prévient* la grande insuffisance ventriculaire gauche.

Indications : Crises intenses d'angine de poitrine, crises algiques des cardiaques ayant des signes de défaillance du myocarde, petits spasmes artériels, extrasystoles et palpitations.

Posologie et mode d'emploi :

Trinitrine-Caréna est présentée sous forme de dragées à noyau mou, permettant l'absorption per-linguale instantanée de la *trinitrine* et son action immédiate.

Médication d'urgence : croquer 1, 2 ou 3 dragées, à quelques minutes d'intervalle, au moment de l'accès ou à titre préventif. Ne pas dépasser 10 dragées par jour.

Médication d'entretien : avaler 1 dragée, deux ou trois fois par jour.

Société d'Applications Pharmacodynamiques.

39, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).

(Invalides 43-60 et 43-61.

TRINITRINE-PAPAVÉRINE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à :

Trinitrine au centième..... 11 gouttes (3 centigr.).
Chte Papavérine 5 milligrammes.

Propriétés et indications. — Association synergique hypotensive et analgésique, à diffusion instantanée et action immédiate, ne provoquant aucun phénomène réactionnel.

Spécialement indiquée dans : Angine de Poitrine, Asthme cardiaque et pulmonaire, Aortites, Artérites, Urémie.

Forme. — Dragées roses à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — Ces dragées doivent être croquées : leur noyau mou facilite leur absorption rapide et permet d'obtenir la diffusion instantanée des principes actifs et, par là même, une action immédiate.

Croquer une, deux ou trois dragées à quelques minutes d'intervalle au moment ou en prévision des accès.

Dose maxima : 10 dragées par 24 heures.

Durée moyenne des unités de vente : De 15 à 60 jours. (S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.)

Prix de vente au public : Étui de 60 dragées : 22 francs.

Laboratoires LALEUF

Georges DUGUÉ, docteur en pharmacie.

51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Trocadéro : 62-24.)

TRINITRINE ROUSSEL

Composition :

Comprimés n^{os} I, II, III correspondant à I, II ou III gouttes de la solution au 1/100^e.

Indications :

Hypertension : Crises douloureuses des aortiques, angine de poitrine, asthme cardiaque.

Doses et mode d'emploi :

Au moment des crises, laisser fondre sur la langue un comprimé. (Deux à 6 par 24 heures.)

Prix : 9 fr. 50-9 fr. 50-10 fr. 50.

Pharmacie ROUSSEL

10, rue Washington — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Élysées 62-27.)

TRINITRINE SIMPLE LALEUF

Composition. — Chaque dragée est rigoureusement dosée à : Trinitrine à 1/100 : 1 gtte. (1 mgr.5).

Propriétés et Indications. — Vaso-dilatateur puissant à diffusion instantanée. Médicament de choix de l'angine de poitrine.

Forme. — Dragées blanches à noyau mou.

Posologie et mode d'emploi. — La *Trinitrine Simple Laleuf* se recommande par son faible dosage (une goutte par dragée) chez les *sujets très sensibles* à la trinitrine.

Médication d'urgence : Croquer une, deux ou trois dragées au moment ou en prévision des crises.

Maximum : 20 dragées par 24 heures.

Médication d'entretien : Avaler une dragée, une à trois fois par jour, aux repas.

Prix : 12 fr. 80 l'étui de 60 dragées (de 15 à 60 jours de traitement). S'en tenir scrupuleusement aux doses prescrites par le médecin traitant.

Laboratoires LALEUF

Georges DUQUÉ, docteur en pharmacie.
51, rue Nicolo — PARIS (XVI^e). (Tél. : Troc. 62-24).

TRINIVÉRINE

Angine de Poitrine.

Forme. — Dragées vertes à noyau mou.

Composition. — Trinitrine (Vasodilatateur), Chlorhydrate de papavérine (antispasmodique), Caféine (toni-cardiaque, vaso-dilatateur des coronaires).

Indications. — Angine de poitrine, Cardialgie des aortiques, des hypertendus, Crises vasculaires, Angio-spasmes des artérites, de l'hypertension (éclipses), Asthme cardiaque.

Mode d'emploi. — Croquer une dragée pour prévenir ou calmer l'accès. Si nécessaire, croquer 2 ou 3 dragées à quelques minutes d'intervalle. Ne pas dépasser 10 dragées par 24 heures.

Prix : 20 fr. 40.

Émile MONAL

Docteur en Pharmacie

13, avenue de Ségur — PARIS (VII^e).

(Tél. : Invalides 52-73.

TRIOL

Gouttes.

Composition :

Codéine	1 gr.
Solution officinale de Bromoforme	24 —
Teinture aconit	12 —
— belladone	12 —
— drosera	12 —
— grindelia	12 —
— lobélil	12 —
Eau laurier-cerise	12 —
Benzoate de soude	3 —
pour 100 grammes	

Indications. — Maladies des voies respiratoires, rhumes, bronchites, grippe, toux persistantes, asthme, laryngites, pharyngites.

Posologie.

Adultes: XXV gouttes 4 à 6 fois par jour.

Enfants : 2 à 4 ans : X gouttes 3 fois par jour ;

4 à 10 ans : XV gouttes 3 fois par jour ;

10 à 16 ans : XX gouttes 3 fois par jour.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1593-1.

Laboratoires ROUSSEAU

SENS (Yonne).

TRIRADOL

Association d'iode organique, de menthol, de camphre et d'éléments radioactifs.

Indications. — Adénopathies cervicales et trachéo-bronchiques. Affections pulmonaires chroniques. Toute tuberculose pulmonaire et pleurale à évolution lente et à lésion limitée. Toute tuberculose chirurgicale.

Contre-indications. — Tuberculose évolutive rapide, néphrite, insuffisance hépatique, etc.

Posologie. — 1 ampoule ou 2 à 6 capsules par jour pendant 15 jours par mois.

Boîte de 10 ampoules : 24 francs.

Flacon de 60 capsules : 24 francs.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

TRISALYL

Indications. — Traitement de la maladie rhumatismale. Rhumatisme articulaire aigu et toutes ses complications.

Composition. — Salicylates chimiquement purs de sodium, potassium et calcium, associés dans les proportions physiologiques du sérum de Ringer-Loocke.

Propriétés. — Le Trisalyl réalise l'association salicylée isoionique au sang, permettant l'emploi massif, continu, sans contre-indications ni intolérance, du Salicylate.

Formes:

Voie buccale : Solution dosée à 1 gr. 50 par cuillerée à soupe (250 cc.).

Comprimés glutinisés à 0 gr. 50.

Voie veineuse : Ampoules I. V.

8 ampoules 10 cc..... 0 gr. 50 par ampoule.

8 — 10 —..... 1 gr. — —

4 — 20 —..... 2 gr. — —

Posologie:

Voie buccale : à partir de 3 cuillerées à soupe, monter à 6 cuillerées pro die. Pour les comprimés de 4 à 16 en 24 heures.

Voie veineuse : d'abord 0 gr. 50, puis 1 gr., puis 1 gr. 50 par injection intraveineuse : 2 injections par 24 heures.

Traitement d'entretien. — Moitié des doses ci-dessus ; au bout d'un certain temps, n'employer que la voie buccale.

TRAITEMENT EXTERNE ADJUVANT BAUME TRISALYL

Composition. — Salicylate de glycol, Salicylate d'ammonium, Salicylate d'antipyrine, excipient *non gras*.

Indications. — Traitement externe des rhumatismes, lumbagos, douleurs, etc...

Propriétés. — Association d'un éther salicylique, absolument non irritant, au salicylate d'analgésine, calmant et antipyrétique. Absorption favorisée par salicylate d'ammonium. Excipient *non gras*. S'enlève à l'eau.

Mode d'emploi. — Onctions douces 2 fois par jour, *in loco dolenti*.

J. OLIVE, Pharmacien

14, rue des Minimes — PARIS (III^e).
(Tél. : Archives 03-94.)

TRISEPTINE

Granulé de charbon animal uroforminé, citraté, pepto-magnésie, de goût très agréable.

Admise dans les Hôpitaux. Adoptée par les Ministères de la Marine et des Colonies après expérimentation.

Propriétés Thérapeutiques. — Excellent antiseptique des voies digestives, biliaires et urinaires, cholérétique et cholagogue. absorbant des gaz et des toxines, désensibilisant, diurétique, prévient la formation des calculs biliaires.

Originalité. — Produit d'une innocuité parfaite assurant, en même temps, l'évacuation des canaux biliaires et la désinfection des voies digestives, biliaires et urinaires. Contient une forte proportion de citrate de soude, lequel agit très heureusement sur le foie et les voies digestives, fait passer le sulfate de magnésie à l'état de citrate non irritant pour l'intestin, se transforme en carbonate dans l'organisme et, avec les benzoates de soude et de lithine, fluidifie la bile et les sécrétions, facilite la solution biliaire du cholestérol et modifie le pH biliaire dans le sens de l'alcalinité, ce qui aide à la stérilisation du milieu.

Indications. — Infections des voies digestives, biliaires et urinaires. Auto-intoxication et auto-infection intestinales avec leurs conséquences (cholécystite, colibacillose, lithiase biliaire, entérite, cystites, furunculose, etc...) Séquelles fonctionnelles de la cholécystectomie.

Posologie habituelle :

Adultes : 1 à 4 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge. Une heure environ avant les repas ou le matin à jeun et le soir en se couchant. Croquer et boire un peu d'eau aussitôt après ou délayer dans un peu d'eau.

Tube de 80 gr. de granulé (10 jours env. de traitement). Prix : 17 fr. 75.

Enregl. tré au L. N. C. sous le n° 699-1.

Laboratoires G. LAMBERT, O. ✱, Docteur en Pharmacie
rue de la Paix — VICHY (Allier). (Tél. : 48-54).

TROPHOCALCINE

Traitement et cicatrisation des plaies.

Utilisation du pouvoir eutrophique des sels insolubles de calcium à l'état naissant.

Traitement véritablement spécifique des plaies dont on veut activer ou déterminer la cicatrisation : **brûlures, gelures, plaies atones, (ulcéreuses et cancéreuses), ulcères de toute nature, particulièrement variqueux, escarres, radio-dermites, radionécroses.**

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

TRYNOL

(Comprimés.)

Forme pharmaceutique et composition. — Comprimés à base de silicate de soude, sels sodiques décholestérinisants, Gui, Parenchyme hépatique et thyroïdien. (Boîte de 50 comprimés.)

Propriétés et avantages. — Abaissant la tension artérielle, dissolvant la cholestérine et décalcifiant les parois artérielles, il tend à rendre de la souplesse aux artères, en empêchant les formations scléreuses.

Indications. — Artériosclérose, Athérome, Vertiges, Troubles circulatoires, etc.

Mode d'emploi. — 6 comprimés par jour le matin à jeun ou 3 à midi et 3 le soir, de préférence avec une infusion rafraîchissante.

Prescription. — 1 boîte comprimés Trynol.

Inscrit au Laboratoire de Contrôle.

Les Laboratoires A. FALVY

Licencié ès sciences,

Ex-interne, lauréat des Hôpitaux de Paris.

40, rue des Acacias — PARIS (XVII^e). Tél. : Etoile 18-26.

TRYPSINAN-RADIOACTIF

Vitaminé B.

Forme. — Pilules toluisées dosées à 0 gr. 40.

Présentation. — En étui aluminium de 60 pilules au prix de 32 francs.

Composition. — Sel complexe : chlorures (ammonium, magnésium, calcium, manganèse suractivé par uranyle) en milieu phosphaté, Extrait levure (Codex 37), Extrait eucalyptus globulus, Poudres végétales.

Indications. — Tous les troubles de la nutrition. Le diabète sous toutes ses formes et ses complications. (Aucune contre-indication.)

Posologie. — Deux pilules au repas de midi et du soir, avec une infusion de feuille de noyer, par périodes de 15 jours.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1884-2.

Ne se délivre que sur ordonnance (tableau A, codex 37).

Échantillons et littérature au

Laboratoire MONGE-LAVENIR

90, cours Gambetta — LYON.

TUBERCULINES DE L'INSTITUT MÉRIEUX

Cuti-réaction. — Depuis plus de trente ans, l'Institut Mérieux fournit aux hôpitaux de Lyon la Tuberculine nécessaire pour la cuti-réaction classique de Von Pirquet.

Percuti-réaction. — Après quatre années d'expérimentation, l'Institut Mérieux délivre une Néotuberculine spéciale pour percuti-réaction.

Plusieurs communications ont démontré que la percuti-réaction effectuée avec ce réactif donnait des résultats aussi sûrs que la cuti-réaction et était d'un emploi beaucoup plus pratique.

La percuti-réaction s'effectue sur la région sternale, après décapage préalable de la peau à l'éther. A l'aide d'une goutte de Néotuberculine concentrée, il suffit de frictionner la peau pendant une vingtaine de secondes. Les réactions positives se manifestent dans les quarante-huit heures qui suivent l'application par une éruption caractéristique, alors que les réactions négatives n'amènent aucun changement dans l'aspect de la peau.

Institut biologique MÉRIEUX
17, rue Bourgelat — LYON.

TUBÉROL

TUBÉROL (pur)

Forme. — Liquide.

Composition. — Association complexe d'Essences balsamiques pures.

Indications. — Toutes affections des poumons, broncho-pneumonies, bronchites purulentes, coqueluche, tuberculose, etc.

Mode d'emploi. — En enveloppements thoraciques : avec gaze hydrophile imbibée et en inhalations.

Prix : le flacon, 28 fr. 25 et 17 fr. 85.

TUBÉROL (onguent).

Composition. — Tubérol + Excipient adhésif.

Indications. — Fin de broncho-pneumonie, bronchite légère, coqueluche, engorgements ganglionnaires.

Mode d'emploi. — En onctions de la poitrine ou des ganglions. Recouvrir de papier brouillard.

Prix : 14 fr. 60.

TUBÉROL (Oléo).

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — Tubérol + Huile stérilisée.

Indications. — Affections naso-pharyngées, oreillons, coqueluche, grippe, rhumes, etc.

Mode d'emploi. — En pulvérisations et instillations nasales. Badigeonnage dans oreillons, coqueluche, scarlatine.

Prix : 14 fr. 60.

TUBÉROL (injectable).

Forme. — Ampoules.

Composition. — Tubérol + Benzoate de Benzyl + Huile d'Olive stérilisée éthéro-camphrée.

Indications. — Complément intensif du Tubérol dans bronchites fétides, pneumonies, coqueluche, tuberculose.

Mode d'emploi. — 1 à 6 amp. par jour suivant gravité.

Prix { ampoules de 5 cc. : 31 fr. 25 ; la 1/2 boîte : 17 fr. 25
ampoules de 2 cc. : 26 fr. 80 ; la 1/2 boîte : 15 fr. 65

TUBÉROL (Sirop).

Composition. — Tubérol + véhicule.

Indications. — Antiseptique des voies respiratoires.
Calme la toux.

Mode d'emploi. — Adultes : 3 à 4 cuil. à soupe par jour.

Enfants : 3 à 4 cuillerées à café.

Prix : 18 fr. 50.

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).

(Tél. : Marcadet 04-02.)

TUBES BLACHE

**Toutes formules en pommades pour
l'Ophtalmologie.**

Liste des principales préparations :

Analgo-Contractine, Argovyl, Aristol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Zinc, Compositol, Contractine, Hydrargyre composé, Hydrocupréine (Optochine), Ichto-zinc, Iodoforme, Iodure alcalino-calcique, Mydriatine, Nitrate d'argent, Ophtalmo-Chrome, Organo-Bismuth, Oxyde Hg, Phocéol, Précipité blanc.

Tubes CHAUVIN

**Toutes formules en pommades
pour la Dermatologie et la Rhinologie.**

Etablissements Alfred CHAUVIN

(Laboratoire des Tubes Blache)

AUBENAS (Ardèche).

TUBES DU D^r GUIRAUD

**Ex-Pharmacien des Hôpitaux de Bordeaux
(Anciennement tubes DAVIEL).**

POMMADES OPHTALMIQUES

munis d'une canule spéciale permettant l'introduction directe de la pommade dans l'œil.

TOUTES FORMULES

Spécialement recommandées : Pommades à l'aristol, à l'oxyde jaune orangé et à l'atropine. Obtenues par dissolution préalable de la substance active et évaporation du solvant, ce qui assure un état de division extrême et une puissance d'action considérable.

Prix : 9 et 10 francs.

Échantillons sur demande.

Laboratoire SPES GUIRAUD

10, impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

TUBES DULCIS POMMADES ASEPTIQUES

Argolène 1, 5 et 10 p. 100 : Bactéricide, conjonctivites aiguës.

Aristol 1 et 2 p. 100 : Antiseptique.

Asepto-Bismuth 5 p. 100 : Bactéricide puissant, non irritant, inodore.

Atropine 0,50 et 1 p. 100 : Mydriatique.

Bleu de Méthylène 0,50 et 1 p. 100 : Colorant aseptisant, indolore.

Cadmiol-Zino 1 p. 100 : Conjonctivites à diplobacilles.

Calomel 5 p. 100 : Antiseptique, résorbant.

Cuprinol 1, 2 et 5 p. 100 : Conjonctivites chroniques.

Diodéine 2 p. 100 : Lymphagogue, analgésique profond.

Eserine Sulfate 0,50 p. 100 : Myotique.

Ichtyol-Zino : Blépharites.

Iodo-Calcoique : Cataracte.

Iodoforme 1, 2 et 3 p. 100 : Antiseptique.

Kilogan : Antiseptique non irritant.

Mercurobrome : Antiseptique colorant.

Mercurioforme 1 %, 2 %, 3 % et 5 % (pseudonyme d'oxyde orangé).

Myosine faible : Myotique.

Myosine forte : Myotique puissant.

Mydriasine : Mydriatique énergique.

Novoptine : Ulcères à pneumocoques.

Oxyde Orangé de Mercure 1, 2, 3, 4 et 5 p. 100 : Antiseptique résorbant.

Ophtalmoforme 1, 2 et 3 p. 100 : Antipurulent.

Pilocarpine 1,2 p. 100 : Myotique.

Polyvaccin-Antivirus Dulois : Immunisent les cellules en contact et stérilisent le foyer infecté, sans réaction locale ni générale. Pommade Type Ophtalmo et Type Oto-Rhino.

Ampoules de 2 cc. Type Ophtalmo et type Oto-Rhino.

Précipité blanc 1, 2, 5 p. 100 : Antiseptique résorbant.

Sédargol (collyres ampoules) : 2 %, 5 % et 10 %. Toutes les infections.

Sédoléine (Brûlures des paupières et de la conjonctive).

Thiosinamine 1 p. 100 : Opacités de la cornée.

Vitamine A : Avitaminoses.

Xéroforme 5 p. 100 : Antipurulent.

**Laboratoire du Docteur FERRY
MONTE-CARLO**

TUBES FERLUX RATIO

Une gamme thérapeutique complète et rationnelle

Ils s'appliquent à 95 p. 100 des cas de l'ophtalmologie...

Tous les pharmaciens en sont approvisionnés,
vos ordonnances seront exécutées sans délai.

Une thérapeutique ophtalmologique en 7 formules :

Aseptiforme	Optochin, Bromo-phénate de bismuth, Aristol	Antiseptique Polyvalent: infections banales et à pneumocoques
Hydrargyl	Oxyde jaune et orangé Calomel	Kératites justiciables des sels de mercure
Bléphargyl	Oxyde de zinc, Oxyde jaune Ichtyol, Thigénol, Résorcine, etc.	Blépharites et Conjonctivites
Halo calcine	Iodure de sodium Chlorure de Calcium	Cataractes en évolution
Tracholéol	Huile de chaulmoogra Sels de cuivre	Trachome
Mydriatique Ferlux	Atropine, Scopolamine Duboisine	Mydriatique puissant et sûr
Myotique Ferlux	Pilocarpine-Esérine Adrénaline	Myotique

N. B. — Il existe également des Tubes Ferlux classiques à base de tous les médicaments utilisés en ophtalmologie.

Docteur G. BOUSQUET
à Albi — TARN

TUBES STRANA

Pommades ophtalmiques en tube breveté.

Toutes formules à partir de 11 fr. 45.

Liste des Préparations — Antipneumo, Argyrol, Bleu de Méthylène, Cadmio-Laro-Zinc, Calomel, Chlorhydrate d'Ethylmorphine, Eserine, Ichtyol, Ichtyol-Zinc, Iode-Calcium, Mydriatique puissant, Myotique puissant, Noviforme prov. Heyden, Oxyde jaune de mercure, Oxyde de zinc, Calmocaïne, Pilocarpine, Précipité blanc, Rouge écarlate, Sulfo-cuivre, Sulfo-laro-zinc, Tanargine, Xéroforme.

Laboratoires SALANTALE
STRASBOURG.

TULLE GRAS LUMIÈRE

Pansement indolore de toutes plaies
(des plus bénignes aux plus graves).

Double la vitesse de cicatrisation.

Il peut être prescrit aux accidentés du travail.

Constitution. — Carrés de tulle imprégnés d'une composition grasse à base de baume du Pérou, qui lui communique des propriétés désodorisantes, kératoplastiques (activation considérable de la cicatrisation).

Propriétés. — Évite l'adhérence des pièces de pansement aux plaies. Se détache aisément sans provoquer de douleur ni d'hémorragie, évite l'arrachement des bourgeons, respecte leur tissu fragile et supprime totalement la douleur du décollement des compresses, douleur souvent intolérable chez les amputés ou les grands brûlés, par exemple.

Le Tulle gras Lumière permet d'abréger la durée de la cicatrisation dans des limites très importantes.

Présentation. — Le Tulle gras Lumière est présenté en carrés de dimensions fixes :

0m07 × 0m09.	Boîte de 10 compresses.
0m10 × 0m10.	— 10 —
0m10 × 0m10.	— 20 —
0m10 × 0m10.	— 30 —
0m22 × 0m22.	— 30 —

Ces carrés de tulle que l'on applique directement sur les plaies sont superposés dans une boîte métallique, séparés les uns des autres par des carrés de papier. Le tout est ensuite stérilisé à l'autoclave à 120°.

Mode d'emploi — Placer un carré de Tulle gras sur la plaie, appliquer par-dessus le pansement stérilisé.

LABORATOIRES LUMIÈRE — 45, rue Villon — LYON.

TULLE GRAS NEMAUSA

(Boîtes brevetées NEMAUTAL)

Forme. — Le Tulle gras Nemausa est constitué par un tissu de coton à mailles de 2 millimètres, imprégné à saturation d'un mélange gras renfermant 1 p. 100 de Baume du Pérou et d'essences balsamiques.

Présentation. — Ce tulle est découpé en carrés de 10 centimètres, enfermés isolément dans un sachet Nemausa breveté et stérilisé à 120°.

Les boîtes contiennent 10, 20 ou 30 carrés.

Propriétés thérapeutiques. — Supprime l'adhérence du pansement avec la plaie, permet le dégagement des sécrétions purulentes ou humorales, abrége la durée de cicatrisation.

Mode d'emploi. — Ouvrir la boîte pour saisir un sachet.

Le décacheter et écarter le papier de protection pour appliquer le tulle sur la plaie sans avoir à le toucher avec les doigts.

Indications. — Pansement cicatrisant indolore pour le traitement rapide des plaies, brûlures, ulcères, gercures, crevasses, herpès, etc.

Laboratoires de LA FABRIQUE INTERNATIONALE D'OBJETS DE PANSEMENT

5, Grande-Rue — MONTPELLIER.

(Tél. : 54-93.)

TULLE GRAS RUBY STÉRILISÉ

Pansement gras au **Faume du Pérou**, remboursable au **Tarif interministériel**.

Constitution. — Compresses 4 épaisseurs à lisières imprégnées d'un excipient gras à base de lanoline, huile d'olive, paraffine, baume du Pérou, essence de Niaouli.

Indications. — Cicatrisation rapide des plaies et plus spécialement des brûlures par pansements stériles indolores, sans adhérence.

Mode d'emploi. — Placer une compresse sur la plaie désinfectée; recouvrir avec un pansement stérile et un bandage, de préférence en crêpe.

Présentation. — En boîte fer-blanc, enveloppé cellophane, contenant :

Tarif interministériel.

5 compresses	7 cm. 5 × 7 cm. 5 .	
10 —	10 × 10 cm.	18 francs.
20 —	10 × 10 —	25 —
30 —	10 × 10 —	31 —
20 —	15 × 15 —	"
30 —	20 × 20 —	"

Laboratoires de Pansements RUBY
M. PACCARD, Docteur en pharmacie,
VOIRON-EN-CHARTREUSE (Isère).

TULLE ROSE BESLIER

Pansement gras.

Constitué par un carré de 13 × 13 imprégné d'un mélange plastique à base de Microcidine, Baume du Pérou, Huile essentielle de Verveine, Thym, Niaouli. Pélargonium.

Le **Tulle Rose Beslier** est un cicatrisant énergique : il permet le renouvellement indolore des pansements sans arrachements des bourgeons charnus, sans hémorragies.

Il assure des cicatrices souples, sur les brûlures, plaies par vésication, ulcères variqueux, plaies atones, plaies infectées, phlegmons, abcès, etc...

Le **Tulle Rose Beslier** est livré en boîtes de 10 carrés de 13 × 13.

Prix : 12 francs la boîte.

L. N. C. 508.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.). (Tél. : 45.)

TYMPANYL MAY**Otites Catarrhales, Otagies.****Composition :**

Novocaïne.....	1	gramme.
Diméthylamino-analgésine.....	4	grammes.
Alcool éthylique pur	16	—
Glycérine anhydre chim. pure	79	—
(En association <i>anhydre</i>).		

Indications. — Affections inflammatoires et congestives de l'*oreille moyenne* et de l'*oreille externe* : Otites catarrhales et congestives, Otagies ; Furoncles du conduit.

Mode d'action. — Analgésique, antiseptique, décongestif par osmose per-tympanique.

Non toxique. Non caustique.

Mode d'emploi. — V à X gouttes en instillation dans l'*oreille malade* ; à renouveler toutes les heures ou deux heures.

Prix : Le flacon 15 cc. : 14 fr. 75.

Laboratoires P. MAY, Pharmacien.

Lauréat de la Faculté de Paris.

215, boulevard Voltaire — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roq. 41-51.)

UCLARSYL

Novarsénobenzol Codex, voie intraveineuse.

Rigoureusement pur, instantanément soluble. Maximum de tolérance.

Poudre d'un jaune très clair, en ampoules scellées sous vide.

Syphilis à toutes les périodes. Traitement d'attaque et d'entretien.

Doses unitaires de 15 à 90 cgr. par fractions successives de 15 cgr.

Prix au public, suivant doses, de 3 fr. 05 à 12 fr. 20.

USINES CHIMIQUES DES LABORATOIRES FRANÇAIS

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

Dép^{re} : Laboratoire et Pharmacie A. MILLET

5, rue Ambroise-Thomas — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 20-20.)

ULCÉOPLAQUE - ULCÉOBANDE

Pansement de marche.

Cicatrisation certaine des *Plaies aux jambes*, des *escarres*, des *plaies atones* et des *Ulcères variqueux*, même anciens et trophonévrotiques, sans interrompre ni le travail ni la marche.

Pansement souple et spongieux préparé avec des poudres aseptiques émulsionnées. C'est un merveilleux générateur de la cellule, un stimulant de sa vitalité. **Résultats surprenants.**

Boîte de 6 pansements pour 20 ou 24 jours.

Deux dimensions { Ulcéoplaque n° 1 5/6 centim.
 { Ulcéoplaque n° 2 7/9 centim.

Formuler : Une boîte Ulcéoplaque n° 1 ou n° 2.

Prix : 27 ou 40 francs.

1 Ulcéobande. Prix : 35 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 371-1.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04:

ULCÉOSINE

Poudre soluble.

Sulfo-citrate de soude et pipérazine formino-arsénio-lithiné.

Action antitoxique et hypotensive.

Indications. — Artério-sclérose, Hypertension artérielle, Varices, Congestions variqueuses et phlébitiques, Plaies atoniques, Ulcères variqueux, Rhumatisme chronique, Troubles hépatiques, Hyperglycémie, Diabète.

Une cuillerée à café par jour dans un verre d'eau chaude ou froide, pendant 15 jours consécutifs.

Enregistré au L. N. C. n° 371-2. Prix : 13 francs.

ULCÉOBALNÉINE

Poudre spéciale pour bains de jambe antivariqueux.

Alcalino-Sodique-Silicatée.

Par leur action sédative sur l'élément nerveux, les bains à l'Ulcéobalnéine :

Calment les douleurs variqueuses. Arrêtent l'évolution des varices et en diminuent le volume. Font résorber l'œdème et l'empâttement. Guérissent les congestions variqueuses et périphlébitiques.

Un bain de jambe de 30 minutes à 36° tous les jours pendant 24 jours.

La boîte pour 4 bains de jambe. Prix : 9 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 371-5.

LABORATOIRE SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS. (Tél. : Roq. 1904.)

ULCÉOSOL-POMMADE

Oxyde et peroxyde de zinc, acide orthobenzoïque, sulfate de cuivre, excipient spécial.

Guérison rapide de l'Eczéma variqueux sec, Irritation de la peau, Prurigo.

Prix : 11 fr. Enregistré au L. N. C. n° 371-4.

ULCÉOSOL-POUDRE

Acide orthobenzoïque, magistère de bismuth, oxyde et peroxyde de zinc, acide boracique.

Poudre siccatrice, guérit rapidement l'eczéma variqueux suintant, les excoriations eczémateuses superficielles.

Prix : 11 fr. Enregistré au L. N. C. n° 371-3.

Laboratoire SÉVIGNÉ

76, rue des Rondeaux — PARIS (XX^e).

Tél. : Roquette 19-04.

ULCÉRINE BERGER

Spécifique des Ulcères Variqueux.

Composition. — Pommade stérilisée aux principes actifs suivants : populine, salicine, pectine, acide benzoïque, acide gallique, associés à certaines huiles volatiles nouvellement introduites en thérapeutique (*Thymus vulg.* et *Calendula off.*), dont les propriétés bactéricides et cicatrisantes sont remarquables.

Propriétés. — Décongestionnant. Suppression de la douleur et du prurit. Cicatrisation rapide de l'ulcération par *bourgeonnement*. Evite l'adhérence des pansements aux plaies et assure des cicatrices souples.

Indications. — *Ulcères variqueux*, même les plus rebelles.

Eczémas variqueux, secs et suintants.

Toutes les plaies atones : Radiodermites, Ulcérations chroniques, Brûlures anciennes, engelures, escarres, plaies diabétiques et par vésication, etc.

Mode d'emploi. — Nettoyer la plaie avec de l'éther ou de l'eau oxygénée diluée. Appliquer la pommade étendue sur une compresse de gaze stérilisée. Renouveler le pansement tous les jours, et 1 ou 2 fois par jour si les sécrétions sont abondantes.

Historique. — Présentée à la Société de Dermatologie par le Dr Gastou, chef du Laboratoire Central de l'Hôpital Saint-Louis, l'Ulcérine Berger a été admise dans les hôpitaux de Paris à la suite des rapports médicaux fournis par MM. les docteurs Brocq et Balzer, médecins des hôpitaux, Rieffel, chirurgien des hôpitaux, etc.

Prix : Le tube : 14 francs. — Le grand tube : 22 francs.

Laboratoires P. NADAUD

Docteur en Pharmacie, licencié ès Sciences.

31, boulevard de la Villette — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 66-58.)

ULCÉROPHILE NOSAN

Traitement ambulatoire des Ulcères variqueux.

Présentation et composition. — Bande de 0 m. 13×10 mètres imprégnée aseptiquement par un procédé spécial d'une pâte gélatino-amidonnée (pâte de Unna modifiée) constituant, après application, un appareil de contention parfait.

Action. — Décongestionnant, cicatrisant, on obtient par ce pansement un bas à varices semi-rigide moulé sur le membre et ne pouvant se distendre ; provoque par la marche un léger massage qui a pour résultat la résorption rapide du liquide séreux infiltré et le dégonflement du membre. Rétablissement de la circulation veineuse, meilleure nutrition des tissus qui retrouvent toute leur vitalité et enfin la cicatrisation des lésions.

Indications. — Toutes les plaies atones des membres variqueux même les plus anciens, sans tendance à la cicatrisation. Plaies traumatiques à cicatrisation lente, phlébites, varices douloureuses, eczémas, brûlures à épidermisation difficile.

Mode d'emploi. — Plonger la boîte contenant la bande dans un récipient d'eau assez profond (bouillotte) et porter à l'ébullition jusqu'à ramollissement complet (15 à 20 minutes). Appliquer la bande directement sur la peau à la façon d'une bande molletière en évitant les renversés.

Prix au public : 30 fr. la bande.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1984-1.

Pharmacie MAYAUD

6 ter, rue Voltaire

LA GARENNE-COLOMBES (Seine).

Tél. : Charlebourg 21-53.

ULTRACALCIUM IRRADIÉ

Reminéralisateur physiologique assurant toutes les propriétés physiologiques de l'Ion Calcium.

INDICATIONS. — Assimilation défectueuse du calcium, déminéralisations, déficiences constitutionnelles, troubles de croissance, anémie, lymphatisme, surmenage, convalescence, grossesse, allaitement, pré tuberculose.

Ergostérine irradiée.....	0 gr. 03
Poudre de parathyroïde.....	0 gr. 06
Poudre de surrénale.....	3 gr.
Poudre d'os frais.....	20 gr.
Poudre de thymus.....	5 gr.
Glycérophosphate de chaux.....	40 gr.
Glycérophosphate de manganèse.....	6 gr.
Fluorure calcium.....	5 gr.

Sucre aromatisé : Q. S. pour 1.000

Ultracalcium se présente sous la forme d'un granulé fondant, de goût très agréable et facile à prendre.

L'association d'extraits des glandes parathyroïdes, surrénales, etc..., aux minéraux nécessaires à l'organisme (Phosphore, calcium, manganèse, magnésium), assure une reminéralisation optimale. La présence d'ergostérine irradiée ajoute à ces principes reminéralisateurs les propriétés considérablement augmentées de l'huile de foie de morue.

Le granulé **Ultracalcium** peut être administré depuis l'enfance jusqu'à la vieillesse, sans aucun inconvénient.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, suivant prescription médicale. Prix : le flacon 17 fr. 70.

LABORATOIRE AUCLAIRE,

E. Auclaire, Pharmacien de la Faculté de Paris.

36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e). — (Tél. : Trudaine 38-63.)

ULTRACRINOL

Extraits désalbuminés de Foie, Rate, Moelle osseuse, frais d'animaux jeunes, préparés selon la méthode de Whipple.

Traitement adjuvant des Anémies pernicieuses. Anémies post-hémorragiques. Anémie des maladies infectieuses, Chlorose, Anémies des jeunes enfants. Toutes déficiences organiques, Convalescences.

Ampoules buvables, aromatisées au curaçao.

Boîte de 10 ampoules : 22 francs.

Coffret de 30 ampoules : 55 francs.

Adultes : 1 ampoule 1/4 d'heure avant chaque repas midi et soir dans un peu d'eau ; en cas de besoin, doubler la dose.

Adolescents : 2 ampoules par jour.

Enfants : A partir de 1 à 2 ans, 1 ampoule à boire par jour dans un peu d'eau sucrée en 2 fois.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments sous le n° 1750-2.

Laboratoires BIOPHARMAX

40, quai Jeanne-d'Arc — CHINON (I.-et-L.).

ULTRAFORMINE

B. et S.

Urotropine avec association de Benzoate de soude (B) ou de Salicylate de soude (S).

Composition. — Comprimés de 0,50 d'Urotropine et comprimés de 0,50 de Salicylate de soude ou de Benzoate, présentés en deux tubes différents dans la même boîte.

Propriétés. — Antiseptique urinaire, biliaire et général. L'association de Benzoate ou de Salicylate augmente fortement les propriétés diurétiques.

Indications. — Toutes infections générales, urinaires, Affections hépatiques, Affections rhumatismales (Ultraformine S).

Dose moyenne. — 2 ou 3 fois par jour 2 comprimés (un de chaque tube) dans un grand verre d'eau.

Laboratoire SAUZE

60, rue Jean-Jaurès — FIRMINY (Loire).

ULTRA-LEVURE

Levure à température Ultra-Haute (37°)

Composition : 200 à 250 millions de globules de levure par ampoule de 5 cc. dans un milieu isotonique où la levure reste vivante pendant plus de 5 ans.

Propriétés : Température d'activité et de reproduction optimum correspondant à la température physiologique de l'intestin. Élimine les ferments pathogènes par concurrence vitale. Exerce cette action vivante sur tout le circuit d'élimination rénale.

Ne produit qu'une acidité insignifiante.

Facilite les phénomènes d'assimilation et de désassimilation — tonique par les diastases et les vitamines produites en grande abondance (principalement vitamines B). Action spéciale sur les dermatoses par la vitamine B.

Indications : *Infections intestinales*, états aigus et chroniques, diarrhées infantiles (peut se prendre mélangée au lait), diarrhées et dysenteries ambieuses ou bacillaires, entérites, furonculoses et dermatoses, *colibacilloses intestinales et urinaires* (résultats rapides), diabète.

Mode d'emploi : *Dose normale :* une ampoule par jour dans un peu d'eau sucrée ; *dans les cas aigus :* une ampoule deux fois par jour ; *dose d'entretien :* deux ampoules par semaine.

La boîte de 12 ampoules : 25 francs.

Enregistré au L. N. C. n° 535-27.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. Odéon : 73-92.)

ULTRA-VIOLET

- 1° Affections de la première et de la seconde enfance, hypotrophies, rachitisme, tétanie, anémies.
 - 2° Tuberculoses dites chirurgicales : ganglionnaire, osseuse et ostéo-articulaire, péritonéale, génitale.
 - 3° Affections cutanées : acné, psoriasis, engelures, lupus et affections du cuir chevelu, pelade.
 - 4° États de surmenage et d'asthénie, convalescence.
 - 5° Infections de l'oreille, Tuberculoses oculaires, Carie dentaire, Pyorrhée, Blanchiment des dents.
- Appareils en location sur ordonnance médicale.
Livraison rapide par :

LA VERRERIE SCIENTIFIQUE

12, avenue du Maine — PARIS (XV°).
(Tél. : Littré 90-13.)

ULTRAVITAMINE 4

" U 4 "

Puissant dynamogène. Recalcifiant intégral, plus actif et plus régulier que l'huile de foie de morue.

Composition. — Association des Vitamines avec des éléments minéraux : Phosphore, Manganèse, Calcium, et des éléments opothérapiques : Moelles et Poudres d'Os frais.

Indications. — Déminéralisation, Rachitisme, toutes Carences et Convalescences, Dépression nerveuse, Fatigue musculaire, Allaitement, Prétuberculose.

Forme. — Granulé bicolore, délicieusement parfumé.

Posologie. — La même pour enfants et adultes : 1 cuillerée à café de granulé sec ou dissous dans un peu d'eau froide, avant les 2 ou 3 principaux repas.

Prix : 19 fr. 05.

Laboratoire d'Actino-Biologie
LAURENÇON et Cie, Pharmaciens
11, rue François-Giraud —
VILLEFRANCHE-SUR-SAONE (Rhône.)

UMCKA

Gouttes

Phytothérapie antibacillaire

Composition. — Complexe végétal contenant les principes actifs de l'Umckaloabo, plante Africaine de la famille des Polygonacées.

Propriétés. — Amélioration du terrain. Augmentation des moyens de défense.

Indications. — Tous les états pré tuberculeux et tuberculeux pulmonaires et chirurgicaux.

Avantages. — Innocuité absolue, aucune contre-indication, parfaitement toléré, même par les organismes les plus délicats, convient particulièrement aux enfants (ganglions).

Présentation. — Petit modèle (P. M.). Extrait fluide. Durée moyenne 20 jours.

Grand modèle (G. M.). Extrait fluide concentré. Durée moyenne 4 mois.

Mode d'emploi :

Adultes : V à XXX gouttes 2 fois par jour.

Enfants : II à XV gouttes 2 fois par jour, dans un demi-verre d'eau ou tisane une demi-heure avant les repas.

Laboratoire J. MAUNAND.

146, avenue Parmentier — PARIS (XI^e).

(Tél. : Oberkampf 55-55.)

URALYSOL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la diathèse rhumatismale. Agent de dissolution et d'élimination de l'acide urique.

Indications. — Arthritisme, Rhumatismes, Goutte, Coliques néphrétiques et hépatiques, Urétrites, Cystites.

Forme. — Granulés.

Formule. — Acide thyminique, Hexaméthylène-tétramine. Lysidine, anhydro-méthylène-citrate d'hexaméthylène - tétramine, Sels de lithine.

Mode d'emploi. — 1 cuillerée à café, matin et soir, dans un verre d'eau.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

URASEPTINE ROGIER

Principes actifs. — Hexaméthylènetétramine et son citrale, Benzoates de soude et de lithine, Diéthylènediamine.

Forme. — Granulé soluble dosé à 0 gr. 50 de matière active par cuillerée à café.

Action thérapeutique. — Puissant antiseptique urinaire et biliaire par dédoublement assuré de l'hexaméthylène, Antisepsie générale, Dissout et chasse l'acide urique.

Indications. — Pyélites, cystites et toutes affections vésico-rénales, cholécystites, Colibacilloses, maladies infectieuses, diathèse urique, arthritisme.

Posologie :

Adultes : *Antisepsie vésico-rénale :* 3 à 6 cuillerées à café par 24 heures.

Arthritisme : 2 à 4 cuillerées par 24 heures par périodes alternées de dix jours longtemps répétées.

Enfants : 1/2 à 2 cuillerées à café par 24 heures suivant l'âge.

Le flacon : 15 fr. 75.

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Pereire — PARIS.

(Tél. : Wagram : 33-70.)

URAZINE

Citro-salicylate de pipérazine.

Dissolvant de l'acide urique. Action analgésique et antiseptique. Innocuité absolue.

Indications :

Goutte, Gravelle, Rhumatisme.

Posologie et mode d'emploi :

Comprimés à 30 ctg. : trois ou quatre par jour, au moment des repas (tubes de 20 comprimés). Prix : 9 fr. 60.

Granulés effervescents : une cuillerée à café dans un demi-verre d'eau, aux deux principaux repas (flacons de 85 g. env.).

Prix : 17 fr. 50.

Société Parisienne d'Expansion Chimique
« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

UR-CLAR

Antiseptique urinaire.

Forme : Capsules.

UR-CLAR BLEU

Composition. — Bleu de Méthylène, Citraminoxiphyène, Poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et analgésique des voies urinaires et du tube digestif.

Indications. — Toutes les infections urinaires et en particulier les colibacilluries, la tuberculose rénale et vésicale et la blennorrhagie.

Mode d'emploi. — 6 à 9 capsules par jour.

Prix : 20 fr. 80 les 60 capsules.

UR-CLAR BLANC

Forme : Capsules.

Composition. — Santalol citraminoxiphyène, poudre d'hamamélis.

Propriétés. — Antiseptique et balsamique des voies urinaires.

Indications. — La blennorrhagie et ses complications.

Mode d'emploi. — 9 à 12 capsules par jour.

Prix : 21 fr. 20 les 60 capsules.

Laboratoire M. A. ROUX (M. A. R.)

M. A. ROUX, Pharmacien

58, rue de Maubeuge — PARIS. (Tél. : Trudaine 54-69.)

URÉINOL

Diurétique.

Granulé ou comprimés de goût très agréable.

Composition. — Hexaméthylène-tétramine recristallisée dans l'alcool, 20 cgr. par comprimé ou cuillère à café ; benzoate de soude ; extrait d'uva ursi ; orthosiphon stamineus ; camomille ; chendent, romarin.

Propriétés thérapeutiques. — Antisepsie des voies urinaires.

Indications. — Colibacillose, Arthritisme, Uricémie, Syndromes entéro-rénaux.

Posologie. — De 2 à 8 comprimés ou cuillères à café par jour dissous dans de l'eau tiède ou froide.

Prix. — La boîte de granulés ou de 40 compr. : 16 fr

L. N. C. M. n° 1629-3 et 4.

Laboratoire du MUXAGOL

43, rue de Chartres — NEUILLY-SUR-SEINE.

URÉMIASE

(Comprimés Anti-Urémiques.)

Composition. — Produit concret extrait du cerveau de certains poissons (Gadidés), associé à la Rénine (substance corticale rénale).

Propriétés thérapeutiques. — L'URÉMIASE rend d'immenses services dans le traitement de l'urémie d'origines diverses et des rétentions azotées. Douée de propriétés antitoxiques et en même temps diurétiques, elle produit un abaissement sensible du taux de l'urée sanguine, une diminution et même la disparition de l'albumine, l'activation de la diurèse dans l'Oligurie. On peut dire que, sous son action, le rein est débloqué.

Indications. — Crises d'Urémie, Néphrites chroniques, Azotémie, Hypertension, Artériosclérose, Oligurie, Insuffisance rénale, etc. L'URÉMIASE n'agit comme diurétique que dans les troubles fonctionnels du rein, dans tous les accidents de nature urémique, et non chez les sujets normaux.

Posologie. — *Adultes, Vieillards* : 3 comprimés dans une cuillerée d'eau toutes les deux heures. Après 5 ou 6 prises ainsi réparties, réduire à deux comprimés toutes les 2 ou 3 heures jusqu'à résolution. *Etats chroniques* : 6 par jour, matin, midi, soir, pendant 2 ou 3 semaines.

Enfants à tout âge jusqu'à 14 ans environ : Même mode d'emploi avec 2 comprimés au lieu de 3.

Prix : 20 francs.

Dépôt : Laboratoire NOGUÈS

7, rue Galvani — PARIS (XVII^e).

URÉOL CHANTEAUD

Composition. — Granulé contenant par cuillerée à café :

Héxaméthylène tétramine	0 gr. 40
Benzoate de soude	0 gr. 30
Benzoate de lithine	0 gr. 10

Indications :

Désinfectant très actif des voies urinaires et biliaires. Manifestations arthritiques, goutteuses, suppurations rénales et des voies urinaires.

Doses et mode d'emploi :

1 cuillerée à café 2 fois par jour que l'on fait dissoudre dans un peu d'eau.

Prix de vente : 12 fr. 75.

Laboratoires CHANTEAUD

J. LAURIN, Pharmacien

CHAMBOURCY (Seine-et-Oise.)

URICÉMINE

Excès d'acide urique, diurèse.

Antisepsie urinaire et biliaire.

Synergie médicamenteuse à doses non floculantes.

Composition de 2 cuillerées à café : Salicylate de pipézarine, 0,065 ; benzoate de soude, 0,25 ; benzoate de lithine, 0,25 ; silicate de soude, 0,025 ; urotropine, 0,25 ; citrate monosodique 0,30 ; sous forme de granulés. Doses fractionnées utilisables en totalité à l'état naissant par synergie et sans provoquer de précipitation.

Mode d'action. — Dissolvant de l'acide urique, anti-purinique, anti-floculant, anti-sclérosant, antiseptique.

Indications. — Hyperuricémie, Lithiase rénale, hypertension artérielle, artério-sclérose, athérome, goutte, sciatique, asthme, pléthore, dermatoses. Infections urinaires et biliaires.

Mode d'emploi. — 2 à 4 cuillerées à café par jour dans un verre de liquide, aux repas ou en dehors.

Prix : 17 fr. 50 le flacon.

Produits SANOVA

Laboratoires TACHOT

103, rue Saint-Lazare — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trinité 04-49.)

URICLARINE

(Comprimés.)

Antiseptique entéro-rénal.

Propriétés thérapeutiques. — Combat l'infection urinaire au lieu même où elle naît : dans le tube digestif. L'Uriclarine, dans laquelle le chlorure d'ammonium renforce l'action du salicylate de phénile et de l'urotropine, est le médicament des affections réno-vésicales.

Indications. — Maladies infectieuses des Voies Urinaires : Colibacilloses, Cystites, Pyérites, Blennorrhagie.

Mode d'emploi. — Avaler sans croquer 6 à 8 comprimés par jour de préférence aux repas.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

URIFLUINE

Succinate de lithine.

Dissout l'acide urique, augmente la quantité des urines, empêche les coliques néphrétiques. Action anti-rhumatismale dans la Cellulite et le Rhumatisme chronique.

Produits STÉNÉ

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

URISANINE

Composition. — Une cuillerée à café représente :
0,75 de Benzoate d'hexaméthylène-tétramine et 0,25 d'extrait de stigmates de maïs dissous dans un excipient balsamique (buchu).

Indications :

Antiseptique : par le benzoate d'hexaméthylène-tétramine toujours bien toléré.

Diurétique : par l'extrait spécial de maïs.

Sédatif : par le buchu et l'extrait de plantes balsamiques.

Toutes les affections des voies urinaires et biliaires, maladies infectieuses (typhoïde, scarlatine, grippe), comme préventif de l'infection vésico-rénale.

Solution aromatique concentrée, à prendre par cuillerée à café dans un demi-verre d'eau.

Posologie :

1 à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : X gouttes par jour et par année d'âge.

Prix du flacon : 16 fr. 50 (10 jours de traitement).

Laboratoires LONGUET

34, rue Sedaine — PARIS (XI^e).

(Tél. : Roquette 21-95.)

UROBLEU VERGELOT

Antiseptique urinaire.

Composition. — Bleu de méthylène : 0 gr. 03 ; Hexaméthylène-tétramine : 0 gr. 15, pour un comprimé.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires par formation de formol, Tarit les sécrétions purulentes, Détruit les agents de fermentations, Cicatrise les muqueuses urinaires, Dissout l'acide urique, Diurétique, Permet de vérifier la perméabilité rénale.

Indications. — Affections des voies urinaires et leurs conséquences : Urétrites, Prostatites, Cystites, Pyuries, Colibacilluries. Aucun des inconvénients des balsamiques.

Présentation et mode d'emploi. — Comprimés dragéifiés, à prendre de 1 à 3, trois fois par jour, avant les repas, selon indications.

Prix : 17 fr. 70, le tube de 50 comprimés.

Laboratoires Ch. VERGELOT,

Docteur en Pharmacie,

6, rue de Navarin — PARIS (IX^e).

(Tél. : Trudaine 50-18.)

Enregistré au Lab. de contrôle sous le n° 1236-3.

UROBOLDINE

Composition. — Pipérazine, Phosphate de soude, Phénylcinchoninate de soude, Carbonate de lithine, Hexaméthylène-tétramine, Chlorhydrate de boldine.

Présentation. — Granulé effervescent agréable au goût.

Propriétés thérapeutiques. — Dissolvant et éliminateur puissant de l'Acide urique, cholagogue. La Boldine associée aux plus actifs dissolvants actuels de l'acide urique assure à l'UROBOLDINE un pouvoir d'attaque et d'entretien.

Indications. — Diathèse urique, Rhumatismes, Gouttes aiguë et chronique, gravelle, lithiase rénale, coliques néphrétiques, artériosclérose, arthritisme, troubles fonctionnels du foie et des voies biliaires, auto-intoxications.

Mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, chacune dans un verre d'eau.

Dans les crises aiguës, 3 à 5 cuillerées à café.

Laboratoire de l'UROBOLDINE

L. MOREAU, Pharmacien
6, rue Dombasle — PARIS (XV^e).

UROCÉDROL

Composition :

Essence de cèdre du Maroc.....	0 gr. 05
Hexaméthylène tétramine recristallisé dans l'alcool.....	0 gr. 05
Extrait sec de stigm. de maïs.....	0 gr. 055
Théobrominate de lithium.....	0 gr. 045
Bromure de camphre.....	0 gr. 02

Présentation. — Dragées.

Propriétés thérapeutiques. — Désinfectant des voies urinaires, dont l'activité est due à l'association d'*antiseptiques doux* et de *diurétiques*. Balsamique par l'essence de cèdre, qui ne présente aucune intolérance. Décongestionnant. Sédatif génital. Sans contre-indication.

Indications. — Affections de la prostate, Cystites, Urétrites, Néphrites, Pyélonéphrites, Catarrhe vésical, Incontinence d'origine vésicale.

Mode d'emploi. — 2 à 3 dragées avant chacun des 3 repas.

Prix : 18 fr. le flacon pour 7 jours de traitement.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1638-1.

Laboratoires GALLO, Docteur en pharmacie

AURILLAC (Tél. : 0-57.)

UROCHOLINE

Composition. — Salicylate d'hexaméthylène-tétramine, Peptones, Sulfate de magnésie, extrait d'artichaut, extrait de boldo, glycyrrhizine.

Indications thérapeutiques. — Lithiase biliaire, constipation, ictère, urticaire, hémorroïdes, cholécystites simples et chroniques, intoxications du tube digestif.

Présentation. — Granulé soluble, odeur et saveur agréables.

Posologie et mode d'emploi. — De une à trois cuillerées à café par jour dans un demi-verre d'eau tiède le matin à jeun. Enfants demi-dose.

Prix. — 18 fr. 20 pour un traitement moyen de 1 mois environ.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1.100.01.

Laboratoire de l'UROCHOLINE

20, pl. de la Mairie — PARC-SAINT-MAUR (Seine).

(Tél. : Gravelle 00-43.)

UROCLASE

Gouttes.

Traitement causal de l'Uricémie et des états pré-alcalosiques. — Anturique vrai (préventif et curatif). Non toxique. — *Acidifiant (chimiquement non acide)*.

Définition :

L'*Uroclase* agit exclusivement par l'état colloïdal dans lequel ses composants s'y trouvent, comme le prouve sa formule (pour 100 gr. de solution)

Bioxyde de silicium : 0,25, uni par adsorption au Carbonate de K : 0,02, au Chlorure de Na : 0,19, et au Carbonate de Lithium : 0,005.

Dispersés en milieu aqueux par procédé spécial.

Mode d'action :

L'*Uroclase* est essentiellement un *modificateur du terrain*, bien que son action immédiate en fasse également le plus actif éliminateur des dépôts existants d'acide urique. Son efficacité est profonde, progressive et durable.

En effet, par sa forme colloïdale, il permet la self-acidification de l'organisme, corrige progressivement le métabolisme, rétablit l'équilibre acido-basique dévié vers l'alcalose et redresse jusqu'à la normale le pH humoral et tissulaire. La précipitation de l'acide urique endogène et exogène devient ainsi impossible dans l'organisme.

Il agit à la façon des diastases suivant les lois de la physico-chimie des colloïdes, sans altérer l'organisme ni déclencher les réactions alcalines de défense.

Indications :

1° *Uricémie*: Arthritisme, Goutte et Rhumatisme goutteux, Artériosclérose et son hypertension, Névralgies (Sciaticque, Lumbago, Migraines) et tous les troubles de même étiologie (Arthrite alvéolo-dentaire, Bourdonnements, Cataracte uricémique, etc.).

2° *Toutes les manifestations pré-alcalosiques*: Asthénies, Psychasthénies, Surmenage, Sénilité, Phosphaturies, Colibacillurie, etc.

Posologie :

Son inobservation diminuerait sensiblement l'efficacité du traitement.

Prescrire : V à X gouttes d'*Uroclase* à prendre dans *un peu* d'eau seulement, le matin à jeun (1/4 d'heure avant toute autre ingestion), par décades alternées de cure et de repos.

En bonne règle, commencer par V gouttes seulement (au delà, le traitement peut réveiller au début, tout comme une banale cure hydro-minérale, une légère manifestation arthritique de courte durée), puis atteindre graduellement (dès la 3° décade de cure) la dose journalière optima, à savoir : 1 goutte par 10 kg. de poids.

Pas de contre-indication, ni intolérance, ni accoutumance. Inoffensif et sans saveur, il n'a pas d'action nocive sur le cœur ni sur aucun autre organe.

Pas de régime (une alimentation variée est à conseiller), mais proscrire l'alcool et tous excès en général.

Pour atteindre pleinement le but visé, la persévérance doit être exigée.

Contrôle de l'efficacité de l'Uroclase:

Avant de commencer le traitement (à instaurer dès terminaison de la période aiguë) :

- 1° Prendre la tension artérielle ;
- 2° Faire le dosage de l'acide urique : *a.* dans les urines ; *b.* dans le sang.

Au cours du traitement :

a. Constatations immédiates :

- 1° Augmentation du taux de l'acide urique dans le sang, et secondairement dans les urines ;
- 2° Eventuellement, légère manifestation arthritique (sujets fortement uricémiques).

b. Constatations ultérieures :

- 1° Chez les hypertendus : abaissement de la tension artérielle ;
- 2° Diminution du taux de l'acide urique d'abord dans le sang, puis dans les urines (jusqu'à la normale) ;
- 3° Sensation de légèreté, de souplesse, d'euphorie, de lucidité mentale avec une sorte de rajeunissement, de goût au travail, etc.

UROCLASE « M »

[GOUTTES]

Diathèses mixtes (uro-oxaliques, uro-phosphatiques).

Même composition que l'*Uroclase* normal, mais avec micelles colloïdales plus fines ; son emploi doit être réservé aux cas suivants : Lithiase urinaire (rénale ou vésicale), Rhumatismes déformants, Tophi, etc.

Posologie spéciale. — Prescrire un traitement prolongé, avec alternances d'*Uroclase* normal et d'*Uroclase* « M ».

Mêmes décades de cure séparées par des repos équivalents.

Commencer par V gouttes journalières, dose à porter progressivement, dès la 3^e ou la 4^e décade de cure, jusqu'à XV et même XX gouttes (selon la sensibilité du sujet).

On constate tout d'abord des éliminations de gravelle avec arrêt dans l'évolution des formations calculeuses ; puis, *avec le temps*, une lente désagrégation de ces dépôts ou calculs (que confirme l'examen radiologique). Ces résultats remarquables s'expliquent par le mode d'action physico-chimique d'*Uroclase*.

Prix de vente :

Le flacon *Uroclase* normal (pour 2 mois de traitement)... 24 fr. 50

Le flacon *Uroclase* « M » 26 fr. 50

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1325-1.

Littératures spéciales et échantillons sur demande aux :

Laboratoires UROCLASE-CATHACIDE-CHOLAL

G. BERTIN, pharmacien,

95, rue de Prony — PARIS (XVII^e) — (Carnot 03-80.)

UROCYLATE

Composition. — Héxaméthylène tétramine et Salicylate de soude.

Forme. — Liquide sirupeux.

Dosage. — 1 cuillerée à soupe = 0 gr. 75 d'Héxaméthylène tétramine + 0 gr. 75 de Salicylate de soude.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique des voies urinaires et des voies biliaires. Antiseptique général.

Indications. — Celles de la médication urosalicylée. Tout état infectieux, grippe, voies urinaires, colibacillose, cholécystite, affection thyphoïde, état arthritique.

Posologie. — Voies biliaires : 1 cuillerée à soupe le matin à jeun. Autres états infectieux : 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix au public : 19 fr 65.

Enreg. au L. N. C. sous le n° 1079.

Laboratoires de l'Hépatomagnésion, A. CHATAIN
Docteur en Pharmacie

Ex-interne en Pharmacie des Hôpitaux de Lyon.

Diplômé de Bactériologie de l'Université de Lyon.

Dépôt général : 57, rue Pierre-Corneille — LYON.

(Tél. : Lalande 41-81.)

UROFLUX

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Extrait rénal, 0 gr. 02, Tartrate de pipérazine, 0 gr. 05. Benzoate de lithium, 1 gr. Benzoate de sodium, 1 gr. Héxaméthylène tétramine, 3 gr. Pipérazine, 0 gr. 50. Excipient effervescent au citron, Q. S. pour 100 gr.

Propriétés pharmacodynamiques. — Diurétique, antiseptique des voies urinaires et biliaires, régulateur de l'activité hépatique, dissolvant de l'acide urique.

Indications. — Affections urinaires (urétrites, cystites, prostatites). — Manifestations arthritiques (goutte, gravelle, coliques hépatiques et néphrétiques).

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dissoute dans un verre d'eau 2 à 3 fois par jour entre les repas.

Prix : 14 fr. 50 pour 10 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12°).

UROFORMINE GOBEY

Hexaméthylène-tétramine chimiquement pure, cristaux solubles dans l'eau.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique sanguin pouvant être utilisé contre toutes les infections.

Indications. — Fièvres infectieuses, grippe simple, encéphalites, complications bronchiques et pulmonaires, etc., infections des voies biliaires et urinaires, colibacillose.

Présentation :

Boîte de 50 comprimés simples à 50 egr.

Boîte de 50 comprimés efferv. à 25 egr.

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. à 25 ‰

Boîte de 12 ampoules de 2 cc. à 50 ‰

Boîte de 6 ampoules de 5 cc. à 25 ‰

Boîte de 6 ampoules de 5 cc. à 50 ‰

Boîte de 8 suppositoires associant Uroformine, Ichtyol, Jusquiame et Codéine.

Posologie :

2 à 4 comprimés simples par jour.

4 à 8 comprimés effervescent par jour (dans un 1/2 verre d'eau).

1 à 3 ampoules par jour.

2 à 3 suppositoires par jour.

Prix au public :

Boîte de comprimés (simples ou effervescent).....	15 fr. 65
Boîte d'ampoules à 25 ‰ 2 cc. et 5 cc.....	18 francs.
Boîte d'ampoules à 50 ‰ 2 cc. et 5 cc.....	22 fr. 25
Boîte de 8 suppositoires.....	16 fr. 95

Laboratoires du Docteur ROUSSEL

89, rue du Cherche-Midi — PARIS (VI^e).

(Tél. : Littré 58-43.)

UROÏODINE

Composition. — Iodoéthylate d'hexaméthylène-tétramine, associé au salicylate de lithine.

L'*Uroïodine* n'est pas une simple association Iode-urotropine-lithine, mais une combinaison chimique nettement définie.

Elle ne peut donc être remplacée par une formule magistrale. Elle contient 43 p. 100 d'iode rigoureusement titré, au lieu de 17 p. 100 dans les iodopeptones.

Propriétés physiques. — Solution dialysable — se décomposant lentement — s'éliminant dans l'urine, sous forme d'iodure alcalin, ce qui indique une destruction complète de la molécule organique, pas d'accumulation.

Propriétés physiologiques :

- 1° Par sa molécule iodée : excitateur puissant des fonctions lymphoïdes ;
- 2° Par sa combinaison iodo-salicylate-formine : agent anti-infectieux particulièrement énergique, antinévralgique et antithermique.
- 3° Grâce à l'association formine-lithine : diurétique très actif, urisolvant puissant.

Indications. — *Diathèse urique* : Goutte, gravelle, lithiases biliaire et rénale.

Diathèse arthritique : Rhumatismes chroniques et subaigus, sciatique.

Tuberculoses localisées : osseuses et ganglionnaires ; tuberculose pulmonaire (formes non congestives) ; Toutes affections justiciables d'un traitement iodo-ioduré intensif : adénopathies, végétations, asthme, emphysème, scléroses viscérales, artério-sclérose, hypertension artérielle.

Toutes maladies infectieuses, du Système nerveux notamment.

L'*Uroïodine* agit sur la douleur et sur la cause.

Présentations. — Ampoules de 4 cc., injectables indifféremment en I. M. ou I. V. — sans réaction locale ni choc — résorption parfaite. Comprimés de 0 gr. 50, enrobés de gluten : ne se dissolvant donc pas dans l'estomac, tolérance parfaite.

Posologie :

Chez l'enfant : au-dessous de 15 ans : 1/2 à 1 ampoule par jour ; 1 à 3 comprimés par jour.

Chez l'adulte : 1 à 3 ampoules par jour, simultanément (à la dose maxima, de préférence en I. V.) ; 4 à 8 comprimés par jour. Avaler les comprimés avec un peu d'eau, sans les croquer, de préférence avant les repas.

Chaque ampoule correspond à 148 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Chaque comprimé correspond à 48 1/2 gouttes de teinture d'iode.

Prix : Ampoules : 28 francs ; Comprimés : 25 francs.

Laboratoires de l'UROÏODINE

17 bis, rue Juge — PARIS (XV°).

(Tél. : Suffren 41-22.)

URO-LITHIUM

Granulé.

Antitoxique, Diurétique, Antiurique.

Indications. — Diathèse urique et arthritique. Antisepsie hépato-vésico-rénale. Asthme, Artériosclérose, eczémas, etc.

Formule. — Pipérazine 3, Urotropine reconst. 3, Salicylate de lithine 2, Phosphate dissodique 2, Citrate de soude 5, borocitrate de soude et de magnésie 3, pour 100 gr. de granules effervescents.

Dose et emploi. — En général, 3 à 5 cuillerées à café par jour, dissoutes dans un peu d'eau, le matin à jeun, une demi-heure avant les repas et au coucher.

Utilisation du borocitrate de soude et de magnésie considéré comme le dissolvant par excellence des calculs urinaires.

L'emploi simultané d'*Uro-lithium* et d'*Anatensyl* donne en général d'excellents résultats : 8 ou 10 jours *Anatensyl*, puis usage plus ou moins prolongé d'*Uro-lithium*.

Prix : 20 fr. la boîte de 90 gr.

L. N. G. 1676-21.

Laboratoire G. CALMELS
AUTERIVE (Haute-Garonne).

UROMÉTHYL

Composition. — Héxaméthylènetétramine chimiquement pure, Citrate d'Héxaméthylènetétramine, Bleu de méthylène, Salol.

En association stable.

Formes et posologie :

- a. Cachets à noyau médicamenteux glutinisés (3 à 6 par jour).
- b. Dragées glutinisées (6 à 8 par jour).

Action thérapeutique. — La libération d'une partie des principes actifs a lieu seulement dans l'intestin : d'où *activité renforcée et tolérance parfaite*, même par les estomacs les plus délicats.

Indications. — Antisepsie générale, Maladies infectieuses, Affections et infections des voies urinaires et biliaires, Manifestations des diathèses urique et arthritique.

Les Laboratoires du LUGOCALCION

OULLINS (Rhône).

UROMÉTINE LAMBIOTTE FRÈRES

Hexaméthylènetétramine pure.

Formes. — Comprimés, Ampoules, Cristaux.

Propriétés thérapeutiques. — Puissant antiseptique interne, antitoxique, antiuricémique.

Indications. — Toutes infections urinaires, intestinales et biliaires, toutes maladies infectieuses, toutes manifestations de la diathèse urique.

Mode d'emploi. — 1° Comprimés de 0 gr. 50 à faire dissoudre dans l'eau et à prendre matin, midi et soir : 6 à 8 dans les cas aigus, 3 à 4 dans les cas chroniques ; 2° Ampoules de 2 cc. et 5 cc. dosées à 0 gr. 25 par cc. pour injections intramusculaires ou mieux intraveineuses ; 3° Cristaux pour prescriptions magistrales.

Ampoules : Prix 19 fr. 40. — **Comprimés :** 17 fr. 10.
Littératures et Échantillons :

Produits LAMBIOTTE FRÈRES

20, rue Dumont-d'Urville — PARIS (XVI^e).
124, avenue Rogier — BRUXELLES.

UROMIL

Composition. — Ether éthyl-phényl-cinchonique, pipérazine, hexaméthylène-tétramine, phosphate disodique.

Forme. — Granulés effervescents, instantanément solubles dans l'eau. Solution de goût agréable.

Action. — Mobilise, dissout, élimine l'acide urique. Possède un pouvoir dissolvant double de celui des pipérazines granulées. Antiseptique urinaire.

Très actif et toujours bien toléré.

Par ses éléments phosphoriques, empêche la néo-formation de purines endogènes. Combat ainsi efficacement la cause même de la diathèse urique.

L'ion H dérivé de ses phosphates acides et le CO² qui se développe au moment de son ingestion assurent l'équilibre acido-basique du plasma sanguin.

Indications. — Diathèse urique, rhumatismes, goutte, lithiases, coliques néphrétiques, cystite, pyélite.

Posologie. — 2 à 4 cuillerées à café par jour, chacune dissoute dans un verre d'eau.

Laboratoires UROMIL - L. BÉLIÈRES, D^r en Ph¹⁰

19, rue Drouot — PARIS (IX^e).

(Tél. : Provence 04-00.)

UROPHÉNYL

Composition. — Acide phénylquinolique carbonique et hexaméthylène-tétramine recristallisée.

Action. — La puissance de l'acide phénylquinolique carbonique pour l'élimination de l'acide urique, sans ses inconvénients (ictère) par association en heureuse proportion avec l'urotropine recristallisée.

Indications. — Goutte et rhumatisme.

Mode d'emploi. — 2 à 6 cachets par jour avant les repas, dans un grand verre d'eau alcaline.

Prix : 18 francs.

Laboratoires **CROUY**

Docteur en Pharmacie.

VERNON (Eure).

UROPHILE

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments, sous le n° 363-10.

Forme. — Granulé effervescent.

Composition. — Lithine en combinaison benzoïque, Hexaméthylène tétramine, Acide Thyminique.

Propriétés pharmacodynamiques. — Uricolytique, Diurétique, Antiseptique des voies urinaires et biliaires.

Indications. — Diathèse arthritique. — Goutte aiguë et chronique. — Gravelle urique. — Lithiase biliaire. — Rhumatismes. — Cystites.

Mode d'emploi. — Une cuillerée à café dans un peu d'eau, deux fois par jour, entre les repas.

L'étui de 90 grs : 17 fr. 35.

Laboratoires **A. BAILLY**

15, rue de Rome — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Lab. 62-30.)

UROQUINASE DUBOIS

Comprimés.

Composition. — Un comprimé contient :

Acide Phénylcinchonique.....	5 cgr.
Glande Thyroïde	1 —
Iodo-quinat de lithine.....	5 —
Sucre de lait	30 —

Indications. — *Arthritisme.* Régulation de la nutrition, Obésité, Dermatose d'origine arthritique, Névralgies, Troubles de la ménopause.

Posologie. — *Adultes* : 3 à 4 comprimés par jour.

Enfants : de 1/4 à 1/2 comprimés par jour selon l'âge.

Traitement minimum : 15 jours.

Prix : 16 fr. 30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 238-9.

Laboratoires DUBOIS

R. DUBOIS, Docteur en Pharmacie

16, boulevard Péreire — PARIS (XVII°).

(Tél. : Car. 45-62.)

UROQUINOL

Antiseptique urinaire et biliaire,
à l'extrait d'artichaut.

Action :

- 1° Mobilisatrice par le Phénylcinchoninate de Soude.
- 2° Cholagogue par l'extrait d'artichaut.
- 3° Antivisqueux par le citrate trisodique.
- 4° Empêche la formation des purines et entrave la précipitation de l'acide urique par son phosphate de soude.

Formule :

Phénylcinchoninate de soude	1
Urotropine	3
Tartrate pipérazine.....	1
Phosphate de soude pulvérisé	1
Citrate trisodique	2
Extrait mou artichaut repris.....	0.50

Pour 100 grammes.

Posologie. — 2 à 3 cuillerées à café par jour, dans un verre d'eau, pris le matin à jeun et avant les repas.

Dans les crises aiguës : 4 à 5 cuillerées à café par jour.

Présentation. — Granulé soluble.

Prix : 19 fr. 65.

Laboratoires DEXO

7, rue de la République — PUTEAUX (Seine).

(Tél. : Lon 04-61.)

UROSALYL B B SIMPLE ET METHYLE

Cachets - Comprimés Dragéifiés.

Association de deux formules. - I. - Antiseptique; II. - Hépatocholagogue.

Urosalyl normal suractivé.

Par un cholagogue :

Poudre de feuilles de Boldo.. 0,10 par cachet ou 0,05 par comprimé.

Par un antispasmodique :

Poudre de feuilles de Belladone 0,02 par cachet ou 0,01 par comprimé.

Le *Boldo* renforce le pouvoir cholagogue de l'*Urosalyl normal*, stimule les fonctions hépatiques, augmente la sécrétion biliaire favorisant ainsi l'élimination des toxines qui s'accumulent dans le foie et sont à l'origine de la plupart des infections intestinales et urinaires.

La *Belladone*, par ses propriétés antispasmodiques et son action sur les extrémités du système parasympathique, apaise les troubles réflexes, calme les contractions douloureuses de l'intestin et de l'appareil urinaire.

Indications. - Toutes celles de l'*Urosalyl normal* dans les infections intestinales, urinaires et généralisées d'origine mal définie qui sont bien souvent d'origine hépatique.

Doses journalières. - 2 ou 3 cachets - 4 à 6 comprimés à prendre au début des repas.

Présentation. - En boîte de 24 et 60 cachets. - En étui de 50 comprimés. Enregistrés au L.N.C.M. sous les n° 300-4, 300-5.

Laboratoire C. GARDIOL

Pharmacie de 1^{re} classe de la Faculté de Montpellier.

6, rue Félix-Pyat, MARSEILLE. (Tél. National 49-10.)

UROSALYL NORMAL

Association scientifique Hexaméthylène-tétramine-Salol stabilisée par un excipient spécial qui augmente son pouvoir cholagogue et lui donne une remarquable activité.

Deux formules : I. — **UROSALYL SIMPLE**

Cachets (boîte à bande rouge).

1 cachet correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine..... 0 gr. 40

Salol..... 0 gr. 50

Granulé :

1 cuiller à café correspond à :

Hexaméthylène - tétra -

mine 0 gr. 10

Salol 0 gr. 10

II. — **UROSALYL-MÉTHYLE**

(Sans Urotropine).

Cachets (boîte à bande bleue) :

1 cachet correspond à : Bleu de

méthylène crist. chimiquement

pur. 0 gr. 03 ; Salol. 0 gr. 65

NOUVELLE FORME

Urosalyl simple et méthylé en comprimés dragéifiés facilement assimilables.

2 comprimés représentent

1 cachet.

Particularités. — Grâce à l'heureuse association de ses composants, qui retarde la décomposition de l'urotropine dans l'estomac, crée le milieu favorable à son dédoublement dans l'intestin et assure son élimination par les urines, l'Urosalyl est bien plus actif que chacun de ses éléments, qu'ils soient pris ensemble ou isolément.

Propriétés. — Puissant antiseptique des infections gastro-intestinales, urinaires, biliaires, rhumatismales et toutes maladies infectieuses. Le bleu de méthylène étant un puissant sédatif de l'élément douleur, l'Urosalyl méthylé est particulièrement indiqué dans toutes les affections douloureuses de l'appareil urinaire (cystites et prostatites tuberculeuses), ainsi que dans les crises aiguës de rhumatisme arthritique et toutes les fois qu'il y a intolérance à l'Urotropine.

Indications thérapeutiques.

Infections gastro-intestinales. — Fermentations intestinales, auto-intoxications, intoxications alimentaires, colibacillose et toutes maladies d'origine infectieuse ou microbienne : agit comme antiseptique général interne par son urotropine, comme antiseptique intestinal par son salol.

Infections biliaires. — Angiocholites, cholécystites, lithiase biliaire et toutes les manifestations de l'hépatisme : agit comme antiseptique par son urotropine, comme cholagogue par son salol dont l'excipient vient renforcer son action sur le foie et la bile.

Infections urinaires. — Urines troubles, purulentes, microbiennes, toutes infections urinaires, rénales, vésicales, cystites, urétrites, prostatites, pyélonéphrites, syndrome entéro-rénal.

Rhumatismes. — Agit par son salol qui se décompose dans l'intestin avec mise en liberté d'acide salicylique, spécifique du rhumatisme.

Posologie :

Doses journalières — 2 ou 3 cachets, 4 à 6 dragées, 2 à 6 cuillérées à café de granulé, à prendre au début des repas (le granulé doit être croqué et non délayé dans l'eau).

Présentation :

Boîte de 24 et 60 cachets. Étui de 50 dragées. Étui de 150 gr. de granulé.

Enregistrés au L. N. C. M. sous les n°s 300-1, 300-2 et 300-3.

Laboratoire Clément GARDIOL

Pharmacien de 1^{re} classe de la Faculté de Montpellier,
6, rue Félix-Pyat — MARSEILLE (Tél. : National 49-10.)

Échantillons et littérature sur demande.

UROSERUM

Puissant diurétique polyvalent, Effet rapide et prolongé sur la diurèse, pas d'accoutumance. Antiseptique des voies urinaires. Dépuratif doux.

Composition. — Associations organiques et minérales, granulé soluble effervescent, 0 gr. 55 de principes actifs par cuillerée à café.

Posologie :

Antiseptique : 3 cuillerées à café par jour.

Anti-urique : 2 cuillerées à dessert par jour.

Dépuratif : 4 à 6 cuillerées à café par jour.

Prix. le flacon : 20 fr. 25.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1766-13.

Laboratoires LAUGIER

56, rue St-Lambert — MARSEILLE.

UROSIPHON

Forme. — Infusion, de goût agréable.

Composition. — Orthosiphon Stamineus de culture, sélectionné et desséché suivant un procédé spécial, conservant toutes les propriétés et tout l'arome de la plante fraîche.

Propriétés. — Puissant diurétique hépato-rénal, azoturique, déchlorurant, hydrurique, sédatif, stimulant de la dépuration urinaire.

Indications. — Oligurie, hyperazotémie, uricémie, hypochlorurie, cystite, pyélonéphrite, rhumatisme goutteux, œdèmes, hépatisme.

Posologie. — Chacun des 10 paquets contenus dans la boîte d'*Urosiphon* sert à préparer un demi-litre d'infusion qui représente la dose quotidienne à absorber en 3 ou 4 prises au cours de la journée.

Laboratoire de l'UROSIPHON

J. HUCHEDÉ, Docteur en Pharmacie.

F. RICHARD, Successeur

1, rue de l'Odéon — PARIS.

UROVITINE

Composition. — Vitamine A, extrait d'Orthosiphon, Hexaméthylène-tétramine, Chlorure d'Ammonium.

Propriétés. — Antiprécipitant biologique, Diurétique, azoturique, déchlorurant. Antiseptique interne. Acidifiant léger du pH urinaire. Anti-infectieux.

Indications. — Affections des Voies Urinaires, Arthritisme, Hypertension, Maladies infectieuses, Chirurgie pré et post-opératoire.

Présentation. — *Dragées* — Prix : 19 francs.

Mode d'emploi. — 3 à 6 dragées par jour. en 2 ou 3 fois, avec un peu d'eau.

LABO-VITA

29, rue Duret — PARIS (XVI^e).

URTICIDE

Médicament antianaphylactique.

Composition. — Pancréatine, Hépatine et 12 peptones (poissons, crustacés, sérum de cheval, caséine, gluten, ovalbumine, etc.).

Présentation. — **DRAGÉES** et **LIQUIDE**.

Une dragée équivaut à une cuillerée à café d'Urticide liquide.

Indications. — Affections aiguës, tous urticaires, (Edème de Quincke, Prurigo strophulus, prurit des fièvres éruptives,

Asthme infantile.

Zona (récent).

Affections chroniques, Eczéma, Prurits divers.

Posologie. — *Adultes* : Traitement d'attaque : 2 dragées toutes les heures pendant au moins 6 heures. Les jours suivants, 4 fois par jour, 3/4 d'heure avant les 3 repas et le soir au coucher. — Prolonger le traitement 15 jours.

Enfants et bébés : Même cadence, par cuillerée à café de liquide.

2 dragées toutes les heures le 1^{er} jour (20 dragées), toutes les 2 heures le 2^e jour (12 dr.), toutes les 3 heures ensuite (8 dr.).

Adultes : 2 dragées matin, midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

Enfants : 1 cuillerée à café matin, midi et soir, 3/4 d'heure avant les repas.

Obs. importante. — Dans la posologie ci-dessus, on peut remplacer 2 dragées par 1 cuillerée à dessert d'Urticide liquide.

Vomissements des nourrissons. { 1 cuillerée à café 1/4 d'heure avant les tétées.

Asthme adulte. { 1 cuillerée à café d'Urticide liquide 3 fois par jour 3/4 d'heure avant les repas.
Dose à ne pas dépasser.

Ch. ROCHE, * & O, Pharmacien,

Ex-interne, lauréat des hôpitaux de Lyon, ex-pharmacien major de l'armée, ex-chef de travaux de chimie, 2, rue Michelet — ALGER.

Dépôt général O. C. P., 108, rue Picpus, Paris.

L'étui G. M. (80 dragées) } 21 fr. 35
Le flacon G. M. (40 c. à café) }

L'étui P. M. (40 dragées) } 13 fr. 40
Le flacon P. M. (20 c. à café) }

Enregistré au L. N. C. n°s 1113-4 et 1113-5.

UTERSAN

Décongestif Utéro-ovarien.

Composition. — Extrait mammaire, Extrait placentaire, Anémone pulsatille, Bourse à Pasteur, Cimicifuga, Hamamélis, Hydrastis, Marron d'Inde, Viburnum, Sépia.

Posologie. — 6 dragées par jour, 10 à 20 jours par mois. Cesser pendant les règles.

Indications. — Traitement *per os* des états congestifs, inflammatoires, douloureux et des hyperplasies de l'appareil utéro-ovarien. Métrites. Salpingites. Prolapsus, Rétroversions. Fibromes, Métrorragies et Leucorrhées. Suites de couches.

Prix de l'étui de 60 dragées argentées : 18 fr. 35.

Laboratoire du VAGOSEDYL

122, Champs-Élysées — PARIS (VIII^e).

G. COUSSINET, Pharmacien

Licencié ès sciences.

UVARGOL

Argent colloïdal irradié. Plus actif et plus constant dans ses effets que l'Argent colloïdal ordinaire. Agit sans effet toxique en raison de la faible dose nécessaire.

Forme. — Dragées (à avaler) à 0,01, pour adultes 6 à 8 par jour.

Prix : 20 fr. 80

Comprimés Solubles à 0,01 pour enfants (3 à 5 par jour) ou adultes (6 à 8).

Prix : 19 francs.

Ovules à 0,05. 19 fr. 75

Pommade à 5 p. 100. 14 fr. 55

Indications. — Maladies infectieuses de l'intestin et des voies urinaires (Entérites, diarrhées, cystite, Syndrome entéro-rénal, etc.).

Antiseptique général.

Laboratoire MARTINIE

62, avenue Philippe-Auguste — PARIS (XI^e).

Tél. : Roquette 86-84.

Enregistré au L. N. C. M. sous les n^{os} 1122-1 à 1122-4.

UVÉ

(Gouttes.)

Composition. — Solution aqueuse de phosphate diacide de calcium, chlorure manganéux, chlorure de magnésium, chlorure ferreux, acide orthophosphorique, activés.

Ni arsenic ni strychnine.

Mode d'action. — Reminéralisent, reconstituent, désintoxiquent.

Indications. — Toutes les anorexies (nourrissons, enfants, adultes), dont elles sont le véritable spécifique. Convalescence, Asthénies, Surmenage, Décalcifications, Alcalose.

Posologie. — *Adultes* : 40 à 120 gouttes. *Enfants* : 20 à 80 gouttes, en une ou deux fois, dans un peu d'eau pure ou bicarbonatée.

Nourrissons : 1 goutte par mois d'âge de 1 à 6 mois ; 1 goutte et demie par mois de 6 à 12 mois, dans le lait des tétées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-2.

Prix : Le flacon :

Petit modèle : 11 fr. 40 Grand modèle : 21 fr. 20

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur Lannelongue — PARIS (XIV°).
(Tél. Alésia 28-51.)

UVÉOLINE

Pommade antiseptique aux essences aromatiques, longuement irradiée par les Rayons Ultra-Violets.

Indications. — Pyodermites, Plaies atones, Ulcères variqueux, Furonculose.

Mode d'action. — Agit par les essences végétales, l'hydroxyde de magnésium, le peroxyde de zinc, le bismuth, le calomel.

Mode d'emploi. — En onctions ; en compresses imprégnées ; incorporée à la paraffine dans les brûlures.

Prix du tube de 40 gr. : 11 fr. 50.

Ovules à l'Uvéoline.

Traitement de toutes les lésions utéro-vaginales.

Prix de la boîte de 6 ovules : 18 fr. 75.

Enregistrés au Lab. Nat. de Cont. des Médic. sous les n°s 1830-1 (ovules) ; 1830-2 (pommade).

Laboratoire de l'UVÉOLINE

Pharmacie AMBARD

CARCES (Var). (Téléphone n° 35.)

UVÉSTÉROL

Vitamine D + Cholestérine.

Composition. — Émulsion d'aspect et de goût non huileux; contenant par cc. (XL gouttes);

Vitamine D cristallisée..... 6 000 unités
antirachitiques

Cholestérol irradié..... 5 mgr,

Extrait de levure de bière vitaminé... 1 mgr. 3

Mode d'action. — Fixe chaux et phosphore, active la croissance. Antitoxique, bactéricide, hématopoïétique.

Avantages. — Remplace intégralement l'huile de foie de morue, parce qu'il unit à l'action exclusivement antirachitique de la vitamine D (Lesné, Clément, Simon) les activités de croissance, antitoxique et antianémique de la cholestérine.

Aucune toxicité, aucune contre-indication.

Parfaitement toléré, même par les fébricitants.

L'absorption du produit dans le lait augmente considérablement son activité (Hess et Wieland).

Indications. — Croissances difficiles ou retardées, Lymphatisme, Prétuberculose, Rachitisme, Tétanie, Décalcification. Améliore rapidement l'état général des tuberculeux chroniques.

Conservation. — Garde son activité intacte même après plusieurs années.

Posologie. — *Adultes* : 40 à 80 gouttes.

Enfants : 15 à 50 gouttes diluées dans une boisson lactée de préférence, ou une eau alcaline, du jus d'orange.

Chez le nourrisson sain (action préventive) : 5 à 20 gouttes.

Chez le nourrisson rachitique : 20 à 30 gouttes.

N. B. — Bien agiter le flacon avant l'usage.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 185-3.

Prix. — Le flacon :

Petit modèle : 11 fr. 40 Grand modèle : 20 fr. 10

Laboratoires CRINEX-UVÉ

1, av. du Docteur-Lannelongue — PARIS (XIV^e).

(Tél. Alésia 28-51.)

VACCIN ANTI-ASTHMATIQUE

du Professeur MINET

Le traitement vaccinal de l'asthme et des affections pulmonaires présente sur les nombreuses médications utilisées jusqu'à ce jour l'avantage de s'adresser non pas à un symptôme, tel que la toux ou l'oppression, mais à une des causes les plus évidentes de l'entretien des affections, à savoir la pullulation microbienne à l'intérieur des voies respiratoires.

Indications. — Asthme, Emphyseme, Catarrhe. Infections secondaires de la Tuberculose pulmonaire.

Mode d'emploi. — L'injection doit être faite dans le tissu cellulaire sous-cutané ; le point d'élection est la région dorsale, vers la base du thorax. Chez l'adulte, on peut injecter sans inconvénient le contenu d'une ampoule de 1 cc. 1/2. Les injections doivent être répétées tous les deux jours. Entre la 5^e et la 6^e injection, il est recommandé d'interrompre durant 6 jours et de reprendre le traitement dans les mêmes conditions. Chez l'enfant, le vaccin est aussi bien supporté que chez l'adulte, à la dose de 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; à 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-PNEUMONIQUE

du Professeur MINET

A la suite de l'injection de ce Vaccin, on assiste à une modification « véritablement impressionnante du tableau classique de la pneumonie. »

Indications. — Pneumonie, broncho-pneumonie des enfants et des vieillards.

Mode d'emploi. — Le point d'élection est incontestablement la région sus-épineuse. Chez l'adulte, il faut injecter d'emblée le contenu d'une ampoule, soit 1 cc, et répéter l'injection toutes les 24 heures. Dans les cas graves, la dose peut être portée, dès le deuxième jour, à deux ampoules en une seule injection. Si le cœur et les reins sont déjà touchés par l'infection, il y a lieu de commencer à la dose de 1/2 cc. Chez l'enfant, il y a lieu de réduire la dose à 1/4 de cc. entre 1 à 3 ans ; 1/3 de cc. de 3 à 7 ans ; à 1/2 cc. de 7 à 12 ans.

VACCIN ANTI-GRIPPAL

du Professeur MINET

Traitement de la grippe et de toutes les complications pulmonaires et suppuratives : otites, sinusites, etc., congestion grippale.

Enraye immédiatement toutes gripes légères ou graves dans leur évolution et évite ainsi leurs complications.

Mode d'emploi. — Voir « Vaccin Anti-Pneumonique. »

Produits " STÉNÉ "

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

VACCIN DE WEILL ET DUFOUT

Composition. — Pneumocoques, Entérocoques, Staphylocoques, Tétragènes.

Indications :

Préventif : Bronchites profondes ou épidémiques, Broncho-pneumonies post-opératoires.

Curatif : Broncho-pneumonies de l'enfant, de l'adulte et du vieillard, Pneumonies.

Avantages. — Aucune contre-indication, aucune réaction.

Forme. — Ampoules de 2 cc.

Posologie :

Nourrissons : 1/3 de cc., puis 1/2 cc., puis 1 cc.

Adultes : 1 cc., puis doubler.

Ne pas injecter le vaccin à travers des téguments atteints d'eczéma, d'impétigo, de pyodermites.

Prix : 41 fr. 30 la boîte de 6 ampoules ;

23 fr. 90 la boîte de 3 ampoules.

Enregistré au L. N. C. n° 507-7.

Laboratoires ROBERT et CARRIÈRE

1, avenue de Villars — PARIS (VII^e).

(Tél. : Inv. 20-60.)

VACCINOTHÉRAPIE ATOXIQUE CÉPÈDE

Hyperleucocytose et phagocytose spécifique exaltée.

Médication causale naturelle.

A PRESCRIRE PAR N° ou PAR LETTRES SYMBOLIQUES

Innocuité absolue.

1. Vaccin Ac. Sa (acné).....	Cépède.
2. Vaccin Bg. Pl. S. P. E. S. Ca (coqueluche et complications).....	Cépède.
3. Vaccin C. (colibacillaire).....	Cépède.
4. Vaccin C. E. (coli-entérococcique).....	Cépède.
5. Vaccin C. E. S. (diarrhée).....	Cépède.
6. Vaccin C. S. E. S. (entérite et entérocolite).....	Cépède.
7. Vaccin E. (entérococcie).....	Cépède.
8. Vaccin E. S.....	Cépède.
9. Vaccin E. Sa.....	Cépède.
10. Vaccin G. (gonococcie).....	Cépède.
11. Vaccin G. S. E. S. (blennorrhagie).....	Cépède.
12. Vaccin G. C. S. E. S. (affections blennorrhagiques de l'homme et de la femme).....	Cépède.
13. Vaccin G. C. S. E. S. Psd.....	Cépède.
14. Vaccin Mo (Morax) (conjonctivite aiguë).....	Cépède.
15. Vaccin Mo. Sa. (Morax-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
16. Vaccin Mo. P. Sa. (Morax-Pneumo-Staphylo) (conjonctivite mixte).....	Cépède.
17. Vaccin P. E. S. (pneumonie).....	Cépède.
18. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca.....	Cépède.
19. Vaccin Pb. S. P. E. S. Ca. Py (Otites, sinusites).....	Cépède.
20. Vaccin Pl. S. P. E. S. Ca. (grippe et complications).....	Cépède.
21. Vaccin Pl. Pb. S. P. E. S. Ca. (Asthme).....	Cépède.
22. Vaccin S (érysipèle).....	Cépède.
23. Vaccin S. Sa (peau-ostéomyélite).....	Cépède.
24. Vaccin S. E. S. (puerpéralité, abcès chauds, phlébites).....	Cépède.
25. Vaccin S. P. E. S. (100 millions).....	Cépède.
26. Vaccin S. P. E. S. (400 millions).....	Cépède.
27. Vaccin S. P. E. S. Ca. (catarrhe).....	Cépède.
28. Vaccin S. P. E. S. Ca. 100.....	Cépède.
29. Vaccin S. P. E. S. Ca. Pz. (Ozène).....	Cépède.
30. Vaccin Sa (furoneles).....	Cépède.

Tous curovaccins atoxiques sur demande
de MM. les médecins.

La caractéristique de la méthode Cépède réside dans la suppression totale de la phase vaccinale négative. Dans les curovaccins Cépède ci-dessus (désignés par les initiales des microbes servant à leur préparation) les toxines microbiennes sont toujours éliminées ou anéanties. L'injection sous-cutanée n'entraîne aucune réaction ni aucun phénomène morbide général ou local surajouté.

La boîte de 10 ampoules : 33 fr. 25 au public.

L. N. C. M. n° 1018-2 à 1018-11.

Institut de Biologie appliquée

57, 59, 60, rue Mathurin-Régnier et 47, rue Bague — PARIS (XVe).

(Tél. : Ségur 11-40.)

Adresse télégraphique : Ibacépède — PARIS

Dans toutes les pharmacies.

Adoptée par les Hôpitaux.

VACCINOTHÉRAPIE PROBIOS

En outre des produits *Ampoules, Pommades, Comprimés* préparés avec des Antivirus et des Bactériophages associés connus sous le nom générique de *Probios* destinés aux *vaccinations locales* (ingestion buccale, instillations, pansements locaux), les **Laboratoires PROBIOS** préparent des émulsions et filtrats microbiens destinés aux injections sous-cutanées. Ces émulsions microbiennes ou vaccins sont préparés de façon à éviter les phénomènes de choc dont les effets souvent inquiétants pour les malades ou leur entourage peuvent détourner la clientèle d'une méthode thérapeutique cependant efficace.

Pour les vaccins buvables, pommades, ovules, crème, etc.; voir *Probios*.

VACCIN PROBIOS ANTIGONORRHÉIQUE

Formule. — Gonocoques de Neisser, Synocoques, Bac. de Hofmann. Staphylocoques (d'origine urétrale).

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc. 20 fr. 40.

Indications. — Urétrites, Métrites gonococciques et complications.

Mode d'emploi. — Injections sous-cutanées, d'abord faibles, puis progressivement croissantes.

Pour la discrétion et la commodité des prescriptions, nous avons le même produit, qui peut être prescrit sous le nom *Vaccin Probios 365*.

INJECT-APYO

Formule. — Filtrat de cultures de :

Staphylocoques.....	50 parties.
Streptocoques	30 —
Bacilles Pyocyaniques	20 —

Présentation. — 6 ampoules jaunes de 2 cc. 20 fr. 40.

Indications thérapeutiques. — Absès, Phlegmons, Anthrax, Erysipèle, Impétigo, Intertrigo, Staphylococcies, Lymphangites. Toutes les affections à germes Pyogènes.

Mode d'emploi. — a. *En injections.* — b. *Applications locales.*

PRÉV-AKINTYL

Vaccin préventif injectable.

Formule. — Bacilles de Bordet et Gengou : 100 millions par cc.

Présentation. — 3 ampoules claires de 2 cc. 12 francs.

Indications. — Traitement préventif de la coqueluche.

Mode d'emploi du Pré-Akintyl. Nous conseillons de faire 3 injections de *Prév-Akintyl* séparées par des intervalles de 5 à 7 jours à des doses différentes selon les âges.

INJECT-AKINTYL

Vaccin curatif injectable.

Formule :

Bacilles de Bordet-Gengou	100 millions.
Bacilles de Pfeiffer.....	10 —
Bacilles de Friedländer	100 —
Bacilles Pyocyaniques	50 —
Streptocoques.....	10 —
Staphylocoques	200 —
Pneumocoques	10 —
Micrococcus Catarrhalis.....	50 —

Par centimètre cube.

Présentation. — 10 ampoules jaunes de 2 cc. 30 fr. 60.

Indications thérapeutiques. — Traitement curatif de la coqueluche.

Mode d'emploi. — Il est recommandé de commencer dans tous les cas par utiliser des doses faibles en vue d'éviter les réactions de choc ou les réduire le plus possible.

INJECT-APLEURYL

Vaccins préventif et curatif dans les affections des Voies respiratoires.

Formule :

Filtrats de cultures de Pneumocoques I-II-III.....	3 parties.
Filtrats de cultures Bac. de Friedländer	1 partie.
Filtrats de cultures de Streptocoques	2 parties.
Filtrats de cultures de Staphylocoques	2 parties.
Filtrats de cultures de Proteus	1 partie.
Filtrats de cultures Bac. de Pfeiffer.....	1 partie.

Présentation. — 6 ampoules de 2 cc. 25 fr. 50.

Indications thérapeutiques. — Laryngites, bronchites, broncho-pneumonies, pneumonies, Grippe et ses complications, pleurésie, asthme, emphysème.

Le Vaccin *Inject-Apleuryl* s'emploie en injections sous-cutanées à doses progressives en commençant par des doses faibles avec les précautions asseptiques d'usage.

Laboratoires PROBIOS

8 rue Saint-Martin — PARIS (IV^e).
(Tél. : Turbigo 40-83.)

VACCINOVULES

(Adultes et fillettes).

Forme. — Ovules,

Composition. — Culture atténuée de gonocoque, synocoque, staphylo, strepto B. d'Hoffmann, Excipient Q.S.

Indications. — Métrites, Urétrites, Pertes blanches, toutes affections microbiennes.

Posologie. — Pansement gynécologique idéal (ne tache pas).

Prix : { Adultes : 23 fr. 95
 { Fillettes : 21 fr. 60

Laboratoires E. BOUTEILLE

23, rue des Moines — PARIS (XVII^e).
(Tél. : Marcadet 04-02.)

VACCIN R. N.

Vaccin antipyogène, anti-infectieux
du Dr Roger NATIVELLE.

Forme. — Ampoules injectables de 2 cc.
(Boîte de 6 ampoules).

Propriétés thérapeutiques. — Les microbes entrant dans la composition de ce Vaccin sont sélectionnés parmi les formes jeunes, ce qui permet d'obtenir un maximum d'action avec un minimum de réaction. Ce Vaccin injectable par voie sous-cutanée s'applique aux infections diffuses et aux suppurations mal collectées, à microbes pyogènes courants (spécialement streptocoques et staphylocoques).

Indications. — Abscesses, Phlegmons, Panaris, Lymphangites, Anthrax, Furoncles, Pyodermites, Infections puerpérales, Infections grippales, Broncho-pneumonies.

Posologie. — Les doses habituelles sont les suivantes :

Premier jour.....	1/4 de cc.
Deuxième jour.....	1/2 cc.
Troisième jour.....	1 cc.

L. N. C. M. n° 43-11.

Laboratoires PÉPIN et LEBOUcq
COURBEVOIE (Seine).
(Tél. : Défense 09-71)

VACCINS ANTIBRUCCELLIQUES POLYMICROBIENS

des Docteurs DUBOIS et SOLLIER
Fièvre Ondulante. Fièvre de Malte

Composition. — Constitués par des *brucella abortus* et *melitensis* récemment isolés de l'homme et des animaux et en provenance des différentes régions où sévissent les brucelloses. Ces germes tués par la chaleur sont émulsionnés dans de l'eau de mer naturelle isotonique..

Indications. Présentation. Mode d'emploi.

Vaccin préventif. — Se prescrit sous deux formes :

- 1° *Vaccin préventif injectable* (3 ampoules de 1 centicube. Prix : 20 fr.). Trois injections sous-cutanées à 10 jours d'intervalle.
- 2° *Vaccin préventif buvable* (3 ampoules de 10 centicubes. Prix : 20 fr.). Pendant trois jours consécutifs, faire avaler le matin à jeun le contenu d'une ampoule.

Vaccin curatif. — Se prescrit sous deux formes :

- 1° *Vaccin curatif injectable* (12 ampoules de 1 cc. Prix : 50 fr.). Une injection sous-cutanée tous les deux jours (1/4, 1/2, 3/4, puis 1 cc.).
- 2° *Vaccin curatif buvable* (6 ampoules de 10 cc. Prix : 30 fr.) S'emploie à titre d'adjuvant du vaccin injectable dans l'intervalle des injections ou pour remplacer celui-ci en cas de contre-indication. Faire avaler, le matin à jeun, le contenu d'une ampoule.

Vaccins autorisés par décret N° 95 du 22 décembre 1937. Enregistrés au L. N. C. M. sous les N°s 1782 (1, 2, 3, 4).

Laboratoire des « VACCINS en PLASMA MARIN »
17, rue de Sauve — NIMES (Gard)
(Tél. : 36-10. Adr. Télégraph. : Plasmavax Nimes.)

VACCINS ATOXIQUES STABILISÉS

Stock-vaccins, constitués par des émulsions de cultures traitées par le fluorure de sodium, injectables par la voie sous-cutanée ou intramusculaire, composition polyvalente.

Nomenclature et Indications :

- Néo-Dmègon* : Antigoneococcique. (Voir ce nom.)
Néo-Dmesta : Antistaphylococcique. (Voir ce nom.)
Néo-Dmètys : Anticoquelucheux. (Voir ce nom.)
Aplexil : Préventif des complications pulmonaires de la Grippe et des Fièvres éruptives.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône
21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).
(Tél. : Balzac 22-94.)

VACCINS BACTÉRIENS I. O. D.

(Procédés RANQUE et SENEZ)

Prophylaxie — Vaccinothérapie.

VACCINS : Antitypholdique.

— Antistaphylococcique.

— Polyvalents.

— Pneumo-streptococcique.

— Anticoquelucheux.

— Antigonococcique.

— Antistreptococcique.

— Anticolibacillaire.

— Antimélicococcique.

(Injectables en injections sous-cutanées.

Vaccin-Pansements non injectables.

Pyophylaxines, Hémophylaxines, Entérophyloxine.

Prix : 25 francs. La boîte de 4 amp. de 2 cc.

Anasthmyl, Vaccin antispasmodique I. O. D 50 fr.

Rhino-Vaccin, Pansement I. O. D 31 fr.

L. N. C. M. n° 1864-1 à 11.

Dépositaires généraux :

Éts DEFFINS et GRUAT, 40, faub. Poissonnière — PARIS

Laboratoire de Biologie Médicale, 16, rue Dragon — MARSEILLE

HAMELIN, 16 ter, rue Burdeau — ALGER.

AVIGNON et HAYAT, 9, rue Malta-Srira — TUNIS.

Pour littérature et échantillons : 16, rue Dragon — MARSEILLE

VACCINS BRUSCHETTINI

1° **Antipyogène Polymicrobien Polyvalent**
(streptocoques, staphylocoques, pneumocoques,
colibacilles pyocyaniques) ;

2° **Antigonococcique.**

Forme. — 5 ampoules de 2 cc. : 29 fr. 70.

Indications :

1° **Vaccin Antipyogène Polymicrobien Polyvalent :** État infectieux, État grippal, Angines,

2° Vaccination pré-opératoire, Accouchements,
Broncho-pneumonie, Pneumonie, Abscess, Phlegmons, etc.

1, 2 et même 3 ampoules par jour en injection intramusculaire.

Aucune réaction générale ni locale, même en thérapeutique infantile ;

2° **Vaccin Antigonococcique :** Applications spécifiques.

Laboratoires FOURNIER Frères

7, rue Biscornet — PARIS (XII°).

(Tél. : Diderot 86-45, 5 lignes groupées.)

VACCINS CARRION

Le nombre de germes est exprimé en millions par centimètre cube.

- 1° **Vaccins monomicrobiens.** — Ampoules de 1 cc. Colibacillaire à 100 et 500 ; Coquelucheux à 100 et 500 ; Gonococcique à 100, 500 et 1 000 ; Paratyphique A ou B à 100 et 500 ; Pfeiffer à 100 et 500 ; Pneumococcique à 200, 500 et 1 000 ; Staphylococcique à 200, 1 000 et 5 000 ; Staphylo acné à 5 000 ; Staphylo anthrax à 1 000 et 5 000 ; Staphylo abcès de l'aisselle à 5 000 ; Staphylo ostéomyélite à 1 000 et 5 000 ; Streptococcique à 100, 500 et 1 000 ; Typhique à 100, 500 et 1 000. L'ampoule de 1 cc. : 5 fr. 45.

Entéroccoccique à 1 000 :

- La bte de 12 amp. : 19 fr. 65. — La bte de 6 amp. : 10 fr. 85.
Streptococcique endocardite à 1 000.

L'ampoule : 13 fr. 05.

- 2° **Vaccins polymicrobiens.** — Vaccin polymicrobien polyvalent ; Vaccin polymicrobien anti-grippal ; Vaccin coquelucheux mixte à 1 000 et 5 000 ; Vaccin typhique mixte T. A. B. à 100 et 500.

L'ampoule : 6 fr. 55.

Vaccin formule Delbet.

- L'ampoule de 4 cc. : 8 fr. 65. — La boîte de 3 ampoules : 21 fr. 75.

Vaccin typhique mixte pour vaccination préventive à 3 000 pour 1 cc.

- L'amp. de 1 cc. : 6 fr. 55. — L'amp. de 2 cc. : 8 fr. 65.

- 3° **Vaccins régionaux.** — Auriculo, Broncho, Intestino, Naso, Oculo, Pelli, Pharyngo, Uro, Uréthro et Utéro-vaccin :

L'ampoule de 1 cc. : 6 fr. 55.

- 4° **Lysats sodiques** (Dr Mauté). — Colibacillaire, Staphylococcique, Streptococcique, à 1 mgr. pour injections sous-cutanées et à 1/10^e de mgr. pour injections intraveineuses.

L'ampoule de 1 cc. : 6 fr. 55.

- 5° **Bouillons immunisants pour pansements.** — En tubes scellés de 5 cc.

Le tube : 5 fr. 45.

La boîte de 6 tubes scellés de 5 cc. : 27 fr. 20.

Naso et Auriculo-Bouillon.

La boîte de 6 tubes scellés de 2 cc. : 21 fr. 75.

- 6° **Vaccins buvables.** — Tubes scellés de 5 cc. : Colibacillaire, Typhique, Typhique mixte.

* La boîte de 6 tubes scellés : 16 fr. 30.

Voir aussi : Entéroccoccène et Coliflorine.

Entéroccoccique buvable en tubes scellés de 1 cc. (nourrissons).

La boîte de 12 tubes scellés : 19 fr. 60. — La boîte de 6 tubes scellés : 10 fr. 85.

- 7° **Anavaccins** (Dr Jaubert). — Voir : Gonagone, Staphylagone, Cardio-Streptine.

Enregistré au L. N. C. n° 514 — n° divers.

Produits biologiques CARRION

54, rue du Faubourg-Saint-Honoré — PARIS (VIII^e)

(Tél. : Anjou 36-45, 2 lignes groupées.)

VACCINS CLIN

Stocks-vaccins, lysés et détoxiqués, d'une concentration élevée en espèces microbiennes judicieusement choisies et fréquemment renouvelées.

Constitution constante, tolérance parfaite, conservation illimitée.

Formes : Vaccins injectables, en ampoules de 1 cc. de concentration microbienne.

Vaccin Clin antistaphylococcique.

Vaccin Clin antigonococcique. — N° 1 monomicrobien. — N° 2 polymicrobien (gonocoques, staphylocoques, pseudo-diphthériques, Friedlander, microcoques, entérocoques).

Vaccin Clin anticoquelucheux. — 3 concentrations. 1-2-3 milliards. (B. de Bordet-Gengou).

Pneumo-broncho-vaccin Clin. — *Adultes, Enfants.* (Pneumocoques. Friedlander, Pfeiffer, streptocoques, staphylocoques, entérocoques.)

Coli-entéro-vaccin Clin. Injectable, Buccal.

Vaccin Clin antistreptococcique.

Vaccin Clin pré-opératoire antipyogène (streptocoques, staphylocoques, colibacilles, entérocoques, pyocyaniques).

PYOVARGOL

(Pommade colloïdo-vaccin Clin argentique antipyogène)

Vaccin pour usage local, constitué par une émulsion microbienne (streptocoques, staphylocoques, microcoques, colibacilles, pyocyaniques) ayant fixé par absorption une certaine quantité de micelles argentiques.

L'action curative spécifique du vaccin se trouve renforcée par les colloïdes.

Indications. — Plaies infectées, suppurations localisées, furoncles, anthrax, abcès, panaris, pyodermites, dermatoses infectées.

Forme. — Tube de 31 grammes.

Laboratoires CLIN, COMAR et Cie.
20, rue des Fossés-Saint-Jacques — PARIS

VACCINS CREUZE

Polyvalents et polymicrobiens.

Application de la théorie de l'antagonisme microbien.

Bactériolysothérapie.

Eucratol. — Blennorrhagie et ses complications chez l'homme et chez la femme.

Vaccin M. A. — Affections non tuberculeuses des voies respiratoires, bronchite chronique, asthme, emphysème, etc...

Antixénol. — Entérovaccin polyvalent, furonculose, arthritisme, etc...

Formes : 14 ampoules de 1 cc. ou 60 comprimés. Prix public, la boîte : 35 francs. La demi-boîte (7 ampoules) : 20 francs.

Modes d'emploi :

Ampoules : une injection un jour non l'autre, progressivement de 1/8 cc. à 1 cc.

Comprimés : 1 à 4 par jour au début des repas.

Crèmes-Vaccin Creuze à base de filtrats (méthode de Besredka).

Le tube avec embout : prix public, 12 francs.

N° 1 Derma : Eczéma, furoncles, plaies infectées, etc.

N° 2 Opht : Blépharites, conjonctivites, orgelets, etc...

N° 3 O. R. L. : Grippe, rhume des foins, sinusites, ozène, etc.

Rhino Sec-Rhino Vaccin : Poudre à priser : le tube : 5 francs. Rhumes de cerveau, grippe, rhinites, etc...

Laboratoire CREUZE

74, rue de Lourmel — PARIS (XV^e). (Tél. : Vaugirard 30-05.)

VACCINS DEMONCHY

A forte concentration.

Antidiplococcique. — 25 milliards de gonocoques, de 12 souches différentes, au centimètre cube.

Posologie. — Injections (sous-cutanées) tous les 2, 3 ou 4 jours, la première de 1/4 ou de 1/8 de centimètre cube.

L'intensité des réactions générale et focale déterminées par chaque injection permettra de fixer la dose suivante, qui pourra ainsi, suivant les cas, être supérieure, égale ou même inférieure à la précédente. Donc, n'augmenter les doses que lorsqu'une amélioration se manifeste et que la réaction générale reste discrète.

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Antidiplo-entéro-staphylococcique. — (25 milliards de germes) Même posologie. *Vaccin mixte* spécialement destiné aux affections gynécologiques, aux urétrites ayant subi de nombreux traitements locaux et à leurs complications.

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Anti-staphylococcique. — Staphylocoques blancs et dorés de plusieurs souches, vaccin puissant (15 milliards de germes au centimètre cube).

Boîte de 6 ampoules de 1 cc.

Société Générale d'Applications Thérapeutiques.

THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (7^e).

(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VACCINS « INAVA »

(par voie sous-cutanée).

Souches sélectionnées. Lyse mécanique. Tyndalisation à froid
laissant intacts les antigènes concentrés et solubilisés.

Affections génitales.

Gynécologique « M » Injectable.

Ovules-Vaccins « M » (Voir à).

Affections dermatologiques.

Antipyogène « P » Injectable.

Pyogénol-Gelée.....

Infections grippales.

Antibronchitique..... « A » Injectable.

Rhino-Vaccin Gelée

Infections intestinales.

Vaccin antitypique (dragées).

Infections bucco-dentaires :

Pyodarsénol (Fuso-Strepto-vaccin et Sulfarsénol) (injectable et en gelée).

Pâte Dentaire Bleue immunisante au Pyodarsénol. (Voir à Inava.)

Affections rhumatismales

Thiophéol (Thiophène, Eucalyptol). (Voir à).

Laboratoire INAVA, E. GUIGNIER, Pharmacien.

14, rue de Normandie — ASNIÈRES (Seine).

(Tél. : Grésillons 31-30.)

VACCINS IVAGO

(Procédé L. Goldenberg.)

Les vaccins Ivago se présentent sous trois formes : Vaccins injectables, — Vaccins buvables, — Gelées-vaccins par pansements.

Vaccins IVAGO Injectables (voie Intradermique).

Les procédés spéciaux de préparation des vaccins IVAGO leur assurent les principaux avantages suivants :

Haute teneur microbienne et pouvoir antigénique très élevé sous le plus petit volume.

Absence de choc et de toute réaction générale.

Efficacité égale à tous les âges, chez le tout jeune enfant comme chez le vieillard.

Possibilité d'étendre la vaccinothérapie aux états septicémiques qui contre-indiquent la voie sous-cutanée.

Les vaccins IVAGO empruntent la *voie intradermique* parce que la peau « revêtement protecteur » est, par destinée, un organisme de défense considérable en liaisons physio-pathologiques, directes ou réflexes, avec tous les organes.

Ils sont injectés par gouttes (I à VI gouttes) dans la peau.

IVAGO « A » (antigrippal et broncho-pulmonaire).

IVAGO « B » (antipyorrhéique).

IVAGO « D » (antistaphylococcique).

IVAGO « G » (antigonococcique).

IVAGO « M » (gynécologique).

IVAGO « P » (antipyogène), avec *streptocoques*.

IVAGO « R » (antiozéneux).

IVAGO « U » (anticolibacillaire).

Vaccins IVAGO buvables.

La vaccinothérapie par voie buccale est indiquée comme thérapeutique adjuvante à la méthode de vaccination intradermique, 2 ampoules par jour dans un verre d'eau éloigné des repas.

IVAGO-COLI : pyélite, pyélonéphrite, cystite, colibacillose.

IVAGO-STA : furonculose, anthrax, abcès, acné, sycosis.

IVAGO-GRIPPE : affections broncho-pulmonaires, bronchites, complications grippales.

IVAGO-PYO, états septicémiques et infections causées par les pyogènes communs.

Gelées-Vaccins IVAGO (Usage externe).

Les gelées-vaccins réalisent l'immunité locale de la peau.

Gelée-vaccin IVAGO, Antistaphylococcique : furonculose, anthrax, sycosis, acné.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyogène (avec streptocoques) : infections causées par les pyogènes communs.

Gelée-vaccin IVAGO, Antipyorrhéique : pyorrhée alvéolaire, abcès dentaires.

Gelée-vaccin IVAGO, Gynécologique : métrites, salpingites, leucorrhée.

OVULES VACCIN IVAGO.

LUGHORHINE (Gelée-vaccin anticoryza).

Pâte Dentifrice Bleue IVAGO GM + PM.

Laboratoires IVAGO

L. BELIÈRES, docteur en pharmacie.

17, rue de Provence, PARIS (IX^e) (Tél. : Prov. 76-18.)

AMPHO-VACCINES

Ampho-Vaccines is a leading manufacturer of vaccines and biological products. The company is a subsidiary of the Amphenol Corporation, a leading manufacturer of electronic components.

Ampho-Vaccines is a leading manufacturer of vaccines and biological products. The company is a subsidiary of the Amphenol Corporation, a leading manufacturer of electronic components.

Ampho-Vaccines is a leading manufacturer of vaccines and biological products. The company is a subsidiary of the Amphenol Corporation, a leading manufacturer of electronic components.

VACCINS RONCHÈSE

« AMPHO-VACCINS »

AMPHO-VACCINS A INGÉRER.

Par cc. lysat de 1 milliard de germes et 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Amphoprophyl T. A. B. : (voir ce nom) Vaccin *préventif* anti-typho-paratyphique.

Ampho-Quintivaccin : Traitement efficace de la coqueluche et de ses complications.

Anti-infectieux : Toutes infections générales ou locales. Dermatoses. Vaccination pré ou post-opératoire.

Anti-staphylococcique : Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Antityphoïdique T. A. B. : Agent *curatif* remarquable des infections typhique et paratyphiques et, grâce à une association microbienne étendue, des affections générales indéterminées d'origine intestinale.

Intestinal : Auto-intoxications d'origine intestinale, entérites, appendicites, cholécystites, syndrome entéro-rénal, certains rhumatismes, insuffisance hépatique, préparation des malades avant les interventions abdominales, préparation aux accouchements.

Pulmonaire : Grippe, bronchites, pneumonie, broncho-pneumonie, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire : Toutes infections de l'appareil urinaire.

Présentations. — Les Ampho-vaccins à ingérer, sauf l'*Amphoprophyl T. A. B.* et l'*Ampho-vaccin intestinal*, sont présentés en : Boîtes de 10 ampoules de 2 cc. :

D'autre part, l'*Ampho-Quintivaccin* et les Ampho-vaccins anti-infectieux pulmonaire et urinaire à ingérer sont également présentés en : Coffrets de 24 ampoules de 2 cc.

L'*Amphoprophyl T. A. B.* (préventif) est présenté en boîtes de 6 ampoules de 2 cc. avec 6 pilules de bile :

L'*Ampho-Vaccin intestinal* à ingérer est présenté :

En boîtes de 8 ampoules de 5 cc.

En coffrets de 24 ampoules de 5 cc.

En coffrets de 50 ampoules de 5 cc.

Posologie moyenne. — *Ampho-vaccin intestinal* : 1 ampoule par jour, puis 1 ampoule tous les 2 ou 3 jours.

Pour les autres *Ampho-Vaccins* à ingérer : 2 à 3 ampoules par jour.

AMPHO-VACCINS INJECTABLES

Par cc. lysat de 2 milliards de germes et 200 millions de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Anti-infectieux: Toutes infections générales ou locales. Vaccin général des affections thermiques même avant le diagnostic précis. Vaccination pré-opératoire.

Anti-staphylococcique : Furoncles, anthrax, ostéomyélites, impétigo, acné, folliculites, staphylococcémies.

Intestinal : Tous états intestinaux aigus et chroniques.

Pulmonaire : Pneumonie, broncho-pneumonie, bronchite, grippe, certains asthmes, sinusites, otites, conjonctivites.

Urinaire : Toutes infections de l'appareil urinaire.

Les Ampho-Vaccins injectables sont vendus en boîtes de 6 ampoules de 1,5 cc.

Posologie moyenne. — 1 cc. tous les 2 à 3 jours (doses quotidiennes d'essai : 1/4, 1/3, 1/2 cc.).

AMPHO-VACCINS PANSEMENTS

Filtrats de cultures additionnés par cc. de 1 milliard de germes entiers stérilisés et stabilisés.

Antipyogène : Furoncles, anthrax, abcès, dermatoses infectieuses, interventions abdominales, curetages, cancers du col.

Trois présentations :

Boîtes de 3 ampoules de 10 cc.

Coffrets 12 ampoules de 10 cc.

Ampho-vaccin antipyogène pour petits pansements,
en boîtes de 10 ampoules de 2 cc.

Rhino-Pharyngien : Affections du nez, du pharynx, des oreilles, de la mastoïde, de la conjonctive. Traitement abortif du coryza. Présenté en ampoules auto-instillables.

Présentations :

Boîtes de 6 ampoules de 2 cc.

Coffrets 20 ampoules de 2 cc.

Rhino-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien). Rhino-Prophylaxie de la grippe et du coryza.

Ampho-tablettes (Voir ce nom). (Comprimés à base d'Ampho-vaccin rhino-pharyngien.)

Pyo-Amphogel (Voir ce nom). (Gelée à base d'Ampho-vaccin pansement antipyogène.)

Laboratoires des Ampho-Vaccins Ronchèse
A.-D. RONCHÈSE, docteur en pharmacie.

21, boulevard de Riquier — NICE.
Dépôt à PARIS : 62, rue Charlot (III^e).
(Tél. : Turb. 72-34.)

VACCINS " STÉNÉ "

Vaccin antifurunculoux « Sténé ». — Traitement de la furonculose et des affections à staphylocoques.

(En injections sous-cutanées, ampoules de 1 cc. — en comprimés.)

Bouillon-vaccin antifurunculoux « Sténé », pour pansements.

Vaccin anti-coryza « Sténé » polyvalent. — Traitement des Coryzas aigu et chronique, des pharyngites, angines, rhinites et de l'ozène.

Ovules-Vaccin « Sténé ». — Métrites, Salpingo, ovarites, pertes blanches.

Vaccin « opératoire » Sténé. — Préventif des complications infectieuses post-opératoires. En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

Bouillon-Vaccin « opératoire » Sténé. — Pour pansements.

Vaccin antipyrogène Sténé. — Pour le traitement des plaies. Préventif et curatif de l'infection des plaies de toutes natures.

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En Bouillon-Vaccin pour pansements.

Vaccin Antistaphylococcique « Sténé ».

Bouillon-Vaccin Antistaphylococcique « Sténé »

En ampoules de 1 cc. pour injections sous-cutanées.

En bouillon-vaccin pour pansements.

Produits « STÉNÉ »

2 bis, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 46-47.) Adr. télégr. : Sténé 21 Paris.

VACCINS « VIRULTRA »

Anti-Pyogène chirurgical « Virultra ». — Pré et postopératoire.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 26 fr.

Anti-Pyogène général « Virultra ». — Toutes affections pyogènes et septicémies.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

— : 3 amp. de 2 cc. — : 20 fr. 80

Furunculose, Eczéma, Erysipèle.

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 26 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr. 75

Brûlures, Plaies, Anthrax, Phlegmons, etc.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Broncho-Vaccin « Virultra ». — Grippe, Broncho-Pneumonies et toutes affections broncho-pulmonaires.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

— : 3 amp. de 2 cc. — : 20 fr. 80

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. — : 20 fr. 80

Dermultra « Virultra ». — Pour toutes affections dermatologiques.

Une seule forme : Pommade-Vaccin. Le tube : Prix public : 12 fr. 50

Enterultra « Virultra ». — Colibacillémies, Enterococcémies et toutes affections intestinales.

Une seule forme : Ampoules buvables.

6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Gynécologique « Virultra ». — Métrites, Salpingites, Fièvre puerpérale, etc...

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 10 cc. — : 26 fr.

— : 3 amp. de 10 cc. — : 18 fr. 75

Ophthalmologique « Virultra ». — Toutes affections oculaires suppurées.

Une seule forme : Pansement.

Prix public : 6 amp. de 2 cc. : 18 fr. 75

Oto-Rhino-Laryngologique « Virultra ». — Rhinites, Sinusites, Mastoidites, Coryzas, Laryngites, Otites, Rhume des foins, etc.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement : 6 amp. de 5 cc. — : 25 fr.

— : 6 amp. de 2 cc. — : 18 fr. 75

Uro-Vaccin « Virultra ». — Toutes affections gonococciques.

Forme injectable : 6 amp. de 2 cc. Prix public : 31 fr. 20

Forme pansement (pour homme) : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Forme pansement (pour femme) : 6 amp. de 10 cc. Prix public : 26 fr.

Forme buvable : 6 amp. de 5 cc. Prix public : 20 fr. 80

Nota. — L'Uro-Vaccin « Virultra ». — Pansement (H ou F.) peut être utilisé *in loco* pour le traitement de l'ophtalmie purulente du nouveau-né.

Ultrovules « Virultra ». — Pour pansement génital de la femme dans toutes affections microbiennes utérines.

Une seule forme : ovules-vaccin. Prix public : 26 fr.

G. TAUPIN, Pharmacien de 1^{re} classe.

Dépôt général pour la France : O. C. P.

Laboratoires « VIRULTRA »

LAUNAY-SERQUIGNY (Eure). — (Tél. : 19 à Serquigny.)

VACLYDUN

Lysats-vaccins du Docteur Louis Duchon.

Adoptés par les Hôpitaux de Paris.

Le Vaclydun est un vaccin d'un type entièrement nouveau. Il est obtenu par un procédé exclusivement biologique. Utilisation des propriétés du bacille pyocyanique qui lyse les germes, neutralise leurs toxines (en particulier, la toxine diphtérique), ce qui permet sa stérilisation par filtration sur bougie serrée. Il est donc un « vaccin vivant ».

Voir : Broncho-Vaclydun ; Coli-Vaclydun ; Entéro-Vaclydun ; Gynéco-Vaclydun ; Gono-Vaclydun ; Pyo-Vaclydun ; Rhino, Staphylo et Strepto-Vaclydun ; Grippe-Vaclydun.

VACLYDERM

Composition. — Le Vaclyderm est le Pyo-Vaclydun incorporé à un corps gras.

Indications. — Réalise une vaccinothérapie cutanée locale. Toutes les Dermites, Furunculose, Anthrax, Impétigo, Folliculites, Erysipèle, etc.

Mode d'emploi. — En applications locales, 2 à 3 fois par jour. Peut être associé à la vaccination profonde.

Le tube : 19 francs.

Laboratoire Pharmaceutique CORBIÈRE

27, rue Desrenaudes — PARIS.

(Tél. : Carnot 78-11.) — Télégr. : Pantuto 74 Paris

VAGOGASTRYL

Traitement rationnel des Gastralgies, des Spasmes, des Etats Anxieux.

Présentation. — Cachets.

Composition. — Belladone totale (1 cgr.). Kaolin colloïdal. Carbonate de Bismuth purifié. Bicarbonate de Soude.

Propriétés thérapeutiques. — 1° Saturant de l'acidité gastrique ; 2° Sédatif du Vague.

Indications. — 1° *Gastralgies* : Hyperchlorhydries, Ulcères, Aérophagie. 2° *Spasmes* : Gastriques, Intestinaux, Utérins, Vaginaux, Sphinctériens, Coliques hépatiques.

3° *Vomissements réflexes* : Mal de Mer, Mal de l'Air, Mal de Montagne, Etats gravidiques.

4° *Etats anxieux* : Psychasthénie, Neurasthénie, Mélancolie, Anxiété dans les Psychoses.

Posologie. — 1 à 2 cachets après chacun des 2 principaux repas et au moment des douleurs.

Pour un traitement d'une semaine. Prix : 12 fr. 80.

Prix spéciaux aux Etablissements hospitaliers.

Laboratoires de Vagothérapie,
M. Crozet, Docteur en pharmacie.
SAINT-VENANT (Pas-de-Calais).

VAGORIANE

Troubles du Vago-Sympathique à prédominance Vagale.

Formule :

Lobe antérieur d'hypophyse	0,01	Extrait de Cratægus	0,01
Camphre monobromé.....	0,05	— Valériane	0,015
Diéthylmalonylurée	0,05	— Boldo	0,015
Chlorure de Magnésium....	0,05	— Guarana.....	0,015
Extrait de Passiflore.....	0,025	— Jusquiame	0,0075
— Ballote	0,01	— Marron d'Inde.	0,005
— Combretum.....	0,01	— Belladone.....	0,005

Par comprimé dragéifié.

Indications. — VAGOTONIE, dépression, vertiges, anxiété, insomnies ou mauvais sommeil, torpeur et inquiétude, désordres psychiques frustes, douleurs erratiques variées, céphalées frontales et occipitales, état nauséux, auto-intoxication, spasmes, anabolisme, perturbations circulatoires, désordres mensuels chez la femme et dysgénésie chez l'homme.

Posologie. — 4 comprimés en moyenne, 8 au plus par jour.

Prix: 17 fr. 20 (40 dragées par boîte).

Pour les Sympathicotoniques, voir : SYMPATHORIANE.

Enregistré Laboratoire Contrôle des Médicaments sous le n° 988-2.

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (Seine-et-Oise). (Tél.: 11.)

VAGOSÉDYL

Sédatif du vague.

Phényléthyl-Malonylurée	} aa 0 gr. 017
Extrait de Jusquiame titré en alcaloïdes.....	
Extrait de Valériane fraîche et stabilisée	
Oxyde de zinc préparé par voie humide	

VAGOSÉDYL réalise une formule de Méglin améliorée.

Doses moyennes. — 2 à 4 comprimés par jour.

Indications principales. — Hypervagotonie, Spasmo-philie, Algies et Spasmes viscéraux, Entéronévroses, Gastronévroses, Aérophagie, Mal de Mer, Troubles réflexes des ptoses, Malaises en rapport avec la Menstruation, la Grossesse, la Ménopause, Symptômes subjectifs du Cœur, Artériospasme, Dyspnées spasmodiques, Angoisses, Nervosisme, Mélancolie anxieuse, Neurasthénie, Excitation psychique, Troubles du Sommeil.

Prix du flacon : 16 fr. 50.

Laboratoire VALTRY,

122, Champs-Élysées, — PARIS.

VAGOSTABYL MONIN

Comprimés dragéifiés.

A base de Marjolaine. — Sans Barbituriques.

Traitement phytothérapique de toutes dystonies Vago-Sympathiques.
Communication Société de Biologie, tome CXV.

Composition. — Oléosaccharure de Marjolaine (*Origanum majorana*, labiées). Lactate de Calcium, Cimicifugine. Hyposulfite de magnésie.

Propriétés. — Régulateur et stabilisateur très actif du système nerveux.
Action tonocardiaque : diminue la fréquence, augmente l'amplitude.

Indications. — Toutes Dystonies vago-sympathiques. — Insomnies. — Affections cardiaques : Tachycardie, Arythmie, Palpitation, Angor. — Troubles de la vie végétative : Basedow, Ménopause, grossesse, déséquilibre du métabolisme basal. — Asthme nerveux. — Symptômes nerveux pré et post-opératoires. — Algies : Céphalées rebelles, Névralgie faciale, Douleurs des sinusites — Troubles nerveux divers : Bourdonnements et sifflements d'oreilles, hoquet, mal de mer. Aérophagie, Vertiges, spasmes. — Epilepsie, Agitation. Dermatoses nerveuses.

Posologie. — 1^{er} jour : 6 à 8 dragées, doses fractionnées. Jours suivants : doses décroissantes jusqu'à 2 dragées.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 696.

Laboratoire MONIN

Bureaux et Correspondances.

49, rue de Maubeuge — PARIS (IX^e). (Tél. : Trudaine 37-45.)

VALBORNINE ROGIER

(Iso-Valérianate de Bornyle Bromé.)

Perles. — 3 à 6 par jour avant les repas ;
ou, pour l'insomnie, 2 perles le soir, deux heures après un léger repas.

Propriétés. — Antispasmodique énergique et puissant sédatif du système nerveux, régulateur de la circulation et de la respiration.

N. B. — La Valbornine n'est pas un soporifique. Le sommeil n'est régularisé qu'au bout de quelques jours par sédation du système nerveux.

Le flacon : 12 fr. 30

Laboratoires Henry ROGIER

56, boulevard Péreire — PARIS.

(Tél. : Wagram 33-70.)

VALBROL

Essai de rajeunissement de la Formule de Meglin.

Composition :

Extrait alcoolique de valériane <i>stabilisée</i>	0 04
Extrait alcoolique de jusquiame.....	0 005
Extrait de datura	0 003
Extrait alcoolique de passiflore	0 03
K Br.	0 05
Extrait alcoolique de cratægus.....	0 03

pour une dragée de 0 gr. 18.

40 dragées par étui — Prix en France : 15 francs.

Propriétés. — Activité due à la valériane stabilisée et à l'association jusquiame-passiflore, beaucoup moins toxique que la jusquiame employée seule, aux doses thérapeutiques (H. Leclerc). Le cratægus agit synergiquement.

Indications. — États nerveux : angoisse, mélancolie, anxiété, Insomnie, quelle qu'en soit l'origine : surmenage, éthyisme, affections cardiaques ou vasculaires, digestives, génitales.

Posologie. — États nerveux : 1 à 2 dragées par jour.

Insomnie : 1 à 3 dragées le soir au coucher.

A avaler sans croquer avec une boisson chaude.

20 jours de traitement.

Laboratoires MAYOLY-SPINDLER

I, place Victor-Hugo — PARIS (XVI^e). Tél. Passy 51-12.

A Bruxelles : LE MARINEL. pharm., 4, avenue Orban.

VALEDYL

Propriétés thérapeutiques. — Traitement phytothérapique des névropathes, cardiopathes.

Indications. — Insomnies, vertiges, neurasthénie, états spasmodiques, états névropathiques, troubles cardiaques.

Formule. — Extraits stabilisés de valériane, de Passiflore, de cratægus, acide diacétylbarbiturique sodique, alcoolature de ballote, teinture de gelsénium.

Forme. — Le Valedyl est présenté sous forme de liquide sirupeux sans aucune odeur.

Mode d'emploi. — En cas de troubles nerveux ou cardiaques, 1 cuillerée à café avant les 3 repas. En cas d'insomnie, 1 à 4 cuillerées à café le soir au coucher.

Enregistré au Laboratoire National de Contrôle des Médicaments sous le N^o 403-34.

Laboratoire HOCQUETTE

191, rue du Faubourg-Saint-Antoine — PARIS.
(Tél. : Diderot 04-71.)

VALÉNAL

Sédatif nerveux. Hypnotique doux.

Composition. — Pour 1 dragée :

VALÉRIANE extrait	0,045
Cratægus extrait.....	0,015
Saule blanc extrait	0,015
Passiflore extrait	0,015
Hamamélis extrait	0,01
LUGONAL (<i>Phényléthylmalonylurée</i>) ...	0,005

Association logique, bien dosée, active et sans danger.

Indications. — Déséquilibre du sympathique, Insomnies, Agitation nerveuse, Hyperémotivité, anxiété, palpitations. Etats nerveux de la ménopause. Hypertension (surtout spasmodique).

Posologie. — De 1 à 4 dragées par jour (dose pouvant être largement dépassée).

Les Laboratoires du LUGOCALCION
OULLINS (Rhône).

VALÉRIANATE GABAIL DÉSODORISÉ

Simple ou Bromuré.

Composition :

Simple : 0 gr. 50 d'extrait de Valériane, par cuillerée à café.

Bromuré (Élixir Gabail) : 0 gr. 50 d'extrait et 0 gr. 25 de Bromure de Strontium, par cuillerée à soupe.

Indications. — Toutes les affections nerveuses.

Simple : 4 cuillerées à café par 24 heures.

Bromuré : 4 cuillerées à soupe par 24 heures.

(Comme *Hypnotique* : 2 cuillerées à soupe une heure avant le coucher).

Prix : Le flacon : 22 francs.

Laboratoires GABAIL

55, avenue des Ecoles — CACHAN (Seine).
(Tél. : Alésia 23-48.)

VALÉRIANATE GRIGNON

à odeur dissimulée.

Composition. — Contient tous les principes actifs de la plante fraîche.

Forme. — Liquide de goût agréable, l'odeur de valériane étant absolument masquée.

Propriétés thérapeutiques. — Antinerveux, antispasmodique.

Dose et mode d'emploi. — 2 à 3 cuillerées à café par jour.

Prix : 10 fr. 20.

Pharmacie GRIGNON

2, rue Duphot — PARIS.

(Tél. : Opéra 30-50.)

VALÉRIANATE PIERLOT

Composition :

Distillat représentant 2 fois son poids
de racines fraîches et sauvages de
valériane..... 5 cc.
Carbonate d'ammoniaque Q. S.
pour saturer, par cuillerée à café.

Indications. — Neurotrope, sédatif, inof-
fensif, le *Valérianate Pierlot*, rétablit
toujours l'équilibre du système nerveux
en supprimant l'excitabilité morbide des
neurones.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à café
dans un peu d'eau sucrée ou non le soir
avant de se coucher et le matin à jeun.

Prix : 20 fr. 40.

DRAGÉES PIERLOT

à la liqueur concentrée de *Valérianate Pierlot*,
associé au *Cratægus*.

Noyau liquide. Absence totale de produits
toxiques. Aucune odeur, goût masqué.

Indications. — Troubles du sommeil.
Troubles nerveux, de la puberté et de la
ménopause. Troubles nerveux fonctionnels
du cœur.

Composition :

Distillat représentant 10 fois son
poids de racines fraîches et sau-
vages de valériane (*Valérianate
Pierlot* concentré)..... 1 c.
Carbonate d'ammoniaque Q. S.
Extrait de *cratægus*..... 0,08
(Par dragée.)

Mode d'emploi. — Croquer de 1 à 3 dragées
par jour et avaler de préférence avec un
peu d'eau.

Prix : 20 fr. 40.

Laboratoires RIVIER

10, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél. : Al. sia + 22-46.)

VALÉRIANE GMET

Composition. — Extrait total obtenu exclusivement à l'aide de racines de valériane sans adjonction d'acide valérianique ou d'autres produits de synthèse. Sans alcool. Sans sucre.

Propriétés. — Puissant toni-sédatif du système nerveux central et périphérique.

Odeur conservée (indice de son activité), mais *goût peu prononcé*. Bien acceptée par les femmes et les enfants.

Indications. — Tous les états d'excitation et de dépression nerveuse, Névroses, Insomnie, Epilepsie, Chorée, Nervosisme, Convulsions, Terreurs nocturnes, Cauchemars. Dans la neurasthénie lui adjoindre le *Composé Gmet*. (Voir ce nom.)

Posologie. — 1 à 2 cuillerées à café avant les repas.
Le flacon de 135 cc. 22 fr. 45.

Laboratoire GMET

Docteur A. LOROT, Pharmacien,
27, faubourg Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 43-10.)

VALÉRIANE PACHAUT

Préparation liquide contenant les principes actifs de la valériane fraîche sans addition d'aucun hypnotique ou stupéfiant.

Indications. — Névroses, états spasmodiques, insomnies.

Posologie. — 1 à 4 cuillerées à café par jour.

La Valériane liquide PACHAUT est **inodore** et d'une **saveur agréable**.

Prix : 16 fr. 65.

Laboratoires THOMAS

33, faub. Montmartre — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 49-77.)

VALÉRIUM PAUL THIBAUT

Dragées de *Valérianate de Cérium, sans odeur, de P. Thibault*, licencié ès sciences physiques, ancien président de la Société de pharmacie de Paris. Le meilleur sédatif régulateur du système nerveux. Action particulièrement élective sur le grand sympathique.

Indications. — Troubles gastriques d'origine névropathique, Dyspepsies nerveuses, Vomissements chroniques, Vomissements incoercibles de la Grossesse, Insomnies, Névralgies, Neurasthénie, Mal de Mer, Hoquet.

Posologie. — Prescrire 2 dragées le matin et 2 dragées dans le milieu de la journée. Dans les affections chroniques, prescrire, si possible, 2 dragées 2 à 3 heures avant les troubles. Continuer le traitement 10 à 12 jours. Cesser 2 à 3 jours et reprendre.

Les dragées de *Valérium P. Thibault* sont dosées à 0,05 de principe actif.

Prix : 16 francs.

Pour un traitement de 8 à 10 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e). (Tél. : Gobelins 06-89.)
Enregistré au Laboratoire National n° 218-10.

VALÉROBROMINE LEGRAND

Composition. — Ethers-Sels de l'acide « Bromovalérianique ».



Avantages. — La VALÉROBROMINE LEGRAND (brome organique) offre, par rapport aux bromures (brome minéral), des avantages de même ordre que les Cacodylates et les Glycérophosphates (arsenic et phosphore organiques), par rapport aux arsénates et aux phosphates (arsenic et phosphore minéraux). Elle possède, contrairement au valérianate d'ammoniaque, une régularité d'action constante, et sa toxicité, quatre fois moindre que celle de ce produit, est nulle aux doses usitées. Effets plus nets et plus durables que les bromures et les valérianates, sans avoir à redouter, quelles que soient la durée du traitement et les doses employées, les inconvénients trop connus de ces produits.

Indications. — Toutes les névroses : Epilepsie, Insomnies nerveuses, Hystérie, Migraines, Vertiges, Coqueluche, Neurasthénie, Troubles mentaux de la ménopause, etc...

Formes. — Liquide : 0,50 de bromovalérianate de soude par cuillerée à café, 2 à 6 cuillerées à café par jour. — Capsules : 0,25 de bromovalérianate de magnésie par capsule enrobée de gluten, ne se dissolvant que dans l'intestin. 4 à 12 capsules par jour.

DARRASSE

13, rue Pavée — PARIS (IV^e).

Nota. — La lettre M représente dans cette formule la soude ou la magnésie, suivant la forme pharmaceutique.

VALÉRONAL

Solution ou comprimés.

Sédatif puissant et inoffensif
des troubles nerveux, Psychopathies.

Hypnotique doux sans odeur.

Antispasmodique.

Par cuillerée à café ou par comprimé.

Acide diéthylbarbiturique en solution
ammoniacale 3 gr 25
Intrait de Valériane 0,05
par 100 cc. d'excipient liquide.

Dose sédativ. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé
2 à 3 fois par jour.

Dose hypnotique. — 1 cuillerée à café ou 1 comprimé avant le dernier repas et 2 ou 3 au coucher dans infusion.

Pas de contre-indication.

Laboratoire BERGER

14, rue des Pyramides — PARIS

VALÉROQUINQUINA

Médication sédativ pour le traitement symptomatique des syndromes douloureux neuro-végétatif et du vago-sympathique.

Composition : 100 grammes contiennent :

Extrait fluide de Valériane	12 gr. 00
Extrait fluide de Passiflora incarnat.	12 gr. 00
Extrait fluide de Crataegus oxyacantha.	6 gr. 00
Extrait fluide de Belladone racine.	0 gr. 30
Extrait fluide de Quinquina Succirubra.	1 gr. 20
Solution hydro-alcool ; sucrée.	68 gr. 50

Indications. — Troubles de déséquilibre neuro-végétatif (Emotivité, Insomnies, Hyperexcitabilité, Irritabilité, Angoisse). Troubles névropathiques, vaso-moteurs et cardiaques par sympathicotomie, Troubles circulatoires, Inquiétude sexuelle, Anémie, Débilité, Surmenage, Constipation.

Posologie. — De deux à trois cuillerées à soupe par jour avant les repas.

Contre l'insomnie, de une à deux cuillerées à soupe le soir avant de se coucher.

Solution sirupeuse stable de goût très agréable, non toxique et sans risques d'intolérances.

Enregistré au L. N. C. M.

Prix : le flacon, 25 francs.

Produits Biochimiques ROSSO

Laboratoires CLEVENOT et ROSSO

3, rue Lamblardie — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dor : 56-38.)

VALLATHEN

Traitement des maladies de la peau.
Organothérapie Bellas.

Présentation. — En boîtes de 50 dragées.

Composition. — Suc intestinal, Extrait de pancréas, Extrait hépatique, Soufre lavé.

Indications. — Eczémas, Furonculose, Anthrax, Blépharite, Orgelets, Séborrhée, Acné vulgaire, Acné rosacée, Urticatoire et toutes dermatoses.

Posologie : Adultes : Dose moyenne, 2 dragées 3 fois par jour, 1/2 heure avant les repas ;

Enfants (au-dessus de 6 ans) : Dose, 1 à 3 dragées par jour selon l'âge.

Ces doses peuvent être augmentées ou diminuées selon la gravité des cas.

Veiller à ce que le malade ait tous les jours une selle régulière.

Enreg. au L. N. C. M. n° 167-16.

Laboratoires ABADIE-TANZI

B. Abadie, pharmacien,

3, pl. Intérieure-St-Michel - TOULOUSE. Tél. 213-06.

VAL'OVARINE FARMA

Déficiences ovariennes, Nervosisme, Douleurs, Malaises, Insomnies.

Composition : { Ovarine intégrale 20 cent.
(Par cachet) { Intrait de valériane fraîche stabilisée.. 12 —

Avantages. — Odeur agréable. Conservation garantie par procédé spécial. Présentation soignée. Tolérance parfaite. Assimilation facile.

Posologie. — Sauf indication spéciale du médecin traitant, la cure moyenne de VAL'OVARINE doit être faite chaque mois à raison d'une boîte de cachets à prendre au cours des dix jours qui précèdent les règles. (Un au milieu de chaque grand repas, soit deux par jour.)
(Traitement à suivre également en cas d'obésité glandulaire.)

Pour obtenir un effet certain et durable, on continuera ce traitement pendant 3 à 4 mois consécutifs.

Les femmes ayant subi l'OVARIECTOMIE ou qui ont passé l'âge critique choisiront de préférence pour suivre un traitement de dix jours de VAL'OVARINE une période où elles constatent soit du nervosisme, soit de l'insomnie, soit une sensation de pesanteur.

Prix : 22 francs.

Laboratoire de la VAL'OVARINE

1, avenue Eugène-Thomas — KREMLIN-BICÊTRE (Seine).

(Tél. : Italie 20-18.)

VALOVOSAN

Composition :

Folliculine	40 U. I.
Poudre d'ovaire frais.....	0 gr. 40
Bromisovalérylurée.....	0 gr. 15

Pour 1 comprimé.

Action. — *Sédatif des troubles nerveux liés à l'insuffisance ovarienne.*

Indications. — Troubles psychiques de la puberté, du pré-ménstruum et de la ménopause : Instabilité, Irritabilité, Angoisses, Insomnie, Palpitations, Prurit vulvaire. Vaginisme, Frigidité, Dysménorrhées, Aménorrhées occasionnelles, Vomissement incoercibles et troubles sympathiques de la grossesse.

Posologie. — 2 comprimés, 3 fois par jour.

Présentation. — Flacon de 40 dragées.

LE PROGRÈS SCIENTIFIQUE

M. LEFEBVRE, Pharmacien,

25, boulevard de La Tour-Maubourg — PARIS (VII^e).
(Tél. : Ségur 60-77.)

VALTHÈNE

(Gouttes)

Antispasmodique puissant.

Indications. — Toux laryngées, coqueluche, asthme, toux rebelles des tuberculeux.

Composition. — Alcoolature d'Allum Cepa, Teinture de Drosera, Teinture de Cochenille.

Ne contient aucun toxique. Goût agréable.

Posologie. — Doses moyennes à prendre dans une petite quantité d'eau sucrée et à répéter 4 à 5 fois par jour.

Enfants au-dessous d'un an... V à X gouttes.

— de 1 an à 5 ans X à XX —

— au-dessus de 5 ans... XX à XL —

Adultes..... L à LX —

Flacon de 30 cc. Prix : 13 fr. 50.

Laboratoire de la VALTHÈNE
VALAT

166, rue de la Roquette — PARIS (XI^e).
(Tél. : Roquette 25-47.)

VANADARSINE GUILLAUMIN

GOUTTES

Composition. — Solution d'arséniate de Vanadium au centième.

Propriétés. — Puissant stimulant de l'appétit, sans aucune action néfaste sur l'estomac et les intestins. Augmente le taux de l'hémoglobine, le poids et les forces. Sous son influence, le teint redevient frais.

Indications. — S'emploie avec succès dans la prétuberculose et la tuberculose, la chorée, le rachitisme des enfants, les états anémiques, chlorotiques, dans la neurasthénie, les dépressions nerveuses, le surmenage, le paludisme, les leucémies et les convalescences.

Mode d'emploi. — La *Vanadarsine* s'administre aux mêmes doses que la liqueur de Fowler : dose moyenne : X gouttes dans un peu d'eau avant les 2 principaux repas.

Prix : 16 fr. 50.

VANADARSINE GUILLAUMIN

AMPOULES

(Sérum Vanadarsiné)

Composition. — Ampoules contenant 0 gr. 002 arséniate de vanadium par cc.

Propriétés. — Solution très stable, indolore, parfaitement tolérée en injections hypodermiques. Reconstituant globulaire sanguin de premier ordre, oxydant énergique, excite l'appétit, augmente le poids et les forces et stimule les combustions organiques.

Indications. — Chlorose, anémie, prétuberculose, tuberculose, chorée, rachitisme, paludisme, syphilis, asthénie, leucémies, neurasthénie, surmenage, convalescence, anorexie.

Mode d'emploi. — *Adultes* : Injecter 1 à 3 cc. par jour ou tous les deux jours.

Enfants : Injecter selon l'âge.

Faire une vingtaine d'injections. Après 8 à 10 jours de repos, recommencer le traitement si nécessaire.

Se prescrit en ampoules de 1 cc. (prix 20 francs.), et de 3 cc. (dose forte) (prix 23 fr. 50).

Laboratoires ANDRÉ GUILLAUMIN

13, rue du Cherche-Midi — PARIS.

(Tél. : Littré 26-92.)

VANOXYLE MILLET

AMPOULES

Composition :

Solution isotonique et isoionique de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, non arsénée.

Propriétés :

Médication vanadiée oxydante, amélioratrice du terrain. Stimulante et tonique.

Indications :

Toutes les asthénies, anémies, convalescences, tuberculose, pré-tuberculose, paludisme, syphilis.

Présentation :

12 Ampoules de 10 cc. correspondant à 20 mgr. de Métavanadates, soit 8 mgr. 3 de Vanadium métal.

Mode d'emploi :

En injections intra-musculaires, chez les adultes. Commencer par une demi-ampoule, puis 3/4, puis l'ampoule entière, tous les deux jours.

Prix : 21 fr. 75.

GOUTTES

Composition :

Solution stable de Métavanadates de Sodium et de Magnésium, *non arsénée*, à 5 p. 1000.

XX gouttes correspondant à 5 mgr. de Sels de Vanadium.

Propriétés et Indications :

Celles des ampoules.

Mode d'emploi :

Les gouttes de Vanoxyle se prennent au début du repas, dans un peu d'eau.

Adultes : XX à XXX gouttes deux fois par jour.

Enfants : selon l'âge, V à X gouttes deux fois par jour.

Prix : 16 fr 30.

Laboratoires Thérapeutiques

A. MILLET et CH.-O. GUILLAUMIN

4, rue Richer — PARIS.

(Provence 20-20 et 58-43.)

VAN-SOL

Cachets

Formule :

Poudre de colchique.....	0,03
Acide acétylsalicylique	0,50
Acide phénylcinchoninique	0,25

Forme. — Boîte de 20 cachets.

Propriétés thérapeutiques. — Toutes les formes de rhumatismes et névralgies de toute origine.

Mode d'emploi. — De 2 à 4 cachets par jour, pris de préférence au moment des repas, autant que possible à intervalles réguliers, en laissant un intervalle de 4 heures entre chaque cachet.

Ne pas en donner aux enfants.

Prix : 16 fr. 65 la boîte.

Laboratoire P. et R. PLAGNOL

18, rue du Maréchal-Foch — VERSAILLES
(S.-et-O.)

VAPOSULPHIUM

Comprimés sulfurés pour inhalations.

Propriétés thérapeutiques. — Le Vaposulphium comprimés inhalants sulfurés rend pratique la cure soufrée externe par inhalation. Il complète la cure soufrée interne par le Sulphium.

Indications. — Rhumes, Enrouements, Laryngites, Pharyngites, Catarrhes, Sinusites et toutes affections des voies respiratoires.

Mode d'emploi. — Mettre un comprimé dans un bol d'eau bien chaude (salée, si on désire un liquide voisin de l'isotonicité), et respirer les vapeurs sulfureuses.

Laboratoires BRISSON

Docteur DEDET et Cie Pharmaciens.

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

VARILAXINE

Groupe cinq laxatifs différents : Rhubarbe, Cascara, Podophyllin, Rhamnus, Tamarin, mais d'action équivalente.

Chaque boîte renferme 5 tubes,
numérotés de 1 à 5.

Doses et mode d'emploi. — Avaler, sans les croquer, deux Comprimés avant le repas du soir, en alternant du n° 1 au n° 5, pour reprendre au n° 1 le sixième jour, et continuer la variation.

Propriétés thérapeutiques. — Action laxative toujours identique. — Jamais d'accoutumance ni d'irritation. — Tolérance parfaite. — Innocuité absolue.

Prix : 12 fr. 80 la boîte.

Laboratoire de la VARILAXINE

SURGÈRES (Charente-Inférieure).

(Tél. : 59.)

VARIPHILE

Forme. — Pilules dragéifiées.

Composition. — Extrait de cupressus, 0,04 ; Extrait d'Hamamélis, 0,04 ; Extrait d'œsculus, 0,04 ; Poudre d'ovaire, 0,004 ; Poudre de surrénale, 0,004 ; Poudre de thyroïde, 0,004, pour une pilule.

Propriétés pharmacodynamiques. — Tonifie les vaisseaux, fluidifie le sang et active la circulation générale par une association médicamenteuse synergique d'extraits de glandes endocrines et d'extraits de plantes aux propriétés vaso-constrictives et hémostatiques.

Indications. — Affections veineuses (varices, hémorroïdes, varicocèle, phlébites).

Troubles circulatoires (accidents de la puberté et de la ménopause).

Mode d'emploi. — 2 pilules à chacun des 2 principaux repas pendant 3 à 4 semaines, arrêter une semaine et reprendre ainsi de suite.

Prix : 17 francs la boîte de 60 pilules pour 15 jours de traitement.

Laboratoire de L'UROFLUX

21, rue de Lyon — PARIS (12°).

VARISCLÉRINE

(Ampoules).

**préparées selon les indications
du professeur Sicard.**

Injectons sclérosantes intravariqueuses,
sans accidents, sans succès.

Varisclérine A : Salicyl. de soude.

Varisclérine B : Quinine.

Prix de la boîte de 12 : 31 fr. 20.

Laboratoire Angelini,
61, rue de Seine — PARIS
(Tél. : Danton 92-73.)

et chez tous les commissionnaires
de droguistes.

Détail : Dans toutes les pharmacies.

VASCOSODINE

Sa préparation demande environ deux mois.

Troubles de la circulation chez l'homme et chez la
femme. Dépourvue de toute action irritante et
de toute toxicité. Ne contient pas d'iode.

Composition. — Hamamélis, Seneçon, Gul, Passiflore,
Cimicifuga, Viburnum, Gossypium, Marron d'Inde,
Citr. de Na., Organes frais : pancréas, foie.

Indications. — Hémorroïdes, Varices, Phlébites, Arté-
riosclérose, Vertiges, Bourdonnements d'oreille, Sur-
dité, Otosclérose, Rougeurs du visage, Congestions,
Chaleurs, Lourdeurs de tête, Dartres, Eczémas, Pu-
berté, Menstruation, Angoisses, etc...

Posologie. — XXX gouttes dans un peu d'eau sucrée
ou non, avant chacun des deux principaux repas.

Cure immédiate : 2 flacons. Cure d'entretien : 1 flacon
tous les deux mois.

Prix du flacon de 30 cc. : 12 fr. 50.

Enr. au L. N. C. M. n° 1837-4.

Laboratoire LORMEAU
27, rue Planchat — PARIS (XX°).

VASCUROL

(Dragées)

Traitement de l'hypertension et des troubles de la ménopause.

Composition. — Gui, cratægus, formine iodée, scille, pyrole, extraits laxatifs et opothérapiques.

Indications. — Hypertension, Presclérose et Artério-sclérose, Troubles de la ménopause, Varices, Hémorroïdes, Obésité.

Mode d'emploi. — 2 dragées au début de chacun des deux principaux repas.

Prix : 21 francs.

Laboratoire P. GUÉRIN

86, rue de la Réunion — Paris (XX^e).

VASO-NEURINE

Extrait de Jaborandi et Chlorure de magnésium.

Forme. — Gouttes.

Indications thérapeutiques.

Troubles circulatoires : Troubles des règles et Ménopause, Congestions broncho-pulmonaires, Hémoptysies, Vertiges, Bourdonnements d'oreilles.

Troubles glandulaires : Congestion thyroïdienne, ovarienne, pancréatique : Troubles sécrétoires, salivaires et cutanés. Sécrétion lactée.

Troubles sensitivo-moteurs : Arythmie, Tachycardie, Névralgisme facial, Névro-dermites.

Mode d'emploi. — VIII à XV gouttes, 2 à 3 fois par jour dans un peu d'eau, en commençant par la dose la plus faible.

Après les repas, matin, midi et soir.

Prix de vente au public : 19 fr. 10 le flacon.

Laboratoire de Pathologie Générale de Paris

5, rue François-Ponsard — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 35-25.)

VASO-RHINOL

Simple et mentholé.

Forme. — Solution huileuse.

Composition. — 1° (V. R. simple) : Oxyde de Terpilène, Résorcine, Camphre, Linalol; Para-amido-benzoate d'éthyle, Terpènes purifiés, Huile olive stérilisée.

2° (V. R. Mentholé) : Même formule plus menthol.

Indications. — 1° V. R. simple : Infections du Nez, du Pharynx, du Larynx et des Oreilles.

2° V. R. mentholé : Troubles sécrétoires, état congestif du Rhino-Pharynx, des Fosses nasales et du Sinus.

Doses. — X gouttes ou plus selon les cas, 2 à 4 fois par jour en position couchée.

Prix : 14 fr. 75.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n^{os} 219-8 et 219-9.

Laboratoire des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE

VASO-RHINOL ADRÉNALINÉ

Forme. — Pommade pour enfants et adultes.

Composition. — 1° Pommade pour enfants : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Pétroléine ;

Prix : 9 fr. 40.

2° Pommade pour adultes : Solution d'Adrénaline au millième, Eucalyptol, Résorcine, Novocaïne, Pétroléine.

Prix : 10 fr. 40.

Indications. — Infections du Rhino-Pharynx, Etat catarrhal, Troubles Vaso-Moteurs.

Doses. — Gros comme un pois dans chaque narine, deux à trois fois par jour.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n^{os} 219-6 et 219-7.

Laboratoires des VASO-RHINOL

20 bis, rue Gravelotte — TOULOUSE.

V. A. V.

Propriétés thérapeutiques. — Antitoxiques et curatives qui permettent d'éviter parfois les interventions chirurgicales, l'hospitalisation et les immobilisations prolongées.

Indications thérapeutiques. — Adénites, Ostéites, Arthrites bacillaires, Péritonites, Bacilloses rénales, Lésions oculaires, Granulomes annulaires, Pityriasis, certains Psoriasis, Lupus, etc., associés ou non aux lésions pulmonaires.

Forme et mode d'emploi :

a) *Emulsion forte* pour tuberculoses chirurgicales : injectable. Doses croissantes : 0,25, 0,50, 1, 1,5, 2 et 2 cc. tous les 4 jours. Doses massives : 2 cc. une fois par semaine.

b) *Emulsion faible* : injectable :

1° Pour tuberculoses pulmonaires et chirurgicales associées, 0,50 cc. une fois par semaine ;

2° Pour tuberculoses chirurgicales chez d'anciens tuberculeux pulmonaires, 0,25, 0,50, 1, 1,5, 2 et 2 cc. une fois par semaine.

3° Pour tuberculoses pulmonaires seules, 0,50 une fois par semaine. Valable 2 ans.

Prix au public : 65 et 68 francs.

Enregistré au L. N. C., n 1203.

Laboratoire ELOCINE

51, rue du Ranelagh — Paris (XVI^e).

(Tél. : Auteuil 84-18.)

VAXA

Composition :

Cultures de Bacterium Coli.....	55
— d'entérocoques	15,5
— de Proteus Vulgaris	15
— de Staphylocoques.....	8
— de Streptocoques.....	5
— de Sarcines	1
— de Bacilles Pyocyaniques	0,5
pour 100	

Propriétés : C'est un bouillon-vaccin polymicrobien et polyvalent, riche en corps microbiens, endotoxines et produits de lyse spontanée. Il est préparé avec des souches isolées et renouvelées pour chaque préparation.

Indications. — *Enfants, Adultes.* Colites, colibacilloses, entérocoques, pyélonéphrite, cystite, syndrome entéro-hépatique et entéro-génital ; troubles nerveux, cutanés.

En chirurgie, la cure pré et post-opératoire empêchera de graves complications, car c'est souvent l'intestin qui infecte l'opéré.

Présentation : Ampoules de 5 cc.

Mode d'emploi : Une ampoule le matin au réveil dans un peu d'eau. Attendre 20 minutes pour prendre le petit déjeuner. Une seconde ampoule le soir au coucher.

Il est intéressant de faire une cure de *Vaxa* et *Lactéol-liquide* pour supprimer les fermentations intestinales (1 ampoule de chaque avant chaque repas).

Laboratoire du Docteur BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

VAXITIOL BOUTY

Vaccin Intestinal Polyvalent
à support sulfo-sodique.

Composition. — 1° Du vaccin : Colibacilles (10 milliards), Entérocoques (6), Staphylocoques (2), Proteus Vulgaris (1) ;

2° Du support sulfo-sodique : Hyposulfite de soude et Solution de Bourget.

Indications. — Syndromes entéro-rénal et associés, colibacillose, auto-intoxication intestinale et séquelles anaphylactiques, entéro-colite...

Chirurgie et accouchements : vaccination pré- et post-opératoire des complications (infections, phlébites).

Gynécologie : séquelles des maladies infectieuses et d'accidents colibacillaires.

Forme. — Ampoules buvables.

Posologie. — Cas aigus : matin et soir.

Cas moyens et chroniques : une fois par jour.

Laboratoires BOUTY

3, rue de Dunkerque — PARIS.

VÉGANINE

**Médicament Analgésique, Antipyrétique,
Antigrippe, à action renforcée.**

Comprimés se désagrégeant immédiatement par un
procédé nouveau de fabrication.

Composition :

Phosphate de Codéine	0 gr. 01	} par comprimé.
Acide acétylsalicylique	0 gr. 25	
Phénacétine	0 gr. 25	

Action thérapeutique et indications :

La Véganine, composée d'après les nouvelles théories de l'association médicamenteuse, possède tous les avantages de chacun de ses composants, sans en avoir les inconvénients isolés :

Sédatif puissant par la Codéine,

Analgésique par l'Acide acétylsalicylique,

Analgésique et antithermique par la Phénacétine,

la Véganine constitue un excellent agent thérapeutique à utiliser dans les maladies par refroidissement, courbatures fébriles, grippe et sa toux réflexe, rhumatismes, névralgies, céphalées, douleurs dentaires, névrites, sciatique, lumbago ; également utile en neurologie (états anxieux) et en cancérologie.

Par son association synergique, l'action thérapeutique de la Véganine est considérablement renforcée, et cela sans intoxication secondaire.

Doses et mode d'emploi :

1 à 6 comprimés par 24 heures, à prendre de préférence avec un peu d'eau, de café ou de thé.

Prix : 7 fr. 15 le tube de 10 comprimés,
11 fr. 95 le tube de 20 comprimés.

Enregistré au L. N. C. M. sous le N° 150-1.

Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en Pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16.85-16.86.)

Dépôt pour la Belgique, le Congo belge
et le Grand-Duché de Luxembourg :

LABORATOIRES SUBSTANTIA

53, rue du Poinçon — BRUXELLES.

VÉGÉCARNIS BENGUÉ

(Viande végétale.)

Composition. — Pour 100 gr. :

Farine de riz	4 gr.
Farine d'Arrow-Root	3 gr. 50
Phosphate tricalcique.....	1 gr.
Glycérophosphate de chaux	0 gr. 40
Poudre de champignons de Paris	4 gr.
Citrate de soude	0 gr. 70
Cacao pulvérisé	26 gr. 40
Sucre vanillé	60 gr.

Propriétés et indications. — Puissant reconstituant à base de champignons de couche et de cacao. Toutes maladies causes de débilité, tuberculose, lymphatisme, surmenage, phosphaturies, troubles de croissance, dépressions nerveuses.

Forme. — Poudre.

Posologie. — *Adultes* : Délayer une cuillerée à entremets de poudre dans un peu de lait. Ajouter une tasse de lait chaud et faire bouillir trois minutes environ.

Enfants : Une demi-cuillerée de poudre et une demi-tasse de lait suffisent.

N.-B. — Toujours utiliser le lait et toujours tenir la boîte fermée.

Prix : 13 fr. 75.

Laboratoires du Docteur BENGUÉ et Fils, Pharmaciens,
16, rue Ballu, PARIS (IX^e). (Tél. : Trinité 85-60.)

VÉGÉLACT-SOJA

Lait sec végétal au Soja-Soyolk

Aliment complet du régime lacté restreint.

Composition. — Lait sec demi-écrémé dont les 2/3 des matières protéiques sont constitués par la caséine du Soja.

Ration équilibrée et complète d'entretien et de croissance par ses *acides aminés*, ses *sels minéraux* (Fe, Mn, Ca, phosphore assimilable), ses *vitamines naturelles* A, B, C, D, E.

Valeur alimentaire. — 1 cuiller à soupe de *Végélact* (7 gr. 20) = 40 gr. de lait de vache = 27 calories.

Equivalent du lait de vache, le *Végélact* s'emploie comme tel et aux mêmes doses en biberons ou bouillies dès la *sixième semaine*, se fait cuire comme tout aliment malté. Son usage exclusif peut être poursuivi plusieurs mois.

Indications principales :

Nourrisson malade : Intolérances au lait, dyspepsie, chez les vomisseurs, colïtes, eczéma. Le *Végélact* se prépare à l'eau ; pour un biberon de 100 gr. utiliser : *Végélact*, 2 cuillerées à soupe et un morceau de sucre, faire cuire doucement 15 minutes avant de porter à l'ébullition.

Nourrisson bien portant : utiliser le *Végélact* dès le quatrième mois en remplaçant progressivement 10 gr. de lait de vache par 1 cuillerée à café de *Végélact*. Une ration mi-lait, mi-*Végélact* préserve l'enfant contre les accidents digestifs en lui assurant une croissance parfaite.

Adulte : Par sa digestibilité, le *Végélact* est le premier aliment des Convalescents et des Colitiques.

Boîte métal de 350 gr., prix 16 fr. 65 (permet de préparer 17 biberons de 150 cc.). Boîte de 1 kg. Prix 41 fr. 60 (permet de préparer 45 biberons de 150 cc.).

VÉGÉLACT-SPÉCIAL, solubilisé, atomisé, prédigéré et survitaminé : aliment conservé sous azote réservé aux nouveau-nés et aux prématurés intolérants même au lait de mère. Se prépare en dissolvant, sans cuisson, 10 gr. de *Végélact-Spécial* dans 60 gr. d'eau bouillie.

La boîte de 300 gr. Prix : 36 francs (permet de préparer 30 biberons de 70 gr.).

LABORATOIRES BOUTROUX

Fournisseurs de l'Assistance Publique,
25, rue du Général-Foy — PARIS (8^e). (Lab. 08-51.)

VÉGÉLAX

Laxatif végétal.

(Comprimés)

Composition. — Extraits de bourdaine, séné, cascara sagrada, boldo, artichaut. Poudres de scammonée et rhubarbe.

Indications :

Constipation rebelle. — Rééducation Intestinale. — Affections du foie. — Arthritisme. Action douce et progressive. Ne donne pas de coliques.

Doses :

De 2 à 4 comprimés par jour le soir au coucher.

Enfants : 1/2 dose.

LABORATOIRES NOLLET

Chenegros, Pharmacien

47, rue Nollet — PARIS (XVII^e).

VÉGÉPHOS

Inosito Hexaphosphate de chaux
et de Magnésie.

Composition. — Phosphore organique, *extrait de l'embryon de blé.*

Propriétés. — Recalcifiant supérieur aux phosphates de chaux, directement assimilable. Agent phosphoré, contribue à la formation du squelette, du noyau cellulaire, de la substance nerveuse.

Indications. — Anémie, Chlorose, Lymphatisme, Tuberculose, Rachitisme, Déminéralisation.

Utile dans : convalescence, grossesse, allaitement.

Formes. — Cachets à 0,60 : boîtes de 20. — Granulé à 12 p. 100. — Poudre.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 cachets par jour ; 1 à 2 cuillerées à café de granulé par jour ; dose moyenne, poudre 0 gr. 60 à 1 gr. 20 en une ou deux fois.

Pharmacie Centrale de France

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

VÉGUMINE

Aliment à base de poudres de légumes frais stabilisés.

Composition. — Poudre totale de légumes et de fruits frais stabilisés (carottes, tomates, épinards, bananes mûres) associée aux hydrates de carbone et au dextromaltose. Riche en éléments minéraux ; apport de vitamines A. B. C.

Forme. — Poudre.

Propriétés. — Complément indispensable de l'allaitement artificiel, stimule et régularise les fonctions digestives, reminéralisateur, favorise la croissance et la dentition, pouvoir calorique élevé.

Indications. — Végumine facilite le sevrage, évite les carences, les accidents dyspeptiques dus au régime trop exclusif des farineux et du lait, éduque les voies digestives. Anorexie, avitaminoses.

Dose. — A 3 mois : 1/2 cuillerée à café par biberon.

De 4 à 5 mois : 1 cuillerée à café par biberon.

De 6 à 7 mois : 2 cuillerées à café par biberon.

A partir de 8 mois : 3 à 4 cuillerées à café par repas.

Boîte de 250 gr : Durée moyenne de consommation : 10 jours.

Établissements WANDER
CHAMPIGNY-SUR-MARNE (Seine).
(Tél. : Tremblay 09-78 et 09-79.)

VEINHEMONE

Synergie Médicamenteuse complète.

Spécifique des Maladies Veineuses. — (Stase et inflammation), Troubles circulatoires généraux, Congestions pelviennes, Avant, pendant et après la Ménopause.

Association opothérapique

Poudre de glande parathyroïde.	0,0005
Poudre d'Hypophyse.	0,001
Poudre de glande surrénale.	0,005
Poudre d'Ovaire.	0,003
Poudre de glande Thyroïde.	0,001

Complexe galénique

Ext. sec Teskra. ...	0,005
— — Hamamélis.	0,04
— — Marron d'Inde.	0,04
— — Viburnum.	0,025
— — Cupressus.	0,025
— — Gui.	0,01
— — Anémone.	0,005
— — Noix vomique.	0,005

Pour 1 Comprimé.

Posologie. — Prendre 6 dragées par jour, à raison de 2 avant chacun des repas.

Enregistré au L. N.C.M. sous le n° 718-16

Laboratoires BRICHARD et Fils
BAR-LE-DUC (Meuse).

VEINICURA

Médication Spécifique des Troubles de la Circul. veineuse.

Composition et forme. — Association d'extraits végétaux à propriétés vaso-constrictives et toniques du système veineux, d'extraits glandulaires (thyroïde et hypophyse) modificateurs de la nutrition générale, et d'un sel fluidifiant du sang (citrate acide de soude).

Présentée en comprimés *bicolores* : comprimés rouges contenant les extraits végétaux et le Citrate; comprimés blancs contenant les extraits glandulaires seuls (Thyr. 1 ctg., hyp. 2 ctg. p. comp.), afin d'éviter leur altération qui se produit fatalement lorsqu'ils sont mélangés à d'autres produits, surtout lorsque ceux-ci sont hygrométriques.

Indications thérapeutiques. — Tous les troubles circulatoires dus à la stase veineuse; varices et varicosités, hémorroïdes, varicocèles, congestions passives de l'utérus et de la prostate, pesanteur et œdème des jambes, etc.

Mode d'emploi. — 2 à 6 comprimés de chaque couleur en moyenne par jour, les rouges pendant le repas, les blancs entre les repas.

Prix : 18 fr. 55.

Laboratoire **FABIOU**

132, av. Victor-Hugo — PARIS (XVI°).

(Tél. : Passy 187-85).

VEINOPOSINE

Régénérateur du système artério-veineux.

Composition. — Surrénales, Hypophyse, Ovotest, Thyroïde, Extrait d'Hamamélis, Cratægus, Œsculus, Viburnum, Valériane.

Indications. — Congestion sanguine sous toutes formes, Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Vapeurs, Migraines, Troubles ovariens de la Puberté et de la Ménopause.

Formes. — Pilules et gouttes.

Dose :

Pilules : 4 à 6 par jour aux repas.

Gouttes : X à XXX deux fois par jour aux principaux repas.

Prix : *Pilules* 16 fr. 65 ; *Gouttes* : 15 fr. 60.

Enreg. au L. N. C. M. sous les n° 219-1 et 219-2.

Laboratoire Moderne

d'Opothérapie et Biologie Médicale

40, rue Claire-Paulhac — TOULOUSE.

VEINOREX

**Spécifique des troubles circulatoires
et des phénomènes consécutifs.**

Vaso-constricteur : marrons d'Inde, hamamelis.

Sédatif : passiflore, chloral, canelle.

Cardiotonique : cratægus, noix vomique.

Hypotenseur : gui, iodure de sodium.

Action rapide, aucune intolérance.

Forme. — Gouttes : XX à XXV, 2 à 3 fois par jour.

Prix. — 16 francs, pour un mois de traitement.
L. N. C. n° 1741-1.

Laboratoire du VEINOREX

E. et G. DELAUNAY, pharmaciens

6, rue La Fayette — CHATELLERAULT
(Vienne)

VEINOSÉROL

(ancien Veinosérum)

Enregistré au L. N. de C. des médic. sous le n° 167-10.

Indications. — Retour d'âge, Varices, Phlébites, Œdèmes, Hémorroïdes et tous états congestifs.

1° Forme gouttes : Formule très active à base d'extraits de plantes *stabilisées* par procédé spécial (capsicum, gui, marron d'Inde, hamamelis, rhamnées).

Doses. — XX gouttes matin et soir, 15 jours par mois. — 21 fr. 20.

2° Forme liqueur, à base de citrates alcalins, urotropine et extraits de rhamnées.

Doses. — 1 cuillerée à soupe matin et soir 15 jours par mois. — 15 fr. 30.

Laboratoires ABADIE-TANZI

3, place Intérieure-Saint-Michel, TOULOUSE
(Tél. : 213-06.)

VEINOSINE

Traitement spécifique complet des affections veineuses.

Comprimés à base de : Hamamelis virginica, Marron d'Inde, Citrate de soude, Glandes thyroïde et hypophyse.

Indications. — Hyposphyxie, Phlébites aiguës et chroniques. Insuffisance valvulaire de la saphène, Varices, Varices de la grossesse, Pseudo-varices par troubles des glandes à sécrétions internes, Hémorroïdes, Troubles de la vie génitale chez la femme, Puberté, Ménopause.

Doses. — Trois comprimés avant les repas de midi et du soir.

Prix : 16 fr. 50, la boîte de 40 comprimés.

Laboratoires LEBEAULT

Besins et Cie, pharmaciens.

5, rue Bourg-l'Abbé — PARIS (III^e).

VEINOTROPE

Propriétés thérapeutiques. — Traitement de la maladie veineuse et de ses complications.

Indications. — Varices, Varicosités, Hémorroïdes, Ulcères variqueux, Troubles de la ménopause et de la puberté.

Composition :

A. — VEINOTROPE M.

(Usage masculin, comprimés roses.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— orchitique	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde	0,005

Pour un comprimé.

B. — VEINOTROPE F.

(Usage féminin, comprimés violets.)

Poudre de Para-thyroïde	0,001
— d'ovaires	0,035
— de surrénales	0,005
— de pancréas	0,100
— d'hypophyse (lobe post.)	0,001
— de noix vomique.....	0,005
Extrait d'hamamélis virginica	0,010
— de marron d'Inde.....	0,005

Pour un comprimé.

Mode d'emploi. — 2 comprimés au lever et 2 comprimés au coucher, ou suivant prescription médicale ; 3 semaines de traitement, 1 semaine de repos.

Formule F. — Interrompre pendant la période menstruelle.

VEINOTROPE POUDRE

Ulcères variqueux et plaies en général.

Extrait embryonnaire.....	1 gr.
Protéoses hypotensives du pancréas..	3 —
Calomel	1 —
Talc stérile, Q. S. pour	100 —

Mode d'emploi. — Poudrer, après lavage au sérum physiologique et recouvrir de gaze stérile.

Laboratoires LOBICA

25, rue Jasmin — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Aut. 81-45, lignes groupées.)

BANDE DE CRÊPE VELPEAU

Bande de tissu élastique sans caoutchouc.

La meilleure des bandes de crêpe : Légère, douce, extensible, chaude lavable.

Filet bleu à utiliser lorsque la chaleur n'est pas nécessaire.

Plaies, Varices, Efforts. Prix marqués : 5 cm. : 7 fr. ; 7 cm. : 9 fr. 25 ; 10 cm. : 12 francs.

Filet rouge. — Plus riche en laine. A utiliser lorsque la chaleur est nécessaire. **Douleurs, Rhumatismes.** 5 cm. : 8 fr. 75 — 7 cm. : 11 fr. 50 — 10 cm. : 16 fr. 75 ; 15 cm. : 23 fr.

Ceintures de 20 cm. : 31 fr. ; 25 cm. : 39 fr. ; 30 cm. : 46 fr. ; pour **Grossesse et Opérations.**

Bande rose sans filet. Même qualité que la bande filet rouge, Spécialement créée pour l'usage féminin. Pratiquement invisible sous les bas fins.

5 cm. : 9 fr. 25 ; 7 cm. : 12 fr. ; 10 cm. : 17 fr. 25.

Toutes les bandes de crêpe ne sont pas des bandes de crêpe Velpeau. Exiger la marque Velpeau.

PHARMACIE CENTRALE DE FRANCE

25, boulevard Beaumarchais — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 18-67.)

VÉNOCAPSYL

Traitement phytothérapique.

Spécifique des troubles circulatoires.

Composition. — Gouttes à base de Capsicum, Hydrastis, Marron d'Inde, Piscidia et Hamamelis, sous forme d'extraits stabilisés et de teintures.

Indications :

Troubles circulatoires : ménopause, puberté, grossesse.

Atonie du système vasculaire : varices, ulcères variqueux, hémorroïdes, phlébites.

Doses. — XX à XXX gouttes, 2 fois par jour aux principaux repas.

Prix : 21 francs, pour un traitement d'une durée de un mois environ.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 1765-1.

Laboratoire du VÉNOCAPSYL

Place du 9-October — CAMBRAI

(Tél. : 590.)

VERACHOL

Cholagogue physiologique.

Augmente et fluidifie la sécrétion biliaire.

Composition. — Dragées à base de sels biliaires associés à des laxatifs légers.

Indications. — Préventif et curatif de la lithiase biliaire, Ictères, Insuffisance hépatique, Gros foie des alcooliques et des coloniaux, Constipation par insuffisance biliaire.

Mode d'emploi. — Commencer par une dragée et jusqu'à trois, si nécessaire, le soir en se couchant, ou une dragée après chaque repas. A avaler sans croquer. Pas d'intolérance, pas d'incompatibilités.

Prix : 16 fr. 30 le flacon de 50 dragées.

27 fr. 25 le flacon de 100 dragées.

Enreg. au Lab. N° de Cont. des Méd. sous le N° 443-5.

Échantillons médicaux sur demande :

LABORATOIRES FOUGERAT

44, rue Chaptal — LEVALLOIS-PERRET (Seine).
(Tél. : Pereire 00-32.)

VÉRALGINE

Supprime toute souffrance. *Complète l'action du traitement curatif.*

Combinaison barbituro-analgésique (Phénétine-Amidopyrine-Sonéryl) agissant sur les centres encéphaliques de la douleur :

centres corticaux et pseudo-centres de Sherrington.

Non soumise aux formalités des Toxiques C,

Sans stupéfiant.

Sans intolérance.

Sans réaction cutanée.

Indications. — Tous les états douloureux quelles qu'en soient la cause ou l'origine : Névralgies, Rhumatismes, Douleurs opératoires, Coliques néphrétiques ou hépatiques, Ulcères, Cancer, Menstruation, etc.

Art dentaire, Périostite, Pulpite, Extractions, Fraisages, etc.

Posologie. — *Adultes* : 1 à 2 comprimés ou cachets.

Enfants : 1/2 ou 1 comprimé.

Ces doses peuvent être répétées 2 à 3 fois par 24 heures.

12 Comprimés : 8 fr. 50 — 8 Cachets : 6 fr. 50.

Laboratoire du MAINGUY

M. BASSIN, Docteur en pharmacie, à BONDY (Seine).

Échantillons sur demande. (Tél. : 24 Bondy.)

VÉRIANE BURIAT

Composition. — Préparation liquide contenant par cuillerée à café : 0 gr. 12 d'amide barbiturique diéthylé et 1 gramme de Valériane fraîche et INODORE.

Indications. — Hypnotique fidèle et inodore; sommeil calme, réveil normal. Sédatif du système nerveux central parfaitement toléré par les estomacs délicats.

Posologie:

Adultes. — Comme sédatif : 2 à 5 cuillerées à café, espacées dans les 24 heures. Comme hypnotique : 2 à 5 cuillerées à café 2 heures avant l'heure du sommeil dans une infusion ou dans de l'eau sucrée.

Enfants. — XXV gouttes par 24 heures et par année d'âge, soit espacées, soit avant l'heure du sommeil suivant les cas.

Le flacon contient environ 25 cuillerées à café.

Laboratoire BURIAT

37, rue Spontini — PARIS (XVI^e).

(Tél. : Passy 64-23.)

VÉRICARDINE

Tube de 30 comprimés glutinisés à base de **Papavérine**.

Chaque comprimé représente :

Chlorhydrate de Papavérine	0,015
Bromhydrate de Quinine	0,02
Phényléthylmalonylurée	0,02
Extrait de Cratægus stabilisé	0,05

Excipient Q. S. pour 1 comprimé.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 121-9.

Indications. — Traitement énergique et rapide de l'instabilité cardiaque, Troubles cardiaques, Etats d'anxiété et de nervosité, Spasmes digestifs, Insomnies.

Grâce à la Papavérine, antispasmodique puissant de tous les muscles lisses.

Mode d'emploi. — Par 24 heures :

1 à 3 comprimés avant chacun des principaux repas.

Contre les insomnies : 2 à 4 comprimés en se couchant.

Avaler sans sucer ni croquer.

Prix : 18 francs.

Laboratoire de L'IODARSENIC GUIRAUD

10, Impasse Milord — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Marcadet 37-98.)

VERMIFUGE CHIARINI

Vermifuge dont la formule a été créée il y a un siècle et demi.

Composition. — Essence de plantes anti-helminthiques récoltées en Provence, additionnées de K Br en petite quantité et soigneusement dosé, en solution hydro-alcoolique.

Indications. — Expulsion des vers intestinaux, principalement Oxyures et Ascaris, sauf le *Tænia* (Voir *Tæniifuge Jacquème*). Tous les troubles nerveux des enfants. Insomnies, irritabilité.

Présentation. — Elixir agréable.

Posologie. — Jusqu'à un an : 1/2 cuillerée à café ;
de 1 à 3 ans : 1 cuillerée à café ; au-dessus de
3 ans : 1 cuillerée à dessert.

Adultes : 2 cuillerées à potage.

Le matin à jeun, le soir en se couchant.

Enr. au L. N. C. n° 641-1.

Flacons toutes dimens. (dep. 1/16 de l. jusqu'au l.)

Laboratoires CHIARINI

68, Bd. du Roi-René — AIX-EN-PROVENCE (B.-du-R.)

VERMIFUGE CORNET

Composition. — Macération dans un liquide hydro-alcoolique de plantes anthelminthiques (semen-contra, mousse de corse, fougère mâle, etc.), de produits médicamenteux et d'huiles essentielles.

Forme. — Liquide, de conservation indéfinie.

Indications thérapeutiques. — Destruction de tous les vers intestinaux (ascarides, oxyures, trichocéphales).

Doses et mode d'emploi :

Jusqu'à 1 an	1/2 cuillère à café.
De 1 à 8 ans	1 —
De 8 à 15 ans	2 —
Adultes.....	1 à soupe.

Le matin à jeun dans un peu d'eau sucrée, ces doses doivent être données régulièrement tous les huit jours.

Prix : 7 fr. 50.

Échantillons sur demande.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle des Médicaments.

Laboratoires SERRE

7, place Pey-Berland — BORDEAUX. (Tél. : 840-78.)

VERMIRÈNE AUDIBERT

Macération de semen-contra d'Alep de chœnopodium anthelmenthicum et de pyrethrum anthemis, présentée sous forme de sirop aromatisé à la vanille.

Agréablement accepté par enfants et adultes.

Ne nécessite ni diète, ni régime et n'offre pas les inconvénients de la Santonine.

Chaque cuillerée à café renferme 42 mgr. 5 de semen-contra, 50 mgr. de pyrethrum anthemis et 2 mgr. 5 d'essence de chœnopodium.

Posologie :

Enfants de 1 à 5 ans : Une cuillerée à café le matin à jeun pendant 3 jours consécutifs.

Enfants de 5 à 10 ans : Une cuillerée à dessert.

Adultes : Une à deux cuillerées à soupe.

En cas de crise aiguë doubler les doses.

Dans les cas d'oxyurase, en plus de l'administration par la bouche, donner en outre le Vermirène, aux mêmes doses que ci-dessus, en lavement à conserver, mélangé à une ou deux cuillerées à café d'eau tiède.

Prix : 11 fr. 50.

M. AUDIBERT, Docteur en Pharmacie.

Cinq-Cantons — BAYONNE.

VEROGÉNOL

Traitement des Insomnies et des Maladies nerveuses.

Présentation. — En liquide ou en comprimés (cette dernière forme étant en règle avec les décrets sur les barbituriques).

Composition :

En liquide : 0,25 de diéthylbarbiturate de soude et 0,10 d'extrait fluide de valériane, plante fraîche.

En comprimés (forme à recommander) : 0,03 de diéthylbarbiturate de soude, 0,15 de glucochloral, plantes fraîches de valériane, passiflore et crataegus.

Indications. — Insomnies de toutes sortes, états nerveux et anxieux, toux nerveuses, tics, etc.

Posologie :

Pour dormir : 2 cuillerées à café ou comprimés, le soir en se couchant.

Pour calmer : 2 à 3 cuillerées à café ou comprimés en 24 heures.

Prix : 17 francs.

Laboratoires VENOT

139, avenue Émile-Zola — PARIS (XV°).

(Tél. : Sulfren 31-75.)

VÉRONIDIA

Composition. — Diéthylmalonylurée associée à l'extrait de Passiflore. Chaque cuillerée à soupe de solution renferme 0 gr. 25 de diéthylmalonylurée.

Propriétés thérapeutiques. — Sédatif de l'hyperexcitabilité nerveuse, traitement des insomnies, névroses diverses, palpitations, phobies, terreurs nocturnes, mal de mer, tremblements, bourdonnements d'oreilles, etc...

Doses pour 24 heures. *Adultes* : 1 à 4 cuillerées à café espacées dans le courant de la journée, comme antispasmodique ; 1 à 2 cuillerées à soupe comme hypnotique.

<i>Enfants</i> :	{	Au-dessous de 2 ans, nourrissons.	X à XXX gouttes.
		De 2 à 5 ans	XX à LX —
		De 5 à 7 ans	L à C —
		De 7 à 9 ans	1/2 à 1 cuillerée à café.
		De 9 à 11 ans....	1 cuillerée à café à 1 cuillerée 1/2.
		De 11 à 14 ans...	1 cuillerée 1/2 à 3 cuillerées à café,

dans une infusion de tilleul ou dans du lait, le mélange étant pris en plusieurs fois, comme une potion.

(Flacon de 175 cc.) (Flacon de 85 cc.)

Société Générale d'Applications Thérapeutiques
THÉRAPLIX

98, rue de Sèvres — PARIS (VI^e).
(Tél. : Ségur 13-10, 6 lignes groupées.)

VERRULYSE

Composition. — A base de magnésie lourde et légère, phosphore, chaux, fer, manganèse, hydrofluosilicate de soude, charbon végétal et quinquina.

Propriétés. — Reconstituant de la cellule. Antiverruqueux.

1° *Effet général* : Reconstituant. Amélioration très nette, chez les enfants, de l'entrain, de l'appétit, du teint, des fonctions intestinales.

2° *Effet local* : La deuxième ou la troisième semaine, les verrues prennent une teinte rosée au pourtour ou deviennent le siège d'une légère démangeaison. Elles s'éliminent ou se résorbent peu à peu.

Condition essentielle : Suivre le traitement sans arrêt, régulièrement, avec patience, jusqu'au résultat escompté.

Indications. — Traitement spécifique des verrues et autres papillomes (larynx, organes génitaux, etc.).

Exerce une action de redressement dans toute production cellulaire anormale.

Aucune contre-indication. Après l'emploi d'une première boîte, le traitement peut être prolongé et même renforcé sans inconvénient dans les cas exceptionnels où cela est nécessaire (jusqu'à 4 cachets par jour dans les cas de verrues rebelles ou de tumeurs malignes).

Forme. — Poudre divisée en petits cachets ouvrables. Boîtes de 80 cachets, quantité suffisante dans la plupart des cas.

Dose et mode d'emploi. — Pour les enfants de plus de 8 ans et les adultes : 2 cachets par jour pendant 40 jours au début des repas.

Pour les enfants de moins de 8 ans : 1 cachet tous les jours.

Pour les enfants, et même pour les adultes, dans les cas rebelles, pour augmenter l'assimilation, ouvrir le cachet et prendre la poudre délayée dans un peu de potage, purée, compote, etc., la poudre ne communiquant aucun goût désagréable.

Prix public : Boîte 80 cachets pour 40 jours : 16 fr.30.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 159-4.

Voir à Formule JACQUEMAIRE n° 60.

Laboratoires FLUXINE
Produits BONTHOUX

Edm. JOËT, Docteur en pharmacie.
VILLEFRANCHE (Rhône).

VERTICURINE

Composition. — Silicate de soude colloïdal.

Action. — Hypotensive-antiathéromateuse, — déchlorurante, ramène les viscosités à la normale, fait disparaître les symptômes cérébraux.

Indications. — Artério-sclérose, Angine de poitrine, Troubles cérébraux. Otite scléreuse, Hypertension, Aortite, Bourdonnements, Sclérose cardiaque, Pré-sclérose. Vertiges, Ménopause.

Formes et doses. — 1° *Liquide* : chaque cuillerée à soupe représente 1 gr. de silicate assimilable. Dose : 1 cuillerée à soupe aux deux principaux repas ; 2° *Comprimés* : chaque comprimé renferme 0 gr. 50 de silicate assimilable. Dose : 2 comprimés à chacun des principaux repas.

Nous recommandons de préférence la solution dorénavant préparée sans goût désagréable.

Verticurine, liquide : le flacon, 20 fr. 70.

Verticurine, comprimés : le flacon, 15 francs.

Laboratoire L. GRIAS, Pharmacien de 1^{re} classe.
47, rue Feray — CORBEIL (S.-et-O.).

VERTOX

Comprimés vermifuges pour parasites intestinaux (trichocéphales, oxyures).

Dosés à 0,15 de poudre de semen-contra.

Action. — Se dissolvent dans la seconde partie du tube digestif et agissent électivement sur : trichocéphales, anguillules, oxyures, etc...

Doses. — (Moyennes) 5 Vertox et 2 comprimés Leptab, avalés avec un peu d'eau, loin des repas. Les adultes peuvent répéter 2 à 4 fois cette dose, dans la journée, si la crise de parasitisme est grave. Suivre le traitement pendant 3 à 4 jours, au moment des lunaisons.

Présentation. — En boîte aluminium 50 comprimés dragéifiés : 12 fr. 25 (10 jours effectifs).

Enregistré au L. N. G. sous n° 1039-7.

Laboratoires A. V. E.

56, rue Beaubourg — PARIS (III^e)

(Tél. : Turbigo 51-12.)

VÉRYL

Composition. — Dérivé organique aminé du cyanure de mercure, nettement plus actif, beaucoup moins toxique que le cyanure ordinaire.
Pas d'intolérance.

Indications, Posologie et Mode d'emploi. — Toutes les indications du cyanure de mercure, Syphilis à toutes les périodes. Même posologie que HgCy : 1 ampoule de 1 cc. par jour.

En injections intraveineuses ou intramusculaires profondes indolores.

Diurétique mercuriel de toxicité minimum, 1 à 3 ampoules par 24 heures.

Présentation et Prix. — La boîte de 20 ampoules de 1 cc. : 25 fr. 50.

Laboratoires G. BEYTOUT

12, boulevard Saint-Martin — PARIS (X^e).

(Tél. : Nord 76-85.)

VÉSICATOIRE ROSE BESLIER

Au Cantharidate de Soude.

Le Vésicatoire Rose Beslier à base de Cantharidate de Soude, produit chimique stable défini, pur, aseptique, offre au médecin l'avantage de mettre à sa disposition un **Vésicatoire aseptique, indolore, fidèle, et sans toxicité pour l'appareil rénal.**

Indications. — Bronchites, pleurésies, pleurites, pneumonies, réactions douloureuses des tuberculeux, péritonite, hydarthrose, arthrite, névralgies, sciatique, etc.

Présentation. — Pour éviter toute manipulation, toute substitution, le **Vésicatoire Rose Beslier** est délivré exclusivement en pochettes unitaires contenant un carré de 10 × 10.

Prix : la pochette : 6 francs.

Chaque carré, mis sous pochette à l'usine, parvient ainsi sans souillures sur l'épiderme du malade.

L. N. C. n° 508.

M. COQUELU, Pharmacien-Fabricant
DIGOIN (S.-et-L.) (Tél. : 45.)

VIATOL

Composition :

Facteur oxydant de levures.....	0,002
Vitamines B-1.....	10 U. I.
Vitamines B-2	2 Unités physiologiques.
Saccharomyces cerevisiae	0,04

Pour un comprimé.

Propriétés. — C'est un fortifiant et un reconstituant naturel qui améliore le rendement de la nutrition et équilibre les fonctions vitales.

Indications. — *Enfants, adultes.*

Maladies chroniques, Convalescences, Fatigue générale, Dépression, Surmenage, Grossesse, Enfants débiles, Tuberculose, Troubles de l'assimilation, États de dénutrition.

Présentation. — Comprimés.

Mode d'emploi. — *Adultes* : 2 comprimés au milieu de chaque repas. Les croquer ou les avaler avec une gorgée de liquide.

Enfants : 1 comprimé au milieu de chaque repas.

En prenant le *Viatol* 20 minutes avant les repas, on a une action stimulante sur l'appétit.

Laboratoire du Dr BOUCARD

30, rue Singer — PARIS (XVI^e).

VICALPHOS

VICALPHOS SIMPLE

Composition. — Parathyroïde, surrénale, thymus ; phosphate, glycérophosphate et gluconate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

Forme. — *Cachets* ou *granulé*, sucre aromatisé à la mandarine d'un goût très agréable.

Prix : Cachets ou gran. P. M. : 17 fr. 65 — Gran. G. M. (trait^e) : 48 fr.

VICALPHOS IRRADIÉ

Composition. — Ergostérine irradiée, carotène ; parathyroïde, surrénale, thymus ; fluorure de calcium, phosphate et glycérophosphate de chaux, inositolphosphate acide de chaux et de magnésie.

Forme. — *Cachets* ou *granulé* sucré aromatisé à la framboise, d'un goût très agréable, est très bien accepté pour les enfants.

Prix : Cachets ou gran. P. M. : 23 fr. 50 — Gran. G. M. (trait^e) : 64 fr.

Indications. — Tous les états de déminéralisation : Tuberculose et Pré-tuberculose, Troubles de croissance, Rachitisme, Convalescence, Surmenage, Fracture, Caries dentaires, Grossesse, Allaitement, etc.

CACHETS

Posologie :

GRANULÉ

Adultes, 3 par jour.	} au début des repas.	Adultes, 2 cuillerées à café.
Adoles., 1 à 2 par jour.		Adoles., 1 cuillerée à café.
		Enfants, 1/2 cuillerée à café.
		Nourris., 1/4 cuillerée à café.

Aucune contre-indication.

Laboratoires du VICALPHOS

P. LAURENT, Pharmacien, 48, rue Saint-Jean — LYON.

VICELIASE

Formule dragéflée.

Antitoxique. Tonique. Cytophylactique.

Composition. — Citrate de soude, Phosph. de soude, Noix vomique, Chlorure de magnésium, Hyposulfite de soude

Propriétés. — Reconstituant général, Tonique du système nerveux, Régulateur des fonctions digestives et nutritives, Prophylactique des néoplasmes.

Indications. — Asthénies, Surmenage, Troubles digestifs par hypofonctionnement, Troubles de la nutrition, Hypertrophie de la prostate.

Toutes indications du Chlorure de Magnésium.

Tube de 80 dragées (traitement pour 1 mois) : 19 fr. 25.

Laboratoire J. MESSIS

71, avenue de la République — CHAMPIGNY (Seine).
(Tél. : 16.)

VIGOFRUITS

Composition. — Acide phosphorique associé aux divers glycérophosphates et aux chlorures de Calcium et de Magnésium, dissous dans des jus de fruits naturels.

Propriétés thérapeutiques. — Sans strychnine ni arsenic, sans alcool, stimule et tonifie sans exciter.

Indications. — Toutes les asthénies cérébrales ou musculaires, combat la fatigue et les effets du surmenage, abrège les convalescences.

Mode d'emploi. — 1 à 2 cuillerées à soupe par jour.

Prix : 19 fr. 15, flacon 240 cc.

Laboratoire des ABATILLES

Route du Moulleau — ARCACHON.

VIN ANTI-DIABÉTIQUE TALON

Composition. — A base de quinium associé à des toniques végétaux et arsenicaux. Médication complémentaire de l'insuline.

Indications. — Diabète et ses conséquences. Revitalise les tissus, arrête la déminéralisation, empêche la formation du sucre.

Dose. — 1 verre à liqueur avant les 2 principaux repas.

Brochure franco sur demande.

Laboratoire du Dr TALON

153, boulevard Montparnasse — PARIS.

Paris c/c 1557-94 (Tél. : Danton 51-07.)

VIN AUBERY AU SUC DE VIANDE

Formule pour 1 litre.

Plasma musculaire de viande crue (concentré à froid).....	26 gr. 54
Arrhénal	0 gr. 442
Extrait de noix vomique.	0 gr. 069
Phosphate de soude	8 gr. 85
Ecorces de Quinquina	2 gr. 65
Noix de Kola	8 gr.
Feuilles de Coca	2 gr. 65
Ecorces d'oranges amères	1 gr. 56

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 440-1.

Posologie. — Un verre à madère avant chaque repas pour les adultes. Demi-verre pour les enfants.

Indications. — *Anémie, Débilité, Dépression physique, Surmenage, Epuisement, Tuberculose, Grippe, Trouble de Croissance, Convalescence.* En outre toutes les affections justiciables des Sucs musculaires de viande trouveront ici leur traitement avec une efficacité accrue.

Prix : 23 fr. 45 la grande bouteille, pour 10 jours de traitement ; 26 fr. 50 le litre pour 15 jours de traitement.

Laboratoires AUBERY
AVIGNON (Vaucluse).

VIN BRAVAIS

Composition. — Kola, Coca, Caféine, Théobromine, Malaga.

Indications. — Anémie, Neurasthénie, Débilité, Convalescence, Surmenage, Maladies nerveuses.

Posologie. — *Adultes* : le gobelet-mesure joint au conditionnement représente la quantité à prendre deux fois par jour avant les deux principaux repas.

Demi-doses pour les enfants à partir de 10 ans.

Prix : 20 fr. 90 le flacon de 500 cc.

NOTA. — Il existe également l'Elixir Bravais, même composition que le Vin, mais à base de Curaçao, et le Granulé Bravais, spécialement indiqué dans les cas où le Vin et l'Elixir sont interdits.

AUBRIOT, Pharmacien

56, boulevard Ornano — PARIS (XVIII^e).

(Tél. : Montmartre 28-90.)

VINCE

Poudre antiseptique, désodorisante et cicatrisante.
Soluble dans l'eau.

Composition. — A base de parahydroxybenzoate de propyle, de perborate de soude spécialement préparé et d'une pureté absolue, additionnés d'essences antiseptiques et aromatiques qui en corrigent le goût et en augmentent l'activité.

Indications. — Spécialement l'angine de Vincent, les ulcérations fuso-spirillaires, les stomatites ulcéro-membraneuses, les gingivites ulcéreuses, les accidents de dent de sagesse et la pyorrhée. S'emploie également comme dentifrice.

Mode d'emploi. — Pour lavages, bains de bouche ou gargarismes : une cuillerée à café de Vince dissoute dans un verre d'eau tiède. En applications, sous forme de pâte, dans les cas d'angine de Vincent, stomatites ulcéro-membraneuses, pyorrhée ou irritation des gencives. A laisser de 4 à 10 minutes.

Prix : 13 francs la boîte P. M. ; 25 fr. 10 la boîte G. M.
Littérature et échantillonnage médical sur demande.

LABORATOIRES SUBSTANTIA

M. Guérault, Docteur en pharmacie.

13, rue Pagès — SURESNES (Seine).

(Tél. : Longchamp 16-85, 16-86.)

VIN DE BAUDON

Antimonio-phosphaté.

Composition. — Contient le phosphate de chaux sous une forme non acide, éminemment assimilable. Cette assimilation se trouve exaltée par la présence de l'antimoine qui forme avec le phosphate une véritable combinaison et qui agit lui-même par ses vertus propres, comme excitant et régulateur du bon fonctionnement de l'appareil digestif.

Avantages. — Son goût agréable le fait accepter avec plaisir par les malades.

Indications thérapeutiques. — Affaiblissement général, anémie, lymphatisme, rachitisme, scrofule, croissance, suppurations prolongées, maladies des os, grossesse, allaitement, etc.

Posologie. — Un verre à madère pour les adultes et un verre à liqueur pour les enfants à prendre au moment des repas ; on peut en prendre selon les cas jusqu'à 4 ou 5 par jour.

Enregistré au Lab. Nat. de Cont. sous le N° 544-2.

Prix : 24 fr. 50.

Laboratoires GUILLAUMIN et GÉRARD

Docteurs en Pharmacie,

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

VIN DE VIAL ET SIROP DU VIN DE VIAL

A. VIN DE VIAL. — Strychnine. Quinine. Arséniate de Sodium. Viande. Lacto-Phosphate de chaux. Quinquina. Malaga.

Composition pour un verre à liqueur (30 cc.)	{	Sulfate de strychnine	1/2 milligr.
		Quinine pure	2 centigr.
		Arséniate de sodium.	1/2 centigr.
		Substances extractives de la viande...	50 centigr.
		Lacto-phosphate de calcium.....	50 centigr.
		Ecorces quinquina.	2 grammes
		Malaga et Muscat.....	Q. S.

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications — et couramment un verre à liqueur pour les adultes — une cuillerée à bouche pour les adolescents, 1/4 d'heure avant les 2 principaux repas. *Le goût est très agréable.*

Indications. — Asthénies de toutes espèces. Convalescences. Rachitisme léger. Croissance et puberté. Grossesse. Allaitement. Etats déficients des vieillards.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 687-1.

B. SIROP DU VIN DE VIAL — Même composition, *sans alcool, ni strychnine ni arsenic.*

Composition pour une cuillerée à soupe (20 grs.)	{	Substances extr. de la viande.....	1 gramme.
		Lacto-phosphate de chaux.....	1 —
		Quinine.....	1/2 centigr.
		Sirop de gentiane.....	6 grammes
		Sirop de quina.....	3 —
		Sirop simple.....	8 —

Posologie et mode d'emploi. — Suivant indications et généralement : *Adultes* : une cuillerée à soupe. *Enfants* : une cuillerée à café, pur ou dilué dans un peu d'eau pure ou minérale, 1/4 d'heure avant les 2 principaux repas.

Indications. — Le *Sirop du Vin de Vial* est en somme du *Vin de Vial*, sans strychnine ni arsenic, et en outre sans alcool. Il est particulièrement réservé aux enfants et aux malades qui ne peuvent utiliser un produit alcoolique.

Enregistré au L. N. C. sous le n° 687-2.

Laboratoires pharmaceutiques : H. VIAL
7, rue Damon — VILLEURBANNE.
(Tél. : V. 95-11).

VIN GIRARD

Iodo-tannique phosphaté.

Nature. — Le VIN GIRARD est la meilleure formule des préparations iodo-tanniques phosphatées consacrées par l'usage.

Un verre à madère ou deux cuillerées à soupe de Vin Girard correspondent à :

Iode	0 gr. 04
Tannin.....	0 gr. 08
Lactophosphate de chaux	0 gr. 30

Mode d'emploi. — 1 ou 2 verres à madère par jour pour une grande personne ; 1/2 dose pour enfant.

Propriétés thérapeutiques. — Tonique, reconstituant, augmente la phagocytose.

Indications. — Adénopathies, Lymphatisme, Scrofula, Tuberculose apyrétique, toutes convalescences, en particulier infectieuses et grippales.

Prix : 21 francs.

Pour un traitement de 12 à 15 jours.

Établissements SOUDAN

48, rue d'Alésia — PARIS (XIV^e).

(Tél. : Gobelins 06-89.)

Enregistré au Laboratoire National n° 405-2.

VIN RACI-BEL

**RACine de BELLadone
en décoction à 5 p. 100.
« Cure Bulgare. »**

Traitement des rigidités extrapyramidales : maladies de Parkinson, Little, Wilson, Athétoses avec rigidité spasme de torsion, etc.

Titré en alcaloïdes totaux.

Stabilisé, se conserve.

Avantages. — Egalité d'action, activité constante. Beaucoup moins toxique et plus actif que les fortes doses d'atropine.

Posologie. — Demander notre notice.

En principe, doses croissantes : de CXXV gouttes à sept cuillers à café par jour.

Flacons de 210 grammes à 22 francs ou de 500 grammes à 38 francs.

Enregistré au Laboratoire de Contrôle sous le n° 535-48.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V^e).

(Tél. : Odéon 73-92.)

VIOFORME

Iodochloroxyquinoléine.

CIBA

ANTISEPTIQUE, CICATRISANT.

Poudre inodore. Non toxique, jamais irritant.

Indications. — Plaies atones, ulcères variqueux, eczémas, escarres, brûlures.

Doses. — En poudre, 2 à 3 gr. pour une application. Pommade de 2 à 10 p. 100. Se formule magistralement:

Boîte poudreuse : 12 francs.

Usage interne. — Voir **Entéro-Vioforme**.

OVULES AU VIOFORME. — Antiseptiques, analgésiques, décongestionnants, désodorisants, résolutifs : métrites, vaginites, etc.

Formuler. — Boîte de six ovules.

Laboratoires **CIBA** — **O. ROLLAND**

103 à 117, Boulevard de la Part-Dieu — LYON.
(Tél. : Moncey 43-26.)

VIOPHAN

Acide phénylcinchoninique de synthèse spéciale :
fabrication entièrement française.

Propriétés. — 1° *Non toxique* : Le chien supporte plus de 2 gr. par kilo de poids.

2° Mobilisateur et éliminateur spécifique de l'acide urique et des insolubles après modification interne profonde empêchant l'irritation des muqueuses de l'appareil urinaire et permettant une *miction indolore*.

3° Antithermique, Antinévralgique, Antiphlogistique, Anticholestérinhémique.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Sciatique, Rhumatisme articulaire aigu et chronique, Névralgies rebelles, Lumbagos, Artériosclérose, Arthritisme.

Posologie. — 2 à 6 comprimés ou cachets par 24 heures aux repas, Boissons abondantes. Cure intermittente.

Présentation : 20 cachets ou comprimés 0 gr. 40.

Viophan Injectable : associé à l'iodure de Na.

2 formes : **Viophan amp. M** (intramus.) avec novocaïne.
— **amp. V** (intraveineux).

5 ampoules : Prix 26 fr. 70.

Laboratoire National de Contrôle, 196-1 et 2.

Laboratoire du **Viophan**

91, rue de Monceau — PARIS (8°).

VIOSTEN DU D^r LESCÈNE

Composition. — Principes actifs de l'huile de foie de morue. Lipoides irradiés. Phosphatides (glycérophosphate de choline), Ether benzyl-cinnamique. Vitamines.

Comprimés. — **Granulé.** — **Injections sous-cutanées de 1 cc.**

Indications. — Anémies, Asthénies, Convalescences, Tuberculoses, Rachitisme, Grossesse, Suites de couches.

Chez les nourrissons et les déficients digestifs, employer la **Zymatine irradiée** (Zymatine + Nucléinate de Ca + Ergostérol irradié).

Doses. — **Enfants** : Au-dessous d'un an : 1 cc. tous les 4 jours. — 1/2 cuillerée à café de granulé par jour avant le repas principal.

De 1 à 3 ans : 1 cc. tous les 3 jours. — 2 comprimés par jour, pendant les repas. — 1 cuillerée à café de granulé par jour avant les repas.

De 3 à 7 ans : 1 cc. tous les 2 jours. — 4 comprimés par jour, pendant les repas. — 2 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

Au-dessus de 7 ans : 1 cc. tous les jours. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas

Adultes : 1 à 2 cc. par jour. — 6 comprimés par jour pendant les repas. — 3 cuillerées à café de granulé par jour avant les repas.

LABORATOIRES LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19)
et LIVAROT (Calvados).

VIOXYL

Médication Céro-arsénio-hématique.

Puissant Accélérateur de la Nutrition générale.

Indications. — Asthénies diverses, Cachexies, Convalescences, Maladies consomptives, Anémie, Chloro-Anémie, Lymphatisme, Scrofule, Tuberculose, Neurasthénie, Asthme, Diabète.

Formes. — Elixir, Granulé et Comprimés.

Posologie :

Adultes : Débuter par 2 cuillerées à café par jour, une le matin, une le soir, soit au moment, soit dans l'intervalle des repas. Au bout de 3 ou 4 jours; porter cette dose à 3 cuillerées à café par jour.

Enfants : 1 à 2 cuillerées à café par jour, suivant l'âge.

Établissements MOUNEYRAT

Docteur MOUNEYRAT

Professeur Agrégé Faculté de Médecine
Docteur ès sciences, Pharmacien de 1^{re} classe,

12, rue du Chemin-Vert — VILLENEUVE-LA-GARE NNE
près Saint-Denis (Seine).

(Tél. : Plaine 23-34, 2 lignes groupées.)

VIRADÈNE (Dragées de)

Synergie de glandes génitales, composé phosphorique, phytothérapique, extrait de noix vomique, nucléinate de manganèse, extrait de maté.

Indications. — 1° *Chez l'homme : dépression nerveuse, affaiblissement des facultés, neurasthénie, sinistrose, surmenage, sénilité prématurée, difficultés de l'acte génésique, frigidité, troubles de la puberté, convalescences difficiles, etc...*

2° *Chez la femme : dans le cas de troubles à tendance dépressive, d'asthénie, de surmenage, d'affaiblissement des facultés intellectuelles, physiques ou génésiques, etc.*

Doses. — 4 dragées par jour en moyenne.

La boîte de vente contient un traitement de trois semaines:

Prix de la boîte : 25 fr. 05.

Laboratoires du FÉMINADÈNE
120, rue Lecourbe — PARIS (XV°).

VIREDOX

Composition. — Levure de bière désamertumisée, purifiée, séchée et IRRADIÉE.

Protéines.....	56 p. 100
Hydrates de carbone.....	26 —
Lécithine	1 —
Glutathion.....	0,65 —

Vitamines B¹, B², B³, B⁴, B⁵, B⁶, et 165 unités internationales de Vitamines D par gramme.

Indications :

Carie dentaire, rachitisme, fractures osseuses, hypogalactie, toutes les formes de la tuberculose.

Posologie et mode d'emploi :

Nourrissons : 2 à 5 grammes par jour.

Enfants : 5 à 10 grammes par jour.

Adultes : 10 à 20 grammes par jour.

Remarque. — Le goût agréable du VIREDOX en permet la prescription infantile. Il est recommandé de l'ajouter aux potages, bouillies, purées, ou de le mélanger aux légumes ou pâtes. Bien délayé, le VIREDOX se prend également très facilement dans un verre d'eau fraîche ou tiède.

Prix : 15 fr. 30 le flacon de 150 grammes.

SANAVITA

7, rue Fontaine-Delsaux — LILLE. — (Tél. 11-35.)

VIRMIONAL « PIAM »

A base de phosphore organique.

Forme et dosage. — Comprimés contenant 0 gr. 0033 de phosphore organique.

Posologie. — 3 à 4 comprimés, 3 fois par jour, avant les repas, par périodes de dix jours. Ces doses peuvent être augmentées, le VIRMIONAL ne renfermant ni alcaloïdes, ni substances toxiques.

Indications. — Neurasthénie, Hystérie, Hypochondrie, Faiblesse nerveuse, Tics, Epilepsie, Insomnie, Surmenage.

Prix. Le flacon de 90 comprimés : 27 francs.

Inscrit au L. N. C. n° 1207-3.

Échantillons et vente en gros :

Laboratoire PERRIN

11, quai Saint-Clair — LYON.

Dr A. IMBERT, Ph^{1er} (Tél. : Burdeau 28-96.)

Dépositaire pour Paris : **E. MOREAU, Pharmacien**

13, rue des Nonnains-d'Hyères.

(Tél. : Turbigou 87-05.)

VISCO-SÉRUM

Visco-sérum injectable reproduit exactement la formule minérale

du plasma sanguin : $\frac{K + Na}{Ca + Mg} = 30$; $\frac{K}{Ca} = 2$.

Stimulation du système nerveux, de l'appareil cardio-vasculaire et des organes hématopoïétiques.

Indications. — Tous les états asthéniques. Les affections chroniques déprimantes. Convalescences. Neurasthénies, Surmenages. Débilité physiologique. Pré-sénilité.

Posologie. — Une ampoule de 5 cc. tous les jours ; voie sous-cutanée ou intramusculaire.

Visco-sérum buvable. — Complète l'action du Visco-Sérum injectable, mais peut également être administré isolément.

Solution phosphorique acide radioactive. Fer, manganèse, zinc.

Catalyseur des métabolismes, fait l'appoint des carences minérales, ramène à la normale l'acidité humorale.

Indications. — Les déminéralisations, les anémies quelles que soient leurs causes. Tous les états asthéniques avec hypoacidité urinaire. Tous les états de dénutrition.

Posologie. — 2 ampoules buvables de 3 cc. par jour, 10 à 20 jours.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules injectables de 5 cc. : 21 fr. 60.

Boîte de 10 ampoules buvables de 3 cc. : 21 fr. 60.

Laboratoire G. FERMÉ

22, rue de Turin — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Europe 49-50.)

VISCOVEINE

Composition. — XL gouttes =

Citrate de soude.....	0,10
Ext. stab. de Marron d'Inde Dausse ...	0,10
Ext. stabilisé de Monesia.....	0,05
Ext. stabilisé de Gui (fluide)	0,02
Bourse-à-pasteur.....	0,05
Ext. fluide de Viburnum, Cupressus, hamamelis aa.....	0,10
En milieu glyciné.	

Indications. — Hémorroïdes et tous états variqueux, Aménorrhée, Dysménorrhée, Règles douloureuses, Troubles de la ménopause.

Posologie. — XXX à XL gouttes aux repas.

Enr. au Lab. de Cont. des Méd. sous le n° 988-3.

Prix : 17 fr. 20

Laboratoire FOSSET

21, Grande-Rue — MONTFERMEIL (S.-et-O.).

VITACALCINE MONCOUR

Complexe reminéralisant et énergétique.

Reminéralisant par sa vitamine D, ses poudres de glande thyroïde et surrénale et son carbonate de calcium.

Energétique par sa vitamine A, sa poudre totale de foie de bœuf, son phosphate de magnésium et son nucléinate de manganèse.

Indications. — Toutes affections déminéralisantes et hyposthénisantes : carences vitaminiques, états de déchéance organique, convalescence des maladies infectieuses, rachitisme, fragilité des os, fractures, anémies, chlorose, cachexies, troubles de croissance, carie dentaire, neurasthénie, psychasthénie, scrofule, prébacillose, bacillose, etc.

Posologie :

Adultes : 2 à 8 comprimés par jour, ou 1 à 4 cachets.

Enfants : 1 à 4 comprimés ou 1 à 2 cachets (suivant l'âge).

Dose d'entretien : la moitié de la dose normale.

Le traitement sera poursuivi aussi longtemps que nécessaire, la Vitacalcine n'étant pas toxique.

Prix : 24 fr. 55.

Laboratoires « MONCOUR »

49, avenue Victor-Hugo — BOULOGNE-PARIS.

(Tél. Molitor 01-14.)

VITACHOLINE

**Rééducatrice des fonctions entéro-hépatiques.
Puissant tonique du foie.**

Composition. — VITAMINE A. Sulfate de Magnésie.
Extrait d'Artichaut, Lacto-sérum.

Propriétés. — L'apport en VITAMINE A, qui s'accumule dans le foie, permet d'obtenir une *action tonifiante et anti-infectieuse* considérable de la cellule hépatique. Active la sécrétion et l'excrétion biliaires. Régularise les fonctions intestinales et aseptise le tube digestif. Diurétique. *Saveur agréable.*

Indications. — Congestion du foie et de la vésicule, Lithiase, Ictère, Cholécystite chronique, Cholémie, Insuffisance. Constipation, Entérocélite. Urticaire. Prurit, Eczéma chronique, Acné chronique, Asthénie et fatigue générale.

Présentation. — Granulé. Prix : 16 fr.

Mode d'emploi. — *Drainage biliaire* : 1 à 3 c. à café de granulé à jeun avec 1/2 verre d'eau tiède.

Cure d'entretien : 1/2 à 1 c. à café de granulé, 20 minutes avant les repas.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1139-F.

LABO-VITA

29, rue Duret — PARIS (XVI^e).

VITACRINE

Association hormono-vitaminique.

Deux formules : Vitacrine M (Masculine) et Vitacrine F (Féminine).

Composition. — Hormones génitales principales et accessoires, Lobe antérieur d'Hypophyse, Corps thyroïde, Surrénale, Vitamine E.

Propriétés thérapeutiques. — Reconstituant pluriglandulaire et médication endocrinienne d'appoint.

Mode de présentation. — Comprimés dragéifiés.

Indications. — Asthénies, Convalescence, Surmenage, Fatigue physique et intellectuelle, Troubles de la puberté, Déficiences glandulaires de la ménopause.

Posologie. — 4 à 6 comprimés par jour.

Laboratoire DEFFARGE

Docteur en Pharmacie

188, cours de la Somme — BORDEAUX
(Tél. : 91-609.)

VITADIASE

Composition et présentation :

Comprimés d'inositophosphate de chaux et magnésie associé aux extraits hydroalcooliques de levure de bière, de son et germe de blé.

Indications :

Surmenage physique et intellectuel, dépression nerveuse, convalescence, rachitisme, tuberculose, grossesse et allaitement.

Doses et mode d'emploi. — 3 à 6 comprimés par jour.

Enfants : 2 comprimés.

Prix au public : 15 fr. 60.

L. N. C. M. n° 515-4.

Docteur J. GALIMARD O. * * *

145, rue Yves-Le-Coz — VERSAILLES

VITADONE

Vitamines A et D en ampoules injectables.

Titrage : 20.000 u. i. de vitamine A. }
20.000 u. i. de vitamine D. } par ampoule de 2 cc.

Propriétés thérapeutiques. — La VITADONE agit puissamment contre la tuberculose pulmonaire, par sa vitamine D, qui calcifie les lésions tuberculeuses, et par sa vitamine A, anti-infectieuse et protectrice des épithéliums (notamment de l'épithélium pulmonaire).

Indications et posologie. — Dans la tuberculose pulmonaire, 2 injections intra-musculaires par semaine ; cures de 10 semaines, séparées par des périodes de repos de 15 jours.

La VITADONE, qui se fait aussi en GOUTTES (nouvelle concentration : 10 à 20 gouttes et davantage par jour) et en CHOCOLATES (2 à 4 par jour en moyenne), peut remplacer, dans toutes ses indications, l'huile de foie de morue, dont elle contient tous les principes actifs. Elle est, en somme, une huile de foie de morue synthétique et hyperconcentrée.

Prix : Ampoules : 29 fr. 75 la boîte de 6.

Gouttes : 22 fr. 30. — Chocolates : 23 fr. 35.

Laboratoires d'Endocrinologie appliquée

Concessionnaires des Marques des

ÉTABLISSEMENTS BYLA

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV^e). (Danton 08-11.)

VITAGAR

à base de Vitamine B

Composition. — Mucilage exclusivement végétal, à base de Vitamine B (300 U. I.), Agar-Agar, Bourdaine exempte de principes amers et irritants.

Forme. — Petits grains dragéifiés, faciles à absorber

Action. — Déconstrictant complet. Par sa Vitamine B, régénère les fibres lisses de l'intestin auxquelles il restitue le tonus contractile. Combat ainsi en même temps la constipation et sa cause principale, l'atonie intestinale. — La Vitamine B agit également contre l'auto-intoxication due à la stase stercorale.

Indication. — Traitement complet et rationnel de la constipation. Laxatif purement physiologique. D'action douce et d'emploi agréable, particulièrement indiqué chez les enfants, les femmes enceintes et les nourrices.

Posologie. — 1 ou 2 cuillerées à café (1/2 ou 1 pour les enfants) après chacun des deux repas. Avaler sans mâcher à l'aide d'une gorgée de liquide.

Laboratoires UROMIL, L. BÉLIÈRES, D^r en Ph^{ie}
19, rue Drouot — PARIS (IX^e).
(Tél. : Provence 04-00.)

VITALYNE

Traitement phytothérapique rationnel de tous désordres organiques imputables à la diathèse arthritique.

Propriétés thérapeutiques. — Antiseptique urinaire et hépatique ; balsamique et diurétique ; dissolvant remarquable des phosphates, acide urique et urates.

Indications. — Goutte aiguë et chronique, Gravelle urique, Lithiase biliaire, Rhumatismes, Affections de la peau, Cellulite, Ménopause, Artériosclérose sous toutes ses formes.

Principaux constituants. — *Cynara scolymus*, *Chimaphylla umbellata*, *Ylex paraguayensis*, *Hydrocotyle asiatica*, *Fabianus imbricata*, *Barosma crenulata*, *Rhamnus frangula*, *Hemidesmus indicus*, etc.

Posologie. — Sauf avis contraire du médecin traitant, une infusion quotidienne le soir durant une semaine ; deux infusions quotidiennes, une le matin à jeun, une le soir durant la deuxième semaine ; une infusion quotidienne le soir pendant la troisième semaine. Se reposer 8 à 10 jours et reprendre, dans les mêmes conditions, le traitement pendant les deux mois suivants.

Présentation. — 1^o Boîtes de 15 ou 30 sachets cellophane, rigoureusement dosés pour une tasse d'infusion. Très agréable au goût.
2^o Comprimés.

Prix de vente au public. — La boîte : 15 fr. 50. La double boîte : 30 fr.
Comprimés : la boîte 16 fr. 50.

Laboratoires MINERVA — 10, rue Bayard — TOULOUSE.

VITAMINE D CORTIAL

Vitamine D cristallisée.

Composition. — Vitamine D cristallisée incorporée au chocolat. Pastilles dosées à 4 centièmes de milligramme de vitamine cristallisée pure.

Indications. — Spécifique de toutes les formes du rachitisme.

Curatif. — Chez l'*enfant* : retard de croissance, déformations osseuses, retard de la dentition, carie dentaire, troubles scorbutiques.

Chez le *nourrisson* : accidents convulsifs, tétanie, décalcification, avitaminoses.

Chez l'*adulte* : pré tuberculose, grossesse, allaitement, consolidation des fractures, ostéomalacie.

Préventif. — Enfants prématurés ou de constitution faible, pour prévenir les troubles rachitiques ; dans les convalescences de maladies infectieuses.

Avantages. — Dosage précis, pureté de la vitamine D, conservation indéfinie, absorption agréable pour les enfants.

Mode d'emploi et doses. — Au-dessous d'un an, 1/2 pastille chaque matin. — Jusqu'à 10 ans : 1/2 pastille matin et soir. — Au-dessus : de 1 à 2 pastilles par 24 heures.

Pour les nourrissons, faire fondre la pastille dans du lait tiède.

Prix : le tube de 20 tablettes (20 à 40 jours de traitement) : 21 francs.

Laboratoires CORTIAL

7, rue de l'Armorique — PARIS.

(Tél. : Suffren 53-70 et 53-71.)

VITAMINE P. P.

Lematte et Boinot.

Voir

NICOBION

EX-14

1000

Solution filtrée par un 100 000 de fines

Pommes de terre, de la variété de la variété

Solution filtrée par un 100 000 de fines

MINE D'ORIGINE

Chocolat, de la variété de la variété

Vitamine (Vitamin) (V)

Jules (25 000) de la variété de la variété

Solution filtrée (20 000) de la variété de la variété

Les données initiales de la variété de la variété
 n'ont pas été modifiées par la variété de la variété
 et la variété de la variété de la variété
 n'ont pas été modifiées par la variété de la variété
 et la variété de la variété de la variété

b(6)

LES VITAMINES BYLA

VITAMINES LIPOSOLUBLES

Amunine (Vitamine A).

Nouvelle concentration :

Solution huileuse per os, à 120 000 u. i. au cc.

5 à 10 gouttes par jour (au lieu de 20 à 60).

Chocolatés, dosés à 12 000 u. i. par chocolaté.

1 à 2 par jour (au lieu de 2 à 4).

Ampoules injectables, à 20 000 u. i. par ampoule.

Pommade, à 20 mgr. de carotène pur cristallisé par 100 gr.

Solution pour lavements et *suppositoires*.

Irrastérine (Vitamine D).

Solution huileuse per os, à 0 mgr. 5 de vitamine D cristallisée au centimètre cube.

Chocolatés, à 0 mgr. 1 de vitamine D cristallisée.

Vitadone (Vitamine A + D).

Nouvelle concentration :

Solution huileuse per os (50 000 u. i. de vitamine A et 10 000 u. i. de vitamine D au cc.).

10 à 20 gouttes par jour (au lieu de 20 à 100).

Chocolatés (25 000 u. i. de vitamine A et 5 000 u. i. de vitamine D par chocolaté).

1 à 2 par jour (au lieu de 2 à 4).

Solution injectable (20 000 u. i. de vitamine A et 20 000 u. i. de vitamine D par ampoule de 2 cc.).

Vitamine E Byla.

Ampoules injectables de 1 cc., contenant en solution huileuse la matière insaponifiable liquide de 15 gr. d'huile de germe de blé fraîche (cette matière insaponifiable est 25 fois plus active que l'huile de germe de blé).

Comprimés contenant chacun la matière insaponifiable de 2 gr. 50 d'huile de germe de blé.

VITAMINES HYDROSOLUBLES

Vitamines B.

Vitamine B¹ Byla, en *comprimés* à 1 mgr. et en *ampoules injectables* à 2 mgr. et à 1 cgr. de vitamine B¹ cristallisée.

Vitamine B² Byla, en *ampoules injectables* dosées à 1 mgr. de flavine cristallisée.

Vitaminol, contenant toutes les vitamines B et les acides aminés. Présenté en granulé, comprimés et sous forme de poudre maltée, cette dernière servant au maltage des bouillies.

Mentionnons aussi les *Comprimés vitaminés B Byla* pour diabétiques.

Vitamine C Byla.

(Acide ascorbique cristallisé naturel.)

Comprimés à 50 mgr. et *ampoules injectables* à 100 et 500 mgr.

Vitamine P. P. Byla.

(Amide nicotinique).

Ampoules injectables dosées à 0 gr. 10.

Comprimés dosés à 0 gr. 05.

Littératures et échantillons sur demande adressée :

26, av. de l'Observatoire — PARIS (XIV^e),
où il sera mis notamment à la disposition
du Corps médical deux brochures sur la
thérapeutique des maladies par carence :

I. Vitamines Liposolubles.

II. Vitamines Hydrosolubles.

VITAMORRHUINE

Perles

Composition :

1 perle contient 0,10 cc. d'un concentré d'huile de foie de morue à 1/50 et correspond à :

3.500 unités internationales, Vitamine A. *naturelle* ;

750 unités internationales, Vitamine D. *naturelle*.
Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Inappétence, anémie, aux femmes enceintes pendant la période de gestation, convalescence, etc.

Doses :

Adultes : 4 à 6 perles par jour.

Adolescents : 3 à 4 perles par jour.

Enfants : 1 à 2 perles par jour.

A avaler après les repas.

Pharmacie Centrale de Belgique,

Soc. Anonyme

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMORRHUINE

GRANULÉS CHOCOLATÉS

Composition. — Concentré d'huile de foie de morue à 1/50 associé au phosphore et au calcium sous forme de granulés chocolatés. Une cuillerée à café de Vitamorrhutine représente :

3 500 unités internationales Vitamine A. *naturelle*.

750 — — — — — D. —

0 mgr. 02 de phosphore.

0 gr. 05 de calcium.

Vérifié par l'analyse chimico-physique et par des essais biologiques.

Indications. — Croissance, Rachitisme, Scrofule, Convalescence, Carie dentaire, etc.

Doses. — *Enfants* : de 3 mois à 1 an ; 1 cuillerée à café par jour (dans du lait) ; de 1 à 5 ans : 2 cuillerées à café par jour ; de plus de 5 ans : 3 cuillerées à café par jour. *Adultes* : 4 cuillerées à café par jour.

Pharmacie Centrale de Belgique, S. A.

12, rue du Téléphone — BRUXELLES.

VITAMYL

Vitamines A. B. et C. en extrait concentré.
Une cuillerée à café à chaque repas.

Prix public : 21 francs le flacon.

VITAMYL IRRADIÉ

Solution et Dragées.

Vitamines A. B. C. et D. en solution huileuse,
finement émulsionnée. Une cuillerée à café ou
2 dragées à chacun des 3 repas.

Une cuillerée à café renferme 2 200 unités anti-
rachitiques internationales, 1 dragée renferme
1 000 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

Le flacon de solution grand modèle : 23 fr. 45.

— — petit modèle : 14 fr. 30.

Le flacon de 40 dragées : 22 fr. 45.

VITAMYL IRRADIÉ CHLOROPHYLLÉ

Ampoules buvables.

**Chlorophylle pure associée aux vitamines A, B, C
et D.**

1 à 3 ampoules buvables par jour.

Chaque ampoule contient 10 cgr. de Chlorophylle
et 2 500 unités antirachitiques internationales.

Prix public :

La boîte de 10 ampoules de 3 cc. : 25 fr. 50.

Chaque unité grand modèle correspond à 10 jours
de traitement à dose journalière

Indications. — Toutes les indications du trai-
tement de carence. Tous les cas de déminérali-
sation. Les différentes formes de ce produit sont
aromatisées et d'un goût agréable.

Laboratoire des Produits AMIDO

A. BEAUGONIN, Pharmacien

4, place des Vosges — PARIS (IV^e).

(Tél. : Archives 41-65.)

VITAOL

Huile de foie de morue survitaminée en vitamine A.

De très faible acidité facilement assimilable.

Teneur en vitamine A constamment contrôlée et ramenée à un titre uniforme de 2 000 unités internationales par gramme.

Produit très actif.

Indications. — Troubles de la croissance, état infectieux, lymphatisme, prétuberculose et précaréence — sans contre-indication.

Doses : *Enfants* : 1/2 cuillerée à café, avant le repas du soir.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café, avant le repas du soir.

Présentation. — Forme liquide flacon de 180 cc. Prix : 14 francs.

Lab. pharmaceutiques CHABRE Frères.
TOULON.

VITARGYL

Composition. — Protéose argentine.

Propriétés. — Antiseptique de toutes les muqueuses. Non irritant. Sédatif et décongestif externe. Non corrosif. Action absolument indolore.

Indications. — Traitements préventif, abortif et curatif de toutes les affections des muqueuses.

Oto-rhino-laryngologie : Coryzas, Sinusites, Amygdalites, Angines, Désinfection pré ou post-opératoire, Prophylaxie de grippe, oreillons, rougeole, otites :

Vitargyl 1 % gouttes 12 fr. 75

Pour les cas aigus :

Vitargyl éphédriné, gouttes 14 fr. 80

Ophthalmologie : Conjonctivites banales ou purulentes, Ulcères, Ophthalmies, Préventif de l'ophtalmie des nouveau-nés :

Vitargyl collyre 5 % gouttes 14 fr. 80

Urologie : Blennorragie (préventif : instillations 10 p. 100 Prophylargyl ou crayons ; abortif : injections 20 p. 100 ; curatif : lavages 1 et 5 p. 100), Urétrites, Cystites (injections 10 p. 100 ou crayons), Métrites du col, Bartholinites (crayons, ovules ou lavages).

Vitargyl 20 % en boîtes de 6 tubes
scellés de 5 cc. 21 fr. 20

Vitargyl Crayons urétraux, en boîte
de 6 14 fr. 80

Vitargyl Crayons utérins, en boîte
de 6 14 fr. 80

Vitargyl ovules, en boîte de 6 19 fr. 10

Prophylargyl, compte-gouttes 16 fr. 85

Laboratoires POINTET & GIRARD

30, rue des Francs-Bourgeois — PARIS.

(Tél. : Arch. 03-29 et 42-40.)

VITARSENIC

Ses deux formes stables :

1 suppositoire : 1 gr. 30 ; 1 dragée : 0 gr. 25,

Contiennent :

Vitamine D 500 unités.

Triiodure d'Arsenic 1 milligramme.

Indications. — Lymphatisme, Scrofule, Rachitisme, Anémie, Convalescence, Anorexie.

Mode d'emploi. — De 1 à 3 ans : 1 suppositoire ou 1 dragée par jour ; de 3 à 5 ans : 2 par jour ; de 5 à 8 ans : 4 par jour ; de 8 à 12 ans : 6 par jour.

Adultes : 9 par jour.

Laboratoires du **BLAGNY**

René PAMELA, Pharmacien

85, rue Turbigo — PARIS (III^e).

Tél. : Archives 12-39.

VITASCORBOL

Acide Ascorbique

Médication spécifique des états de précaréence et de carence en vitamine C. Facteur de restauration du terrain.

Indications :

Scorbut, préscorbut, anorexie, retard de la marche, anémie, syndromes hémorragiques, retards de la dentition, allaitement artificiel, rhumatisme, convalescences, déficiences organiques, anémies.

Présentations :

Comprimés à 0 g. 05. (Tubes de 20) 13 fr. 50

Vitascorbol injectable :

Boîte de 10 amp. de 1 cc. à 0 g. 05. Prix 29 fr.

— 10 amp. de 2 cc. à 0 g. 10. Prix 41 —

— 3 amp. de 5 cc. à 0 g. 50. Prix 35 —

Posologie :

Nourrissons : 1 comprimé à 0 g. 05 *pro die*.

Adultes et enfants : 2 à 4 comprimés *pro die*.

Par voie intraveineuse : 10 à 50 cgt. *pro die* suivant les cas.

Société Parisienne d'Expansion Chimique

« SPECIA »

Marques Poulenc Frères et Usines du Rhône

21, rue Jean-Goujon — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Balzac 22-94.)

VITÈNE

Médication vitaminée, phosphorée.

Composition. — Gouttes :

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{tes}
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Capsules de 0 gr. 20 :

Phosphatides cérébraux	0 gr. 025
Vitamine A	6000 unités Intern ^{tes}
— D	2000 —
Huile d'olive	Q. S. pour 1 cc.

Propriétés. — Le Vitène possède un pouvoir de croissance et anti-anémique remarquable. Agent anti-infectieux et antirachitique puissant, il est aussi fixateur de calcium.

Indications. — *Chez l'enfant :* Troubles de croissance, Rachitisme, Anémie. — *Chez l'Adulte :* Convalescence, Surmenage, Lésions bacillaires. — *Chez la femme enceinte :* Pare aux perturbations du métabolisme du calcium. — *A tous les âges :* Agent anti-infectieux.

Mode d'emploi. — *Nourrissons :* X gouttes matin et soir. — *Enfants :* XX gouttes matin et soir. — *Adultes :* 2 capsules à midi et le soir au début des repas.

Prix : 22 francs. Enregistré au L. N. de C. sous le N° 544-4.

Laboratoire A. GUILLAUMIN et A. GÉRARD

Docteurs en pharmacie

12, rue Charles-V — PARIS. (Tél. : Arc. 68-10.)

VIVACURE

Composition et formes. — Deux formes.

Formule :

	<i>Adulte.</i>	<i>Infantile.</i>
Bi-iodure de Mercure (Hg)	0 gr. 02	0 gr. 01
Iodure de potassium	0 gr. 25	
Arséniate de soude	0 gr. 01	0 gr. 005
Extrait atropa bellad.	0 gr. 02	0 gr. 005
Arome q. s.	15 cc.	15 cc.

Indications. — 1° Toutes les indications de la syphilis soupçonnée ou connue et de l'hérédo-syphilis.

2° Adjuvant indispensable de tous les traitements antisypilitiques soit au cours de la grossesse, de la croissance ou entre les périodes de traitement (cure de repos).

Avantages. — Présentation spéciale (ampoules buvables) ne comportant aucune indication susceptible de dévoiler la nature du traitement.

Mode d'emploi. — A prendre immédiatement avant les repas dans un verre d'eau gazeuse de préférence.

Posologie : Une ampoule par jour. Cette dose ne peut être dépassée que sur indication spéciale du médecin.

Note très importante : En cas de prédispositions anaphylactiques contre l'iodure de potassium, prescrire la forme infantile.

La boîte de 14 ampoules : 23 francs.

Laboratoires de la JÉCOBIASE

D^r R. PIONNEAU, Pharmacien
VAYRES (Gironde).

VIVARGYRE

Traitement mercuriel dissimulé en ampoules buvables.

Deux dosages. — Adultes :

Phénoldisulfonate Hg et Na.....	0,05
Arséniate de soude.....	0,01
Excipient pour.....	10 cc.
Phénoldisulfonate Hg et Na.....	0,02

Enfants :

Méthylarsinate de soude.....	0,01
Excipient pour.....	5 cc.

Présentation. — Boîtes de 10 ampoules de 5 et 10cc.

Indications. — Traitement Hg d'entretien ;
Troubles généraux ; Déficiences organiques ;
Agent dépuratif et reconstituant.

Doses. — 2 ampoules par jour (enfants et adultes)
dans de l'eau gazeuse, sucrée ou non.

Prix : *Adultes* : 24 francs. — *Enfants* : 22 francs.

Enr. au L. N. C. sous les n^{os} 403-23 et 24.

Laboratoires HOCQUETTE

191, Faubourg Saint-Antoine — PARIS (XI^e).
(Tél. : Diderot 04-71.)

VIVOLÉOL

Huile de foie de morue sélectionnée, non irradiée, garantie active et riche en vitamines.

(Vitamines antirachitique et de croissance.)
(Contrôle biologique rigoureux.)

Forme. — Liquide.

Indications :

Troubles de la croissance, de l'ossification, de la dentition, Etats de dénutrition, Lymphatisme, Convalescences.

Posologie :

Enfants — Nourrissons :

XV à XXX gouttes par jour, jusqu'à 1/2 cuillerée à café.

Jusqu'à 3 ans :

1/2 à 1 cuillerée à café.

Au-dessus de 3 ans :

1 à 2 cuillerées à café suivant l'âge.

Adultes :

1 cuillerée à soupe par jour.

(Peut être pris à toute époque de l'année.)

N.-B. — *Le Vivoléol a été la première huile de foie de morue contrôlée biologiquement.*

Prix : 17 fr. 10.

Laboratoires du Docteur ZIZINE

Docteur en Médecine — Docteur en Pharmacie. — Ex-Interne en Pharmacie — Lauréat des Hôpitaux — Lauréat des Fac. de Méd. de Paris et Bordeaux.

24 et 26, rue de Fécamp — PARIS (XII^e).

(Tél. : Diderot 28-96.)

VOCALDOP

CACHET

Nouvelle formule. Même posologie.

Composition. — Yohimbe, Fenugrec et doses minima d'amorçage d'hypophyse antérieure et de thyroïdine.

Propriétés. — Le *Cachet Vocaldop* est un tonique spécifique du système vocal. Il représente une synergie médicamenteuse adaptée aux trois qualités de la Voix considérée comme instrument de travail. Il a une élection élective sur le Timbre, la Puissance, la Résistance.

Indications.

Enrouement, Laryngite, Chevrotement.

Surmenage vocal, Asthénie vocale.

Et comme tonique pendant la période de tout traitement oto-rhino-pharyngien.

Posologie. — 2 cachets par jour pendant 8 jours, dans l'intervalle des repas. Un troisième les jours de gros effort vocal.

Présentation et prix. — Boîte de 20 cachets : 13 fr. 55.

INHALATION-GARGARISME VOCALDOP

Voir à Inhalation-Gargarisme.

Laboratoire Laryngologique.

R. CORDIER,

Docteur en Pharmacie,

45, rue de Lyon — PARIS (XII^e).

(Tél. : Dorian 57-79.)

VOLTARGOL ROBIN

Composition. — Argent colloïdal électrique à très petits grains, isotonique et stabilisé, à 0,50 0/00

Propriétés. — Anti-infectieux, antiseptique, non toxique; ne produit pas de choc.

Indications. — Toutes infections aiguës : grippe, fièvre typhoïde et puerpérales, etc...

Forme et mode d'emploi. — Ampoules de 5 et 10 cc. pour injections intramusculaires ou intraveineuses, 1 à 10 cc. par 24 heures ; jusqu'à 50 cc. et plus dans les cas graves. Ovules.

Prix : 6 ampoules à 5 cc	25 fr. 50
6 ampoules à 10 cc	40 fr. 80
Ovules.....	18 fr. 40

Laboratoires ROBIN

13, rue de Poissy — PARIS.

(Tél. : Odéon 08-55, 38-75.)

VULCAPIL

**Lotion au soufre solubilisé
pour le cuir chevelu.**

Propriétés thérapeutiques. — Le VULCAPIL rend aisé, agréable et sans danger le traitement de la Séborrhée et des Alopécies. Il est indolore, inodore, ininflammable et ne graisse pas ; il apporte au cuir chevelu le soufre nécessaire à sa kératinisation et le débarrasse de ses sécrétions anormales et des desquamations de pellicules.

Indications. — Affections du cuir chevelu : Alopécies, Séborrhées.

Mode d'emploi. — Tous les matins faire une friction suivie d'un massage du cuir chevelu.

Laboratoires BRISSON

Dr DEDET et Cie, Pharmaciens,

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris,
157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e).
(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

VULCASE

(Comprimés).

Laxatif-cholagogue.

Soufre assimilable. Opothérapie biliaire.

Propriétés thérapeutiques. — Combat la constipation par action directe sur le foie, n'irrite pas l'intestin, ne provoque pas d'accoutumance.

Indications. — CONSTIPATION. Affections du FOIE et de l'*Intestin*. *Dermatoses*. *Arthritisme*.

Mode d'emploi. — Prendre de 1 à 4 comprimés par jour, soit le matin à jeun, soit vers 17 heures.

Laboratoires BRISSON

D^r DEDET et Cie, Pharmaciens

Anciens Internes des Hôpitaux de Paris.

157, rue Championnet — PARIS (XVIII^e)

(Tél. : Montmartre 75-01 et 75-02.)

VULCRINOL

Pilules dragéifiées.

Opothérapie hépatique et chimiothérapie humorale associées.

Composition :

Extrait total de foie de veau frais.

Thiosulfate de magnésium.

Hexaméthylènetétramine.

Propriétés thérapeutiques :

Spécifique idéal des manifestations de l'insuffisance hépatique et des syndromes d'intolérance : agit comme excitant propre de la cellule hépatique et comme catalyseur de l'équilibre humoral.

Indications :

- 1° *Maladies d'intolérance et états anaphylactiques.* — Dermatoses, Prurits, Urticaires, Migraines, Asthme, Rhume des foins, Accidents sériques, Intolérances diverses.
- 2° *États hépatiques.* — Torpeur du foie et troubles digestifs consécutifs, Hépatites chroniques, Ictères, Foie colonial, Cholémie familiale, Arthritisme sous toutes ses formes : obésité, goutte, certaines formes de rhumatismes chroniques.
- 3° *Intoxications.* — Médicamenteuses et alimentaires, Auto-Intoxications, Adjuvant des traitements anti- Σ et de l'aurothérapie, Convalescences des maladies infectieuses.

Posologie :

3 à 4 pilules avant les deux principaux repas. Cure de 7 jours consécutifs, à répéter plusieurs fois avec intervalle d'une semaine entre les cures.

Aucune toxicité. Aucune contre-indication.

Prix : L'étui de 50 pilules : 23 fr. 95.

Laboratoires CARTERET

15, rue d'Argenteuil — PARIS (I^{er}).

(Tél. : Opéra 43-79.)

VULNAMINE

Pommade à base d'Huile de foie de Flétan.

La *Vulnamine* contient 1 p. 100 d'huile de foie de Flétan correspondant à :

0 gr. 005 mgr. de Carotène pur cristallisé
et 0 mgr. 0125 d'Ergostérol pur cristallisé.

Indications. — Plaies atones de toute nature, Brûlures thermiques et chimiques, Ulcérations, Engelures, Dermatoses chroniques.

Emploi. — Étendre la *Vulnamine* en couche épaisse et recouvrir d'un pansement à garder le plus longtemps possible.

Prix : 17 fr. 05.

Laboratoire C. GIREL

J. LACOUR, Pharmacien

19, rue Godot-de-Mauroy — PARIS (IX^e).
(Tél. : Opéra 76-24.)

VULNÉRINE DU D^r BERGEN

Principes actifs. — Camphre associé au Phénol, Naphtol, Éther éthylpyramido-benzoïque, oxyde de zinc, etc.,

Forme. — Emplâtre semi-fluide en tube d'étain de 50 cc.

Indications. — Ulcères variqueux, plaies atones
Brûlures, Eczémas, Cancroïdes, Lupus, Érysipèle, Engelures, Impétigo, Cancers ulcérés inopérables.

Spécifique de la gangrène gazeuse.

La **VULNÉRINE** calme, déterge, stérilise, épidermise toutes les plaies sans adhérer, sans macérer, sans intoxiquer. Les brûlures sont calmées instantanément et guérissent sans laisser de cicatrices.

Mode d'emploi. — 1 ou 2 applications par jour avec le papier à pansement qui accompagne chaque tube de **VULNÉRINE**. Nettoyage à l'éther.

Prix du tube : 15 francs.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. sous le n° 1927-1.

IODO-HAMAMÉLIS DUCOQ : 13 francs.

Enregistré au Lab. Nat. Cont. sous le n° 1927-2.

Laboratoire DUCOQ

LANGBAIS (I^e-et-L.). — (Tél. : 68.) R. C. Chinon 2059

XANTHARLEM

Le Médicament du Foie.

Forme.

Pilules glutinisées, ne se dissolvant que dans l'intestin.

Composition.

Haarlem Bardet, Curcuma Xanthorriza, Cynara Scolymus.

Indications thérapeutiques.

Angiocholite, Cholécystite aiguë ou chronique, Péri-cholécystite, Cholélithiase, Cholémie, Cholestérinémie, Congestion du foie, Ictère catarrhal, Insuffisance hépato-biliaire, Cirrhose, Coliques vésiculaires, États hypercholestérinémiques, Constipation, Asthme hépatique, Colibacillose.

Posologie et mode d'emploi.

Affections aiguës : 4 à 6 pilules par jour.

Affections chroniques et cures d'entretien :

2 à 4 pilules par jour, à prendre au cours des repas.

Laboratoire National de Contrôle 518-7.

LABORATOIRES BARDET, fondés en 1860.

76, rue de Sèvres — PARIS (VII^e).

XANTHORRYL

Composition :

Curcuma Xanthorriza 5 centigr.

Extrait réglisse..... 5 —

Magnésie hydratée 10 —

Indications :

Insuffisance hépato-biliaire, états congestifs du foie, cholécystites, angiocholites, cholé-lithiase, constipation chronique, cellulite. Augmente la sécrétion biliaire sans spasmes ni coliques.

Présentation et prix :

18 francs la boîte de 60 comprimés glutinisés.

Mode d'emploi :

2 à 6 comprimés dans les 24 heures immédiatement avant les repas.

Littérature et Échantillons :

Flacon de 60 comprimés : 18 fr. 75.

Laboratoire des Produits XANTHORRYL

E. AUOLAIRE, Pharmacien,

36, rue de la Tour-d'Auvergne — PARIS (IX^e).

(Tél : Trudaine 38-63.)

XÉRODERME

Composition. — Pommade à base d'Oxyde de Zinc, de précipité blanc, d'Amidon, de Tribromophénate de Bismuth, de Vaseline.

Indications. — Spécifique de toutes les affections de la Peau.

Dartres, Eczéma, Herpès, Démangeaisons, Dermatoses, Rougeurs, Impétigo.

Emploi. — Après lavage de la région malade à l'eau bouillie ou avec une solution antiseptique, faire une légère application de Xéroderme. Faire deux ou trois applications par jour.

Prix au public : 9 francs.

Enregistré au L. N. C. M. sous le n° 1478-4.

Laboratoires MICHEL
CIREY-SUR-VEZOUZE (M.-et-M.).

YAOURTINE

Culture sèche des ferments du Yaourt.

Composition. — Ferments bulgares vivants et sélectionnés, protégés, par un enrobage spécial, de l'action oxydante de l'air et de l'humidité (Procédé Nestlé).

Formes. — Dragées et granulé.

Propriétés thérapeutiques. — Spécifique de l'auto-intoxication intestinale et de ses répercussions cutanées, rénales et hépatiques.

Posologie. — *Nourrissons.* — 1 à 2 cuillerées à café par jour. Yaourtine granulée.

Enfants et Adultes. — Cas aigus : 2 à 4 cuillerées par jour Yaourtine granulée. Cas chroniques : 10 à 12 dragées par jour.

A prendre à jeun avec lait bouilli, 1 heure avant le repas.

Prix : Dragées 12 fr. 80. — Granulés : 16 fr.

Enr. au L. N. C. sous le n° 1816 (2 et 3).

L.-J. MOUNIER, Pharmacien de 1^{re} classe

18, place de Laborde — PARIS (VIII^e).

(Tél. : Laborde 64-90 à 95.)

YO-ANDROL

Médication hormono-vitaminique.

Composition :

Un complexe endocrinien :

Lipoides orchitiques	0, 03 cgr.
Antéro-hypophysine	0,005 mmgr.
Cortico-surrénine	0, 02 cgr.
associé à la vitamine E	0, 02 cgr.
et à la Yohimbine	à dose infinitésimale

Présentation. — 1° Pilules (*tube de 60*).

2° Ampoules injectables en solution huileuse indolore. (*Boîte de 6.*)

Mode d'emploi. — *Per os* : 9 à 12 pilules par jour, avant chacun des principaux repas.

Voie injectable : 1 injection sous-cutanée ou intramusculaire journalière ou trihebdomadaire.

Indications. — Traitement spécifique des asthénies. Opothérapie complémentaire chez la femme.

Note. — Nous préparons aussi une forme sans yohimbine. Veuillez, dans ce cas, prescrire : **Yo-Androl sans Yohimbine.**

YO-GYNINE

Médication ovarienne renforcée.

Associant la totalité des hormones ovariennes à l'antéro-hypophysine, à la Vitamine E et à la Yohimbine

Présentation. — Pilules.

Mode d'emploi. — 9 pilules par jour, avant chacun des principaux repas et dans les 20 jours qui suivent le dernier jour des règles.

Indication. — Donne des résultats là où l'opothérapie ovarienne seule a échoué.

Laboratoire ISCOVESCO

8, passage Morel — MONTROUGE (Seine).
(Tél.: Alésia 04-39).

YOHIMBINE HOUDÉ

Alcaloïde cristallisé du *Pausinystalla Yohimbe*, spécialement purifié, constant et contrôlé par titrage physiologique.

Propriétés :

- 1° Aphrodisiaque (par vaso-dilatation élective et excitation directe du centre érecteur);
- 2° *Système nerveux*. Sympathicolytique véritable (R. Hamet).
- 3° *Système vasculaire*. Vaso-dilatateur général, donc hypotenseur (Loeper et Lemaire). Bons résultats dans l'aménorrhée et la dysménorrhée.
- 4° *Sécrétions*. Augmente la sécrétion lactée (Cortia, Nolle, Del Buono, Levent). Résultats remarquables et constants.

Présentation :

- 1° Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes sous le nom de **Yohimbine Houdé**.
- 2° Sous le nom de **Gynimbine Houdé**, avec une *littérature faisant abstraction complète des propriétés aphrodisiaques*:
 A. Granules de chlorhydrate à 2 milligrammes.
 B. Ampoules de solution stabilisée, de 2 cc., à 5 milligrammes de chlorhydrate par cc.
 Prescrire : **Ampoules de Gynimbine Houdé**.

Doses :

Frigidité, impuissance psychique : 6 à 10 granules par jour en 3 fois, avant les repas. Prescrire sous le nom de Yohimbine ou de Gynimbine.
 Sympathicotonie, Exophtalmie basedowienne, Hypertension, Dysménorrhée : 3 à 6 granules par jour, ou 1 ampoule (sous-cutanée). Prescrire sous le nom de Gynimbine.
 Hypogalactie : 1 ampoule Gynimbine de 10 milligrammes par jour, en injection sous-cutanée, pendant 4 à 6 jours; commencer autant que possible dans les 3 jours suivant l'accouchement.
 A défaut d'injections, 3 à 6 granules par jour.

Laboratoires HOUDÉ

9, rue Dieu — PARIS. (Tél. : Nord 40-58.)

YOHOURTHOGÈNE CARRION-LAGNEL

Pour la préparation domestique du Yohourth.

Composition. — Ferments lactiques sélectionnés, fournis par les cultures pures des microorganismes producteurs du Yohourth.

Indications. — Le Yohourthogène permet la fabrication du Yohourth lorsque ce dernier ne peut être obtenu tout préparé (hors Paris) en vue des usages habituels de ce lait fermenté : alimentation des sujets fragiles ou déprimés, ou souffrant d'infections intestinales, etc.

Mode d'emploi. — La technique à suivre en utilisant n'importe quel appareil est donnée par une notice spéciale.

Présentation et prix :

La boîte de 12 ampoules : 10 fr. 85.

Le flacon (pour 20 pots de 120 cc.) : 5 francs.

Laboratoires CARRION et LAGNEL

3, 5, 7, rue du Capitaine-Scott — PARIS (XV°).

(Tél. : Ségur 40-30.)

YPTOR

Bougies à l'argent colloïdal (non grasses, sans radium) pour le traitement abortif et curatif des urétrites.

Les bougies *Yptor* sont délivrées stériles en tubes scellés, lubrifiées et prêtes à être introduites dans l'urètre.

Bougles courtes (7 cm.). Boîte de 5 : 20 fr. ; de 10 : 38 fr.

Bougles longues (15 cm.). Boîte de 5 : 20 fr. ; de 10 : 38 fr.

Traitement abortif : 1 à 2 bougies courtes par jour.

Traitement curatif ou complémentaire des lavages : 1 bougie par jour après miction et lavage.

Enregistré au L. N. C. n° 535-37 et 38.

Laboratoire TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).

(Tél. : Odéon 73-92.)

YSEULT

(Gouttes).

Admis dans les Hôpitaux de Paris.

Indications :

- 1° Troubles de la ménopause et de la puberté ;
- 2° Troubles de la circulation veineuse chez la femme et chez l'homme (varices, hémorroïdes, états congestifs).

Conception nouvelle : La mesure de la tension veineuse montre que toutes ces affections correspondent à un stade spécial d'insuffisance hépatique et cardiaque.

Composition. — Adjonction à des vaso-constricteurs veineux d'action sûre du Boldo et du Cratægus, qui répondent admirablement à ce stade.

Les résultats cliniques ne se comparent à aucune autre préparation, ils sont surprenants.

Doses moyennes. — X gouttes, 3 fois par jour, avant les repas.

Prix : 17 fr. 70 pour un mois de traitement.

Dépôt chez tous les grossistes.

E. ROCHE, Pharmacien

9, rue de la Platière — LYON.

(Tél. : Burdeau 66-45.)

ZOMO-STHÉNOL

BOUILLON APÉRITIF — Tonique et reconstituant

Formule :

Sulfate de strychnine.....	0,001
Méthylarsinate de sodium.....	0,02
Sesqui-bromure de fer.....	0,03
Chlorure de manganèse.....	0,05
Glycérophosphate de calcium.....	0,10
Acide orthophosphorique.....	0,10

Lysat de globules rouges correspondant à 2 grammes de sang frais.
Extrait de viande et de légumes concentrés par procédé spécial à la quantité suffisante pour 1 tube scellé de 10 cc.

Indications. — Anémie, Asthénies, Anorexies, Dépressions, Neurasthénies, Convalescences, Surmenage, Amaigrissement, etc.

Présentation et prix :

Adultes : boîte de 10 ampoules buvables de 10 cc : 24 fr. 50.

Enfants : flacons de 150 cc. : 23 fr. 45.

Posologie :

Adultes : une ampoule dans une demi-tasse à café d'eau très chaude

donne un excellent bouillon apéritif, stimulant nerveux et tonique général. A prendre avant le repas de midi ou du soir.

Enfants : une cuiller à dessert représente le 1/3 d'une ampoule.

Enregistré sous le n° 1779-1 et 2.

Laboratoire COURTIN

G. COURTIN, Pharmacien,

134, avenue Jean-Jaurès — REIMS (Marne).

ZYMATINE LESCÈNE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Ferments, Galactozymases, Alcalinité titrée, Carbonate de Mg., Phosphate de Na et de Mg., Bicarbonate de Na., Lactose.

Propriétés. — Déconstrictant, Cholagogue alcalin, Pansement des muqueuses. Empêche les fermentations intestinales, Antiémétique. Eupeptique.

Indications. — *Enfants* : Constipation, Vomissements, Gastro-entérite, Intolérance lactée, Dermatoses, Hépatisme.

Adultes : Constipation, Vomissements, Hyperchlorhydrie, Affections hépatiques, Dermatoses.

Doses. — *Enfants* : 2 à 6 1/2 cuillerées à café par jour dans le lait (biberons), eau, bouillies. (Éviter température supérieure à 50°.) Dans la *constipation*, on peut augmenter les doses sans danger jusqu'à effet.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café suivant effet, dans un demi-verre d'eau avant le repas, 2 à 3 fois par jour.

ZYMATINE IRRADIÉE

Poudre lactosée, de saveur agréable.

Composition. — Zymatine, Vitamines, Nucléinate de Ca.

Indications. — Médications hépato-digestive et reminéralisante associées.

Doses : *Enfants.*

Jusqu'à 6 mois : 1/2 cuillerée à café matin et soir.

— 1 an : — matin, midi et soir.

Au-dessus de 1 an : 2 1/2 cuillerées à café matin et soir.

On peut augmenter les doses sans danger.

Adultes : 1 à 2 cuillerées à café 2 à 3 fois par jour.

Laboratoires LESCÈNE

PARIS, 58, rue de Vouillé (Tél. : Vaugirard 08-19.)
et LIVAROT (Calvados).

ZYMION

Traitement du rhumatisme chronique.

Description. — Capsules glutinisées contenant : Soufre colloïdal, Manganèse colloïdal, Lithium colloïdal, Etain colloïdal et Levurine Extractive.

En flacons de 60 capsules.

Action pharmacodynamique. — L'action résolutive du soufre sur les tissus fibreux, celle du Lithium sur la diathèse uratique, du Manganèse sur la goutte et l'érythème noueux, et la présence d'Etain colloïdal (qui existe dans diverses sources thermales) et de *Levurine extractive*, antitoxique, antiglycémique et stabilisant des colloïdes minéraux, expliquent l'activité du *Zymion* dans de nombreuses formes de rhumatisme.

Indications. — Rhumatisme chronique simple, fibreux, déformant, noueux, infectieux, arthrite sèche, goutte, lumbago, et toutes manifestations arthritiques ou rhumatismales chroniques avec réactions douloureuses.

Doses. — 4 à 10 capsules par jour aussi longtemps qu'il est nécessaire.

Prix : 28 fr. 60 pour 6 à 15 jours de traitement.

Laboratoires COUTURIEUX

18, avenue Hoche — PARIS.

(Tél. : Carnot 18-75.)

ZYMOGASTRINE KERVAN

Auxiliaire puissant des fonctions digestives.

Forme. — Poudre.

Composition. — Mélange légèrement effervescent de sels alcalins associés à des ferments digestifs.

Mode d'emploi :

A. *Adultes.* — Le matin à jeun : une cuillerée à café délayée dans un demi-verre d'eau.

Dans la journée : une cuillerée à café, soit une demi-heure avant les deux repas (nausées, fringales, aigreurs, pyrosis), soit une heure après les repas (comme saturant de l'acidité gastrique primitive ou secondaire).

B. *Nourrissons.* — Une pincée dans un peu d'eau bouillie avant chaque prise d'aliments.

Indications. — Tous états nauséux, états vésiculaires, mal biliaire, dyspepsies de tous ordres. Grossesses nauséuses, vomissements des nourrissons.

Sans contre-indications.

Prix de vente au public : 14 fr. 30.

Dépôt Général :

J. LAURIN, Pharmacien

CHAMBOURCY (Seine-et-Oise).

ZYMOSTOL

Vitamine D naturelle sur un support vivant, présentant en même temps des vitamines B et des acides aminés.

Indications. — Toutes déficiences de Calcium, Magnésium et Phosphore, alcaloses, Décalcification, Soudures osseuses, Asthénies, Convalescences, Certaines déficiences glandulaires.

Posologie. — *Ampoules buvables*: Une ampoule de 3 cc. 5 par jour ou tous les deux ou trois jours dans un peu d'eau sucrée ou non, le matin à jeun.

Présentation. — Boîte de 10 ampoules de 3 cc. 5.

L. N. C. M. n° 535-39.

Prix : 25 francs.

Laboratoires TORAUDE

22, rue de la Sorbonne — PARIS (V°).
(Tél. : Odéon 73-92.)



2^e Partie

NOMENCLATURE NOMINALE DE SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES MÉDICALES

avec les adresses de leurs
Fabricants

Les noms des produits précédés d'un astérisque figurent dans la 1^{re} partie du présent ouvrage avec leurs compositions, propriétés thérapeutiques, indications et posologies.

A

- *A 313
- Absinthine Houdé
- *Absuric
- *Acatar
- Accessoires d'Électricité médicale
- Accod
- Accouchements aseptiques Astruc
- *Acécolex
- *Acécoline
- *Acécoline camphre
- *Acécoline Papavérine
- *Acécoline Spartéine
- *Acécoline Yohimbine
- *Acépyline
- Acépyrol Brun
- *Acéryl
- *Acésine Guillaumin
- *Acétamone
- *Acéto-Sterandryl
- Acétosulfol Huerre
- *Acétumine
- *Acétylarsan
- Achlorol
- Acide oléique P. Thibault
- *Acidofoce
- Acimyl Monimart
- *Acobella
- Acodros
- Acoégénol
- *Acolitol
- *Aconitine Houdé
- *Acoqtol
- Acticalcine
- Acticarbine
- Actiformine
- Actigermine
- Actimaryl
- Actine
- Actinophore
- Chabre Frères, Toulon.
- 9, rue Dieu, Paris.
- 17, rue de Provence, Paris.
- 72, quai Jemmapes, Paris.
- 12, av. du Maine Paris.
- 28, r. de l'Hôp.-Militaire, Lille.
- 5, Grande-Rue, Montpellier.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 74, rue Monge, Paris.
- 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
- J. Blanchard, Pont-de-Vaux(Ain)
- 13, r. Cherche-Midi, Paris.
- 40, rue de Bellechasse, Paris.
- 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
- 41, route de Turin, Nice.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 110, route de Colmar, Strasbourg.
- 48, rue d'Alésia, Paris.
- (Voir : Oléocidase.)
- 25, rue Michelet, Saint-Ouen (Seine).
- 23, rue Grand-Cerf, Meaux.
- 191, fg Saint-Antoine, Paris.
- 62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M.).
- Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- 9, rue Dieu, Paris.
- Mialhe, 8, rue Favart, Paris.
- 109, rue de Sèvres, Paris.
- 149, av. des Minimes, Toulouse.
- 149, av. des Minimes, à Toulouse.
- 11, rue F.-Giraud, Villefranche-sur-Saône.
- 9, imp. Thoréton, Paris.
- 60, rue Vieux-Pont-de-Sèvres, Billancourt.
- 84, av. de Saint-Mandé, Paris.

***Actiphos**

Actipyrine
Actitonic liquide
Adénocédran
Adénocynésine

Adénoseptyl**Adhésif Radonol**

Adiploc

***Adipo-Fugeline**

Adolan
Adolol
Adonal Vicario
Adonidine Clin

***Adoverne Roche**

Adragol
Adral
Adrénaline Aguetant
Adrénaline Byla
*Adrénaline Carrion
*Adrénaline Choay
*Adrénaline Clin

Adrénaline Houdé

Adrénaline Invar**Adrénaline Mialhe**

Adrénaline Sauba

Adrenargol**Adrénine Mialhe*****Adrenocalcine*****Adrénoïdes Béral**

Adréno Cortex
Adréno Total. (Voir
Lipoides)

***Adrénooléine**

Adrénoolive
Adréno-physéine
Adréno-Styptique Midy

Adrépatine Laleuf**Adréphédrine Béral**

Adrialgine

Adrianine

Adrogestill

Adsorgan***Aéine**

Aérasthmyl Mossion

Aérocid**Aérocolyl*****Aérol*****Aérophagyl*****Æsculase**

Æthone

Alatyl

Affinex

42, rue Émile-Deschanel, Courbevoie (Seine).

9, rue Victor-Letalle, Paris.

160, av. d'Italie, Paris.

Gruyer, Anizy-le-Château.

10, r. Rabelais, Asnières (Seine).

E. Dufour, Amplepuis (Rhône).

110, bd Haussmann, Paris.
(Voir: Radonol.)

9, rue Victor-Letalle, Paris.

2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).

45, rue du Marché, Neuilly.

D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.

17, bd Haussmann, Paris.

20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.

10, rue Crillon, Paris.

15, rue des Champs, Asnières.

1, av. de Villars, Paris.

36, quai Fulchiron, Lyon.

26, av. Observatoire, Paris.

54, fg Saint-Honoré, Paris.

48, av. Th.-Gautier, Paris.

20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.

9, rue Dieu, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

8, rue Favart, Paris.

Montreuil-Paris.

Lab. LUGOCALCION, Oullins (Rhône).

(Voir: Adrénaline Mialhe.)

L. ADAM, à Granville (Manche).

194, rue de Rivoli, Paris.

8, pass. Morel, Montrouge.

8, pass. Morel, Montrouge.

40, rue des Acacias, Paris.

Lab. SAUBA, Montreuil-Paris.

14, rue de Cligny, Paris.

67, av. de Wagram, Paris.

51, rue Nicolo, Paris.

194, rue de Rivoli, Paris.

9, rue de la Perle, Paris.

9, rue de la Perle, Paris.

45, fg Saint-Denis, Paris.

6, place des Ternes, Paris.

6, place Cligny, Paris.

20, rue d'Angoulême, Cognac.

20, rue de Péetrograd, Paris.

199, bd Bineau, Neuilly-s.-Seine.

19, rue Drouot, Paris.

12, bd Saint-Martin, Paris.

20, bd Heurteloup, Tours.

35, rue Boissonnade, Paris.

8, pass. Morel, Montrouge.

2, rue des Lombards, Paris.

- Agamétol**
Agaraffine
 ***Agarase**
Agardol
Agar-Lac

Agarlaxine

 ***Agarol**
Agaryl Fournier
Aglucol
 ***Agobyl**
 ***Agocalcium**
 ***Agocholine Zizine**
Agocrynos

Agofluine

 ***Agomensine Ciba**

 [**Agonal**
Agonocaine
Agonol Cognet
 ***Agorenal**
 ***Agorexine**
Ago Sels
Agosthépine
Agozyl
 ***Agozymase**
Agrippol
 ***Aigue d'Or**
Aimhepar
 ***Airoyglyce**
 ***Akésol Muzi**
 ***Albu-Coli**
Albumar
Albuplast
 ***Alburénol**
Alburol
Albuvore
 ***Alcachol**
 ***Alcacyl Wander**
Alcaderma

Alcadermine
Alcala
Alcalinase
 [**Alcalino-Correctine**
Alcalino-Gastrol
 ***Alcalinose**
 ***Alcalisalyl**
Alcaloïdes seuls et
combinés
Alcalovules
Alcalozal
Alcasalyl
- Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 58, bd Port-Royal, Paris.
 115, rue de Paris, Boulogne-s.-S.
 58, bd Port-Royal, Paris.
 Lab. MIQUEL, 1, av. Lowen-
 dal, Paris.
 AURAX, Combronde (P.-de-
 D.).
 53, r. du Poinçon. Bruxelles.
 7, rue Biscornet. Paris.
 PATRICE, à Vichy.
 Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
 299, rue des Pyrénées, Paris.
 24-26, rue de Fécamp, Paris.
 Calmels, Auterive (Haute-Ga-
 ronne).
 Delaunay, 119 bis, rue Victor-
 Hugo, Tours.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 28, rue de Seine, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 43, rue de Saintonge, Paris.
 89, rue Martre, Clichy (Seine).
 37, av. de la République, Paris.
 Fosset, Montfermeil (S.-et-O.).
 3, pl. Hôtel-de-Ville, Vienne.
 69, rue de Sèvres, Paris.
 71, av. République, Champigny.
 SAUBA, Montreuil (Seine).
 53 bis, bd de la Liberté, Lille.
 29, rue Jean-Perréal, Lyon.
 55, rue de Chabrol, Paris.
 40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon.
 84, av. Versailles, Paris (XVI^e).
 28, rue Marceau, Angers.
 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
 Alpha Montreux-le-Château (H.-R.).
 r. Albert-I^{er}, Beaumont-s.-Oise.
 19, rue Jacob, Paris.
 134, av. Parmentier, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
 47, r. de la Boule-d'Or, Romilly
 (Aube).
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 M. Le Floch, Quessy-Cité (Aisne).
 23, bd Hoche, Saint-Brieuc.
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 35-37, rue, Joinville Laval.
 Labor. Dulcis, place Clichy.
 Monte-Carlo.
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Le Floch, Quessy-Cité (Aisne).
 GATEL, Evron (Mayenne).

- Alcasodine**
Alcatensyl
Aldhylène
***Aldine**
Aldogène Carteret
Aldophène

Aldor
***Alepsal Genévrier**
***Alexime**
Alfane
***Algane**
Algarine Nyrdañ
Algarol
Algatan
Algiogyl
Algécrine

***Algéon**
Algilaxine
Algional
***Alipan Midy**
Algoboldine
***Algocratine Lancosme**
Algocrinol
Algocurine
Algodigestine
***Algoil du D^r Guiraud**
Algolane Poulenc
***Algonal**
Algopha Baume
***Algophagine**
Algoplast
Algosédine
Algosécol
Algostérine Oliviero
Algovitine
Algozone
***Alibourine**
***Alimavéna**

Aliment Edel
Alimentine Mory
***Aliments équilibrés Joly**
***Aliment Tinardon**
Alisal
***AllauroL Lumière**
Allcock's Porous Plaster
***Allergantyl Miluc**
***Allergine**
***Alliocar**
***Alliodose**
***Allisatine**
***Allium Coirre**
***Allocaïne Lumière**
- 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 9, imp. Thoréton, Paris.
 74, rue de Rome, Marseille.
 37, rue de la Fédération, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 17, av. de la République, Aubervilliers.
 39, r. Roger-Salengro, Bondy.
 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
 8, rue Riblette, Paris.
 3, rue Watteau, Courbevoie.
 35, rue de Paris, Clichy (Seine).
 12, r. de la République, Puteaux.
 6, rue des Dames, Paris.
 3-9, rue des Alouettes, Nanterre.
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Laurençon, Villefranche-sur-Saône.
 Eon, à Dinan (Côtes-du-Nord).
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 67, av. Wagram, Paris (XVII^e).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 86, rue de la Réunion, Paris.
 PONCET, à Limoges.
 5, pl. Francheville, Périgueux.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 Fournier, Dijon.
 58, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).
 27, r. G.-Teissier, St-Étienne.
 Boulogne-sur-Seine.
 Fontanier, Moulins-s-Yèvre (Cher).
 Lab. Marin, de Pontaillac-Royan.
 Lab. B. E. A., Belfort.
 Aliments équilibrés Joly, Bourg-la-Reine (Seine).
 122, Champs-Élysées, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 17, rue Cadet, Paris.
 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne-Colombes.
 2, rue J.-Bara, Paris (VI^e).
 11, rue de Clichy, Paris.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 13, pl. du Peuple, Saint-Étienne.
 20, rue Vernier, Paris.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.

- *Allochrysine Lumière 45, rue Villon, Lyon.
- *Allonal Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Allophaquina 3, rue Watteau, Courbevoie.
- *Aloïne Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- *Aloplastine 19, av. d'Orléans, Paris.
- *Aloysine 139, rue de Paris, Pantin.
- Alpilex 47, rue Nollet, Paris.
- *Alsodine 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- *Alucol Wander P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
- *Alunozal 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Alvoricine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Alzine 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- Amalariol Jarmon, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- *Ambocurine 12, r. des Petits-Carreux, Paris.
- Amborhinol 276, rue Lecourbe, Paris.
- Ambrine 84, bd Garibaldi, Paris.
- *Amibiasine 69, rue de Wattignies, Paris.
- Amicrargol 177, r. de Courcelles, Paris.
- *Amidal 4, pl. des Vosges, Paris.
- Amidon Planche 2, rue Volney, Paris.
- *Amido-Septine rue Fred.-Chevillon, Allauch.
- *Amiflorine PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
- *Aminase 40, cours Charles-Vitton, Lyon.
- *Aminoléine 72, r. de Bagneux, Montrouge.
- *Aminophylline Boudier 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Aminophylline Carena 39, bd Latour-Maubourg, Paris.
- Amino-Sel Byla 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Amiphédrine 6, place Jean-Jaurès, Montrouge.
- *Amiphène 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- Amipyrine 113, bd Voltaire, Paris.
- Ampélicônes 11, rue La Fayette, Paris.
- Ampélidine 11, rue La Fayette, Paris.
- *Amphomuth 21, bd Riquier, Nice.
- *Amphoprophyl T.A.B. 21, bd Riquier, Nice.
- Ampho-Pulvérisateur
- Ronchèse 21, bd Riquier, Nice.
- *Ampho - Quintivaccin 21, bd Riquier, Nice.
- Amphormone 4, av. M.-Berteaux, Poissy (S.-et-O.)
- *Amphostabyl 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- *Amphosynthyl 4, pl. des Vosges, Paris.
- *Ampho-Tablettes Ron-
- chèse 21, bd Riquier, Nice.
- *Amphotonyl Lersam 14, rue Maubland, Paris.
- *Ampho-Vaccins de
- Ronchèse 21, bd Riquier, Nice.
- *Ampolases - opolases
- (Voir Opothérapie
- E. Vergelot)
- Ampoules Aguetant
- Ampoules antalgiques
- Ophidios
- *Ampoules Anti-H.
- Ampoules antipalu-
- diques Fraisse
- *Ampoules Auto-In-
- jectables Acron 45, rue Villon, Lyon.
- 10, rue Crillon, Paris.
- 3, rue Watteau, Courbevoie.
- 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- 19, av. d'Orléans, Paris.
- 139, rue de Paris, Pantin.
- 47, rue Nollet, Paris.
- 29, fg de Bourgogne, Orléans.
- P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
- Jarmon, 4, pl. de la Gare, Tunis.
- 12, r. des Petits-Carreux, Paris.
- 276, rue Lecourbe, Paris.
- 84, bd Garibaldi, Paris.
- 69, rue de Wattignies, Paris.
- 177, r. de Courcelles, Paris.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 2, rue Volney, Paris.
- rue Fred.-Chevillon, Allauch.
- PROBIOS, 8, r. St-Martin, Paris.
- 40, cours Charles-Vitton, Lyon.
- 72, r. de Bagneux, Montrouge.
- 37, rue de Bourgogne, Paris.
- 39, bd Latour-Maubourg, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 6, place Jean-Jaurès, Montrouge.
- 69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).
- 113, bd Voltaire, Paris.
- 11, rue La Fayette, Paris.
- 11, rue La Fayette, Paris.
- 21, bd Riquier, Nice.
- 21, bd Riquier, Nice.
- 21, bd Riquier, Nice.
- 4, av. M.-Berteaux, Poissy (S.-et-O.)
- 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 21, bd Riquier, Nice.
- 14, rue Maubland, Paris.
- 21, bd Riquier, Nice.
- (Voir Opothérapie
- E. Vergelot)
- Ampoules Aguetant
- Ampoules antalgiques
- Ophidios
- *Ampoules Anti-H.
- Ampoules antipalu-
- diques Fraisse
- *Ampoules Auto-In-
- jectables Acron

163, rue de Flandre, Paris.
36, quai Fulchiron, Lyon.

67, r. de Grenelle, Paris (VII^e).
160, av. d'Italie, Paris.

8, rue Jasmin, Paris.
37, r. de la Hale-Coq, Auber-
villiers.

- *Ampoules auto-instillables Nader
Ampoules de benzoate et bi-iodure Hg. Vigier
Ampoules bi-iodure Hg. Midy
- *Ampoules Boissy
Ampoules Cantonnet
Ampoules Cardio - Camphre (simple et sparthéiné)
Ampoules Dubé
Ampoules Égralène
Brisson
- *Ampoules Ferrugineuses Fraisse
Ampoules « Gay-Lussac »
Ampoule huile soufrée
Brisson
Ampoules Lemary
Ampoules névrosthéniques Dausse
- *Ampoules Névrosthéniques Fraisse
Ampoules Ophidies
Ampoules Optima
Ampoules Pentamicros
- *Ampoules Reipar
Ampoules Romon
Ampoules Scléro-Hémorroïdiques Fraisse
- *Ampoules Sclérosantes Fraisse
Ampoules Sigmuth
Ampoules d'Uriage
Ampoules V.-E. Doumer
- *Ampoules Vigor
Aminine
- *Amybdine
Amygdarsol
Amyliodine
Amylobromine
- *Amylodiastase Thépénier
Anacamphre
Anacarbhol
Anaclasine infantile
- *Anaclasine Ranson
Anadiposine
- *Analgénine
*Analgésol
AnalGINE dentaire
Analgol
- *Analpyrine
- 6, rue de l'École, Versailles.
- 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- 67, av. Wagram, Paris.
SOUDAN, 48, r. d'Alésia, Paris.
- 19, rue Drouot, Paris.
- 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.
- 177, rue de Courcelles, Paris.
- 157, rue Championnet, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 1, rue de la Martinière, Paris.
- 157, rue Championnet, Paris.
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 4, rue Aubriot, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 67, rue de Grenelle, Paris (VII^e).
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- 177, rue de Courcelles, Paris.
DRAPIER, Rethel (Ardennes).
- 13, av. de Ségur, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- 15, Champs-Élysées, Paris.
- BOMEL, à Annonay⁷ (Ardèche).
- 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 44, av. Pasteur, Courbevoie.
- pl. de la Poissonnerie, Toulon.
- 163, rue de Flandre, Paris.
- 163, rue de Flandre, Paris.
- 10, rue Clapeyron, Paris.
- 1, avenue de Villars, Paris.
- 47, rue Maleret, Bordeaux.
- 96, rue Orfila, Paris.
- 96, rue Orfila, Paris.
- FLAHAUT, 74, r. Monge, Paris.
- 17, rue Cadet, Paris.
- 24, r. des Plantes, Paris (XIV^e).
- 8, ruelle Saint-Antoine, Nancy.
- D^r LALAUURIE, Cuxac-d'Aude.
- BERTRAND, Nomexy (Vosges).

- *Anapeptone Vassal 28, r. Hôpital-Militaire, Lille
 Anaphylène Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
 Anaplagan Calmels, Auterive (Hte-Gar.).
 *Anapyol 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 *Anaquintine Lescène à Livarot (Calvados) et 58, r. de
 Vouillé, Paris.
 Anasectol 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 *Anatensyl G. Calmels, Auterive (H.G.)
 Anatoxine diphtérique Institut Pasteur, 36, rue du
 D^r-Roux, Paris.
 *Anaural Barthélemy, pl. Forbin, Aix
 (B.-du-Rh.).
 *Anaxeryl BAILLY, 15, r. de Rome, Paris.
 *Andotestrone 73, rue Dutot, Paris.
 *Androcalcion 7, rue de l'Armorique, Paris.
 Androocrinol 8, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 *Andro-Gouttes 8, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 Andropolycrinol 8, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 Androsthénol 60, rue de Monceau, Paris.
 *Androstine Ciba 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 *Androvar 139, r. J.-Jaurès, Maisons-Alfort.
 *Androvules 139, r. J.-Jaurès, Maisons-Alfort.
 Andryl Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
 *Anégrine Rivier 10, pas. Morel, Montrouge (Seine).
 Anervol Mons 14, rue du Temple, Calais.
 Anestile Bengué 16, rue Ballu, Paris.
 Aneuvryl 71, rue du Fort, Aubervilliers.
 *Anexol Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 *Angéolol 10, rue du Pont-aux-Chèvres
 Fontenay-le-Comte (Vendée).
 *Angihormol Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 *Angiolymphé 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
 *Angionevrol 3, rue Lamblardie, Paris.
 *Angiosédine 81, rue de la Roquette, Paris.
 *Angioxyl 97, rue de Vaugrard, Paris.
 †Angitan 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Angivore 14, rue du Temple, Calais.
 *Angoral 5, pl. Francheville, Périgueux.
 Angostyl 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 *Angusturyl Porcher 35, rue des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 Angyl 44, av. Pasteur, Courbevoie.
 Anhémor 71, av. Victor-Emmanuel-III,
 Paris.
 Anepatox 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Anictérol 164, rue St-Honoré, Paris (1^{er}).
 *Aniodol interne et ex- 3-9, r. des Alouettes, Nanterre.
 terne 2, place des Vosges, Paris.
 *Ankylosyl 116, bd Haussmann, Paris.
 *Anoïde 7, rue de l'Armorique, Paris.
 *Anorexyl

- Anoxyne**
Anozyl
Antacidyl
Antalgol Dalloz
***Antalgyl**
***Antasthène**
Antasthme Cibrand
***Antélobine Byla**
***Antéparsine Grémy**
***Antepsal interne**
Anthelox
***Anthema**
***Anthiomaline**
Anthraccalcine
***Anthrasedptol**
***Anthraxivore**
Anthraxone
Anthylline
***Antialgos Christiaens**
Anti-anémique F. F.
***Anti-Asthénie Lauriat**
(Ex-Lauriatol)
Anti-asthmiques du
D^r Cléry
***Antiasthme Bengalais**
Anti-asthme Noirot
***Anti-Asthmine**
Antibilieux Fuzor
Antibronchitique
Anticolibacillaire
Anticonvulsif Kraus
Anti-coryza-Rex
***Anti-diabète H**

Anti-dermite
Antidiabétique Midy
***Antidiabétique Monavon**
***Antidiabétique Requis**
Antidol Leroy
Antidolor
Antidotase
Antidote-malaria
Antidouleur Barbessou
***Anti-Floculine**
Antifluor
Antifuronculeux
Antigastralgique
Winckler
Antigel
Antigélures
***Antigénines**
Antiglaire Forézen
Antiglairol
Antigonn RX
Antigonol
Antigrippal Demay

Gueret, Meung-sur-Loire (Loiret),
24, rue Jardel, Bordeaux.
Duret et Rémy, Asnières (Seine).
13, bd La Chapelle, Paris.
11 bis, 13, rue Levert, Paris.
54, fg St-Honoré, Paris.
199, av. V.-Hugo, Aubervilliers.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
14, rue de Clichy, Paris.
A. Clanché, Vars (Charente).
88, rue Duhesme, Paris.
21, rue Jean-Goujon, Paris.
21, rue Jean-Goujon, Paris.
SAUBA, Montreuil.
BAUDE, Saint-Aubert (Nord).
14, rue du Temple, Calais.
11, ch. de la Muette, Paris.
88, rue Duhesme, Paris.
4, rue Colbert, à Reims.
163, rue de Flandre, Paris.
31, av. Foch, La Garenne-
Colombes (Seine).
Lab. du D^r CLÉRY, 53, bd
Saint-Martin, Paris.
Fagard, Lons-le-Saunier.
Vesoul (Haute-Saône).
50, rue Nationale, Lille.
46, rue Pierre-Charron, Paris.
22, fg Saint-Michel, Angers.
14, r. de Normandie, Asnières.
37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
14, rue Demarquay, Paris.
Alpha, Montreux-le-Château
(H.-Rh.).
4, rue de Metz, Toulouse.
67, av. de Wagram, Paris.

41, rue Victor-Hugo, Lyon.
163, bd Croix-Rousse, Lyon.
Lamalou-les-Bains (Hérault).
7^o av. Thiers, Le Mans.
" NGLA ", Monte-Carlo.
30, quai Fulchiron, Lyon.
10, allées Damour, Bordeaux.
2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
26, r. des Petits-Champs, Paris.
DOMERGUE, Agen (L.-et-G.).

67, av. de Wagram, Paris.
18, rue de Beaune, Paris.
72, av. Thiers, Le Mans.
1, pl. Lucien-Herr, Paris.
Elssé, à Fontaine (Isère).
Castellane, Morteau (Doubs).
3, rue Lamblardie, Paris.
26, r. des Petits-Champs, Paris.
42, rue des Martyrs, Paris.

- *Antigrippine Midy**
Antikamnia
Anti-kokytine
Antiluétiques
Antimycose
Antinéase
Antinerveux Lesourd
***Antiobé Gmet**
AntipaludiqueLumière
***Antiphi**
***Antiphlogistine**
Antiphymase Meurice
Antiphymique Nomss
***Antiphymique Vadam**
***Antipiol**
Antipsorine
Antipur
Antipyrine efferves-
cente Le Perdriel
Antipyrine U. R.
Antirhumatismal Nu-
der
***Antirrhoïde Bélières**
***Antisciatique**
***Antiseptic Ladiu**
Antiseptinol
***Antiseptoma**
Antispa
Antispasmyl
Antisuce
Antityphique T. P.
***Antiuirique de Con-**
trexéville
***Antivirus**
***Antivirus Probios**
Antixénol
Antodyne Poulenc
Antonal
Anturic Labesse
Anucalm
Anuidol
Anulisia
***Anurique Duplex**
***Anusol**
Anytal Brisson
***Anxiol**
Anxiosédine
Anxyl
Anytal Brisson
Aortol
Apaisyl
- 67, avenue de Wagram, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Ga-
 renne-Colombes.
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 25, rue Dagorno, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 Salavert, Ste-Foy-la-Gde (Gir).
 88, rue Duhesme, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 Rion-des-Landes.
 11, r. Collange, Levallois (Seine).
 61, av. Louise, Bruxelles.
 88, rue Duhesme, Paris.
 Didry, Janville (E.-et-L.).
 8, av. Walkanaer, Nice.
 14, rue A.-Briand, Levallois.
 121, av. de St-Ouen, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 16, bd des Filles-du-Calvaire,
 Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 CHAMBON, pl. Francheville,
 Périgueux.
 36, rue des Archives, Paris.
 Baron, Sables-d'Olonne (Vendée).
 L. Robert, pharmacien à Niort.
 à Rion-des-Landes.
 30, bd Raimbaldi, Nice.
 FERCOCQ, La Varenne-St-
 Maur (Seine).
 14, r. de Normandie, Asnières.
 222, bd Pereire, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 (Voir : Probios.)
 74, r. de Lourmel, Paris (XV^e).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 2, quai Paul-Bert, Tours.
 38, rue des Lices, Angers.
 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 62, av. de Paris, Villejuif.
 14, rue Demarquay, Paris.
 Dreyer-Dufer, Nogent-s.-Marne.
 13, r. Pagès, Suresnes, et 53, r.
 du Poinçon, Bruxelles.
 157, rue Championnet, Paris.
 Falvy, 40, r. des Acacias, Paris.
 74, fg d'Ambrail, Épinal.
 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
 157, r. Championnet, Paris.
 16, bd des Filles-du-Calvaire,
 Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.

- Apaludol
 *Aparoxal
 Aphloïne
 Aphonía
 *Aphosal
 Apiol
 *Apioline Chapoteaut
 Apioline Houdé
 *Apiol Tanit
 *Apivène
 Aplexil
 Apocynine du Dr Des-
 champs
 Appareils faradiques
 Appareils galvaniques
 Appareils galvano-fa-
 radiques
 Appareils de haute
 fréquence
 Appareil Lancelot
 Appetonyl
 *Appetyl
 Aprot Vigier
 *Apsophol
 Apyrexine Optima
 Aquasoluble
 *Aquantol
 *Arapal
 Archésine Trouette-
 Perret
 *Arcica
 Ardogène
 Argent colloïdal élec-
 trique
 *Arg-Eph
 *Argocarbène
 Argolacta
 Argolène
 Argy
 *Argybil
 Argycarbonate
 *Argycuprol
 *Argyrescine Mars (dite
 Veinomars)
 *Argyrine
 *Argyrophédrine
 *Argyseptine
 *Arhémapectine Gallier
 *Arhéol Astier
 *Arhine Lambiotte Fr.
 *Aristargol
 Aristoplast
 *Aristoplastic (aristo-
 plats élastique)
 AUCLAIR, à Aigurande (Indre).
 7, allée du Midi, Courbevoie.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 3, rue Sarrette, Paris.
 48 bis, av. Mozart, Paris.
 PALC, Messigny (Côte-d'Or).
 8, rue Vivienne, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 Rouanet, Antibes (A.-M.).
 39, r. Claude-Bernard, Paris (V^e).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Laleuf, 51, rue Nicolo, Paris.
 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
 12, av. du Maine, Paris (XV^e).
 100 ter, av. de St-Mandé, Paris.
 27, r. G.-Teissier, St-Etienne.
 37, av. de la République, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 40, rue des Carmes, Orléans.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 16, rue Ficatier, Courbevoie.
 8, rue Favart, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 9, rue du Temple, Enghien.
 Maronneau-Morel, 156, r. des
 Fauvelles, Courbevoie.
 6, place des Ternes, Paris.
 8, rue Sarrette, Paris.
 140, rue Lamarck, Paris.
 Dulcis, pl. Cléchy, Monte-Carlo.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
 Guérande (L.-Inf.).
 28, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 20, av. Jean-Jaurès, Suresnes.
 7, rue de la République, Pu-
 teaux.
 1 bis, pl. du Président-Mi-
 thouard, Paris.
 42, rue du Dr-Blanche, Paris.
 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 9, rue de la Gare, Levallois.

- *Arkéblos
1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris.
- *Armanite
3, av. Daumesnil, Paris.
- Armosine
58, rue de Maubeuge, Paris.
- Aromalt
139, rue des Pyrénées, Paris.
- Aromoka R. U. F. É.
54-56, av. République, Paris.
- *Arquéritol
LESURE, 70, r. du Bac, Paris.
- *Arrhénal Adrian
9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Arrhénalifine Bureau
86, bd Port-Royal, Paris.
- Arrhéniques Clin
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- Arrhénomartiol Clin
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- Arrhénio-Splénine
6, rue Adolphe-la-Lyre, Courbevoie.
- Arrhénuclène Bergevin
à Châteaudun (Eure-et-Loir).
- Arrow-root
BLOCH, Tomblaine, près Nancy.
- Arsallyl
3, rue Lamblardie, Paris.
- Arsallyl iodé
3, rue Lamblardie, Paris.
- *Arsaminol Clin
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- Arsébényl Meurice
61, av. Louise, Bruxelles.
- Arsécrinol Lersam
14, rue Maubanc, Paris.
- Arsenic Organique
5, bd Montparnasse, Paris.
- Glasser
37, rue Spontini, Paris (XVI^e).
- *Arséniode Buriat
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
- Arsénobenz énes Clin
89, rue Sclessin, Liège.
- Arséno-fer Henry
6, pl. de Breteuil, Paris.
- Arsénogyl
Mouneyrat, Villen.-la-Garenne.
- *Arsénomyl
19-21, rue Van-Loo, Paris.
- *Arsénos-Solvant
20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
- Arsétonyl
H. BENOIT, Poligny (Jura).
- *Arshémo-Fer-B
Chassaigne, Ruffec (Charente).
- Arsiodyle
60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
- Arsiquinine Lemaitre
37, rue Pajol, Paris.
- Arsi-quinolforme
84, rue Sedaine, Paris.
- Arsi - Strychnal Longuet
Châtelain, Niort (Deux-Sèvres).
- Arsocléine
62, rue de la Tour, Paris.
- Arsycodyle Leprince
10, rue Crillon, Paris.
- Arsylène Roche
GREMY, 14, r. de Clchy, Paris.
- Arsynal Legrand
46, rue de Rome, Marseille.
- Arsysérum
Lab. Demasles, Vienne (Isère).
- *Artériocrinol
4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
- *Artériorlex (ou Minéralogène)
14, av. G.-Clemenceau, Nice.
- *Artérion Vincardi
5 bis, bd des Italiens, Paris.
- *Artério-Phan
121, av. St-Ouen, Paris.
- *Artérioveinine
78, bd Batignolles, Paris.
- Arthri-Biose
20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Arthricétol
Fercocq, la Varenne-St-Maur.
- Arthrident
Lyons, 30, rue Monge, Paris.
- *Arthrilax
9, impasse Thoréton, Paris.
- *Arthrilyse
22, rue Morere, Paris.
- Arthri-sel
21, av. Albert-I^{er}, Dijon.
- Arthrita
La Blomarine, à Dieppe (S.-Inf.).
- Arthritose
Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
- Arthrizol
11, rue Lafayette, Paris.
- Arthrolyl

- Arthrone
 Artichaut Rosa
 Articholine
 Artil
 *Artobyl
 Artoradine
 Artrex-Croz
 *Artrocolchine " C "
 *Arvensyl
 Arzonil
 Ascabiol
 Ascarine
 *Ascéine
 *Asciatine
 Ascle
 Asclérogénol
 *Ascoléine Rivier
 Aséphéine
 Aseptampoules Du-
 mesnil
 Aseptobiline
 Aseptoline Freysse
 *Aseptone
 *Aseptophédrine
 Aseptopoudre
 Aseptoradol
 *Aseptorhine
 Aseptovules
 Asepturine
 Asepturrol
 Asfarol
 *AS. I. P.
 *Asmocrine
 Aspirine Lafran
 Aspirine U. R.
 Aspirine Vicario
 Asquirol Poulenc
 Astasol Douetteau
 Asthma
 Asthmacidine
 Asthmalène
 Asthmapepton
 Asthmaphédrine
 *Asthmasédrine
 Asthmatyl
 *Asthmédrine
 Asthmenthol
 *Asthmo-Actine
 *Asthmo-Hépatine Le-
 brot
 Asthmolène
 *Asthmolysin
 Asthmor
 9, impasse Thoréton, Paris.
 11, rue Roger-Bacon, Paris.
 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes.
 17, rue Mayet, Paris.
 7, rue Sainte-Isaure, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 143, Gde-Rue Guillotière, Lyon.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Rayot, Seloncourt (Doubs).
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 10, passage Morel, Montrouge.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 50, r. République, Puteaux.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 25, rue Friant, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 30, rue Saint-Jacques, Namur.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 14, av. Perrichont, Paris.
 25, bd Edgar-Quinet, Colombes.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 20, fg St-Honoré, Paris.
 94, rue Michelet, Alger.
 Gde-Rue au Bois, Bruxelles.
 3, rue de Vouillé, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers.
 Lab. Optima, 78, Gde-Rue-aux-
 Bois, Bruxelles.
 9, impasse Thoréton, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris.
 19, av. Secrétan, Paris (XIX^e).
 33, fg Montmartre, Paris.
 BERTHON, à Dornes (Nièvre).
 24, av. Albert-I^{er}, Dijon.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 92, rue Bobillot, Paris.
 88, av. J.-B.-Clément, Bou-
 logne-s.-Seine.

- *Asthmosine
Asthmylose
Astmavol Reys
- *Atalante
Atébrine
(Voir : Quinacrine.)
- *Atens
Atensyl
Athérolysine
Atihal
Atlasantol
- *Atocrazine
Atodol
Atolysan
- *Atomine
Atonos
- *Atoquinol Ciba
- *Atospirine
*Atosulfase
- *Atouxin
Atrabiline Gory
- *Atrobyl

Atropophédrine
Attaches Néoplastex
- *Atural
Atussol
- *Aubéliode

Aubémone
- *Audigénine
Auriculine
- *Aurixéma
Auxergyl
Avantol
Avistyl
Axodermine
Axonal
- *Axopectine
Axorhine
- *Axyol
- *Azama
- *Azigol
- *Azotyl
- *Azufrol
- *Azym
3, rue E.-Burgault, Vannes.
2, rue Lesdiguières, Paris.
21, rue de la Gare, La Broque.
9, bd Malesherbes, Paris.
92, rue Bobillot, Paris (V^e).
17 bis, av. Parmentier, Paris.
41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
Lab. Demasles, Vienne (Isère).
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
2 bis, place des Vosges, Paris.
14, rue Demarquay, Paris.
156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
97, r. J.-d'Arc, Rouen (S.-Inf.).
103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
19, rue du Bac, Paris.
200, rue du Fg-Saint-Martin, Paris.
3, rue Lamblardie, Paris.
JOOSS, Montreuil (Seine).
M. Saudemont, Grenay (Pas-de-Calais).
CHAUVIN, Aubenas (Ardèche).
71, fg St-Martin, Paris (X^e).
10, rue de Strasbourg, Paris (X^e).
56, rue St-Lambert, Marseille.
33, rue Rempart-Matabiau, Toulouse.
3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
Defresne, 19, rue Jacob, Paris.
21, rue de Lyon, Paris.
11 bis et 13, r. Levert, Paris.
89, rue du Cherche-Midi, Paris.
20, rue des Écoles, Paris.
98, bd Rochechouart, Paris.
3, rue Sarrette, Paris.
20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
3, rue Sarrette, Paris.
3, rue Sarrette, Paris.
Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
21, r. des Roses, Dijon.
25, rue Jasmin, Paris.
18, av. Hoche, Paris.
28, r. Guibal, Marseille.

B

- *Babeure Dardelet
 *Babeurre Guigoz
 Babeurre Lactella
 *Babeurre Nestlé Élé-
 don
 *Babeurre Nutricia
 Babeurres Carrion-
 Lagnel
 *Babeurres La Faye

 *Babeurres Molard
 Babinox
 Babutyrose
 Baby-Bala
 Baby-Ossine
 Babysanine

 Bacilacrine
 Bacilactine
 Bacillactine Nutricia
 *Backérine
 *Bacté-Coli-Phage
 Bacté-Dysentéri-Phage
 *Bacté-Intesti-Phage
 Bacté-Phages
 *Bacté-Pyo-Phage
 *Bactéramide
 *Bacté Rhino-Phage
 *Bacté-Ricyl

 *Bactériophages Probios
 *Bacté-Staphy-Phage
 Bactioxylene
 *Bacturyl
 Bagnolax
 *Bain Bagnorradioactif
 Bains Brimox
 Bains carbogazeux de
 Royat
 *Bain carbogazeux
 Wolo
 *Bain Carré
 Bain de bouche du
 Dr A. Boll
 *Bain de bouche à la
 Duna-caine
 Bain de bouche Estève
- Bonnard (Yonne).
 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.
 à Tourcoing.

 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e)
 1, bd Saint-Martin, Paris.

 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.
 Ferme de « La Faye ». Marlihes
 (Loire).
 25, cours Lafayette, Lyon.
 14, rue Demarquay, Paris.
 23, rue du Flocon, Tourcoing.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 Billy-Montigny (Pas-de-Calais).
 35, rue Christophe-Colomb,
 Lille (Nord).
 50, r. de la République, Puteaux.
 50, r. de la République, Puteaux.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 4, pl. des Vosges, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 15, rue de Rome, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 22, rue de l'Est, Boulogne-sur-
 Seine.
 (Voir : Probios.)
 1, av. de Villars, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 Morellet, Bagnoles-de-l'Orne.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 BRIMONT, 74, r. Blanche, Paris.

 Royat (Puy-de-Dôme).

 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.

 7, av. du Doyenné, Lyon.

 17, rue de Berri, Paris.
 187, r. de la Croix-Nivert, Paris.

- Bain de Royan Varech** Lab. Marin, Pontailiac (Ch.-Inf.).
Bain Fagard (Sulfador) Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
Bain Flévar 22, rue de la Sorbonne, Paris.
***Bain Salvia** 139, av. Emile-Zola, Paris.
Bains médicamenteux 2-4, place Gambetta, Paris.
Bainsulphium 157, rue Championnet, Paris.
Bakolyse 122, rue du Cherche-Midi, Paris.
***Baldisedan** 133, rue Lecourbe, Paris.
***Ballotyl** 113, bd Voltaire, Paris (XI°).
***Balmiga** 127, bd Saint-Michel, Paris.
***Balnéradol** 25, rue Friant, Paris.
***Balsaformine** 42, r. Emile-Deschanel, Courbe-
 voie (Seine).
Balsaine 156, av. Victor-Hugo, Paris.
Balsamiode 19, cours Morand, Lyon.
***Balsamol Lescène** à Livarot (Calvados), et 58, rue
 de Vouillé, Paris.
***Balsamorhinol** Fides, 14, r. de la Comète, Paris.
Balsaniodol 10, rue Washington, Paris.
***Balsaquintine** 58, rue de Vouillé, Paris.
Balseptol 23, rue des Moines, Paris.
***Balsoforme** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
***Balsofumine** 22, rue Turbigo, Paris.
***Balsorhine (Huile, Cap-**
sules, Pommade) 22, rue Turbigo, Paris.
Balsosantol 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
Balsurol 16 bis, rue Dufresnoy, Paris.
***Bande Giltex** 28, cours Gambetta, Lyon.
***Bandes crêpe Néoplas-**
tex (Voir: Néoplastex.)
***Bandes Mérinos Bébé** 3, r. des Reculettes, Paris (XIII°).
Bandes ulcérophiles 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-
 Colombes.
Nozan Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
Bande du Praticien Ruby, Volron (Isère).
***Bande Presto** " ANGLA ", Monte-Carlo.
***Barbiflorine** 79, rue de Paris, St-Denis (Seine).
***Barcan**
***Bardane stabilisée** 4, rue Aubriot, Paris (IV°).
Dausse 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
Bardanyl 2, rue Chevalier-de-la-Barre,
 Saint-Quentin.
Baromyl 184, route de Genas, Lyon (III°).
***Barytol** 1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).
***Baryx-Colloïdal** 1 bis, pl. du Président-Mi-
 thouard, Paris.
***Basedowine** 20, rue Vernier, Paris.
Basergine A. Bouchand, Melle (D.-Sèvres).
***Basmyl** 78, c. de la Liberté, Lyon.
***Baume Adol** 27, bd de Courtais, Montluçon.
Baume Aparé 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
***Baume Aroma** St-Loup, Marseille (B.-du-R.).
***Baume D' Baissade** 52, rue de la Folie-Regnault,
 Paris.
***Baume des Bébés** 16, rue Ballu, Paris (IX°).
***Baume Bengué** Saint-Ouen-l'Aumône. (S.-et-O.).
***Baume Berthelot**

- Baume D^r Blancard 114, av. Jean-Jaurès, Paris.
 Baume Camphro-Sa- 8, rue Jasmin, Paris.
 lyle Fraisse
 Baume Chiron Mougnaud, Longjumeau (S. et O.).
 Baume Coqueluchyl 38, rue du Louvre, Paris.
 *Baume Crésa 2 bis, place des Vosges.
 Baume Dalet 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 Baume Darnoe Hubert, Romorantin (L.-et-C.).
 *Baume Delacour 56, bd Pereire, Paris.
 Baume de Dentition 33, fg Montmartre, Paris.
 Baume de la Faculté 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 Baume de l'Échalp Lab. Géha, Port-de-Bouc, près
 Albert Marseille.
 Baume Dolopax Lyon-Oullins.
 Baume Dolora 50, r. de la République, Puteaux.
 Baume Dulac 55, av. des Écoles, Cachan.
 *Baume Duret 20, rue Saint-Lazare, Paris.
 Baume Flozo 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 Baume Fuba 37, rue des Lois, Toulouse.
 Baume Gélurot 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
 Baume du D^r Gigon 25, bd Beaumarchais, Paris. (4^e).
 Baume Heptalgine Berthoumeyroux, Souillac (Lot).
 Baume Iki MERCIER, Fécamp (S.-Inf.).
 *Baume Kalendol 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
 Baume Kamol 6, rue Ad.-La Lyre, Courbevoie.
 *Baume Lartigol 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Baume Lorol Zedaire, à Chambéry.
 Baume Marta Bonnaure, à Alès (Gard).
 *Baume de la Mater-
 nité 7, rue Galvani, Paris.
 Baume Merveilleux 6, pl. de Breteuil, Paris.
 *Baume Oberlin 17, rue Cadet, Paris.
 Baume Oco 87, rue Lafayette, Paris.
 *Baume Panthésine 20, rue Vernier, Paris.
 Baume Pélévine 15, bd des Batignolles, Paris.
 Baume de Port-Royal 2, av. Gambetta, Choisy-le-Roi.
 Baume Py 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
 Baume des Pyrénées Chalet du Rêve, Bayonne.
 *Baume Rafax 4, rue Boulard, Paris (XIV^e).
 *Baume Rhodia 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Baume Robernard Pharm. Moderne, r. V.-Hugo,
 Mauléon-Soule (B.-Pyrénées).
 *Baume Robur 72, av. Thiers, Le Mans.
 Baume Saint-Antoine 4, avenue de Bayonne, Pau.
 Baume Saint-Roch place Forbin, Aix-en-Provence.
 Baume Saporex 184, route de Genas, Lyon.
 Baume Sarein 14, avenue Perrichont, Paris.
 *Baume Selenia 49, rue de Bitché, Courbevoie.
 Baume du D^r Serin de
 Gaillac 10, allées Damour, Bordeaux.
 Baume Suelta 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 Baume Tanex 66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
 *Baume Thomas 33, fg Montmartre, Paris.
 Baume Valentin-Chail-
 lot 10, Square de Châtillon, Paris.
 Baume Vêrandy G. Laurens, Aix-en-Provence.
 Baume Zénopal Miribel (Ain).

- *Baumix
- *Baumolacpinine
- *BB Derm Mars
- *Béatol
Béarnyl
- *Bécalciol « Mètère »
- Bédénal
- Beef Lavoisier
- *Beef Lavoix
- Bégessol
- *Belcarmine
- *Belhémine
- *Belladenal
- Belladone Dausse
- *Bellafoline
- Bellas « 707 »
- Bellas « M »
- *Bellasodine
- *Bellergal
- *Bellinguol
- Belvuline
- *Bemax
- Bémecé
- *Bénerva Roche (Vit B¹)
- Bengouté
- *Bensamine
- Benzethanopneumol
- *Benzethol
- Benzhermyl
- Benzoate de Folliculine
- Benzoate Le Perdriel
- Benzoate de Naphtol
- *Benzo-Bismuth Millot
- Benzobromine
- Benzocalyptol
- *Benzocarbène
- *Benzoflorine Julien
- *Benzo-Gynœstryl
- *Benzo-Gynœstryl 5
- *Benzo-iodhydrine
- Benzolactine
- Benzo-Lactol
- Benzo - phosphine
Christiaens
- Benzoplix
- *Benzoquinol
- Benzo-Ringyl
- *Benzosulfène
- Benzothymol
- Benzyanyl
- *Benzylcalcium
- Delaprée, Mortagne (Vendée).
- Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- Guérande (Loire-Inférieure).
- 25, rue Jasmin, Paris.
- à Salies-de-Béarn.
- 24, bd J.-Jaurès, Boulogne.
- (Voir : Névrovitamine 4.)
- Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- 222, bd Pereire, Paris.
- 57, bd Aristide-Briand, Cham-
- pigny (Seine).
- 33, Gde-Rue, Besançon.
- 3, imp. Adam, Boulogne-s.-S.
- 20, rue Vernier, Paris.
- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- 20, rue Vernier, Paris.
- 3, pl. Int.-Saint-Michel, Tou-
- louse.
- 3, pl. Int. Saint-Michel, Tou-
- louse.
- Rue Nouvelle, Villard-de-Lans.
- 20, rue Vernier, Paris.
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- 4^{ter}, rue Barbès, Courbevoie.
- 21, rue Violet, Paris.
- 10, rue Crillon, Paris.
- 55, r. de Chabrol, Paris.
- 72, quai Jemmapes, Paris.
- 84, rue du Commerce, Ville-
- neuve-le-Roi (S.-et-O.).
- 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 11, rue Milton, Paris.
- 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
- 177, r. de Courcelles, Paris.
- 14, pl. Hôtel-de-Ville, Beauvais.
- 213, rue St-Honoré, Paris.
- Fouchère, Rive-de-Gier (L.).
- 105, rue de Rennes, Paris.
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Seclo, 6, rue Adolphe-la-Lyre,
- Courbevoie.
- 38, rue Albouy, Paris.
- 10, rue du Parc-Royal, Paris.
- 4, rue Colbert, Reims.
- 98, rue de Sèvres, Paris.
- 25, rue de Calais, Dunkerque.
- 35, rue Boissonade, Paris.
- 62, av. Ph.-Auguste, Paris.
- 50, r. de la République, Puteaux.
- 1, avenue de Villars, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.

- Benzylol
 Bergamol
 Berkendyl
 Berralgine
 Béryline du D^r Fayès
 *Bétul-Ol Midy
 *Bévita
 *Bévitine
 *Bexinine
 Bi-98
 Bi-Activat
 Bianterol
 *Bi-As Aguetant
 *Biazan
 Bi-Carbine
 Bichlorone
 *Bi-Ci-Pa
 *Bi-Citrol Marinier
 Bicolyre
 *Bière des Nurses
 Bière Fanta(nourrices)
 Bifermets lactiques
 stables
 *Bifidigène
 Bigonor
 Bigynol
 Bi-Iodural Novat
 Bi-iodure Cros
 Bi-iodure Domergue
 Bi-iodure Midy
 Bikréol
 *Bilaxyl
 Bilentérie
 Bilexabol
 *Bileyl Fournier
 Bil-Flux
 *Biliase Raby
 *Biliboldo
 Bilichlorine
 *Bilicrinol
 *Bilidrainine
 *Bilifluine
 *Bilifluol
 Bili-Magnétol
 *Biliogastrine Chevillon
 Bilior Bouty
 *Bilivaccins
 *Bilivaccin Anticoliba-
 cillaire
 Billabstine
 Billeros
 Billirgyl
 Bilogène Reys
 Bilordyl
 Bil Soda
 Biminéral Reynaud
 *Binidia
 37, rue Gallée, Paris.
 9, impasse Thoréton, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 Noiro, Vesoul (Haute-Saône).
 2-4, place Gambetta, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 7, r. Fontaine-Delsaux, Lille.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 L. Colin, 19, r. St-Jean, Caen.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 49, r. du Château-d'Eau, Paris.
 37, r. Tivoli, Bordeaux.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 Oullins (Rhône).
 Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
 7, rue Chaptal, Paris.
 23, rue Ballu, Paris.
 276, rue Lecourbe, Paris.
 Bourg-la-Reine (Seine).
 77, route d'Orléans, Montrouge.
 98, r. J.-Mailotte, La Made-
 leine (Nord).
 22, rue Pigalle, Paris.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 54, rue de Paris, Charenton.
 BOMEL, à Annonay (Ardèche).
 12, rue de Nice, Paris.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 67, av. de Wagram, Paris.
 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 7, rue Biscornet, Paris.
 42, bd St-Marcel, Paris.
 à Asnières (Seine).
 Barthélemy, pl. Forbin, Aix.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 2 bis, place des Vosges, Paris.
 20, rue de Rivoli, Paris.
 58, r. de Maubeuge, Paris.
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 3, rue Dunkerque, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 117, rue de Belleville, Paris.
 33, rue Rennequin, Paris.
 30, rue Miromesnil, Paris.
 21, r. de la Gare, La Broque (S.-R.).
 62, rue de la Tour, Paris.
 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 Durand, à Aigues-Mortes.
 19, rue Franklin, Paris.

- *Binoxol 19, rue Franklin, Paris.
- Biocalcine 2, rue des Lombards, Paris.
- *Biocalcion 50, av. Jacqueminot, Meudon
- *Biocalcium 50, rue Nationale, Lille.
- Biocalcose Chevreton 52, rue La Bruyère, Paris.
- Biocalmine 50, route Nationale, Lille.
- Biocalyptol 76, rue Jean-Jaurès, Paris.
- Biocatalyseur-Rolland 85, r. V.-Hugo, Levallois-Perret.
- *Biocéane Olivéro, à Boulogne-sur-Seine.
- *Biocholine 1, av. de Villars, Paris.
- *Biocrina 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- Biocrine 122, fg St-Honoré, Paris.
- *Biodarcine 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
- Bioderma Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
- Biodermyl Monal 13, av. de Ségur, Paris.
- *Biodynamine 17, rue Cadet, Paris.
- *Biodynol Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
- *Bioélixir 160, av. d'Italie, Paris.
- *Bioentérase 69, r. de Wattignies, Paris.
- Bioforcil 1, r. des Augustins, Perpignan.
- Bioforgine Pruvot, Forges-les-Eaux (S.-Inf.).
- Biogastrine 1, bd Henri-IV, Paris.
- Biogastrol 18, rue de la Perle, Paris.
- *Biogénol Lab. Demasles, Vienne (Isère).
- Biokolarsan Calmels, Auterive (Haute-Garonne).
- *Biolactyl Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
- Biolax 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
- *Biolipase 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
- Biomagnésium 20, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Biomucine 1, av. de Villars, Paris.
- Bionéol 14, r. de Périgueux, Angoulême.
- Bionergy 16, rue Saint-Gilles, Paris.
- Bionine Lecronier, Domfront (Orne).
- Bionucléine 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- *Bio-Organic 160, av. d'Italie, Paris.
- Biopausine 32, rue de l'Ouest, Paris.
- *Biophène 19, rue Drouot, Paris.
- *Biophényl Rosso 3, rue Lamblardie, Paris.
- *Biophorine Girard 48, rue d'Alésia, Paris.
- Biophosphine Dépouilly, Le Creusot.
- Biophosyl Bertrand, Nomexy (Vosges).
- Biophylactine 116, av. Berthelot, Vienne.
- *Biophytol Bouyssou, Chambois (Orne).
- Bioplasmyl 2, r. N.-Dame, Guingamp (C.-du-N.).
- *Bioplastine 25, r. Dagorno, Paris (XII^e).
- Biopulmol Termes, Miramont-de-Guyenne (L.-et-G.).
- *Bioradyl 34, rue Pigalle, Paris.
- Biorégine Chambron, Portes (Drôme).
- Biorénine 18, rue de la Perle, Paris.
- Bio-Rob Delaunay, 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
- *Biosédra 37, rue Brochant, Paris (XVIII^e).
- Bio-Sel M. Desolmes, Le Cannet-Rocheville (A.-M.).
- *Biosérine 18, cours Suchet, Lyon.

- *Biosérone**
 Biosine Le Perdriel
***Biosodine**
 Biostabyl
 Biosthène
***Biosulfol**
***Biosurgon**

***Biotéol**
***Bio-Titane Prima**
***Biotone**

***Biotrigon**
 Biovigorine
 Biovital
***Bioxyol**
 Biozol
***Biphédrine** (aqueuse,
 huileuse)
 Biquinyl Meurice
 Bi-Ricin
 Bisalicylate

 Biscamph
 Biscols Fraudin
 Biscopaks Clin
 Biscottes Delft
 Biscottes Grégoire
 Biscottes Heudebert
 Biscottes et Biscuits
 Nutricia
Bisermol

***Bis-Hyd**
 Biskalose

***Bis-ka-ma**
 Bismétine Clin
***Bismhydral**
 Bismint
 Bismogénol
 Bismogyre
***Bismokaol**
 Bismucarbonate
***Bismullium**

 Bismupafne
***Bismusodine**
 Bismutartrol
 Bismuth Adler

***Bismuth Adrian**
***Bismuth B3**
***Bismuth (Crème de)**
***Bismuth Desleaux**
 Bismuthine
***Bismuthion**
- 8, rue Saint-Martin, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 M. Saudemont, Grenay (P.-de-
 C.).
 30, rue Singer, Paris.
 3, rue des Reculettes, Paris.
 r. Fréd.-Chevillon, Allauch (B.-
 du-R.).
 22, r. Perceval, Paris.
 6, rue du Colonel-Renard, Paris.
 7, r. de la République, Puteaux.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 25, rue Drouot, Paris.

 47, rue de Bretagne, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 72, route de Châtillon, Malakoff.
 Lab. du Gastrocarbone, Saint-
 Louis (B.-du-R.).
 55, av. des Écoles, Cachan.
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 45, r. Grande-aux-Belles, Paris.
 24, r. du Bois, Cllichy (Seine).
 85, rue St-Germain, Nanterre.

 142, rue Fransman, Bruxelles.
 9, rue de la Gare, Levallois-
 Perret.
 45, r. du Marché, Neuilly-Paris.
 Hosselopp Grandadam, Buhl
 (B.-Rh.).
 15, r. des Champs, Asnières.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 2, rue Paradis, Paris.
 8, r. Lafayette, Paris (IX^e).
 2, allées de Chelles, Le Raincy.
 7, rue de la République, Puteaux.
 7, Petite Place, Douai.
 St-Saturnin-les-Avignon (Vau-
 cluse).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
 6, pl. de Breteuil, Paris.
 36, rue des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 5, bd des Brotteaux, Lyon.
 5, rue d'Angoulême, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 LOGEAY, Le Langon (Vendée).
 18, av. Hoche, Paris (XVI^e).

- *Bismuthoidol Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
Bismuth Perroud 3, rue Sébastien-Gryphe, Lyon.
Bismuth Pointet Girard (Voir: Novismuth.)
Bismuth Terrial 22, rue de la Bienfaisance, Paris.
***Bismuth Tulasne** 48, bd des Batignolles, Paris.
Bismuth 25 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Bismuthyl « Meurice » 61, av. Louise, Bruxelles.
***Bismuxyl** 3, rue Lamblardie, Paris.
Bi-Sodine 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
Bi-So-Dol 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
Bissine St-Hilaire-des-Loges (Vendée).
***Bissyl** 117 ter, rue Ordener, Paris.
Bistan 31, rue Francs-Bourgeois, Paris.
***Bistomax** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Bitonine 56, r. St-Lambert, Marseille.
Bituyol 62, av. de Paris, Villejuif.
***Bivatol** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
Bivigor 348, rue Saint-Honoré, Paris.
Bladérol du Dr Jenrout 18-20, rue Vavin, Paris.
***Blagny (sirop, gouttes, dragées)** 85, rue de Turbigo, Paris.
Blastéase 10, rue Crillon, Paris.
Blécao Jacquemaire à Villefranche (Rhône).
***Blédine Jacquemaire** à Villefranche (Rhône).
Blé Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
***Blennopiat** 78, cours de la Liberté, Lyon.
Blennoradine 17, rue Mayet, Paris.
Blennosine Fornet 11, Chaussée de la Muette, Paris.
Blennotoxyl 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
Bleumyl 5 et 10 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
Blimal 42, rue de l'Abbé-Groult, Paris.
Bloc Saporex 184, route de Genas, Lyon.
Blocs Vécór 21, Rond-Point de la Reine, Boulogne (Seine).
Blokao Bloch, à Tomblaine (M.-et-M.).
Bluetine Meiller, Dumières (H.-L.).
***Blüyl** 6, av. Mirabeau, Nice.
Bokanol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Bolcitol 88, rue Duhesme, Paris.
Boldagar 239, fg Saint-Honoré, Paris.
Boldilia 24, av. Albert-1^{er}, Dijon.
***Boldine Houdé** 9, rue Dieu, Paris (X^e).
Boldine Plagnol 18, r. du Mar.-Foch, Versailles.
Boldine Verne 13, r. Docteur-Mazet, Grenoble.
Boldo-Basma Palc Messigny (Côte-d'Or).
Boldo-Biline Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
Boldobyl Sauba, Montreuil (Seine).
***Boldochol** 55, av. de Montredon, Marseille.
Boldocrésine 3, bd Jean-Jaurès, Paris.
***Boldocrinol** 86, r. Michel-Ange, Paris.
***Boldocyna** 6, av. Victor-Hugo, Paris.
Boldo Glucine Chapoteaut 8, rue Vivienne, Paris.
***Boldo-Gmet** 27, fg Montmartre, Paris.
***Boldoïne Éparvier** 26, Grande-Rue-St-Clair, Lyon.

***Boldolactic Lagoutte**

***Boldolactol**

***Boldolaxine**

***Boldolive**

***Boldomucyl**

***Boldo-Verne**

***Boléase Monal**

***Bolène**

Bonbons Lucas (Vermifuges)

Bonbons vermifuges Royer

Boréol

Boricine Meissonnier

***Borinhalant**

***Bornéosol**

Bornyval

Boro-borax Vigier

Borocalcyl Thévenot

Boroformyl

Borogenyl

Boromyl

Boroseptine

***Borosodine Lumière**

Borosol

***Borostyrol**

Borotropine Sevin

Boues Radioactives de Pistyan - les - Bains (Tchécoslovaquie)

***Boues radioactives Rhemda**

Bougies Américaines

Bougies camphrées

Collas

Bougies Chaumel

Bougies coricides Dermopode

Bougies radioactives Rhemda

Bougies Raynal

Bouillie Molard aux amandes

Bouillon antidysentérique Db

Bouillons végétaux

Bouillon Vaccin opératoire Sténé

***Boules Quiès**

Bouragar

Bourdainol

Bourgène Blanc

Boustrol

85, cours Albert-Thomas, Lyon.

11, bd de Strasbourg, Paris.

7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.

19, rue de Ponteves, Marseille.

45, rue Cambronne, Paris (XV^e).

13, rue du D^r-Mazet, Grenoble.

13, av. de Ségur, Paris (VII^e).

154, av. Malakoff, Paris.

Joubert et Sibassié, Nantes.
Laumonnier, 225, r. St-Martin, Paris.

21, rue de Lyon, Paris.

71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux.

156, av. Victor-Hugo, Paris.

143 bis, rue Ordener, Paris.

2, rue des Lions, Paris.

9, rue de la Gare, Levallois-Perret.

21, rue des Roses, Dijon.

47, rue Nollet, Paris (XVII^e).

14, rue Demarquay, Paris.

2 bis, rue du Chevalier-de-la-Barre, St-Quentin.

11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).

45, rue Villon, Lyon.

47, rue Nollet, Paris (XVII^e).

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

2 bis, rue Chevallier-de-la-Barre, Saint-Quentin.

45, rue du Marché, Neuilly.

51, rue d'Alsace, Courbevoie.

24, rue de Sully, Boulogne-s.-S.

Mougnaud, Longjumeau (S-et-O).

78, fg Saint-Denis, Paris.

22, rue Saint-Pierre, Evreux.

51, rue d'Alsace, Courbevoie.

12, rue de Nice, Paris.

25, cours Lafayette, Lyon (VI^e).

14, r. de Normandie, Asnières (Seine).

Heudebert, Nanterre (Seine).

2 bis, place des Vosges, Paris.

8, r. Aug.-Chabrières, Paris.

Bonnaure, à Alès (Gard).

6, rue Berbissey, Dijon.

8, r. de Loge, Montpellier.

78, fg Saint-Denis, Paris.

- *Bovavéna**
- *Bovcardia Lefrancq**
- *Bovhépatie Lefrancq**
- *Bovstrol Lefrancq**
- *Bradygastrine**
Bréthyl Dumesnil
- Brévanyi**
- Brilo-Entérine**
- Brimox**
- Bromadyl Vicario**
- Bromalbin Adrian**
- *Broméine Montagu**
- Bromephra**
- *Bromeserine**
- Bromhydrate Le Per-**
driel
- *Bromiase**
- *Bromical**
- Bromidia**
- Bromidine Henry**
- Bromisténine**
- *Bromocarbène**
- Bromocarpine Rocher**
- *Bromocodéine Chenu**
- Bromoderme**
- *Bromo-Garnal**
- *Bromogastrine Verge-**
lot
- *Bromogénol Pépin**
- *Bromomagnesium**
- *Bromomaïsine**
- *Bromone Robin**
- Bromophène**
- Bromovaleron Henry**
- *Bromovose**
- *Bromure de calcium**
- Bromure de camphre**
Clin
- Bromure de Codéine**
- Bromure d'éthyle**
- Bromure Laroze**
- Bromure Pachaut**
- Bromure de sodium du**
D^r Gigon
- *Bronchasmine**
- Bronchialis**
- *Bronchial Luna**
- Bronchitol Henry**
- *Bronchivax**
- Broncho-Axos**
- Broncho-Baume**
- Broncho-Correctine**
- Bronchodermine**
- Aliments équilibrés Joly, Bour-**
la-Reine (Seine).
- 36, av. de Metz, Romainville (S.).**
- 38, av. de Metz, Romainville (S.).**
- 36, av. de Metz, Romainville (S.).**
- Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).**
- 10, rue du Plâtre, Paris.**
- 15, qu. de Bourbon, Paris.**
- Piette, pharm., Étréaupont**
(Aisne).
- 74, rue Blanche, Paris.**
- 17, bd Haussmann, Paris.**
- 9, rue de la Perle, Paris.**
- 10, rue de la Barouillère, Paris.**
- 187, rue de Crétel, Maisons-**
Alfort (Seine).
- 59, rue Boissière, Paris.**
- 11, rue Milton, Paris.**
- 18, av. Hoche, Paris.**
- 98, rue de Sèvres, Paris.**
- 7, rue Lucien-Jeannin, La Ga-**
renne-Colombes.
- 39, rue Sclessin, Liège.**
- 171, rue de Belleville, Paris.**
- Leurquin, Dreux (E.-et-L.).**
- 32, rue Grenelle, Paris.**
- Montferrand (Puy-de-Dôme).**
- 8, av. Walkanaer, Nice.**
- 13, rue Boïnod, Paris (XVIII^e).**
- 6, rue de Navarin, Paris.**
à Courbevoie (Seine).
- 72, av. Kléber, Paris.**
- 48, rue d'Alésia, Paris.**
- 13, rue de Poissy, Paris.**
- Roussel, Gde-Rue, Flers (O.).**
- 39, rue Sclessin, Liège.**
- 14, rue Miromesnil, Paris.**
- 18, rue des Écoles, Paris (V^e).**
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.**
- Dausse, 4, rue Aubriot, Paris.**
- Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.**
- 2, rue des Lions, Paris.**
- 33, fg Montmartre, Paris.**
- 25, bd Beaumarchais, Paris.**
Saugier, Dôle (Jura).
- 6, rue Berbisey, Dijon.**
- 7, av. du Doyenné, Lyon.**
- 39, rue de Sclessin, Liège.**
- 97, rue de Vaugirard, Paris.**
- 3, rue Sarrette, Paris.**
- 34, rue Turgot, Narbonne.**
- 13, pl. du Peuple, St-Étienne.**
- 34, bd de Clichy, Paris.**

- *Broncho Favrot**
 Bronchofluid
 Bronchoforme
 Bronchogénine
***Broncho-Lactol**
 Bronchopan
 Bronchophile
***Bronchophilos**
***Bronchopneumol**

 Bronchopuerol
***Broncho-Rectine**

 Bronchorose
 Bronchosanyl Estève
***Bronchosédol**
 Bronchosédyl
***Bronchoseptol**
 Broncho-Sérum Con-
 nat
 Bronchotonine
***Broncho-Vaclydun**
 Broncodyl
 Bronco-sérum Connat
***Broncosol**
***Broncurol**
***Bronphélia**
 Bronxia
***Broseyl**
 Brumarsyl
 Bruméol Elixir
 Brunyl
***Bruzarine**
 Buccaniz
***Buccaseptyl**

 Bucchu-Basma
 Buccochlore
 Buccolan
 Bucco-Propone
 Buccospérine
 Buccothymol
 Buccurol
 Buchobleu
***Bucmine**
 Bucsano

 Buctol Paris
***Bufox**
***Bulgarine Thépénier**
***Bulgatropine - Bulga-**
 done
 Bursol
 Butyral
 Buvanol
 Buxain
 6, rue Dombasles, Paris.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 6, pl. de l'Académie, Angers.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 Lab. Badel, Valence (Drôme).
 6, rue Berbisey, Dijon.
 Doladille, Saint-Aignan-sur-
 Cher (L.-et-Ch.).
 Huyghe, Brazey-en-Plaine.
 46, r. St-Mandé, St-Maurice
 (Seine).
 23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.
 187, r. Croix-Nivert, Paris.
 16, cours Gambetta, Lyon.
 276, rue Lecourbe, Paris.
 Lauriat, La Garenne-Colombes.
 M. Follier, Rumilly (H.-Savoie).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 177, rue Saint-Maur, Paris.
 Folliet, Rumilly (H^{te}-Savoie).
 Brésil, 12, r. St-Gilles, Paris.
 10, r. de Constantinople, Paris.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 40, rue des Acacias, Paris.
 65, cours National, Saintes.
 65, cours National, Saintes.
 17, rue de Berri, Paris.
 Latour, Terrasson (Dordogne).
 14, rue du Temple, Calais.
 17, av. Charles-Lambert, Cha-
 tou (S.-et-O.).
 Lab. Palc, Messigny (C.-d'Or).
 5, cours St-Louis, Marseille.
 24, rue Jardel, Bordeaux.
 15, r. Catulienne, St-Denis.
 11, rue Malher, Paris.
 1, rue Ferrandière, Lyon.
 83, bd de la Villette, Paris.
 117, r. V.-Hugo, Houplines (N.).
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 9, av. de la Grande-Armée,
 Paris.
 4, rue Lamotte-Picquet, Paris.
 21, r. Grange-aux-Belles, Paris.
 10, rue Clapeyron, Paris.
 23, rue Louis-Astruc, Mar-
 seille.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
 2, r. du Cherche-Midi, Paris.
 18, rue Thiers, Mantes-Gas-
 court.

- *Buxema** 18, r. Thiers, Mantes-Gassicourt (S.-et-O.).
Bylac 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
Bylierine Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
Byl-Efa Lab. EFA, 5 bis, rue de Crimée, Paris.
Bylyxyl 37, rue de Bourgogne, Paris.

C

***C. 40**

- Cachets Adol**
Cachets Asminol
Cachets Aspéca
Cachets Atlantis
Cachets B. O. S. C.
Cachets bronchosthé-
niques
Cachet Caillau
Cachets Castanet
Cachets C. A. S.
Cachets Céli
***Cachets Charvoz**
Cachets Cy-troène
Cachets Dellé
Cachets digestifs Car-
bowil
Cachets digestifs du
D' Bern
Cachets digestifs Gydé
Cachets Dolozymes
Cachets Donol

Cachets du D' Boveil
Cachets du D' Faivre
Cachets du D' Marck
Cachets Felle
Cachets Gau

Cachets Hériol
Cachets Kapytan
***Cachets Lekma**
Cachets Louix
Cachets Merveilleux
- Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 78, c. de la Liberté, Lyon.
 1, rue Paul-Bert, Angers.
 P. Dordin, Harnes (P.-de-C.).
 66, rue Paradis, Marseille.
 38, rue St-Ferdinand, Paris.

 St-Gilles-sur-Vie (Vendée).
 Argentat (Corrèze).
 Lab. Marin, Pontallac-Royan.
 49, rue de Metz, Nancy.
 Landes, à Gramat (Lot).
 9 et 9 bis, rue Borromée, Paris.
 4, av. de Bayonne, Pau.
 Le Naour, Quimperlé (Finistère).

 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel,
 Toulouse.
 4, cours Tolstoï, Lyon.
 Sauba, Montreuil, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (B.-Rhin).
 1, rue Lassalle, Lyon.
 Tassin la Demi-Lune, Lyon.
 Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
 Guilbert, Hesdin (P.-de-C.).
 87, rue de la République, St-
 Mandé (Seine).
 Thévenin, Feurs (Loire).
 76, rue de Sèvres, Paris.
 P. Guin, Contres (L.-et-C.).
 78, cours de la Liberté, Lyon.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).

- Cachets Mictosidine
 Cachets Némi
 Cachets opothérapiques Byla
 * Cachets Pachaut α γ
 Cachets Phebor
 Cachets Phydès
 Cachets Prodiger
 Cachets Pulmonix
 Polvi
 Cachets Pyrana
 Cachets Rabelais
 Cachets Rava
 Cachets Réal
 Cachets réparateurs
 * Cachets du Dr Richomme
 Cachets Roche de Thio-col
 Cachets de Roux
 Cachets Salvé
 Cachets Saunier
 Cachets S. F. T.
 Cachets Seda
 Cachets de Sidérol
 PEM
 * Cachets Spévin
 Cachets Urby
 Cachets Van-Sol
 Cachets Vilax

 Cacodylate Vigier

 * Cacodyle Gonnon
 Cacodyle Mars
 * Cacodyline Jammes
 Cacodylo Phosphate
 vital Jacquemaire
 Cacospermine
 Cactocardine du
 Dr Conraux
 * Cadior
 Cadmiol zinc
 Cœcaline Gagnière
 Café décaféiné
 Cafédrine
 * Caféine granulée Houdé
 Calcéose Boillot
 Calcériode Marin
 * Calcibronat
 Calciclo
 Calcifixine Bureau
 Calcigénie
 * Calcigénol
 * Calcigénol irradié
 * Calciglandine
 Calcigouttes
 21, rue de Lyon, Paris.
 Géha, Port-de-Bouc, Marseille.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 33, fg Montmartre, Paris.
 64, rue des Tournelles, Paris.
 Miribel (Ain).
 12, rue Grande, Évreux.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 Logeay, Le Langon (Vendée).
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 62, r. des Petits-Champs, Paris.
 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 29, bd Voltaire, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 56, r. des Minimes, Marseille.
 45, fg St-Denis, Paris.
 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e).
 38, rue Saint-Ferdinand, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 P. Dordin, Harnes (P.-de-C.).
 18, r. du Mar.-Foch, Versailles.
 16, bd des Filles-du-Calvaire, Paris.
 9, rue de la Gare, Levallois-Perret.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 à Caudebec (Seine-Inférieure).
 19, rue Clapeyron, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 à Clermont-Ferrand.
 Heudebert, Nanterre (Seine).
 Sauba, Montreuil (Seine).
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 22, rue Morère, Paris.
 62, r. de Montreuil, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 90, bd St-Denis, Courbevoie.
 pl. de la Poissonnerie, Toulon.
 45, rue de Jussieu, Paris.

- *Calcilève
- *Calciline
- *Calciocholine
- Calciodyl
- *Calcio-Dynamyl
- *Calcional
- Calcion Elsse
- Calcior
- Calci-Ostéline
- *Calcipaine

- Calciphorine
- Calciphose
- Calcisan
- Calcisthénine
- Calcitanine-S
- Calcitanol
- *Calcium 30
- *Calcium Corbière
- Calcium Finikoff
- Calcium Français J. B.

- Calcium Francalcium
- *Calcium injectable
- Fraisse
- *Calcium-Plé
- *Calcium Rosso
- *Calcium-Sandoz
- Calcium Vehem
- *Calcivitam
- Calco-céril

- *Calcoléol
- *Calcomagnésie
- Calco-magnésol
- Calcophore
- *Calcozymase
- *Calgluquine
- *Calmaby
- *Cal-Mag-Na

- Calmant Meunier

- *Calmarine
- Calmasmine
- Calménol

- Calmidex
- Calmigorge
- *Calminimal
- Calmitine
- *Calmobro - Niel (ex-Kalmobrol)
- *Calmocardine
- Calmogastrol
- *Calmopelvine

- 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
- 21, rue Violet, Paris.
- Bertrand, Nomexy (Vosges).
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 95, rue Lecourbe, Paris.
- 52, r. La Bruyère, Paris.
- Chavanne, Fontaine, Grenoble.
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
- 7, rue de la République, Puteaux.
- 74, r. de la Jonquière, Paris.
- 14, r. des Pyramides, Paris.
- 23, r. Beautreillis, Paris.
- 171, r. de Belleville, Paris.
- 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
- 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- 299, rue des Pyrénées, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 21, rue Chaptal, Paris.
- 7, rue de la Montagne-Ste-Geneviève, Paris.
- 3, rue St-Roch, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 111 bis, rue de Turenne, Paris.
- 3, rue Lamblardie, Paris.
- 20, rue Vernier, Paris.
- 7, rue St-Isaure, Paris.
- route du Mouleau, Arcachon.
- 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
- 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- 47, rue Bokanowski, Asnières.
- 52, bd Diderot, Paris.
- 6, rue Raoul-Berton, Bagnolet.
- 3, rue Fernand-Widal, Paris.
- 20, rue Vernier, Paris.
- 84, rue Rochechouart, Paris.
- 13, rue Pagès, Suresnes, et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
- rue du Commerce, Montmarault (Allier).
- 95, rue Lecourbe, Paris.
- 137, fg. Saint-Antoine, Paris.
- Delaunay, 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
- 27, r. des Batignolles, Paris.
- à Thury-Harcourt (Calvados).
- 3, rue Lamblardie, Paris.
- Billebaud, Paray-le-Monial.
- 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
- 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
- 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes.
- 81, rue Réaumur, Paris.

- *Calmosuppos
- *Calmovarine
- Calobil
- Calogyre
- Calomel R.-B. Lagrave
- Calomel Vicario
- Calox
- *Calsédine
- *Calyptol Charpentier
- *Calyptophédryl
- *Camformine
- Camphal
- Camphemol
- Camphex
- *Camphocalyptol
- *Camphodausse
- *Camphogénine
- *Campho-Pneumine
- Camphoral Aguetant
- Camphoran
- *Campho - Spartéine
- Dubois
- *Camphostyl Lacroix
- Camphroluble
- *Camphrolyse
- *Camphro-Salyl Fraisse
- Camphryl
- *Camphydryl Robin
- Camphydryl Spartéiné
- *Camphydryl strychno-
- spartéiné Robin
- Campolon
- *Canol
- *Cantéine Bouteille
- *Caparlem
- Capillairal
- Capsol
- Capsoléol
- Capsorhinol
- Capsovules Diplos
- Capsules Bonnefond
- *Capsules Bruel
- Capsules Cédro - Mé-
- thyle
- Capsules Cognet
- Capsules Dartois
- Capsules de Gonosan
- Capsules Dieu
- Capsules Enos
- Capsules et sirop Préga
- Capsules Goubaux
- Capsules grises Ca-
- banes
- Boivert, Montguyon (C.-I.).
- 81, rue Réaumur, Paris.
- 84, rue Rochechouart, Paris.
- Imbert, à Toulon (Var).
- 72, quai de Jemmapes, Paris.
- 17, bd Haussmann, Paris.
- 7, rue Lucien-Jeannin, La Ga-
- renne-Colombes.
- 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
- 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.
- 11 bis et 13, r. Levert, Paris.
- 7, rue de l'Armorique, Paris.
- 15, r. Mercière, Erstein (B.-Rh.).
- 109, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- 59, bd Lefebvre, Paris.
- 26, rue des Moines, Paris.
- 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- 3, rue Lamblardie, Paris.
- 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 59, bd Lefebvre, Paris.
- 16, bd Pereire, Paris.
- 37, rue Pajol, Paris.
- Delaunay, 119 bis, rue Victor-
- Hugo, Tours.
- 8, rue Saint-Martin, Paris.
- 8, rue Jasmin, Paris.
- 16, bd Péreire, Paris.
- 13, rue de Poissy, Paris.
- Id.
- Id.
- 143, av. Louise, Bruxelles.
- Maizet (Calvados).
- 23, rue des Moines, Paris.
- Lab. Lorrain de Produits Purs,
- Étain (Meuse).
- Arquevaux, Étampes (S.-et-O.).
- 74, rue Blanche, Paris.
- Lab. Aninat, à Nîmes (Gard).
- 9, impasse Thoréton, Paris.
- 13-15, rue des Châmes, Asnières.
- 10, rue de la Barouillère.
- Seclo, 6, rue Ad.-La-Lyre,
- Courbevoie.
- 55, rue de Chabrol, Paris.
- 43, rue de Saintonge, Paris.
- 6, rue Abel, Paris.
- 2, rue des Lions, Paris.
- 7, rue Charlot, Paris (III^e).
- 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
- 50, rue Nationale, Lille.
- 4, rue Colbert, Reims.
- 17, rue Cadet, Paris.

- Capsules Gurgol
 *Capsules H a a r l e m Bardet 76, rue de Sèvres, Paris.
 *Capsules Henry 36, quai Fulchiron, Lyon.
 *Capsules Huile de Haarlem véritable (Voir Huile de Haarlem) 33, fg Montmartre, Paris.
 Capsules d'Ichtyol Vigier 9, rue de la Gare, Levallois-Perret.
 *Capsules Joret et Homolle 165, rue Saint-Honoré, Paris.
 *Capsules Kuchner L. Hinglais. Épernay (Marne).
 Capsules de Morrhuine Puy Grenoble (Isère).
 *Capsules Noguès 7, rue Galvani, Paris.
 Capsules Pneuma¹ 172, rue d'Alésia, Paris.
 Capsules Raquin 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Capsules Ricord 3, bd Beaumarchais, Paris.
 Capsules salolées 31, r. Philippe-de-Girard, Paris.
 Capsules Sédomicol 21, rue de Lyon, Paris.
 Capsules Sérafon 9, rue de la Perle, Paris.
 Capsules de sulfate de quinine 8, rue Vivienne, Paris.
 Capsules Taetz 2, rue Lesdiguières, Paris.
 Capsules Therpinol 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Capsules Vigier 9, rue de la Gare, Levallois-Perret.
 Captobyl 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
 Carb 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 *Carbagol Marinier 23, rue Ballu, Paris.
 Carbaïne Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 *Carbalcaloides 10, rue de la Barouillère, Paris.
 Carbalga id.
 *Carbargyre 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 *Carbatropine 10, rue de la Barouillère, Paris.
 Carbémétine id.
 Carbeserine id.
 Carbintol 151, rue de Charenton, Paris.
 *Carbobel 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 *Carbo - Bismuth 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 Adrian 10, rue de la Barouillère, Paris.
 Carbocarpine 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 Carbocitol 59, rue Boissière, Paris (XVI^e).
 *Carbo-Combrosmol 4, rue Aubriot, Paris.
 Carbodausse 34, rue Sedaine, Paris.
 Carbofixine 45, fg Saint-Denis, Paris.
 *Carbogénase 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine).
 *Carboiodure Fraudin 19, rue de Fleurus, Paris.
 *Carbolactyl simple et bilié 1, r. d'Arras, Béthune (P.-de-C.).
 *Carbolaxine 14, rue Demarquay, Paris.
 Carboléine 67, av. de Wagram, Paris.
 *Carbolin Midy 63, rue de Charonne, Paris.
 Carbomagnesol 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 Carbométine

- *Carbomucil
- Carbonal Magnésien
- Carbonal Princeps
- *Carbonaphtine
- Carbonaphtolan
- Carbonate de Bismuth
- *Carbonate de Chaux
- Adrian
- Carbonate de Chaux
- Lancosme
- Carbonate de Lithine
- Le Perdriel
- *Carbonésie
- Carbonex
- Carbophos
- *Carboquinol
- *Carborexyl
- *Carbos
- *Carbosanis
- Carboseptyl
- Carbotensyl
- Carbotex
- *Carbotrignon
- Carboxine
- Cardi-Acron
- *Cardialgine Dubois
- *Cardibaine
- Cardicratine
- Cardiobromine
- Cardiocrinol
- *Cardioflorine
- Cardioparine
- *Cardiophylline
- *Cardior
- *Cardiosthénine
- *Cardiostreptine
- Cardiotensyl
- Cardiotonic
- Cardiotonine
- Cardiovasyl
- *Cardirène
- Cardisédine
- *Carditone
- *Cardosol
- *Caréna
- *Caréna Calcium
- *Caréna injectable
- *Caréna Ouabaine
- Carminase
- Carnéose D^r Spès
- 21, rue de Madrid, Paris.
- 14, rue Cantin, Courbevoie.
- id.
- 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
- B.-F. Delaunay, 119, rue Victor-Hugo, Tours.
- 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
- 9-11, rue de la Perle, Paris.
- (Voir: Calcilève.)
- 11, rue Milton, Paris.
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
- 10, rue Vineuse, Paris.
- Noé, St-Amand-les-Eaux.
- Rue Nouvelle, Villard-de-Lans.
- 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
- Lab. Millet, Rambouillet (S-et-O).
- 10, rue de la Barouillère, Paris.
- 94, rue Michelet, Alger.
- Chavanne, Fontaine - Grenoble (Isère).
- 1, avenue de Villars, Paris.
- Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
- 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- 37, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers.
- 16, bd Pereire, Paris.
- 15, bd Pasteur, Paris.
- 56, rue St-Lambert, Marseille.
- 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
- 8, passage Morel, Montrouge (Seine).
- " ANGLA ", Monte-Carlo.
- 66, rue de la Pompe, Paris.
- 36, av. de Metz, Romainville.
- M. Robilliart, pharm., Lille.
- 8, r. Vivienne, Paris.
- 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- 7, r. de la République, Puteaux.
- Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
- 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- 84, fg du Temple, Paris.
- L. Robert, pl. des Halles, Niort.
- Milan, 7, rue Bonald, Lyon.
- Lobica, 25, rue Jasmin, Paris.
- (Voir Solution Cardosol.)
- 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- id.
- id.
- 2-4, place Gambetta, Paris.
- Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).

- Carnets de Régime du D^r Corset de Vichy**
- *Carnicalcine 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 - *Carnine Lefrancq 36, av. de Metz, Romainville.
 - Carnix Robert Lab. Elsse, Fontaine-Grenoble.
 - Carnofer 3, r. des Rouairies, Dinan.
 - Carottase Wander, Champigny-s.-Marne.
 - Cartilos 56, rue Beaubourg, Paris.
 - Cartouches Lemary 36, quai Fulchiron, Lyon.
 - *Carypaine 57, av. Jean-Jaurès, St-Fons.
 - Casaldyl 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 - Casbyl 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
 - Cascalobyl 187, r. de Créteil, Maisons-Alfort.
 - Cascara Alexandre 41, rue de Rome, Paris.
 - Cascara Eparvier 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon.
 - Cascara Henry rue de Sclessin, Liège.
 - *Cascara Midy 67, av. de Wagram, Paris.
 - Cascarine Leprince 62, rue de la Tour, Paris.
 - Caséoline Girard 48, rue d'Alésia, Paris.
 - Caséone Fabre 33, rue de la Hale-Coq, Aubervilliers (Seine).
 - *Casol 12, rue Montmartre, Dijon.
 - Cassilax 137, rue de Belleville, Paris.
 - Cassitol Mauchant, Gennecvilliers (Seine).
 - *Castanol 9, pl. Municipale, Tulle (Corrèze).
 - Catalgine 98, rue de Sèvres, Paris.
 - *Catalyl 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
 - Cataplasme et boue radioactive de Pistyan Genevriev, 45, r. du Marché, Neuilly.
 - Cataplasme du D^r Lelièvre 19, r. de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
 - Cataplasme Electrique 46, rue Dauphine, Paris.
 - Morgin
 - Cataplasmes de Fango
 - Fisch
 - Cataplasme Optima
 - Catéchiode Martinet
 - Catéményl
 - Catguts et Crins de Florence
 - *Cathacide 95, rue de Prony, Paris.
 - Cathartine 3, r. des Rouairies, Dinan.
 - Cathiode Brisson 157, r. Championnet, Paris.
 - Catramina 78, bd Beaumarchais, Paris.
 - Cautère Lumière 12, avenue du Maine, Paris.
 - *Caveform 114, rue Solférino, Lille.
 - C. B. K. 15, rue Catulienne, St-Denis.
 - *Cédoseptol 50, av. Jacqueminot, Meudon (S.-et-O.).
 - Cèdre bleu 42, bd St-Marcel, Paris.
 - Cedrel Bel DUC, 24, av. Mac-Mahon, Paris.
 - Cédro-Méthyle 55, rue de Chabrol, Paris.
 - Cédrosan Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
 - *Cellargos 27, rue Desrenaudes, Paris.
 - *Cellona Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 - Cellopansements La Cellophane, Bezons (S.-et-O.).
 - *Cellucrine 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- Palc, Messigny (Côte-d'Or)**

- *Cellulax
 Cellules Paret
 Cellu-Son
 Cemag
 Centroserum Grosjean
 *Cépaïne
 *Cephalgi-Lysine
 Cepharnail
 Cephœmetine
 Cerdosol
 Céréales-Bébé

 Céréales granulées
 Céréaline Tulivet

 Céréalose
 *Cérébrine Fournier

 Cérébrinol
 Cérébrocrinol

 *Cérébrolipase
 *Cérébron
 *Cérébrosthénine Dalin
 Cérédine Loudenot

 Céréol Gigon
 *Céréossine Dehaussy
 *Céréossine survitami-
 née
 *Cérinil

 Cériomine
 Cerotto Bertelli
 Cersomine
 Cervol
 Cetamol
 *Cethocal
 Cétrarose Gigon
 Charbenzo Lafran
 *Charbon Fraudin sim-
 ple, belladonné et
 naphtolé
 Charbon Tissot
 Chardyl Meurice
 Charleben

 Charrier (Eau Miné-
 rale Naturelle viv.)
 *Chasvers Michel
 Chatel-Biasé
 Chaulmorhuate Poma-
 ret
 Chélibile
 *Chelicyne
 *Chéloïdine
 *Chenanthol
- 40, quai J.-d'Arc, Chinon.
 28, rue Guibal, Marseille.
 Aubry, 62, r. Erlanger, Paris.
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 36, rue de Malte, Paris.
 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
 17, rue de Berri, Paris (VIII^e).
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 Favrichon, St-Symphorien-de-
 Lay (Loire).
 id
 52, r. de Polissy, St-Germain-en-
 Laye.
 45, r. du Dr Blanche, Paris.
 6 bis, rue Campagne-Première,
 Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 8, passage Morel, Montrouge
 (Seine).
 17, rue Soufflot, Paris.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 49, quai St-Vincent, Lyon.
 106, av. du Roule, Neuilly-sur-
 Seine.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.

 50, rue Nationale, Lille.
 11, rue de Flandre, Paris
 (XIX^e).
 id
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 19, rue de Fleurus, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 6, rue Abel, Paris (XII^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
 8, rue de Prague, Paris.

 4, av. Desfeux, Boulogne-Bil-
 lancourt (Seine).
 34, bd de Clichy, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville,
 Cannes (A.-M.).
 à Laprugne (Allier), et 24, av.
 de l'Opéra, Paris.
 Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.).
 Miraton, Châtel-Guyon.

 21, rue Marbeuf, Paris.
 A. Cousin, Estissac (Aube).
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 L. Hinglais, à Épernay.

- Cheralys comprimés
 *Chibromercurobrome
 *Chlocchi
 *Chlomag
 Chlorakin
 *Chloral bromuré
 Dubois
 Chloral Dalis
 Chloral-Geranie
 Chloralgine
 Chloralgot
 *Chloralosane
 *Chloramine
 *Chlorammonic
 Chlorasepthymol
 Chloraseptine
 *Chloréthyle Bengué
 Chlorhydropeptine
 Chlorhydrol
 Chlorical
 *Chloridia
 Chlorinol
 *Chloripepsine
 Chlormagnésium Fisch
 Chlorobacilline
 *Chloro-Calcton
 Chlorofoline
 *Chloroforme Adrian
 Chloroforme anesthé-
 sique
 Chloroforme amp.
 Chloroforme L a m -
 biotte frères
 Chloroma
 *Chloro-Magnesion
 Chloro - Magnésium
 Hatier
 Chloro - magnésium
 Henry
 Chloropeptase
 Chlorostomalise
 Chlorosulfol Vigier
 Chloro-Thymol
 *Chlorumagène
 *Chlorure d'ammo-
 nium Bréant
 *Chlorure d'Ethyle
 Adrian
 *Chlorure de Magné-
 sium Adrian
 Chlorurol
 Chlory choline
 *Chocochaux
- 18, rue de Beaune, Paris.
 5, r. St-Hérem, Clermont-Fd.
 L. Adam, Granville (Manche).
 18, rue des Écoles, Paris (V°).
 1, Av. de Villars, Paris.
 Duriez, 20, place des Vosges,
 Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 36, rue de Malte, Paris.
 6, cours V.-Hugo, Cavaillon.
 8, rue de la Paroisse, Versailles.
 19, rue Franklin, Paris.
 Freyssinge, 6, rue Abel, Paris.
 25, bd de la Tour-Maubourg,
 Paris.
 Saint-Sever (Landes).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 16, rue Ballu, Paris (9°).
 5, bd Montparnasse, Paris.
 Fouché, 2, bd Pershing, Paris.
 Lab. Sauba, Montreuil, Paris.
 64, r. des Tournelles, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII°).
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
 Tullivet, St-Germain-en-Laye.
 4 bis, rue du Colonel-Moll, Paris.
 21, rue de Picpus, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 Spécia, 21, r. Jean-Goujon,
 Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 52, bd du Temple, Paris.
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 Henry, 39, rue de Selessin,
 Liège (Belgique).
 14, r. Thiers, St-Amand-les-Eaux.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 9, rue de la Gare, Levallois-
 Perret.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 42, rue Mont-Cenis, Paris.
 11, r. de Clichy, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 9-11, rue de la Perle, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris.
 22, rue Morère, Paris.
 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).

- Chocolat au lait Nutricia**
Chocolax
***Chocynol**
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 6, r. A.-La-Lyre, Courbevoie (S.).
 Huyghe (G. et J.), Brazev-en-Plaine (Côte-d'Or).
- *Cholagol**
Cholagon
***Cholal**
***Cholaxol**
***Cholécystine**
***Choléfluine**
***Choléfluine (comprimés)**
Cholégastron
***Choléine Camus**
***Choléine lactique**
Choléitoires Byla
***Cholélyse Carbou**
Choléoboldine Thévenot
Choléocinol
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 48, bd des Batignolles, Paris.
 95, rue de Prony, Paris.
 3, rue Sarrette, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
- *Choléo-Combretol**
Choléocytol
***Choléo-Fluase**
***Choléokinase**
***Choléolactol Daguin**
***Choléolax**
***Choléopeptine**
***Choléo-Zymatine**
Cholépan
***Cholérene**
***Cholergine**
Cholétrypsine
Choline Roche
***Cholofluol**
Choloptomercuro
Cholotoxine
***Chophytol (Ampoules, Dragées et Gouttes)**
Christolax
 74, rue Lourmel, Paris.
 Darrasse, Nanterre (Seine).
 id.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 8, rue Jean-du-Bellay, Paris.
 21, rue des Roses, Dijon.
 Huyghe, Brazev-en-Plaine (C.-d'Or).
 37, rue de la Fédération, Paris.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 Verdon, Celles-s.-Belle (D.-S.).
 15, r. des Champs, Asnières.
 7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
 Colas, 133, r. Lecourbe, Paris.
 24, rue des Plantes, Paris.
 58, rue de Vouillé, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 5, rue de Vic, Nancy.
 10, rue Crillon, Paris.
 13, pl. de la Nation, Paris.
 5, r. St-Hérem, Clermont-Fer.
 Chaumont-Cazals, à Vichy (A.).
 Rosa, 11, rue Roger-Bacon, Paris (XVII^e).
 151 bis, route de Joinville, Champigny.
- Chromo - Thermo - Thérapie**
Chromomercurocl Clars
***Chronicystine Manor**
Chrysalmiode Aguetant
***Chrysemine Carteret**
Chymosine Fisch
***Cibalgine**
Cibrol
Cicabi
Cicafer
Cicatryl
G⁴ Cidre Bol régime
 12, av. du Maine, Paris.
 18, rue Saint-Sulpice, Paris.
 St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.)
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 2, bd Pershing, Paris.
 14, rue du Temple, Calais.
 21, rue Chaptal, Paris.
 M. Langlois, La Cressonnière, Pont-l'Évêque.

- Cigares Gicquel**
Cigarettes anti-asthm.
Cigarettes anti-asthm.
Cigarettes Barral
Cigarettes du D^r Cléry
Cigarettes Espic
Cigarettes Indiennes
Grimault
Cigarettes Salva
Cigarettes Schulze
Cigarettes Zani
- 64, r. des Tournelles, Paris.
 Escoufflaire, Baisieux (N.).
 Martin-Mazade, Saint-Raphaël.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil.
 20, rue St-Lazare, Paris.
- 8, rue Vivienne, Paris.
 r. de Châteaudun, Rennes.
 Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-Laye.
- 3, bd Beaumarchais, Paris.
 50, av. de Normandie, Colombes.
 4, pl. Royale, Nantes.
 60, route de Châtillon, Malakoff.
 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes.
- G. Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.).
 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Immunos, av. des Sources, Nice.
 12, r. de la République, Puteaux.
 40, r. des Acacias, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 74, r. de La Fère, St-Quentin.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 62, av. de Paris, Villejuif.
- 11, rue Milton, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 7, rue de la République, Puteaux.
- Lab. Sauba, Montreuil (Seine).
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 49, rue du Loing, Montargis.
 22, fg St-Michel, Angers.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge.
- 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
 (Voir : Lemonai)
 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
 304, r. Saint-Jacques, Paris.
 83, bd de la Villette, Paris.
 Noé, St-Amand-les-Eaux.
 57 bis, av. Motte-Picquet, Paris.
 7, rue Galvani, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 49, rue de Bitche, Courbevoie.
 6, rue du Laos, Paris.
 26, rue Norvins, Paris.
- *Cimalvol
 Cimarsényl
 Cimatryl
 *Cinalose
 *Cinarascol
 *Cinascol
 *Cinéyl
 *Cinnestérol
 *Cinnozyl Clin
 Cinol
 *Cipromarol
 *Cirvose
 *Citralin
 *Citra-Quint
 Citrarose du D^r Gigon
 Citrase
 *Citratægus
 Citrate de Lithine Le
 Perdriel
 Citrhémol
 *Citrixlex
 Citrina
 *Citrocarbine
 *Citrocholine
 Citro-fer
 *Citrofluyal
 Citrol
 Citrolactine
 *Citrolargol
 Citroléol
 *Citronai
 *Citronema
 *Citropaine
 *Citropeptol
 Citrophos
 Citrosalol
 Citrose-Vichy
 *Citrosodine
 *Citro-thymol
 Clairmine
 Clangoryl

- *Clearol
- Cleinol
- Clinax
- Clinuryl
- Clisémine Longuet
- *Clonazone Daufresne
- Clupéyl (Voir: *Laitancyl*)
- *Coagulène Ciba
- Coaltar Le Beuf
- Coalt Derma
- *Cobrallyre
- Cobranyl
- Cobratoxine
- Cocadreïne
- *Cocaïne Midy
- Coccidal Grémy
- Codarsyl
- *Codéphryl Dufour
- *Codérax
- *Codéthyline Borne
- *Codéthyline Houdé
- Codobromyl
- *Codocol
- *Codoforme Bottu
- Coffret traitement Piorréagine
- Colargyl
- *Colarsénol (collutoire et pommade)
- *Colavé
- *Colchicine Houdé
- Colchiflor Vial
- *Colchi-Sal Midy
- Colhépatyl
- *Colibacine
- *Colibyl
- *Coliflorine Carrion
- Colilactol
- *Colisel
- *Coliseptine
- *Colitique
- Colitisane
- *Coli-Vaclydun
- *Colivax
- Colizyl
- Collargol
- *Collargophédrine
- *Collarman
- Colleodin Leo
- Colliodure
- *Collobacilline du Dr Grimberg
- 194, rue Rivoli, Paris.
- G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
- 78, av. Schneider, Clamart.
- Delaunay. 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
- 34, rue Sedaine, Paris.
- 42, rue Thiers, Le Havre.
- Panier, à Malo-les-Bains.
- 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- 11, rue Milton, Paris.
- 30, bd Raimbaldi, Nice.
- 27, rue Desrenaudes.
- 68, r. Berkendael, Bruxelles.
- (Voir Katox-Intra).
- 2, rue Michelet, Alger.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 14, rue de Clichy, Paris.
- Dubois, 16, bd Pereire, Paris.
- 40, rue des Carmes, Orléans.
- 69, av. du Maine, Paris.
- 79, rue de Paris, Saint-Denis.
- 9, rue Dieu, Paris.
- Saubat, Montreuil (Seine).
- 122, Champs-Élysées, Paris.
- 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Croissy-sur-Seine.
- 49, rue de Biche, Courbevoie.
- 43, rue de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine).
- E. Verdon, Celles-s.-Belle (D.-S.).
- 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- 8, rue Vivienne, Paris.
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 50, fg Poissonnière, Paris.
- 122, Champs-Élysées, Paris.
- 33, Rempart Matabiau, Toulouse.
- 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
- 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.).
- 54, r. de Paris, Charenton (S.).
- 33, Rempart Matabiau, Toulouse.
- 42, r. du Dr-Blanche, Paris.
- 88, rue Duhesme, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Lonjumeau (S.-et-O.).
- 67, av. de Wagram, Paris.
- 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
- 3, av. Daumesnil, Paris.
- 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
- 84, fg du Temple, Paris.
- 74, rue Blanche, Paris.

*Collobiase de Sulf-
hydrargyre
Collobiase d'Or
Collocrine

Collohirtol
Colloïdes Amicros
Colloïdes Clin
*Colloïdine
*Colloïdogénine
*Collo-iode Dubois
Collophérine Bapt
Collosol Pépin
*Collosoufre

Collothiol
*Collovaccins
*Collubiazol
Colluborine
Collubleu
*Collucromex
*Collunovar

Colluquinol
Colluséda
*Collusulfamid
*Collusulfar
*Collutoire Collargent
Collutoire gargarisme
Neyret
Collutoire Mexyl

*Collutoire Trépallix
*Collutoire V.-E. Dou-
mer
Collybor

*Collyres Chibret Op-
tima

*Collyres (rose, bleu,
irradié)
Collyres Stéryl
Collyre des Alpes Vica-
rio
Collyres stérilisés Clin
Collyx Rayot
Colmatol

Coloplastre
*Colpophile
*Coltène
Columiel
*Coluval

Combex-Lax
Combiné Gécán

Dausse, 4, r. Aubriot, Paris.
4, rue Aubriot, Paris.
155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
Orge (S.-et-O).

Chauvin, Aubenas (Ardèche)
177, r. de Courcelles, Paris.
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
8 et 10, r. Alp.-Bertillon, Paris.
16, bd Pereire, Paris.
4, rue de l'Alma, Asnières.
116, bd Haussmann, Paris.
Lab. Lorrain de Produits purs,
Étain (Meuse).

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
74, rue Blanche, Paris.
89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e).
223, rue Saint-Martin, Paris.
98, bd Rochechouart, Paris.
11 bis, 13, rue Levert, Paris.
7, rue de la République, Pu-
teaux (Seine).

14, rue Demarquay, Paris.
149, av. des Minimes, Toulouse.
22, rue de la Sorbonne, Paris.
19-21, r. Van-Loo, Paris (XVI^e).
160, avenue d'Italie, Paris.

35, rue de la Bourse, Lyon.
12, rue Henri-Rivière, Le Per-
reux.

66, rue de la Pompe, Paris.

Bomel, Annonay (Ardèche).
Adler, 36, rue des Francs-Bour-
geois, Paris.

5, r. St-Hérem, Clermont-Fer-
rand.

52, r. Heurtault, Aubervilliers.
94, rue Michelet, Alger.

17, bd Haussmann, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
A Seloncourt (Doubs).
36, r. de la Tour-d'Auvergne,
Paris.

29, rue Singer, Paris.
45, fg Saint-Denis, Paris.
Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
156, av. Victor-Hugo, Paris.
7, r. L.-Jeannin, La Garenne
(Seine).

134, av. Parmentier, Paris (XI^e).
(Voir : Gécán.)

- *Combrétine
Combretochol
*Combretodrainol
Combrosmol
*Comititol
Complexe Ovarien
Caldo
Complextraits
*Composé Gmet
*Compressees grasses
« Onctua »
*Compressif Beslier
Comprimés Adolan
Comprimés Alla
Comprimés Anta
*Comprimés d'Alibour
Comprimés Aqua Pura
Comprimés A. R.
Comprimés Arthrocri-
nol
Comprimés Aseptuter
Comprimés Broncho-
organic
Comprimés de carbo-
nate de chaux
Comprimés de Char-
bon Fraudin
Comprimés de Gibert
Comprimés Dynamy
*Comprimés Galac
Comprimés Garga
*Comprimés Guillau-
min
Comprimés Kléos
*Comprimés Laxocrinol
Comprimés Luc
Comprimés N. B. M.
Comprimés Néotho-
rium Millot
Comprimés Neyret
*Comprimés Nican
Comprimés Notal
Comprimés Panto-
laxine du Dr Boveil
Comprimés Pausis
Comprimés du Prof.
Pénières
*Comprimés Ortho-
Malleval
202 bis, av. Jean-Jaurès, Cla-
mart.
B.-F. Denaunay, 119 bis, rue
Victor-Hugo, Tours.
Doladille, Saint-Aignan-sur-
Cher (L.-et-Ch.).
59, r. Boissière, Paris (XVI^e).
12, pl. de la Révolution, Resan-
çon.
20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
Huckel, Héricourt (Hte-Saône).
27, fg Montmartre, Paris.
Échard - Gillier, L'Arbresle
(Rhône).
Coquelu, Digoin (Saône-et-L.).
45, r. du Marché, Neuilly.
Lapeyre, Neuvic-s.-Isle (Dor-
dogne).
178, rue Montmartre, Paris.
15, r. des Champs, Asnières.
1, av. de Villars.
9, impasse Thoréton, Paris.
160, avenue d'Italie, Paris.
156, av. Victor-Hugo, Paris.
160, avenue d'Italie, Paris.
Millet, Rambouillet.
4, av. Desfeux, Billancourt
(Seine).
19, rue d'Aubagne, Marseille.
Chavanne, Fontaine-Grenoble.
Lambert, pl. du Châtelet, Or-
léans.
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
13, rue Cherche-Midi, Paris.
2, rue des Cordeliers, Meung-
sur-Loire.
160, avenue d'Italie, Paris.
Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher).
56, rue Beaubourg, Paris.
177, rue de Courcelles, Paris
35, rue de la Bourse, Lyon.
Cantin, Palaiseau (S.-et-O.).
23, rue Beautreillis, Paris.
1, rue Lassalle, à Lyon.
4, pl. de la Gare, Tunis.
Coupat, Ussel (Corrèze).
34, rue du Plat, et 9, rue Sala,
Lyon.

- *Comprimés Probios
 - Antipyogène
 - Comprimés Proto-Gambier
- *Comprimés Purgos
- *Comprimés Recal
- Comprimés Rhinol
- Comprimés Roche de Thiocol
- Comprimés Roy
- Comprimés Salvé
- Comprimés Sériques Clin
- *Comprimés de Thio-naiodine
- Comprimés Urbé
- Comprimés Vérandy
- *Comprimés Vichy - Etat
- Conarsynol
- Concentré des Nurses
- Condurango Gmet
- Condurango granulé Astier
- *Cônes Antiseptiques
 - Rendell
- Conhydrargol
- Conjonctol
- *Continol
- *Contracide Norgan
- *Convalbaine
- Convallamarine
- *Cophed
- Copraxe
- *Coprax
- Coqluplaste
- *Coquelicônes
- *Coqueluchyl
- *Coqueluvax
- *Coramine
- Corasmal
- Cordicura d'Ott. Can-dela
- *Coréine
- Corizol
- Coroplasme
- *Corosédine
- Corpogénine
- Corps Thyroïde Mon-cour
- *Cortiode
- *Corydrane
- Corylase
- *Coryphédrine
- Coryza-Ouate
- 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
- 42, r. Émile-Deschanel, Courbe-voie (Seine).
- 7, rue Galvani, Paris (XVIII^e).
- Fleury, Arcachon (Gironde).
- 80, fg Saint-Denis, Paris.
- 10, rue Crillon, Paris.
- 81, bd Suchet, Paris.
- 12, rue du Fg-Saint-Denis, Paris.
- 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
- Laffargue, Barsac (Gironde).
- G. Laurens, Aix-en-Provence.
- G. Prunier et C^{ie}, 4, rue de la Coutellerie, Paris.
- 12, pl. Puget, Toulon.
- Bourg-la-Reine (Seine).
- 27, fg Montmartre, Paris.
- 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
- 61, rue Damrémont, Paris.
- 12, pl. Puget, Toulon.
- Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
- 2, pl. de la Porte-des-Ternes, Paris (XVII^e).
- 21, rue de Madrid, Paris.
- 12, rue Henner, Paris (IX^e).
- 15, bd Pasteur, Paris.
- 47, rue Bokanowski, Asnières.
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- 120, rue Lecourbe, Paris (XV^e).
- Coquelin, Digoin (S.-et-L.).
- 24, av. Mac-Mahon, Paris.
- 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
- 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- 7, allée du Midi, Courbevoie.
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 24, pl. des Vosges, Paris.
- 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- 13, av. de Ségur, Paris.
- Lebon, Charost (Cher).
- 49, av. V.-Hugo, Boulogne-s.-S.
- 7, rue de l'Armorique, Paris.
- 5-7, rue Claude-Decaen, Paris.
- 105, rue de Rennes, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 14, av. de Paris, Biarritz.

- Cosmargyre**
***Coton cataplasme As-truc**
Cratægine
Cratægol
Cratægiode
Cratægus Bocquillon
Limousin
***Cratægus Gmet**
Cratiode
Crayon à la chrysarobine Vigier
Crayons Antifissure
Crayons Chaumel
Crayons néothorium
Millot
***Crayon Termosan**
Crayons Thomas
Créacalcine
***Créagénol Corbière**
Créatonine
***Crédone Dehaussy**
Crémasepta
Crème de bismuth chloromagnésienne
***Crème de Bismuth Quesneville**
Crème Diadermine
Crème de lainine Vigier
Crème de Lait Nutricia
Crème Ludin
Crème de Lygie
***Crème Mégève**
Crème Méta-Titane
***Crème de Nujol (Voir : Nujol)**
Crème Probios anti-pyogène
Crème de quinine Sapolan
***Crème résolutive du Dr Rap**
Crème Stéar
Crèmes-Vaccin
Crémolax
Crémo-plastol Dumesnil
***Créoformine**
***Créofruits**
Créogarlic
Créosal Dubois
***Créositoires**
- 21, r. des Roses, Dijon.
 5, Grande Rue, Montpellier.
 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
 14, rue Eug.-Delacroix, Paris.
 36, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
 202 bis, av. Jean-Jaurès, Clamart.
 27, fg Montmartre, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 9, rue de la Gare, Levallois-Perret.
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
 Lab. du Donagol, Péronne.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 5, rue d'Angoulême, Paris.
 L. Colleson, 5, rue d'Angoulême, Paris.
 60, rue Et.-Dolet, Malakoff (Seine).
 9, rue de la Gare, Levallois.
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 Lab. Rey, Dijon (C.-d'Or).
 43, av. Kléber, Paris.
 9, rue de la Gare, Levallois.
 P. Métadier, Tours.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 8, rue Saint-Martin, Paris (IV^e).
 29, rue Singer, Paris.
 29, rue Singer, Paris.
 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône).
 74, rue de Lourmel, Paris.
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 Rte du Moulleau, Arcachon.
 15, av. Parmentier, Ivry.
 (Voir : Sirop Dubois au Créosal.)
 Margex, 13, r. Mélingue, Paris.

- *Créosoforme Lam - 20, r. Dumont-d'Urville, Paris
 biotte Frères (XVI^e).
 Crescol 98, rue de Sèvres, Paris.
 Crésolargol 191, r. du Fg St-Antoine, Paris.
 Créosote soluble Va- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 cheron 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 *Créo-suppo-camphre 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
 Crêpe Eglanos 25, bd Beaumarchais, Paris.
 *Crêpe Velpeau (Voir: Velpeau.)
 88, rue Duhesme, Paris.
 Crescogénol 1, pl. Lucien-Herr, Paris.
 *Crésentyl 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 Crésolargol 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 *Crésophanyl id.
 *Crésopirine id.
 *Crésotanol 35, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 Crésyl Jeyes H. Benoit, Poligny (Jura).
 *Crinergyl 1, av. du D^r Lannelongue, Paris.
 *Crinex 1, av. D^r Lannelongue, Paris.
 *Crinex-Orex (Ambo) Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 *Crinhémol Hatier, à Saint-Étienne.
 *Crinocalcine 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 *Crinocardine 41, rue Germain, Lyon.
 *Crinoflux 37, av. Jean-Jaurès, Auber-
 villiers.
 Crinomarine 7, rue Biscornet, Paris.
 *Crino-Menstryl 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 *Crinopancrine passage des Princes, Paris (II^e).
 *Crino-Sérum 7, rue Biscornet, Paris.
 *Crino-Sthényl id.
 *Crino-Tensyl 48, rue de la Procession, Paris.
 Crinothéine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 *Crisalbine 151 bis, route de Joinville,
 Champigny (Seine).
 *Cristolax 1, Jardin-Anglais, Le Raincy.
 Croquettes Marida 49, rue de Maubeuge, Paris.
 *Cruxol 45, rue Villon, Lyon.
 *Cryogénine Lumière Lab. Lorrain de Produits purs,
 Étain (Meuse).
 *Cryosan 45, rue Villon, Lyon.
 *Cryptargol Lumière 50, rue Nationale, Lille.
 *Crypthermol 35, r. de Paris, Clichy (Seine).
 *Crylthiol 4, av. M.-Berteaux, Poissy
 (S.-et-O.).
 Cryptos 134, cours de Verdun, Bordeaux.
 *Cryptosote Nêda 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 *Cryptotoxyl 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 *Crysiodal 8, rue Vivienne, Paris.
 Crystol P. V. Léger, St-Pourçain (Allier).
 Cupranine 191, rue Saint-Honoré, Paris.
 *Cuprase 52, r. Heurtault, Aubervilliers.
 *Cuprazurol Gouin, 20, r. des Écoles, Paris.
 *Cupremone F id.
 *Cupremone Masculin 6, rue Dombasle, Paris (XV^e).
 *Cupressiode 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 Cupressus Dausse à La Ferté-Macé (Orne).
 Cuprifer

- Cuprinal**
Cuprinol
Cuprion
 ***Cuprobalt**
Cuprocithine
 ***Cuproformine**
Cupro-Génitol
Cupro-Glycol
 ***Cupro-nickel intravei-**
 neux Fraisse
Cupro-Salyl du D^r
 Quesneville
 ***Cuprosténol**
 ***Cuproxil**
Curalgine

Curalsine
Curaluès D^r Lafay

Curamélis
 ***Curamida**

Curandra (onguent,
 ovules)
Curasme
 ***Curatine Brunet**
Curatoxine
Curiodé
 ***Curiosan**

Curocalcine
 ***Curogène**
Curospasm
Curovaccins atoxiques
 Cépède (Voir : Vac-
 cinothérapie)
Curoveinyl Gef
 ***Curozéma**
 ***Cuscutine Foulon**
Custodine
Cuti-Dmelcos
 ***Cutigénol**
Cutiphile
Cutiplaste
 ***Cutisanine**

 ***Cutobronchyl**
Cutopralgine
 ***Cuzinargol**
Cyalène
Cyanargyre
Cyanauroil du D^r Gigon
 ***Cyanhermine**
Cyanhermyl Dalin
Cyanovaine
Cyanure indolore Ercé
- Bertrand, Nomexy (Vosges).**
Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 18, av. Hoche, Paris.
 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe).
 Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
 17, rue Soufflot, Paris (V^e).
 193, av. du Maine, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.
 8, rue Jasmin, Paris.
 5, rue d'Angoulême, Paris.
 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 92, rue Bobillot, Paris.
 P. Fontanier, Moulins-sur-Yèvre
 (Cher).
 27, rue Planchat, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois-
 Perret.
 39, rue Roger-Salengro, Bondy.
 A. Chapellier, St-Aigulin (Ch.-
 Inf.).
 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 260, r. de Rosny, Montreuil.
 23, rue des Ecoiffes, Paris.
 114, rue du Temple, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 43-45, rue des Fauvelles, Cour-
 bevole.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
 Saint-Sever (Landes).
 60, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 269, rue Judaique, Bordeaux.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 24, rue Flégier, Marseille.
 21, rue J.-Goujon, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 17, r. de Berri, Paris.
 id.
 35, rue Christophe-Colomb,
 Lille.
 2, r. Sédillot, Strasbourg (B.-R.).
 id.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 13, r. du Cherche-Midi, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 1, rue de la Martinière, Lyon.
 34, bd Beaumarchais, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.

- *Cyanure isotonique
Cyclenil
- *Cycliton Roche
- *Cynabilline
- Cynaboldine
- *Cynaracholine
- Cynarine Estèbe
- *Cynefluine
- Cynhépatil
- *Cynurol Rosa
- Cyprol
- *Cyproveinol
- Cystéine
- Cystitol
- *Cystocône
- *Cystocure
- *Cystoflorine
- Cystoréol
- ¶Cysto-Suppos
- *Cytobaume
- *Cytobiase
- *Cyto-choline Corbière
- Cytomagnésium
- *Cyto-Manganol
- *Cytopan
- *Cytopepsal
- ¶Cytophédrettes
- Cytophédrine
- Cytoplasmine Ducatte
- Cytopulmase
- Cytosal
- *Cyto-Sérum Corbière
- ¶Cystostrychnine
- Cytotropines
- Cytuline
- Fraisse, 8, rue Jasmin, Paris.
- 15, rue des Champs, Asnières.
- 10, rue Crillon, Paris.
- r. Fréd.-Chevillon, Allauch.
- 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
- 112, Grande Rue, Nogent-sur-Marne.
- à Villefranche-du-Lauragais.
- 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
- Benderitter, Vendôme (L.-et-C.).
- 11, rue Roger-Bacon, Paris.
- Janelle, pharm., Sens (Yonne).
- 18, rue de Beaune, Paris.
- 10, rue Crillon, Paris.
- 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 15, rue des Champs, Asnières.
- Calmels, Auterive (H.-G.).
- "Angla", Monte-Carlo.
- 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
- Calmels, Auterive (Hte-Gar.).
- 8, rue Vivienne, Paris.
- 25-27, rue du Commandant-Rivières, Colombes (Seine).
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- Oliviero, Boulogne-s.-S.
- 27, r. Desrenaudes, Paris.
- 54, rue de Paris, Charenton.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- id.
- id.
- 191, rue St-Honoré, Paris.
- 21, Grande-Rue, Monfermeil.
- 60, r. de Miromesnil, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 7, rue Biscornet, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.

D

- *Daboïne
- *Dagenan
- *Damicol
- ¶Daturasolène
- ¶Debreyrol
- *Decholestrol
- 1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
- 11, rue de Clichy, Paris.
- L. Baillleul, Mortagne (Orne).
- 54, rue de Paris, Charenton. j

- *Decorpa**
Defensol B
- *Delbiase**
Delbosel
- *Delcaine Roques**
Demalgon
Demanyl
Déméteros
***Demorphène**
Denisia Brisson
***Denisoline Brisson**
***Dentamide**
Dentifrice Probios
Dentifrice Saporex
Dentochrysine Lumière
Dentoline
***Dentoma**
Dentoryl
***Dentoval**
Dentoxyl
***Depressytol**
Dépuratif Berry
- *Dépuratif Chauvin aux**
Hyposulfites
Dépuratif des Vosges
- Dépuratif Dubreuil**
Dépuratif du D^r Régor
Dépuratif Dumesnil
Dépuratif Fuba
Dépuratif Nox
Dépuratif Rob-Lechaux
Dépuratif Santa
Dépuratif Saint-Michel
n° 1 et 2
- *Dépuratif Salganyl**
Dépurhemo
***Dépuriode**
***Dépurogène**
***Dépurogène T**
Dépurose
Dépursan
Dercusan
***Dermacide Porcher**
- Dermadésine**
Dermajic
***Dermalibut**
Dermaline Corbière
Dermaline Demeule-
naere
***Dermasuline**
***Dermathorium**
- 21, rue de Madrid, Paris.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 id.
 36, rue Ste-Croix-de-la-Breton-
 nerie, Paris.
 25, bd Latour-Maubourg, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 9, bd Malesherbes, Paris.
 157, rue Champignonnet, Paris.
 id.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 184, route de Genas, Lyon.
 45, rue Villon, Lyon.
 46, rue Pierre-Charron, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris (X^e).
 3, r. Ch.-Gounod, St-Raphaël.
 62, av. des Champs-Élys., Paris.
 37, rue Galilée, Paris.
 4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
 Usine du Blosset, Moulins-sur-
 Yèvre (Cher).
- Aubenas (Ardèche).
 21, r. de la Gare, La Broque
 (B.-R.).
 48, av. Porte d'Ivry, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 10, rue du Plâtre, Paris.
 17, rue des Lois, Toulouse.
 14, rue Demarquay, Paris.
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 9, place Municipale, Tulle.
- 46, rue des Faures, Bordeaux.
 2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
 Oullins (Rh.).
 61, rue de Seine, Paris.
 2, place des Vosges, Paris.
 id.
 r. des Marchands, Apt (Vaucluse).
 23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.
 73, bd Beaumarchais, Paris.
 35, r. des Blancs-Manteaux,
 Paris.
 41, rue Saint-Pierre, Caen.
 23, rue du Grand-Cerf, Meaux.
 348, r. Saint-Honoré, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 25, rue de Calais, Dunkerque.
 11, Chaussée de la Muette,
 Paris.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie.

- Dermatyon**
Derméon
Dermobaume
Dermobel
***Dermodulcis**
***Dermofagine**

***Dermofletol**
Dermolène

***Dermolive**
Dermone
***Dermoplastol**
Dermopode
***Dermoradol**
***Dermo-Reipar**
***Dermo - Rhino - Génésine**
Dermoschistol
Dermose anti-impétigineuse
***Dermoseptazine**
***Dermosplénine**
Dermosufrol
Dermotylol
Dermoyse
Dermylène Vaille
***Derphyl**
***Desartyl**
***Deschlero-Sel**
Désensibilisant Chauvin
***Désensibilysine**
***Desintex**
Desitin
Desitinol
Détergine
Dexiode
Dexogyne
***Dexoplasma**
***Dextrosol**
Dextrospol
Diabétalim
***Diabétifuge**
***Diabétosan**
Diabétuline
***Diadermine**
Diagnorenol
***Diagnothorine**
***Dial Ciba**

Dialine
***Dialyl Brunot**
Dialyses Golaz
Diapros
Diardyscol
Diarex
- L. Godart, Audenne (Belgique).
 3, rue des Rouairies, Dinan.
 39, r. Roger-Salengro, Bondy.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon.
 Boulogne-sur-Mer.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 158, Promenade de la Corniche, Marseille.
 19, rue de Pontevès, Marseille.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris (IV°).
 Évreux (Eure).
 25, rue Friant, Paris.
 Drapier, Rethel (Ardennes).
 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux, Paris.
 Lecronier, Domfront (Orne).
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 21, rue J.-Goujon, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 44, r. de Lagny, Montreuil.
 Le Naour, Quimperlé (Finistère).
 R. Klein, Baccarat (M.-et-M.).
 1, r. du Puits-de-l'Ermite, Paris.
 15, r. de Rome, Paris.
 8, av. Walkanaer, Nice.
 6, pl. de l'Académie, Angers.
 Aubenas (Ardèche).
 Bélières, 19, r. Drouot, Paris.
 M. Richard, Aubenas (Ardèche).
 8, rue La Fayette, Paris (IX°).
 id.
 Dr Bourdeau, à Parthenay.
 7, r. de la République, Puteaux.
 id.
 id.
 29, rue de Berri, Paris.
 id.
 2, rue de Compiègne, Paris.
 21, rue Chapal, Paris (IX°).
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Charret-Tomasi, St-Just-sur-Loire.
 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
 21, rue J.-Goujon Paris.
 id.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 16, rue Boulainvilliers, Paris.
 4, rue Bellart, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.

- Diasclérol**
***Diases**
Diasténine Gremy
***Diastogène**
***Diasto-Pepsine Riche-**
pin
***Diathermie**
***Diathès « Mètère »**
***Diatol**
Di-bromotyrosine Byla
***Dibromotyrosine**
Roche
***Dicaliode**
***Dicodéine Lafran**
***Didial Ciba**

***Diéménal**

***Diénol**
Dientyl
***Dietofco**

***Difollisterol**
***Digalène Roche**
***Digastrine**
***Digerol**
Digeryl
Digestal
Digestif Capmartin
Digestif Dal
Digestif Goy
Digestif Harvey
Digestif Henry
Digestif Maulin
Digestif Pinel
Digestif Polvi

***Digestonic**
Digestose
***Digex**
***Digibaine Deglaude**
***Digicardine**
***Digicardine quininée**
***Digifoline Ciba**

***Digi-Lanatine**
***Digilanide**
***Digi-mial-baine**
***Digistabiline**
Digitale Dausse]
Digitale Ecalle
Digitale Labelonye
Digitaline Homolle et
Quévenne
***Digitaline Invar**
***Digitaline Mialhe**
***Digitaline Nativelle**
- 21, rue Norvins, Paris.
 Progil, 10, quai de Serin, Lyon.
 14, rue de Clichy, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 Lab. D^r Tissot, 34, bd de Clichy,
 Paris.
 12, av. du Maine, Paris.
 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.

 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 23, rue du Parc, Fontenay-sous-
 Bois (Seine).
 id.
 14, r. de Normandie, Asnières.
 25, av. Michelet, Saint-Ouen
 (Seine).
 73, rue Dutot, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 11, rue St-Agricol, Avignon.
 36, rue des Archives, Paris.
 33, rue du Bois, Vincennes.
 Chenu, Montferrand (P.-de-D.).
 7, rue Charlot, Paris.
 33, bd Dubouchage, Nice.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil.
 39, rue Sclessin, Liège.
 50, r. de la République, Puteaux.
 à Bonnelles (Seine-et-Oise).
 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 21, r. Chaptal, Paris (IX^e).
 Battut, à Vatan (Indre).
 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 15, bd Pasteur, Paris.
 Immunos, av. des Sources, Nice.
 id.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 8, rue Favart, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 8, rue Favart, Paris.
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 4, rue Aubriot, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris.

 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 8, rue Favart, Paris.
 27, rue de la Procession, Paris.

- Digitalis Purpurea**
Diiodoforme Taine
***Di-iodo-tyrosine Byla**
***Diiodotyrosine Roche**
Dilubyl
Dimétol Vicario
***Dimitensyl**
Dimol
Dinacode
***Dinitra**

***Diocamphine Borne**
Diocol
***Dionine Borne**
***Dionol**
Dio-Quint
***Diorine**
***Dioséine Prunier**
Dipentyl
Diphasol
Dippol
Dismenine Henry
Disménol
***Dismine Favrot**
Disolurane

***Disonyl**
Dissolvarsan
***Distilbène**
Disurol
Disuryl
Ditagel
Dithioléine
***Dithioral**
Diumnal
Diurédause
Diuregan
Diurégine
Diurélax
***Diurène**
***Diuréphédrine**
Diurésinol
***Diurétique Gmet**
***Diurobromine**
***Diurocalcine Gros**
***Diurocalcine iodurée**
***Diurocardine**
***Diurocystine**
Di-Uroiodine
***Diurophylline**
***Diurophyte**
Diurotonine
***Divacsol**
Dmégon (Néo)
***Dmelcos**
Dmesta (Néo)
Dmetys (Néo)
- Gde-Rue-au-Bols, Bruxelles.**
 9, rue de la Perle, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 61-63, r. Damrémont, Paris
 17, bd Haussmann, Paris.
 19, av. Secrétan, Paris.
 Bols-Colombes (Seine).
 14, rue du Temple, Calais.
 39, bd de la Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
 79, r. de Paris, St-Denis (Seine).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 (Voir : *Codéthylène*.)
 Fleury, Arcachon (Gironde).
 74, r. de La Fère, St-Quentin.
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 57, bd A.-Briand, Champigny.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 Sauter, Bellegarde (Ain).
 6, r. Dombasle, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 97, rue Vaugirard, Paris.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 79, rue de Paris, Saint-Denis.
 42, rue des Martyrs, Paris.
 23, rue des Moines, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 19, rue Franklin, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 Charret-Tomas, St-Just-s.-Loire.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 Saugier, Dôle (Jura).
 1, r. des Augustins, Perpignan.
 27, fg Montmartre, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 13, pl. Delille, Clermont-Fd.
 id.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 id.
 17 bis, rue Juge, Paris.
 13, av. de Ségur, Paris.
 Lorthioir, 22, r. Perceval, Paris.
 4, pl. de la Gare, Tunis.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 21 r. Jean-Goujon, Paris.
 id.
 id.
 id.

Docteurine**Doganol*****Dogastro****Dolental****Doliseti*****Doloma****Dolophan****Dolophos*****Dolotensine****Dolozymes*****Dolpyc*****Dolysine Rochereau****Donagol****Dontera*****Do-Sa-No-Sal****Dosarter*****Dosotol*****Dosurine (Trousses)****Doxa****Dozéol Deglaude****Dracoline*****Drag-Bil*****Dragécalcion****Dragées Adrian****Dragées anticatar-
rhales du D^r E. Du-
hourcau****Dragées aux Algues
Marines*****Dragées Bengué****Dragées Blagny*****Dragées Bondonneau****Dragées Calm****Dragées Carbonel****Dragées de Charbon
Fraudin****Dragées de fer Cognet****Dragées de fer Rabu-
teau****Dragées gargarisme de
Luchon****Dragées de Mastho-
phile Annic****Dragées Demazières****Dragées de Prasion****Dragées de Royat****Dragées d'iodurine****Dragées Dubourg****Dragées Efgé****Dragées Elkin****Dragées Gélinau****Vignal, Dejoux et Raoux, Péri-
gueux.****52, r. de Cambrai, Lille (Nord).****8, rue Saint-Martin, Paris.****187, rue de Créteil, Maisons-
Alfort (Seine).****157, rue Championnet, Paris.****29, pl. Bossuet, Dijon.****Calmels, Auterive (Haute-Ga-
ronne).****Colmant, à Caudry (Nord).****A. Clanché, Vars (Charente).****Lab. Sauba, Montreuil-Paris.****78, avenue de St-Ouen, Paris.****Salbris (L.-et-Ch.).****Thomas, à Péronne (Somme).
id.****42, r. du Mont-Cenis, Paris.****156, r. des Fauvelles, Courbevoie.****54, rue de Paris, Charenton.****16, rue Charlemagne, Paris.****4, pl. de la Gare, Tunis.****15, bd Pasteur, Paris.****5, av. Boissier, Nantes.****3, rue Watteau, Courbevoie.****24, av. Mac-Mahon, Paris.****9 et 11, rue de la Perle, Paris.****6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
Colombes.****6, rue Berbissey, Dijon.****16, rue Ballu, Paris.****Paméla, 85, rue Turbigo, Paris.****20-22, r. de la République, Lyon.****98, rue Jeanne-Maillotte, La
Madeleine (Nord).****15, rue d'Argenteuil, Paris.****4, av. Desfeux, Billancourt
(Seine).****43, r. de Saintonge, Paris.****Comar et C^{ie}, 20, rue des Fossés-
St-Jacques, Paris.****Sauba, Montreuil Paris.****Montbron (Charente).****1, rue d'Alembert, Paris.****14, rue Eug.-Delacroix, Paris.****26, av. de Royat, Chamalières-
les-Clermont-Ferrand (P-de-D.).****Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.****43, rue de Saintonge, Paris.****40, av. Secrétan, Paris.****18, r. de Beaune, Paris.****28, r. Velpeau, Antony (Seine).**

- Dragées Gesta
 Dragées Gmet
 *Dragées Hecquet
 Dragées hépatiques
 *Dragées Hépat - Ré-
 nales Gros
 Dragées Japat
 *Dragées Lebrun toni-
 cardiaques
 Dragées Lumeval
 *Dragées Mannet
 Dragées menthol-bo-
 rax, cocaïne
 *Dragées Névrosthé-
 niques « Yse »
 Dragées Northon
 Dragées Pautauberge
 Dragées Phlébos
 Dragées Pierlot
 Dragées pulmonaires
 Giry
 Dragées St - André-
 Mayniel
 Dragées Sédo - car-
 diaques Pélissier
 Dragées Somedo
 Dragées Tasch
 Dragées Vichy-Amal-
 grissant
 Dragées Vityl
 Dragélines
 *Dragéval (ex.-dragées
 Luméval)
 *Dragurol
 Drainhépatol
 Drainobiline
 *Drainobyl
 *Drainochol
 Drainosel
 *Drinal
 *Drcsol
 *Dryco (Lait sec)
 *Dulcao
 Dulcia
 Dulcilax
 Iulcrem
 *Dulfor
 Duna-B
 *Duna-caïne (Bain de
 bouche)
 *Duna-caïnol
 Dunaméol élixir
 Duna-phorine
 Duodénase
 Dusart (sirop, solution)
 *Dycholium
 43, av. de la République, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 10, rue de la Barouillère, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 252, fg St-Martin, Paris.
 5, rue de Lubek, Paris.
 (Voir Dragéval.)
 Loudun (Vienne).
 Optima, Grande-Rue-au-Bois,
 Bruxelles.
 65 rue Louis-Blanc, Paris.
 Cachat, Évian-les-Bains (H.-S).
 10, r. de Constantinople, Paris.
 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
 (Voir : Valérianate Pierlot.)
 49, rue de Metz, Nancy.
 85, rue Turbigo, Paris.
 33, av. de Villiers, Paris.
 à Meudon (Seine-et-Oise).
 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
 Blancher, Vichy (Allier).
 72, quai Jemmapes, Paris.
 Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
 12, rue Boïnod, Paris (XVIII^e).
 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 Chavanne, Fontaine-Grenoble.
 54, Chaussée-d'Antin, et 69, r.
 de Provence, Paris.
 78, av. Schneider, Clamart.
 73, rue de Balagny, Paris.
 Mironneau, Chef - Boutonne.
 J. Boutes, Muret (Hte-Garonne).
 5, rue Saint-Roch, Paris.
 38, pl. de la Victoire, Tourcoing.
 38, pl. de la Victoire, Tourcoing.
 134, bd Pereire, Paris (XVII^e).
 Quiétiéville, Mézidon (Calvados).
 38, pl. de la Victoire, Tourcoing.
 17, rue de Berri, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 10, allées Damour, Bordeaux.
 17, rue de Berry, Paris.
 12, rue de Nice, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.

- Dymozyl
 Dynabiose
 Dyn-Acron

 Dynamine Connat
 Dynamobiase
 Dynamoferol
 *Dynamogénine du Dr
 Chaboud
 Dynamose
 Dynaphosol
 Dynaserum
 Dynasthénine
 Dynavitamine
 Dynos
 *Dynosthène
 *Dysariode
 Dyspepsia

 *Dyspeptine Hepp
 *Dyspné-Inhal

 *Dysthène
 *Dystonine
 Dysurol
 Dyuril

 40, rue des Carmes, Orléans.
 Zedaire, Chambéry.
 37, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers.
 Folliet, Rumilly (Hte-Sav.).
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 55, rue de Chabrol, Paris.

 Rumilly (Hte-Savoie).
 84, fg du Temple, Paris.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 Aubéry, Avignon (Vaucluse).
 Martin, Bordeaux-Cenon.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 183, r. de Rome, Marseille.
 91, rue de Monceau, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 Le Puits d'Angle, Le Chesnay.
 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 45, r. Cambronne, Paris (XV^e).
 1, av. de Villars, Paris.
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.

E

- Eau de Charrier

 Eaux de Châtel-Guyon
 Eau de Glauber
 Eau de Lorraine
 Eau d'Enghien
 Eau Sova
 *Eaux-Mères

 Ectiazol
 Ectobiase Bonnay
 Ecto-Gynœstryl
 Ecto-Sterandryl

 Laprugne (Allier), et 24, av. de l'Opéra, Paris.
 6, square de l'Opéra, Paris.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 10, rue Caumartin, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 Établ. Thermal, Salles-du-Salat (Haute-Garonne).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 112, Gde-Rue, Nogent-s.-Marne.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.

- *Eczéda 35, r. des Blancs-Manteaux, Paris.
- Eczémacure 121, av. Saint-Ouen, Paris.
- Eczémine 33, Grande-Rue, Besançon.
- *Eczosec 35, r. des Blancs-Manteaux, Paris.
- Edalguine Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher).
- *Edistol 40, rue des Carmes, Orléans.
- Edo-vaccins 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Edricamphre 40, rue des Acacias, Paris.
- *Eductyl 32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
- Edulax 5, rue François-Ponsard, Paris.
- Efflozone Labocip 19, bd du Parc, Neuilly-s.-Seine.
- *Efryl (sirop) 98, rue de Sèvres, Paris.
- *Egidol 74, rue Blanche, Paris.
- Egralene 157, r. Championnet, Paris.
- Eitreb-embrocation Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Ektal Seguin, 7, r. Ste-Isaure, Paris.
- *Ektogan 12, rue Lamartine, Paris.
- *Ektophanol 19-21, rue Van-Loo, Paris.
- *Elaiadine M. Murat, Castres.
- *Elastoplaste Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- *Elatine Bouin Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
- Elbon Ciba 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Electralguine Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher).
- *Electrargol Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Electrodes de haute fréquence 12, av. du Maine, Paris.
- Elédon Soc. NESTLÉ, 6, av. César-Caire, Paris.
- Eleodermine 4, av. de Bayonne, Fau.
- *Elguine Julien 105, rue de Rennes, Paris.
- *Elipol Drouet et Plet, Ruell-Malmaison (Seine-et-Oise).
- *Elixir Bonjean 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
- Elixir Bravais 56, bd Ornano, Paris.
- Elixir Daumy 38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
- Elixir de Catéchiodé 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- Elixir de Larsa 77, bd de Grenelle, Paris.
- Elixir de Pepto - Cardine 5, av. des Tilleuls, Paris.
- Elixir dépuratif aux Algues Marines 6, rue Berbissey, Dijon.
- *Elixir Déret 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Elixir Duchamp De Grauwe, La Plaine-St-Denis.
- *Elixir Ducro 20, pl. des Vosges, Paris.
- Elixir Duret 12, rue de Nice, Paris.
- Elixir Dussaud 1, rue Fondère, Marseille.
- *Elixir eupeptique Tisy 12, rue Charles-V, Paris.
- *Elixir eupnéique Martin Mazade Saint-Raphaël (Var).
- Elixir de fer Koenig 37, av. Marceau, Paris.
- Elixir Fleig 88, rue Duhesme, Paris.
- Elixir Gabail 55, av. des Écoles, Cachan.

- *Elixir Godfrin
 Elixir Goy
 *Elixir Grez
 Elixir hépatique Henry
 Elixir Houdé
 *Elixir Hymel
 Elixir I. A. M.
 Elixir iodépuratif Pépin
 Elixir des Jacobins
 Elixir Koff
 Elixir Maltopepsique
 *Elixir Mannet ferro-ergoté
 Elixir Mannet à l'Iodure de Potassium
 Elixir Mannet à l'Iodure de Sodium
 Elixir Tribromuré Mannet au Salol
 *Elixir Mialhe
 Elixir Morlas
 Elixir de Pepsine Boudault
 Elixir Percy
 Elixir Phospho-Mel
 Elixir polybromuré Yvon
 *Elixir Rodi
 Elixir Saint-Jean
 Elixir Séda
 Elixir Spark
 *Elixir Spes
 Elixir supertonic Stella
 Elixir du Dr Thermes
 Elixir thiogalacolé Arquevaux
 Elixir Tonicardiaque Roussel
 Elixir Valéro-bromuré
 Elixir vermifuge Allvers
 Elixir vermifuge américain Olivier
 Elixir vermifuge Chiarini
 Elixir Virenque
 Elixir de Virginie Nyr-dahl
 Elixir Vital Quentin
 Elixir Zidal
 *Elkin Dragées et Granules
 Elycaptol (sirop, capsules, pastilles)
 Elzévir Dentition
 6. r. de Paris, Joinville-le-Pont.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 9, rue Dieu, Paris.
 90, av. de St-Ouen, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 116, bd Haussmann, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 Chavanne, Fontaine (Isère).
 Loudun (Vienne).
 id.
 id.
 id.
 8, rue Favart, Paris.
 passage des Princes, Paris (II^e).
 Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
 55, av. Montredon, Marseille.
 2, pl. Duchesse-Anne, Nantes.
 5, rue Robert-Planquette, Paris.
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 64, r. des Tournelles, Paris.
 Étampes (Seine-et-Oise).
 10, rue Washington, Paris.
 (Voir : Valérianate Gabail.)
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 10, allées Damour, Bordeaux.
 Aix-en-Provence.
 1, rue d'Alembert, Paris.
 12, r. de la République, Puteaux.
 28, rue Velpeau, Antony.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 Dépruneaux, 18, rue de Beaune, Paris.
 23, bd Raymond-Poincaré, Bar-le-Duc.
 H. Salle, 4, r. Elzévir, Paris.

- *Embrôcan
Embrocation Richer
Embrocation Roche
- *Embrocation Rosso
Embrocation Siamoise
- *Embryhormone
- *Embryocytol
- *Embryo-Dynam
- *Embryol
- *Embryona-Probios
Embryonine du Dr
Barré
- Emencyl
- Emerson's Bromo-Sel-
tzer
- Emétinol Viel
- *Emgé Lumière
- Emonctine
- Emollian
- *Emplâtres R. Cavallès
- Empyrol
- Emulsion Bonnefond
- Emulsion Marchais
- Emulsion Scott
- Encylat Cordonnier
- *Endocaïne-Adrianine
- Endocalcase
- Endocalcine
- *Endocarbône Erce
- *Endocrisines Fournier
- *Endolacgénine
- Endolcalcine
- *Endo-Ovarina
- *Endopancrine
- Endoplex Polvi
- *Endothymusine
- Endoxène
- *Endoxidine
- Energésine
- Energétènes végétaux
Byla
- *Energine Iodée de
Berck
- *Energine Phosphorée
de Berck
- *Enésol Clin
- Engeluroil
- *Eniode Lefebvre
- Ennago
- *Eno
- Entalva
- Entaseptine
- Entelactol
- *Entérargol
- Saporta, 59, bd Lefebvre, Paris.
45, fg Saint-Denis, Paris.
- 7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
Colombes (Seine).
- 3, rue Lamblardie, Paris.
- M. Martin, Cloyes (E.-et-L.).
191, fg St-Antoine, Paris.
- Lab. La Biomarine, Dieppe.
- 4, rue Balzac, Paris.
- Lab. La Biomarine, Paris.
- 8, rue St-Martin, Paris.
- 20, rue St-Lazare, Paris.
- 20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
- 62, av. Champs-Élysées, Paris.
- 7, rue Saint-Yves, Rennes.
- 45, rue Villon, Lyon.
- G. Baude, St-Aubert (Nord).
- rue Faidherbe, Lille.
- 29, rue Singer, Paris.
- Mec Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).
- 10, rue de la Barouillère, Paris.
- 11, pl. Castellane, Marseille.
- 6, r. Ad.-La Lyre, Courbevoie.
- 52, r. de Cambrai, Lille.
- 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- 74, rue des Jacobins, Amiens.
- 3, bd Beaumarchais, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 7, rue Biscornet, Paris.
- 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
- 3, bd Beaumarchais, Paris.
- 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
- 48, rue de la Procession, Paris.
- 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
Paris.
- 48, rue de la Procession, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 25, rue Dagorno, Paris.
- 276, rue Lecourbe, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 10, rue du Bloc, Amiens.
- Id.
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 41, rue de Madrid, Paris.
- 2, rue Duphot, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 4^{ter}, rue Barbès, Courbevoie.
- 45, r. Villon, Lyon.
- CH. LAVERGNE, r. de Rome,
Cannes (Alpes-Maritimes).
- 24, bd Sébastopol, Paris.
- 47, rue Maleret, Bordeaux.

- *Entéraspirine
- Entéricure
- *Entériode
- *Entéro-Antigènes
- *Enterobyl Dehaussy
- *Entérococcène
- *Enterocuprol
- *Entérodausse et Enté-
rodausse calcique
- *Enterofagos
- Entéroformine
- Entéroglandex
- Entéro-granulé
- Entérohépatine
- *Entéromucine
- *Entéropansement du
D^r Zizine
- *Entéropathyl
- *Entérosalicyl
- *Entéroseptyl
- *Entérovaccin Lumière
- *Entéro-Vaclydun
- *Entéro-Vioforme
- Entérozinc
- Enterozone
- Entérozyne
- Entéryl
- Enurol
- *Enzypan
- *Epanal
- Ephargol
- *Ephasma
- *Ephédrmine
- *Ephédraféine
- Ephédramélis
- *Ephédrampoules
- *Ephédramyd
- Ephédrargol
- *Ephédrasmine
- *Ephédricones
- *Ephédrine Béral
- *Ephédrine Houdé
- Ephédrine Proba
- *Ephédrisol
- *Ephédrivaine
- Ephédrocamphre
- *Ephédrocure
- *Ephédroïdes Béral
- Ephédrol
- *Ephédrolénol
- *Ephédrolyptol
- *Ephédromel
- *Ephédro-rhinol
- *Ephéiodine Béral
- 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- 157, r. Championnet, Paris.
- 39, rue de Clichy, Paris.
- 10, rue Barbette, Paris (III^e).
- 50, rue Nationale, Lille.
- 54, r. Fg-St-Honoré, Paris.
- G. Calmels, Auterive (Haute-
Garonne).
- 4, rue Aubriot, Paris.
- 8, av. Walkanaer, Nice.
- 141, rue de Paris, Angoulême.
- 58, rue de Maubeuge, Paris.
- 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 24-26, rue de Fécamp, Paris.
- 7, imp. de la Sous-Préfecture,
Roanne.
- 14, av. Perrichont, Paris.
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- 45, rue Villon, Lyon.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- 103-107, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
- 4, pl. de la Gare, Tunis.
- 56, bd Pereire, Paris.
- 52, rue Labruyère, Paris.
- Falque, Besançon.
- Bardet, 76, r. de Sèvres, Paris.
- 21, rue de Madrid, Paris.
- 47, rue de Bretagne, Paris.
- 44, rue d'Inkermann, Lille.
- 50, rue Nationale, Lille (Nord).
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- id.
- 20, av. J.-Jaurès, Suresnes.
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- 22, rue de la Sorbonne Paris.
- 99, bd Lafayette, Calais.
- Saugier, Dôle (Jura).
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- id.
- 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- 40, rue des Acacias, Paris.
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
- 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- 194, rue de Rivoli, Paris.

- *Ephétropine Béral
- Ephodol
- *Epholéine
- *Ephydion
- *Ephynal Roche
- *Epicral
- Epidermine
- Epidosine Grémy
- *Epipaline
- Epithémia
- Epoc
- Epoqualine François
- Equisétol
- *Eranol
- Eranyl
- *Erцерhinol
- Ergényl
- *Ergépatine
- Ergocoline
- *Ergophos
- *Ergorone
- Ergostol Violet
- Ergot de seigle Dausse
- *Ergotine Bonjean
- Ergotine Lamante
- Ergotine Yvon
- Ergotinine Tanret
- Ergotinine Byla
- Erystypticum Roche
- *Erysulfure Eon
- *Erythéma
- *Erythra
- Erythraseptol
- Erséol Prunier
- Esanofèle Bisleri
- Esculéol
- *Esératropine
- Eska
- Essence alsacienne
- Essence japonaise
- Essence Landaise
- Essoforme
- Etain Amicros
- Ether amyvalérianique
- *Ether anesthésique
- Adrian
- Ether anesthésique
- Ether pour narcose
- Ether valérianique Vial
- Ethoforme
- *Ethyl-Pneumine
- Etoléase
- *Eubine
- 194, rue de Rivoli, Paris.
- 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- 40, rue des Acacias, Paris.
- 18, bd de la Liberté, Rennes.
- 10, rue Crillon, Paris.
- Lambert, rue de la Paix, Vichy.
- 112, rue de Gerland, Lyon.
- 14, rue de Clichy, Paris.
- 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
- 6, pl. de l'Académie, Angers.
- 14, r. Demarquay, Paris.
- 16, cours Gambetta, Lyon.
- 59, rue Boissière, Paris.
- 45, rue de l'Échiquier, Paris.
- Sanson, Mer (Loir-et-Cher).
- 1, av. de Villars, Paris.
- 1, pl. du Griffon, Lyon.
- St-Just-en-Chaussée (Oise).
- 32, rue de l'Ouest, Paris.
- 3, rue Royet, Lyon-Caluire.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 62, av. de Paris, Villejulf (Seine).
- 4, rue Aubriot, Paris.
- 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- M. Paris, 1, r. Lassalle, Lyon.
- 5, rue Robert-Planquette, Paris.
- 28, avenue de l'Observatoire, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 10, rue Crillon, Paris.
- Dinan (Côte-du-Nord).
- 139, rue Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine).
- 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- 3, pl. Thiers, Le Raincy.
- 4, rue de la Coutellerie, Paris.
- 25, rue Dagorno, Paris.
- 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- 22, rue Lakanal, Paris.
- 76, rue Orfila, Paris.
- 11, r. La Fayette, Paris.
- 79, rue Legendre, Paris.
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
- Simon, 44, r. Inkermann, Lille.
- 177, rue de Courcelles, Paris.
- 36, rue de Paris, Colombes.
- 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- 8, rue Vivienne, Paris.
- 18, rue de Jouvence, Dijon.
- Ingé, 14, rue Maublanc, Paris.
- Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- 18. r. de Ménilmontant, Paris.

- Eucalcyl**
Eucalinhal
***Eucalybrol**

Eucalyptéol Antoine
***Eucalyptine Le Brun**
***Euchol**
Eucortone

Eucratol
Eudermyl
Eudigérase
Euférine
Eufosyl

Eugaline
Eugastrol
Eugéine Prunier
Eugestol

***Eugynol Grandval**
Eukéol Clément
Eukinase Carrion
Eulaxol

Eumictine Leprince
***Eunéryl**
***Euonymine P. Thibault**
Eupatorine

***Eupaveryl**
***Eupeptique Monavon**
Eupepton
Eupeptyl
Euphénine Bastia
***Euphon**
Euphonol Aguetant
Euphorine du D^r Chaboud
Euphorol Loudenot
***Euphoryl**
***Euphoryl Infantile**
***Euphrenine Bastia**

Euphysol

***Euphytose**
Euplasmol
***Euplastyl**
Eupnéol
***Eupnine Vernade**
***Eupnogénol**
***Eupnol**
Eupnoléine
***Eupnophédrol**
Euprandiol
***Eupulmol**
- 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 23, bd Raymond-Poincaré, Bar-le-Duc.
 8, rue Vivienne, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 Morellet, Bagnoles-de-l'Orne.
 Scott, 348, rue Saint-Honoré, Paris.
 74, rue de Lourmel, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 112, rue de Gerland, Lyon.
 12, rue des Petits-Carreaux, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
 r. Albert-1^{er}, Beaumont-sur-Oise.
 8, r. de Passy, Paris.
 4, rue de la Coutellerie, Paris.
 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine).
 12 et 14, rue Féry, Reims.
 7, pas. Thionville, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 4, pl. Saint-Martin, Vendôme (L.-et-C.).
 62, rue de la Tour, Paris.
 9, bd Malesherbes, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Lab d'Allopathie générale, Brignais (Rhône).
 33, fg Montmartre, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 36, qual Fulchiron, Lyon.
 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
 106, av. du Roule, Neuilly-s.-S.
 18, av. Daumesnil, Paris.
 id.
 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
 22 bis, av. de St-Cloud, Versailles.
 14, rue de Miromesnil, Paris.
 79, rue de Wazemmes, Lille.
 89, rue Martre, Clichy (Seine).
 21, rue des Roses (Dijon).
 r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
 116, av. Berthelot, Vienne (Isère).
 26, r. des Moines, Paris (XVII^e).
 id.
 id.
 58, r. St-Lambert, Marseille.
 Chavatte, r. de France, Roubaix.

- Eupurgo Bengué**
 *Euquinargol
 Eurectol
 Euresine
 Eurhéine
 *Eurinase
 Euronal
 Eurythmine Dethan
 Eusébine
 *Eusedyl
 *Eusomnine Bélières
 Eutectyl
 *Eutensyl Grémy
 Euvagol
 *Evatmine Carrion
 *Evine
 Evirène
 Evobiline
 Evolax
 *Evolaxine
 *Evonyl
 Excytol
 *Exentérol
 *Exhépa
 *Exobol

 Exol Cognet
 Exolysés Byla
 Exometalion
 Exonagar
 Exonérol
 Exorphyl
 *Exoseptoplix
 *Exsugyl
 *Extensoplast
 Extrait antiseptique du
 D^r Wolf
 Extrait Bile Boudier
 *Extrait de Bile Le-
 francq
 Extrait de céréales
 Adrian
 *Extrait de Malt Fran-
 çais Déjardin
 Extrait de Malt Grütli

 Extrait du D^r Rap
 Extrait fluide de Bar-
 dane Dausse
 *Extrait Hamyd
 *Extrait Hépatique Le-
 francq
 Extraits injectables
 Choay
 Extrait Juvinium
- 16, rue Ballu, Paris.
 60, r. J.-Jaurès, Firminy (Loire).
 Perrochon, à Tours (I.-et-L.).
 11, rue des Postes, Angoulême.
 7, pas. Thionville, Paris.
 Fleury, Arcachon (Gironde).
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 11, r. Al.-de-Neuville, Paris.
 Radifer, Nantes (L.-Inf.).
 32, r. des Vallées, Colombes.
 19, rue Drouot, Paris.
 108, rue du Mal-Pétain, Vichy.
 14, rue de Clichy, Paris.
 9, impasse Thoréton, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 168, bd Saint-Germain, Paris.
 Laffort, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 Fluxine, Villefranche (Rhône).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 39, r. Fondaudège, Bordeaux.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne (Seine).
 43, rue de Saintonge, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 14, rue Demarquay, Paris.
 8, rue de l'Assy, Paris.
 150, r. de Paris, Pantin (Seine).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 9, r. de la Gare, Levallois (Seine).

 46, rue des Faures, Bordeaux.
 37, rue de Bourgogne, Paris.

 36, av. de Metz, Romainville.

 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
 10, r. Parent-de-Rozan, Paris
 (XVI^e). (Voir Malt.)
 139, av. de Verdun, Issy-les-
 Moulineaux.
 29, rue Singer, Paris.

 (Voir : Bardane stabilisée.)
 27, fg Montmartre, Paris.

 36, av. de Metz, Romainville.

 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 2, pl. de la Duchesse-Anne,
 Nantes.

Extraits Moncour**Extraits totaux Choay****Extrait surrénal Meurice****Extrait de Yogourth****Ugaz*****Exubyle****Exugyl**49, av. Victor-Hugo, Boulogn
sur-Seine.

48, av. Théophile- Gautier, Paris.

61, av. Louise, Bruxelles.

13, rue Nouvelle, Charenton.
9, rue Chaptal, Levallois-Perret.
Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).**F****Fabérian** (dragées,
ovules, pommades,
suppositoires)**Fagicarbonne*****Fa-ner-val*****Fango Fisch****Fantine Adoue****Fantol****Fantyl Manseau****Farines de céréales,
légumes et fruits*****Farines de régime
Bloch****Farine de Soja«Soyolk»****Farine lactée diastasée
Salvy*****Farine Heudebert****Farine lactée Larousse****Farine lactée Nestlé*****Farine maltée Vial****Farines maltées Heu-
debert*****Farine Mont-Blanc****Farines de céréales, de
légumes****Farines Favrichon****Farines Maltées Fa-
vrichon****Farines Maltées Jam-
me****Farines Nutricia****Farré-Cure**

112, rue des Pyrénées, Paris.

3, rue Sarrette, Paris.

42, r. Mont-Cenis, Paris.

Mer Rouge, Mulhouse (Ht.-Rh.).

36 bis, r. Scallger, Bordeaux.

22, r. de l'Arsenal, Angoulême.
à Margaux (Gironde).

à Tomblaine, près Nancy.

**BLOCH, Tomblaine, près Nancy
(M.-et-M.).**

25, rue Général-Foy, Paris.

4, rue Lambrechts, Courbevoie.

85 r. de St-Germain, Nanterre.

99, Cours Balguerie, Bordeaux.

6, av. César-Caire, Paris.

8, rue Vivienne, Paris.

85, r. de Saint-Germain, Nan-
terre.

Rumilly (Haute-Savoie).

Heudebert. Nanterre (Seine).

St-Symphorien-de-Lay (Loire).**St-Symphorien-de-Lay (Loire).**

47, rue Miromesnil, Paris.

142, r. Fransman, Bruxelles

29, rue Mogador Paris.

- Favexir
 Fébrifuge
 Fébriline
 Fébrosérum Kylna
 *Féculyse
 *Félamine
 Félargent
 *Félisedine
 Félosine
 Felsol
 *Femidiol
 *Féminadène
 Féminoglandol
 Féminose
 *Fénuclacium
 Fenugrec Ravin
 *Fenugrène
 *Fénurobur
 Fer Amicros
 *Férandrine Vitalis
 Fer-Arsenic
 Fer-Basma
 *Fer Bravais
 Fer Henry
 Fer injectable Rousse
 *Fer intraveineux
 Fraisse
 Fériode Byla
 Fer-ion
 Fer Jacquemaire
 Fer Larcade
 Fer Manganèse Amicros
 *Ferment Dep
 Fermentérol
 *Fermentéryl
 Ferment lactique Van Lier
 *Ferment pur de raisin Jacquemin
 Ferment pur de raisin Médicoferment
 Ferments immuno-lactiques
 Ferments lactiques Fabre
 Ferments organiques Zévon
 Férogyl
 *Fer-Ovarine Vitalis
 *Feroxal
 Fer Quévenne
 Fer Rabuteau
 Ferrocaltbiose
 Ferrocalcine
 Ferrocaltose
 43, rue de Lancry, Paris.
 Mollère, à Constantine.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 57, rue du Cherche-Midi, Paris.
 85, rue Saint-Germain, Nanterre (Seine).
 20, rue Vernier, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 Pl. Homme-de-Fer, Strasbourg.
 M. Robilliart, pharmacien, Lille.
 120, rue Lecourbe, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 7, rue Coq-Héron, Paris.
 191, fg St-Antoine, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 2, pl. des Vosges, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 40, bd de Charonne, Paris.
 Aucher, La Ferté-Macé (Orne).
 Palc, Messigny (Côte-d'Or).
 de Grauwe, La Plaine-St-Denis.
 39, rue Sclessin, Liège.
 28, r. Velpeau, Antony (Seine).
 8, rue Jasmin, Paris.
 26, av. l'Observatoire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 à Villefranche (Rhône).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 44, rue Taitbout, Paris.
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 30, r. St-Jacques, Namur (Belgique).
 à Malzéville-Nancy (M.-et-M.)
 10, rue de la Viotte, Besançon
 8, av. des Sources, Nice.
 33, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers (Seine).
 Coirre, 5, bd Montparnasse, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 40, bd de Charonne, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 26, rue Petit, Saint-Denis.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris.
 86, rue de la Réunion, Paris.
 71, rue du Fort, Aubervilliers.

- Ferrocodile et Ferrico-**
dile Leprince
Ferrogyl
Ferroneurol
Ferropeptone
***Ferrophytine Ciba**

Ferroxyline
Ferrygène Carrau
***Ferydal**
***Fibrigélase**

Fibrinine
Fibrogène

Fibrogénine
Ficabyl
Ficairine

Fidulox
Figadol Vivien
***Filhosa**
Filhosovules
Filtrat Inosepta
Filtraxyl

***Fixase**
***Fixase Irradiée**
Fixocalcine
***Fixocalcion**
Fixogène Loudenot
Fixophos
***Flavex**

Flavol-Boeglin
***Flavurool**
Flébosanine
Flécutine AD

***Flétagène**

***Flétagex**

***Flétase**
***Flétobiol**
***Flétonic**
***Fletyol**
Flocons d'avoine Nutricia
***Floculysine simple, infantile**
Floranémone
Floresas
Floréal
Florhamélis
***Florhépatine**
- 62, rue de la Tour, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 Termes, Miramont-de-Guyenne.
 17, rue Cadet, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 26, Gde-rue-St-Clair, Lyon.
 34, bd de Clichy, Paris.
 29, av. Charras, Clermont-Fd.
 O. Bailly, 44, rue Armand-Carré, Montreuil-sous-Bois.
 1, av. de Villars, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
 20, r. du Fg-Saint-Honoré Paris.
 11 bis, pl. Hôtel-de-Ville, Cannes.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 45, r. du Marche, Neuilly-s.-S.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 60, rue de Manceau Paris
 Mexvl. 12, rue Henri-Rivière, Le Perreux.
 28, rue Guibal, Marseille.
 Id.
 9, rue Victor-Fetalle, Paris.
 H. Benoit, Poligny (Jura).
 106, av. du Roule, Neuilly-s.-S.
 151, rue de Charenton, Paris.
 1, av. du Dr Lannelongue, Paris.
 Haguenau (Bas-Rhin).
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 26, Chaussée de la Madeleine, Nantes.
 62, r. de la Brauderie, Châteauroux.
 62, r. de la Brauderie, Châteauroux.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 13, rue Pavée, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 Novita, Reichshoffen (B.-R.).
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 12, bd St-Martin, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 Cavy, à Montluçon (Allier).
 45, fg Saint-Denis, Paris

- Florisana**
Florisédyl
***Florix**
Florosine
***Flor-Peyotl**

***Fluase**

***Flucholinase**

***Fludiose**
Fluène
Fluenzyl
Fluerase
Fluidbos Moyet
***Fluidobile**
Fluidosterol

***Fluobyl**
Fluocholine
***Fluodyle**
Flucoformol Gonin
Fluogranèse
***Fluokol**
Fluol
Fluor dia
***Fluosalyl**
***Fluveinose Mauchant**
Fluvia
Fluxbêmo
***Fluxidia**
***Fluxine (gouttes)**
Fluxivenol
Fluxossan
Focalyne
Fœnugol
Foie - Endocrisines
Fournier
Foliavène
***Follestrine Grémy**
***Follicormone buccale**
Folliculine cristallisée
Roussel
***Folli-lobine**
Folliovarine Laleuf
***Fondants de Soufre**
Dausse
Fondant Iodotanique
Dausse
Fordynol
***Foriod**
Formadermine
Formagol Bouty
Formétine
Formicalcine
Formine Adrian
- 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 58-60, r. des Moulins, Valence.
 54, Chaussée-d'Antin, et 69, r.
 de Provence, Paris.
 r. Fréd.-Chevillon, Allauch (B.-
 d.-R.).
 8-10, rue Croix-Belle-Porte, St-
 Quentin.
 1-3, r. Malherbe, à Beauvais.
 12, r. de la République, Puteaux.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
 Michel, Crevin-Vezouze (N.-et-A.).
 71, av. de Clamart, Issy-les-
 Moulineaux (Seine).
 38, bd Bourdon, Neuilly, Paris.
 50, rue de Turenne, Paris.
 10, rue René-Bazin, Paris.
 60, rue Saussure, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 Laffort, Jougé-lès-Tours (I.-et-L.).
 43, av. Kléber, Paris.
 53, rue de Lille, Tourcoing.
 43, av. Kléber, Paris.
 Gennevilliers (Seine).
 25, r. du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
 112, rue de Gerland, Lyon.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 Fluxine, Villefranche (Rhône).
 14, r. Demarquay, Paris.
 Chavanne, Fontaine, Isère.
 153, bd Montparnasse, Paris.
 88, rue Duhesme, Paris.

 7, rue Biscornet, Paris.
 59, rue Boissière, Paris.
 14, r. de Clichy, Paris.
 30, r. de Miromesnil, Paris.

 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 21, r. de Neuilly, Nanterre.
 51, r. Nicolo, Paris (XVI^e).

 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

 4, rue Aubriot, Paris.
 13, r. du Gal-Foy, St-Étienne.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 3, rue Dunkerque, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 71, rue Ste-Anne, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.

Formitrol

Formitrol Wander

***Formobenzyl**

***Formocarbine**

***Formocarbos**

***Formocholine**

Formocitrine

Formogastrine

Formojectine

Formoline

Formosaline Houdé

Formo-Vaccins

***Formule Jacquemaire**
N° 60

Formyl

***Fornose**

Fortiane

Fortitonyl Clars

***Fortossan Ciba**

Forvital

Foscal Serono

***Fosfomagnyl**

***Fosfoxyll Carron**

***Fosyls Carron**

***Francalcium**

***Francoplaste Kraus**

Frangoléine

Frangulose Flach

***Franlaxol**

Freinix

***Freinolutéine**

Freinospasmyl

Leprince

***Frenasma**

Frène Gmet

***Frénitan**

***Frenovex**

Frey

Frialine Grémy

Frigyl

Frixol

Fructines Vichy

Fructuval

Fucobiline Prothière

Fucoglycine

Fucophosphine

***Fucosine Prothière**

Fuculose

***Fucus Gmet**

***Fucusol**

P. Bastien, Champigny-sur-Marne.

151 bis, r. de Joinville, Champigny.

50, rue Nationale, Lille.

1-3, rue Malherbe, Beauvais (Oise).

Millet, Rambouillet (S.-et-O.).

36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.

37, av. J.-Coutant, Ivry-s.-S.

21, r. Alsace-Lorraine, Lyon.

112, rue de Gerland, Lyon.

rue de la Loge, Montpellier.

9, rue Dieu, Paris (X^e).

154 bis, rue Breteuil, Marseille.

Fluxine, Villefranche (Rhône)

23, r. Valéry-Meunier, Pau.

70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).

Bonnafé, Milliau (Aveyron).

18, rue St-Sulpice, Paris.

103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

Brichard, Bar-le-Duc (Meuse)

25, rue Dagorno, Paris.

92, av. de St-Mandé, Paris.

69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).

69, r. St-Cloud, Clamart (Seine).

3, rue Saint-Roch, Paris.

37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.

à Aigurande (Indre).

6, av. Colonel-Bonnet, Paris.

3, r. St-Roch, Paris.

98, rue de Sèvres, Paris.

2, rue des Deux-Ponts, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.

71, rue Saint-Blaise, Paris.

27, fg Montmartre, Paris.

60, rue de Monceau, Paris.

1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.

12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).

14, rue de Clichy, Paris.

F. Montanton, Buzançais (Indre).

4, rue Richer, Paris.

1 et 3, r. Laflaque, Vichy.

Lab. du Comtat Viticole, Avignon (Vaucluse).

55, rue Auguste-Comte, Lyon.

11, rue Milton, Paris.

Couget, à Olonzac (Hérault).

55, rue Auguste-Comte, Lyon.

223, rue Saint-Martin, Paris.

27, fg Montmartre, Paris.

2, pl. des Vosges, Paris.

Fumar du Dr Fournier	Saint-Sever (Landes).
Fumigalène	7, r. du Marché, Blaye (Gironde).
Fumigator Gonin	60, rue Saussure, Paris.
Furcol	47, r. Carnot, Versailles (S.-et-O.).
Furoncide	37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
Furonculase	24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
Furonculine	Couget, à Olonzac (Hérault).
*Furoplast	9, r. de la Gare, Levallois.
Furosyl	156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Fusol	154 bis, r. Breteuil, Marseille.

G

Gabianol	22, rue de la Bienfaisance, Paris
Gabiol	2 bis, rue Chevalier-de-la-Barre Saint-Quentin.
Gadilène Vasseur	114, r. Faidherbe, Boulogne-sur- Mer.
Gadloline	38, rue des Lices, Angers.
*Gaduamine	35, r. de Paris, Clichy (Seine).
*Gaduase	Servier, Orléans (Loiret).
Gaduline algovitinée	Fontanier, Moulins-sur-Yèvre
Galacalcine Latour	16, r. du Petit-Musc, Paris.
*Galacamphre	18, r. Mal-Foch, Versailles.
Galcanthine	133, rue Lecourbe, Paris (XV ^e).
Galacodil Godard	13, rue Chernovitz, Paris.
*Galacoline	3, rue Lamblardie, Paris.
Galacol phosphaté Pau- tauberge	165, r. Saint-Denis, Courbevoie.
Galacophosphat Clin	20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
*Galarsénan Ducatte	191, rue Saint-Honoré, Paris.
Galarsol Bouty	3, rue de Dunkerque, Paris.
*Galabacteine	154 bis, rue Breteuil, Marseille.
Galactina	68, rue Phalsbourg, Le Havre.
Galactogène Byla	26, av. de l'Observatoire, Paris.
*Galactogène Chalvet	Aix-en-Provence.
*Galactogil	Jacquemaire, Villefranche (Rhône).
Galactose	30, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
*Galaphos	92, r. C.-Pelletan, 2, r. d'Amiens, Marseille.
Galazène	15, quai Bourbon, Paris.
Galegalactol	156, av. Victor-Hugo, Paris.
*Gallorm	20 rue Dumont-d'Urville, Paris.

- Galliasco**
Gallo-chrome
***Gambeol**
***Gamostyl**
- *Ganderma**
Ganglionyl
- Gangliosaa**
***Gardenal**
Gardorinol
***Garepnedrine**
Gargarial
- Gargarisme concentré**
G. Bernhard
Gargarisme Lancosme
- Gargarisme sec Wurh-
lin**
***Gargarisme du Mont-
Dore**
Gargarisme Salmon
***Gargyl**
**Garnitures Obstétri-
cales « Parturia »**
Garsedol
***Gasmany**
- *Gasmar Legendre**
Gasteose
Gastérinase
Gastérine Frémont
Gasterodyne
Gastérol
***Gastéryl**
- Gastiasc**
Gasto-Entérol
- *Gastrépatine**
***Gastrhéma**
Gastrhépase
Gastria
***Gastricine du Dr**
Duhourcau
Gastrilène
Gastrisodyl
***Gastrobellone**
Gastrobiase
Gastrobismul
***Gastrocalcine**
Gastrocalmine
Gastrocaol
Gastrocarbône
***Gastrocitrine**
***Gastroclean**
- 11, r. de Prony, Paris.**
Chauvin, Aubenas (Ardèche).
42, r. É.-Deschanel, Courbevoie.
**43 et 45, r. des Fauvelles, Cour-
bevoie.**
42, r. É.-Deschanel, Courbevoie.
200, rue du Fg-Saint-Martin,
Paris.
2, allée Spach, Strasbourg.
21, r. Jean-Goujon, Paris.
156, av. Victor-Hugo, Paris.
Saugier, Dôle (Jura).
**Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).**
- 11, rue Lafayette, Paris.**
71, av. Victor-Emmanuel-II,
Paris.
- 11, rue Lafayette, Paris.**
**Labor. de la Varilaxine, Sur-
geres (Ch.-Inf.).**
151, r. Charenton, Paris (XII^e).
Chemineau, à Vouvray (I.-et-L.).
- Echard-Gillier, l'Arbresle (R.).**
Simon, 44, r. Inkerinann, Lille.
**E. Verdon, Celles-sur-Belle (D.-
Sèvres).**
Houilles (Seine-et-Oise).
37, rue Brochant, Paris.
77, bd de Grenelle, Paris.
à Vichy (Allier).
137, fg St-Antoine, Paris (II^e).
37, rue Galilée, Paris.
**G. Calmels, Auterive (Haute-
Garonne).**
14, rue Demarquay, Paris.
**41, av. Joffre, La Garenne-
Colombes (Seine).**
29, fg de Bourgogne, Orléans.
71, r. Saint-Blaise, Paris (XX^e).
Cellier, Saint-Uzé (Drôme).
Miraton, Châtel-Guyon.
**6, rue Louis-Blanc, La Garenne-
Colombes (Seine).**
Richard, Aubenas (Ardèche).
27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme).
49, rue du Château-d'Eau, Paris.
2, pl. des Vosges, Paris.
38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
17, rue Cadet, Paris
178, rue Montmartre, Paris.
Benderitter, Vendôme (L.-et-C.).
Saint-Louis (B.-du-Rhône).
Luc-sur-Obieu (Aude).
36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.

- Gastrodium**
 ***Gastro-entéro Pectine** 51, rue de Paris, Pierrefitte.
 Gallier 1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris.
 Gastrofluid 66, bd Exelmans, Paris (XV^e).
 Gastrolex Bertrand, Nomexy (Vosges).
 ***Gastronal'dine** 58, rue de Maubeuge, Paris.
 ***Gastroniger** 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
 ***Gastropansement** 24-26, r. de Fécamp, Paris.
 ***Gastropathyl** 7, impasse de la Sous-Préfecture, Roanne.

 ***Gastropeptyl** 40, rue des Acacias, Paris.
 Gastrophiline 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.

 Gastrophyle 14, rue du Temple, Calais.
 Gastrosaline Lab. du BLOSSET, Moulins-sur-Yèvre (Cher).

 Gastrosalvine Id.
 ***Gastro-Sédatif Atcia** 122, Champs-Élysées Paris.
 Gastrosédase 41, rue de Rome, Paris.
 ***Gastrosédyl** Landrier, Coulanges-sur-Yonne.
 ***Gastro-Sodine** 21, rue Violet, Paris.
 Gastrosic Léo 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 Gastrosthénol 29, av. d'Orléans, Paris.
 Gastrotherib 5, r. Paul Barruel, Paris.
 ***Gastrozymase Bouty** 3, r. de Dunkerque, Paris.
 Gastruth 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 Gastryl 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 Gatercodéine Domergue, Agen (L.-et-G.).
 ***Gatran** 14, r. A.-Briand, Levallois-Perret.
 ***Gaurol** 30, r. Armand-Sylvestre, Courbevoie.

 ***Gaurol intraveineux** Id.
 [**Gaze Anadhère** 29, rue Singer, Paris.
 Gaze Néolée 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 Gécan Géha, Port-de-Rouc (R.-du-R.).
 Gelchol 56, rue Beaubourg, Paris.
 Gelciver 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Gélée antidiarrhéique
 Lumière
 [**Gélées Vaccins Gol-** 45, rue Villon, Lyon.
 denberg Ivago, 17, rue de Provence, Paris.
 ***Géliderm** 16, rue St-Yon, La Rochelle.
 ***Gélobarine** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Géloboldine 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 [**Gélocalcine** 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
 ***Gélogastrine** 38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
 ***Gelok** Leurquin Droux (E.-et-L.).
 Gélolaxol 54, av. de la Bourdonnais, Paris.
 [**Gélo-Pansement Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Gélopeptone 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Gélor 63, rue Falsanderie, Paris.
 Gélo-Son 35, rue Cler, Paris.
 ***Gélotanin** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
 ***Gélotube 29** 49, rue de Blitche, Courbevoie.
 ***Gels gastriques Beau-**
 filis 8, quai du Châtelet, Orléans.
Gélsémium Dausse] 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

- *Génacide
- Génaldyl
- Génalyptol
- *Génatropine
- Gencigel
- *Genécarmine
- Génergosine
- *Génésérine
- Genêt Gmet
- *Genhyoscyamine
- Génisténal
- Génoderme
- *Génomorphine
- *Génoscopolamine
- *Genosthéniques
- *Génostrychnine
- Genovigor
- Génovital
- Génurine
- Génysil
- *Géo-baryum
- Géodyl
- Géraldine
- Geranine
- Geraseptol
- Gérasol Cimon
- Gercéol
- Gercérine Eon
- Gercurol (Pommade)
- *Germalpe
- Germex 42
- Germidex Pâte
- *Germidor
- *Germinol
- Germocalcine
- Germoléol
- *Germolysine
- *Germose
- Germyl
- Gérol Testart
- *Gestormone
- Gesto Serum
- Giberol
- Gines (Comprimés)
- Girasiol Dumesnil
- Givrinol
- *Glandex phoscalcique
- *Glandimbine Lafran
- *Glandocalcyl
- Glandophile
- 10, rue de la Barouillère, Paris
- 76, rue des Jacobins, Amiens.
- 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 13, rue Mélingue, Paris.
- 33, Grande-Rue, Besançon.
- 41, av. Joffre, La Garenne-Colombes (Seine).
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 27, fg Montmartre, Paris.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 24, rue de Montessuy, Paris.
- 4, pl. des Vosges, Paris.
- id.
- id.
- id.
- 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
- 3, rue Dulong, Paris.
- Boucly, Gde Place, Louvrol (Nord).
- 7, rue St-Isaure, Paris.
- Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
- 1, av. de Villars, Paris.
- 121, av. de St-Ouen, Paris.
- 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
- 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
- 34, bd de Clichy, Paris.
- 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.
- 3, r. des Rouairies, Dinan.
- Bourillot, 6, rue Berbizey, Dijon.
- Lab. Bonnet, Laragne (Hautes-Alpes).
- 85, rue du Canal, Roanne.
- 37, av. Jean-Jaurès, Aubervilliers.
- Grasse (Alpes-Maritimes).
- 8, rue St-Martin, Paris.
- 29, rue de Metz, Toulouse.
- Blanc, Barcelonne - du - Gers.
- 10-12, bd de la Villette, Paris.
- 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
- 9, rue Petitot, Dijon.
- Chalais (Charente).
- 73, rue Dutot, Paris.
- 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
- pl. Thiers, Le Raincy (S.-et-O.).
- Bourillot, 6, rue Berbizey, Dijon.
- 10, rue du Plâtre, Paris.
- 14, rue d'Auge, Caen.
- 58, rue de Maubeuge, Paris.
- 8, rue de Prague, Paris.
- 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
- 15, r. Martel, Paris.

- Glandovital**
Glaucuro
 *Gléfina
 *Glésol
Glé Verdat

Globabyl
Globépal
 *Globexine
 *Globinofer
 *Globiron

Globugénol

Globular
Globules Chomel
Globules Hébert
 *Globules Fumouze
Globules Laincar
 *Globules Rébaud
 *Globules Romon
Globules Secrétan

Glomalt (Malt Wander)
 *Glottyl
 *Gloxines
Gloxines Polyvalentes

 *Glucalcium
Glucalone
 *Glucamonix
Gluchol
 *Glucobiocalcium
 *Glucochaux

 *Glucocithine
 *Gluco-cyanure
Gluconate de calcium
Sandoz
 *Gluconyl
Glucoplax
 *Glucosaly
Glucose D
 *Glucosium
 *Glucoxyl Nacher
Gluphosol
 *Gluquinix
Glutéokina
 *Gluthional
 *Glutines Chabre
Glutinettes d'Aspirine
 *Glutipolysaly
 *Glutisaly
Gluti-Santal
 *Glycalcion
- 15, r. Martel, Paris.
 74, rue Blanche, Paris.
 348, rue Saint-Honoré, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 Bourillot, 6, rue Berbizey, Dijon.
 25, r. de Calais, Dunkerque.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 Scientia, 21, r. Chaptal, Paris.
 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
 42, rue Emile-Deschanel, Courbevoie.
 Comtos, Fesches - le - Châtel (Doubs).
 Géha, Port-de-Bouc, Marseille.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 à Saint-Lô (Manche).
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 33, bd Dubouchage, Nice.
 11 ter, av. de Ségur, Paris.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 151, av. Roger-Salengro, Champigny (Seine).
 20, rue du Laos, Paris.
 6 bis, rue Campagne-Pro, Paris.
 6 bis, rue Campagne-Première, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 56, rue Beaubourg, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 Mironneau, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 95, rue Lecourbe, Paris.
 Sandoz, 20, r. Vernier, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 14, avenue Perrichont, Paris.
 46, r. Claude-Lorrain, Lille.
 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 71, bd Carnot, Toulouse.
 55, av. des Écoles, Cachan.
 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
 id.
 78, av. Schneider, Clamart.
 16, cours Gambetta, Lyon.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 24, rue Paul-Bert, Paris.
 id.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 21, rue de Lyon, Paris.

- *Glycarsol
 Glycaspirine
 Glycérine créosotée
 phosphatée Catillon
 Glycéro-bromurine
 Glycéro Gloma
 Glycéro-iodurine
 Glycérolive
 Glycérométhylarsénié
 Glycéro-ovarine
 Glycérophosphate Dal-
 loz
 Glycérophosphate Le
 Perdriel
 Glycerophosphates de
 chaux granulé Gi-
 rard
 Glycérophosphates
 Freysingé
 Glycérophosphates
 Jacquemaire
 *Glycérophosphates
 Robin
 Glycéro-Thyroïdine
 Glycéro-Tribromurine
 *Glycocarpine
 *Glyccure
 Glycogène Clin

 Glyco-lactimase
 *Glyco-M.
 Glyco - phénique du
 D' Déclat
 Glycophosphates gra-
 nulés Astier
 *Glycosthène
 *Glyco-Thymoline
 Glyctone phosphatée
 Charrière
 *Glyphéranol
 Glyphospher
 *Gmet (Extraits)
 Gobérol

 Gobillettes Hypnos
 Golarsyl Maurice
 *Gomenol
 Gometer
 Gométyl
 *Gonacrine
 Gonadormone

 *Gonagone
 *Gonarthri Vaclydun
 Gonéine (Capsules)
 Gonocure
 *Gono-Vaclydun
- 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
 13, rue Antoine-Vollon, Paris.

 3, bd Saint-Martin, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 151 bis, r. Joinville, Champigny.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 5, rue Mézelle, Tarare (Rhône).
 6, rue Dombasle, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

 13, bd de La Chapelle, Paris.
 11, rue Milton, Paris.

 48, rue d'Alésia, Paris.
 6, rue Abel, Paris.

 à Villefranche (Rhône).

 13, rue de Poissy, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 id
 Dalin, 49, q. St-Vincent, Lyon.
 Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 18, av. Illoche, Paris.
 Lab. Miquel, 1, av. Lowendal, Paris.

 4, rue de la Coutellerie, Paris.

 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
 3, rue Saint-Roch, Paris.
 76-78, rue Dareau, Paris (XIV^e).
 Arquevaux, à Étampes (Seine-
 et-Oise).
 52, rue des 5-Diamants, Paris.
 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 27, fg Montmartre, Paris.
 26, av. de Royat, Chamalières-
 lès-Clermont-Ferrand.
 Chabeuil (Drôme).
 61, av. Louise, Bruxelles.
 48, r. des Petites-Écuries, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 id.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Pa-
 ris.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 Sauba, Montreuil.
 27, rue Desrenaudes, Paris.

- Goncoyatrène**
Gonurool A et B
Gorgex
Gosiérine Dalloz
Gossyl
***Gossypiol Maurin**

***Gotira**
Goudrinhal
***Goudroline**
Goudron des Vosges

Goudron Le Beuf
Goudron Freyssinge
Gouttes amères de Baumé
Gouttes Antigél
Gouttes antirhumatismales Wagner
***Gouttes Antispasmodiques Adol**
Gouttes Antispasmodiques Dausse
Gouttes Arsénosthéniques Dausse
***Gouttes Bernamont**
Gouttes Blagny
***Gouttes B. O. P.**
***Gouttes Bronchophiles André**
Gouttes calciques Zanit
Gouttes C. C. U.
Gouttes Chauvin à l'Audisclérocitrine.
Gouttes C. Z. A.
Gouttes dépuratives Fuha
Gouttes Efigé
***Gouttes Eryl**

Gouttes Esurine
Gouttes Géha
Gouttes Glyciodines
Gouttes Gydé
Gouttes Fluvia
Gouttes halogènes du D^r Bern
Gouttes Hélis

***Gouttes hypotensives Fraisse**
Gouttes I. A. M.
Gouttes Iodocirculine

Gouttes Iodopan
- 92, rue Bobillot, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 13, bd La Chapelle, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 102 bis, rue de l'Aigle, La Garenne-Colombes.
 39, r. Taubout, Paris.
 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.
 30, r. Fcs-Bourgeois, Paris.
 21, r. de la Gare, La Broque (B.-Rhin).
 11, rue Milton, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 D^r Gigon, 25, bd Beaumarchais, Paris.
 18, rue de Beaune, Paris.
 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.

 78, cours de la Liberté, Lyon.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 87-89, r. du Commerce, Nevers.
 85, rue Turbigo, Paris.
 8, bd de Cessole, Nice.
 58-60, r. des Moulins, Valence (Drôme).
 3, pl. Intérieure-St-Michel, Toulouse.
 88, rue Duhesme, Paris.

 Aubenas (Ardèche).
 88, rue Duhesme, Paris.

 37, rue des Lois, Toulouse.
 40, av. Secrétan, Paris.
 Lab. Lugocalcion, Oullins (Rhône).
 D^r R. Petit, Angoulême.
 Port-de-Bouc, près Marseille.
 83, bd de la Villette, Paris.
 4, cours Tolstoï, Lyon.
 (Voir : Fluvia.)
 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
 6, cours V.-Hugo, Cavaillon (Vaucluse).

 8, rue Jasmin, Paris.
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 Bourillot, 6, rue Berbizey, Dijon.
 9, rue de la Plâtière, Lyon.

- Gouttes Iodopeptiques**
 Narud 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
 *Gouttes Ionisées 10, rue Vineuse, Paris.
 Gouttes Leconte 12, r. des Petits-Carreux, Paris.
 *Gouttes Linober 17, rue Cadet, Paris.
 Gouttes livoniennes 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 Gouttes Lo-Lo Tsé 51. Bouvier, 31, bd de la Vil-
 Isberg lette, Paris.
 *Gouttes Magalo Goy, 23, r. Beautreillis, Paris.
 *Gouttes Malone J. Vincent, Ancenis (L.-Inf.).
 Gouttes Manor St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
 Gouttes M. I. A. 36, r. de la Tour-d'Auvergne,
 Paris.
 Gouttes Milko Cluzel, 60, c. É.-Zola, Lyon.
 Gouttes Molinal Sauba, Montreuil (Seine).
 Gouttes Narkay Id.
 *Gouttes névrosthéni-
 ques Fraisse 8, rue Jasmin, Paris.
 *Gouttes Nican Cantin, à Palaiseau (S.-et-O.).
 Gouttes au Nitrite de 10, rue Washington, Paris.
 Soude Roussel 23, rue Bautreillis, Paris.
 Gouttes Notal Amicos, 177, r. de Courcelles,
 Paris.
 *Gouttes d'Orargol
 Gouttes Païdophiles du
 D^r Guiraud (Voir : Io-
 darsénic Guiraud.)
 Gouttes P. A. S. 10, imp. Milord, Paris.
 Gouttes Pectiques du Gouin, 20, rue des Écoles, Paris.
 D^r Albert 37, rue des Lois, Toulouse.
 Gouttes de Pectosérum 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 Gouttes Perettes 42, av. de Breteuil, Paris.
 *Gouttes Phosphosthé-
 niques Dausse 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 *Gouttes Pilka 92, rue Bobillot, Paris.
 Gouttes de Quarant-
 taine 38, rue des Lices, Angers
 (M.-et-L.).
 Gouttes Quassinol 73, bd Baille, Marseille.
 Gouttes Rami 44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
 Gouttes Reynaud Durand, Aigues-Mortes (Gard).
 *Gouttes Sap 2, rue des Lombards, Paris.
 Gouttes Scandinaves 36, quai Fulchiron, Lyon.
 Gouttes Schmidt anti-
 convulsives G. Vilas, à Châlons-sur-Marne.
 Gouttes de Sérû 103-105, rue St-Lazare, Paris.
 Gouttes Sédatives Bernhard, 11 r. La Fayette, Paris.
 *Gouttes Trina Gray, Montmirail (Marne).
 Gouttes Triol Rousseau, Sens (Yonne).
 Gouttes Veinophyles Manor, St-Germain - du - Bois
 (S.-et-L.).
 Gouttes Vigor 26, ch. de la Madeleine, Nantes.
 Gouttes Vocis 23, rue Beautreillis, Paris.
 Gouttes Yseult 9, rue de la Plâtière, Lyon.
 *Gouttolysine Alpha, Montreux-le-Ch. (Ht-R.).
 Goyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.

- Grains céphalgifuges** 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux.
- Grains de Seltz** Alpha, Montreux-le-Château (Ht-Rh.).
- *Grains de Vals** 7, rue Galvani, Paris.
- Grains d'Évian** J. Perrochon, Tours (I.-et-L.).
- Grains d'Éphédrine** 194, rue de Rivoli, Paris.
- Grains du D^r Jehan-Meyer** 34, r. Saint-Martin, Château-du-Loir (Sarthe).
- Grains Miraton** 48, rue d'Alésia, Paris.
- Gramalt** Chassaigne, Ruffec (Ch.-I.).
- *Granions de Fouard** 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
- Granoxyl** 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- Granstimul** 78, fg St-Denis, Paris.
- *Granuchol** 42, r. de Paris, Pantin (Seine).
- Granulé Bravais** 56, bd Ornano, Paris.
- *Granulé Cabasson** 183, r. de Rome, Marseille.
- Granulé Calmafreinkel** 52, rue La Bruyère, Paris.
- Granulé Caresmel** 2, qual Paul-Bert, Tours.
- Granulé Chomel** 23, r. Beautreillis, Paris.
- Granulé de Panphosphates** 119 bis, av. Chemin-de-Fer, Rueil (Seine-et-Oise).
- Granulé du D^r Mous-saud** H. Rivier, 10, passage Morel, Montrouge.
- Granulé dépuratif Künckel** 3, rue Watteau, Courbevoie.
- *Granulé Edgès** 59, rue Boissière, Paris.
- Granulés Elkin** 18, rue de Beaune, Paris.
- Granulé Girard** 48, rue d'Alésia, Paris.
- Granulé Hormos** 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
- Granulé pulmonaire Giry** 49, rue de Metz, Nancy.
- Granulé Sabel** 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
- *Granulé Salicylé** Dausse, 4, r. Aubriot, Paris.
- Granulé Tinardon** 17, rue Cadet, Paris.
- Granules antinausiques** Chambourcy (S.-et-O.).
- Granules 3 cachets** 5, bd Montparnasse, Paris.
- *Granules Chanteaud** Chambourcy (S.-et-O.).
- Granules Chevrier** 21, fg Montmartre, Paris.
- Granules Colchicine** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Granules Crosnier** 44, r. de Lagny, Montreuil.
- Granules d'Aloïne** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Granules de Boldine** id.
- *Granulés de Bourget** 8, r. St-Martin, Paris (IV^e).
- Granules de Digitaline** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Granules Elkin** 18, r. de Beaune, Paris.
- Granules Houdé** 9, rue Dieu, Paris.
- Granules Hydrastinine** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Granules Hyosciamine** id.
- Granules Pantofort du D^r Boveil** 1, rue Lassalle, à Lyon.
- Granules du D^r Papillaud** Gigon, 25, bd Beaumarchais, Paris.

- Granules Phosphure de Zinc**
Granules Spartéine
 *Granules des Vosges
 *Granulochrysine Lumière
 Granusel
 Granyl
 Grappuval
 *Gravidostyl
 Graumanyl Meurice
 Gravural
 Griponal
 Grippol
 Gripponyl
 Gripposédine
 *Grippo-Vaclydun
 Grog antigrip Laborom
 Guanec Lafosse
 Guarana Grimault
 *Guaraphos
 *Gubline
 Guérysyphèle
 *Guéthural
 Gui Byla
 *Gui Gmet
 *Guigoz (Lait)
 Guilyl
 *Guimelinde
 Guinitrol
 Guipsine Leprince
 Guipsiode
 *Guïtose
 Gunose
 Guttoléol
 Gutturyl
 *Gynaicéol
 *Gynarsol
 Gynaseptone
 *Gynéco-Vaclydun
 Gynéose
 *Gynepta
 *Gynergène
 Gyneseptil
 Gynésodine
 Gynévrine
 Gynimbine Houdé
 Gynium
 *Gynocalcion
 Gynochlor
 Gynocrinol
 Gynocure
 Gynodine
- 5, bd Montparnasse, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 11, rue La Fayette, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 « Anzla », Monte-Carlo.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 Aubery, Avignon (Vaucluse).
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 28, rue de Seine, Paris.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 11, ch. de la Muette, Paris.
 Calmels, Auterive (Haute-Garonne).
 M. Richard, Aubenas (Ardèche).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 4, av. Brazza, Romainville (Seine).
 48, av. de la République, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris.
 92, rue Robillot, Paris.
 4, rue Richer, Paris.
 71, av. de la République, Champigny (Seine).
 Pepin et Leboucq, Courbevoie.
 26, av. Observatoire, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 Ancenis (Loire-Inf.).
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 62, rue de la Tour, Paris.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 11, qual St-Clair, Lyon.
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 171, r. de Belleville, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 Bourdou, Frontignan (Hérault).
 20, rue Vernier, Paris.
 Calmels, Auterive (Haute-Garonne).
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 (Voir: Yohimbine Houdé.)
 37, rue des Lois, Toulouse.
 7, r. de l'Armorique, Paris.
 38, r. des Fes Bourgeois, Paris.
 8, pas. Morel, Montrouge (Seine).
 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).
 52, r. de Cambrai, Lille (Nord)

- *Gynœstryl 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
- *Gyno-gouttes 8, pas. Morel, Montrouge (Seine).
- Gynohypophysol id.
- *Gyno-Lactosmose Lavril, Pacy-sur-Eure.
- Gynolactyl 37, r. Château-Landon, Paris.
- Gynolutéol 8, pas. Morel, Montrouge (Seine).
- Gynolysats 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
- Gynomalvine 36, r. des Fes-Bourgeois, Paris.
- *Gynométine 45, fg Saint-Denis, Paris.
- Gynopausine 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
- Gynophiline Douard, Uzel (C.-du-N.).
- Gynophyl Reboul 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
- *Gynoplix 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- Gynopolycrinol 8, pas. Morel, Montrouge (Seine).
- Gynosanine 151, rue de Charenton, Paris.
- Gynosol 1, av. Eug.-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre (Seine).
- Gynoster 133, rue Lecourbe, Paris.
- *Gypsol 13, pl. du Peuple, Saint-Etienne.

H

- Halibut (Voir : Novallbut.)
- *Halifiletol 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
- *Halivite 6, rue Adolphe-la-Lyre, Courbevoie.
- Halocalcion 90, bd St-Denis, Courbevoie.
- Halocure 2 bis, r. du Chevalier-de-la-Barre, Saint-Quentin (Aisne).
- Halogénol 1, rue du Griffon, Lyon.
- Halcmagnésine 41, bd Haussmann, Paris.
- Hamamélidine J. Logeais, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
- Hamacitro 34, rue Sedaine, Paris.
- Hamaméline Houdé 9, r. Dieu, Paris.
- *Hamaméline Roya 21, rue de Madrid, Paris.
- *Hamaméliode 17, rue Cadet, Paris.
- Hamamélis Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
- *Hamamélis Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
- *Hamamélis Grandval 12-14, rue Féry, à Reims.
- Hansénol 116, bd Haussmann, Paris.
- *Harlédine 11, rue de Mogador, Paris (IX^e).
- *Harlem Philippe 36, qual Fulchiron, Lyon.
- Hazellium 62, av. des Champs-Élysées, Paris.
- *Hébéol 20, rue de Rivoli, Paris.

Hectargyre**Hectine****Hectiode****Hédéranol*****Hédéryl*****Hedopeptol*****Hédusol****Héganol****Heinobiose****Helenaso*****Hélénine de Korab*****Hélénine Houdé*****Helguerol****Héliatol (poudre, pom-
made)****Hélieurone****Hélital****Helmazil****Helminthyl****Hémabéol****Hémabione*****Hémagène Tailleur*****Hémagénine Giraud****Hémaldine****Héma-Rhéo****Hémarsyl du Dr Roux****Hématéol****Hématocalcyl*****Hématoéthéroïdine****Hématogénol*****Hémato-iodine****Hématopan****Hémaxol*****Hémédonine*****Hémoantitoxine Sofos****Hémobiose*****Hémocalcine*****Hémocalciopectine****Hémocholine****Hémocléan****Hémocléine Lafay****Hémo-Coagulène****Hémo - Cyto Sérum
Corbière****Hémodrainase*****Hémodrome*****Hémoductyl****Hémoferrine****Hémofixine****Hémofluidine*****Hémofluidol****Mouneyrat, Villeneuve - la-
Garenne.**

d.

Canonne, bd Sébastopol, Paris.

151, r. de Charenton, Paris (XII^e).69, r. de Sèvres, Paris (VI^e).

35, av. de Versailles, Paris.

47, rue Nollet, Paris (XVII^e).

38, fg Montmartre, Paris.

145, av. Montredon, Marseille.

19, rue du Bac, Paris.

Bouyssou, Chambois (Orne).

9, r. Dieu, Paris.

17, rue Soufflot, Paris.

4, pl. Royale, Nantes.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

15, pl. Nationale, Dieppe.

25, rue du Général-Foy, Paris.

14, r. A.-Briand, Levallois-Perret.

72, av. Kléber, Paris.

Chemin Neuf, Ganges (Hérault).

38, rue de Ponthieu, Paris.

65, rue Louis-Blanc, Paris.

Paray-le-Monial (S.-et-L.).

27, av. V.-Hugo, Valence (Drôme)

Caillau, à Argentat (Corrèze).

81, r. Le Corrège, Bruxelles.

1, rue du Griffon, Lyon.

54, fg Saint-Honoré, Paris

37, rue Galilée, Paris.

2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).

263, rue Lecourbe, Paris.

41, av. Joffre, La Garenne.

19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.

11, quai St-Clair, Lyon

55, av. de Montredon, Marseille.

Fercocq, La Varenne-St-Maur
(Seine).

37, rue de Bourgogne, Paris.

12, r. des Petits-Carreaux, Paris.

36, rue des Francs-Bourgeois,
Paris.

54, ch. d'Antin, Paris.

103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.Lab. Corbière, 27, rue Desre-
naudes, Paris.

Cosson, Romainville (Seine).

71, av. Victor-Emmanuel-III,
Paris.

38, bd Bourdon, Paris.

Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

4, r. Beaurepaire, Paris.

14, rue du Temple, Calais.

Léonardon, Angers (M.-et-L.).

- Hémogénase**
***Hémogénol Dausse**
Hémogényl Godart
Hémoglobine Bovel
Hémoglobine Dalloz
***Hémoglobine Deschiens**
Hémoglobine Star
Hémoglobine Van Lier
Hémoglyne Thuau
Hémo-Hépatext
***Hémolucyl**
***Hémoluol**
Hémoneurol Cognet
***Hémopanbiline**
***Hémopausine**
***Hémopectal**
***Hémo-Phagosthyl**
Hémophiline Planche
Hémophytol
***Hémoplasme Lumière**
Hémoplasmine
Hémopoïne
***Hémoptysol**
***Hémopylore**
[Hémoradol
***Hémorex**
***Hémorragine**
***Hémorroïdine**
 (Pommade, Gouttes, Suppositoires)
Hémorroïdyl
***Hémosamine (Utéramine)**
Hémosédine
Hémosine
Hémosérum
Hémostase
***Hémostatique Coudert**
***Hémostatique Ercé**
***Hémostatique Goy**
***Hémostérine irradiée**
***Hémostra Roche**
***Hémostyl**
***Hémotal**
Hémo-Tonikéine
Hémotonine
Hémotrope
[Hémovarine
Hémovaryl Farma
***Hémoveine**
Hémoviris
 (cachets, élixir)
Hémovitase
Hémozol
- à Courpière (Puy-de-Dôme).**
 4, rue Aubriot, Paris (IV°).
 Andenne (Belgique).
 139, av. Emile-Zola, Paris.
 13, bd de La Chapelle, Paris.
 9, r. Paul-Baudry, Paris (VIII°).
 7, rue Charlot, Paris.
 30, rue Saint-Jacques, Namur.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 107, av. Jean-Jaurès, Paris.
 54, av. de la Bourdonnais, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 Annonay (Ardèche).
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 4, r. La Motte-Picquet, Paris.
 2, rue Volney, Paris.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 45, rue Villon, Lyon.
 30, rue Saint-Jacques, Namur.
 Scholl, Gembloux (Belgique).
 2 pl. des Vosges, Paris.
 42, r. E.-Deschanel, Courbevoie.
 17, rue Mayet, Paris.
 9, rue Chaptal, Levallois-Perret
 2, pl. des Vosges, Paris.
 25, rue de Calais, Dunkerque
 (Nord).
 Roussel, Gde Rue, Flers (Orne).
 92, rue Bobillot, Paris.
 19, rue de Fleurus, Paris.
 89, bd Sébastopol, Paris.
 4, pl. de la Gare, Tunis.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 13, rue Antoine-Vollon, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 188, c. de la Somme, Bordeaux.
 10, rue Crillon, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 14, r. Demarquay, Paris.
 52, rue La Bruyère, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 71, av. République, Champigny.
 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 1, av. E.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine).
 Brichard et fils, à Bar-le-Duc.
 54, r. de Sablonville, Neuilly-s.-Seine.
 14, rue du Temple, Calais.
 12, bd Saint-Martin, Paris.

- Hémynne** 13, r. de la République, Yzeure-Moulin (Allier).
- *Hémypnal** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- Henrick's bill** 163, r. de Flandre, Paris.
- Hényl** 31, av. Foch, La Garenne-Colombes.
- Hépacholine** 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Hépacrine** 60, r. de Monceau, Paris.
- Hépacrinol** Calmels, Auterive (Haute-Garonne).
- Hépacynase** 35, rue Cler, Paris.
- *Hépadrainase** 16, rue du Petit-Musc Paris.
- *Hépadrops** Kerckove, pl. Charles-Roussel, Tourcoing.
- *Hépaflorine** « Angla », Monte-Carlo.
- *Hépafluol** 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- Hépagastrol** 33, av. de Villiers, Paris.
- *Hépaglycérol** 54, r. du Fg-Saint-Honoré, Paris.
- *Hépagyl** 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Hepalium** 10, rue Vineuse, Paris.
- *Hepalomel Védé** 2, pl. Gambetta, Paris.
- *Héпамine Mauchant** Gennevilliers (Seine).
- *Hepamult** 21, rue de Madrid, Paris.
- *Héпанème** 54, 1^{re} St-Honoré, Paris (VIII^e).
- *Héпанова** 37, rue Brochant, Paris.
- Héпаеptine** 60, rue de Monceau, Paris.
- *Héпаphos** 4, rue Platon, Paris (XV^e).
- Héпарадénine** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Héпарбилне** id.
- Héпарсүл** 11, ch. de la Muette, Paris.
- *Héпарéguine Wander** P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
- Héпаріer** 33, av. de Villiers, Paris.
- Héпаргène** 56, r. St-Lambert, Marseille.
- Héпармone Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Hépartichaut adultes** 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine).
- *Héпасel** 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
- *Héпасman** 40, quai J.-d'Arc, Chinon.
- Héпасодүл** 9, rue Laloy, Chaumont.
- Hépastéryл** Martin, Bordeaux-Cenon.
- Héпастhényл** 21, r. de Neuilly, Nanterre.
- Héпатергол** Cousin, r. Albert-1^{er}, Beaumont-s.-O.
- *Héпатhemo Deschiens** 9, rue Paul-Baudry, Paris.
- *Héпатіalcіon** 14, rue de Clichy, Paris.
- *Héпатіc Efa** 5 bis, r. de Crimée, Paris.
- *Héпатіcol** Brun, Tassin - La Demi-Lune (Rhône).
- Héпатіne Bouty** 3, rue Dunkerque, Paris.
- Héпатіne Gad** Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
- Héпатіona** Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
- Héпатіque Delfos** Occitan, Auterive (H-G.).
- *Héпатіsmіne** 103, rue Saint-Lazare, Paris.
- *Hepato-5** Royannais, 17, rue Baudin, Lyon.

- Hépatobiline**
Hépatobyl
***Hépatocarnine Le-**
francq
Hépatocrinol
***Hépatocurcumine**
***Hépatocure**
Hépatocynol
***Hépatodiagnose**
***Hépatodiase**
Hépatoformine
Hépatogastrine
***Hépatogènes Charvoz**
***Hépatogénine**
***Hépatoglobine**
Hépatolax
***Hépatomagnésion**
Hépatomanganol
Hépatomuscolisine
***Hépatonia**
Hépatoplasma
Hépatoplasmine
Hépatorga
Hépatoseptyl
Hépatosérine
***Hépatosodine**
Hépatosol
***Hépatostimuline**
Manor
***Hépatosuc**
Hépatotanic
***Hépatoveine M et F**
Hépatos - Vésiculite du
D^r Phélyx
***Hépatovane**
Hépatozyl
***Hépatrol buvable et**
injectable
Hépaturyl
***Hépavita**
***Hepax**
***Hepbi**
***Hepenteryl**
Heptanol
***Heptyl Bourdou**
Héraeléol
***Hergénol**
Hermarsinol
Hermomuthol
- E. Bassol, St-Alvère (Dordogne).
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 36, av. de Metz, Romainville
 (Seine).
 8, passage Morel, Montrouge.
 16, Rond-Point de la Station,
 Le Raincy.
 G. Calmels, Auterive (Haute-
 Garonne).
 62, bd St-Germain, Paris.
 30, r. des Francs-Bourgeois,
 Paris.
 14, r. Demarquay, Paris.
 26, av. de Royal, Chamalières-
 lès-Clermont-Ferrand (P-de-D).
 5, rue François-Ponsard.
 9, et 9 bis, r. Borromée, Paris.
 P^r Bovert, Montguyon (Ch.-Inf).
 Ch. Vergelot, 6, rue de Navarin,
 Paris.
 201, r. du Fg-St-Denis, Paris. }
 57, r. Pierre-Corneille, Lyon.
 11, pl. Louis-XII, Blois.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 Orga, Avignon (Vaucluse).
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 22, r. Guillaume-le-Conquérant,
 Caen.
 15, r. des Champs, Asnières.
 14, rue du Temple, Calais.
 St-Germain du-Bois (S.-et-L.).
 34, rue Pigalle, Paris.
 14, rue de l'Écluse, Paris.
 24, av. Albert-I^{er}, Dijon.
 25, av. du Pt-Wilson, Monthuçon.
 91, rue de Monceau, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 4, rue Platon, Paris (XV^e).
 55, r. de Chabrol, Paris.
 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 4, r. Platon, Paris (XV^e).
 Boucly, Gde Place, Louvroll
 (Nord).
 r. Condorcet, Poitiers.
 Frontignan (Hérault).
 Salle 4, r. Elzévir, Paris.
 13, pl. De'ille, Clermont-Ferrand.
 50, r. Nationale, Lille.
 50, rue Nationale, Lille.

- *Hermophényl**
 Hermoplast (Furoplast
 élastique)
 ermostyrum
 Héroïne Vicario
 Herpur
 Hespéridausse
 Hétérolysine
 Hétraménol
 Hévoglan
***Hevoglanol**
 Hexacarbine
 Héxafel
 Hexalithine
 Hexaranol
 Hexarubrine
 Hexor éne
 Hexot l
***Higadose**
 Higalex
 Hippo-Carnis
***Hippobémo**
 Hippoplasine du D
 Gran
 Hipposarcine Roy
***Hirudinase**
***Hista (Histamine Bey-**
 tout)
***Hista Injectable**
***Hista Liniment**
***Hista Dimilli**
***Histaclartyl**
***Histalgine**
***Histamyl**
 Histocalcine
***Histochrome**

***Histocollyre**
***Histogénol**

***Histogerma**

***Histosmose (concen-**
 tration, injectable)
***Histropa**
 Holaseptine
 Holocalcine

 Hololax
***Holos Deschiens**
***Holosplénine**
***Holovarine**
 Holuryl
***Hopogamyl**

***Hopogan**

45, rue Villon, Lyon.

9, rue de la Gare, Levallois.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
 6, rue Berbisey, Dijon.
 Blanc, Barcelonne - du - Gers.
 Blanc, Barcelonne-du-Gers.
 83, bd de la Villette, Paris.
 47, r. Bokanowski, Asnières.
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 88, rue Duhesme, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 18, r. Ernest-Rousselle, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 37, rue Brochant, Paris.
 Le Gallo, Auray (Morbihan).
 34, rue Pigalle, Paris.
 BYLA, 26, av. de l'Observa-
 toire, Paris.
 53, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 18, av. Daumesnil, Paris.

 12, bd St-Martin, Paris.
 id.
 id.
 id.
 85, av. de Neuilly, Neuilly-s.-S.
 14, av. Perrichont, Paris.
 111 bis, r. de Turenne, Paris.
 201, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 Doladille, St-Aignan-sur-Cher
 (L.-et-Ch.).
 id.
 Mouneyrat, Villeneuve-La-Ga-
 renne.
 Lab. du Rogerma, Lens (P.-d.-
 C.).
 Doladille, St-Aignan-sur-Cher
 (Loir-et-Cher).
 15, r. des Champs, Asnières.
 r. de Rome, Cannes (Alpes-M.).
 15, pl. Godefroy-de-Bouillon,
 Boulogne-sur-Mer.
 13, rue Bolnod, Paris.
 9, rue Paul-Baudry, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 40, rue des Acacias, Paris.
 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beau-
 vais (Oise).
 12, rue Lamartine, Paris.

- Hopoganasé**
Hordénine Lauth
***Hordénol**
Hordosé

***Hormantoxone**
***Hormiadyne**

***Hormobiline**
Hormobrol

Hormocalcium
Hormocarbol
Hormocarnyl
***Hormocline**
***Hormocrinol F et M**

***Hormodausse**
Hormoduodine
***Hormoïlavéine**
Hormo-gynol
Hormolaxine
***Hormoléol**
***Hormolutéine**
***Hormone Gonadotrope du D^r Roussel**
***Hormones Hypophysaires Byla**
***Hormoplasmine**
***Hormosthényl**
Hormotensyl

Hormotone

***Hormovarine Byla**
***Hormoveinyl F**
***Hormoveinyl M**
***Hormovitol**
***Hormuclases (Opothérapies du D^r Roussel)**
***Hormuter**
Horsine
***Hova (Tablettes)**
Huile au Calomel Dumesnil
Huile au Calomel Duret
Huillaxine
Huile Boris

***Huile camphrée Manganesée « Métére »**
Huile Crolas
***Huile de foie de morue médicinalesuractivée**
- 12, rue Lamartine, Paris.
 9, r. du 4-Septembre, Paris.
 12, bd St-Martin, Paris.
 31, r. des Pierres, Bruges (Belgique).
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne.
 A. Mironneau, Pharm., Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 28, av. Carnot, St-Germain-en-Laye (S.-et-O.).
 22, r. de l'Arsenal, Angoulême.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 20, rue de Rivoli, Paris.
 52, r. La Bruyère, Paris.
 102 bis, rue de l'Aigle, La Garenne-Colombes.
 4, rue Aubriot, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 id.
 38, rue du Louvre, Paris.
 6, rue du Petit-Musc, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.

 97, rue de Vaugirard, Paris.

 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 36, av. de Metz, Romainville.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
 11, rue Antoine-Bourdelle, Paris.
 id.
 26, av. Observatoire, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 id.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.

 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 4, rue Saint-Anastase, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.

 10, rue du Plâtre, Paris.
 202 bis, av. Jean-Jaurès, Clamart.
 15, rue de Rome, Paris.
 22, bd Circulaire d'Épinay, Gennevilliers.
 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 56, rue Paul-Cazeneuve, Lyon.
 SPÉCIA, 21, rue Jean-Goujon, Paris.

- Huile de foie de morue** 6, r. Ad.-La-Lyre, Courbevoie
 Seclo (Seine).
Huile de genévrier Vial 8, rue Vivienne, Paris.
 ***Huile d'Harlem** 33, fg Montmarire, Paris.
Huile Gallina 4, rue Candolle, Paris.
Huile grise Duret 202 bis, av. Jean-Jaurès, Cla-
 mart.
Huile grise Ercé 1, av. de Villars, Paris.
Huile grise stérilisée 9, rue de la Gare, Levallois-
 Perret.
Huile de Hogg 18, r. Paul-Baudry, Paris.
 ***Huile iodée Finikoff** 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
Huile Parlax 71, r. Douv-Deleune, Montreuil.
 ***Huile Radonol** 110, bd Haussmann, Paris. (Voir:
 Radonol.)
Huiles Cholestérinées
 Dausse 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 ***Huilorhine** 29, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
Humeur Aqueuse Arti- 5, r. St-Hérem, Clermont-Fer-
 ficielle rand.
 ***Humoro Stabiline** 2, r. Claude-Matrat, Issy-les-
 Moulineaux.
 ***Hupnosol Adrian** 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
 Hyctal Duret & Rémy, Asnières (Seine).
 ***Hydralin** 37, rue de la Fédération, Paris.
Hydramélis 33, Grande-Rue, Besançon.
Hydrargyrettes Hubert, Romorantin (L.-et-C.).
Hydrariode à La Ferté-Macé (Orne).
 ***Hydrastine Houdé** 9, rue Dieu, Paris (X^e).
Hydrastis Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
 ***Hydrastis Gmet** 27, faub. Montmartre, Paris.
 ***Hydrate de Magnésie**
 Adrian 9 et 11, r. de la Perle, Paris.
Hydrocamphre 38, rue Duhesme, Paris.
Hydroclonazone 42, rue Thiers, Le Havre.
Hydrocotyle 21, rue Chaptal, Paris.
Hydrogemmine La- 5, rue François-Ponsard, Paris.
 gasse 45, rue de Lyon, Paris.
 ***Hydrorrhéol** 10, rue Blanche, Paris.
 ***Hydroxydase** 172, rue d'Alésia, Paris.
 Hygiénane 38, rue Saint-Ferdinand, Paris
 Hygienyl du Dr Gau- (XVII^e).
 lier 61, bd Malesherbes, Paris.
 ***Hygiocoline** 222, bd Pereire, Paris.
 ***Hyriodine** 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
 ***Hymel** 6, place des Ternes, Paris.
 ***Hyol** 9, rue Dieu, Paris (X^e).
Hyoscine Houdé Id.
 ***Hyoscyamine Houdé** 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 ***Hyostinal** 127, bd St-Michel, Paris.
 ***Hypalène** Id.
 ***Hypalène mal de mer** Id.
 ***Hypalène obstétrical**
 ***Hyperchlorhydral** 5 bis, rue Marlus-Aufan, Paris.
 [**Hypercytol** Matray, à Aublière (P.-de-D.).

Hypergal Grémy	14, rue de Clichy, Paris.
*Hypersan	12, r. du Téléphone, Bruxelles.
*Hyper Serum Nao	2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.
Hyperstyl	239, r. Nationale, Villefranche s.-S.
*Hypiode	16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
Hypnase Vergelot	163, rue de Flandre, Paris.
Hypneural Cos	99, rue d'Aboukir, Paris.
*Hypno-Nervine	17 bis, av. Parmentier, Paris.
Hypnosedine	11, chaussée de La Muette, Paris.
Hypnovel	41, av. Joffre, La Garenne.
*Hypocarbone	Caresmiel, 131, bd Raspail, Paris.
Hypochlorine	48, r. de Londres, Paris.
*Hypochoiate	2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV ^e).
Hypodermiozone	56, bd Pereire, Paris.
Hypogustyl	191, r. du P ^g -St-Antoine, Paris.
Hypolyse	24, av. Châtillon, Paris.
*Hypophedrine	18, rue de Beaune, Paris.
Hypophos Hurbourque	à Montmeyan (Drôme).
Hypophosphites Chur-	
chill	92, av. St-Mandé, Paris.
Hypophydose	21, r. de Neuilly, Nanterre.
Hypophyse - Endocri-	
sines Fournier	7, rue Biscornet, Paris.
Hypophysine	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Hypophysol	8, passage Morel, Montrouge (Seine).
*Hypostrontium	22, rue de la Sorbonne, Paris.
*Hyposulfène	id.
*Hypotan comprimés	52, r. La Bruyère, Paris.
*Hypotan injectable	id.
*Hypotan papavérine	id.
*Hypotensa	8, rue St-Martin, Paris.
*Hypotenseur Vale	11esdin (Pas-de-Calais).
Hypotensiode	21, rue de Neuilly, Nanterre.
*Hypotensol	38, r. des Lices, Angers.
*Hypo-Thiorine	39, rue Fondaudou, Bordeaux.
Hypoviscol	83, bd de la Villette, Paris.
Hyrganol	21, r. Jean-Goujon, Paris.

I

***I. A. M. (Gouttes)**
Iasthol
Ibogaine Nyrdhal

D^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.).
Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
12, r. de la République, Puteaux.

- Ichtyol Zinc**
Icorase
Idéolaxine
***Idonil**
Idonil au Maté
Iénol
***Ifranol**
***Imdo Roche**
***Im insthme**
***Immunicorps**
***Immuniderm Grémy**
***Immuniperos Grémy**
Immuniphages Grémy
***Immunizols Grémy**
Immuno-Antivirus
Immunovaccin anti-pyorrhélique
***Immunovaccin Anti-rhumatismal**
Immunovaccin bronchopulmonaire
Impaludol
***Impétigol**
Inajuglane
***Inava**
***Indhaméline Lejeune simple et pluriglandulaire**
Indine
***Inertyl Charvoz**
***Infangyl Carlier**

***Infra-rouges**
Infundibuline
Infusion orientale R. B. L.
Inhabillol
***Inhalantyl**
Inhalateur et Inhalations
***Inhalation-Gargarisme**
Inhalation Goy
***Inhalation Lancosme**
Inhalation Sargéthyl

Inhalations Dynamy
Inhalations Vocis
Inhalex
***Inhalo-Bol**
Inhalogène
Inhalol
Inhalone
***Inhalo-Past**
***Inhalophédrine**
Inhalopin
***Inhalo-Sel**
- Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.**
52, rue de Cambrai, Lille.
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
56, rue Beaubourg, Paris.
id.
37, rue Galilée, Paris.
98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
10, rue Crillon, Paris.
Servier, Orléans (Loiret).
6, rue Dombasle, Paris.
14, rue de Clichy, Paris.
id.
id.
id.
61, av. Louise, Bruxelles.
8, av. des Sources, Nice.
id.
8, av. des Sources, Nice.
23, rue Beautreillis, Paris.
181, av. V.-Hugo, Clamart (Seine).
46, rue des Faures, Bordeaux.
14, rue de Normandie, Asnières.

142, rue de Picpus, Paris.
Dabat, à Pau (Bas.-Pyr.).
9 et 9 bis, rue Borromée, Paris.
43, rue de Créteil, Joinville-le-Pont (Seine).
12, av. du Maine, Paris.
21, r. J.-Goujon, Paris.

72, quai Jemmapes, Paris.
36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
14, rue de la Comète, Paris.
Lab. Inhal, 98, r. J.-Maillotte, La Madeleine, Lille.
45, rue de Lyon, Paris.
23, rue Beautreillis, Paris.
71, av. V.-Emmanuel-III, Paris
Stolz, 56, av. Édouard-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.
Chavanne, Fontaine-Grenoble.
23, rue Beautreillis, Paris.
37, rue Galilée, Paris.
32, rue de l'Ouest, Paris.
3, bd Beaumarchais, Paris.
62, r. d'Antibes, Cannes (A.-M.).
Ch. Dehay, à Arras.
32, rue de l'Ouest, Paris.
4 et 6, r. Ordener, Paris (XVIII^e).
Brichard et fils, Bar-le-Duc.
32, rue de l'Ouest, Paris.

- ***Inhalo-Thiorine** 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- ***Inhaloxyl** 5, rue François-Ponsard, Paris.
- Inhalyptol** 4, r. Raymond-Poincaré, Nancy.
- Inhalyl** 33, rue du Bois, Vincennes.
- Inhaphone** 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
- Inhatillo** 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
- ***Inbess** 3, rue de Vouillé, Paris.
- Inhovap** 151, rue de Charenton, Paris.
- Injection Clin Strychno-Phospharsinée** 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- ***Injection désensibilisante Fraisse** 8, rue Jasmin, Paris.
- ***Injection immunisante Fraisse** id.
- Injection sèche Bréra-Innerclean** Montauban (T.-G.).
- ***Inocrinines** 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- Inogyl** 4, route du Médoc, Bordeaux-Bouscat (Gironde).
- ***Inolaxine** 60, rue de Monceau, Paris.
- ***Inolène** id.
- ***Inorénol** 42, rue du Mont-Cenis, Paris.
- Inorhinyl** 60, rue de Monceau, Paris.
- ***Inosepta** id.
- Inosphacelol** 60, rue de Monceau, Paris.
- Inosplénol** id.
- ***Inotyol** id.
- Inoxemol** Debat, 60, r. de Monceau, Paris.
- Inoxyl** id.
- Inoxine** id.
- Insevacins** 22, av. Opéra, Paris.
- ***Institut Pasteur** 60, rue de Monceau, Paris.
- ***Insulanol** 36, rue du D^r-Roux, Paris.
- ***Insuline** (Voir : **Endo-pancrine*) 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Insuline A. B.** 48, rue de la Procession, Paris
- ***Insuline buccale Fornet** 1, rue Dajot, Melun.
- Insuline Byla** 11, chaussée de La Muette, Paris.
- ***Insuline Choay** 26, av. Observatoire, Paris.
- ***Insuline Léo** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- ***Insuline Novo** 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- Insuline Phylose** 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- Insuline-Retard « Leo »** 48, rue de la Procession, Paris.
- ***Insuline - zinc - pro-tamine Choay** 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- ***Insulyl** 48, av. Th.-Gautier, Paris.
- ***Insulyl-Retard** 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Intaline** 97, rue de Vaugirard, Paris.
- Integral Vaccin** Thomas, Chemillé (M.-et-L.).
- ***Intestarsol** 12, rue Paul-Baudry, Paris.
- ***Intesto** 162, r. de l'Hay, Gentilly (Seine).
- ***Intraits Dausse** Problos, 8, r. St-Martin, Paris.
- ***Intra-Reipar** 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
- Introl** Drapier, Rethel (Ardennes).
- Iocasine** 78, fg St-Denis, Paris.
- 5-7, r. Cl.-Decaen, Paris (XII^e).

- Ioda**
Iodalbin Adrian
Iodalia
Iodalis
***Iodalose Galbrun**
***Iodamelis Logeais**
- Iodaminase**
***Iodamol Michel**
Iodargol Viel
***Iodarthos**
Iodarsène
***Iodarsenic Guiraud**
Iodarsine
Iodarsyle
***Iodasclérine**
***Iodaseptine Cortial**
***Iodaseptine salicylée**
***Iodassium**
Iodatoxine Laleuf
***Iodaupébine**
Iodavelan
Ioda Aucher
***Iode Colloïdal Roze**
- Iode liquide Lambiotte**
***Iodéine Montagu**
Iodentérol
Iode Oberlin
Iodéolaxine
Iode Organique Boissy
Iodéol Viel
Iodéopirine
Iodeptol
Ioderme
Iode Tulasne
Iodeyl Fournier
***Iodex**
***Iodhéma**
Iodhyrine du Dr Des-champs
***Iodiformine**
Iodihameline Louveau
***Iodinjectol Jammes**
Iodion
***Iodo - Bismuthate de Quinine Fraisse**
Iodo-Bismuth Ercé
Iodo-Brou
Iodocaféine Goy
***Iodocaïne**
***Iodo-calcique**
Iodocalcium
Iodocardine
- 63, rue de la Falsanderie, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 60, r. E.-Dolet, Malakoff (Seine).
 51, av. G.-Clemenceau, Reims.
 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 2, rue des Deux-Ponts, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 6, rue Parrot, Paris.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 10, imp. Milord, Paris.
 304, rue St-Jacques, Paris.
 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 103, r. Saint-Lazare, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 id.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 36, r. des Fes-Bourgeois, Paris.
 Bedell, Lavelanet (Ariège).
 La Ferté-Macé (Orne).
 2, allée de Chelles, Le Raincy (Seine-et-Oise).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 10, rue de la Barouillère, Paris.
 4, rue Candolle, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 id.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 20, rue de Verdun, Carcassonne.
 (Voir : Iodulane.)
 7, rue Biscornet, Paris.
 46, rue Claude-Lorrain, Lille.
 4, rue Candolle, Paris (V^e).
 51, rue Nicolo, Paris.
 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
 78, bd des Batignolles, Paris.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 94, rue Michelet, Alger.
 8, rue Jasmin, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 19, av. d'Orléans, Paris.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.

- Iodocéane**
Iodocéréol Dalloz
***Iodocitrane**
***Iodo-Citrol**
Iododépuratif
Iodofostal
Iodogalle Vial
Iodogargyval
Iodogéline
***Iodogénol Pépin**
Iodo-Hamamelis Du-
coq
Iodo-Juglan
Iodolactyl
***Iodolipine**
***Iodo-Magnésium**
***Iodo-Maisine**
Iodométine Hautdidier
***Iodone Robin**
***Iodonésyl**
Iodonine
Iodonion
Iodonoses Clin
***Iodonucléol**
***Iodopan**
Iodopeptone

Iodopeptyl

Iodophosfer Duplex
Iodoplasme
Iodoplume
***Iodorganine Mercier**
Iodo Rubidium
Iodoscilline

Iodosédine-Opophos
Iodosigol
Iodosclérol
Iodo-Sodyl Clars
Iodosoufre
Iodosoufryl
***Iodostem**
***Iodosulfène**
***Iodotensyl**
Iodo-Théine Henry
***Iodo-Thyroidine Catil-**
lon
***Iodoveine Leduc**
Iodoveinine
Iodo-Vitasine
Iodoxinol
Iodoxol
***Iodulane**
***Iodurase**
- 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 13, bd de La Chapelle, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 Cody, Brive-la-Gaillarde.
 Lab. du Sodésyl, Vierzon (Cher).
 18-20, rue Vavin, Paris.
 4, pl. Croix-Rousse, Lyon.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 Crozet, à Cannes (A.-M.).
 à Courbevoie (Seine).

 Langeais (Indre-et-Loire).
 Legallo, à Auray (Morbihan).
 14, rue Demarquay, Paris.
 Monal, 13, av. de Ségur, Paris.
 72, av. Kléber, Paris (XVI^e).
 48, rue d'Alésia, Paris.
 37, rue Galilée, Paris.
 12, rue de Polssy, Paris.
 34, rue Saint-Lazare, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 9, rue Victor-Letalle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 9, rue de la Platière, Lyon.
 15, rue de l'Hôtel-de-Ville,
 Paris.
 Detaunay 119 bis, r. Victor-
 Hugo, Tours.
 Dreyer-Dufer, Nogent-s.-Marne.
 85, rue des Morillons, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris.
 41, route de Turin, Nice.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 55, av. des Écoles, Cachan
 (Seine).
 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e).
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 30, r. de Sète, Longuyon (M. et M.).
 18, rue St-Sulpice, Paris.
 20, r. Pré-St-Gervais, Paris.
 1, place L.-Herr, Paris.
 20-22, r. de la République, Lyon.
 22, r. de la Sorbonne, Paris (V^e).
 16, bd Pereire, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège.

 3, bd Saint-Martin, Paris.
 152, Côte Pavée, Toulouse.
 152, Côte Pavée, Toulouse.
 H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 8, passage Morel, Montrouge.
 48, bd des Batignolles, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.

***Iodure d'Amidon]**
***Iodures Cros**

Iodures Domergue
 Iodure de fer
 Iodures Foucher
 Iodures Laroze
 Iodure Philippe

***Iodures Pachaut**
Iodures Souffron

***Ioglott**
Iogol

***Ioguine Delba**

Iolase Corbière
 Ionisalt
 Ionoïdes

***Ionyl**
Iophénal

***Io-Salyl**
Iosorbine

***Ipalcal**

Ipéca digitale Dausse

***Ipecopan**

***Irénine Gonnou**

Irol Churchill

Irovarine Tisy

Irracalcasse

Irracalosyl

Irradiol

***Irrastérine Byla**

Isalaxine

***Iscautoxène gr.**

Isobromyl

Isocollium

***Isogev**

Isoluol

***Isonal**

Isoptal

***Isorgane**

Isorhinol

***Iso-Sels**

***Isotanin**

Isotonine

***Isotonyl Bouret (Pou-
 dre de Lausanne)**

Ispaghul

Ivula Pearson

Ixide A et B

***Ixium**

Lumière, 45, rue Villon, Lyon
 202 bis, av. Jean-Jaurès, Clamart.

20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.

64, r. La Rochefoucauld, Paris.

19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.

2, rue des Lions, Paris.

3, rue de la Quarantaine, Lyon.

33, fg Montmartre, Paris.

98, rue de Sèvres, Paris.

2, rue Michelet, Alger.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

Lab. Delcambre, Issoudun
 (Indre).

27, rue Desrenaudes, Paris.

199, bd Bineau, Neuilly-sur-S.

13, rue Pavée, Paris.

La Biomarine, Dieppe (S.-Inf.).

12, r. du Téléphone, Bruxelles.

1, r. des Cordouans, La Rochelle.

16, r. Ficatier, Courbevoie.

6, av. des D^{rs}-Foix, Salles-de-
 Béarn (B.-P.).

4, rue Aubriot, Paris (IV^e).

20, rue Vernier, Paris.

14, rue Victor-Hugo, Lyon.

92, av. de St-Mandé, Paris.

95, r. de Turenne, Paris.

7, rue St-Isaure, Paris.

43, rue de Lancry, Paris.

19, r. du Bailly, La Plaine-St-
 Denis.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).

Eon, à Dinan (Côtes-du-Nord).

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

62, av. Champs-Élysées, Paris.

26, rue Chaptal, Paris (IX^e).

1, pl. Victor-Hugo, Paris.

89, r. du Cherche-Midi, Paris.

2, r. des Lombards, Paris.

(Voir : Opothérapie Lauriat)

90, r. Saint-Martin, Étampes.

8, r. Aumont-Thiéville, Paris.

2, place des Vosges, Paris.

76, rue des Jacobins, Amiens.

87, rue Lafayette, Paris.

61, av. Philippe-Auguste, Paris.

41, av. Joffre, La Garenne (Seine).

89, rue Michelet, Alger.

94 rue de Sèvres, Paris.

J

- *Jabosulfène
 Jacopol
 Jamax
 Jarsod
 *J. B. 5 Bellas
 *Jécobiasse
 *Jécoboldine
 Jécocarbène
 Jécofluy
 *Jécol (cachets et gtttes)
 *Jécolaxine
 *Jécopeptol
 Jécordine
 Jécorsan Fornet

 *Jécosédyl
 Jéjunine
 *Jemalt Wander
 Jennol
 Jicémine
 Jodal
 Jouvamélys

 Jovanyl
 Jouvein B
 Jovine Brisson
 Juglamarine
 *Jugland Gmet
 Juglandine Ferrouillat
 *Juglane
 *Juglanrégine André
 Juniodyl
 Juniophos
 Junovarine
 Juraissin Macon

 *Juranol
 Jus de myrtille pure
 Jus de pomme « Le
 Suc Normand »
 Jus de raisins Chal-
 land
 Jus de raisins Fructu-
 val

 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 43, rue de Lancry, Paris.
 45, rue Cambronne, Paris.
 50, av. de Normandie, Colombes.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 R. Pionneau, Vayres (Gironde).
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 id.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 3, rue Watteau, Courbevoie.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 89, rue Martre, Clichy (Seine).
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Inst. de Microbiologie, à Sar-
 rebruck.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 42, av. de Breteuil, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-M.
 5, r. E.-Combes, St-Etienne.
 304, r. Saint-Jacques, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (II^e).
 place Hôtel-de-Ville, Salon-de-
 Provence.
 1, place L.-Herr, Paris.
 6, rue Berblsey, Dijon.
 157, rue Champlonnet, Paris.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 33, rue Daguerré, Paris.
 C. Cons, Chambéry (Savoie).
 58-60, rue des Moulins, Valence.
 21, rue des Roses, Dijon.
 Joué-les-Tours (I.-et-L.).
 H. Dubois, Tours (I.-et-L.).
 Établ. Œnologiques de Bour-
 gogne, Mâcon (S.-et-Loire).
 5, bd du Montparnasse, Paris.
 H. Chartier, Saumur (M.-et-L.).
 id.
 Nuits-St-Georges (C.-d'Or).
 Lab. du Contat Viticole, Avi-
 gnon (Vaucluse).

- Jus de raisins Pampryl** 149, r. du Port-de-Bercy, Paris.
***Jus de raisin quotidien** H. Chartier, Saumur (M.-et-L.).
Jus intégral de Pommes fraîches « Dallery » 75, av. Victor-Hugo, Fresnay-sur-Sarthe (Sarthe).
Juvantol 23, rue Beautreillis, Paris.
Juvenex 27, rue des Batignolles, Paris.
Juvénostyl 23, bd Raymond-Poincaré, Bar-le-Duc.
Juvéol 17, rue Cadet, Paris.
Juvigor Nuits-St-Georges (Côte-d'Or).

K

- Kalastyl**
Kalefluid
Kalmangor
- Kalm-Asthmine**
Kalmidor
Kalmine
Kalmigraine
- *Kalmobrol**
Kalmogastrol
Kamara C. 47
***Kaneuron**
***Kaobrol**
***Kao-Carbo**
***Kaolinase**
***Kaolinase Belladonée**
Kaolin Géo
Kaolovules
Kaomag
Kao-Pepsol
Karstabyl
- *Katox-Intra**
***Kaviase**
Kéfir Nutricia
***Kéfirogène**
***Kélédol**
Kélène
Kélenol
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 137, fg St-Antoine, Paris.
 Faure & Lagente, Montargis.
 Métadier, à Tours.
 Meunier, rue du Commerce, Montmarault (Allier).
 (Voir : Calmibro-Niel.)
 132, av. Victor-Hugo, Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 52, rue de Cambrai, Lille.
 54, r. Paris, Charenton (Seine).
 8, rue St-Martin, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 id.
 20, cours Morand, Lyon.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 Huyghe, Brazey-en-Plaine.
 43, rue de Lancry, Paris.
 Lab. Occitan, Auterive (Haute-Garonne).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 22, r. Lalande, Paris (XIV^e).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 5, r. du Capitaine-Scott, Paris.
 114, rue Solférino, Lille.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 11, r. La Fayette, Paris.

Kéluryl	12-14, rue Féry, Reims.
Kénapirine Chanteaud	Chambourcy (S.-et-O.).
*Kénol	4, r. Richer, Paris.
Képhaline Brunot	10, pl. Thiers, Le Mans.
*Képhedryl	1, rue Auber, Paris.
*Keralax	id.
Kéraphiline	102, r. de Gerland, Lyon.
*Kérasalicyl	36, quai Fulchiron, Lyon.
Kéraspirine	id.
Kératolyne	Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
Kératoplastol	L. Dordin, Harnes (P.-de-C.)
Kerlactine	1, rue Lassalle, Lyon.
Ketophan	6, r. rue Cigognes, Strasbourg.
*Kidoline	1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris.
*Kidophédrine	id.
Kina-Coca-Kola	12-14, rue Féry, Reims.
Kina Elzévir	Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
*Kinaldyne	2, pl. de la Salamandre, Nîmes.
Kinébyl	24, bd J.-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
*Kinéchol	29, r. des Marchands, Avignon.
*Kinectine	12, r. du Chemin-Vert, Ville-neuve-la-Garenne.
Kinégastrine	Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
Kineurine Moncour	49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
Kinoram	H. Dubois, Tours (I.-et-L.).
Kioféine	53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
Kipsol	64, r. La Rochefoucauld, Paris.
Kiroplast	9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
Kitine	90, rue Saint-Martin, Étampes.
*Kluchol Remeaud	38, av. J.-B. Clement, Boulogne-sur-Seine.
*Kodos	route du Moulleau, Arcachon.
Koddyll	52, rue de Cambrai, Lille (Nord).
Kola Astier	42, r. du D ^r Blanche, Paris.
Kola caféinée	71, rue Sainte-Anne, Paris.
Kola-fer Trouette	61, av. Philippe-Auguste, Paris.
Kola Gmet	27, fg Montmartre, Paris.
*Kola granulée Astier	42, rue du D ^r Blanche, Paris.
Kola granulé Roy	81, bd Suchet, Paris.
Kolaïne	109, rue de Sèvres, Paris.
Kola Midy	67, av. de Wagram, Paris.
*Kola Monavon	14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Kola	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Kola Pausodun	6 bis, r. Campagne-P ^{re} , Paris.
Kola Pichat	5, cours Charlemagne, Lyon.
Kola Roy	81, bd Suchet, Paris.
Kolarsan	45, fg Saint-Denis, Paris.
Kolarsine Pautauberge	10, r. Constantinople, Paris.
*Kola Sthényl	38, rue du Louvre, Paris.
Kolasthène Badel	58-60, rue des Moulins, Valence.
*Kolatinés	75, rue J. Dulud, Neuilly-s.-Seine.
*Koumyl	50, r. Nationale, Lille.

- Kréazone
Kustoderm M. C.
Kydalose
*Kymosine Rogier
Kyprol
Kyralgine
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
1, pl. de la Victoire, Vichy.
49, quai St-Vincent, Lyon.
56, bd Pereire, Paris.
9, av. de la Grande-Armée.
Paris.
11, r. La Fayette, Paris.

L

- *Lab-Lacto-Ferment
Laborol
*Laccodermes Brisson
*Lachésine
Lacodia
*Lacpinine
Lacrenile Meurice
*Lac-Ser
Lacta
Lacta-Calcium
*Lactacyd
*Lactagol
Lactalvose
*Lactaris
*Lactavinaigre
*Lactéol Boucard (Com-
primés, liquide,
ovules, pansement,
suppos.)
Lactéomaltol
Lactermol Vigier
Lacticholéine Tulivet
*Lactifère
Lactigélose
Lactimase
*Lactiphage
Lactis-Salt
*Lactobacilline
Lactobactyl
Lactobiase
*Lactobyl
*Lactocalcine
- Mialhe, 8, r. Favart, Paris.
Chauvin, Aubenas.
157, r. Championnet, Paris.
2, r. P.-Demours, Paris.
Joué-les-Tours (Indre-et-Loire).
Fisch, Mer Rouge, Mulhouse.
61, av. Louise, Bruxelles.
10, r. de la Barouillère, Paris.
6, rue Berbissey, Dijon.
Calmels, Auterive (Haute-Ga-
ronne).
Lavril, Pacy-sur-Eure.
48, rue d'Alésia, Paris.
3, bd Beaumarchais, Paris.
4, rue Richer, Paris.
34, rue de Trévise, Paris.
30, rue Singer, Paris.
9, rue Rodier, Paris.
12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
52, r. de Poissy, St-Germain-en-
Laye.
54, fg Saint-Honoré, Paris.
Ducloy, Arques (P.-de-C.).
18, av. Hoche, Paris.
3, rue Lamblardie, Paris.
154 bis, rue de Breteuil, Mar-
seille.
r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
22, r. de la Sorbonne, Paris.
83, bd de la Villette, Paris.
25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
12, r. des Petits-Carreaux, Paris.

- *Lactochol**
Lactocoaguline Fabre 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
33, r. de la Haie-Coq, Aubervilliers.
- Lacto-Diastal 45, fg Saint-Denis, Paris.
Lacto-ferment Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Lactofermentine Thévenot, r. des Roses, Dijon.
Lactoflavine (Vit. B²) 10, rue Crillon, Paris.
Lactogélose Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
- *Lactolaxine Fydau** 4, r. de La Motte-Picquet, Paris.
Lactoler H. Perrin, 55, r. Auguste-Comte, Lyon.
- Lactoma 12, bd Saint-Martin, Paris.
Lacto-Magnésie Vita 27, rue Desrenaudes, Paris.
Lactomorrhuel 5, rue Danton, Paris.
Lactophéine Cachat, Évian-les-Bains (H.-S.).
Lactophorine 9, r. de la Gare, Levallois-Perret.
- *Lactoprotéide** 54, r. Fg-St-Honoré, Paris.
Lactormone 26, av. de l'Observatoire, Paris.
Lactorum 50, bd des Batignolles, Paris.
Lactosine 142, r. Fransman, Bruxelles.
- Lactoseptyl Legrand 11, pl. Louis-XII, Blois (L.-et-C.).
- *Lacto-Sérum Carrion** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Lacto-Sérum Lavril** Pacy-sur-Eure (Eure), et 26, bd des Batignolles, Paris.
- *Lactosmose** id.
- *Lactosodine** 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
Lactosone 17, rue Cadet, Paris.
Lactyl Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
Lagasse 5, rue François-Ponsard, Paris.
- Lait albumineux Mol- 25, cours Lafayette, Lyon.
lard 15, quai de Bourbon, Paris.
- Lait allégé Dieticus M. Panier, Malo-les-Bains.
- *Laitancyl** 199 bis, bd St-Germain, Paris.
- Lait Berna 24, rue de Fécamp, Paris.
- *Lait calcique Zizine** Bonnard (Yonne).
- *Lait Dardelet** 29, r. Singer, Paris.
- Lait de cèdre Sapolan 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.
- *Lait déchloruré Guigoz**
- *Lait de Magnésie Bey-** 12, bd St-Martin, Paris.
tout
- *Lait de magnésie Phil-** O. C. P., 108, r. de Picpus, Paris.
lips 29, rue Singer, Paris.
- Lait de Sapolan id.
- Lait de Soufre Sapolan
- Lait Gallia Ch. Ger- 11, rue de Prony, Paris.
vais 4, rue Roussel, Paris (XVII^e).
- Lait Gloria
- *Laits Guigoz : en pou-** 2 et 4, rue Catulle-Mendès, Paris.
dre, dextrosé, malté,
déchloruré
- Lait déchloruré Mo- 25, cours Lafayette, Lyon (VI^e).
lard 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.
- *Lait en poudre Guigoz**

- *Lait en poudre Nesto-
 gène
 Lait entier acidifié en
 poudre Pelargon
 Lait Molard au Calcia
 Lait Molard aux aman-
 des
 *Lait Mont-Blanc
 Lait Ofco
 *Laits Carrion
 Lait sec Lo-lo
 Lait sec Nutricia
 Lait Sekle
 Laits Nutricia
 *Lambarène
 Lanatine
 *Lanceryl
 Lanières aseptiques
 Astruc
 *Lansoyl

 *Lantol
 Largocol Gef
 *Laristine Roche
 Larocalne
 *Larosane Roche
 *Laroscobine
 Laryngol Reys

 Laryngolan
 *Lasal
 Lasto-bande du Prati-
 cien
 *Laurenol
 Lavement mucobary-
 tiné
 Lax
 Laxafégine
 Laxaflor
 Laxagarine
 Laxalates
 Laxalbine
 *Laxamalt
 Laxamer Lefèvre
 Laxapoudre Fleury
 *Laxaseptol
 Laxatif Baillet
 Laxatif Blancher
 Laxatif Châtel-Guyon
 Gubler
 Laxatif Coprex
 Laxatif Fluol
 *Laxatifs Miraton
 Laxatine Mory
 Laxatol
 Laxatone Déjardin
- 6, av. César-Caire, Paris.
 6, av. César-Caire, Paris.
 25, cours Lafayette, Lyon.

 Id.
 Romilly (Haute-Savoie).
 25, av. Michelet, Saint-Ouen.
 5, r. du Capitaine-Scott, Paris.
 123, rue de Paris, Saint-Denis.
 1, bd Saint-Martin, Paris.
 51, rue Rennequin, Paris.
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 5 bis, rue de Berri, Paris.
 (Voir : Digi-Lanatine.)
 13, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.

 5, Grande-Rue, Montpellier.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne
 (Seine).
 18, av. Hoche, Paris.
 269, rue Judaïque, Bordeaux.
 10, rue Crillon, Paris.
 Id.
 Id.
 Id.
 21, r. de la Gare, La Broque
 (B.-Rh.).
 24, rue Jardel, Bordeaux.
 348, rue Saint-Honoré, Paris.

 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 19, rue Drouot, Paris.

 145, r. Yves-Le-Coz, Versailles.
 19, av. Secrétan, Paris.
 74, rue Lourmel, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières.
 84, fg du Temple, Paris.
 80, fg St-Denis, Paris.
 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
 52, rue Decamps, Paris.
 Battut, à Valan (Indre).
 pl. Maréchal-Pétain, Béthune.
 14, rue Demarquay, Paris.
 Vichy (Allier).

 70, rue Legendre, Paris.
 120, rue Lecourbe, Paris.
 43, av. Kléber, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 Sauba, Montreuil.
 10, r. Parent-de-Rosan, Paris

- Laxaul**
Laxaval
***Lax-Hormone « Lipo »**
Laxia Dannec'h
Laximanne
***Laxior**
***Laxiris**
Laxocholéine Tulivet
***Laxofco**
Laxogélose Tulivet
Laxoil
Laxol Fraudin
Laxo-lin
***Laxopeptine Girard**
Laxophényl
***Laxo-Psyllium**
Laxor
Laxorange Connat
***Laxo-Thiorine**
Lebnol
***Léciflétone**
Lécithine Adrian
Lécithine Clin
Lécithine Colloïdale
***Lécithine Vacheron**
Lécithine Vial
Lécithocéril
Leiomormone
***Lemonai**
***Lénadryl**
***Lénibar (granulé pou-**
dre)
Lenicade Brisson
Lénicure-Vichy
***Lénientol**
***Lenifédrine**
***Léniforme**
Lénigastre
***Lenior Bonnet**
***Léniserum**
Lenit-Gum
Léophani
***Léotamine**
***Leptab**
Leptandrine Royer
***Leptol**
***Léthalgol**
***Leucagine**
Leucobules Gallier
Leucogénase
Leucolyse
- pl. Guillaume-le-Conquérant, à
 laise (Calvados).
 Brèdeil, Lavelanet (Ariège).
 2, pl. des Vosges, Paris.
 64, rue des Tournelles, Paris.
 7, rue de la République, Puteaux.
 8-10, rue Masséna, Nice.
 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.
 25, avenue Michelet, Saint-
 Ouen (Seine).
 52, r. de Poissy, St Germain-en-
 Laye.
 74, rue Monge, Paris.
 4, av. Desfeux, Boulogne-s.-S.
 182, av. de Versailles, Paris.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 Thomas, Eurville (Hte-Marne).
 Landon, Châtel-Guyon.
 19, av. d'Orléans, Paris.
 M. Folliet, Rumilly (Hte-S.).
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 23, rue de Douai, Lille.
 234, rue des Pyrénées, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 8, rue La Fayette, Paris.
 14, r. Victor-Hugo, Lyon.
 8, rue Vivienne, Paris.
 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 Fréchin, Lure (Haute-Saône).
 Labor. Lugocalcion, Oullins
 (Rhône)
 Drouet & Plet, Rueil-Malmaison,
 (S.-et-O.)
 157, r. Championnet, Paris.
 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
 27, rue Brézin, Paris (XIV^e).
 26, rue Pétreille, Paris.
 id.
 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
 5, r. E.-Combes, St-Étienne.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-Seine.
 95, rue Michelet, Alger.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 56, rue Beaubourg, Paris.
 223, rue Saint-Martin, Paris.
 333, rue de Vaugirard, Paris.
 32, rue Assalit, Nice (A.-M.).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 1 bis, pl. du Président-Mi-
 thouard.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 32, rue de l'Ouest, Paris.

- Leucosérol**
Levaine
***Levulinyl**
Levurase

Levure B. 17
Levure Boss
Levure Coirre
Levure de bière
Levure Déjardin
Levure fraîche Mycéta
Levure Mycéta en comprimés
Levure Vitæ d'Irwing
Levure Zymaculine
***Levurine extractive**
Lévrine brute
Levuritin
Lévuromaltine Dejardin
Libérase
Libérine
Licardet Brisson
***Lichénose**
Ligatures chirurgicales
Likan Asiatique
Limital
Limmerol
Limnéol

***Limol Churchill**
***Limonade Godfrin**

Limonade hypotensive
Pachaut
Linadeline
Linicaïne

Liniderme
Liniment Bertran
Lin Tarin
Lipasonol
***Lipaurol**

Lipex
***Lipicdol Lafay**
***Lipiodol « F »**
Lipobil
Lipo-Bismuth Ercé
***Lipocérébrine**
Lipochol Byla
***Lipocrinyl**
Lipocytol Grémy
Lipodoterpénol Zyma
Lipoféine
- 50, rue Nationale, Lille. ∇
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 3, rue de Vouillé, Paris (XV^e).
 Charmaison, av. de Royat, Charmalières (P.-de-Dôme).
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 G. César & B. Boss, Besançon.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 Adrian, 9, r. de la Perle, Paris.
 10, r. Parent-de-Rozan, Paris.
 34, rue Vignon, Paris (IX^e).

 92, rue Bobillot, Paris.
 Palc, Mussigny (Côte-d'Or).
 92, rue Bobillot, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 id.
 Feigel, Lutterbach (H.-Rhin).
 Dejardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris.
 35, av. de Versailles, Paris.
 Rion-des-Landes.
 157, rue Championnet, Paris.
 Ducloy & C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 Optima, 78, Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
 11 ter, av. de Ségur, Paris.
 12, rue de Strasbourg, Paris.
 12, pl. Renoux, Clermont-Ferrand (P.-de-D.).
 92, av. de St-Mandé, Paris.
 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne.

 33, fg Montmartre, Paris.
 151 bis, Gde-Rue, Villemonble.
 H. Perrin, 55, rue Auguste-Comte, Lyon.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 Nomexy (Vosges).
 6, rue Dombasle, Paris.
 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois-Perret.
 41, av. Joffre, La Garenne.
 22, rue du Landy, Saint-Ouen.
 id.
 29, pl. Wilson, à Denain.
 1, av. de Villars, Paris.
 52, r. Labruyère, Paris (IX^e).
 26, av. Observatoire, Paris.
 154, av. Malakoff, Paris.
 14, rue de Clichy, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- Lipogazes dermatologiques**
Lipogyre Ciba
- *Lipolodine Ciba**
 Lipol
- *Lipolysine Martinet**
- *Liposeptine**
- *Liposeptol**
- *Liposplénine du D^r Groc**
 Lipo-Vaccins
- *Lipovita**
 Liqueur Bouty
 Liqueur de l'Étoile an-
 tialsthmatique
 Liqueur d'Hermès
 Liqueur Laprade
 Liqueur Laville
 Liqueur peptophospho-
 rique
 Liqueur de Pittermont
 Liqueur sédative Ba-
 coq
 Liqueur Thyro
 Liqueur végétale Narud
 Liq. organiques inject.
 Liqueur dépurative
 Vêrandy
- *Liquidix**
 Liquoïde
 Liseronine
 Listérine
- Listose Vicario**
- *Lita**
 Litharsyne Ferré
 Lithiné Henry
 Lithinés Magnésiés
 Maxim
- *Livartil**
- *Liverdase**
- *Lobéliane Laleuf**
- *Lobéline Bruneau**
- *Lobeline Sandoz**
 Lobuline
 Localibut
 Lofodol
- *Logaphos**
- *Loraga**
 Lortocarbol
- *Lotion Blanche R. P.**
 Lotion végétale Pachaut
- *Lotion Py**
- Lecoq & Ferrand, 14, r. A.-
 Briand, Levallois.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
- id.
 34, pl. Alex.-Dumas, Lille.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 id.
 14, rue des Minimes, Paris.
 32, rue de Vouillé, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 49, r. de Maubeuge, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- 9, rue de la Perle, Paris.
 2, rue de Paris, à Douai.
- 10-12, bd de la Villette.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 38, r. N.-D.-Nazareth, Paris.
 Bouty, 3, r. Dunkerque, Paris.
- Laurens, Aix-en-Provence.
 Delaprée, Mortagne (Vendée).
 10, rue Crillon, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 7, rue Lucien-Jaennin, La Ga-
 renne-Colombes.
 17, bd Haussmann, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 39, r. de Sclessin, Liège.
- 6, pl. de l'Académie, Angers.
 86, r. du Pas-St-Georges, Bor-
 deaux.
 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 17, rue de Berri, Paris
 20, rue Vernier, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 (Voir : *Nonalibut local*.)
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 9, av. Jean-Jaurès, Lyon.
 13, rue Pagès, Suresnes.
 86, bd Port-Royal, Paris.
 La Roche-Posay (Vienne).
 33, fg Montmartre, Paris.
 58, bd Richard-Wallace, Pu-
 teaux (Seine).

***Lotusédine**

Lual

Luarsyl

***Lubrigel**

Lubrilax

***Lubrokall**

Luchon

Lucimarine

Lucinine

Lucodal

Lucosalgue

***Ludin**

Luérol

***Lugocalcion**

Lusitol

***Lusoforme**

Luteovar

Lutocycline**Lutogyl**

Lux-Gaillac

Luxiber

Lycétol Vicario

Lyciflore

Lycobile

Lyméogène

Lymphactol

***Lymphiode**

Lymphosclérol

Lynévol

Lynoléol

Lysacrème L. M. L.**Lysamide*****Lysapyrine*****Lysarthrol*****Lysaxins L. M. L.**

Lysidinal

Lyso-Choc

***Lysococcine**

Lysol

Lysolats

Lysomol

***Lysosclérol**

Lysurol

***Lyxanthine Astier**

86, r. du Pas-St-Georges, Bordeaux.

Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
id.

33, bd Dubouchage, Nice.

8, rue Fleury, Lyon-Oullins.

19, rue Drouot, Paris.

C¹⁶ l'ermière de Luchon (Hte-G.).

154 bis, r. Breteuil, Marseille.

88, rue Duhesme, Paris.

2, quai Paul-Bert, Tours.

10-12, r. Guynemer, St-Mandé.

Rey, 12, r. Montmartre, Dijon.

37, rue Pajol, Paris.

Oullins (Rhône).

7, passage Thionville, Paris.

15, rue d'Argenteuil, Paris.

12, bd St-Martin, Paris.

103-117, bd Part-Dieu, Lyon.

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

av. du Mar.-Foch, Gaillac (Tarn).

12, Gde-Rue, Évreux (Eure).

17, bd Haussmann, Paris.

11, r. des 2-Ponts, Paris.

11, rue de Clichy, Paris.

26, rue Cambon, Paris.

4 bis, rue de Lyon, Paris.

16, rue du Petit-Musc, Paris.

72, r. St-Dominique, Paris.

112, rue des Pyrénées, Paris.

Monge, Pharm., Oullins (Rhône).

1, av. de Villars, Paris.

Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne.

Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne.

12, bd Saint-Martin, Paris.

1, av. de Villars, Paris.

Bedell, Lavelanet, Ariège.

20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.

79, r. de Paris, St-Denis (Seine).

65, r. Parmentier, Ivry (Seine).

65, rue Parmentier, Ivry.

Hendrix, Anvers (Belgique).

Laffort, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).

112, rue de Gerland, Lyon.

42, rue du D^r-Blanche, Paris.

M

- Ma-Bis-Cal** (voir Crème de bismuth chloromagnésienne).
Maganéol 5, rue d'Angoulême, Paris.
Magbi Le Blosset, Moulin-s.-Yèvre (Cher).
 61, rue de Seine, Paris.
 ***Magbromyl** 10, r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
 ***Magécarine** 15, r. St-Maurice, Nanterre.
 ***Magiodyl** 10, r. J.-Hachette, Ivry-s.-Seine.
Magistère de Bismuth 2, bd Pershing, Paris.
Maglose 178, rue Montmartre, Paris.
Magnacalcine 103, r. Saint-Lazare, Paris.
Magnebyl 126, rue de la Pompe, Paris.
Magnécal 54, rue des Fcs-Bourgeois, Paris.
Magnéclo 16, rue du Petit-Musc, Paris.
Magnécythine DrTissot 34, bd de Clichy, Paris.
 ***Magnélax** 23, av. de Marlioz, Aix-les-Bains.
Magnésia Régnier 75, rue Grande, Fontainebleau.
 ***Magnésie Dechosal** 39, r. R.-Salengro, Bondy (Seine).
Magnésie Drouet 37, r. de Marly, Rueil (S.-et-O.).
Magnésie Durel 7, bd Denain, Paris.
Magnésie Dr Gustin 157, r. Championnet, Paris.
Magnésie hydratée Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).
 ***Magnésie Lancosme** 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
Magnésie Roger's 103, rue St-Lazare, Paris.
Magnésie Roy 81, bd Suchet, Paris.
Magnésie San Pellegrino 78, bd Beaumarchais, Paris.
Magnésio - Cacodyline 86, rue Michel-Ange, Paris.
Magnésiode 20, pl. de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine).
Magnésion 27, r. Poids-de-la-Farine, Marseille.
Magnésium chloruré 107, av. de la Reine, Boulogne-sur-Seine.
Magnésium Grorichard 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 ***Magnésium Hardy**
 (Sirop et Tablettes-Bouillon) 42, bd Saint-Marcel, Paris.

- *Magnésium Rosso
Magnésol
- *Magnésio-tubes Robinet
- *Magnésiovules
Magnétol
- Magnidia
- Magnogène
- Magnolax
- *Magnoxol
- *Magol Churchill
- *Magsalyl
- *Maïas Fouchère
- *Maisleriasé
Maisleriasé F.
- *Maisleriasé P. M.
- Maisleriasé vétérinaire
- *Maïzena
- Malarsan
- Maltase Fanta
- Malt Barley
- Malt des Nurses
- *Maltea Moser
- *Malt Ethel
- *Malt français Déjardin
(extrait)
- Maltine Gerbay
- Malt Kneipp
- Maltine-Phénix
- Malt Moritz
- *Maltogil
- Malt-Oléol
- *Maltosan
- *Maltose -- Dextrine
Nestlé
- *Maltosine Déjardin
- Malt Régina
- *Malt Wander
- Malzémose
- Mamelle Endocrisines
Fournier
- Mameline Meurice
- Mammol
- *Manacine
- Mancobène
- *Mandelium
- *Mandocarbène
- Mandragol
- *Mangaine
- Manganèse Axos
- *Manganésia
- Manganifer
- 3, rue Labillardie, Paris.
- 37, rue Galilée, Paris.
- Moret-sur-Loing (S.-et-M.).
- 16, rue du Petit-Musc, Paris.
- 58, r. de Maubeuge, Paris.
- 17, rue du Midi, Vincennes.
- 13, av. de Ségur, Paris.
- 87, av. Borriglione, Nice.
- 74, rue de la Fère, St-Quentin.
- 92, av. de St-Mandé, Paris.
- 10 r. J.-Hachette, Ivry (Seine).
- Rive-de-Gier (Loire).
- 143, r. d'Alésia, Paris.
- Id.
- Id.
- Id.
- 29, rue de Berri, Paris.
- 62, rue Erlanger, Paris.
- 77, av. A.-Briand, Montrouge.
- Id.
- à Bourg-la-Reine.
- 8, ch. de Montbrillant, Lyon.
- 132, r. du Fg-St-Denis, Paris.
- 10, r. Parent-de-Rosan, Paris.
- à Roanne (Loire).
- Juvisy-sur-Orge (S.-et-O.).
- Mauchant, Gennevilliers (Seine).
- 189, rue de Vaugirard, Paris.
- Progil, 10, quai de Serin, Lyon,
- et Ris-Orangis (S.-et-O.).
- 12, bd St-Martin, Paris.
- Wander, Champigny-s.-Marne.
- 6, avenue César-Caire, Paris.
- 10, rue Parent-de-Rosan, Paris.
- 10, rue Pajol, Paris.
- Wander, Champigny-s.-Marne.
- 18, r. de Ménilmontant, Paris.
- 7, rue Biscornet, Paris.
- 61, av. Louise, Bruxelles.
- 8, passage Morel, Montrouge
(Seine).
- 83, bd de la Villette, Paris.
- 32, rue de l'Ouest, Paris.
- 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- 89, rue Martre, Clichy (Seine).
- 113, bd Voltaire, Paris.
- 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- 3, rue Sarrette, Paris.
- 64, r. des Tournelles, Paris.
- 9, r. de la Gare, Levallois.

- Mangano-Calciqne**
Mangano-Fer Henry
Manganonuclyl
***Mangano Phosphal Ju-**
lien
Mangaphos
Mangarsenio
Manglynol Ducatte
Mangratinés
Maniodhamamélie
Mannitine
Marabout
Marcynase
***Marinol**
Marlode
Marisine
Marnai
Marramélis
Marron d'Inde Dausse
Marronine
***Marrubène**
***Marrubiasé**

***Marrucol**
1 Marruséra
Marsyle Clia
***Marubor**
Masbi
Masglandoi

***Maté Douglas**
Matéine Dufert
Matico de Grimault
Maya Bulgare
Médicament de Saint-
Boes
***Medicoferment**
Mégathion
Mélange Anesthésique
Adrian
Mélange Anesthésique
de Schleich
Mélange Balsamique
de Schleich
Mellolaxine
***Ménacrine**
***Ménobiol**

Menopansine
***Menosedine**
***Ménovarine**
***Mensalgine**
***Mensival**
- à St-Amand-Montrond (Cher)
36, rue de Sclessin, Liège.
Delaunay, 119 bis, rue Victor-
Hugo, Tours.
105, rue de Rennes, Paris.
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
D^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.).
31, r. Francs-Bourgeois, Paris
163, r. de Flandre, Paris.
55, r. de Chabrol, Paris.
62, r. Carnot, Vernon (Eure).
6, rue Trencavel, Béziers.
11, r. Antoine-Bourdelle, Paris.
« La Blomarine », Dieppe (S.-I.).
14, r. des Pyramides, Paris.
15, r. de l'Hôtel-de-Ville, Brive.
8, rue Riblette, Paris.
2, allées de Chelles, Le Raincy.
4, rue Aubriot, Paris.
61 bis, r. Corot, Ville-d'Avray.
2, pl. des Vosges, Paris.
60-62, r. St-Guilhem, Montpel-
lier.
69, av. du Maine, Paris.
133, rue Lecourbe, Paris.
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
1, r. d'Arras, Béthune (P.-de-C.).
7, pass. Thionville, Paris.
43-45, r. des Fauvelles, Courbe
voie.
62, Champs-Élysées, Paris.
163, r. de Flandre, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
322, r. Saint-Honoré, Paris.
par Orthez (Basses-Pyrénées).
10, r. de la Viotte, Besançon.
Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
9 et 11, rue de la Perle, Paris.

id.

id.
3, r. Royet, Lyon.
88, rue Duhesme, Paris.
Hatier, 13, pl. du Peuple, St.
Etienne.
9, pl. de la Paix, Mulhouse.
Lab, Demasles, Vienne (Isère).
211, r. de la Convention, Paris.
3, bd Beaumarchais, Paris.
62, r. de la Brauderie, Château-
roux.

- Mensorrhine**
***Mensuosedyl**
***Menthe Mitcham Védé**
Mentholina
Menyant
Méral
***Mercurochrome 220**
***Mercuro-Past**
Mériod
Méroléol Salle
Mésosome
Mésogastrine
***Mésothine Rhemda**
Mésothorium
***Mésothorium Rhemda**
***Métacarbène**
***Métacitrine**
***Métacuprol**
***Métaformine**
Métalase
***Métallophédrine**
Métallosal

Métarapnol
Métarsine Jasma
Métasept
Métasérum
Métaspirine
Métastérol
***Métasulfamide**
Métasulf Vigier
***Méta Titane**
***Métatone**
Métaux colloïdaux
Métaux colloïdaux
Métaux colloïdaux
***Méta Vaccin**
Métharfer Bouty
[Métharsinate Clin
Métharsol Bouty
Méthinol
Méthylarsinates Bouty
[Méthylarsinate Vicario
Méthylarsinate Vigier
Métophan
***Métrex**
Métricine
Métricure (poudre et ovules)
***Metritols**
Métrivore
[Métrostyptal Grori-
chard
***Mexyl**
- 3, r. des Rouairies, Dinan.
 2, r. des Lombards, Paris.
 2 et 4, pl. Gambetta, Paris (XX^e).
 Guignier, Bois-Colombes.
 Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 25, r. St-Augustin, Paris.
 52, r. des 5-Diamants, Paris.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 4, rue Elzévir, Paris.
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 37, av. Jules-Coutant, Ivry-s.-S.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 id.
 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e).
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 252, fg Saint-Martin, Paris.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 149, r. du Palais-Gaillien, Bordeaux.
 50, av. de Normandie, Colombes.
 4, pl. de la Gare, Tunis.
 1, r. de Besançon, Montbéliard.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 P. Métadier, Tours.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 16, route d'Abbeville, Amiens.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Paul Métadier, à Tours.
 348, rue St-Honoré, Paris.
 8, rue des Capucines, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris.
 Paul Métadier, à Tours.
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 39, r. Roger-Salengro, Bondy.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 34, bd Victor-Hugo, Grasse.
 1, av. du Dr-Lannelongue, Paris.
 23, Gde-Rue, Asnières (Seine).
 21, rue de Lyon, Paris.
 127, bd Saint-Michel, Paris.
 14, rue du Temple, Calais.
 12, pl. de la Révolution, Besançon.
 12, rue Henri-Rivière, Le Perreux.

- Meyor**
 ***Micellode**
 Micoforme
 ***Micranyl**
 Microbol
 Microcidal
 ***Microderme**
 ***Microgel**
 ***Microlyse**
 ***Mictasol**
 ***Mictasol Bleu**
 ***Mictasovules**
 ***Mictazine**
 ***Mictophile**
 ***Mictoséda**
 Mictosédine
 ***Mictoseptol**
 Mictosulf

 ***Mictualine**
 Micturyl
 Migrainol
 Milkase

 Mimophédrine
 ***Minéplastine**
 ***Minéraline du D^r Baud**
 Minéralogène
 Minérolaxine
 ***Minervol**
 Mintosal
 ***Minurex**
 ***Miroxyl Lahaye**
 Misalgol
 ***Mistol**
 ***Mitosyl**
 Mixalthyl
 ***Mixiod**
 Mokavène

 ***Molagar**
 Molavose
 ***Molène**

 Molléine
 ***Moréthyl Dausse**
 Morisland
 ***Morrhualène Gautier**
 ***Morrhuéline Jungken**

 ***Morrhuéline Jungken**
 Vitaminée
 Morrhuline Puy
 ***Morrhuel Chapoteaut**
 Morrhuxine
 Morsine
- 12, Grande-Rue, Évreux.
 4, rue Platon, Paris (XV^e).
 Savary, Sallaumines (P.-de-C.).
 Grémy, 14, rue Clichy, Paris.
 55, av. de Montredon, Marseille.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 25, rue du Général-Foy, Paris.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 10, rue Strasbourg, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 id.
 id.
 id.
 45, fg saint-Denis, Paris.
 Faure & Lagente, Montargis.
 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 29, fg de Bourgogne, Orléans.
 47-49, rue du Loing, Montargis.
 Cluzel, 60, c. É.-Zola, Lyon.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 16, cours Gambetta, Lyon.
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, Salon-de-Provence.
 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e).
 22, bd Camelinat, Gennevilliers.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 (Voir : *Artériolex.*)
 87, av. Borriglione, Nice.
 11 bis et 13, rue Levert, Paris.
 Jouffray, Bourgoin (Isère).
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 60, rte de Châtillon, Malakoff.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 61, av. de Saxe, Paris.
 5-7, r. Cl.-Decaen, Paris.
 59, rue Boissière, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 19, rue du Bailly, La Plaine-Saint-Denis.
 13, r. Pagès, Suresnes (Seine).
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 14, rue A.-Briand, Levallois-Perret.
 80, fg St-Denis, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 105, r. de Normandie, Courbevoie (Seine).
 id.
 à Grenoble (Isère).
 8, rue Vivienne, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.

- Moruan**
***Morucalcose**
***Morufine**
Moruphylie
Moruxase concentrée
Mostl
***Mothersill's seasick**
remedy
Mouches Albespeyres
Movebil
***Mucicarbos**
Mucicardine
Mucigénol
***Mucigrains**
Mucilage Goy
***Mucilaxine**
***Mucinum**
***Mucobismuthine**
Mucobyl
Mucolflogose

***Mucofoie**
Mucogène Astier
Mucoléine
***Mucosodine**
***Mucyllium**

Mugrizol Dumesnil
***Multiplast**
Muoléol
Muqueuse Endocrisi-
nes Fournier
***Murones du Dr Robert**
Jacques
Musclanol
Musculargyre
Musculogénol
Musculosine Byla
Mustérole
[Mutandine]
***Muthanol]**
***Muthiode**

Muthoquin^{1]}
***Muxagol**
Muxol
Muxyl
***Mycidol Badel**
Mycolactine
***Mycolysine Doyen**
Mydriasine
Mydriédrine
Mygdal

***Myochrysine**
- 7, rue St-Isaure, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 Bost, Villefranche (Rhône).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.

 5, rue de Provence, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 5, pl. Bisson, Lorient.
 Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
 Mouslet, Chennebrun (Eure).
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
 23, rue Beautreillis, Paris (XIV^e).
 Millet, Rambouillet (S.-et-O.).
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 145, r. Yves-le-Coz, Versailles.
 4, av. M.-Berteaux, Poissy.
 10, r. Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).
 48, rue de la Procession, Paris.
 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
 av. Baraduc, Châtel-Guyon.
 37, r. de la Fédération, Paris.
 Bernard-Garcin, Saint-Saturnin-lès-Avignon (Vaucluse).
 10, rue du Plâtre, Paris.
 3, r. des Reculettes Paris (XIII^e).
 Blanc, Barcelonne-du-Gers (Gers).

 7, rue Biscornet, Paris.
 Silbert Ripert, 30, rue Benedit, Marseille.
 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
 95, r. de Turenne, Paris.
 117, r. V.-Hugo, Houplines (Nord).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 78, rue Dareau, Paris.
 Grémy, 4, r. de Clichy, Paris.
 22, rue de Turin, Paris.
 14, r. Ar.-Briand, Levallois-Perret.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 43, r. de Chartres, Neuilly-s.-S.
 Lab. Servier, à Orléans.
 77, bd de Grenelle, Paris.
 à Valence-sur-Rhône.
 122, r. du Cherche-Midi, Paris.
 5, r. Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 295 bis, rue de la Benaige, Bordeaux.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.

*Myoden (élixir et baume)	37, r. des Lois, Toulouse.
Myodyne Mauchant	Gennevilliers (Seine).
Myonutrose	71, rue Ste-Anne, Paris.
*Myoral	3, rue Saint-Roch, Paris.
*Myosérum	168, bd St-Germain, Paris.
Myosine (forte et faible)	Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
Myosthène	E. Bartier, Armentières (Nord).
Myostyl	168, bd Saint-Germain, Paris.
*Myothermine	47, r. Bokanowski, Asnières.
*Myovarsyl	89, rue Cherche-Midi, Paris.
Myrcol	72, quai Jemmapes, Paris.
Myrrhina	38, rue du Louvre, Paris (1 ^{er}).
Myrtanol	19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
Myrtille pure	Chartier, Saumur (M.-et-L.).
Myrtilline	Lab. Demasles, Vienne (Isère).
*Myrtine	194, rue de Rivoli, Paris.
Myrtoline	9, pl. Municipale, Tulle.

N

Nader	6, rue de l'École, Versailles.
Nadolor	191, fg Saint-Antoine, Paris.
*Naïodine Logeais A et B	71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
*Naïodine Suractivée A et B	71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux.
Naphtocarbène	83, bd de la Villette, Paris.
Naphtolargol	3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
Narcotile Bengué	16, rue Ballu, Paris.
Narcyl	34, rue Sedaine, Paris.
Narizol	23, rue Beautreillis, Paris.
Narkène	Mauchant, Gennevilliers (Seine).
Nasale Ymera	28, rue de Seine, Paris.
Nasargine	171, r. de Belleville, Paris.
*Nasobore	Lab. Lugocalcion, Lyon-Oullins.
Nasocaine	Lab. Aninat, Nîmes (Gard).
Nasogyne	37, rue des Lois, Toulouse.
Nasolène	42, r. du Mont-Cenis, Paris.
*Nasophédrine Béral	194, rue de Rivoli, Paris.
Nasopon	1, pl. Sainte-Anne, Lyon.
Nasosulfolarsan	Domergue, Agen (L.-et-G.).
Nasyllum Blondin	18, rue Maréchal-Foch, Versailles.

***Natibaine Nativelle**

Natirose

Natrochol

***Natrosyl**

Natura

Navidrine

Naza-Capsules

Nazilante

Naziline

Nazogyne

Nazoil

Nazophyl Darva

Néalgyl Bottu**Néatol**

Nécessaire d'Accouchement

***Néfitol**

Neigotan

Nénita

Néoarsite

Néo-Arsycodile

Néo-Asclérol

Neobiline**Néo-Bioélixir*****Néo-Biol*****Néoboldine**

Néoby

Néo-Cador

***Néo-Calculine**

Néo-Carbonate Magnésie

***Néocardyl**

Néocedine

Néo-chloral Nau

Néo-Coccyll**Néo-Codion*****Néo-Collargol*****Neocortine*****Néo-Crinol**

Néodermine

Néo-Dispositif Ravaut

Néo-Dmégon**Néo-Dmétys**

Néo-Emétinol

Néo-Ferments du Dr Wolf

Néo-Feroxal

Néofilhos le Perdril

Néo-Galyl

Néoglobuline**Néo-Granulé Dr Chur-chill*****Néo-Gynergène**

27, rue de la Procession, Paris.

27, rue de la Procession, Paris.

19, r. du Panier, Marseille.

127, bd Saint-Michel, Paris.

10, rue de Strasbourg, Paris.

194, rue de Rivoli, Paris.

29, fg de Bourgogne, Orléans.

Aninat, Nîmes (Gard).

51 33, Grande-Rue, Besançon.

37, rue des Lois, Toulouse.

Lacoste, Caudéran (Gironde).

19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.

62, r. de la Brauderie, Châteauroux.

Lucinia, 154 bis, r. de Breteuil, Marseille.

24, rue de Montessuy, Paris.

48, bd La Tour-Maubourg, Paris.

58, r. de Maubeuge, Paris.

7, rue Galvani, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.

110, av. E.-Vaillant, Boulogne-sur-Seine.

Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).

160, av. d'Italie, Paris.

181, av. V.-Hugo, Clamart (Seine).

9, impasse Thoréton, Paris.

61, av. Philippe-Auguste, Paris.

19, rue Clapeyron, Paris.

21, rue Violet, Paris.

75, r. Grande, Fontainebleau.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

50, av. Jacqueminot, Meudon.

21, Gde-Rue, Argenteuil.

222, bd Péreire, Paris.

47, rue de Bretagne, Paris (III^e).

16, rue du Petit-Musc, Paris.

73, rue Dutot, Paris.

89, rue Martre, Clichy (Seine).

21, rue de Neuilly, Nanterre.

1, av. de Villars, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.
id.

2, rue de Rivoli, Paris.

46, rue des Faures, Bordeaux.

98, rue de Sèvres, Paris.

11, rue Milton, Paris.

Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne (Seine).

84, fg du Temple, Paris (XI^e).

92, av. de Saint-Mandé, Paris.

20, rue Vernier, Paris.

- Néoiacol I. S. M.**
Néo-Iodure Ménard
Néo-Kola Lumière
Néol
Néolactine
***Néo-Laxatif Chapotot**
Néolides H. B.
***Néolyse**
***Néo-Mictazine**
***Néo-Neurosine Prunier**
***Néo-Pancarpine**
Néopansement du Dr Wolf
***Néo-Passiflorine**
***Néophage**
Néophos
***Néo-Physio**
Néo-Pituitairine
***Néoplastex**
***Néopulmine**
Néoquinine Falières
Néoral
***Néo-Révulsif Coulloux**
Néorexine
***Néo-Rhénium du Dr L. Fournier**
Néo-Rhomnol
***Néo-Riodine Astier**
Néosalicylate
Néosalicylate
***Néosaliodé**
***Néo-Salyl (ex Sodisalyne)**
Néosantal
***Néosédyl**
***Néo-Seti**
***Néosolmuth**
Néo-Soufre Inava
Néospasmodyl
Néo-spermine
***Néo-Sphérulines**
Neospiran
***Néosplénine**
Neostomol
***Néosulfa**
***Néosuline Fornet**
Neosyl Doury
***Néothorium Millot**
Néo-Tréparséan
 25, rue Dagorno, Paris.
 3, rue République, Lyon.
 45, rue Villon, Lyon.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 2, r. des Fossés-St-Denis, Boulogne-sur-Seine.
 56, bd Ornano, Paris.
 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
 22, rue de Turin, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 1, quai Aulagnier, Asnières.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 115, r. de Paris, Boulogne-sur-Seine.
 86, rue Michel-Ange, Paris.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (Seine-et-Oise).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 71, fg Saint-Martin, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 295 bis, r. de la Benaugue, Bordeaux.
 116, rue du Pont, Auxerre.
 place Pilorget Saint-Symphorien (Indre-et-Loire).
 82-84, rue de Belleville, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 42, r. Docteur-Blanche, Paris.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège.
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 222, bd Pereire, Paris.
 Fabris, 72, rue Mazenod, Lyon.
 18, bd de Strasbourg, Albi.
 157, rue Championnet, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois.
 14, rue de Normandie, Asnières.
 41, av. Joffre, La Garenne.
 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
 (Voir : *Opothérapie Moncour.*)
 8, rue La Fayette, Paris (IX^e).
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 86, rue de la Réunion, Paris.
 71, rue Saint-Blaise, Paris.
 11, Chaussée de la Muette, Paris.
 Marsac (Creuse).
 177, rue de Courcelles, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.

- *Néo-Trépol
- *Néotrope Aguetant
- Néotrophène
- Néovaryl
- Néovitalyne
- Néoxyl
- *Néphractive
- Néphralbine
- Nephridrainol
- Néphrine Bouty
- Néphrine Byla
- Néphrocrinol
- *Néphrylan
- *Neptal
- *Nergine
- Nervador
- *Nervantyl Miluc
- Nervobiolène
- *Nervocithine Tissot
- Nervosédol
- *Nervyl Rousseau
- *Nesal
- *Néseptol Bengué
- *Nestamine
- *Nestogène
- *Nestosyl
- *Nestrovit
- Neubryne
- *Neuralgic Carron
- Neuranol
- Neuraxial
- Neuraxol
- *Neurène
- *Neuréal
- *Neuréthane
- Neuricure
- Neuridor
- *Neurinase
- Neuristol
- Neurit
- Neurobore
- Neurobrom
- *Neurocalcium
- Neurodonal König
- Neurodose
- *Neuroferyl
- *Neuroflorine
- Neurogaïacol Dethan
- *Neurogalène
- *Neurogastrine
- 22, r. de la Sorbonne, Paris.
- 36, quai Fulchiron, Lyon.
- 31, r. Chemin-de-Fer, Nanterre.
- 6, av. Mirabeau, Nice.
- 28, r. de l'Hôpital-Militaire, Lille.
- 27, rue G.-Tessier, Saint-Étienne.
- 10, r. Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).
- 2, r. Carnot, Melun (S.-et-M.).
- 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 8, passage Morel, Montrouge.
- 6, rue Parrot, Paris.
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- 4, rue Lamartine, Nanterre.
- Lab. des Vosges, La Broque (B.-Rh.).
- L. Ragoucy, 2, r. J.-Bara, Paris.
- 137, Fg Saint-Antoine, Paris.
- 34, bd de Clichy, Paris.
- 109, rue de Sèvres, Paris.
- 4, r. Gambetta, Sens (Yonne).
- 92, rue Bobillot, Paris.
- 16, rue Ballu, Paris (IX^e).
- 18, pl. Laborde, Paris.
- 6, av. César-Caire, Paris.
- 72, r. St-Dominique, Paris (VII^e).
- 10, rue Crillon, Paris (IV^e).
- 78, bd Beaumarchais, Paris.
- Latour, Terrasson (Dordogne).
- Delaunay, 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
- 45, fg St-Denis, Paris.
- Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
- 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- Chambourcy (S.-et-O.).
- 41, rue Emile-Augier, Valence.
- 77, bd de Grenelle, Paris.
- Saubas, Montreuil (Seine).
- 45, r. du Marché, Neuilly (Seine).
- pl. de la Comète, Asnières.
- 11, rue Malher, Paris.
- 23, rue des Moines, Paris.
- 6, r. du Moulin, Charleville.
- 19, av. d'Orléans, Paris.
- Thomas, Chemillé (M.-et-L.).
- 47, rue de Neuilly, Nanterre.
- 37, av. Jean-Jaurès, Aubervilliers.
- 44, rue de Lagny, Montreuil.
- 11, rue A.-de-Neuville, Paris.
- 61, bd Malesherbes, Paris.
- 12, bd St-Michel, Paris (VI^e).

Neurogénol

Neuroiodure Dethan
Neurokabryl

***Neuronal Brothier**

Neuro-Pax

***Neurophoryl**

***Neurophos**

Neurophytol

Neuroplasma

***Neuroplexyl**

Neuropol

Neuormone

Neuroséda

Neurosérine

***Neurosine Prunier**

Neurosol Debreyne

***Neurosolène**

***Neurostabil**

Neurosthéma

***Neurosthénol**

Neurosthyll

Neurotanic

***Neurotensyl**

Neurotonine

Neurotrol Abadie

Neurotrophe

**Neurotrophène (am-
poules)**

Neurotrophol Byla

***Neurovarol Douetteau**

[**Neurovital**

Neurovoïne

***Neuséda**

***Neutracétyl**

***Neutracétyl chocolaté**

Neutracide

Neutralcaol

Neutralisine Bureau

Neutralol

Neutroblyl

Neutropeptine

***Neutroses-Vichy**

Neuvaritol

Névoral

Névralgésine

Névralgine Montsarrat

***Névralgol Brossard**

Névraline Rosey

Névrasite

Névroxol Fréval

**Blosset, Moulins - sur - Yèvre
(Cher).**

11, r. A.-de-Neuville, Paris.

150, r. de Paris, Pantin (Seine).

20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).

19, r. du Bailly, Plaine-St-Denis.

187, rue de Créteil, Maisons-
Alfort (Seine).

11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville,
Cannes.

78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).

16, r. H.-Regnault, Courbevoie.

5 bis, rue Pajou, Paris.

83, bd de la Villette, Paris.

26, av. de l'Observatoire.

149, av. des Minimes, Toulouse.

Jarmon, 4, pl. de la Gare, Tunis.

1, quai Aulagnier, Asnières.

M. Bailleul, Mortagne (Orne).

Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.

Guilbert, bd Demailly, Avion
(Pas-de-Calais).

Cellier, Saint-Uzé (Drôme).

Richard, Aubenas (Ardèche).

4, r. Lamotte-Picquet, Paris.

Grémy, 14, rue Clichy, Paris.

72, bd Davout, Paris (XX^e).

Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.

37, r. Pajol, Paris.

35, rue de Boissonnade, Paris.

26, av. Observatoire, Paris.

20, fg Saint-Honoré, Paris.

7, r. de la République, Puteaux.

Grémy, 14, rue Clichy, Paris.

Lyons, 30, rue Monge, Paris.

25, bd de La Tour-Maubourg,
Paris.

Id.

42, bd St-Marcel, Paris.

Benderitter, Vendôme.

86, bd Port-Royal, Paris.

13-15, r. de la Sablière, Bécon-
les-Bruyères.

71, rue Sainte-Anne, Paris.

15, r. Pasteur, Bourg (Ain).

1 et 3, rue Lafloque, Vichy.

41, av. Joffre, La Garenne (Seine).

95, r. de Turenne, Paris.

Débordes, à Moulins (Allier).

Dourgne (Tarn).

1, r. des Cordouans, La Rochelle.

1, rue de l'Odéon, Paris.

11, r. Joseph-Bara, Paris.

84, r. de Rochechouart, Paris.

- *Névrosan
 Névrosérum
 *Névrosol
 Névrostérol
 *Névrosthénine Freys-
 singe
 *Névrovitamine 4
 Newlax
 Nézol
 Nickobalt
 *Nicobion (Vitamine
 P. P.)
 Nicopyrine
 *Nigérine Vincent
 Nigroformine
 Nipostra
 *Nitium
 Nitracaine
 *Nitrargol
 Nitrophényl
 Nobial
 Noctifen Léo
 Noctisédy
 Noelline (Sirop, Savon)
 Nogryp
 Nopirine Vicario
 *Norgangine
 *Normacol
 *Normaflux
 *Normalax
 *Normatensol Bouret
 *Normogastryl
 *Normosol
 *Normucyl
 Nortal Clin
 Nosol Aguetant
 Notal (comprimés et
 gouttes)
 Notaline
 *Novacétine Prunier
 Novoiodal
 *Novalibut (ex-Halibut)
 *Novalibut Local
 Novalibut Pommade
 Novaline de Montfleury
 *Novamide 109 M
 Novanol
 *Novargyre Guillaumin
 Novarine Vicario
 *Novarsénobenzol Billon
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 8, ruelle St-Antoine, Nancy.
 Mahieu, Lens (Pas-de-Calais).
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 6, rue Abel, Paris.
 11, r. F.-Giraud, Villefranche
 (Rhône).
 Coulaud, Lorris (Loiret).
 Châtelain, Niort (D.-Sèvres).
 12, r. Paul-Baudry, Paris.
 Lematte et Boinot, 52, rue La
 Bruyère, Paris.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (B.-Rhin).
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 51, rue de Paris, Pierrefitte.
 Ferrembach, Kaisersberg (H.-
 Rh.).
 98, rue de Sèvres, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 12, rue du Chemin-Vert, Ville-
 neuve-la-Garenne (Seine).
 4, r. de La Fère, St-Quentin.
 15, rue des Champs, Asnières.
 11, sq. Marie Louise, Bruxelles.
 2-4, r. des Lombards, Paris.
 45, place du Centre, Guingamp.
 Lacoste, Caudéran (Gironde).
 17, bd Haussmann, Paris.
 21, rue de Madrid, Paris.
 id.
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 9, impasse Thoréton, Paris.
 87, rue Lafayette, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 6, r. Adolphe-la-Lyre, Courbe-
 voie.
 45, rue Cambronne, Paris (XV^e).
 20, r. des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 1, q. Aulagnier, Asnières (Seine).
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 348, r. St-Honoré, Paris.
 id.
 (Voir Dermalibut.)
 Zédaire, à Chambéry.
 Mouneyrat, Villeneuve-la-Ga-
 renne.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.

- Novarsénobenzol Cor-**
bière
Novarsénobenzol Ercé
Novarthritol
Novatropine
Novaïodal
***Novhépar**
***Novigol**

Noviode
***Novismuth**
***Novo-Brol**
Novochimosine

***Novocortex**
Novo-Hepatyl
***Novolactol**
***Novolax**
***Novolug**

Novophylline
***Novoplasmine**

Novoptine
Novosedine
Novoseptine

Novoseptol
***Novospasmyl**
***Novotyol**
***Novurit**
Novusang
Nox
***Nuciphos**
Nuclarène Cognet
Nuclarrhol
Nucléarrhol Gabriel
***Nucléarsan**
***Nucléarsitol Robin**
Nucléasine
***Nucléatol Robin**
Nuclécithine
Nucléigène
Nucléigénol

Nucléinovarine
***Nucléocardyl**
Nucléo-fenugrene
Nucléo-fer Girard
Nucléol Hanbro
Nucléophorène
***Nuclergol**
Nuclhémose
***Nujol**
Numal Roche
Nuphos
Nurécase
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
1. av. Villars, Paris.
Darbans, St-Chinian, Hérault.
66, r. de la Pompe, Paris (XVI^e).
45, fg Saint-Denis, Paris.
89, rue Martre, Clichy (Seine).
24. r. de Lesson, Rochefort-s.-
Mer.
237, r. Lafayette, Paris.
30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-S.
Lab. des Vosges, La Broque (B.-
Rhin).
8, passage Morel, Montrouge.
116, av. Berthelot, Vienne.
Diaguin, St-Maur (Seine)
183, rue de Rome, Marseille.
Lab. Lugocalcion, Oullins
(Rhône).
8, rue La Fayette, Paris (IX^e).
7, av des Marronniers, Fontenay
(Seine).
Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
83, bd de la Villette, Paris.
57 bis, av. La Motte-Picquet,
Paris (XV^e).
22, r. de l'Arsenal, Angoulême.
94, bd Lefebvre, Paris (XV^e).
60, rue de Monceau, Paris.
25, bd de la Tr-Maubourg, Paris.
Bedeil, Lavelanet (Ariège).
14, r. Demarquay, Paris.
47, rue Bokanowski, Asnières.
42, rue de Saintonge, Paris.
Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain).
39, rue Sclessin, Liège (Belgique).
45, fg Saint-Denis, Paris.
13, rue de Poissy, Paris.
163, rue de Flandre, Paris.
13, rue de Poissy, Paris.
Collonges-St-Just-s.-L. (Loire).
99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
30, rue St-Jacques, Namur (Bel-
gique).
22, rue Turbigo, Paris.
188, c. de la Somme, Bordeaux.
Furnon, St-Sigolène (Hte-L.).
48, rue d'Alésia, Paris.
1, r. de Châteaudun, Rennes.
40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
37, rue Brochant, Paris.
6, pl. Clichy, Paris.
98, rue de Sèvres, Paris.
10, rue Crillon, Paris.
20, rue Beaubourg, Paris.
Grandval, à Reims,

Nurserine
***Nusyl**
Nutréol
Nutritine Déjardin
Nutrobiase
***Nutromalt**
***Nuxeol**
Nuxiodine
Nuxyl

Nyctal
Nydol

6, c. Joseph-Thierry, Marseille.
 8, rue Favart, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 109, bd Haussmann, Paris.
 10, rue Cimarosa, Paris (XVI^e).
 Wander, Champigny-s.-Marne.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 26, av. des Klauwaerts, Bruxelles.
 15, r. des Petits-Champs, Asnières.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.

O

***Obsor**
Occi-Gourme
***Ocréine Grémy**
***Octensanol**
***Oculase**
Ocytormone
***Odarsol**
Oderma
Odochloraline
Oénole Paludo'uge

***Enophos**
Enoquinol
Enosthène
***Oéréliode**
***Estrobroil Roche**
***Estroglandol Roche**
Olo-Thyroidine
***Okamine simple**
***Okamine cystéinée**
***Okamine (Dragées)**
***Olbia**

***Olcalan**
Olcanfral
***Olegel**
Oléo-Calcium
***Oléochrysine Lumière**
***Oléochrysos Lumière**
***Oléocidase**
Oléodermine Vincent
Oléodine
***Oléoformine Corbière**
Olégarine

8, r. St-Martin, Paris (IV^e).
 Pl. Carnot, Romainville (Seine).
 14, rue de Clichy, Paris.
 4, rue Platon, Paris (XV^e).
 15, rue de Rome, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Gonneville-la-Mallet (S.-Inf.).
 6, rue Berbissey, Dijon.
 Dagniac, St-Sulpice-la-Pointe (Tarn).
 29, pl. Bossuet, Dijon.
 12-14, rue Fery, Reims.
 Mouflet, Chennebrun (Eure).
 Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-O.).
 10, rue Crillon, Paris.
 id.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 13, rue Pavée, Paris.
 id.
 id.
 Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne (Seine).
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
 M. Martin, Cloyes (E.-et-L.).
 3, rue de Vouillé, Paris.
 Maures, Port-de-Besse (L.-et-G.).
 45, rue Villon, Lyon.
 id.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 Pont-à-Celles (Belgique).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 151, rue de Charenton, Paris.

- Oléogazeur
 Oléo-Iode Dubois
 Oléol
 Oléolaxine
 *Oléo-Mel
 *Oléophédrine Béral
 Oléo-Psyllium
 Oléorhinol
 *Oléo-Sanocrysine de Mollgaard
 Oléo-Sérums
 *Oléosodine P. Thibault
 *Oléovules
 Oléthyle Benzyle
 Olévone
 Olfamide
 Olical
 Oliolase Corbière
 *Olipan
 *Oliphédrol
 Oliphédrol BB
 *Oliricyl Hardy
 Olisol éphédriné
 *Olivéol Etiévant
 *Oliviasse Gmet
 Ombiplaste
 Omonos
 *Onction Angelini
 Onctua
 Ondanol
 Ondes courtes
 Onguent Borgia
 *Onguent Fréval
 Onguent Dion
 Onguent Ivula
 Onguent Prunot
 Onguent Pyorrhépha-gine
 *Onogo
 Ophorine
 *Ophtal
 Ophtalmine Leprince
 Ophtalmiso 8
 Ophtalmoforme
 Ophtalmo-vaccin Sa-lantale
 Ophtélium
 *Opobrol
 *Opobyl
 Opo-Calcéofibrose
 *Opocalcium
 *Opocalcium Irradié
 Opocalcyl
 122, fg Saint-Martin, Paris.
 16, bd Pereire, Paris.
 Brun, Demi-Lune, Lyon (Rh.).
 15, rue des Champs, Asnières.
 Delfour, Pouillon (Landes).
 194, rue de Rivoli, Paris.
 36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
 9, impasse Thoréton, Paris.
 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
 Route de Cimiez, Nice.
 48, rue d'Alésia, Paris.
 15, r. Catulienne, St-Denis.
 122, fg Saint-Honoré, Paris.
 25, r. du G^l-Foy, Paris (VIII^e).
 1, rue Nélaton, Puteaux.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
 25, bd Edgar-Quinet, Colombes.
 id.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 Brun, Tassin-Demi-Lune, Lyon.
 27, fg Montmartre, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 61, rue de Seine, Paris.
 25, r. de Bordeaux, l'Arbresle (Rhône).
 Sauba, Montreuil (Seine).
 12, av. du Maine, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 84, rue Rochechouart, Paris.
 31, rue Illzach, Mulhouse.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 61, rue de Seine, Paris.
 Croissy-sur-Seine.
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 13, pl. de la Nation, Paris.
 62, rue de la Tour, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 Dulcis, pl. Clichy, Monte-Carlo.
 42, Grandes Arcades, Stras-bourg.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 C. Le Follet, Nozeroy (Jura).
 15-17, rue de Rome, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 96, rue Orfila, Paris.
 id.
 Calmels, Auterive (Haute-Ga-ronne).

- *Opocérès
- *Opochol
- Opocobalt
- *Opodermyl
- Opodigestif
- *Opo-Dinitra
- *Opoferrine vitaminée
- Opogénines
- *Opogermine
- Opoglandéol Fray
- *Opo-Iodamélis Logeais
- Opolases (Voir : *Opothérapie E. Vergelot*)
- Opolaxyl Corbière
- Opomanganol
- *Opo-Micro
- Opomygdal
- Oponergyl
- Oponuclyl irradié ou simple
- Opopédol
- *Opophos
- Opo-phyto-draineurs
- Opophytol
- *Opo-plasma
- Oporadol
- *Oposclérine Vergelot
- Oposcérum
- *Opo-Signal
- Opositoires opothérapiques Pellissier
- *Oposséine
- *Opostyl
- *Opothérapie Bazin
- *Opothérapie Bouty
- *Opothérapie Byla
- *Opothérapie Carrion
- Opothérapie Chaix
- Opothérapie Chevreton
- *Opothérapie Choay
- *Opothérapie du D^r Fraysse
- Opothérapie du D^r Roussel
- *Opothérapie E. Vergelot
- Opothérapie Fortin
- *Opothérapie Fournier
- Opothérapie Fumouze
- *Opothérapie Iscovesco
- 20, rue de Pétrograd, Paris (VIII^e).
- Tétard, Beauvais (Oise).
- 83, bd de la Villette, Paris.
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 59, rue Boissière, Paris.
- 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
- 96, rue Orfila, Paris.
- 40, rue de Bellechasse, Paris.
- Ledent, Montreuil-s.-Mer (P.-C.).
- Durand, Aigues-Mortes.
- 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
- 163, rue de Flandre, Paris.
- 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Duval, Mézières (Ardennes).
- 6, rue de Babylone, Paris.
- 295 bis, r. de la Bénauge, Bordeaux.
- Opos, Castelnaudary (Aude).
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- 8, passage Morel, Montrouge (Seine).
- 19, rue de Fleurns, Paris.
- 1, rue Raynouard, Paris.
- D^r Testart, Chalais (Char^t^e).
- 19, rue Drouot, Paris.
- 25, rue Vaneau, Paris (VII^e).
- 6, rue de Navarin, Paris.
- D^r Testart, Chalais (Char^t^e).
- 7, av. des Marronniers, Fontenay-sous-Bois.
- 33, av. de Villiers, Paris.
- 33, r. Rempart-Matabiau, Toulouse.
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux.
- 3, rue de Dunkerque, Paris.
- 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- 10, rue Al.-Bertillon, Paris.
- 52, rue La Bruyère, Paris.
- 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- 21, rue de Neuilly, Nanterre (Seine).
- 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- 163, rue de Flandre, Paris.
- 109, rue de Sèvres, Paris.
- 7, rue Biscornet, Paris.
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
- 8, passage Morel, Montrouge.

- *Opothérapie Lauriat
Isorgane La Garenne-Colombes (Seine).
Opothérapie «Le Pecq» 11, rue Beautreillis, Paris.
- *Opothérapie Moncour 49, av. V.-Hugo, Boulogne-s.-S.
- Opothérapie Richard 79, av. d'Orléans, Paris.
- Opothérapie U. T. A. 13, r. Sainte-Véronique, Liège.
- *Opothérapiques Crinex-Uvé 1, av. D^r-Lannelongue, Paris.
- Opothérapiques Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- Opothérapiques Pélissier 33, av. de Villiers, Paris.
- Opotonine 122, Champs-Élysées, Paris.
- Opo-Vaccins 51, rue des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Opo-vacuoline 39, r. R.-Salengro, Bondy
- *Opo-Veinogène 37, rue Brochant, Paris (XVIII^e)
- *Opozones Lumière 45, rue Vilbon, Lyon.
- Opsine Grémy 14, rue de Cléchy, Paris.
- Opsolysine 7 à 13, r. St-Maurice, Nanterre (Seine).
- Opsomyl A et B 1, av. de Villars, Paris.
- *Optalidon 20, rue Vernier, Paris.
- *Opticura Bengué 16, rue Ballu, Paris (IX^e).
- *Optiplaste Mer Rouge, Mulhouse.
- *Opto Scott 348, r. St-Honoré, Paris (I^{er}).
- *Optraex 16-22, rue des Orteaux, Paris.
- Opunsine 94, rue Michelet, Alger.
- *Orargol Amicros (Rhino-Gouttes-Collyre) 177, r. de Courcelles, Paris.
- Orarigène 35, av. Alsace-Lorraine, Grenoble.
- *Orcalcine 9, rue de la Platière, Lyon.
- Orcéol 17, rue Mont-Désert, Nancy.
- Orchidine 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Orchitine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Orchitine Meurice 61, av. Louise, Bruxelles.
- *Orex 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
- *Orexyl 5, rue Mazard, Lyon (Rhône).
- *Organésium 20, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Organicalcion simple et endocrinien polyvitaminé 91, rue de Monceau, Paris.
- Organocalcine 121, av. de Saint-Ouen, Paris.
- *Organo-Sthénoléine 2, r. Claude-Matrat, Issy (Seine).
- *Organotioli S-S 22 bis, r. de Silly, Boulogne-s.-S.
- Orge maltée Fanta 77, rte d'Orléans, Montrouge.
- Orianol Genton, à Petit-Quévilly (S.-I.).
- Oriphol 8, rue Richer, Paris.
- Ormatol 80, rte des Petits-Ponts, Drancy (Seine).
- Orocalcyl Le Genill. Pontorson (Manche).
- Orpranor Louvel, Elbeuf (S.-I.).
- Orsanine 21, r. J.-Goujon, Paris.
- *Ortédrine id.
- Orthobiline 37, rue Galilée, Paris.
- Orthochol 7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII^e).

- * Orthocynol
Orthoflorène
- * Ortho-Gastrine
- * Orthogénol
- * Ortholaxine
Ortho Mallevall
- * Orthoneurol
- * Orthophorine
Orthosédan
- * Orthosiphène
Orthosiphon Longuet
- * Ortho-Stomine
Orthozomine
- * Osmoléine
- * Osmo-Peptide
Osmos
Osmotol
- * Osmo-Vaccins Bréant
- Ossical
- * Ossyl
Osteline
Ostéoglandulol
Ostéo-hépatine
- * Ostéopeptine
Ostomalt
- * Ostréiode
- * Ostréiode injectable
Ostréine
- * Ostricalcium
- Otalgine adrénalinée
- * Otalgolex
Otinol
Oto-Antiscclérol
Oto-Draineur
- * Otodraîns
Otolan
Oto-vaccin Salantale
- * Otoléine
- * Ouabaine Arnaud
- * Ouabaine Mialhe
- * Ouataplasme Langlebert
Ouate Rhinol
- * Ova-Crine
Ovaire Fournier
Ovaîrine
Ovaridine Meurice
Ovarids
Ovarine Dubois
Ovarine Meurice
Ovarine Optima
Ovarine Orga
Ovarine Tisy
Ovarose
- 8, r. Aumont-Thiéville, Paris.
18 et 20, rue Vavin, Paris.
15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).
19, rue Drouot, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
34, rue du Plat, Lyon.
Souriguère, Angoulême (Ch^{te}).
15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).
7, r. Ste-Isaure, Paris (XVIII^e).
20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
(Voir : *Siphuryl*.)
77, bd de Grenelle, Paris.
(Voir : *Zomine*.)
26, rue des Moines, Paris.
103, rue St-Lazare, Paris.
56, rue Beaubourg, Paris.
Chauvin, Aubenas.
11, rue de Clichy, Paris.
1, av. de Villars, Paris.
Glageon (Nord).
46, r. Claude-Lorrain, Lille.
14, rue des Pyramides, Paris.
62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine.
Drapier, Rethel (Ardennes).
46, rue Claude-Lorrain, Lille.
344, bd de la Plage, Arcachon.
id.
98, rue de Sèvres, Paris.
21, pl. Maréchal-Pétain, Béthune (Pas-de-Calais).
2, pl. de l'Hôpital-Gai, Montpellier.
21, rue de Lyon, Paris.
14, rue du Temple, Calais.
6, pl. Cambronnet, Paris.
5, r. Emmanuel-Liais, Cherbourg.
5, Grande Rue, Montpellier.
24, rue Jardel, Bordeaux.
42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
72, r. de Bagneux, Montrouge.
27, rue de la Procession, Paris.
8, rue Favart, Paris.
40, rue René-Bazin, Paris.
80, fg Saint-Denis, Paris.
9, impasse Thoréton, Paris.
7, rue Biscornet, Paris.
62, r. Notre-Dame, Bordeaux.
61, av. Louise, Bruxelles.
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
49, av. Lamotte-Picquet, Paris.
61, av. Louise, Bruxelles.
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Orga, Avignon (Vaucluse).
95, rue de Turenne, Paris.
58, rue Saint-Placide, Paris.

- Ovaro-Thyroidine**
Ovcaline
Ovex Léo
Ovigénine Bouty
***Ovobiol**
Ovo-Cac
***Ovocycline**
Ovo-lécithine Billon
***Ovomaltine**
Ovothyrol
Ovrine
***Ovucridine**

***Ovugyne**
***Ovulacyd**
***Ovule au Lactosmose**
***Ovules Alavita**

Ovules Amicros
Ovules antiseptiques
Ovules à l'Inolène
Ovules à l'Iodéol
Ovules au Mictasol
***Ovules au Nestosyl**
***Ovules au Paraiode**
***Ovules Chaumel**
Ovules Derma
Ovules Evine
Ovules au gonagone
Ovules Gynol
Ovules Halogènes du
D^r Bern
Ovules Halleana
***Ovules Hystan**

Ovules Inséva
Ovules Ivula Pearson
Ovules Magida
Ovules Méta-Vaccin
Ovules Néothorium
***Ovules Oape**
Ovules Patrat
Ovules Phena
***Ovules Phytovules**
Ovules Probios
Ovules Radonol
Ovules Résolis
***Ovules Rhemda**
Ovules Roche au Thi-
génol
***Ovules Saporex**
***Ovules Sédo-hémosta-**
tiques Jouve
***Ovules Stérigyne**
Ovules au Terpoxyl
Ovules Uxora
- 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 66, bd Exelmans, Paris (XVI^e).
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 2, rue de Compiègne, Paris.
 103-117, bd Part-Dieu, Lyon.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 Étab. Wander, Champigny (S.).
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 Douarnenez (Finistère).
 2, Rond-Point du Centre, La
 Garenne-Colombes (Seine).
 38, rue de Ponthieu, Paris.
 Lavril, Pacy-sur-Eure.
 Lavril, Pacy-sur-Eure.
 56, bd de la République, Saint-
 Cloud.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 42, rue Mont-Cenis, Paris.
 37, av. de l'Opéra, Paris.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 72, r. Saint-Dominique, Paris.
 23, rue Doudeauville, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Robin, 13, r. de Poissy, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Chaussée d'Ixelles, Bruxelles.
 3, pl. Int.-Saint-Michel, Toulouse.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 54, Chaussée-d'Antin, et 69, rue
 de Provence, Paris.
 60, rue de Monceau, Paris.
 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 56, rue des Dames, Paris.
 P. Métadier, Tours.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 Probios, 8, r. St-Martin, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 Boîte Postale, n° 5, Limoges.
 39, rue Taitbout, Paris.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 (Voir : Radonol.)
 2, rue Michelet, Alger.
 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
 10, rue Crillon, Paris.
 184, route de Genas, Lyon (III^e).
 16 bis, r. Dufrénoy, Paris (XVI^e).
 Servier, Orléans (Loiret).
 (Voir : Terpoxyl.)
 Dhaussy, à Mennevret (Aisne).

- Ovules-Vaccins Goldenberg** 17, rue de Provence, Paris.
- *Ovules-Vaccins Inava** 14, r. de Normandie, Asnières.
- Ovules-Vaccins Salantale** 42, Grandes Arcades, Strasbourg.
- Ovules Vézès** 52, bd du Temple, Paris.
- Ovules au Vioforme** (Voir : *Vioforme*).
- Ovunéol Bottu** 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris.
- Oxhydrate de Bi** 89, av Wagram, Paris.
- Oxitane** Caseneuve, St-Cyprien (Dordogne).
- Oxnol** 45, fg Saint-Denis, Paris.
- *Oxy-Buccol** 15, r. de Rome, Paris.
- Oxycarbène** 23, rue Beautreillis, Paris.
- Oxycyanure d'hydrargyre** 168, bd Saint-Germain, Paris.
- Oxy-Dents C. R. S.** 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.
- Oxyde orangé de Hg ophtalmoforme** Lab. Dulcis, pl. Clichy, Montecarlo.
- Oxydolysine** 7, rue Charlot, Paris (III^e).
- *Oxydothyridine Paris** 4, r. de La Motte-Picquet, Paris
- *Oxydovarine Paris** id.
- Oxydrol** 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Oxyfuge** 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
- Oxygénés du Dr Prim** 27, rue Fourcroy, Paris.
- Oxygénobore « Obs »** Neuilly-sur-Saône (Rhône).
- *Oxy-Injecteur du Dr Fialip** 23, av. de La Motte-Picquet, Paris.
- *Oxyléine (Adultes et Enfants)** Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
- Oxylisine** Rue de la Paix, Vichy.
- *Oxymenthol Perraudin** 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- Oxymuth Saca** 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- Oxynargyl** 56, rue des Dames, Paris.
- *Oxyplastine** 78, av. St-Ouen, Paris (XVIII^e).
- Oxyquinothéine** 91, rue Marietton, Lyon.
- Oxythymol** 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
- Oxy-Thymoline** 13, r. Gambetta, Nancy.
- Oxytoires Sorin** Trombetta, à Blain (L.-Inf.).
- *Oxythyl** Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
- Ozobiase** Drouet et Plet, à Rueil-Malmaison.
- Ozobiase opothérapique** id.
- Ozodor** Lab. Servier, Orléans (Loiret).
- *Ozol** 6, place des Ternes, Paris.
- *Ozolase** id.
- *Ozothine** 4, chaussée de la Muette, Paris.

P

- Pacemol**
Pacyl
***Padéryl**
Paidol
Pain d'amandes au gluten frais
Pain essentiel Heudebert
Pain massé Sana
Pains Nutricia
***Pains de régime Heudebert**
Paloval
***Palpitine**
Paludase Corbière
***Pampryl**
Panbiase antiphymique
***Panbiline**
***Panbiol**
Panbromine
Pancalbiose
***Pancalcion**
Pancarbo
***Panchol-Sel**
***Pancodine**

Pancréadénine
***Pancréal Kirchner**
Pancréas-Endocrisines Fournier
***Pancréastase Defresne**
***Pancréatine**
***Pancréatokinase**
***Pancréatose Idon**
***Pancrébile**
***Pancrépar**
***Pancrépatine Laleuf**
***Pancrepeptal**

Pancrésal
***Pancrinol du Dr Debat**
- Bedell, Lavelanet (Ariège).
 8, rue de Prague, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Roussel, Gde-Rue, Flers (Orne).
 37, rue du Rocher, Paris.
 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
 Gaillac (Tarn).
 142, rue Fransman, Bruxelles.
 85, rue de Saint-Germain, Nanterre (Seine).
 Pharm. de l'Étoile, Strasbourg.
 72, quai Jemmapes, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 149, r. du Port-de-Bercy, Paris.
 15-17, rue de Rome, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 15, rue de Rome, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 1, rue Chancelier, Périgueux.
 5, rue de Lubeck, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 Rousseau, Sens (Yonne).
 4, rue Raymond - Poincaré, Nancy.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 24, rue de Verdun, Strasbourg.
 7, rue Biscornet, Paris.
 19, rue Jacob, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 89, rue Saint-Georges, Nancy.
 71, rue Sainte-Anne, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 51, rue Nicole Paris (XVI^e).
 H. Perrin, 55, rue Auguste-Comte, Lyon.
 Schreiber, av. du Bois, Luxembourg.
 60, rue de Monceau, Paris.

- Pandermol**
Pandigitale Houdas
Pandigitale Optima
Pandiol
***Pandrénaline Julien**
***Panfébrine**
Panfito
***Panfluine**
Panfortan
***Pangaduine**
***Pangastrol**
Pangermine
***Pangestyl Narty**
***Panglandine**
Pangynol
***Panhémoi**
Panhistol
Paniode
Panlaby
Panlacto Midy
Panlax Allard
Panlithyl
***Panlutéine**
Panlypol
***Pan-Neurol**
Panol
Panopepton

Panophytes
***Panosan**
***Panostyl**
Panpectose
Panphosphates
Panphylase
***Panphysex**

Panprocol
***Pansarcine**
Pansedine
Pansements asepti-
ques Astruc
***Pansements Nemausa**
Pansement otologique
Alsai
Pansements gras Mau-
jean (simple et aux
essences)
***Pansmacol**
***Pansolanée**
***Panstomase**
***Pansuline**

***Pantamine**
***Pantavoine**
Pantocamphre
Pantofort du Dr Boveil
(granules)
- 43, avenue Kléber, Paris.
 10, passage Morel, Montrouge.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 15, rue de Rome, Paris.
 105, rue de Rennes, Paris (VI^e).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 20, rue Saint-Lazare, Paris. }
 134, bd Péreire, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 R. Bouyssou, Chambois (Orne).
 4 bis, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 1, pl. Sainte-Anne, Lyon.
 117, rue de Belleville, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris (IX^e).
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 2, rue des 2-Ponts, Paris.
 54, av. de la Bourdonnais, Paris.
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Ga-
 renne-Colombes.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 13, rue Pagès, Suresnes (Seine).
 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 84, fg du Temple, Paris (XI^e).
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 1, av. de Villars, Paris.
 1, av. du Dr-Lannelongue,
 Paris.
 222, rue Duguesclin, Lyon.
 Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).
 122, rue de Gerland, Lyon.

 5, Grande Rue, Montpellier.
 id.

 1, rue Griffon, Lyon.

 Jean Boutes, Muret (H^{te}-Gar.).
 199, bd Bineau, Neuilly-s.-S.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 45, rue du Marché, Neuilly.
 11, Chaussée de la Muette,
 Paris.
 1, avenue de Villars, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 66, rue de la Pompe, Paris.

 1, rue Lassalle, Lyon.

- *Pantogène (granulé et élixir) Hatler, 13, pl. du Peuple, Saint-Etienne.
- Panto-Kinon 2, rue Michelet, Alger.
- Pantolaxine du Dr Bo- 1, rue Lassalle, Lyon.
- veil (cachets) 10, rue Crillon, Paris.
- *Pantopon Roche 13, rue du Peuple, Saint-Etienne.
- Pantosérum (ampou- 34, bd de Clichy, Paris.
- les) 36, av. Niel, Paris.
- Panurol Tissot
- Panvalérase
- *Panveinine 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
- *Panvita 188, cs. de la Somme, Bordeaux.
- *Panxylon Logeais (gra- 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-
- nulé) sur-Seine.
- *Panxylon Logeais in- 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-
- jectable sur-Seine.
- *Panxylon L 12 % Logeais, Boulogne-sur-Seine.
- Panzanon 12, r. de Strasbourg, Paris.
- Paospholine 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
- Papaine Henry 39, r. de Sclessin, Liège (Bel-
- gique).
- Papaine Trouette-Per- 61, av. Philippe-Auguste, Paris
- ret 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- *Papavérine Houdé 245, rue de Vaugrard, Paris.
- *Papaveryl 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Papier Albespeyres Martin-Mazade, S-Raphaël (Var).
- Papiers Anti-Asthm 56, bd Péreire, Paris.
- Papier du Dr Balme 78, fg St-Denis, Paris.
- Papier Barral 24, av. Mathurin-Moreau, Paris.
- Papier Fayard 64, rue des Tournelles, Paris.
- Papier Gicquel 14, Gde-Rue, Pont-de-Vaux
- *Papier iodogène Ey- (Ain).
- monnet 10, rue de La Barouillère, Paris.
- Papier réactif Géna- Fleury, Arcachon (Gironde).
- cide 163, rue de Flandre, Paris.
- *Paquets Alcais Saint-André (B.-du-Rhône).
- Paquets P. C. L. 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- Paquets Salins-du-Re- 2 et 4, pl. Gambetta, Paris.
- vard 71, rue Sainte-Anne, Paris.
- Paquets solubles ORL. 16, cours Portal, Bordeaux.
- *Paquets Védé 18 et 20, rue Vavin, Paris.
- Parabenzyl 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
- Paracoccine id.
- Paracrinase 34, r. de Besançon, Pontarlier.
- *Paradoxex av. Baraduc, Châtel-Guyon.
- *Paradoline 17, rue de Berri, Paris.
- Paraffino-Bande 48, av. de la Porte-d'Ivry,
- Paraffinol Paris.
- Paraffinoléol 25, rue Dagorno, Paris.
- Paraformine 107, av. de la Reine, Boulogne-
- sur-Seine.
- Paragangline Vassale 11, rue de Clichy, Paris.
- Paragar
- Paragélose

- *Paragerm
 Paraghurt Léo
 *Paraiode
 Paralactine Byla
 Paralaxol
 *Paralginine
 Paralymphine
 *Parasclérose
 Paratétanine
 Parathyrocalcine
 Parathyroïde Endocri-
 sines Fournier
 Paratone Léo
 *Paratoxine Ducatte
 Paratyl
 *Paratyrone
 *Paraveinine
 Parégorique Lafran
 Parémanol
 Parkipan
 *Parlax
 *Paroïdocalcium
 *Parolagar
 *Paroxyl
 *Parulcine Robin
 *Parvula
 Parvuline
 Passacanthine
 *Passibromine
 *Passicarbhone
 *Passiflorine
 Passival
 Pastapalm
 Pasticaïne
 Pastilles Arvos
 Pastilles Bala
 Pastilles Brachet
 Pastilles Brunelet
 Pastilles Contre-ut
 Pastilles Debar
 Pastilles Dionol
 Pastilles des Eaux-
 Bonnes
 Pastilles Fayès
 Pastilles de Gonacrine
 Pastilles Helgé
 *Pastilles Houdé
 Pastilles Lezin
 Pastilles Libéria
 Pastilles Maya
 151, av. de Neuilly, Neuilly.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 23, rue Doudeauville, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 52, r. de Poissy, St-Germain-en
 Laye.
 9, rue St-Ferdinand, Paris.
 32, rue de Grenelle, Paris.
 2, place des Vosges, Paris.
 17, rue Bourgelat, Lyon.
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
 sur-Seine.
 7, rue Biscornet, Paris.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 191, rue Saint-Honoré, Paris.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche)
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 45, fg-St-Denis, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 20, av. J.-Jaurès, Suresnes.
 71, r. Douy-Delcupe, Montreuil-
 s.-Bois.
 299, rue des Pyrénées, Paris.
 10-12, r. de Strasbourg, Paris.
 26 et 28, rue des Ponts, Nancy.
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 Brunswick, 3 bis. rue Vallier,
 Levallois-Perret Seine).
 11, rue de Flandre, Paris
 (XIX^e).
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 G. Calmels, Auterive (Haute-
 Garonne).
 115, r. de Paris, Boulogne-s.-S.
 Id.
 H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 222, bd Péreire, Paris.
 164, rue St-Honoré, Paris.
 217, rue La Fayette, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 Fleury, Arcachon (Gironde).
 Raimoa, 16, rue des Immeubles-
 Industriels, Paris.
 2-4, pl. Gambetta, Paris.
 21, r. J.-Goujon, Paris.
 D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 10, r. Cyrano-de-Bergerac, Paris.
 142, rue Fransman, Bruxelles.

- *Pastilles M. B. C.**
Pastilles Méry
Pastilles Midy
Pastilles Miraton
Pastilles Norvégiennes
Pastilles Paterson
Pastilles Pepsa

Pastilles de Pougues
Pastilles St-Christau
Pastilles Seclo
Pastilles Violettes A. B. C.
Pastilles Vichy-Etat
Pastils Meran
***Pâte à l'eau Aloplastine**
***Pâte à l'Eau R. P.**
Pâte Aseptor
Pâte Berthé
Pâte Bleue Goy
Pâte Dentaire Bleue
Pâte dentifrice
Pâte dentifrice du Dr Léon Boyer
***Pâte dentifrice Gibbs R. S.**
Pâte dentifrice Kraus
Pâte dentifrice Philipps

Pâte Dermos Neyret
Pâte Goyer
Pâte de Terpene Guédet
Pâte Germidex
***Pâte Gingivale à l'acétylarsan**
Pâte Jane
Pâte Magali
***Pâte Mireille**
Pâte Neyret
Pâte pectorale du Dr Williams
Pâte Rami
Pâte Robin
Pâte Silka
Pâtes Pectoral Edulcor
***Pâtes Sana**
Pausodyne
***Pavérinol Laleuf**
***Pavéron Dausse**
***Pavonol**
Pavydis
Paxanus

***Paxène**
Paxineurol
- Goy, 23, rue Beautreillis, Paris.**
19, r. du Bailly, Plaine-St-Denis.
67, av. de Wagram, Paris.
48, rue d'Alésia, Paris.
33, bd Dubouchage, Nice.
43, rue de Saintonge, Paris.
38, r. du 11-Novembre, Clermont-Ferrand.
21, rue Chaptal, Paris.
163, r. de Flandre, Paris.
6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.

24, rue de Montessuy, Paris.
24, bd des Capucines, Paris.
18, rue de Maubeuge, Paris.

19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
La Roche-Posay (Vienne).
21, rue de Lyon, Paris.
78, fg Saint-Denis, Paris.
23, rue Beautreillis, Paris.
(Voir : Inava.)
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.

Laffargue, Barsac (Gironde).

4, rue Richer, Paris.
37, rue Godot-de-Mauroy.
O. C. P., 108, rue de Picpus, Paris.

35, rue de la Bourse, Lyon.
23, rue Beautreillis, Paris.
Grignon, 2, r. Duphot, Paris.
37, av. Jean-Jaurès, Aubervilliers.

21, rue Jean-Goujon, Paris.
7, rue Charlot, Paris (III^e).
43, av. Kléber, Paris.
Legendre, Houilles (S.-et-O.).
35, rue de la Bourse, Lyon.

66, r. de Paris, Poissy (S.-et-O.).
44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
13, rue de Poissy, Paris (V^e).
26, ch. de la Madeleine, Nantes.
19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
Gaillac (Tarn).
98, rue d'Angoulême, Paris.
51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
Castel, 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
43, rue de Lancry, Paris.
295 bis, rue de la Benauge, Bordeaux.

4, rue Richer, Paris.
41, rue Germain, Lyon.

- Paxol
 Paxyl
 Febromon Henry
 Pecthionol
 *Pectine Oberlin
 Pecto-Bronchyl
 Pectoforme
 Pectokid
 Pectopax
 Pectophédryl
 *Pectoral Coulloux
 Pectoral des Dames de France
 *Pectoral Fouchère
 Pectoral Giverna
 Pectoral Henry
 Pectoral Serla
 Pectoséda
 *Pectosédyl
 Pectosol
 Pédiasma
 *Pediozema
 Pelacide
 *Pélargon de Nestlé
 Pelletière Tanret
 Pellicules radifères du Dr Vallet
 Pellidol
 Pelviformine
 Pelvinal
 Pelvi-Fyrine
 Pelvisedyl
 Pelvuryl
 *Penghawar des Iles
 Penghawar Vicario
 Pennès (Produits)
 *Pentamicros
 Pentarsyl
 Pepilax
 *Peplodon Henry
 *Pépione
 Pepsencia Roberts
 Pepsichlorine
 *Pepsinacid
 *Pepsine-Ferment
 Pepsipaine
 Pepsiphos
 *Pepsobyl
 Pepsodia
 *Pepso-Pancré-Malt
 *Peptalmine
- 245, rue de Vaugirard, Paris.
 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 Manseau, Margaux (Gironde).
 17, rue Cadet, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 Pruvot, Forges-les-Eaux (S.-I.).
 14, rue du Temple, Paris.
 Lab. des Vosges, La Broque (B.-R.).
 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
 119, rue de Sèvres, Paris.
 Rive-de-Gier (Loire).
 14, rue Demarquay, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 23, rue de Meaux, Paris.
 Lab. ORGA, Avignon (Vauc.).
 122, Champs-Élysées, Paris.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 6, av. César-Caire, Paris (VIII^e).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.
 14, rue des Minimes, Paris.
 21, Grande-Rue, Montfermeil.
 Id.
 15, rue des Champs, Asnières.
 38, bd de Strasbourg, Toulouse.
 Ringeade, Fosseboudeau-Blaye (Gironde).
 17, bd Haussmann, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 14, r. A.-Briand, Levallois-Per.
 14, rue Demarquay, Paris.
 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 8, rue St-Martin, Paris.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne-Colombes.
 Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
 116, bd Haussmann, Paris.
 168, bd St-Germain, Paris (VI^e).
 Delaunay, 119 bis, rue Victor-Hugo, Tours.
 43, rue de Lancry, Paris.
 22, rue Turbigo, Paris.
 53, rue de Crimée, Paris.
 P. Bastien, Champigny-s.-Marne.
 21, r. Chaptal, Paris (IX^e).

- ***Peptalmine magnésinée** 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- ***Peptargyl Aguetant** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- ***Pepticol** 13, av. Maréchal-Foch, Dammarmar-le-Lys (S.-et-M.).
- Peptidol** 12, r. des Petits-Carreux, Paris.
- Pept'iode Farma** 1, av. E. THOMAS, Kremlin-Bicêtre (Seine).
- Peptobrol Kopp** 110, route de Colmar, Strasbourg.
- Peptocalcine** 22, r. de Paris, Houilles (S.-et-O.).
- ***Pepto-Correctine** 13, pl. du Peuple, St-Étienne.
- ***Peptodiase** Zizine, 24, r. de Fécamp, Paris.
- ***Pepto-fer Jaillet** Darrasse, 13, r. Pavée, Paris.
- Pepto-ferrine** 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- ***Peptogil** Jacquemaire, Villefranche (Rh.).
- ***Peptokola Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- ***Pepto-Magnésie Vassal** 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
- ***Peptomaltone Déjardin** 10, rue Parent-de-Rozan, Paris.
- ***Peptonal** 15, r. des Champs, Asnières (Seine).
- Peptonate d'Étain Henry** 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
- ***Peptonate de fer Robin** 13, rue de Poissy, Paris.
- Peptone Byla** 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Peptone Catillon** 3, bd Saint-Martin, Paris.
- Peptone Chapoteaut** 8, rue Vivienne, Paris.
- Peptone Cornélis** 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- ***Peptone Vassal** 28, rue Hôpital-Militaire, Lille.
- ***Peptopancréase** 25, rue Dagorno, Paris.
- Peptoprotease** 25, rue Dagorno, Paris.
- ***Peptosthénine Choay** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- Pepto-Sucs** 24, av. Albert-I^{er}, Dijon.
- Peptoalériane du D^r Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Peptovitrine** Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- ***Peptozym** R. Bouyssou, Chambols (Orne).
- ***Perandrone** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- ***Pérasurol** Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.).
- Peraziodol** 1, av. de Villars, Paris.
- ***Percaïne-percaïnal** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- ***Percalcine** 84, rue Rochechouart, Paris.
- ***Percalcium** 6, av. V.-Hugo, Paris.
- ***Percortène** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
- ***Per-Extraits Carrion** 54, Faubourg-St-Honoré, Paris.
- ***Perglandènes (ovarien, hépatique, orchitique).** 48, rue de la Procession, Paris.
- ***Per-Hépatique Carrion** 54, Faubourg-St-Honoré, Paris.
- ***Péricols Legros** 88, rue Duhesme, Paris.
- Périol Soulié** 21, rue Mouton-Duvernety, Paris.
- ***Péristaltine Ciba** 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- Perles Jeka
 Perles Nivernaises
 *Perles Taphosote
 *Permyase
 Pérosédol
 *Per-Ovarien Carrion
 Perparine
 *Perquinol
 *Persodine Lumière
 *Per-Surrénalien Carrion
 *Per-Thymique Carrion
 Pertussin Salle
 *Pérubore
 Péruglan
 Perumhyl
 Pérusol
 Péruviol
 *Pervosine
 Phagocytine Bureau
 Phagolysine
 *Phagosthyl
 *Phagosthyl Mangané
 Pharmetan
 *Pharyngaseptyl
 *Pharyngoléine
 *Pharynxol
 Phéchlorment
 *Phéna
 Phénacodine
 Phénalgéine
 Phénaseptyl
 *Phénédrine
 *Phéniodine
 Phénol Bobœuf
 Phenorquine
 *Philentérol
 Philhepar
 *Philoderme Yldra
 Philodermine
 Philogyne
 Philtroline
 Phlébafine
 *Phlébocratyl
 Phléboguyl
 *Phlébos
 *Phlébosine M. et F.
 *Phlébotonine
 Phléboveinol
 Phlogogyne
 Phlogovules
 *Phloxiode
 Phlyctol
 Phocéol
 Phocitrol
- 13, rue Saint-Agricol, Avignon.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 20, rue Dumont-d'Urville, Paris.
 48, rue de la Procession, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 66, rue de la Pompe, Paris.
 8, rue Favart, Paris.
 45, rue Villon, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 id.
 4, rue Elzévir, Paris.
 1, place Victor-Hugo, Paris.
 M. Richard, Aubenas (Ardèche).
 83, bd de la Villette, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 G. Baetz, Chef-Boutonne (D.-S.).
 86, bd Port-Royal, Paris.
 14, rue Cantin, Courbevoie.
 4, r. La Motte-Picquet, Paris
 id.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
 72, rue de Bagnaux, Montrouge.
 8, rue Vivienne, Paris.
 7, rue St-Isaure, Paris.
 Boîte postale n° 5, Limoges.
 41, av. Joffre, La Garenne.
 29, rue de Metz, Toulouse.
 4, pl. Wilson, Limoges.
 8, rue Vivienne, Paris.
 57, bd A.-Briand, Champigny.
 41, rue de Rome, Paris.
 7, r. de la République, Puteaux.
 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 2, allées de Chelles, Le Raincy.
 20, rue Antoinette, Paris.
 13, r. de la République, Yzeure-Moulins (Allier).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 16, r. du Petit-Musc, Paris.
 15, rue des Champs, Asnières.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 H. Salle, 4, rue Elzévir, Paris.
 85, crs Albert-Thomas, Lyon.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 id.
 95, rue Michelet, Alger.
 1, av. de Villars, Paris.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 47, rue Bokanowski, Asnières.

- *Phonodiose 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil (Seine).
 [Phora Lang, 14, r. de Marignan, Paris.
 Phosarrhène 122, rue de Gerland, Lyon.
- *Phosarkyl (Quinarzol Antianémique.) Lab. Grandval, Reims.
- Phosbiogyl P. Fontanier Moulins-sur-Yèvre.
 18, rue de la Perle, Paris.
- *Phosbiose Lescaroux, Châteauroux (Indre).
 Phoscalgène Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 *Phoscamine Lescaroux, à Châteauroux.
 Phoscol 7, rue Biscornet, Paris.
- Phosféryl Fournier 4, av. Joffre, La Garenne (Seine).
 Phosfodéine 21, rue des Roses, Dijon.
 Phoshémoquinol 1, av. Eug.-Thomas, Le Kremlin-Bicêtre.
- Phosiodine 47, rue Maleret, Bordeaux.
 5, rue Mazard, Lyon.
- *Phosma Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 Phosocytol 143, rue du Temple, Paris.
- *Phosoforme 72, av. Kléber, Paris.
- *Phosol 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
- *Phoso-Magnésium Lab. Sauba, Montreuil-Paris.
- *Phosote Lambiotte Lab. Elsse, Fontaine-Grenoble.
- Phosovigol 78, av. Schneider, Clamart.
- Phosphalose M. Richard, Aubenas (Ardèche).
- *Phosphan Caducia 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- Phosphantyl 90, bd Saint-Denis, Courbevoie.
- *Phospharsol Delamare et C^{ie}, Romilly-sur-Andelle (Eure).
- Phospharsyl colloïdal 90, bd Saint-Denis, Courbevoie.
 du D^r Pinard
- Phosphate Gefroy à Villefranche (Rhône).
- *Phosphates Finard 1, quai Aulagnier, Asnières.
- Phosphate Vital de 38, rue du Louvre, Paris (1^{er}).
 Jacquemaire Landon, Châtel-Guyon (P.-de-D.).
- Phosphatine Falières 16, cours Gambetta, Lyon.
- *Phosphigem 4, r. Lecomte-de-Nouy, Paris.
- *Phosphobiase Jouffray, Bourgoin (Isère).
- *Phosphobiol 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- *Phosphobrom id.
- Phosphocalcase 41, av. Joffre, La Garenne.
- Phospho-Calcine 165, rue Saint-Honoré, Paris.
- Phospho calcine ferrugineuse 32, rue de l'Ouest, Paris.
- Phosphodéine Rouanet, Antibes (Alp.-M.).
- *Phospho-Fluor-Beynet Saint-Symphorien-de-Lay (Loire).
- *Phosphogaiacol Mary 33, fg Montmartre, Paris.
- Phosphogayol 46, Gde-Rue, Boulogne-s.-Mer.
- Phosphogène Favrichon Lab. Demasles, Vienne (Isère).
- Phosphogène Pachaut 18, rue de Beaune, Paris.
- Phospho-Iodine 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
- *Phospholéose
- *Phosphoneurol
- *Phosphonine Soulié

- Phosphonucléose**
 *Phosphopinal Juin
 *Phosphosodine
 *Phospho-Strychnal
 Phosphotal Clin

 *Phosphoxyl
 Phospirine

Phostanio
 Phostaniol

 *Phosthénine

 Phostone
 Phostonine
 Phrosthémor
 Phusasmine
 Phygynol
 Phylactone Byla
 Phylaxines
 *Phylla

 Phylloglobine
 Physéine Grémy
 *Physioscyamine
 *Physiosthénine

 Physocrisine
 Phytalgine

 Phytergol
 Phyteta
 *Phytine Ciba

 *Phytocholine
 *Phytocuprine
 Phytocytol

 Phytogénine Byla
 *Phytogénol
 *Phytogyl
 *Phytojava
 *Phyto-Kola
 *Phytolax
 Phytomensyl
 Phytophosphine
 Phytosang Sarda
 *Phytosplénol Plé
 Phyto-Tanin
 Phythothérapie Coirre
 *Phythothérapie Coloniale
 *Phytoveinol
 *Phyto-vitamines Plé
 *Picricol
 Picrol
 Pillxyl
- Dupont, Vellnes (Dordogne).
 10, impasse Milord, Paris.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 34, rue Sedaine, Paris.
 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
 (Voir : Fosfoxyl Carron.)
 Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 22, fg St-Michel, Angers.
 Comtos, Feschés - le - Châtel (Doubs).
 7, av. des Marronniers, Fontenay (Seine).
 Bréant, 11, r. de Clichy, Paris.
 14, rue du Temple, Calais.
 80, fg St-Denis, Paris.
 80, rte des Petits-Ponts, Drancy.
 27, r. des Batignolles, Paris.
 26, av. Observatoire, Paris.
 16, rue Dragon, Marseille.
 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris (VII^e).
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).
 14, rue de Clichy, Paris.
 47, rue Maleret, Bordeaux.
 Drouet et Plet, Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
 7, rue Biscornet, Paris.
 P. Fontanier, Moulins - sur-Yèvre (Cher).
 53, rue de Crimée, P. Paris.
 7, passage Thionville, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 37, rue Pajol, Paris.
 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e).
 4, pl. St-Martin, Vendôme (L.-et-C.).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 15, rue Pasteur, Bourg (Ain).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 38, rue du Louvre, Paris (I^{er}).
 50, rue Nationale, Lille.
 59, rue Boissière, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 D^r A. Petit, à Angoulême.
 5, bd Montparnasse, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 116, bd Haussmann, Paris.
 111 bis, rue de Turenne, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 22, r. Mar.-Foch, Montpellier.
 62, rue d'Antibes, Cannes.

- Pilka (Gouttes)**
Pilules Anhépatiques Christiaens
Pilules anti-Diabétiques Jaillardon
Pilules antidiabétiques Midy
Pilules antinévralgiques du D^r Cronier
Pilules Bengué
Pilules Blancard
Pilules Bosredon
Pilules bronchotoniques Arco
Pilules de Chloramine
Pilules Corail

Pilules Coter
Pilules Cuticura
Pilules de Boldo-Biline Ducloy
Pilules d'Eurinase
Pilules Doumer
Pilules Dray

***Pilules du D^r Debouzy**
***Pilules du D^r Moustier**
Pilules Erdibron
Pilules du D^r Séjournet
Pilules écossaises Collas
Pilules énergétiques Fradier
Pilules Éparvier
Pilules Galvane
Pilules Gip
Pilules de Glauber
Pilules Hardy
***Pilules héléniennes Naud**
Pilules Hémabione
Pilules d'Hermal
Pilules Laville
Pilules Lartigue
***Pilules Lemary**
Pilules lithuranées du D^r Boveil
Pilules de Moussette
***Pilules Myosotis**
Pilules Nella
[Pilules Norma
Pilules Oco
***Pilules Philippe**
[Pilules Philippe : Bro-
mure, Harlem, Ki ou
Nal, Pancreatine
- 92 rue Bobillot, Paris.
 4. r. Colbert, Reims.
 Martin-Mazade, St-Raphaël (Var).
 67, av. de Wagram, Paris.
 Monin, 49, rue de Maubeuge, Paris.
 16, r. Ballu, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.

 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 Lab. Legendre, Houilles (S.-et-O.).
 11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.
 3, av. Lowendal, Paris.

 Arques (P.-de-C.).
 (Voir : *Eurinase*.)
 à Annonay (Ardèche).
 196, r. de Paris, Montreuil-sous-Bols.
 34, rue Sedaine, Paris.

 Saint-Vallier (Drôme).
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 62, rue de la Tour, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
 53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bols.
 26, Gde-Rue, St-Clair, Lyon.
 Chabanais (Charente).
 7, r. Galvani, Paris.
 11, bd de Strasbourg, Paris.
 13, rue Minimes, Le Mans.

 37, rue Pajol, Paris.
 Chemin-Neuf, Ganges (Hérault).
 10, pass. Morel, Montrouge.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.

 1, rue Lassale, à Lyon.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 21, rue de Rome, Paris.
 4, rue Jean-Goujon, Paris.
 33, Grande-Rue, Besançon.
 87, rue Lafayette, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.

- Pilules Prophylactiques Christiaens** 4, rue Colbert, Reims.
Pilules Purgatives du Dr Dehaut 147, fg Saint-Denis, Paris.
Pilules de Quassine Frémint 6, rue Abel, Paris.
Pilules Salvia 139, av. Émile-Zola, Paris.
Pilules stibiées 2, rue Volney, Paris.
Pilules Tix 61, rue de Seine, Paris.
***Pilules V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ardèche).
Pimpinol 23, rue Beautreillis, Paris.
Pinofluol 3, rue de Surène, Paris.
***Pineocleum** 7, rue L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
***Pioréagine** Croissy-sur-Seine (S.-et-O.).
Pipérasol Tissot 34, bd de Clichy, Paris.
***Pipérazine Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
Pipérazine R.-B. La-grave 72, quai Jemmapes, Paris.
Pipérazyl 30, bd Raimbaldi, Nice.
***Piperitol** 21, pl. Maréchal-Pétain, Béthune (P.-de-C.).
Pipettes nasales M. S. 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Piscidia Gmet 27, fg Montmartre, Paris.
Pitol 2, rue de Paris, Douai.
Pituilobine Byla 26, av. Observatoire, Paris.
Pituitairine 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Pivadorme 21, rue Jean-Goujon, Paris.
Pixol Kœhly 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
Placenta Endocrisines Fournier 7, rue Biscornet, Paris.
Placentodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
Placidol 14, rue Demarquay, Paris.
Plaganaze 13, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
Plaganol id.
Plagéine Soulas 119, rue de Sèvres, Paris.
***Plasma de Quinton** 54, fg Saint-Honoré, Paris.
Plasmargol Huon, Palmpol (C.-du-N.).
***Plasmarine** Lab. de la Biomarine, Dieppe.
Plasmastyl 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
Plasmatol Roussel, Gde-Rue, Flers (Orne).
Plasmobeef Aubery, Avignon, (Vaucluse).
Plasmobiol id.
Plasmocalcium Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
Plasmocéane Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
Plasmocol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
Plasmodine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
Plasmo Prima 3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).
Plasmostérol Aubery, Avignon (Vaucluse).
***Plasmosthène** 14, rue des Minimes, Paris.
Plasone Vauers 72, av. Kléber, Paris.
Plasthamélyne 59, rue Boissière Paris. 7
Plastima 17, rue Vieille-du-Temple, Paris.
Pléthorine 122, rue de Gerland, Lyon.

- *Plexalgine Laleuf
- *Plexamine
- Plexorine
- Plombyl
- Pluorysse
- *Pluribiase
- Pluriglandine M et F
- *Plurinatriyl
- *Plurion
- Pluriphos
- *Pneumalcoool
- Pneuma Wander
- Pneumobiol
- Pneumocratol
- *Pneumogéine Renard
- Pneumogénol
- *Pneumo-lipase
- Pneumonctyl
- *Pneumostyl Daguin
- Pneumotanic Grémy
- Podophylle Coirre
- Podoxyl
- *Pofénane
- *Poliol Churchill
- Polvista
- *Polybromure Gonnon
- *Polycalcion
- Polycalcose
- Polychromol Coudere
- Poly-opo-minéraline
- Polycine
- Polydigeral Calmel
- *Polyferments Laleuf
- Polyformiate
- *Polyiodure Gonnon
- Polymétal
- Polyminéral Fort
- Polyna
- Polypeptine
- *Polypeptonal
- Polyphorine
- Polypirine
- *Polysalyl
- Polyseptol
- Polysodine
- Polytonyl
- *Polyvaline Dr Bayle
- *Polyveinine
- Pommade Acar
- Pommade 731
- 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
- 40, rue de Bellechasse, Paris.
- 41, av. Joffre, La Garenne (Seine).
- Drouet et Plet, Ruell-Malmaison (S.-et-O.).
- Fabris, 72, rue Mazenod, Lyon.
- 21, rue Violet, Paris.
- 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- 2, Rond-Point du Centre, La Garenne-Colombes.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 14, rue du Temple, Calais.
- 63, av. Grande-Armée, Paris.
- 151 bis, rue de Joinville, Champigny.
- 48, rue de Paris, Vichy.
- 147, fg Saint-Denis, Paris.
- 35, rue de Paris, Clichy.
- Buré, 74, fg d'Ambrail, Épinai.
- Yvrard, 17, r. Soufflot, Paris.
- Jouannet, Le Perray (S.-et-O.).
- à Saint-Maur (Seine).
- 14, rue de Clichy, Paris.
- 5, bd Montparnasse, Paris.
- Palc, Messigny (Côte-d'Or).
- 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
- 92, av. de Saint-Mandé, Paris.
- 6, rue Trencavel, Béziers.
- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
- 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
- 6, rue Berbissey, Dijon.
- 143, rue de la Guillotière, Lyon.
- 1, rue Raynouard, Paris.
- 113, bd Voltaire, Paris.
- 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
- 51, rue Nicolo, Paris.
- 18, avenue Hoche, Paris.
- 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
- 56, rue Beaubourg, Paris.
- 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
- 102, av. Michelet, Saint-Ouen (Seine).
- 61, rue de Seine, Paris.
- 15, r. des Champs, Asnières (Seine).
- 6, rue Abel, Paris.
- 120, rue Lecourbe, Paris.
- Landrier, Coulanges-sur-Yonne.
- 74, rue Lourmel, Paris.
- 24, rue Monttessuy, Paris.
- 32, rue de l'Ouest, Paris.
- 10, r. Alphonse-Bertillon, Paris.
- 152, côte Pavée, Toulouse.
- 5, r. E.-Combes, St-Étienne.
- 1, rue Delacroix, Chartres.

- Pommade adrénostyp-**
tique Midy Lab. Midy, 67, av. Wagram,
 Paris.
Pommade Aiphème 54, r. d'Étretat, Fécamp (S.-I.).
Pommade à l'Inolène 42, r. Mont-Cenis, Paris.
Pommade antihémor-
roïdale Manor, St-Germain - du - Bois
 (S.-et-L.).
Pommade Ascigué Huyghe (G. et J.), Brazey-en-
 Plaine (Côte-d'Or).
***Pommade Bebia** 5, av. E.-Boissier, Nantes.
***Pommade Bernamont** 87-89, rue du Commerce, Nevers.
Pommade Brune Ma-
nor St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
***Pommade-Crème Lu-**
din Lab. Rey, 12, rue Montmartre,
 Dijon.
Pommade Cuticura 3, av. Lowendal, Paris.
Pommade de l'Esterel 2, av. Gambetta, Cholsy-le-Roi.
Pommade de Séru 103, rue Saint-Lazare, Paris.
***Pommade du D^r Butler** 1, rue Bossuet, Dijon.
Pommade du D^r Wolf 46, rue des Faures, Bordeaux.
Pommade épidermo-
gène 53, bd de Verdun, Fontenay-
 sous-Bois.
Pommade Forgeue 1, av. de Villars, Paris.
***Pommade Fernet** 11, Chaussée de LaMuette, Paris.
Pommade au goudron Mougnaud, Longjumeau.
Pommade Heliatol 4, pl. Royale, Nantes.
***Pommade et suppos.** 60, rue de Monceau, Paris.
Inséva
Pommade d'Insuline (Voir : *Poudre et Pommade d'in-*
Phyloze *suline.*)
Pommade L. 3 3, r. Abreuvoir, Boulogne-s.-S.
***Pommade Lenoir** 142, rue de Picpus, Paris.
***Pommade Logeais** 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-
 s.-Seine.
***Pommade Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
Pommade Néothorium 177, rue de Courcelles, Paris
Millot (XVII^e).
***Pommade au Nestosyl** 72, rue Saint-Dominique, Paris.
***Pommade Noelline** Guingamp (C.-du-N.).
Pommade Périol 21, rue Mouton-Duvernet, Paris.
Pommade Phlébos 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
Pommade Poncet 107, av. de la Reine, Boulogne-
 sur-Seine.
Pommade Quartier 34, r. de Paris, Essonnes (S.-et-O.).
Pommade Radine Duclos, Évreux (Eure).
Pommade Raimoa 16, rue des Immeubles-Indus-
 triels, Paris.
Pommade Reys 21, r. de la Gare, La Broque (B.-
 Rh.).
Pommade Rhinol Dubat, 80, fg St-Denis, Paris.
Pommades Kléos 2, rue des Cordeliers, Meung-
 sur-Loire.
Pommade et savon au Collas et Boudault, Longju-
goudron meau (S.-et-O.).
***Pommades aseptiques**
Dulcis (Voir : *Tubes Dulcis.*)
Pommades Chibret (Voir : *Collyres Chibret Op-*
Optima *tima.*)

- Pommades Eon** 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.).
- Pommades nasales** Govaerts, Pont-à-Celles (Belgique).
- *Pommades ophtalmiques** Govaerts, Pont-à-Celles (Belgique).
- *Pommades ophtalmiques Chibret** Chibret, 5, rue Saint-Hérem, Clermont-Ferrand.
- *Pommades Probios** 8, rue St-Martin, Paris.
- Pommades Royer** 223, rue Saint-Martin, Paris.
- Pommades Stéryl** 94, rue Michelet, Alger.
- Pommades Talon** 153, bd Montparnasse, Paris.
- Pommade-Vaccin Sallantale** 42, r. des Gdes-Arcades, Strasbourg.
- Pommade Valentin Chaillot** 27, rue Planchat, Paris.
- Pommade V.-E. Doumer** Bomel, Annonay (Ardèche).
- Pommade Vérandy** G. Laurens, Pharm., Aix-en-Provence.
- *Pommade vitaminée Lafay** 54, Chaussée-d'Antin, Paris.
- *Pommade Vitamorphuine** 12, rue du Téléphone, Bruxelles.
- *Pommade Zylor** 122, Champs-Élysées.
- *Poroderma** 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
- [Poroplaste A. K.]** 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
- *Postérisan** 92, rue Bobillot, Paris.
- *Post-Hypophyse Choay** 48, av. Théophile-Gautier, Paris.
- *Potion Adol** 78, c. de la Liberté, Lyon.
- Potion Boissel** 295 bis, r. de la Bénauge, Bordeaux.
- Potion des Cordeliers de Seéz** 19, av. Secrétan, Paris.
- *Potion Dioga** 37, rue Brochant, Paris.
- [Potion du Dr Henry]** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Potion Granval** 12-14, rue Fery, Reims.
- [Poudre à l'Inolène]** 42, r. Mont-Cenis, Paris.
- Poudre antiasthmaticque Henry** 39, rue Sclessin, Liège.
- Poudre antiasthme Bengalais** Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).
- Poudre anti-asthme** Martin-Mazade, Saint-Raphaël.
- Poudre antigestralgique** 11, r. La Fayette, Paris.
- *Poudre Anti-H** 160, av. d'Italie, Paris.
- Poudre Arria** 47, rue Maleret, Bordeaux.
- *Poudre Beau chloroformée** Ph. Guely, 16, cours Gambetta, Lyon.
- Poudre Bébia** 5, avenue Boissier, Nantes.
- Poudre Blot Laxative** 49, rue de Maubeuge, Paris.
- Poudre Cap** 7, rue Charlot, Paris (III^e).
- *Poudre Cassarin** 24, rue Flégier, Marseille.
- *Poudre Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- Poudre Cosy** 89, rue Saint-Georges, Nancy.
- [Poudre Cytisia]** 15, rue Catulienne, St-Denis.

- Poudre Danica** 50, rue de Turenne, Paris.
Poudre Deol 61, rue de Seine, Paris.
Poudre Diadermine 60, r. Et.-Dolet, Malakoff (Seine).
Poudre Dumur 78, cours de la Liberté, Lyon.
Poudre dentifrice
 Charlard 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
Poudre de Lausanne (Voir : *Isotonyl*).
Poudre de Sapolan 29, rue Singer, Paris.
Poudre de viande 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
Poudre du D^r Butler (Voir : *Pommade du D^r Butler*).
Poudre du D^r Cléry 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
Poudre du D^r Souligoux 1, quai Aulagnier, Asnières.
Poudre épidermogène 53, bd de Verdun, Fontenay-s.-Bois.
***Poudre Escoufflaire** à Baisieux (Nord).
Poudre Espic 20, rue Saint-Lazare, Paris.
Poudre Evine 15, bd des Batignolles, Paris.
Poudre Exhibard 10, av. Félix-Faure, Paris.
Poudre Fiore 61, rue de Seine, Paris.
Poudre Gast 6, pl. Clichy, Paris.
Poudre Gécé 48, rue de Berri, Paris.
Poudre Génia 136, rue Chemin-Vert, Paris.
Poudre Gilbert Trillon 24, r. Eug.-Pelletan, Vitry-s.-S.
Poudre Gynol 316, ch. d'Ixelles, à Bruxelles.
Poudre Gynule Ch. Dehay, à Arras.
Poudre Héliatol 4, pl. Royale, Nantes.
Poudre Helvétia 50, r. de la République, Puteaux.
Poudre Hunier 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
Poudre Jifa 44, r. Chaptal, Levallois (Seine).
Poudre Klappa Giban, à Sens (Yonne).
Poudre Lartigue 78, fg Saint-Denis, Paris.
Poudre laxative André 60, r. des Moulins, Valence.
Poudre Mass plastique 20, rue Joubert, Paris.
***Poudre Noelline** Guingamp (C.-du-N.).
Poudre Optima Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Poudre O. R. L. 4, rue d'Illzach, Mulhouse.
***Poudre Pastorilos** 10, rue du Plâtre, Paris.
***Poudre Paterson** 46, rue de Saintonge, Paris.
Poudre Pelevine 15, bd des Batignolles, Paris.
Poudre de peptone de
 Chapoteaut 8, rue Vivienne, Paris.
Poudre de Pepsine Mougnaud, Longjumeau (S.-et-Oise.)
 Boudault
***Poudre et Pommade**
 d'Insuline Phyloze 48, rue de la Procession, Paris.
Poudre purgative Kün-
 ckel 3, rue Watteau, Courbevoie.
Poudre Pylor 20, Grande-Rue, Besançon.
Poudre Remoro Montauban (Tarn-et-Garonne).
Poudre Reys 21, r. de la Gare, La Broque (B.-Rhin).
Poudre Rhodys 97, bd Saint-Germain, Paris.
***Poudre Rocher laxative** 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
Poudre du roy Desolmes, Le Cannet-Roches-ville (A.-M.).

***Poudre Satine**
Poudre de soufre Sapo-
lan

Poudre Stear
Poudre Stoma

Poudre Zani

***Poudre Zeden**
Poudre Ziethen
Praequine

***Pragmoline**
Praidow

Pré-asthme
Précibiase
Frécy

***Préfagyl**
Prélase

***Prémaline**

***Pressyl**

***Prévalidine**

Prévarsyl
Préventyl

***Prézymase**

Prima Furoncles

Primalgine

Primaplast

Prima-Stéril

Primatex

Primulyze

***Probios**

***Procolyl**

***Procuta Brisson**

Proderma

Produits Billault

Produits Chanteaud

Produits diététiques

Produits du Dr Serin
de Gaillac

Produits Gmet

Produits Gory

Produits Lémary

Produits Maïas

Produits de Malt

Produits opothérapi-
ques

Produits organiques
Richard

Produits Orhino

Produits Fennès

Produits de Régime

Produits Shamb

Produits Zyma

***Prodynase**

Profondol

Progadol

7, rue Galvani, Paris.

29, rue Singer, Paris.

34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
 Hérin, 98, rue Jeanne-Maillotte,
 La Madeleine (Nord).

52, r. de Poissy, St-Germain-en-
 Laye.

27, bd Henri-IV, Paris (IV^e).

85, rue des Morillons, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

id.

Battut, à Vatan (Indre).

3, pl. d'Armes, Valenciennes.

22, rue de la Sorbonne, Paris.

11, rue de Clichy, Paris.

32, rue de l'Ouest, Paris.

20, rue de Pétrograd, Paris.

21, r. Jean-Goujon, Paris.

52, r. La Bruyère, Paris (IX^e).

Mer Rouge, Mulhouse.

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

74, rue des Jacobins, Amiens.

3, rue Fernand-Widal, Paris.

3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).

24, bd Sébastopol, Paris.

3, r. des Reculettes, Paris (XIII^e).

id.

id.

23, rue Beautreillis, Paris.

8, r. St-Martin, Paris.

9, r. de la Platière, Lyon.

157, rue Championnet, Paris.

Cosson, Romainville (Seine).

22, rue de la Sorbonne, Paris.

3 et 5, r. Alex.-Dumas, St-Ouen.

Favrichon, à Saint-Symphorien-
 de-Lay (Loire).

10, allées Damour, Bordeaux.

27, fg Montmartre, Paris.

48, rue d'Alésia, Paris.

36, quai Fulchiron, Lyon.

Fouchère, Rive-de-Gier (Loire).

5, rue Labroque, Strasbourg.

56, rue Beaubourg, Paris.

79, av. d'Orléans, Paris.

82, rue de la Croix-Verte, Albi.

3, rue de Dunkerque, Paris.

142, r. Fransman, Bruxelles.

Palc, Messigny (Côte-d'Or).

92, rue Bobillot, Paris.

12, rue Charles-V, Paris.

21, rue de Madrid, Paris. ■

9 et 11, rue de la Perle, Paris]

- *Progaster 9, rue de la Platière, Lyon.
- *Progone 15, rue Catulienne, Saint-Denis.
- Prolactine 4, rue Richer, Paris.
- Prolax 36, r. de la Tour d'Auvergne, Paris.
- Prolifer 43, rue de Lancry, Paris.
- *Prolyses 6, rue de Navarin, Paris.
- *Prométhine 20, rue des Écoles, Paris.
- Promulier 20 bis, r. Gravelotte, Toulouse.
- Prophylactyl 76, rue des Jacobins, Amiens.
- Erophylargyl (Voir : Vitargyl.)
- Prophylax 6, rue des Feuillants, Marseille.
- *Propidex 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Propidon id.
- *Propivane id.
- Prostacure Calmels, Auterive (Haute-Garonne).
- *Prostal 13, avenue de Ségur, Paris.
- *Prostalyse 21, rue de Lyon, Paris.
- *Prostatidausse 4, rue Aubriot, Paris.
- *Prostatols 72, quai Jemmapes, Paris.
- *Prosthénase Galbrun 10-12, r. Guynemer, St-Mandé.
- *Prostigmine 10, rue Crillon, Paris.
- Prosulfamide 71, rue Sainte-Anne, Paris. ¶
- Prosvelta 24, bd Sébastopol, Paris, et 8, r. de Hollerich, Luxembourg.
- *Prosympal 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Protaminol Byla 26, av. Observatoire, Paris.
- Protège-Vaccin Kraus 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
- *Protensène 142, rue de Picpus, Paris.
- Protensol Godart, Andenne (Belgique).
- Protéobiol Bailly, 17, r. de Rome, Paris.
- *Protéodyne 29, pl. Bossuet, Dijon.
- Protéol 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
- Protéo Maltase 29-31, quai Henri-IV, Dieppe.
- Prothéine 29, pl. Bossuet, Dijon.
- Protiode Grémy 14, rue de Clichy, Paris.
- *Protiodyne 29, pl. Bossuet, Dijon.
- Protonic 88, rue Duhesme, Paris.
- *Proto-Gambier 42, r. É.-Deschanel, Courbevoie (Seine).
- [Protyline Roche 10, rue Crillon, Paris.
- *Provac's 42, rue Thiers, Le Havre.
- Proveinargyre 9, av. de la Grande-Armée, Paris.
- *Proveinase Midy 67, av. de Wagram, Paris.
- Provenine 8, rue Riblette, Paris.
- *Provulsif Probios 8, rue Saint-Martin, Paris.
- Proxystase 97, rue de Vaugirard, Paris.
- *Proxytol 97, rue de Vaugirard, Paris.
- *Prunagar 18, rue des Écoles, Paris.
- Pruneline Bost à Villefranche (Rhône).
- Prunines Sentini Domergue, Agen (L.-et-G.)
- *Prurilyse 72, Grande-Rue, Flers (Orne).
- Pruritol Raimoa 16, rue des Immeubles-Industriels, Paris.

- Psinase Grémy**
 ***Psoréal**
 ***Psorène**
 ***Psoréon**
Psorialan
 ***Psoryl**
 ***Psothanol**
Psychobiases
Psychobiases Dausse
Psycho-Neuryl
Psyliolaxine
 ***Psyllium Langlebert**
Puberglandol
 ***Puéricrine Rey**

Puerol
Pulcéine
Pulm-Acron

Pulmicure
Pulmine Byla
 ***Pulmo Bailly**
Pulmobiasse

Pulmobules Hyva
Pulmocalm
 ***Pulmocardine**
Pulmochole
Pulmochrysine
 ***Pulmodion**
 ***Pulmodynol**
 ***Pulmofluide**
 ***Pulmofluide éphédrine**
Pulmogrog
Pulmogyl
Pulmonaire du
D^r P. Bourgogne
 ***Pulmone**
Pulmonine Bouty
Pulmophédryl
 ***Pulmorectol**
 ***Pulmorex**

Pulmoryl Cody

 ***Pulmoseptine**
Pulmoseptol
Pulmosérum
Pulmosirop

Pulmositoires
Pulmostéryl
Pulmostyl
 ***Pulmo-Thiorine**
- 14, rue de Cllichy, Paris.
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 Eon, Dinan (Côtes-du-Nord).
 14, rue Saint-Claude, Paris.
 2 et 4, pl. St-Martin, Vendôme.
 22, rue de Turin, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 5, rue François-Ponsard, Paris.
 St-Rémy-de-Provence (B.-du-Rhône).
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or).
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 Le Naour, Quimperlé (Fin.).
 37, rue de la Hale-Coq, Aubervilliers.
 3, r. des Rouairies, Dinan.
 26, av. Observatoire, Paris.
 15, rue de Rome, Paris.
 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 12, rue Grande, Évreux.
 14, rue du Temple, Calais.
 J. Perrochon, Tours (I.-et-L.).
 20, rue d'Avron, Paris.
 Bonnay, Nogent-s.-Marne (Seine).
 10, impasse Milord, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
 Id.
 Fercocq, La Varenne-Saint-Maur.
 33, rue Lauriston, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 10, rue Vineuse, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 16, rue du Petit-Musc, Paris.
 23, rue des Moines, Paris.
 Mouneyrat, Villeneuve-la-Garenne.
 15, rue de l'Hôtel-de-Ville, Brive.
 183, r. de Rome, Marseille.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 (Voir : *Pulmo-Bailly*).
 r. du Commerce, Montmarault (Allier).
 7, r. Ste-Isaure, Paris (XVII^e).
 à Châteauroux (Indre).
 3, r. Victor-Hugo, Châteauroux.
 39 rue Fondaudège, Bordeaux.

- Pulmothiol**
Pulmovaccin
Pulmoverne
Pulmovitine
***Pulsamone**
Pulsophyle
***Pulvéol**
Pulvérisateur E. C. S.
Pulvérisateur Vaast
Pulvinasol
***Pulvi-Lactéol du D^r**
Boucard
Pulvinha-Pathuro
Pulviséda
***Pulvita**
Pulvobarine
Pulvo - Biphédrine
(aqueuse, huileuse)
Pulvo - Collargophé-
drine
Pulvo-Ephrédrocure
Punch Novela
Puragar
***Purargol**
Purethyl
Purgalax
***Purganol Daguin**
Purganséline
***Purgarex**
Purgatif Voux
Purgelettes Roux
Purgemint
Purgettes Lentilhac
Purgipastilles
Purgos
Purgyl Kœhly
Purolive
Purpuro
***Pyo-Amphogel**
***Pyocoline**
***Pyodarsénol**
Pyodermase
***Pyodolysine**
Pyodont « 21 »
***Pyodyl Inava « B »**
***Pyoformine**
Pyogénol
Pyol Hambro
- Calmels, Auterive (Haute-Garonne).**
 23, rue des Moines, Paris.
 13, rue D^r-Mazet, Grenoble.
Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 59, rue Boissière, Paris (XVI^e).
 102, av. Michelet, St-Ouen.
 10, impasse Milord, Paris.
 10, rue Caumartin, Paris.
 22, rue de l'Odéon, Paris.
 26, rue des Moines, Paris.
 30, rue Singer, Paris.
Le Gallo, à Auray (Morbihan).
 149, av. des Minimes, Toulouse.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
E. Bouchara, 47, rue de Bre-
tagne, Paris.
 11 bis et 13, r. Levert, Paris
 (XX^e).
Id.
Saint-Julien-en-Jarez (Loire).
 46, rue de Rome, Marseille.
Lab. Lugocalcion, Oullins
(Rhône).
 74, rue des Jacobins, Amiens.
 24, rue Monttessuy, Paris.
 7-13, r. Bobillot, St-Maur (Seine).
Ansel, Samer (Pas-de-Calais).
 17, av. Charles-Lambert, Cha-
 tou (S.-et-O.).
 31, av. Michel-Bizot, Paris.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
Moulin, 50, rue de la Répu-
blique, Puteaux.
 33, fg Montmartre, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 7 bis, rue Galvani, Paris.
 117, r. Vieille-du-Temple, Paris.
 25, av. Ledru-Rollin, Le Per-
 reux (Seine).
 133, r. Lecourbe, Paris.
 21, bd de Riquier, Nice.
 2 et 4, pl. St-Martin, Vendôme.
 14, r. de Normandie, Asnières.
 pl. du Marché, La Rochelle.
 2, rue des Trois-Mages, Marseille
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (S.-et-O.).
 14, rue de Normandie, As-
 nières.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 14, r. de Normandie, Asnières.
 1, r. de Châteaudun, Rennes.

- *Pyorex 15, rue de Rome, Paris.
- Pyoseptol 13, r. de Paris, Clichy (Seine).
- *Pyo-Vaolydun 27, rue Desrenaudes, Paris.
- Pyovargol 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Pyrallium 9 et 9 bis, rue Borromée, Paris.
- Pyramidon U. R. 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Pyran 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Pyratone 71, bd Saint-Michel, Paris.
- *Pyrélaïne Collas Mougnaud, Longjumeau (S.-et-O.).
- *Pyréthane 18, rue Ernest-Rousselle, Paris.
- Pyréthrine 15, rue d'Argenteuil, Paris.
- Pyréthrosol 18, rue de la Perle, Paris.
- Pyréthroxyl rue Faidherbe, Lille.
- Pyridone D^r Berlioz Zédaire, à Chambéry.
- *Pyri-Pyridium Servier, Orléans (Loiret).
- Pyrocidine 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- Pyroclase 15, rue des Champs, Asnières.
- *Pyrocurool 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
- *Pyroléol Edet 25, bd Beaumarchais, Paris.
- *Pyroselline 56, bd Ornano, Paris.
- Pyrosedol Doladille, St-Aignan-sur-Cher (L.-et-C.).
- *Pyurol 15, r. J.-Jaurès, Puteaux (Seine).

Q

- *Quassia-Kina Rabot 49, rue Bitché, à Courbevoie.
- Quassine Frémint 6, rue Abel, Paris.
- Quassine Houdé 9, rue Dieu, Paris.
- *Quassinol 73, bd Baille, Marseille.
- Québralgine 2, bd Pershing, Paris.
- Quiétol 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Quiétudol Bertrand, Nomexy (Vosges).
- Quiétyl 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
- *Quina Baron 3, pl. Miséricorde, Lyon.
- *Quina Bourcet 7, av. du Doyenné, Lyon-St-Jean
- *Quinacrine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Quina pepsiné Blot 38, bd de Strasbourg, Toulouse.
- Quinacinas 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne-Colombes.
- Quina-Fer des Vosges 21, r. de la Gare, La Broque (B.-R.).
- Quina-Fer Mechling à Mulhouse.
- Quina Laroche Comar, 20, rue des Fossés-Saint-Jacques, Paris.
- Quinamagnésion Sauba, Montreuil (Seine).
- Quinarsol antianémique Grandval 12 et 14, rue Féry, Reims.
- *Quinarsol Fébrifuge Grandval 1d.

- Quinastase
 Quinby
 *Quindynol Gmet
 Quinéase
 *Quinéine
 *Quinenol
 *Quinicardine
 *Quinimax
 Quinimuthol Saca
 *Quinine - Calcium -
 Sandoz
 *Quinine Pelletier
 *Quinino-Phytine
 Quinio-Goyl Meurice
 Quiniopraequine
 *Quinio-Stovarsol
 Quinismuth
 Quinium Roy
 Quinium Roy phos-
 phaté
 *Quinobore
 Quinobrome
 *Quinocarbine
 Quinodermine
 *Quinoforme Lacroix
 *Quinoïdine Duriez
 Quinol
 *Quinolax
 Quinophage
 Quinopyrol
 Quinorhéine Duteil
 *Quinosiphon
 Quinotane Valguy
 Quinothorium
 Quinovarine
 *Quinquina Gmet
 Quinquina granulé
 Astier
 Quinquina Grandval
 Quinquina Watelet
 *Quinsal
 *Quinthéryl
 *Quinti-Suppos
 Quintolyse Feret
 Quinurea
 *Quintozone
 *Quinuryl
 Quiphos Churchill
 Quotibyl
- 56, r. St-Lambert, Marseille.
 62, rue Erlanger, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 Drouet et Plet, Rueil-Malmaison
 (S.-et-O.).
 21, rue Chaptal. Paris (IX^e).
 4, rue Richer, Paris.
 27, rue de la Procession, Paris.
 154, av. Malakoff, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 (Voir : *Calgluquine.*)
 Vial, 8, rue Vivienne, Paris.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 61, av. Louise, Bruxelles.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 89, av. Wagram, Paris.
 81, bd Suchet, Paris.
 id.
 143, rue du Temple, Paris.
 15, r. des Champs, Asnières.
 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris.
 54, av. de la Bourdonnais,
 Paris.
 37, rue Pajol, Paris.
 20, pl. des Vosges, Paris.
 G. Henry, à Vernon (Eure).
 7, r. L.-Jeannin. La Garenne
 (Seine).
 18, r. de la Perle, Paris.
 48, av. Porte-d'Ivry, Paris.
 90, av. Saint-Ouen, Paris.
 25-27, r. du Com^t-Rivière, Cô-
 lombes (Seine).
 12, rue Charles-V, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 27, fg Montmartre, Paris.
 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 12-14, rue Féry, Reims.
 15, av. du Parc-Montsouris,
 Paris.
 34, r. Thiers, Gray (H^{te}-Saône).
 1, rue Paul-Bert, Angers.
 38, r. de la République, Montlu-
 çon.
 4, rue des Martyrs, Paris.
 22, r. de la Bienfaisance, Paris.
 25, bd Edgar-Quinet, Colombes.
 34, rue Sedaine, Paris.
 92, av. Saint-Mandé, Paris.
 29, av. d'Orléans, Paris.

R

- Rachisténine** 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
- Radiargyl** 51, r. d'Alsace, Courbevoie.
- Radiesthésie médicale** 88, rue Duhesme, Paris.
- Radioactine** 24, r. de Montessuy, Paris (VII^e).
- *Radio-Baryx** 1, r. de Paris, Limours (S.-et-O.).
- *Radiohaume Adrian** 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Radiobiogyl** Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Radiocréméline** 17, rue Mayet, Paris.
- Radiodine** 4, rue Saint-Anastase, Paris.
- Radiogyl** Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
- Radiole** 17, rue Mayet, Paris.
- *Radiomagnésium** 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
- Radio-osséine** 264, rte d'Heyrieu, Lyon.
- Radiopaque** 4, r. Lamartine, Nanterre.
- Radiophédrine** Lab. Marin, Pontaillac-Royan.
- Radiophorine** Jooss, Montreuil (Seine).
- Radiopirine** Coulaud, Lorris (Loiret).
- Radioplasme** 24, rue de Montessuy, Paris.
- *Radio-Salil** 19, rue Drouot, Paris.
- Radiosantal** 24, rue de Montessuy, Paris.
- Radiosérum Jaboin** id.
- *Radiotétrane** 40, rue Bellechasse, Paris.
- [Radio-Thalline** Bassol, Ste-Alvère (Dord.).
- Radiotonine** 4, rue St-Anastase, Paris.
- Radio Topic C.** Lab. Marin de Royan-Pontaillac.
- Radiovitine** Fontanier, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
- Radioviva** 35, rue Cler, Paris.
- Radiovules** 51, rue d'Alsace, Courbevoie.
- Radipirine** 9, rue Victor-Letalle, Paris.
- Radiurèse** Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
- Radiuryl** id.
- *Radonol** 110, bd Haussmann, Paris.
- Radonol-Opthal** id.
- Raiforyl** 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer.
- Raisin quotidien** Chartier, Saumur (M.-et-L.).
- Rami-goutte** 44, r. Chaptal, Levallois-Perret.
- Rangol** 191, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
- *Raphabil** 20, rue Vernier, Paris.
- *Rapharène** Journet, 18-20, rue Vavin, Paris.
- Rapidoats** Bloch, à Tomblaine (M.-et-M.).
- Rapnol** 50, av. de Normandie, Colombes.
- *Ravix** 2-4, rue Catulle-Mendès, Paris.

Réalgose
Réaline
***Réalphène Buisson**
***Recal** (Voir : *Comprimés*)
Récalcifiant Henry
Reclusol
***Reconstituant Mary**
***Recrésal**
***Rect'Acolitol**
***Rectagine**
Rectanol
Rectocalm
***Rectoline**
Rectoma

***Rectopanbiline**
***Rectopansemment-Ami-**
biasine
Rectoplasme
***Rectoseptal**
***Rectosol**
Recto-Vaccin Salan-
tales
Recytèle
Réflistine
Reginase
Régulase Efgé
Régulaxane

Reinaxine
Rein - Endocrisines
Fournier
Reinicalcine
Remède Boss
Renaleptine
Renalgine
Renetol
***Renocardine**
***Rénoline**
Renosiphon
Renotanic Grémy
Renovir
***Renovitase**
Renovol
Renovules
***Rénoxyl**
Réparateur Thuau
***Résocaïne**
***Résolutif Ruby**
***Résyl**

***Réthragine**
***Rétropituine Carrion**
Retusol

102, av. Michelet, Sant-Ouen.
 Guillaume, Issoudun
 98, rue de Sèvres, Paris.

Fleury, Arcachon (Gironde).
 39, rue de Sclessin, Liège.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 32, rue de l'Ouest, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 71, av. V.-Emmanuel-III, Paris.
 22, r. de la Sorbonne, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 55, rue de Chabrol, Paris.
 M. Soulas, Surgères (Ch.-I.).
 Delaunay, 119 bis, r. Victor-
 Hugo, Tours.
 à Annonay (Ardèche).
 69, rue de Wattignies, Paris.
 Millet, à Rambouillet.
 154, av. Malakoff, Paris.
 M. Soulas, Surgères (Ch.-I.).
 42, r. Grandes-Arcades, Stras-
 bourg.
 Mer Rouge, Mulhouse.
 20, rue du Conseil, Bruxelles.
 20, rue de Pétrograd, Paris.
 40, av. Secrétan, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris, et 8, r.
 de Hollerich, Luxembourg.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).

 7, rue Biscornet, Paris.
 191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
 Prax, à Brest (Finistère).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 Duval, à Falaise.
 Perrochon, Tours (I.-et-L.).
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 39, r. de Sclessin, Liège.
 14, rue de Clichy, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 50, av. Jacqueminot, Meudon.
 22, rue de Paris, Houilles.
 id.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 L^{re} Lugocalcion, Oullins (Rhône).
 Voiron (Isère).
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 119 bis, av. Ch.-de-Fer, Rueil
 (S.-et-O.).

Reviscentyl*Revitalose*****Révulsif Adrian*****Révulsif Boudin****[Révulsif Dynamy*****Révulsif Fisch*****Révulsif Fouchère****Révulsif liquide S R*****Révulsif Manor*****Révulsif Milko****Révulsif Saporex****Révuksigène****Révulsior****Rexacarbine****Réxiode*****Rhagadine Bracque-****mond****Rhamnausol****Rhamnine Henry*****Rhéantine Lumière****Rhésalgine-Vicario****Rheumasan****Rhinadorine****Rhinadrargol*****Rhinadrol*****Rhinalator****Rhinaldose****Rhinalène****Rhinalginol*****Rhinamide*****Rhinaquintine****Rhinargol*****Rhinarsénol****Rhinarvox*****Rhinaspir*****Rhine****Rhinédrine****Rhinil*****Rhino-Amphogel*****Rhino-Antipiol*****Rhino-Borostyrol*****Rhino-Colloïdol****Rhinodol*****Rhinodrops*****Rhinofluine****Rhinogeraniol****Rhinogénol*****Rhino-Guottyl*****Rhinol*****Rhino-Lactéol du D^r****Boucard****Rhinolan****Rhinolin****125, Grande-Rue, Oullins**
(Rhône).**21, r. de Neuilly, Nanterre.****9 et 11, rue de la Perle, Paris.****9, av. J.-Jaurès, Joinville-le-**
Pont (Seine).**Chavanne, Fontaine-Grenoble**
(Isère).**Mer Rouge, Mulhouse (Ht-Rh.).****Rive-de-Gier (Loire).****4, rue Levert, Paris.****St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).****60, cours Émile-Zola, Lyon.****184, route de Genas, Lyon.****Calmels, Auterive (H^{te}-Garonne).****Paulin et Barre, Tours.****G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).****16, r. H.-Régnauld, Courbevoie.****71, av. de Villiers, Paris.****61, bd Malesherbes, Paris.****39, rue de Sclessin, Liège.****45, rue Villon, Lyon.****17, bd Haussmann, Paris.****11, rue Malher, Paris.****33, fg Montmartre, Paris.****56, Gde-Rue, Harnes (P.-de-C.).****40, r. des Acacias, Paris.****5-7, r. Claude-Decaen, Paris.****102, av. Michelet, Saint-Ouen.****Richard, Aubenas (Ardèche).****Longuet, 34, r. Sedaine, Paris.****15, rue de Rome, Paris.****58, rue de Vouillé, Paris.****71, bd Saint-Michel, Paris.****2, allées de Chelles, Le Raincy**
(S.-et-O.).**Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.)****21, rue de Lyon, Paris.****Fleury, Brest (Oise).****9, impasse Thoréton, Paris.****Orga, Avignon (Vaucluse).****21, bd de Riquier, Nice.****8, av. Walkanaer, Nice.****1, pl. Victor-Hugo, Paris.****91, rue de Monceau, Paris.****50, r. de la République, Puteaux.****194, rue de Rivoli, Paris.****5, r. François-Ponsard, Paris.****36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.****97, rue Martainville, Rouen.****Denis, 20, rue du Laos, Paris.****80, fg Saint-Denis, Paris.****30, rue Singer, Paris.****24, rue Jardel, Bordeaux.****82, av. Malakoff, Paris.**

- *Rhino-Liposeptine**
 Rhino-Mèches grasses
***Rhino-Orargol simple**
 et éphédriné
 Rhinophédrine
 Rhino-Pro
 Rhinorcine
 Rhino-Robur
 Rhino-Sec
 Rhinostagone
 Rhino-Titane
***Rhino-Sulforgan**
 Rhinotherme
 Rhino-Vaccin Creuzé
 Rhino-Vaccin Inava
 Rhino - Vaccin Salan-
 tale
***Rhino-Vaclydun**
***Rhizotanin**
***Rhocya**

***Rhodarsan**
***Rhodazil**
***Rhodiacarbine**
 Rhodiaphylline
 Rhodium Amicros
***Rhodoboryl**
 Rhodocaïne
 Rhodoquine
***Rhoféine**
 Rhomnol Leprince
 Rhumacrescol

***Rhumofan**

 Ricigel

***Ricigonol**

***Ricilax**
 Ricinopalmine
 Ricinpoudre
 Ricipurgol
 Ricomalt
 Rinoleina
***Riodine Astier**
***Rob Cabanès**
 Rob Dussang
 Rob Gory
***Rob Oberlin**
***Robrodyne**
 Roburex
***Roche-Posay**
***Rodilone**
 Rodopræquine
***Rogerma**
 Roléine
- 2, pl. des Vosges, Paris.
 5, Grande-Rue, Montpellier.

 177, rue de Courcelles, Paris.
 149, r. des Minimes, Toulouse.
 8, rue Riblette, Paris.
 133, rue Lecourbe, Paris (XV^e).
 72, av. Thiers, Le Mans.
 74, r. de Lourmel, Paris.
 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).
 P. Métadier, Tours.
 16, r. de Gramont, Paris (II^e).
 Bagnères-de-Bigorre (Htes-Pyr.).
 74, rue de Lourmel, Paris.
 14, rue de Normandie, Asnières.
 42, r. Grandes-Arcades, Stras-
 bourg.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 56, bd Ornano, Paris.
 39, bd de La Tour-Maubourg,
 Paris (VII^e).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 id.
 id.
 177, r. de Courcelles, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 18, av. Hoche, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 62, rue de la Tour, Paris.
 14, Gde-Rue, Pont - de - Vaux
 (Ain).
 33, r. Rempart-Matabiau, Tou-
 louse.
 7, rue Lucien-Jeannin, La Ga-
 renne-Colombes.
 2, rond-point du Centre, La
 Garenne-Colombes (Seine).
 60, rte de Châtillon, Malakoff.
 5, bd des Brotteaux, Lyon.
 15, rue de Naples, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 42, r. du D^r-Blanche, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 Lescaroux, Châteauroux.
 Jooss, Montreuil (Seine).
 Tinardon, 17, r. Cadet, Paris.
 L. Robert, Niort (D.-S.).
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 La Roche-Posay (Vienne).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 Mahieu, Lens (Pas-de-Calais).
 49, r. de Bitche, Courbevoie.

Romaboldo	119, rue de Sèze, Lyon.
*Romarène	18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.).
Romarol	81, av. Malakoff, Paris.
*Rosalax (pilules)	11, rue Roger-Bacon, Paris.
Rosalyl	Rueil-Malmaison (S.-et-O.).
Rosanol	L. Hinglais, à Épernay.
Rosaphédrine	Farman, 19, r. Auber, Paris.
*Rosaseptor	21, rue de Lyon, Paris.
Rossoline	5, av. E.-Boissier, Nantes (L.-I.).
Royanol	Lab. de l'Océanie, Royan (Ch.-I.)
Royérine Dupuy	223, rue Saint-Martin, Paris.
*Roziode	6, rue de Navarin, Paris.
Rozoderme	11, rue des Deux-Ponts, Paris.
Rubargyre	72, quai Jemmapes, Paris.
*Rubiaderm	89, rue du Cherche-Midi, Paris.
*Rubiazol	id.
*Rubrophène	25, bd de La Tour-Maubourg, Paris.
Rubyl	21, rue Jean-Goujon, Paris.
*Rutonal	id.
Rythmensime	23, bd Raym.-Poincaré, Bar-le-Duc.
*Rythmosystol	60-62, r. St-Guilhem, Montpellier.
Ryvema	8, rue Riblette, Paris (XX ^e).

S

*Saburrase	30, r. A.-Silvestre, Courbevoie.
*Saccharol Rosso	3, rue Lamblardie, Paris.
Sacérase	20, r. du Pré-St-Gervais, Paris.
*Sacnel	10, rue du Plâtre, Paris (IV ^e).
*Saint-Aré	Sté des Eaux minérales de Decize, 10, r. de la Barouillère, Paris.
*Salantale	42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
Salbiase	La Baule-sur-Mer (Loire-Inf.).
*Salbine du D^r Fayès	2 et 4, place Gambetta, Paris.
*Salénal Ciba	103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
*Salène Ciba	id.
Salganyl	(Voir : <i>Dépuratif Salganyl</i> .)
Sali-Buccal	7, rue Chaptal, Paris.
*Salibra	1, rue des Jardins, Asnières.
Salicaïne	168, bd Saint-Germain, Paris.
Salicaire Dausse	4, rue Aubriot, Paris (IV ^e).
Salicaire Henry	39, rue de Sclessin, Liège.
Salicairine	37, av. de l'Opéra, Paris.

- Salicéral Clin**
Salicol Dusaule
 *Salicure
 *Salicylate Ana surac-
 tive
 *Salicylate de soude
 Clin
 Salicylate Le Perdriel
 Salicylate Manor
 *Salicylna
 *Saliformiode
 Salinaglut
 Saliode
 Saliphoryl
 *Sali-Rectal
 Sali-Suppo
 *Salitropine Aguetant
 Salmenthyl
 Salsanos
 *Sal-Sodyl
 Salt Pepton
 *Salubrine
 Salubrine Dentaire
 *Salvacid
 Salvandra
 Salvanos
 Salva-Sérum
 Salvatyl
 *Salvé
 *Salvebyl
 *Salvenase Legoux

 Salvoxyl
 Salychlore
 *Salyfrène
 *Salyptol Narty
 *Salysérum

Sambul
 (liquide et comp.)
 Sanaféine
 *Sanalepsi Russi
 Sanalgine
 Sanalia
 *Sanargol
 *Sanarteryl
 *Sanas
 Sandar
 *Sandoptal
 *Sanedrine
 *Sanex Inhalant
 Sanguifer Bouret
 *Sanguil
 Sanguine irradiée
 Sanguinova
 Sangule Dubat
 Sanicérène
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 6, rue Abel, Paris.
 19, rue du Bac, Paris.

 18, av. Daumesnil, Paris.
 20, rue des Fossés-St-Jacques,
 Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 St-Germain-du-Bois (S.-et-L.).
 D^r Lavoué, Rennes (I.-et-V.).
 57, bd A.-Briand, Champigny.
 2, rue Michelet, Alger.
 55, av. des Ecoles, Cachan.
 43, r. des Chantiers, Versailles.
 7, rue Chaptal, Paris.
 id.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 4, rue de Metz, Toulouse.
 7, r. L.-Jeannin, La Garenne.
 5, bd Gambetta, Grenoble.
 9, av. J.-Jaurès, Lyon.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 id.
 Mialhe, 8, rue Favart, Paris.
 71, fg St-Honoré, Paris (VIII^e).
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 42, r. E.-Deschanel, Courbevoie.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 45, rue du Fg-St-Denis, Paris.
 6, r. Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes (Seine).
 237, rue Lafayette, Paris.
 46, rue de Rome, Marseille.
 210, av. de Toulon, Marseille.
 134, bd Pereire, Paris. ~~ma~~
 Drouet et Plet, Rueil-Mal-
 maison (S.-et-O.).

 22, r. St-Pierre, Evreux (Eure).
 7, rue Biscornet, Paris.
 78, bd Beaumarchais, Paris.
 Sanal, St-Louis (Haut-Rhin).
 35, rue des Fcs-Bourgeois, Paris.
 13, quai Ragobert, Joigny (Y.).
 124, r. St-Dominique, Paris.
 22, r. de l'Est, Boulogne-s.-Seine.
 av. de Grasse, Cannes.
 20, rue Vernier, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 8-10, rue Masséna, Nice
 87, rue Lafayette, Paris.
 12, rue Saint-Gilles, Paris.
 40, rue des Abbesses, Paris.
 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 24, r. des Plantes, Paris.

Sanka	54, quai de Boulogne, Boulogne-s.-Seine.
*Sanocry sine	39, r. Fondaudège, Bordeaux.
Sanocure	62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
*Sanoformine	1, pl. Victor-Hugo, Paris.
Sanogène	62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
*Sanogyl	5, rue Paul-Barruel, Paris.
Sanogynol	161, rue Croix-de-Seguey, Bordeaux (Gironde).
Sanomint	13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
*Sanoquinol	103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
*Sanoram	5, rue Paul-Barruel, Paris.
Sanos	Lab. Miquel, 1, av. Lowendal, Paris.
Sanovenol	14, rue Demarquay, Paris.
Sanpur	80, fg St-Denis, Paris.
Santal Bretonneau	10, pas. Morel, Montrouge.
Santal Clin	20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris.
Santal Dolmay	71, av. République, Champigny (Seine).
Santalex	14, rue Demarquay, Paris.
Santal Henry	36, quai Fulchiron, Lyon.
*Santal Midy	8, rue Vivienne, Paris.
*Santal Monal	13, av. de Ségur, Paris (VII ^e).
Santal Oberlin	17, rue Cadet, Paris.
Santal P. Petit	12, bd Saint-Martin, Paris.
Santal Salolé	37, rue Pajol, Paris.
Santal Salolé Cabanès	17, rue Cadet, Paris.
Santaline Daupez	37, rue des Lois, Toulouse.
Santalol Montagu	10, rue de la Barouillère, Paris.
*Santamide	13, av. de Ségur, Paris.
Santéine Montagu	10, rue de la Barouillère, Paris.
*Santhéose	4, rue du Roi-de-Sicile, Paris.
*Santonia	139, av. E.-Zola, Paris.
Santurol	21, rue des Roses, Dijon.
Santyol	Cosson, Romainville (Seine).
Sanubrol Mars	Guérande (Loire-Inférieure).
Sanuryl	20, rue de Rivoli, Paris.
Saphylococcine	21, r. Chaptal, Paris (IX ^e).
Sapobarbe	29, rue Singer, Paris.
Sapocade	id.
Sapocrème	id.
Sapocridine	15, quai Bourbon, Paris.
Sapodol	Chavanne, Fontaine-Grenoble (Isère).
Sapogynol	74, rue Blanche, Paris.
*Sapolan	29, rue Singer, Paris.
*Sapolinol	40, cours Richard-Vitton, Lyon.
Sapolysine	18, rue Daguerre, Paris.
Sapopâte	29, rue Singer, Paris.
*Saporex	184, rte de Genas, Lyon (III ^e).
*Saposide	29, rue Singer, Paris.
*Saproxyl	7, r. L.-Jeannin, La Garenne (Seine).

- Sarcoglobine**
Sarcohémol
- Sarcolactine**
 ***Sarcoptol**
Sargéthyle
- ***Saridon**
Satine
 ***Saturalgine**
Saturaline
Saturateur Chomet
Saturol
Saubarsinol
Saucholine
Sauge Gmet
Savon Aiphème
Savon Bébia
Savon dentifrice Vigier
Savon de Sapolan
Savon Glytra
Savon au goudron
Savon Iodé Oberlin
Savons Benys
Savons Denisol Brisson
Savons ichthyol, sou-
fre, etc.
Savons Méta-Titane
Savons Michon
Savons Mollard
Savon Neutrèpur
Savon Perusol
Savons liquides Ramet
- Scatagar**
Scialine
Sciaticure
 ***Scillarène**
Scillase
Scillitensyl
- ***Scillitrine**
Scléramine Dausse
 ***Sclérana**
Sclérobyl
 ***Sclérolysine**
 ***Sclérosérol**
 ***Sclérosérum Ana**
Sclérotensyl
- Scléroveïne Hardy**
Scopolamine Houdé
Scorogènes
 ***Scurocaine**
Scuroforme
Sealandair
Séborrhéine
- Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).**
Huyghe, Brazey-en-Plaine (C.-
d'Or).
 28, bd de la Cluse, Genève.
 177, rue de Courcelles, Paris.
 56, av. Ed-Vaillant, Boulogne-
 Billancourt.
 10, rue Crillon, Paris.
 7, rue Galvani, Paris.
 3, bd Beaumarchais, Paris.
 80, r. du Fg-St-Denis, Paris.
 23, rue Beautreillis, Paris.
 Duret & Rémy, Asnières.
 Sauba, Montreuil (Seine).
 id.
 27, fg Montmartre, Paris.
 Mercier, Fécamp (S.-Inf.).
 5, av. E.-Bolssier, Nantes.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 29, rue Singer, Paris.
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 Mougnaud, Longjumeau.
 17, rue Cadet, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 157, rue Championnet, Paris.
 Vigier, 12, bd Bonne-Nouvelle,
 Paris.
 P. Métadier, Tours.
 10, rue de la Barouillère, Paris.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 31, rue Gambetta, La Rochelle.
 Fontenay-Mauvoisin, par Man-
 tes (S.-et-O.).
 46, rue de Rome, Marseille.
 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
 121, av. Saint-Ouen, Paris.
 20, rue Vernier, Paris.
 85, r. des Morillons, Paris (XV^e).
 Delaunay, 119 bis, r. Victor-
 Hugo, Tours.
 Perrier, 12, rue Henner, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 18, av. Daumesnil, Paris.
 65, av. Victor-Hugo, Paris.
 191, rue St-Honoré, Paris.
 40, r. Claire-Paulhac, Toulouse.
 (Voir : *Sclérana*.)
 Chavanne, Fontaine-Grenoble
 (Isère).
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 id.
 « Angla », Monte-Carlo.
 4, rue de Metz, Toulouse.

- Sécacornine Roche** 10, rue Crillon, Paris.
Seccase Dubat, 80, fg St-Denis, Paris.
Sécurigène 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
- ***Sédabios** 8, rue St-Martin, Paris.
 ***Sédacônes** Bailly, 15, r. de Rome, Paris.
 ***Sédacrine** Soulas, Surgères (Ch.-Inf.).
Sédalgol 23, rue Beautreillis, Paris.
 ***Sédangor** 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-Orge (S.-et-O.).
- ***Sédaortine** 72, quai Jemmapes, Paris.
Sédarsan Optima Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 ***Sédarthryl** 32, r. de l'Ouest, Paris.
Sédasia 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris.
 ***Sédasthmine** 3, bd Beaumarchais, Paris.
 ***Sédatan** Ledent, Montreuil-sur-Mer (Pas-de-Calais).
- Sédatif Py** 58, bd Richard-Wallace, Puteaux.
- Sédatine Christiaens** 4, rue Colbert, à Reims.
Sédaton Leo 21, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 ***Sédatonyl** 7, imp. de la Sous-Préfecture, Roanne.
- Sédatose Gigon** 25, bd Beaumarchais, Paris (IV^e).
Sédatuline 46, rue de la Barrière, Elbeuf.
 ***Sédatussine** 6, av. V.-Hugo, Paris.
Sédent 98, rue de Sèvres, Paris.
Sédergine Saint-Just-en-Chaussée (Oise).
 ***Sédhépatine** 124, rue St-Dominique, Paris.
 ***Sed'Hormone** 4, place des Vosges, Paris (IV^e).
 ***Sédibaïne** 20, av. J.-Jaurès, Suresnes (S.).
 ***Sedlitz Ch. Chanteaud** Chambourcy (S.-et-O.).
Sedobore 83, bd de la Villette, Paris.
 ***Sédobrol Roche** 10, rue Crillon, Paris.
Sédo-Bronchol 2, rue des 3-Mages, Marseille.
Sédocardine Barré, 7, pl. Pereire, Paris.
 ***Sédo-Caréna** 39, bd de la Tour-Maubourg, Paris.
- Sédoderme** Ferrand, 2, av. de Friedland, Paris.
- Sédoflorine** 24, bd Sébastopol, Paris.
 ***Sédofoilline** 42, r. du Mont-Cenis, Paris.
Sédoformine 18, rue de la Perle, Paris.
 ***Sédogastrine** Zizine, 24, r. de l'Écamp, Paris.
Sédogène Sallé 14, rue des Pyramides, Paris.
 ***Sédogastrol** 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
Sédogoutte 19, rue du Bac, Paris.
 ***Sédo-Gynœstryl** 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
- ***S é d o - Hypotenseur**
 Dausse 4, rue Aubriot, Paris.
- ***Sédol** 98, rue de Sèvres, Paris.
Sédomens 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.
Sédomictol 21, rue de Lyon, Paris (XII^e).
 ***Sédoneurol** 50, rue Nationale, Lille.
Sédo-orargol 177, r. de Courcelles, Paris.
Sédoparine 245, r. de Vaugirard, Paris.
Sédopathyl 62, bd St-Germain, Paris.

- Sédopavérine**
Sédopelvien
- *Sédopeptine**
Sédophoryl
Sédoplasme
Sédoplexine
***Sédoprostyl**
Sédorectal
Sédorgine
***Sédorhinol**
***Sedormid Roche**
***Sédosalyl**
Sédoseptyl
***Sédosine**
Sédosol
Sédospasmose
Sédotine
***Sedotonine**
***Sédotyol**
Sédo Viète
***Seignet'fruits**
Seinderm Mars
Sekle
Sektal Grémy
***Selenalgine**
***Seleniol**
Sels Clarks
Sel D
***Sels de Bains R. P.**
***Sel de Hunt**
***Sel d'Ewald**
- *Sel digestif Bé Me Cé**
Sel hépatique U. N.
Arquevaux
Sels Heudebert (achloruré et hypochloruré)
Sels Intar
Sels du Jura
Sels de lithine effervescents
***Sels Mags**
Sels Marva
Sels Montecatini
Sels Na 4
Sel de Salins-Moutiers
***Selor**
Selsodion
***Selunic**
- *Sel Vial**
Sel Vichy-État
Sel Vital RX
Sel Zem
- 122, fg Saint-Honoré, Paris.
 196, r. de Paris, Montreuil-s.-Bois.
 60, rue de Monceau, Paris.
 11, r. de Flandre, Paris (XIX^e).
 276, rue Lecourbe, Paris.
 31, bd de la Villette, Paris.
 8, rue Vivienne, Paris (II^e).
 31, bd de la Villette, Paris (X^e).
 33, Grande-Rue, Besançon.
 276, r. Lecourbe, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 60, route de Châtillon, Malakoff.
 37, r. des Lois, Toulouse.
 38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
 97 bis, r. Martainville, Rouen.
 Lab. Demasles, Vienne (Isère).
 157, r. Championnet, Paris.
 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
 60, rue de Monceau, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 route du Moulleau, Arcachon.
 Guérande (Loire-Inférieure).
 51, rue Rennequin, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 Guin, Contres (L.-et-C.).
 18, av. Hoche, Paris.
 16 bis, rue Vivienne, Paris.
 Dupuy, à Montluçon (Allier).
 La Roche-Posay (Vienne).
 16, r. Boulainvilliers, Paris.
 105, r. de Normandie, Courbevoie.
 21, rue Violet, Paris.
- à Étampes (Seine-et-Oise).
 4, rue Lamartine, Nanterre.
 83, bd de la Villette, Paris.
 11, av. de l'Opéra, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 88, rue Duhesme, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris.
 Leurquin, Dreux (E.-et-L.).
 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 3, rue de Vouillé, Paris.
 46, rue des Faures, Bordeaux.
 Lab. Miquel, 1, av. Lowendal, Paris.
 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon.
 24, bd des Capucines, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 85, rue Turbigo, Paris.

- *Senecine
 49, av. Victor-Hugo, Boulogne (Seine).
 *Seneçonine
 1, r. Raynouard, Paris.
 Sénophile
 17, rue de Berri, Paris. }
 Séphydine
 Chabeuil (Drôme). }
 *Septazine
 21, r. Jean-Goujon, Paris.
 *Septicarbène
 60, rue de Monceau, Paris.
 *Septicéma
 122, Champs-Élysées, Paris. }
 *Septicémine Cortial
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 Septichrome
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 *Septicoline
 Rougeyrolles, pl. République,
 Gramat (Lot).
 *Septiderme
 8-10, r. Croix-Belle-Porte, Saint-
 Quentin.
 Septiphagyl
 15, r. des Champs, Asnières.
 Septisan
 33, r. Rempart-Matabiau, Tou-
 louse.
 *Septodrainol
 46, r. de Trévise, Paris.
 *Septogone
 15, r. Catulienne, St-Denis.
 Septolan
 Laffort, Joué-lès-Tours (I.-et-L.).
 Septometrol
 41, av. Joffre, La Garenne.
 *Septoplax
 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
 Septylase
 157, r. Championnet, Paris.
 Séquardine Bouty
 3, r. de Dunkerque, Paris.
 Sérélbé
 L. B. L., 18, r. Daguerre, Paris.
 *Sérénol
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 *Séricrine Rey
 12, rue Montmartre, Dijon.
 *Serifer Laurençon
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Seringue Léo (spéciale
 pour insuline)
 149, r. du Palais-Gallien, Bor-
 deaux.
 Sérípol
 21, rue de Neuilly, Nanterre.
 Sérobel
 L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.
 *Sérobiol
 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 *Sérocaldine
 Lab. Lorrain de produits purs
 Étain (Meuse).
 Sérocampbre
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 Sérocarbène
 72, rue Saint-Dominique, Paris.
 Séro-Citral
 1, av. de Villars, Paris.
 Séro-Collosol
 116, bd Haussmann, Paris.
 *Séro-Comprimés I. M.
 18, cours Suchet, Lyon.
 *Sérodausse
 4, rue Aubriot, Paris.
 *Sérodausse Ovarien
 id.
 *Sérodausse infantile
 id.
 Séroforce
 14, r. Demarquay, Paris.
 *Séroglobine
 Aubery, Avignon (Vaucluse).
 Sérogyne
 L. B. L., 18, rue Daguerre, Paris.
 *Sérolactyl I. M.
 18, cours Suchet, Lyon.
 Séroléine
 C. Baron, Sables-d'Olonne.
 *Séro-liquide
 18, cours Suchet, Lyon.
 *Séroma Rey
 12, rue Montmartre, Dijon.
 Séro-Neuropsychique
 191, fg St-Antoine, Paris.
 Séroquinol
 15, rue des Champs, Asnières.
 Séro-Sérum Rivier
 10, passage Morel, Montrouge.
 Serosine Boullé
 19, rue de la Porte-Trivaux,
 Clamart (Seine).
 Sérosthényl Bouty
 3, rue de Dunkerque, Paris.

- Séro-Vaccin . Antipyo-**
gène
Séroxamine
***Séroxéma**
Serpoline
***Séru (gouttes, pom-**
mades, suppos)
***Sérum antiasthmati-**
que de Heckel
Sérum antiphymique
Vadam
***Sérum antitypholdique**
de Rodet
Sérum Collyre
***Sérum Ferrugineux**
Fraisse
***Sérum de Jousset**
Sérum maternel
***Sérum Névrosthénique**
Fraisse

Sérum Nevrotone
***Sérum Oliviero**
Sérum polymicrobien
***Sérum Polyvalent de**
Leclainche et Vallée
Sérum sthénique
***Sérum végétal**
***Sérums Clin**
***Sérums Pasteur**
***Sérums et Vaccins**

***Servo-Freinyl**
***Seti**
***Setipyrine**
Setirtem
Sféol

S. I. A. V.
S. I. C.
Siccogyne

Siccol
***Sicovaire**
***Sidéranyl**
Sidérarsan
Siforcia
Sigbi

Sigmoldine Grémy
Sigmotal
Sigol
***Silguine**

Silicate de soude
Pellissier
***Silloyl**
- 97, rue de Vaugirard, Paris.
62, r. Gioffredo, Nice.
1, rue de Phalsbourg, Paris.
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
103, r. St-Lazare, Paris.]
Corbière, 27, rue Desrenaudes,
Paris.
(Voir : *Antiphymique*.)
36, q. Fulchiron, Lyon.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
(Voir : *Amp. Ferrugineuses*
Fraisse.)
17, rue de Berri, Paris.
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
(Voir : *Amp. Névrosthéniques*
Fraisse.)
12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Boulogne-sur-Seine.
36, r. Francs-Bourgeois, Paris.
97, rue de Vaugirard, Paris (VI^e).
78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
19, r. des Chalets, Toulouse.
20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
36, r. du D^r-Roux, Paris.
49, r. des Soldats, Berchem-Ste-
Agathe (Belgique).
52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
157, r. Championnet, Paris.
157, r. Championnet, Paris.
8, rue Passy, Paris.
15, r. Catulienne, St-Denis
(Seine).
8, av. des Sources, Nice.
P. Métadier, Tours.
41, av. Joffre, La Garenne
(Seine).
5, rue Robert-Planquette, Paris.
89, rue Martre, Clichy (Seine).
52, rue de Cambrai, Lille.
102, av. Michelet, Saint-Ouen.
163, rue de Flandre, Paris.
Delaunay, 119 bis, r. Victor-
Hugo, Tours.
14, rue de Clichy, Paris.
5, rue de Stockholm, Paris.
à Saint-Fons (Rhône).
115, r. de Paris, Boulogne-sur-
Seine.
33, av. de Villiers, Paris.
18, rue Ernest-Rousselle, Paris.

- *Siligone**
***Siliplastine**
***Silisode**
***Silymar**
Sinabin
Sinapisme Rigollet
***Sinapiasme**

***Sinapol**
Sinaqua Nutricia.
***Sinaseptic**
Sinesol
Sinrénalline
***Sinusyl**
Siphons de Méthyle
Bengué
***Siphuryl**
Sirodion

Sirop d'Aconit Ecalle
Sirop antiphlogistique
de Briant
Sirop Artil
Sirop d'Aubergier
Sirop Bégessol

***Sirop au Solucamphre**
Sirop Bala
Sirop béchique Maire
Sirop Belca
Sirop Benit
***Sirop Berthé**
Sirop Blagny
Sirop de Blancard
Sirop Blottière
Sirop Bolla
***Sirop Brahma**
Sirop Briant
Sirop Brichard
Sirop Britannia
Sirop de Broméine
Sirop bromoformique
Henry
Sirop Bronchophilos
Sirop Brumauld
Sirop Buci

Sirop Bural
Sirop carbolique du
D^r Vialle
Sirop du D^r Canac
Sirop Carpeau

***Sirop Cassibor**
Sirop Chalin
- 47, av. de la République
 Villeneuve-le-Roi.
 60, rue de Monceau, Paris.
 4 bis, r. du Colonel-Moll, Paris.
 71, av. Emmanuel-III, Paris. }
 15, rue d'Argenteuil, Paris.
 13, rue Pavée, Paris.
 23, av. de Marilloz, à Aix-les-
 Bains.
 R. Renaud, Anould (Vosges).
 142, r. Fransman, Bruxelles.
 9, pl. Beaugrenelle, Paris.
 44, av. Pasteur, Courbevoie.
 50, rue Nationale, Lille.
 9, pl. Beaugrenelle, Paris.

 16, rue Ballu, Paris.
 34, rue Sedaine, Paris.
 228, r. de Paris, Montreuil-s.-
 Bois.
 98, rue de Sèvres, Paris.

 64, rue La Rochefoucauld, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 57, bd Aristide-Briand, Cham-
 pigny (Seine).
 16, r. H.-Regnault, Courbevoie.
 Brichard, Bar-le-Duc.
 171, rue de Belleville, Paris.
 Thévenot, rue des Roses, Dijon.
 90, cours Gambetta, Lyon.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 85, r. Turbigo, Paris.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 34, r. Thiers, Gray (Hte-Saône).
 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne).
 131, rue Vaugrard, Paris.
 23, bd R.-Poincaré, Bar-le-Duc.
 Labor. Berthier, Grenoble.
 10, r. de la Barouillère, Paris.
 39, rue de Sclessin, Liège (Bel-
 gique).
 6, rue Berbizay, Dijon.
 65, cours National, Saintes.
 Comar, 20, rue des Fossés-
 Saint-Jacques, Paris.
 55, av. Montredon, Marseille.

 87, rue Lafayette, Paris.
 Port-de-Bouc, près Marseille.
 102, av. Camille-Pelletan, Mar-
 seille.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 23, r. Beautreillis, Paris.

- Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine**
Sirop Chevassus
Sirop composé aux Hypophosphites Fellows
Sirop Cophed
***Sirop de Créosote Vacheron**
Sirop Debar
Sirop Delabarre
Sirop de Raifort iodé de Grimault
Sirop Derbecq
Sirop de digitale
Sirop Deroux
Sirop d'hypophosphite de chaux de Grimault
Sirop Diver
Sirop Drocot
***Sirop Dubois au Créosol**
Sirop du D^r Dubreuil
Sirop Ducode
Sirop de Dusart
Sirop Dynamy
Sirop Efryl
Sirop eupeptique Bi-Ci-Pa
Siropeco
Sirop Escolle
***Sirop Eucalyptine**
***Sirop Famel**
Sirop de Fenouil
Sirop Ferret
Sirop ferrug. Laroze
Sirop France
Sirop C. Frany
Sirop Froment
***Sirop de Galarsol**
Sirop Gelineau
Sirop Gelvart
Sirop de Gilbert
Sirop Gigon
***Sirop Girard**
***Sirop de glycérophosphates Vacheron**
***Sirop Gribell**
Sirop du D^r Hecquet
Sirop Helgé
Sirop d'Hémoglobine
Byla
- Aubenas (Ardèche).**
6, rue Berbissey, Dijon.
7, r. L.-Jeannin, La Garenne-Colombes (Seine).
(Voir : Cophed.)
14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Brichard, Bar-le-Duc.
78, fg Saint-Denis, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
12, rue Cadet, Paris.
99, r. d'Aboukir, Paris.
Vic-sur-Aisne (Oise).
8, rue Vivienne, Paris.
50, r. de la République, Puteaux.
83, bd de la Villette, Paris.
51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
37, rue Galilée, Paris.
P. Roche, Aigueperse (P.-de-D.).
8, rue Vivienne, Paris.
Chavanne Fontaine, Grenoble.
98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
71, rue Chaptal, Paris.
Lab. des Vosges, La Broque (Bas-Rhin).
pl. Forbin, Aix (B.-du-R.).
5, rue de Lubeck, Paris.
16 à 22, r. des Orteaux, Paris.
21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
Le Chapelain, Lambezellec (Finistère).
2, rue des Lions, Paris.
23, rue Beautreillis, Paris.
52, av. de la République, Paris.
Bouyssou, Chambois (Orne).
3, rue de Dunkerque, Paris.
28, r. Velpeau, Antony (Seine).
24, rue Bagnolet, Paris.
35, av. de Poissy, Maisons-Laffitte (Seine-et-Oise).
25, bd Beaumarchais, Paris.
48, rue d'Alésia, Paris.
14, rue Victor-Hugo, Lyon.
19, rue Drouot, Paris (IX^e).
10, r. de la Barouillère, Paris.
D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
26, av. Observatoire, Paris.

- Sirop d'Hémoglobine**
Star 7, r. Charlot, Paris.
Sirops Henry 39, rue Sclessin, Liège.
***Sirops Henry Mure** 18, rue des Écoles, Paris (V^e).
***Sirop Herceul** 85, r. de Trignac, St-Nazaire.
Sirop Hinglais Épernay (Marne).
Sirop I. A. M. 18, bd de la Liberté, Rennes.
Sirop Iodacanit 58, rue de Maubeuge, Paris.
Sirop d'Iodéfine 10, r. de la Barouillère, Paris.
Sirop Iodermol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
***Sirop Iodocalcium** 19, av. d'Orléans, Paris.
Sirop Iodo-noyer Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Sirop iodotannique
Guillermont 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
Sirop Irsi 5, r. François-Ponsard, Paris.
Sirop Jackson Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Sirop Jane 7, rue Charlot, Paris (III^e).
Sirop Jolivet 119, r. Cardinet, Paris.
Sirop Jovin 48, av. Porte-d'Ivry, Paris.
Sirop Kérída 37, rue des Lois, Toulouse.
Sirop de Kola Henry 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique).
Sirop Koff Bedell, Lavelanet (Ariège).
Sirop Kopé 25, r. de Calais, Dunkerque.
Sirop de la Bonne Mère Gavin, Vimoutiers (Orne).
Sirop Lagasse 8, rue Vivienne, Paris.
***Sirop du D^r Lagnoux** 200, r. du Fg-St-Martin, Paris.
Sirop de Lamoureux 6, rue Dombasle, Paris.
Sirop Lanchat Comtos, Fesches-le-Châtel (Doubs).
Sirop Larphaud 12-14, rue Féry, Reims.
Sirop Laurin 86, bd Port-Royal, Paris.
Sirop Lauzi G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
***Sirop laxatif Gobey** 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
***Sirop Lecœur** Gavin, Vimoutiers (Orne).
Sirop Lefeuvre 18 et 20, rue Vavin, Paris.
Sirop Lex 16, r. du Petit-Musc, Paris.
***Sirop de Lovel** 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
Sirop Magali 43, av. Kléber, Paris.
Sirop du D^r Manceau à Château-du-Loir (Sarthe).
***Sirop de la Maternité** 7, rue Galvani, Paris.
***Sirop Mauchant** Gennevilliers (Seine).
Sirop Mignard 29, bd Sébastopol, Paris.
Sirop de Mimotannin
Iodo-phosphaté 3, rue Bab-Azoun, Alger.
***Sirop minéral sulf.**
Crosnier 44, rue de Lagny, Montreuil.
***Sirop Mireille** Legendre, Houilles (S.-et-O.).
***Sirop Morlas** Passage des Princes, Paris (II^e).
Sirop Mory Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Sirop Négri 78, bd Beaumarchais, Paris.
Sirop Névra 83, bd de la Villette, Paris.
Sirop au Nitrite de
soude Roussel 10, rue Washington, Paris.
***Sirop Noguès** 7, rue Galvani, Paris.
Sirop Nourry (Voir *Vin Nourry*).
***Sirop de Papaine** (Voir *Papaine*).
Sirop Patrat 61, rue de Seine, Paris.

- *Sirop et pâte pectorale Robin
 Sirop Pectiline
 *Sirop Pectonax
 Sirop pectoral Bertrand
 Sirop pectoral du D^r Pyot
 Sirop Pectoral Edulcor
 *Sirop pectoral Gobey
 Sirop pectoral Laënnec
 Sirop phéniqué Vial
 *Sirop Poléry
 Sirop Polybromuré Laroze
 Sirop polyiodure Gonnon
 Sirop Prega
 Sirop Pulmophile
 Sirop Rabuteau
 Sirop Rambaud
 *Sirop Rami
 Sirop Ramos
 Sirop du D^r Reinwillier
 Sirop Rhégia
 Sirop Robin
 *Sirop Roche au thiocol
 Sirop Sédatif Bernhard
 *Sirop Sédatif Neurocalcium
 Sirop Sédatif Gobey
 Sirop Seillon
 Sirop Sentini
 Sirop de Sirtal
 Sirop de Sulfogalacolate de Potasse du D^r Henry
 *Sirop Teyssedre
 Sirop Thébé
 Sirop Thomas
 *Sirop Tinardon
 *Sirop du vin de Vial
 Sirop tribromure Gignon
 *Sirop Vacheron au galacol
 Sirop Viano
 Sirop Viette
 Sirtal
 Sistobyl
 *Sistomensine Ciba
- 13, rue de Poissy, Paris.
 37, rue des Lois, Toulouse.
 8, rue Saint-Martin, Paris.
 Nomexy (Vosges).
 pl. de l'Hôtel-de-Ville, à Salon-de-Provence.
 19, r. Grégoire-de-Tours, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 8, rue Vivienne, Paris.
 J. Fréchin, Lure (H.-S.).
 2, rue des Lions, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 (Voir : *Capsules Préga.*)
 pl. Forbin, Aix-en-Provence.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 20, r. Beaubourg, Paris.
 44, r. Chaptal, Levallois-Perret.
 7, rue Capeyron, Bordeaux.
 64, r. La Rochefoucauld, Paris.
 55, av. de Montredon, Marseille.
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 10, rue Crillon, Paris.
 11, r. La Fayette, Paris.
 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e).
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 2, allées de Chelles, Le Raincy (S.-et-O.).
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Pruvost, Houplines (Nord).
 74, fg d'Angoulême, Limoges.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 2, rue Volney, Paris.
 17, rue Cadet, Paris.
 36, place Bellecour, Lyon.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 15, r. Catulienne, St-Denis, Seine.
 163, rue de Flandre, Paris.
 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
 Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.

- *Sitergol
S. I. V. A. 3, rue de Vouillé, Paris.
- *Sodamine
Sodamyl Immunos, av. des Sources, Nice.
- *Sodergyl 122, Champs-Élysées, Paris.
- *Soderséine A. Mironneau, Pharm., Chef-Boutonne (Deux-Sèvres).
- *Sodésyl 23, r. du Parc, Fontenay-sous-Bois (Seine).
- Sodisalyne R. Jacquet, Vierzon (Cher).
- Sodocalcine (Voir *Néo-Salyl*.)
- Sodogastrol 27, r. des Batignolles, Paris.
- *Sodolactine 85, cours Alb.-Thomas, Lyon.
- Sodotétrane 163, bd Croix-Rousse, Lyon.
- *Sodothioli 41, av. Joffre, La Garenne.
- *Soja « Soyolk » Lab. de médecine expérimentale, Beauvais.
- Sojalose 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
- *Sojaminol Boutroux, 25, r. du Général-Foy, Paris.
- Solacitrine 72, bd Davout, Paris.
- Solargol 47, rue Maleret, Bordeaux.
- Solarsal 37, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- *Sol-Bi-Fraisse 12, rue Henri-Rivière, Le Perreux.
- *Solhermol « Mètère » 8, rue Jasmin, Paris.
- Solhysop 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
- Solicide 143 bis, rue Ordener, Paris.
- Solmuth 2, rue Michelet, Alger.
- Solubaine Nativelle 14, r. A.-Briand, Levallois (Seine).
- *Solubéol 27, rue de la Procession, Paris.
- *Solucalcine 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e).
- *Solucalyptine 5, bd Montparnasse, Paris.
- *Solucamphre Dela- 5, rue de Lubeck, Paris.
- lande 16, r. H.-Regnault, Courbe-voile.
- *Solucamphre (asso- 16, r. H.-Regnault, Courbe-voile.
- ciations diverses)
- *Soludagénan 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- *Soluderm 21, rue Violet, Paris.
- Soludex Pionneau, Vayres (Gironde).
- *Soluphédrine 11 bis et 13, r. Levert, Paris.
- *Solu-Plastol 10, r. du Plâtre, Paris.
- *Soluprotine Roche 10, rue Crillon, Paris.
- Solurase 71, r. du Fort, Aubervilliers.
- Solurol 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Soluseptazine 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Solusoufre Labocip 19, bd du Parc, Neuilly-s.-Seine.
- Soluté Gaube du Gers 177, r. de Courcelles, Paris.
- Solutés Acron (ex-Sé- 37, r. de la Hale-Coq, Auber-
rums) villiers.
- *Solution Cardosol 32, rue Mortinat, Asnières.
- Soluthanol 22, rue de Turin, Paris.
- *Solution du D^r Debat 60, r. de Monceau, Paris.
- Solutions Clin 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- Solution Coirre 5, bd Montparnasse, Paris.
- Solution Cunaud pl. du Marché, La Rochelle.
- *Solution du D^r Jacobson 54, fg Saint-Honoré, Paris.
- *Solution du D^r Watelet 15, av. Parc-Montsouris, Paris.

- Solution Fumouze
 Solutions Mercurielles
 du D' Lafay
 Solution Henry Mure
 *Solution Hapatoum
 *Solution huileuse au
 Nestosyl
 Solution Laroyenne
 Solutions otologiques
 Chauvin
 *Solution Pautauberge
 *Solution Quinquina
 Bardet
 Solution salicylate
 Henry
 *Solution Schoum

 Solution Talon
 *Solution Tisch
 Solution Valens
 Solutol
 Solvochine
 Solvosclérose
 Solvurène
 *Solvuric
 Somatormone
 Somnalgine
 *Somnicônes
 *Somnifène Roche
 Somnitis
 Somnoblol
 Somnopol
 *Somnothyrl
 *Sonagar
 *Sonamel
 *Sonène
 *Soneryl
 Sonomalt
 *Sopodes
 *Soporalose
 *Soporigène
 Soporine
 *Sorbocalcion
 Sornyal
 Sorol Churchill
 Source Marie-Christine
 Source Saint-Aré
 Sous-Nitrate de Bis-
 muth Tulasne pur
 *Soutensa
 Sparablano
 Sparaplast Fournier
 Spartédrine
 *Spartéine Houdé
 *Sparto-Camphre
 Spartoforme
- 78, fg Saint-Denis, Paris.
 54, Chaussée-d'Antin et 69, rue
 de Provence, Paris.
 à Annonay (Ardèche).
 150, r. de Paris, Pantin (Seine).

 72, rue St-Dominique, Paris.
 7, bd Denain, Paris.

 Aubenas (Ardèche).
 10, r. de Constantinople, Paris.

 76, rue de Sèvres, Paris.

 39, r. Sclessin, Liège (Belgique).
 15, r. de la Sablière, Bécon-les-
 Bruyères (Seine).
 153, bd Montparnasse, Paris.
 42, bd Saint-Marcel, Paris.
 52, rue Decamps, Paris.
 22, fg Saint-Michel, Angers.
 Mer rouge, Mulhouse.
 201, fg Saint-Denis, Paris.
 place Forbin, Aix-en-Provence.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 24, r. de Montessuy, Paris.
 194, rue de Rivoli, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 Lyons, 30, rue Monge, Paris.
 Lab. Elsse, Fontaine (Isère).
 83, bd de la Villette, Paris.
 Cantin, Palaiseau (S.-et-O.).
 20, bd Heurteloup, Tours.
 id.
 2, pl. des Vosges, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 128, rue du Mont-Cenis, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris.
 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
 25, rue Dagorno, Paris (XII^e).
 58-60, r. des Moulins, Valence.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 92, av. de St-Mandé, Paris.

 Le Breuil-sur-Couze (P.-de-D.).
 10, r. de la Barouillère, Paris.

 48, bd des Batignolles, Paris.
 7, rue de l'Armorique, Paris.
 Sauter, à Bellegarde (Ain).
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 Lab. Sauba, Montreuil (Seine).
 9, rue Dieu, Paris (X^e).
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Chauvin, Aubenas (Ardèche).

- *Spartophédrine Béral 194, rue de Rivoll, Paris.
- Spartoval 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
- *Spasa 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
- Spasalgique 90, av. de Saint-Ouen, Paris.
- *Spasédol 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- *Spasmacol 21, rue de Madrid, Paris.
- *Spasmalgine Roche 10, rue Crillon, Paris.
- Spasmalgol R. Renault, Anould (Vosges).
- *Spasmalone J. Vincent, Ancenis (L.-I.).
- *Spasmidénal 28, av. Carnot, St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
- *Spasmine Jolly 28, av. Carnot, St-Germain-en-Laye (Seine-et-Oise).
- *Spasmocalcyl 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
- *Spasmocarbine 1-3, r. Malherbe, Beauvais.
- Spasmocuirol 38, r. N.-D.-de-Nazareth, Paris.
- Spasmo-Entéropathyl 7, imp. de la Sous-Préfecture, Roanne.
- *Spasmo-florine 38, rue du Louvre, Paris.
- Spasmolyse 24, av. de Chatillon, Paris.
- *Spasmonal 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand.
- *Spasmonéural 239, cours de l'Yser, Bordeaux.
- *Spasmoryl 18, av. Daumesnil, Paris.
- *Spasmosédine 15, bd Pasteur, Paris.
- Spasneurol 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- Spécialités de Brides 46, rue Pierre-Charron, Paris.
- Spécialités Valentin-Chaillot 27, rue Planchat, Paris.
- Spécific Brachat Livry-Gargan (S.-et-O.).
- *Spécifique Bejean 30, r. des Francs-Bourgeois, Paris.
- *Spécifique Eldé 24, r. Paul-Bert, Paris.
- *Spécifique Lancelot 100 ter, av. Saint-Mandé, Paris.
- Spécifique Mignard 29, av. Charras, Clerm.-Ferrand.
- *Spectrol 9, rue Paul-Baudry, Paris.
- Sphérulines - Moncour 49, av. Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine.
- (Voir : *Opothérapie*)
- Sphygmine 109, rue de Sèvres, Paris.
- Spicanol 54, rue de Sablonville, Neuilly-sur-Seine.
- Spirobismol Mer Rouge, Mulhouse.
- *Spirochtan 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Spirogyl 5, rue Paul-Barruel, Paris.
- Splenamine 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- Splénarmone 26, av. de l'Observatoire, Paris.
- *Splénique (Extrait du 8 et 10, rue Alphonse-Bertillon, Paris.)
- Splénocarbine 88, rue Duhesme, Paris.
- Splénocrinol 8, pass. Morel, Montrouge.
- *Splénocrisines 7, rue Biscornet, Paris.
- Splénodose 47, rue de Neuilly, Nanterre.
- *Splénogastrine 14, rue des Minimes, Paris.
- Spléno-Magnésium 83, bd de la Villette, Paris.
- Splénomanganol 191, fg Saint-Antoine, Paris.
- *Splénomedulla Lab. Chaix, 8 et 10, r. Alph.-Bertillon, Paris (V^e).
- Splénora 1, r. Paul-Bert, Angers.
- Splénose 163, rue de Flandre, Paris.

- Splenotanie**
***Splényl**
Spyroïdès
Stabilisine
- Stabylacto** Chatelain
Stabyne
***Stadrhine**
***Stal-Kosal**
***Stalysine**
***Stanion**
***Stanno-Bardane** Henry
Stannolip Henry
***Stanno-Sufrol** Gros-
 nier
***Stannoxyl**
Staphydex
***Staphylagone**
***Staphylase** du D^r
 Doyen
Staphylocide Audras
***Staphylo-coccine** Fra-
 quet
Staphylophage
Staphyloplast
***Staphylotanol**
***Staphylo-Vaclydun**
***Staprolysat**
***Stavafer**
***Stéarol**
Stechlovules
Sténacrine
Stenergine
Sténio
Stenobiose
Sténofer Lumière
Sténogénine
Sténol Chanteaud
Stenon du D^r Gelm
Stenophos
Sténophyl Vigan
Steracholine
- *Stéramine**
***Stérandryl**
Sterarsinol
- Stérasmine**
Sterédrine
Steridrophil Wuhrlin
Sterigyne
Sterilait
Sterinase Vincent
Sternol
- *Stérogyl**
***Stégoryl** 10 et 15
- 14, rue Clichy, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Salesse, Beaulieu-sur-Dordogne
 (Corrèze).
 pl. des Halles, Niort (D.-S.).
 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
 26, rue des Moines, Paris.
 62, bd Jaurès, Boulogne-s.-S.
 42, rue Docteur-Blanche, Paris.
 18, av. Hoche, Paris.
 39, rue Sclessin, Liège.
 id.
 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
 1, av. de Villars, Paris.
 5, r. François-Ponsard, Paris.
 54, fg Saint-Honoré, Paris.
 Lebeault, Bessin et C^{ie}, 5, rue
 Bourg-l'Abbé, Paris.
 122, rue de Gerland, Lyon.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 10, rue Vignon, Paris.
 Fournier, Dijon.
 22, rue de Turin, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 45, fg Saint-Denis, Paris.
 5, r. Em.-Combes, St-Étienne.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 78, av. Schneider, Clamart.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 A. Cousin, Estissac (Aube).
 D^r Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 45, rue Villon, Lyon.
 Mouflet, Chennebrun (Eure).
 Chambourcy (Seine-et-Oise).
 D^r Lataurie, Cuxac-d'Aude.
 74, rue de Lourmel, Paris.
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 Delaunay, 119, r. Victor-Hugo,
 Tours.
 42, rue Thiers, Le Havre.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 Delaunay, 119, r. Victor-Hugo,
 Tours.
 id.
 id.
 à Houdouville (Eure).
 (Voir *Ovules Stérigyne*).
 10, rue Cardinal-Mercier, Paris.
 14, av. Mac-Mahon, Paris.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (Seine-et-Oise).
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.
 89, r. du Cherche-Midi, Paris.

- Sténobiose**
***Sténophos**
Sthénoléine

Sthénoxal
Stibyal
Sticplast
***Stillargol**
***Stimulaxine**
Stimyl
***Stinergix**
Stock-Vaccin Bovy-
 Cannonnet
Stomachine
Stomacol Boulet
Stomagyl
Stomal

Stomalex
Stomalise
***Stomarol**
Stomasalvine
Stomasédine
Stoméol
***Stomobrol**
Stomolan

Stomophile
Stomoxygène

Stomytéol
***Stopral**
Stosédol
Stovaine Billon
***Stovarsol**
***Stovédrine**
Stovoléine
Stovoquine
***Stragol Merlet**
***Streptoderme**
Strepto-Vaclydun
Strictoforme Dausse
Stromal
***Strongenol**
***Strontiode**
Strophantal
***Strophantine et Stro-**
 phantus Catillon
Strophantine Houdé
***Stry-Calcium Aguet-**
 tant
***Strychnal Longuet**
Strychnan
***Strychnarsitol Robin**
***Strychneuron**
Strychnine Houdé
Strychno-Cacodyl
- G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 74, rue Lourmel, Paris
 2, r. Cl.-Matrat, Issy-les-Moull-
 neaux.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 3, rue des Reculettes, Paris.
 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 Bartier, Armentières (Nord).
 Falque, Besançon.
 62, r. de Cambrai, Lille.

 10, rue Drouot, Paris.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 14, rue E.-Delacroix, Paris.
 47, rue Malleret, Bordeaux.
 58, bd R.-Wallace, Puteaux
 (Seine).
 14, rue Demarquay, Paris.
 Bedeil, Lavelanet (Ariège).
 4, rue Platon, Paris.
 Moulins-sur-Yèvre (Cher).
 48, r. de Flandre, Le Bourget.
 99, r. de Paris, Massy (S.-et-O.).
 Place Carnot, Romainville.
 155, bd A.-Briand, Savigny-sur-
 Orge (Seine-et-Oise).
 17 bis, av. Parmentier, Paris.
 2 bis, rue du Chevalier-de-la-
 Barre, à Saint-Quentin.
 Vignal, Périgueux.
 47, rue Bokanowski, Asnières.
 52, r. de Cambrai, Lille (Nord).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 id.
 38, bd Bourdon, Neuilly-s.-S.
 (Voir *Stadrhine*).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 24, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 25, rue du Gal-Foy, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 7, allée du Midi, Courbevoie.
 11 bis-13, r. Levert, Paris.
 19, rue du Bac, Paris.
 Lab. Elsse, Fontaine, Isère.

 3, bd Saint-Martin, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.

 36, quai Fulchiron, Lyon.
 34, rue Sedaine, Paris.
 10, r. de Strasbourg, Paris.
 13, rue de Poissy, Paris.
 52, rue de Cambrai, Lille.
 9, rue Dieu, Paris.
 21, rue Alsace-Lorraine, Lyon.

Strychno Gardenal

***Strychnophyl**

***Strychnotinine**

Stupho

Subtensène

Succharure Leprince

Succomusculine

***Suc-Durham**

Suc Normand

***Sucre Edulcor Ferré**

Sucs organiques Ba-
zin

***Sucre « Vita D »**

Sudyl Roberts

***Sufrol Crosnier**

***Suiseryl**

Sulcichlorine

***Sulfagone**

***Sulfamido-Suppo**

***Sulfamyl**

***Sulfan**

***Sulfapyridine Zizine**

***Sulfarsénol**

Sulfarsinol Lefèvre

***Sulfarsiode**

Sulfate d'Atropine Clin

Sulfate de quinine Léo

***Sulfex**

***Sulphydral Chanteaud**

Sulfinhal

***Sulfiodé**

Sulfo-benzol

***Sulfobiol Aguetant**

Sulfo-Bore Roy

***Sulfobyl**

Sulfocadol

***Sulfocaine Fayès**

***Sulfocalcyl**

Sulfocol

***Sulfocrème Liless**

***Sulfodermol**

***Sulfoidol Robin**

***Sulfolax**

Sulfol Charlard

Sulfoléine Rozet

***Sulfoline**

***Sulfolive**

***Sulfomaléyl**

Sulfo-Mésarca Roche

Sulfo-Perless

Sulforéon

***Sulforgan**

***Sulfo-rhinol Fayès**

***Sulfosalyl**

21, rue Jean-Goujon, Paris.

74, rue Lourmel, Paris.

25, bd de La Tour-Maubourg,
Paris.

38, rue Mainguy, Bondy (Seine).

2-4, place Gambetta, Paris.

62, rue de la Tour, Paris.

8-10, r. Alp-Bertillon, Paris.

Mauchant, Gennevilliers (Seine).

Chartier, Saumur (M.-et-L.).

19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.

(Voir *Opothérapie Bazin.*)

40, rue François-I^{er}, Paris.

7, r. L.-Jeannin, La Garenne-
Colombes (Seine).

44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).

97, rue de Vaugirard, Paris.

47, rue Maleret, Bordeaux.

54, fg St-Honoré, Paris.

62, av. de Paris, Villejuif.

Laffort, Coué-lès-Tours (I.-et-L.).

Dalayeun, Sannois (S.-et-O.).

24, r. de Fécamp, Paris.

19-21, rue Van-Loo, Paris.

52, rue Decamps, Paris.

11, quai St-Clair, Lyon.

20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.

11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.

13, rue du D^r-Mazet, Grenoble.

Chambourcy (S.-et-O.).

98, r. J.-Maillotte, La Madeleine.

14, av. Perrichont, Paris.

239, fg Saint-Honoré, Paris.

36, quai Fulchiron, Lyon.

81, bd Suchet, Paris.

Chambourcy (S.-et-O.).

16, r. H.-Regnault, Courbevoie.

2 et 4, pl. Gambetta, Paris.

29, av. Charras, Clermont-Fd.

M. Godart, Andenne (Belgique).

Fisch, Mer Rouge (Mulhouse).

Flahaut, 74, r. Monge, Paris.

13, rue de Poissy, Paris.

122, Champs-Elysées, Paris.

12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

à Vendôme (Loir-et-Cher).

78, bd des Batignolles, Paris.

19, rue de Pontevès, Marseille.

20, rue des Ecoles, Paris.

10, rue Crillon, Paris.

26, rue Friant, Paris.

3, r. des Roualries, Dinan (C.-du-
Nord).

16, rue de Gramont, Paris.

2 et 4, pl. Gambetta, Paris.

14, av. Perrichont, Paris.

- *Sulfosine Léo
- Sulfostan
- Sulfoterpine
- Sulfoterpinol
- *Sulfo-Thiorine
- Sulfo-Tréparsénan
- Sulfoaxal
- *Sulfoxyl
- Sulfoxyne
- *Sulfur concentré Dax
- *Sulfureux Pouillet
- *Sulfurine du D^r Langlebert
- *Sulfurion
- *Sulfuryl Monal
- Sulf-Y
- *Sulftypène
- Sulhyp
- Sulphaqua Pépin
- Sulphénine Trouette
- Sulphium
- *Sulsod
- *Sunalcol
- Suniforme
- *Sunoxidon
- *Sunoxol
- Super-digestif
- Supernucléine Legrand
- *Supamide
- *Suppabafne
- *Supparyres du D^r Faucher
- Supparsol
- *Suppoalgos Lagoutte
- Suppo-Anestaline
- *Suppocamphryl
- Suppo-créosote
- Suppo-cuivrol
- [Suppo-Eurinase
- *Suppoglandines
- *Suppo-Gynals
- Suppo-Kélédol
- [Suppol
- *Suppolive
- *Supponéryl
- *Suppopirine Séclo
- *Suppopulmos
- *Suppoquinol
- Supporholdes
- *Suppo-Sédol
- 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- Cavaillès, 29, r. Singer, Paris.
- B.-F. Delaunay, 119 bis, r. Victor-Hugo, Tours.
- Chenu, Montferrand (P.-de-D.).
- 39, rue Fondaudège, Bordeaux.
- 20, r. des Fossés-St-Jacques, Paris.
- 48, rue Claude-Lorrain, Lille.
- L^{re} Lugocalcion, Oullins (Rhône).
- Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
- Morellet, à Bagnoles-de-l'Orne.
- 62, r. du Cardinal-Lemoine, Paris.
- 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- 18, av. Hoche, Paris.
- 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
- Salavert, Sainte-Foy-la-Grande (Gironde).
- 43, r. de Lancry, Paris.
- 58, rue de Maubeuge, Paris.
- 116, bd Haussmann, Paris.
- 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
- Brisson, 157, rue Championnet, Paris.
- 56, rue Beaubourg, Paris.
- 19, rue Franklin, Paris.
- 11, rue de la Station, Asnières.
- 19, rue Franklin, Paris.
- id.
- 96, rue Monge, Dijon.
- id.
- 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson.
- 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes.
- 34, bd de Clichy, Paris.
- 1, av. de Villars, Paris.
- 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
- 156, av. Victor-Hugo, Paris.
- 85, cours Al.-Thomas, Lyon. †
- 71, rue Ste-Anne, Paris.
- Matray, Aubières (Puy-de-D.). (Voir : Eurinase.)
- 84, rue Rochechouart, Paris.
- 127, bd Saint-Michel, Paris.
- 114, rue Solférino, Lille.
- 12, bd Saint-Martin, Paris.
- 19, rue de Pontevès, Marseille.
- 98, rue de Sèvres, Paris.
- 6, r. Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
- 85, cours Albert-Thomas, Lyon.
- 3, pl. Thiers, Le Raincy (S.-et-O.).
- Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- 98, rue de Sèvres, Paris.

- ***Suppositoires Almine Louveau** 78, bd des Batignolles, Paris.
- ***Suppositoires Amibiasine** 69, r. de Wattignies, Paris.
- Suppositoires Anoradonol** 110, bd Haussmann, Paris. (Voir : *Radonol.*)
- Suppositoires Anucalm** 21, rue de Lyon, Paris.
- ***Suppositoires au Nestosyl** 72, rue Saint-Dominique, Paris.
- Suppositoires Bébica** 5, av. E.-Boissier, Nantes.
- Suppositoires Cabanès** 17, rue Cadet, Paris.
- ***Suppositoires Calmopelvine** 81, rue Réaumur, Paris.
- ***Suppositoires Calmovarine** 81, r. Réaumur, Paris (II°).
- ***Suppositoires de Camphocryptol** 26, rue des Moines, Paris.
- ***Suppositoires Chaumel** 78, fg Saint-Denis, Paris.
- ***Suppositoires Corbière** 27, rue Desrenaudes, Paris
- Suppositoires Éon** 3, r. des Rouairies, Dinan.
- ***Suppositoires Eucalyptine** 5, rue de Lubeck, Paris.
- Suppositoires Gonnon** 74, rue Victor-Hugo, Lyon.
- ***Suppositoires Hymel** 90, av. de St-Ouen, Paris.
- ***Suppositoires Inséva** (Voir : *Pommade Inséva.*)
- Suppositoires Lagcutte** 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
- Suppositoires Lama-line** Affre, Saint-Mandé (Seine).
- ***Suppositoires Logeais** 22 bis, 24, r. de Silly, Boulogne-s.-Seine.
- Suppositoires Hg du Dr Lafay** 14, rue A.-Briand, Levallois-Perret.
- Suppositoires anti-hémorroïdaux** Manor, St-Germain-au-Bois (S.-et-L.).
- ***Suppositoires Mictasol** 5, rue de Lubeck, Paris.
- ***Suppositoires Midy** 67, av. de Wagram, Paris.
- ***Suppositoires Pachaut** 33, fg Montmartre, Paris.
- ***Suppositoires Pautau-berge** 10, rue de Constantinople, Paris.
- ***Suppositoires Pelvinal** Fosset, à Montfermeil (S.-et-O.).
- ***Suppositoires Pepet** 56, bd Pereire, Paris.
- ***Suppositoires Pyrax** Chavialle, 70, Gde-Rue, Sèvres (S.-et-O.).
- Suppositoires Radonol** (Voir : *Radonol.*)
- Suppositoires Reys** 21, r. de la Gare, La Broque (B. Rhin).
- Suppositoires Rocav** 116, bd Haussmann, Paris.
- Suppositoires Royer** 223, rue Saint-Martin, Paris.
- Suppositoires Sféat** 15, rue Catulienne, Saint-Denis.
- ***Suppos Lemary** 36, quai Fulchiron, Lyon.
- ***Suppos-Sédabios** 8, rue Saint-Martin, Paris.
- Suppositoires Somnothyrid** Cantin, à Palaiseau.
- ***Suppothemos** 85, cours Al.-Thomas, Lyon.
- ***Suppotonic** id.

[Suppo-Vaccin tale	Salan-	42, r. Grandes-Arcades, Stras- bourg.
*Suppovita		56, bd de la République, Saint- Cloud.
Suppo-Zinol		37, rue Brochant, Paris.
*Supralgyl		10, allées Damour, Bordeaux.
Suprarénidine		G.-Rue-au-Bois, Bruxelles.
*Suprasthényl		33, r. Barthou, Angoulême (Ch ^{te}).
Supravéna		Aliments équilibrés Joly, Bourg- la-Reine (Seine).
Suractivase		122, rue du Cherche-Midi, Paris.
*Surbical		42, rue Mont-Cenis, Paris.
Suriodinine		52 r. Blanc-Dutrouilh, Bordeaux.
Surlax		24, bd Sébastopol, Paris.
*Suroxydal		Lab. C. Le Follet, Nozeroy (Jura).
*Surparine		66, r. de la Pompe, Paris.
*Surpaver		245, r. de Vaugirard, Paris.
*Surrasthénine		26, av. Observatoire, Paris.
Surrénale - Endocri- sines Fournier		7, rue Biscornet, Paris.
Surrénaline Bouty		3, rue de Dunkerque, Paris.
Surrénine		Orga, Avignon (Vaucluse).
Surrénotanic Grémy		14, rue de Clichy, Paris.
Surtensal		24, av. Albert-I ^{er} , Dijon.
*Survall		pl. Charles-Roussel, Tourcoing.
Suryali		50, rue de Turenne, Paris.
*Sylcase		7, rue Saint-André, Le Mans.
Sylvinhalant		16 bis, rue Dufrenoy, Paris.
Sylvol		46, rue Pierre-Charron, Paris.
Sympasedal		130, bd Murat, Paris (XVI ^e).
*Sympathocrine		37, rue Brochant, Paris.
Sympathomine		1, r. du Puits-de-l'Ermite, Paris.
*Sympathoriane		21, Gde-Rue, Montfermeil.
*Sympathyl		26 bis, rue Dombasle, Paris.
Sympatonyl		44, rue d'Inkermann, Lille.
Sympax		191, r. du Fg-St-Antoine, Paris.
Synase		40, rue des Acacias, Paris.
Syncaïne Clin		20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
*Syncortyl		89, r. du Cherche-Midi, Paris.
*Syncrines Choay		48, av. Théophile-Gautier, Paris.
*Synergyl Vadam		Didry, Janville (E.-et-L.).
*Synthagène		62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.- Seine.
*Synthéma		25, bd Latour-Maubourg, Paris.
Synthol		3 à 9, rue de l'Abreuvoir, Bou- logne-sur-Seine.
*Syntropan Roche		10, rue Crillon, Paris.
*Syphonéol		Baude, Saint-Aubert (Nord).
*Syséros		18, rue des Écoles, Paris.

T

- Tabedo**
 ***Tablette Perroud**
 ***Tablettes antimigrai-**
 neuses du D^r Le Tan-
 neur
Tablettes Boval
Tablettes Enurésan

Tablettes Gelok
 ***Tablettes Hova**
Tablettes oxymenthol
Perraudin
Tablettes de Phos-
 pharsol
Tablettes Renard
 ***Tablettes Robin**
Tablettes de thyroïde
Tablettes Vych'Edul-
 cor
 ***Tablettes Zeva**
Tablonal
Tacia

 ***Tachygastrine Ducloy**
Tachysmuth
 ***Tænifuge Bardet**
 ***Tænifuge Castel**
 Tænifuge des Dames
 de France
 ***Tænifuge du D^r Du-**
 hourcau
 ***Tænifuge du D^r Jac-**
 quème
 Tænifuge Ercé
 ***Tænifuge Kirn**
 ***Tænifuge Larix**
 Tænifuge Limousin
 Talcazone
 Talyc
 ***Tamar Indien Grillon**
 ***Tamarine**

 ***Tampol Roche**
Tampons Alsai
Tampovules Corbière
- 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.

 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 Dehay, Arras (P.-de-C.).
 Kuntzmann, Ribeaupillé (Ht-
 Rh.).
 (Voir : *Gélok*.)
 92, rue Bobillot, Paris.
 Lab. Scientia, 21, rue Chaptal,
 Paris.

 46, r. Pierre-Charron, Paris.
 Giban, à Sens (Yonne).
 13, rue de Poissy, Paris (V^e).
 3, bd St-Martin, Paris.

 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 60, cours Émile-Zola, Lyon.
 7, allée du Midi, Courbevoie.
 15, rue du P^t-Wilson, Gentilly
 (Seine).
 Ducloy et C^{ie}, Arques (P.-de-C.).
 89, av. Wagram, Paris.
 76, rue de Sèvres, Paris.
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.

 119, rue de Sèvres, Paris.
 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-
 Colombes (Seine).

 Chiarini, Aix-en-Provence.
 1, av. de Villars, Paris.
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 20, rue Thiers, Tarbes.
 202 bis, av. Jean-Jaurès, Clamart.
 42, rue de Thiers, Le Havre.
 103, r. Saint-Lazare, Paris.
 Darrasse, 13, r. Pavée, Paris.
 4, route de Médoc, Le Bouscat
 (Gironde).
 10, rue Crillon, Paris.
 1, rue Griffon, Lyon.
 27, rue Desrenaudes, Paris.

- Tanacétyl Clin**
Taniglane
Tanisol
Tannarsol
Tannermox
Tanno-Bismuth
***Tanno-Calchine**
***Tannurgyl**
Tanode
Tanosal
***Tapo**
Tarbisol
Tartrate Borico-potas-
sique du D^r Gigon
***Tartrate Borico-potas-**
sique Pachaut
***Tartroborol**
***Taxol**
Tébéphaguine
Tégéol
***Teinture de Cocheux**
Téja
***Ténébryl**
***Tensédine**
Tensiofuge
***Tensol Laurençon**
***Tensopan**
***Tensoryl**
Teperos
***Terbinthiol Thomas**
Tercinol
Terco
***Tercodal**
Tercodyl
Tercolène
Térébane
Térébhine
Térébules Gallier
Tergyl Lamo
***Terkal Monal**
Terneusol
Ternose Trouette
Térozone
Terpine Barbier
***Terpine Boveil**
Terpine Cailleux
Terpine du Mezenc
Terpine Duval
***Terpine Gonnon**
***Terpine granulée**
Baron
Terpinol Adrian
Terpoflor
Terpopneumol
***Terpoxyl interne et**
externe, ovules
- 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 33, rue Barthou, Angoulême.
 119, r. de Noisy, Les Lilas.
 119, rue de Sèvres, Paris.
 7, rue Chaptal, Paris.
 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
 62, bd J.-Jaurès, Boulogne-s.-S.
 103, r. St-Lazare, Paris.
 62, r. de Paris, Villejuif (Seine).
 Feigel, à Lutterbach (Ht-Rhin).
 14, rue Miromesnil, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 33, fg Montmartre, Paris.
 18, rue des Écoles, Paris.
 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).
 11, Ch. de la Muette, Paris.
 11, rue de Clichy, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 56, r. St-Lambert, Marseille.
 22, rue du Landy, Saint-Ouen.
 13, av. de Ségur, Paris.
 43, rue de Lancry, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 139, av. Émile-Zola, Paris.
 52, bd du Temple, Paris.
 Mer Rouge, Mulhouse.
 33, fg Montmartre, Paris.
 247 bis, r. des Pyrénées, Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 14, rue Demarquay, Paris.
 14, r. Demarquay, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (S.).
 59, bd Lefebvre, Paris.
 1, bd de la Madeleine, Marseille.
 1, pl. du Pt-Mithouard, Paris.
 52, rue de Crimée, Paris.
 13, avenue de Ségur, Paris (VII^e).
 43, rue de Lancry, Paris.
 61, av. Philippe-Auguste, Paris.
 62, rue d'Antibes (Cannes).
 8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
 9, pl. des Terreaux, Lyon.
 Parmain (S.-et-O.).
 Cellier, Roanne (Loire).
 Lab. Elsse, Fontaine (Isère).
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 74, rue Monge, Paris.
 9, rue de la Perle, Paris.
 26, rue Petrelle, Paris.
 Huyghe, Brazey-en-Plaine (C.-
 d'Or).
 Jolly, 28, av. Carnot, St-Ger-
 main-en-Laye (S.-et-O.).

- Tersol**
Testkrine
Testicule - Endocris-
nes Fournier
Tetra magnesium
***Tétranitrol Roussel**
Tétrasilfol Vigier
Thalaphyl
Thalassol
***Thalassotonine Vadam**
***Thaolaxine**
***Thébaïl**
Thé d'Albret

Thé de l'Emyrne
Thé Evine
***Théinol Bailly**
***Théïsine Dubat**
Thé Malgache
Themsaline
Théobromine Guillau-
min
Théobromine Houdé
***Théobromine Invar**
Théobromine Vicario
***Théobromose**
Théobrophos
***Théobryl Roche**
Théocalciode
***Théocardine Laleuf**
Théocrinol
***Théophylline Bruneau**
***Théophylline Carena**
Théosalvine
***Théosalvose**
***Théostène scillitique**

***Théostène simple**
Théovadil
***Théovérine Laleuf**
***Théoxanthine**
***Théramine**
Thermalgol

Thermaseline
Thermo-bloc
Thermocédone
Thermo-Vicardine
Thé Suédois

Thiesdyne
***Thigénol Roche**
***Thi-Lip Aguetant**
***Thiobyl Bourcet**
***Thiocitran**
***Thiocol Roche**
Thiocosyl
- 32, r. Carnot, Beaune (C.-d'Or).
 89, Grande-Rue, Sens (Yonne).

 7, rue Biscornet, Paris.
 45, r. du Marché, Neuilly.
 10, rue Washington, Paris.
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 Bouttet, à Ruffec (Ch.-Inf.).
 2, rue Michelet, Alger.
 Didry, Janville (E.-et-L.).
 15, r. des Champs, Asnières.
 7, rue Galvani, Paris.
 295 bis, r. de la Bénauge, Bor-
 deaux.
 151, rue Saint-Maur, Paris.
 15, bd des Batignolles, Paris.
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 80, fg Saint-Denis, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 92, rue Bobillot, Paris.

 3, rue du Cherche-Midi, Paris.
 9, rue Dieu, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 17, bd Haussmann, Paris.
 10, rue du Plâtre, Paris (IV^e).
 14, rue du Temple, Calais.
 10, rue Crillon, Paris.
 12, rue Henner, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris.
 33, av. de Villiers, Paris.
 17, rue de Berri, Paris.
 39, bd La Tour-Maubourg, Paris.
 13, rue Cherche-Midi, Paris.
 id.
 47, av. de la République, Ville-
 neuve-le-Roi.
 id.
 85, r. des Morillons, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 15, bd Pasteur, Paris.
 50, rue Nationale, Lille.
 Deodax, R. Renaud, Arnould
 (Vosges).
 62, Champs-Élysées, Paris.
 Gaudichard, Châtellerault.
 98, bd Rochechouart, Paris.
 15, r. du Commerce, Riom.
 Herin, 98, rue Jeanne-Mail-
 lotte, La Madeleine (Nord).
 56, rue des Dames, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 36, quai Fulchiron, Lyon.
 7, av. du Doyenné, Lyon.
 21, rue des Roses, Dijon.
 10, rue Crillon, Paris.
 23, r. Beautreillis, Paris.

- *Thiocutol Robin
 *Thiodacaine Midy
 *Thiodérazine Midy
 *Thiofène Robin
 *Thio-Goudron
 Thiokéine
 *Thionafodine A et B
 Thionoïadine (Com-primés de)
 Thionaphte
 Thionhydrol Grémy
 Thiopectol
 *Thiopon
 *Thiopheol Inava
 *Thiophyl
 Thiophytol
 Thiorubrol
 *Thiosédal
 Thiosinamine Cognet
 *Thiosote-Lambiotte
 Thiosyl
 Thio-terpine Dalin
 *Thioxyl
 *Thorix (Thorium X Rhemda)
 Thoroxyl
 Thylargol
 *Thyméphérine
 Thymétol
 Thymobrol
 Thymo-Mentol Eup-nique
 Thymophytine
 Thymoseptol
 Thymoseptyl
 Thymus - Endocrisines Fournier
 Thymoseptol
 Thymol doré
 Thymoléine
 Thyratoxine Byla
 Thyormone Byla
 *Thyrénine Grémy
 *Thyrocréine Grémy
 Thyrodose
 Thyro Gardenal
 Thyroguine
 Thyroïde - Endocrisines Fournier
 Thyroïde Léo
 *Thyroidine Bouty
 Thyroidine Flourens
 Thyroidine Gory
 Thyroidine Meurice
- 13, r. de Poissy, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 id.
 13, rue de Poissy, Paris.
 Cébé, St-Just-sur-Loire.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux (Seine).
 id.
 9, pl. Municipale, Tulle.
 14, rue de Clichy, Paris.
 8, r. Fleury, Lyon-Oullins.
 26, r. des Petits-Champs, Paris.
 14, r. de Normandie, Asnières.
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 Villefranche-sur-Saône (Rhône).
 Mer Rouge, Mulhouse.
 79, rue de Paris, Saint-Denis.
 43, rue de Saintonge, Paris.
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 M. Berger, à Orléans.
 1, rue de la Martinlière, Lyon.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).
 51, rue d'Alsace, Courbevoie (S.).
 40, rue de Bellechasse, Paris.
 109, rue de Sèvres, Paris.
 7, rue de la République, Puteaux (Seine).
 77, bd de Grenelle, Paris.
 Lab. des Vosges, La Broque (Bas-Rhin).
 13, rue de Rivoli, Paris.
 12, r. de Strasbourg, Paris.
 117, r. V.-Hugo, Houplines (N.).
 2, rue des 3-Mages Marseille.
 7, rue Biscornet, Paris.
 M. H. Pruvost, Houplines (N.).
 10, impasse Milord, Paris.
 Abou, 26, rue Temple, Paris.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 id.
 14, rue de Clichy, Paris.
 id.
 47, rue de Neuilly, Nanterre.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 7, rue Biscornet, Paris.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 62, rue Notre-Dame, Bordeaux.
 7 bis, r. Gén.-Galliéni, Montreuil.
 61, av. Louise, Bruxelles.

- Thyrol A**
Thyroxine Byla
***Thyroxine Roche**
Tiliane
Tilleul Gmet
Tinctiode
Tinga Rhino-Bismuth
***Tiodine Cognet**
Tisane Anticolibacil-
laire Lesourd
Tisane Bala
Tisane Borkou
Tisane Cisbey
Tisane de Maraisa
Tisane dépurative de
Cavaillès
***Tisane Ethiopienne**
Tisane Ferlys
***Tisane hépatique**
Dausse
***Tisane hépatique La-**
hayé
Tisanes Lesourd n°
19, 62, 55, 10, 20,
40, 3
Tisane R. P. La Mon-
tagne
Tisane rafraîchissante
d'Alsace-Lorraine
Tisane Sanova
Tisane Talon
Tisane Tanit
Tisane Valentin-Chail-
lot
Tissus Le Perdriel
Titanoderme
Tochlorine
Tœnifuge Larix
Togal

Tolu Le Bœuf
Tonal
Tonax
***Tonibiase**
Toni bronchique
Tonicalcine
***Tonicardine Gonnon**
Tonicardine
Tonic Tiffeneau
Toni-Dol
Toniflux
Toniformiase
Tonifort
Tonifosal
Tonigène
Tonigénine
- 8, passage Morel, Montrouge.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 Lacaze, Amélie-les-Bains (P.-O.).
 27, fg Montmartre, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 70, r. Carnot, Stains (Seine).
 43, rue de Saintonge, Paris.

 88, rue Duhesme, Paris.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 69, av. du Maine, Paris (XIV^e).
 12, bd Saint-Martin, Paris.
 Lab. Lorrain, à Étain (Meuse).

 29, rue Singer, Paris.
 32, r. de l'Alouette, St-Mandé.
 59, rue Boissière, Paris.

 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 145, rue des Bourguignons, Bois-
 Colombes (Seine).

 88, rue Duhesme, Paris.

 19, av. Secrétan, Paris.
 Bernhard, 11, rue La Fayette,
 Paris.
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 153, bd Montparnasse, Paris.
 Rouanet, Antibes (A.-M.).

 10, square de Châtillon, Paris.
 11, rue Milton, Paris.
 Lab. Palc, Messigny (C.-d'Or).
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 20, rue Thiers, Tarbes (B.-P.).
 13, fg Ste-Foy, Forbach (Mo-
 selle).
 11, rue Milton, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 Lyons, 30, rue Monge, Paris.
 Pont-de-la-Maye (Gironde).
 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).
 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 24, rue de Monttessuy, Paris.
 Bassol, Saint-Alvère (Dordogne).
 31, bd de la Villette, Paris.
 34, rue Montgallet, Paris.
 41, r. Saint-Louis, Montauban.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 11, rue Eugène-Flachat, Paris.
 Lab. à Montrevel (Ain).

- *Tonikéine Chevretin**
 Tonik Elsse
 Tonikéol
 Tonilécithine Rogier
***Tonimalt**
***Toni-Pectoral Adrian**
 Toniphlébine Hardy
 Toniphos Baron
 Toniphosphine
 Tonique Boudier
 Tonique Chapés
 Tonique Dulciane
***Tonique Favrot**
 Tonique Garnier
***Tonique Gonnon**
***Tonique Nédà**
 Tonique Rik
***Tonique Roche**
 Tonique Rouveray
 Tonique Zéva
 Toni sérum Freyssinge
***Toniveinine**
 Tonixyl
 Tonucyl
***Tonudol**
***Tophista**
***Tophol**
 Topique Bertrand
 Topique Bengué
 Topiques Chaumel
 Topique pyorrhépha-
 gine
 Topique Robein
 Topique stomacal
 Dausse
 Torigyre Lamo
 Toritane Lamo
 Toritanol Lamo
 Totaliode
***Total Magnésien**
***Total-Tonic**
 Total Vital
***Tot'Cobra**
***Tot'Hamelis**
***Tot'Harlem**
***Tot'Héma**
 Tot'Hépatine
***Toti-Phos**
***Tot'Olea**
 Toxurof
***Trachédrine**
 Trachovaccin Salantale
***Traitement Ambula-
 toire**
- 52, rue Labruyère, Paris (IX^e).
 Chavanne, Fontaine (Isère).
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 56, bd Pereire, Paris.
 Rumilly (Haute-Savoie).
 9, rue de la Perle, Paris.
 200, rue de Tolbiac, Paris.
 Les Sables-d'Olonne.
 56, rue des Dames, Paris.
 37, r. de Bourgogne, Paris.
 Bouyssou, Chambois (Orne).
 156, av. Victor-Hugo, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris.
 14, rue Victor-Hugo, Lyon.
 134, c. de Verdun, Bordeaux.
 38, rue du Louvre, Paris.
 10, rue Crillon, Paris.
 3 bis, r. Vallier, Levallois-Perret.
 60, cours Émile-Zola, Lyon.
 6, rue Abel, Paris.
 15, av. Parc-Montsouris, Paris.
 Brichard et fils, Bar-le-Duc.
 Meunier, Montmarault (Allier).
 38, bd Bourdon, Paris-Neuilly.
 3, rue Condillac, Grenoble.
 id.
 à Oullins (Rhône).
 16, rue Ballu, Paris.
 78, fg Saint-Denis, Paris.
 Hygiodontis, Croissy-s.-Seine.
 21, rue de la Gare, La Broque
 (Bas-Rhin).
 4, rue Aubriot, Paris (IV^e).
 53, rue de Crimée, Paris.
 id.
 id.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 24, bd Sébastopol, Paris.
 29, fg Bourgogne, Orléans.
 200, r. du Fg-St-Martin, Paris.
 1 bis, pl. du Présid.-Mithouard,
 Paris.
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 184, route de Genas, Lyon.
 26 bis, rue Dombasle, Paris.
 71, rue Ste-Anne, Paris.
 6, rue Parrot, Paris.
 12, rue Lamartine, Paris.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 60, rte de Châtillon, Malakoff.
 42, Grandes-Arcades, Strasbourg.
 Hussigny-Godbrange (M.-et-M.).

- *Traitement complet
 Nutriment
 Traitement Vernet
 Tranquital
 Transfusine
 *Transitol
 Transpulmine
 *Traphéine
 *Trasentine

 Traumatol
 Traumatoplaste
 *Trepallix
 Tréparsénans
 Tréparsinyl
 *Tréparsol
 *Tréphonyl
 Trépocidine
 Trépol
 Trépoquinol
 *Trépositoires

 Trialgine
 Triano
 Triarsonyl
 Triase
 Tribromure Gigon
 Tricadol
 *Tricalcine
 Tricalm
 Tricarbol Begon
 Tricarbonate Lefranc

 Tricétane

 Tricophan
 Tricostérid
 Tridigestine Dalloz
 *Tridynol
 Triféryl
 Trifloral François
 Triganol Vigier
 Trigastrine
 *Triglandine Bouty
 Triglandol Bouty
 Trigonellose
 *Trigosthène
 Tri-Iodo-Ercé
 Trijumine Pelletier
 Trilactine
 Trimidor (comprimés)
 Trineuxyl
 *Trinibaine Lalouf
 *Trinitral Lalouf
 *Trinitrine Caféinée Du-
 bois
- 34, rue Pigalle, Paris.

 9, rue Laloy, Chaumont.
 13, av. de Ségur, Paris.
 163, rue de Flandre, Paris.
 3, bd Jean-Jaurès, Clichy.
 Mer Rouge, Mulhouse.
 L. Guéret, 89, r. Martre, Clichy.
 103-117, bd de la Part-Dieu,
 Lyon.
 37, r. Gaudot-de-Mauroy, Paris.
 id.
 66, rue de la Pompe, Paris.
 20, r. Fossés-St-Jacques, Paris.
 Falque, Besançon.
 14, r. A.-Briand, Levallois-Per.
 97, rue de Vaugirard, Paris.
 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 22, rue de la Sorbonne, Paris.
 id.
 43-45, r. des Fauvelles, Cour-
 bevoie.
 13, r. Nonnains-d'Hyères, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris.
 137, fg St-Antoine, Paris (XI^e).
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 22, r. de Turin, Paris.
 21, rue Chaptal, Paris (IX^e).
 Donagol, Péronne (Somme).
 Plonsat (Puy-de-Dôme).
 31, rue du Chemin-de-Fer, Nan-
 terre.
 Hatier, 13, pl. du Peuple, St-
 Etienne.
 21, r. Mouton-Duvernet, Paris.
 Pelloille, Champigny (Seine).
 13, bd La Chapelle, Paris.
 18-20, rue Vavin, Paris.
 37, rue Gallée, Paris.
 Taclet, Arras (P.-de-C.).
 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.
 336, r. des Pyrénées, Paris.
 3, rue de Dunkerque, Paris.
 id.
 23, bd Hoche, St-Brieuc.
 "Angla", Monte-Carlo.
 1, av. de Villars, Paris.
 48, rue Jacob, Paris.
 Mauchant, Gennevilliers (Seine).
 Baurillot, 6, r. Berbizey, Dijon.
 12, r. Henri-Rivière, Le Perreux.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 id.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).

- ***Trinitrine-Caréna** 39, bd de Latour-Maubourg, Paris.
- ***Trinitrine-Papavérine** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
Laleuf 10, rue Washington, Paris.
- ***Trinitrine Roussel**
- ***Trinitrine Simple Laleuf** 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
Trinitrine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- ***Trinivérine** 13, av. de Ségur, Paris (VII^e).
Trinobenzyle 50, rue de Turenne, Paris.
- ***Triol** 4, r. Gambetta, Sens (Yonne).
- Triplexine** 150, r. de Paris, Pantin (Seine).
- Tripyroril** 15, r. Catullienne, St-Denis.
- ***Triradol** 22, rue de Turin, Paris.
- ***Trisalyl** 14, rue des Minimes, Paris.
- Triseltz** 163, rue de Flandre, Paris.
- ***Triseptine** Lambert, rue de la Paix, Vichy.
- Triseptol** 21, r. des Roses, Dijon.
- Trisilmag** 348, rue St-Honoré, Paris.
- Trisodyl Rozet** Benderitter, à Vendôme.
- Tristyl Noyon** 53, rue de Crimée, Paris.
- Tritonine** 64, rue des Tournelles, Paris.
- Triurase** 46, rue de Rome, Marseille.
- Trixyl Fraudin** 4, av. Desfieux, Boulogne-s.-S.
- Tri-Zymol** Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
- ***Trophocalcine** 7, r. de la République, Puteaux.
(Voir : *Dosurine*.)
- ***Trousses Dosurine** 52, bd du Temple, Paris.
- Tryclène** 40, rue des Acacias, Paris.
- ***Trynol** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Tryparsamide** 90, cours Gambetta, Lyon.
- ***Trypsinan radio-actif** 21, rue Jean-Goujon, Paris.
- Tuberculine G. L.**
- ***Tuberculines de l'Institut Mérieux** 17, rue Bourgelat, Lyon.
- ***Tubérol** 23, rue des Moines, Paris.
- ***Tubes Blache** Chauvin, Aubenas (Ardèche).
- Tubes Bromure Pachaut** 33, fg Montmartre, Paris.
- ***Tubes Chauvin** Aubenas (Ardèche).
- ***Tubes Dulcis** D^r Ferry, Monte-Carlo.
- ***Tubes Ferlux** G. Bousquet, à Albi.
- ***Tubes du D^r Guiraud** 10, imp. Milord, Paris.
- Tubes Levasseur** 23, rue de la Monnaie, Paris.
- Tubes Lux** 35, rue de l'Abattoir, Bruxelles.
- Tubes P. O. S.** Ferrenbach, Kayzersberg (H.-R.).
- ***Tubes Ratio** Bousquet, Albi.
- Tubes Sals** Oullins (Rhône).
- ***Tubes Strana** Salantale, Strasbourg.
- ***Tulle gras Lumière** 45, rue Villon, Lyon.
- Tulle gras Prima** 3, rue des Reculettes, Paris.
- ***Tulle gras Nemausa** 5, Gde-Rue, Montpellier.
- ***Tulle gras Ruby stérilisé** Et. Ruby, Voiron (Isère).
- Tulle neutre AD-NO** 5, rue Mézelle, Tarare (Rhône).
- ***Tulle rose Beslier** Coquelu, Digoïn (S.-et-L.).
- Tussédyl** 15, r. des Champs, Asnières.

Tuxyl**Tymocalcine****Tympano*****Tympanyl**

4, av. M.-Berteaux, Poissy (S.-et-O.).

156, r. des Fauvelles, Courbevoie.

66, rue Falguière, Paris.

215, bd Voltaire, Paris.

U**Ubécholone*****Uclarsyl****Udanka*****Ulcéobalnéine*****Ulcéobande****Ulcéocure*****Ulcéoplaque*****Ulcéosine*****Ulcéosol****Ulcérine Berger*****Ulcérophile Nosan****Ulmacétyl****Ulmair Gmet****Ulmairène Gigon****Ulréma****Ultracalcine*****Ultracalcium Irradié****Ultracao Laurençon*****Ultracrinol*****Ultraformine B et S*****Ultra-Levure****Ultrapraidow****Ultrargen Leclerc****Ultrasténil*****Ultra-Violets*****Ultravitamine 4****Ultravitine*****Umcka****Uracétose****Uradol*****Uralysol****Uranol****Uraséol*****Uraseptine Rogier*****Urazine*****Ur-Clar blanc, bleu**

Mouflet, Chennebrun (Eure).

89, rue du Cherche-Midi, Paris.

D^r Lalaurie, Cuxac-d'Aude.

76, rue des Rondeaux, Paris.

id.

82-84, rue de Belleville, Paris.

76, rue des Rondeaux, Paris.

id.

id.

31, bd de la Villette, Paris.

6^{ter}, rue Voltaire, La Garenne-Colombes (Seine).

54, r. Sablonville, Neuilly-s.-Seine.

27, fg Montmartre, Paris.

25, bd Beaumarchais, Paris.

39, rue Taitbout, Paris.

41, rue Germain, Lyon.

36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.

11, rue François-Giraud, Villefranche-sur-Saône.

40, quai Jeanne-d'Arc, Chinon.

60, r. J.-Jaurès, Firminy (Loire).

22, rue de la Sorbonne, Paris.

Battut, à Vatan (Indre).

10, rue Vignon, Paris.

P. Fontanier, Moulins - sur-Yèvre (Cher).

12, av. du Maine, Paris.

11, r. F.-Giraud, Villefranche-s.-Saône.

P. Fontanier, Moulins - sur-Yèvre (Cher).

34, rue St-Lazare, Paris (IX^e).

14, rue des Minimes, Paris.

av. de Grasse, Cannes.

25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).

22, rue de Turin, Paris.

17, rue Cadet, Paris.

56, Bd Péreire, Paris.

21, rue Jean-Goujon, Paris.

Roux, 58, r. de Maubeuge, Paris.

- Urdol**
***Ureinol**
***Urémiasé**
Urénile Meurice
***Uréol Chanteaud**
Urgoplast
Uriage (Ampoules)
Uribiline
Uribiol
Uricase
***Uricémine**
Uricine
***Uriclarine**
Uricural
Uricure
***Urifluine**
Uriloal
Urilyse
Urilysonne
Uri-Magnétol
Urimiral
Urisal du Dr Des-champs
***Urisanine**
Urobarine
Uro-Bestol
Urobiose
***Urobleu Vergelot**
***Uroboldine**
Urobuccol Malmanche
Urocarbol benzo-naphtolé
Urocassine
***Urocédrol**
***Urocholine**
Uroclarol
***Uroclase**
***Uroclase « M »**
Uroclean
Urococcine
***Urocylate**
***Uroflux**
***Uroformine Gobey**
Urogène
Urogénine
***Uroflodine**
Urokaps
Urolan
Urolavose
Urol
***Uro-lithium**
- 78, Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
 43, r. de Chartres, Neuilly-s.-S.
 7, rue Galvani, Paris (XVII^e).
 61, av. Louise, Bruxelles.
 Chambourcy (Seine-et-Oise).
 Fournier, Dijon.
 15, av. des Champs-Élysées, Paris.
 62, av. de Paris, Villejulf (Seine).
 55, av. de Montredon, Marseille.
 26, rue de Gagny, Neuilly-sur-Marne.
 103, rue Saint-Lazare, Paris.
 50, rue République, Puteaux.
 157, rue Champlonnet, Paris.
 place de la Comète, Asnières.
 6, rue Ad.-La-Lyre, Courbevoie.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 108, r. Maréchal-Pétain, Vichy.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 103-117, bd de la Part-Dieu, Lyon.
 58, rue de Maubeuge, Paris.
 8, r. Fleury, Lyon-Oullins.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 Longuet, 34, r. Sedaine, Paris.
 Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
 18, bd de la Liberté, Rennes.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 6, rue de Navarin, Paris.
 6, rue Dombasle, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil.
 133, rue Lecourbe, Paris.
 61, bd Malesherbes, Paris.
 Gallo, à Aurillac (Cantal).
 20, pl. de la Mairie, Parc-Saint-Maur (Seine).
 117, r. V.-Hugo, Houplines (Nord).
 95, rue de Prony, Paris.
 id.
 36, r. des Fcs-Bourgeois, Paris.
 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e).
 57, rue Pierre-Corneille, Lyon.
 21, rue de Lyon, Paris.
 89, rue du Cherche-Midi, Paris.
 Dr Lalaurie, Cuxac-d'Aude.
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e).
 38, bd des Brotteaux, Lyon.
 55, bd de Strasbourg, Paris.
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 239, fg Saint-Honoré, Paris.
 G. Calmels, Auterive (H.-G.).

- Urolithol**
Urolyse
***Urométhyl**
***Urométine Lambiotte**
***Uromil**
***Urophényl**
***Urophile Bail'**
Uropiat
***Uroquinase**
***Uroquinol**
***Urosalyl**
Uroscéral
Uroseptic
***Urose Vigan**
***Urosérum**
Urosilal
Urosinol Damber

***Urosiphon**
Urosodine Louveau
Uro-tisan
Urotropine Lafran
***Urovitine**
Uroxyl
***Urticide (Dragées et Liquide)**
Urtiplaste
Utérol Leo
Utéro-streptine
***Utersan**
***Uvargol**
Uvarion
Uvastar
Uvasthène
***Uvé**
Uvécalcion

***Uvéoline**
Uvéovules
Uvéphorine
***Uvéstérol**
Uvor
Uvotonyl
- 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse
 27, rue G.-Tessier, Saint-Étienne).
 L^{re} Lugocalcion, Oullins (Rhône).
 20, r. Dumont-d'Urville, Paris.
 19, rue Drouot, Paris.
 73, r. d'Albuféra, Vernon (Eure).
 15 et 17, rue de Rome, Paris.
 119, rue de Sèze, Lyon.
 Dubois, 16, bd Pereire, Paris.
 7, r. de la République, Puteaux.
 6, rue Félix-Pyat, Marseille.
 5, rue Paul-Barruel, Paris.
 80, fg St-Denis, Paris.
 103, rue St-Lazare, Paris.
 56, rue St-Lambert, Marseille.
 23, r. Beautreillis, Paris.
 71, av. de la République, Cham-
 pigny (Seine).
 1, rue de l'Odéon, Paris.
 78, bd des Batignolles, Paris.
 112, rue des Pyrénées, Paris.
 8, rue de Prague, Paris.
 29, rue Duret, Paris.
 11, place Ste-Eulalie, Bordeaux.

 2, rue Michelet, Alger.
 2, rue Michelet, Alger.
 11, sq. Marie-Louise, Bruxelles.
 54, fg St-Honoré, Paris.
 122, Champs-Élysées, Paris.
 62, av. Philippe-Auguste, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 Route du Moulleau, Arcachon.
 Bourdou, Frontignan (Hérault).
 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
 11 bis, place de l'Hôtel-de-Ville,
 Cannes (A.-M.).
 Ph^{ie} Ambard, Carcès (Var).
 Ambard, Carcès (Var).
 37, rue Galilée, Paris.
 1, av. du D^r-Lannelongue, Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 Laffort, Joué-les-Tours (I.-et-L.).

V

- Vabéol**
Vacciderm

***Vaccin anti - asthma-
 tique du P^r Minet**
- 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
 Unis-Spès, 14, rue Demarquay,
 Paris.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).

- Vaccin Anticolibacillaire M. M.**
Vaccin antigonococcique
 ***Vaccin antigrippal du Pr. Minet**
 ***Vaccin antipneumonique du Pr Minet**
Vaccin antivariolique
 ***Vaccin de Weill et Dufourt**
Vaccin M. A.
 ***Vaccinothérapie atoxique Cépède**
 ***Vaccinothérapie Pro-bios**
 ***Vaccinovules**
 ***Vaccins antibrucelliques polymicrobiens**
Vaccins antipollin
 ***Vaccins atoxiques stabilisés**
 ***Vaccins Bactériens I. O. D.**
Vaccins bactériophages
 ***Vaccins Bruschettini**
 ***Vaccins Carrion**
 ***Vaccins Clin**
 ***Vaccins Creuzé**
 ***Vaccins Demonchy**
 ***Vaccins Inava**
 ***Vaccins Ivago**
Vaccins microbiens curatifs
Vaccins Pasteur
Vaccins Polyvalents Renard
Vaccin Provac's
 ***Vaccin R. N.**
 ***Vaccins Ronchèse**
Vaccins Salantale
 ***Vaccins Sténé**
 ***Vaccins Virultra**
Vaccin Vaudremer
Vacciplast
Vaclydovules
 ***Vaclydun Vaclyderm**
Vacuoline
Vagodénal
 ***Vagogastryl Crozet**
 ***Vagoriane**
 ***Vagosédyl**
 ***Vagostabyl**
Vagotonic Fournier
Vagotonine
 ***Valbornine Rogier**
- 43-45, rue des Fauvelles, Courbevoie (Seine).
 Oliviero, Boulogne-sur-Seine.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 id.
 av. de Lodève, Montpellier.
 1, av. de Villars, Paris.
 Creuzé, 74, r. de Lourmel, Paris.
 57, rue Mathurin-Régnier, Paris.
 8, rue St-Martin, Paris (IV^e).
 23, rue des Moines, Paris.
 17, rue de Sauve, Nîmes.
 26, av. Observatoire, Paris.
 21, rue Jean-Goujon, Paris.
 16, rue Dragon, Marseille.
 1, avenue de Villars, Paris.
 7, rue Biscornet, Paris.
 54, rue du Fg-St-Honoré, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 74, rue de Lourmel, Paris (XV^e).
 98, r. de Sèvres, Paris.
 14, rue de Normandie, Asnières.
 17, rue de Provence, Paris.
 Gremy, 14, r. de Clichy, Paris.
 36, r. du Dr-Roux, Paris.
 1, av. de Villars, Paris.
 42, rue Thiers, Le Havre.
 30, r. Arm.-Silvestre, Courbevoie.
 21, bd Riquier, Nice.
 42, Gdes-Arcades, Strasbourg.
 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV^e).
 à Launay-Serquigny (Eure).
 51, r. du Ranelagh, Paris.
 Fournier, Dijon.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 27, rue Desrenaudes, Paris.
 (Voir : *Opo-Vacuoline*).
 48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
 Saint-Venant (P.-de-C.).
 21, Gde-Rue, Montfermeil.
 122, av. Champs-Élysées, Paris.
 49, rue de Maubeuge, Paris.
 Inst. physiologique Vaucresson.
 26, av. Observatoire, Paris.
 56, bd Péreire, Paris.

- Valbrol
 Valedyl
 *Valénal
 *Valéramyl Foulon
 *Valergyl Doucet
 *Valérianate Gabail
 Valérianate Grignon
 *Valérianate Pierlot
 *Valériane Byla
 Valériane Dausse
 *Valériane Gmet
 *Valériane Pachaut
 Valérianose Gigon
 Valériflore
 Valérinodor Malman-
 che
 *Valerium Paul Thi-
 bault
 *Valérobromine Le-
 grand
 *Valéronal
 *Valéroquinquina
 Valérose
 Valérothéine
 Valéthryne
 Valimyl Clin
 *Vallathen
 *Val'ovarine Farma

 *Valovosan

 Vals St-Jean
 *Valthène
 Valtine
 Valyl Midy
 Vamétol
 *Vanadarsine Guillau-
 min
 Vanadyl
 Vanilactyl
 Vaniol
 Vanosan
 Vanotonyl
 *Vanoxyle
 *Vansol
 Vanucléol
 *Vaposphum
 Varicine
 Varicolyse
 Varicyl
 *Varilaxine
 Varilose
 *Variphile
 *Varisclérine
 Variserum Lebon
 *Vascosodine
 Vasouline
- 1, pl. Victor-Hugo, Paris.
 191, fg Saint-Antoine, Paris.
 L^{re} Lugocalcion, Oullins (Rh.).
 12, bd St-Martin, Paris.
 rue Gambetta, Bolbec.
 55, av. des Écoles, Cachan (Seine).
 2, rue Duphot, Paris.
 10, pas. Morel, Montrouge.
 26, av. de l'Observatoire, Paris.
 4, rue Aubriot, Paris.
 27, fg Montmartre, Paris.
 33, fg Montmartre, Paris.
 25, bd Beaumarchais, Paris.
 38 bis, bd Beaumarchais, Paris.
 101, av. Paul-Doumer, Rueil
 (Seine-et-Oise).

 48, rue d'Alésia, Paris.

 Darrasse, 13, rue Pavée, Paris.
 14, rue des Pyramides, Paris.
 3, rue Lamblardie, Paris.
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 Domergue, Agen (L.-et-G.).
 39, rue de la Chapelle, Paris.
 20, rue Fossés-St-Jacques, Paris.
 3, pl. Int.-St-Michel, Toulouse.
 1, av. Eug.-Thomas, Kremlin-
 Bicêtre (Seine).
 25, bd de la Tour-Maubourg,
 Paris.
 53, bd Haussmann, Paris.
 166, r. de la Roquette, Paris (II^e).
 12, rue Tour-des-Dames, Paris.
 67, av. de Wagram, Paris.
 14, r. de Périgueux, Angoulême.

 13, rue du Cherche-Midi, Paris.
 4, rue Richer, Paris.
 14, r. Demarquay, Paris.
 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
 58, r. Oberkampf, Paris.
 11, rue de Clichy, Paris.
 4, rue Richer, Paris.
 18, r. Maréchal-Foch, Versailles.
 37, rue Pajol, Paris.
 157, rue Championnet, Paris.
 12, rue Cadet, Paris.
 16, rue Salaire, Tarascon.
 12, r. des Petits-Carreaux, Paris.
 M. Soulas, Surgères (Ch.-Inf.).
 G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
 21, rue de Lyon, Paris.
 61, rue de Seine, Paris.
 à Charost (Cher).
 27, rue Planchat, Paris (XX^e).
 102, av. Michelet, Saint-Ouen

- *Vascurol 86, rue de la Réunion, Paris.
- Vaseline Chesebrough 76-78, rue Dareau, Paris (XIV^e).
- Vasocônes Brun, Demi-Lune, Lyon.
- Vasoconstrictine id.
- Vasogènes Pearson 48, rue d'Alésia, Paris.
- Vasolaxine 7, rue Biscornet, Paris.
- *Vaso-Neurine 5, r. François-Ponsard, Paris.
- Vasonitryl 13, rue Pagès, Suresnes et 53, rue du Poinçon, Bruxelles.
- Vasorhinine 22, rue Gambetta, Cherbourg.
- *Vaso-Rhinol 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
- *Vaso-Rhinol adrénaliné id.
- Vaso-Rhinol mentholé id.
- Vasothyol 9, rue Laloy, Chaumont.
- *V. A. V. 51, rue du Ranelagh, Paris.
- Vavéol 19, r. Godot-de-Mauroy, Paris.
- *Vaxa du D^r Boucard 30, rue Singer, Paris.
- *Vaxitrol Bouty 3, rue de Dunkerque, Paris.
- *Véganine 13, r. Pagès, Suresnes, et 53, r. du Poinçon, Bruxelles.
- *Végéocarnis Bengué 16, rue Ballu, Paris.
- *Végéolact-Soja 25, rue du Gal-Foy, Paris (VIII^e).
- *Végéolax 47, rue Nollet, Paris (XVII^e).
- *Végéphos 25, bd Beaumarchais, Paris.
- Végétol Fournier 8, rue des Quatre-Fils, Paris.
- *Végumine Wander, Champigny-s.-Marne.
- Véguva id.
- Veinalgol 96, rue Lafayette, Paris (X^e).
- Veinargyre 95, rue de Turenne, Paris.
- *Veinrhémone Brichard, Bar-le-Duc.
- Veinhormones Logeais 24, r. de Silly, Boulogne-s.-S.
- *Veinicura 132, av. Victor-Hugo, Paris.
- Veinixir Brichard, Bar-le-Duc (Meuse).
- Veinoflorine 44, r. de Lagny, Montreuil (Seine).
- Veinofluine 239, fg Saint-Honoré, Paris.
- Veinoflux 20, rue de Rivoli, Paris.
- Veinogène 37, rue Brochant, Paris.
- Veinoglandol 156, r. des Fauvelles, Courbevoie.
- Veinomars (Voir : *Argyrescine* Mars.)
- Veinophiline 27, rue Polds-Farine, Marseille.
- Veinophos Huyghe, Brazey - en - Plaine (C.-d'Or).
- Veinophyl Mounier, Egliseneuve-d'En-traygues (P.-de-D.).
- *Veinoposine 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse.
- *Veinorex 6, r. La Fayette, Châtellerault.
- Veinosalvine 11, rue de Flandre, Paris (19^e).
- Veinosan 37, rue de Bourgogne, Paris.
- *Veinoserol (Élixir et Gouttes) 3, pl. Intérieure-Saint-Michel, Toulouse.
- *Veinosine 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris (III^e).
- Veinostase Calmels, Auterive (H.-G.).
- Veinotensyl 20, rue de Rivoli, Paris.
- *Veinotrope 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e).

- Veinovarine Mercier**
Veinyl
Velledol Adrian
***Velpeau (bande de crêpe)**
Venisette
***Venocapsyl**
***Vérachol**
***Véralgine**
Verbal

Verbenol Hanbro
***Vérianne Buriat**
***Véricardine**
Vermicide Grahaut

Vermicure Pigeon
Vermifuge Castel
***Vermifuge Chiarini**
***Vermifuge Cornet**
Vermifuge des Moines
Vermifuge Rabi
Vermifuges Sorin
Vermifuge des Vosges

***Vermirène Audibert**
Vermi-Robur
Vermitox

Vermosol
Vermus
***Vérogénol**
***Véronidia Buisson**
Verrucide Robur
Verrucoid Leo

Verrucure
***Verrulyse**
Verrumag
***Verticourine**
***Vertox**
***Véryl**
***Vésicatoire rose Bessier**
Vésicatoires d'Albepuyres
Vexillan
Viabylis
Viargol
***Viatol**
Viburnode
Viburnum Gmet
***Vicalphos (simple et irradié)**
***Vicoelase**
- 41, route de Turin, Paris.
 102, av. Michelet, Saint-Ouen.
 9, rue de la Perle, Paris.

 25, bd Beaumarchais, Paris.
 L^{re} du Sodésyl, Vierzon (Cher).
 pl. du 9-Octobre, Cambrai.
 44, rue Chaptal, Levallois (Seine).
 38, rue du Mainguy, Bondy.
 34, av. de la République, Montrouge (Seine).
 10, rue de Belfort, Rennes.
 37, rue Spontini, Paris.
 10, impasse Milord, Paris.
 21, rue Sainte-Catherine, Ville-neuve-sur-Lot.
 18, rue de Jouvence, Dijon.
 1, pl. Bouquerie, Nîmes.
 Aix-en-Provence (B.-du-R.).
 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux.
 7, rue Charlot, Paris (III^e).
 14, rue Turgot, Limoges.
 Trombetta, Blain (L.-Inf.).
 21, rue de la Gare, La Broque (Bas-Rhin).
 Cinq Cantons, Bayonne.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 19, rue de la Porte-Trivaux, Clamart (Seine).
 46, rue du Bac, Asnières.
 6, rue Berbissey, Dijon.
 139, av. E.-Zola, Paris.
 98, rue de Sèvres, Paris.
 72, av. Thiers, Le Mans.
 11, square Marie-Louise, Bruxelles.
 6, rue d'Auteuil, Paris.
 Fluxine, Villefranche (Rhône).
 23, rue Beautreillis, Paris.
 47, rue Feray, à Corbell (S.-et-O.).
 56, rue Beaubourg, Paris.
 12, bd Saint-Martin, Paris.

 Coquelu, Digoin (S.-et-L.).
 Fumouze, 78, fg Saint-Denis, Paris.
 89, av. Wagram, Paris.
 52, rue de Cambrai, Lille.
 44, av. Pasteur, Courbevoie.
 30, rue Singer, Paris.
 Giry, 49, rue de Metz, Nancy.
 27, fg Montmartre, Paris.

 48, rue St-Jean, Lyon.
 71, av. de la République, Champigny (Seine).

- Vichy Amaigrissant**
Vichy Purgatif
Vigardyne
***Vigofruits**
Vigogastrine
Vigoral
Vigoria
Vigorina
Vigorstyl
Vigostérol irradié
Vigotonique

Vilax
Vin à l'extrait de foie de morue
Vin d'Anduran
***Vin Anti-Diabétique Talon**
Vin Aroud
***Vin Aubery**
Vin Boillaud
***Vin Bravais**
***Vince**
***Vin de Baudon**
Vin de Beef Lavoisier

Vin de Bugeaud
Vin de Carnéose

Vin de Chassaing
Vin de Coca du Pérou
Vin de Dusart
Vin Erlos
Vin des Indes
***Vin de Vial**
Vin diurétique Pyrola
Vin énergétique Fra-dier
Vin Gallia
***Vin Girard**
Vin de Kola Midy
Vin de Moride
Vin de Séguin
Vin Mariani
Vin Mory
Vin Néo-Vital
Vin Nourry

Vinocrinol
Vin Ophorine
Vin de peptone de Chaptoteaut
***Vin-Raci-Bel**
Vin Raimoa Tonic

Vin Rénovateur Hu-chédé
- Blancher, Vichy (Allier).**
7 bis, rue Galvani, Paris.
21, r. du Chemin-de-Fer, Sceaux.
route du Moulleau, Arcachon.
222, rue Duguesclin, Lyon.
50, av. Jacqueminot, Meudon.
Aubery, Avignon (Vaucluse).
Bassol, Sainte-Alvère (Dord.).
8, rue Fleury, Lyon-Oullins.
Brichard, Bar-le-Duc.
71, av. de la République, Cham-pigny (Seine).
16, bd Filles-du-Calvaire, Paris.

21, fg Montmartre, Paris.
28, r. Velpeau, Antony (Seine).

153, bd Montparnasse, Paris.
6, rue Dombasle, Paris.
Avignon (Vaucluse).
48, av. Porte-d'Ivry, Paris.
56, bd Ornano, Paris.
13, rue Pagès, Suresnes.
12, rue Charles-V, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
5, rue Bourg-l'Abbé, Paris.
Usine du Blosset, Moulins-sur-Yèvre (Cher).
1, quai Aulagnier, Asnières.
21, fg Montmartre, Paris.
8, rue Vivienne, Paris.
G. Gayraud, Lavit (T.-et-G.).
61, rue de Seine, Paris.
7, r. Damon, Villeurbanne.
19, rue des Chalets, Toulouse.
53, bd de Verdun, Fontenay-sous-Bois.
12, rue des Petits-Carreux, Paris.
48, rue d'Alésia, Paris.
67, av. de Wagram, Paris.
12, r. République, Puteaux.
165, rue Saint-Honoré, Paris.
41, bd Haussmann, Paris.
Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
Bassol, Sainte-Alvère (Dord.).
20, rue des Fossés-St-Jacques.
Paris.
30, r. de Sète, Longuyon.
Grande-Rue-au-Bois, Bruxelles.

8, rue Vivienne, Paris.
22, rue de la Sorbonne, Paris.
16, rue des Immeubles-Indus-triels, Paris.

1, rue de l'Odéon, Paris.

- Vin St-Raphaël**
Vin Surtonique Val-
Notre-Dame
Vin Tonic Tiffeneau
Vin Tonique des Vosges

Vin Urané Pesqui
Vin Voguet
Vin William
***Vioforme Ciba**

***Viophan**
***Viosten**

***Vioxyl Mouneyrat**
Viperol
***Viradène**
***Viredox**
Viristhène
***Virmonal « Piam »**
Viroglan I. S. M.
Viscine

Visco-dermine
***Visco-serum**
Viscosodine
***Viscoveine**
Viscum Zyma
***Vitacalcine Moncour**

Vitacarnol
***Vitacholine**
***Vitacrine**
Vitacuirol Savare
Vitaderme Bergonier
Vitadermine
***Vitadiase**
***Vitadone**
Vitaferine
***Vitagar**
Vitagéine
Vitalactyl
Vital Extrait
Vitalium
Vitalogène
***Vitalyne**
Vitamines Byla
Vitamine P. P. Byla
***Vitamine P. P. (Nico-**
bion)
***Vitamine D Cortial**
Vitamine Rogier
***Vitamines hydrosolu-**
bles Byla
***Vitamines liposolubles**
Byla
Vitaminol

- à Valence (Drôme).
Usine du Blosset, Moulins-sur-
Yèvre (Cher).
24, rue de Monttessuy, Paris.
21, rue de la Gare, La Broque
(Bas-Rhin).
rue de Béhobie, Hendaye.
5, rue Eug.-Delacroix, Paris.
23, rue Beautreillis, Paris.
103-117, bd de la Part-Dieu,
Lyon.
91, rue de Monceau, Paris.
D^r Lescène, 58, r. de Vouillé,
Paris, et Livarot (Calvados).
Villeneuve-la-Garenne (Seine).
2, pl. de la Pte-des-Ternes, Paris.
120, rue Lecourbe, Paris.
7, rue Fontaine-Delsaux, Lille.
76, rue des Jacobins, Amiens.
11, quai St-Clair, Lyon.
25, rue Dagorno, Paris.
11, rue de Fontainebleau, Krem-
lin-Bicêtre.
21, Gde-Rue, Montfermeil.
22, rue de Turin, Paris.
20 bis, rue Gravelotte, Toulouse.
21, Gde-Rue, Montfermeil.
92, rue Bobillot, Paris.
49, av. Victor-Hugo, Boulogne-
s.-Seine.
Aubery, Avignon (Vaucluse).
29, rue Duret, Paris.
188, c. de la Somme, Bordeaux.
29, rue Duret, Paris.
122, bd Murat, Paris.
Rueil (Seine-et-Oise).
145, rue Yves-le-Coz, Versailles.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
Moulins-sur-Yèvre (Cher).
19, rue Drouot, Paris.
7, r. Sainte-Isaure, Paris.
Sauba, Montreuil (Seine).
à Ste-Alvère (Dordogne).
97, bd Arago, Paris (XIV^e).
62, av. de Paris, Villejuif.
10, rue Bayard, Toulouse.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
26, av. de l'Observatoire, Paris.
Lematte et Boinot, 52, rue
La Bruyère, Paris.
7, rue de l'Armorique, Paris.
56, bd Péreire, Paris.

26, av. de l'Observatoire, Paris.

id.
26, av. de l'Observatoire, Paris.

*Vitamorrhaine, perles et granulés	P. C. B., 12, r. du Téléphone, Bruxelles.
*Vitamyl	4, pl. des Vosges, Paris.
*Vitaol	Chabre frères, Toulon.
Vitaphorine	Usines du Blosset, Moulins- sur-Yèvre (Cher).
Vita-Raisin	7, rue d'Argenteuil, Paris.
*Vitargyl	30, r. Francs-Bourgeois, Paris.
*Vitarsenic	R. Paméla, 85, r. Turbigo, Paris.
*Vitascorbol	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Vitasol	49, rue d'Angoulême, Cognac.
Vitastérol	10, r. du Collège, Arras.
*Vitène	12, rue Charles-V, Paris.
Vitergomine	12, r. du Téléphone, Bruxelles.
Vitimons	16 bis, r. Dufrenoy, Paris (XVI ^e).
Vitocalcion	50, av. de Normandie, Colombes.
Vitorange du Dr Ba- rillot	1, r. de la Rochette, Melun (S.-et-M.).
Vitosine Décornez	à Ornans (Doubs).
Vityl	72, qual Jemmapes, Paris.
*Vivacure	R. Plonneau, Vayres (Gir.).
*Vivargyre	191, fg St-Antoine, Paris (XI ^e).
Vivassol	78, fg Saint-Denis, Paris.
Viviodol	11, rue de Marseille, Paris.
Vivo-Dynergol	20, r. H.-Martin, Vanves (Seine).
*Vivoléol	24, rue de Fécamp, Paris (XII ^e).
Vixol	45, fg Saint-Denis, Paris.
*Vocaldop cachets	45, rue de Lyon, Paris.
Vogénol	13, r. de la République, Yzeure- Moulins (Allier).
Voka	11, rue Ant.-Bourdelle, Paris.
*Voltargol Robin	13, rue de Poissy, Paris.
Voxinhal	163, bd de la Croix-Rousse, Lyon.
*Vulcapil Brisson	157, rue Champignonnet, Paris.
*Vulcase	id.
Vulco (ouate)	Gde-Rue-au-Bois, Bruxelles.
*Vulcrinol	15, r. d'Argenteuil, Paris.
*Vulnamine	19, rue Godot-de-Mauroy, Paris.
*Vulnérine Bergen	Ducoq, Langeais (I.-et-L.).

W

Wantor	122, r. La Fontaine, Paris.
Witch Hazel	Lab. Miguel, 1, av. Lowendal, Paris.
[Wipla	12, r. Henri-Rivière, Le Perreux.
Wismuthane	41, av. Joffre, La Garenne.

X

- *Xantharlem 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e).
- Xanthocol 1, av. de Villars, Paris.
- *Xanthorryl 36, r. de la Tour-d'Auvergne, Paris.
- *Xeroderme Michel, Clrey-s.-Vezouze (M.-et-M.)
- Xylosulfol Vigier 12, bd Bonne-Nouvelle, Paris.

Y

- *Yaourtine 18, place Laborde, Paris.
- *Yo-Androl 8, pass. Morel, Montrouge.
- Yocaïne 18, rue de la Perle, Paris.
- Yoghourt Lactella à Tourcoing.
- Yoghourt Nutricia 142, rue Fransman, Bruxelles.
- *Yo-Gynine 8, pass. Morel, Montrouge.
- Yohimbine Gilbert 7, rue Charlot, Paris (III^e).
- *Yohimbine Houdé 9, rue Dieu, Paris (X^e).
- Yohimbine Vicario 17, bd Haussmann, Paris.
- *Yohourthogène Car- 5, rue du Capitaine-Scott, Paris.
- rion-Lagnel 5, c. Saint-Louis, Marseille.
- Yorva 4 bis, rue Hébert, Courbevoie.
- Yprine 22, rue de la Sorbonne, Paris.
- *Yptor Bouvot, Auvers-s.-Oise (S.-et-O.).
- Yro 62, rue Louis-Blanc, Paris.
- Yse 11, rue de Clichy, Paris.
- Ystaline 9, rue de la Platière, Lyon.
- *Yseult

Z

Zébo-Plastol	10, rue du Plâtre, Paris.
Zédeno	1, av. de Villars, Paris.
Zidaline	11, bd de Strasbourg, Paris.
Zinc Stovarsol	21, rue Jean-Goujon, Paris.
Zistazine	163, rue de Flandre, Paris.
Zogol	1, place Bouquerie, Nîmes.
Zohol	25, r. Jasmin, Paris.
Zomine	34, rue Sedaine, Paris.
Zomol	Vial, 8, rue Vivienne, Paris.
Zomo-maltine	48, av. de la Porte-d'Ivry, Paris.
*Zomo-Sthénol	G. Courtin, 134, av. Jean-Jaurès, Reims.
Zoocytine	Duret et Rémy, Asnières (Seine).
Zycream	84, fg du Temple, Paris.
*Zymatine-Lescène	à Livarot (Calvados), et 58, rue de Vouillé, Paris.
*Zymion	18, av. Hoche, Paris.
*Zymogastrine Kervan	J. Laurin, Chambourcy (S.-et- O.).
*Zymostol	22, rue de la Sorbonne, Paris.

3^e Partie

**NOMENCLATURE
DE
SPÉCIALITES PHARMACEUTIQUES
CLASSÉES
PAR LABORATOIRES**

WOMEN'S STUDIES

PHARMACEUTICALS

PAR LABORATOIRES

- Lab. Félix Abadie, 25, r. Thiers, Tarbes (Htes-Pyr.). — *Taniuge Larix*.
- Lab. Abadie Tanzi, 3, pl. Intérieure St-Michel, Toulouse. — *Algoboldine*, *Asclérogénol*, *Aubémone*, *Baume de la Faculté*, *Bellas « M »*, *Bellas « 707 »*, *Bellinguol*, *Cachets digestifs du D^r Bern*, *Calcior*, *Dépuratif du D^r Regol*, *Diocol*, *Essence landaise*, *Florénal*, *Gouttes calciques Zanit*, *Gouttes halogènes du D^r Bern*, *Gouttes de Pectosérum, J.-B. 5 Bellas*, *Moruxase*, *Naphtolargol*, *Neurotrol*, *Nérostérol*, *Ovules halogènes du D^r Bern*, *Urolithol*, *Vallathen*, *Veinosérol* (élixir et gouttes).
- Lab. Abarnou, 72, av. Thiers, Le Mans. — *Antidolor*, *Antigélures*, *Baume Robur*, *Fenurobur*, *Pelacide*, *Rhino-Robur*, *Vermi-Robur*, *Verrucide Robur*.
- Lab. des Abatilles, r. du Moulleau, Arcachon. — *Calcivitam*, *Créofruits*, *Kodos*, *Seignet'fruits*, *Uvastar*, *Vigofruits*.
- Lab. de l'Absuric, 17, rue de Provence, Paris. — *Absuric*.
- Lab. d'Actino-Biologie, 11, r. François-Giraud, Villefranche-sur-Saône. — *Ultravitamine 4.*, *Nérovitamine 4.*, *Tensol*, *Serifer*, *Actigermine*, *Algécrine*, *Ultracao*, *Thiophytol*.
- Lab. d'Actithérapie, 91, rue de Monceau, Paris (VIII^e). — *Hepatoxane*.
- Lab. Adam, Granville (Manche). — *Adrénocalcine*, *Chloci*.
- Lab. Adler, 36, r. des Francs-Bourgeois, Paris. — *Biolax*, *Bismuth belladonné du D^r Adler*, *Collybore*, *Formocholine*, *Gastroclean*, *Gynochlore*, *Gynomalvine*, *Hémoclean*, *Hémovarine*, *Hepaclean*, *Inhatillol*, *Iodau-bépine*, *Oléopsyllium*, *Pulmobiasse*, *Rhinogéraniol*, *Tonikéol*, *Uroclean*.
- Lab. Adol (L. Giroud), 78, cours de la Liberté, Lyon. — *Baume Adol*, *Blennopial*, *Cachets Adol*, *Cachets Louix*, *Gouttes Antispasmodiques Adol*, *Potion Adol*, *Poudre Dumur*.
- Lab. Adrian et C^{ie}. — Voir Société Française de Productions Pharmaceutiques, 9 et 11, rue de la Perle, Paris.
- Lab. de l'Aéine, 6, place Clichy, Paris (IX^e). — *Aéine*, *Nuchémose*, *Poudre Gast*.
- Lab. de l'Aérocid, G. Schmit, pharmacien, 20, rue de Pétrograd, Paris. — *Aerocid* (cachets, comprimés), *Opocérès* (comprimés et ampoules buvables).
- Lab. de l'Æthone, 35, r. Boissonnade, Paris. — *Æthone*, *Neurotrophène*.
- Lab. de l'Agocalcium, 299, rue des Pyrénées, Paris (XX^e). — *Agocalcium*.
- Lab. de l'Agorexine, 37, av. de la République, Paris (XI^e). — *Agorexins*.

- Lab. N. Aguettant**, 36, quai Fulchiron, Lyon. — *Adrénaline Aguettant*, *Ampoules Aguettant*, *Bt-As Aguettant*, *Chrysalmiote Aguettant*, *Néotrope Aguettant*, *Nosol Aguettant*, *Peptargyl Aguettant*, *Picricol Aguettant*, *Salitropine Aguettant*, *Sérum antityphoïdique*, *Stry-Calcium Aguettant*, *Sulfobiol Aguettant*, *Teinture de Gocheux*, *Thi-lip Aguettant*.
- Lab. de l'Aigue d'Or**, 53 bis, bd de la Liberté, Lille. — *Aigue d'Or*.
- Lab. Albu-Coll, E. Lemonnier**, pharmacien, 84, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Albu-Coli*.
- Lab. Pierre Alexandre**, 41, r. de Rome, Paris. — *Hama-méline Roya*, *Pilules Myosotis*.
- Lab. de l'Alexime**, 8, r. Riblette, Paris (XX^e). — *Alexime*, *Marnal*.
- Aliments équilibrés Joly**, Bourg-la-Reine (Seine). — *Alimavèna*, *Bovavèna*, *Supravèna*.
- Lab. Alpha**, Montreux-le-Château (Haut-Rhin). — *Albu-Rénol*, *Anti-Diabète H*, *Gouttolysins*, *Grains de Seltz*.
- Lab. de l'Amibiasine**, 69, r. de Wattignies, Paris. — *Amibiasine (Liquide, Comprimés, Suppositoires)*, *Bioentérase*, *Rectopanement-Amibiasine*.
- Lab. Amicros**, 177, r. de Courcelles, Paris (XVII^e). — *Amicrargol*, *Ampoules Pentamicros*, *Divacsol (inject. et buvable)*, *Etain Amicros*, *Fer Amicros*, *Orargol (Rhino-Orargol, Rhino-Orargol éphédriné, Gouttes Orargol, Collyre Orargol)*, *Ovules Amicros*, *Pentamicros*, *Rhodium Amicros*, *Sarcoptol*, *Sedo-Orargol*.
- Lab. des Prod. Amido**, 4, pl. des Vosges, Paris (IV^e). — *Amidal*, *Amphosynthyl*, *Backerine*, *Génatropine*, *Généserine*, *Genhyoscyamine*, *Génomorphine*, *Génosthéniques*, *Génoscopolamine*, *Génostrychnine*, *Sed'Hormone*, *Vitamyl irradié*.
- Lab. de l'Amiphédrine**, L. Hugon, docteur en pharmacie, 6, pl. Jean-Jaurès, Montrouge (Seine). — *Amiphédrine*.
- Lab. H. Ammann**, 3, impasse Adam, Boulogne-sur-Seine. — *Belhemine*.
- Lab. des Ampho-Vaccins Bonchèse**, 21, bd de Riquier, Nice, et 62, r. Charlot, Paris. — *Amphomuth*, *Amphoprophyl T. A. B.*, *Ampho-pulvérisateur*, *Ampho-Quintivaccin*, *Ampho-tablettes*, *Ampho-vaccin anti-infectieux*, *Ampho-vaccin anti-staphylococcique*, *Ampho-vaccin intestinal*, *Ampho-vaccin pansement antipyogène*, *Ampho-vaccin pansement rhino-pharyngien*, *Ampho-vaccin pulmonaire*, *Ampho-vaccin urinaire*, *Pyo-Amphogel*, *Rhino-Amphogel*.

Lab. de l'Amybdine, 44, avenue Pasteur, Courbevoie. — *Amybdine*.

Lab. Ana, 18, av. Daumesnil, Paris. — *Euphoryl*, *Euphoryl Infantile*, *Hirudinase*, *Salicylate suractivé Ana-Sclérana* (ex-Sclérosérum Ana), *Spasmoryl*.

Lab. de l'Analpyrine, Nomexy (Vosges). — *Analpyrine*, *Biophosyl*, *Calciocholone*, *Ouprinal*, *Gastrolex*, *Liniement Bertrand*, *Quistudol*, *Sirop pectoral Bertrand*.

Lab. Androvar, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort. — *Androvar*, *Androvules*, *Erythéma*.

Lab. Angelini, 61, rue de Seine, Paris. — *Depuriode*, *Magbi*, *Nutréol*, *Onction Angelini*, *Onguent Borgia*, *Onguent Prunot*, *Ovules Patrat*, *Pilules Tix*, *Polypeptine*, *Poudre Deol*, *Poudre Fiore*, *Sirop Patrat*, *Tonal*, *Vari-sclérine*, *Vin des Indes*, *Phytothérapie coloniale* : *Thé Malgache*, *Uvarion*.

Lab. de l'Angiolymphé, 4 bis, rue Hébert, Courbevoie. — *Angiolymphé*, *Argycuprol*, *Yprine*.

Produits spécialisés « Angla », H. Adam, pharmacien, av. de la Madone, Monte-Carlo. — *Antidotase*, *Barbiflorine*, *Cardioflorine*, *Cystoflorine*, *Granusel*, *Hépaflorine*, *Sealandair*, *Trigosthène*.

Lab. de l'Aniodol, 3-9, rue des Alouettes, Nanterre. — *Algaltan*, *Aniodol*.

Lab. des Antigénines, 1, pl. Lucien-Herr, Paris. — *Antigénines*, *Biazan*, *Gresentyll*, *Iodosoufryl*, *Jovanyl*.

Lab. de l'Antiphi, Ron-des-Landes. — *Antiphi*, *Antispa Libérine*.

Lab. de l'Antiphlogistine, 11, r. Collange, Levallois-Perret (Seine). — *Antiphlogistine*.

Lab. de l'Aparoxal, 7, allée du Midi, Courbevoie. — *Aparoxal*, *Corasmal*, *Stromal*, *Tablonal*.

Lab. de l'Aphosal, 48 bis, av. Mozart, Paris. — *Aphosal*.

Lab. de l'Appétyl, 37, av. de la République, Paris. — *Appétyl*.

Lab. d'Applications biologiques. — (Voir à *Labiola*.)

Sté d'Applications pharmacodynamiques (Lab. Delagrange), 39, bd de La Tour-Maubourg, Paris (VII^e). — *Ami-nophylline*, *Caréna*, *Caréna-Calcium*, *Caréna-Injectable*, *Caréna-Ouabaïne*, *Dinitra*, *Erythra*, *Opo-Dinitra*, *Phylla*, *Rhocya*, *Sédo-Caréna*, *Trinitrine-Caréna*, *Théophylline*.

Sté Générale d'Applications Thérapeutiques, 98, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — Voir "*Théraplax*".

Lab. du Dr Ardely, 20, rue Antoinette, Paris. — *Philoderme Yldra*.

Pharmacie Ardoin, 33, bd Dubouchage, Nice. — *Globules Rébaud*, *Lubrigel*.

- Lab. de l'Argyrophédrine, 20, avenue J.-Jaurès, Suresnes (Seine). — *Argyrophédrine*, *Ephédramélis*, *Parkipan*, *Sédibafne*.
- Lab. de l'Armanite, 3, av. Daumesnil, Paris. — *Armanite*, *Gollarman*.
- Lab. Armoril, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Anorexyl*, *Gamformine*, *Soutensa*.
- Lab. J.-G. Arnault, Saint-Just-en-Chaussée (Oise). — *Ergépatine*.
- Lab. Aseptor, 21, rue de Lyon, Paris (XII^e). — *Aseptorhine*, *Auriculine*, *Boréol*, *Glycalcion*, *Otalgolex*, *Rhinaspir*, *Rosaseptor*.
- Lab. P. Astier, 42, rue du D^r-Blanche, Paris. — *Arhéol*, *Colitique*, *Condurango granulé Astier*, *Glycophosphates granulés Astier*, *Kola Astier*, *Lyxanthine Astier*, *Néo-Riodine*, *Philitérol*, *Quinquina granulé Astier*, *Riodine*, *Stalysine*.
- Lab. de l'Atospirine et du Strontiodé, 19, rue du Bac, Paris. — *Atospirine*, *Strontiodé*.
- Lab. du D^r E. Aubert, 71, rue Sainte-Anne, Paris. — *Aseptobiline Schmit*, *Créacalcine*, *Créatonine*, *Hépatoplasma*, *Kola Aubert caféinée*, *Métacarbène*, *Métacitrine*, *Métaformine comprimé*, *Métaformine granulé*, *Méastérol*, *Mucigénol*, *Néosalicylate*, *Néosplénine*, *Neutrobil*, *Pancrèbile Parabenzyll*, *Prosulfamide*, *Suppo-créosole*, *Tot'Hépatine*, *Tous produits de marque « Bertal »*.
- Lab. Aubery, av. de Monclar, Avignon (Vaucluse). — *Dynaserum*, *Grappuval*, *Plasmobeef*, *Plasmobiot*, *Plasmostérol*, *Séroglobine*, *Vigoria*, *Vin Aubery*, *Vitacarnol*.
- Lab. Aubriot, 56, boul. Ornano, Paris. — *Élixir Bravais*, *Granulé Bravais*, *Vin Bravais*.
- Lab. Auclair, 36, rue de la Tour-d'Auvergne, Paris (IX^e). — *Bi-So-Dol*, *Cachets Pulmonix Polvi*, *Colmatol*, *Defensol B*, *Digestif Polvi*, *Endoplex Polvi*, *Gouttes M. I. A.*, *Iodocardine*, *Panveinine*, *Paxyl*, *Prolax*, *Ultracalcium irradié*, *Xanthorryl*.
- Lab. Marcel Audibert, Cinq-Cantons, Bayonne. — *Vermirène Audibert*.
- Lab. Augier, 2, rue des Lombards, Paris. — *Affinex*, *Biocalcine*, *Gouttes Sap*, *Isoptal*, *Mensuosédyl*, *Noctisédyl*.
- Lab. A. V. E., 56, rue Beaubourg, Paris. — *Cartilos*, *Comprimés N. B. M.*, *Gelchol*, *Gluchol*, *Idonil*, *Idonil au Maté*, *Leptab*, *Osmos*, *Sulsod*, *Vertox*.
- Lab. Axos, 3, rue Sarrette, Paris (XIV^e). — *Aphonia*, *Argocarbène*, *Axodermine*, *Axorhine*, *Axopectine*, *Broncho-Axos*, *Cholaxol*, *Fagiecarbène*, *Manganèse Axos*.

- Lab. Badel, 58-60, rue des Moulins, Valence (Drôme). — *Florosine*, *Gouttes Bronchophiles André*, *Juglanrégine André*, *Kolasthène Badel*, *Mycidol Badel*, *Poudre laxative André*, *Soporine*.
- Lab. G. Baetz, Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Cinascol*, *Perasurol*, *Pervosine*.
- Lab. A. Bailly, 15, rue de Rome, Paris (VIII^e). — *Pulmo Bailly* (ex-*Pulmosérum*), *Opobyl*, *Sédacônes*, *Anaxéryl*, *Derphyl*, *Rhinamide*, *Panbiol*, *Oxy-Buccol*, *Pyorex*, *Theinol*, *Urophile*, *Oculase*, *Bactéramide*.
- Lab. Octave Bailly, 44, rue Armand-Carrel, Montreuil-sous-Bois. — *Fibrigelase*.
- Lab. du D^r Baissade, Saint-Loup, Marseille (B.-du-Rh.). — *Baume du D^r Baissade*.
- Lab. du D^r Baraige, 24, r. Paul-Bert, Paris (XI^e). — *Glutipolysalyl*, *Glutisalyl*, *Spécifique Eldé*.
- Lab. Barbessou, 10, allées Damour, Bordeaux. — *Antidouleur Barbessou*, *Dunaméol élixir*, *Elixir vermifuge américain Olivier*, *Produits du D^r Serin de Gaillac*, *Supralgyl*.
- Lab. Bardet, 76, rue de Sèvres, Paris (VII^e). — *Gachets Kapytan*, *Capsules Haarlem Bardet*, *Sédogastrol*, *Solution Quinquina Bardet*, *Tœnifuge Bardet*, *Xantharlem*.
- Lab. Bardou, 13, q. Ragobert, Joigny (Yonne). — *Sanargol*.
- Lab. Barthélemy, pl. Forbin, Aix (B.-du-Rhône). — *Anaural*, *Baume St-Roch*, *Biliboldo*, *Sirop Escolls*, *Sirop Pulmophile*, *Solvurène*.
- Lab. E. Bartier, Armentières (Nord). — *Myosthène*, *Stimulaxine*.
- Lab. Baude, St-Aubert (Nord). — *Anthrasediol*, *Emonctine*, *Syphonéol*.
- Lab. P. Baude, 72, rue Saint-Dominique, Paris. — *Lymphosclérol*, *Nestosyl* (*Pommade*, *Solution huileuse*, *Suppositoires*, *Ovules*), *Sérocabone*.
- Lab. Spécial Bazin, H. Garraud, pharmacien, 9, cours Victor-Hugo, Bordeaux (Gironde). — *Opothérapie Bazin*.
- Lab. B. C. L., 29, fg de Bourgogne, Orléans. — *Alsodine*, *Gastrépatine*, *Naza capsules*, *Micloseptol*, *Totaltonic*.
- Lab. B. E. A., 17, faub. des Ancêtres, Belfort. — *Alibourine*.
- Lab. Beaufour, 18, pl. Doguereau, Dreux (E.-et-L.). — *Romarène*.
- Lab. Beaugourdon, 43, av. Kléber, Paris. — *Crème Lygie*, *Fluosalyl Beaugourdon*, *Laxatif Fluol*, *Pandermol* (amp. et pommade), *Pâte Magali*, *Sirop Magali*.
- Lab. Beaulieu, 40, bd de Charonne, Paris. — *Ferandrine Vitalis*, *Fer-Ovarine Vitalis*.

- Lab. Beaumis-Lagrange**, 72, quai Jemmapes, Paris. — *Acatar*, *Bensamine*, *Galomel R. B. Lagrange*, *Océbrinol A et B*, *Dragées Vityl*, *Infusion orientale RBL*, *Kamara C. 47*, *Myrcol*, *Néophos*, *Palpitine*, *Pipérazine RB Lagrange*, *Prostatols*, *Rubargyre*, *Sédaortine*.
- Lab. Bebia**, 5, av. E.-Boissier, Nantes (Loire-Inf.). — *Dracoline*, *Pommade et Poudre Bebia*, *Rossoline Lefort*, *Savon et Suppositoires Bébia*.
- L. Bellères**, 19, rue Drouot, Paris. — *Antirrhôide*, *Biophène*, *Désensibilysine*, *Eusomnine*, *Laurénol*, *Lubrokal*, *Opoplasma*, *Orthogénol*, *Recresal*, *Sirop Gribell*, *Vaccins Ivago* (procédé L. Goldenberg).
- Lab. du Dr Bengué et fils**, 16, rue Ballu, Paris (IX^e). — *Baume Bengué*, *Chloréthyle Bengué*, *Anestile Bengué*, *Narcotile Bengué*, *Siphons de Méthyle Bengué*, *Dragées Bengué*, *Néseptol Bengué*, *Opticura Bengué*, *Vegecarnis Bengué*, *Eupurgo Bengué*, *Topique Bengué*.
- Lab. H. Benoit**, Poligny (Jura). — *Arshémo Fer B*, *Grinergyl*, *Fixocalcion*.
- Lab. Béral**, 194, rue de Rivoli, Paris. — *Adrénoïdes*, *Adréphédrine*, *Clearol*, *Ephédermine*, *Ephédraséine*, *Ephédrampoules*, *Ephédricones*, *Ephédrine*, *Ephédrisol*, *Ephédroïdes*, *Ephédromel*, *Ephéiodine*, *Ephétropine*, *Grains d'Ephédrine*, *Mydriédrine*, *Myrtine*, *Nasophédrine*, *Navidrine*, *Oléophédrine*, *Rhinodrops*, *Somnicomes*, *Spartophédrine*.
- Lab. Berger**, 14, rue des Pyramides, Paris. — *Alliocar*, *Calciphose*, *Glutinettes d'Aspirine*, *Gynéose*, *Mariode*, *Ostéoglandulol*, *Valéronal*.
- Lab. Bernamont**, 87-89, rue du Commerce, Nevers (Nièvre). — *Pommade et Gouttes Bernamont*.
- Lab. Bernard Garcin**, St-Saturnin-lès-Avignon, Vaucluse. — *Bismullium*, *Mucyllium*.
- Lab. R. Bernardo**, 47, av. de la République, Villeneuve-le-Roi (S.-et-O.). — *Siligone*, *Théostène* (*Scillitique et Simple*).
- Lab. G. Bernhard**, 11, rue La Fayette, Paris. — *Ampéline Bernhard*, *Ampelicoûnes Bernhard*, *Essence Alsacienne du Dr Frech*, *Gargarisme concentré G. Bernhard*, *Gargarisme sec Wuhrlin*, *Gouttes Sédatives Bernhard*, *Granules des Vosges*, *Kéléol Bernhard*, *Kyralgine Bernhard*, *Poudre antigastralgique Bernhard*, *Sirop Sédatif Bernhard*.
- Lab. Berthelot**, Saint-Ouen-l'Aumône (S.-et-O.). — *Baume Berthelot*.
- Lab. G. Berthon**, Dornes (Nièvre). — *Asthmo Actine Berthon*.
- Lab. A. Besnier**, 1, rue Raynouard, Paris. — *Opo-Phyto Draineurs Réaubourg*, *Poly-Opo-Minéraline*, *Séneçonine*.

- Lab. R. Beurton, 10-12, boulevard de la Villette, Paris. — *Germolysine, Liqueur Sédatrice Bacoq.*
- Lab. de la Bexinine — L. Colin, 19, rue Saint-Jean, Caen (Calvados). — *Bexinine.*
- Lab. Beytout, 12, bd St-Martin, Paris. — *Aérophagyl, Carbonésie, Dentoma, Hista Injectable, Hista Liniment, Hista Dimilli, Hordénol, Kaolinase, Kaolinase Belladonnée, Lactoma, Lait de Magnésie, Suppol, Thiophyl, Tisane Oisbey, Véryl.*
- La Bière des Nurses, Bourg-la-Reine (Seine). — *Bières pures: Diastasée, Hypermaltée, Santé, Elite, Lunch, Con-centré des Nurses.*
- Lab. du Bifidigène, 22, rue Pigalle, Paris. — *Bifidigène.*
- Lab. du Bilifluol, 20, rue de Rivoli, Paris (IV^e). — *Bilifluol, Hormocarnyl, Sanuryl, Veinoflux, Veinotensyl.*
- Lab. Bio-Bourgogne, 24, avenue Albert I^{er}, Dijon. — *Ar-thrita, Asthmo-hépatine Lebrot, Boldilia, Hépatoveine F et M, Pepto-Sucs, Surtensal.*
- Lab. de Biochimie médicale (Ch. Desgrez, D^r en pharmacie), 19-21, rue Van-Looy, Paris. — *Arsénos solvant, Collu-sulfar, Ektophanol, Sulfarsénol.*
- Lab. Biochimique de l'Est, Lure (Hte-Saône). — *Lemonai, Sirop Poléry.*
- Lab. Biolabo, 9, bd Malesherbes, Paris. — *Atalante, Demor-phène, Euneryl.*
- Lab. de Biologie médicale et de Dermothérapie, 8, avenue Walkanaer, Nice. — *Antipiol, Desartyl, Entérofagos, Rhino-Antipiol.*
- Lab. Biologique de l'Ile-de-France, 19, av. d'Orléans, Paris (XIV^e). — *Aloplastine, Iodocalcium, Neurocalcium, Pâte à l'eau Aloplastine, Sirop Iodocalcium, Sirop Sédatif Neurocalcium.*
- Lab. La Biomarine, Dieppe (S.-Inf.). — *Arthritose, Embryo-cytol, Embryol, Ionyl, Marinol, Plasmarine.*
- Lab. Biopharmax, 40, qual Jeanne-d'Arc, Chinon (I.-et-L.). — *Akésol Muzi, Cellulax, Hépasman, Ultracrinol.*
- Lab. Bios, 10, rue Vineuse, Paris (XVI^e). — *Carbonex, Gouttes ionisées A, Hépalium, Pulmone.*
- Lab. Biosedra, 37, rue Brochant, Paris (XVII^e). — *Algonaal, Biosedra, Gastéose, Hépanova, Higalex, Nuclergol, Opo-Veinogène, Potion Dioga, Suppo-Zinol, Sympa-thocrine, Veinogène.*
- Produits de la Biothérapie, H. Villette et Cie, pharmaciens, 5, rue Paul-Barruel, Paris. — *Antivirus, Arapal, Bilivaccins, Cellucrine, Crysiodal, Sanogyl, Sanoram Spirogyl, Uroscléral.*

- Lab. Birnie Scott, 5 bis, rue Marius-Aufan, Paris (XVII^e). — *Hyperchlorhydral*.
- Lab. du Bissyl, 117 ter, r. Ordener, Paris. — *Bissyl*.
- Lab. Pharmaceutiques A. Blanc, Barcelonne-du-Gers (Gers). — *Germoléal*, *Hevoglan*, *Hevoglanol*, *Muolsol*.
- Lab. J. Blanchard, Pont-de-Vaux (Ain). — *Acéryl*, *Cachets du D^r March*, *Coltène*, *Nuclarrhol*.
- Lab. Blanchot, 15, av. du Parc-Montsouris, Paris. — *Toni-veinine*, *Solution Waelet*.
- Lab. Bloch, Tomblaine, près Nancy (M.-et-M.). — *Arrow-root*, *Blokao*, *Farines de régime*, *Farines de céréales*, *de légumes et de fruits*, *Rapidoats*, *Semoules et flocons de céréales*, *Tapiocas*.
- Lab. P. Bolvert, Montguyon (Char.-Inf.). — *Calmosuppos sédatifs*, *Calmosuppos antilhermiques*, *Hepatogenine*.
- Lab. Boize et Alliot, 9, av. Jean-Jaurès, Lyon. — *Alzine*, *Atomine*, *Diurobromine*, *Diurocardine*, *Diurocystine*, *Logaphos*.
- Lab. du Boldochol, 55, avenue de Montredon, Marseille (B.-du-R.). — *Boldochol*, *Elixir Percy*, *Hémobiose*, *Microbol*, *Sirop Bural*, *Sirop Rhégia*, *Uribiol*.
- Lab. du Boldocyna, A. Jourdin, 6, avenue Victor-Hugo, Paris. — *Boldocyna*.
- Lab. Bomel, Annonay (Ardèche). — *Ampoules V.-E. Doumer*, *Collutoire V.-E. Doumer*, *Pilules V.-E. Doumer*, *Pommade V.-E. Doumer*.
- Lab. Boncour, 46, rue de St-Mandé, St-Maurice (Seine). — *Bronchorectine*.
- Lab. Bonetti, 60, rue E.-Dolet, Malakoff (Seine). — *Diadermine*.
- Lab. Bonnet, Laragne (Hautes-Alpes). — *Germalpe*.
- Lab. Bordelais, 47, rue Maleret, Bordeaux. — *Anacarbol*, *Anhépatox*, *Cephæmetine*, *Chelicyna*, *Gelciver*, *Ente-rargol*, *Phosma*, *Phosphosodine*, *Physioscyamine*, *Poudre Arria*, *Solacitrine*, *Stomagyl*, *Sulcichlorine*.
- Lab. Borne, 79, r. de Paris, St-Denis. — *Barcan*, *Benzéthol*, *Chocochoaux*, *Codéthylène*, (ex-Dionine), *Diocamphine*, *Distilbène*, *Lysococcine*, *Thiosédal*.
- Lab. du Bornéosol, 143 bis, rue Ordener, Paris. — *Bornéosol*, *Solhysop*.
- Lab. Bornet, 5, bd des Brotteaux, Lyon. — *Bismuth B3*.
- Lab. Bottu, 115, r. N.-D.-des-Champs, Paris. — *Oodoforme Bottu*, *Gaze néolée*, *Néalgyl Bottu*, *Néol Bottu*, *Néolides H. B.*, *Ovunéol Bottu*.
- Lab. du D^r Boucard, 30, rue Singer, Paris. — *Bioteol*, *Crayon Termosan*, *Lactéol* : *Comprimés*, *liquide*, *ovules*, *pansement*, *suppositoires*, *Pulvi-Lactéol*, *Rhino-Lactéol*, *Vaxa*, *Viatol*.

- Lab. A. Bouchand, Pharmacien, Melle (Deux-Sèvres). — *Basmyl*.
- Lab. E.-Bouchara, 47, r. de Bretagne, Paris. — *Biphédrine aqueuse*, *Biphédrine huileuse*, *Epanal*, *Neo-Godion* (Gouttes et Dragées), *Pulvo-Biphédrine aqueuse*, *Pulvo-Biphédrine huileuse*.
- Lab. P. Bouchereau, 57, bd Aristide-Briand, Champigny (Seine). — *Diphazol*, *Phéniodine*, *Saliformiode*, *Sirop Bégessol*.
- Lab. Boucly, Grande-Place, Louvroll (Nord). — *Génurine*, *Hepentéryl*.
- Lab. Boudier, 37, rue de Bourgogne, Paris (VII^e). — *Aminophylline Boudier*, *Bylyxyl*, *Veinosan*.
- Lab. Boudin, 9, av. Jean-Jaurès, Joinville-le-Pont. — *Révuksif Boudin*.
- Lab. Bouillet, 48, bd des Batignolles, Paris. — *Bismuth Tulasne*, *Sous-Nitrate de Bismuth Tulasne pur*, *Iodulans*.
- Lab. H. Boulsset, Pharmacien, 18, bd de Strasbourg, Albi (Tarn). — *Néosédyl*.
- Lab. Bourdou, Frontignan (Hérault). — *Gynepta*, *Heptyl Bourdou*.
- Lab. Bourillot, 6, r. Berbissey, Dijon. — *Bourdainol* (comprimés), *Bronphélia*, *Bronchialis*, *Bronchophilos*, *Bronxia*, *Choleocytol*, *Dragées et Elixir aux Algues-Marines*, *Gouttes Iodocirculine*, *Ginéo* (comprimés), *Gercurol* (pommade), *Granulé Verdol*, *Héraménol*, *Jouréin B*, *Lacta*, *Morufine*, *Odochloraline*, *Polycalcose*, *Renovitr*, *Sirop Chevassus*, *Toxurol*, *Trimidor*, *Vermus* (sirop).
- Prod. Bourvis-Orthopédie, 28, cours Gambetta, Lyon. — *Bandes Giltex* (7, 8, 10 cm.), *Agrafes de fixation Giltex*, *Bas à varices Giltex*.
- Lab. G. Bousquet, Albi (Tarn). — *Tubes Fertux Ratio*.
- Lab. Boutsille, 23, r. des Moines, Paris. — *Balseptol*, *Cantéine*, *Disuryl*, *Neurobore*, *Pulmorsciol*, *Pulmovaccin*, *Tubérol*, *Vaccinovules*.
- Lab. Jean Boutes, rue Clément-Ader, Muret (Haute-Garonne). — *Drosol*, *Pansements gras Maujean* (simple et aux essences).
- Lab. R. Boutin, 8, rue Aumont-Thiéville, Paris (XVII^e). — *Iso-Sels*, *Orthocynol*.
- Lab. Boutroux, 25, rue du Général-Foy, Paris (VIII^e). — *Comprimés Chloripepsine*, *Comprimés Fluvia*, *Microderme* (crème et solution), *Soja Soyolk*, *Streptoderem*, *Végélacl*, *Soja*, *Sojalose*.

- Lab. Bouty**, 3, rue de Dunkerque, Paris. — *Biliol*, *Gastrozymase*, *Globépal*, *Liqueur Bouty*, *Liqueur Thyro*, *Liquides organiques injectables*, *Métasérum*, *Métharfer*, *Métharsol*, *Néphrine*, *Opostyl*, *Opothérapie Bouty*, *Ovigénine*, *Produits Pennès*, *Sérosthényl*, *Sirop de Gaïarsol*, *Surrénaline*, *Thyroidine*, *Triglandine*, *Triglandol*, *Vaxitiol Bouty*.
- Lab. Bouvot**, Auvers-sur-Oise (S.-et-O.). — *Bichlorone*, *Oéréliode*, *Pastilles Arvox*, *Sulfoxyne*, *Yro*.
- Lab. Bouyssou**, Chambols (Orne). — *Biophytol*, *Helenine de Korab*, *Pankemol*, *Peptozym*, *Sirop Froment*, *Tonique Chapès*.
- Lab. Boyer**, 18, rue de la Perle, Paris. — *Phosbiose*.
- Lab. Bracquemond et Cie**, 105, rue de Normandie, Courbevoie. — *Morrhuéine Jungken*, *Morrhuéine Jungken Vitaminée*, *Sel d'Ewald*.
- Lab. d'Analyses Bréant**, 11, rue de Clichy, Paris. — *Allergine*, *Gédrosan*, *Chlorure d'Ammonium Bréant*, *Daturasolène*, *Lycobile*, *Neurosolène*, *Osmo-Vaccins Bréant*, *Paragelose*, *Phostone*, *Précy*, *Tegeol*, *Vanotonyl*.
- Lab. Ch. Brésil**, 12, rue St-Gilles, Paris. — *Broncosol*, *Sanguil*.
- Lab. Brichard et fils**, 23, bd Raym.-Poincaré, Bar-le-Duc. — *Alcalino-Gastryl*, *Baby-Bala*, *Belvuline*, *Bronchorose*, *Elixir St-Jean*, *Elycaptol* (sirop, capsules, pastilles), *Eucalybrol* (ampoules, sirop, suppositoires), *Forvital*, *Hémovéine*, *Inhalopin*, *Isalaxine*, *Juvénostyl*, *Nuxiodine*, *Nydol*, *Pastilles Bala*, *Pastilles Debar*, *Pecto-Bronchyl*, *Reinaxine*, *Rythmensine*, *Sirop Bala*, *Sirop Brichard*, *Sirop Debar*, *Thyroguine*, *Tonixyl*, *Urobarine*, *Veinhemone*, *Veinixir*, *Vigostérol irradié*.
- Lab. G. Briens**, 20-22, rue de la République, Lyon. — *Dragées Bondonneau*, *Iodostem*.
- Lab. Brisson**, 157, rue Championnet, Paris. — *Ampoules Egralène*, *Ampoules huile soufrée*, *Ampoules Sigmuth*, *Anytal Brisson*, *Bainsulphium*, *Cathiodine*, *Denisia*, *Denisoline*, *Dithioléine Brisson*, *Doliseti*, *Entéricure Brisson*, *Jovine Brisson*, *Lacodermes Brisson*, *Lenicade Brisson*, *Licardet Brisson*, *Magnésie du Dr Gustin*, *Néo-Séti*, *Procula Brisson*, *Savon Denisol Brisson*, *Sédotine*, *Séti*, *Setipyrine*, *Sulphium*, *Vapo-sulphium*, *Vulcase Brisson*, *Vulcapil Brisson*, *Uriclarine Brisson*, *Uvor*, *Septylase Brisson*.
- Lab. Brochon**, 202 bis, avenue Jean-Jaurès, Clamart (Seine). — *Combretine*, *Cratægus Bocquillon-Limousin*, *Huiles Duret*, *Tœnifuge Limousin*.
- Lab. du Broncho-Lactol**, 6, place de l'Académie, Angers. — *Broncho-Lactol*, *Deschlerosel*, *Epithémia*, *Lithinés Magnésiés Maxim*.
- Lab. P. Brothier**, 20, rue Henri-Martin, Vanves (Seine). — *Axonal*, *Emencyl*, *Neuronal*.

- Lab. Bruneau et Cie**, 17, rue de Berri, Paris. — *Bain de bouche à la Duna-caïne*, *Brunyl*, *Cutiphile*, *Cutiplate*, *Duna-caïne*, *Duna-caïnoï*, *Duna-phorine* (ampoules et suppositoires), *Duna-B*, *Lobéline*, *Paraffinoléol*, *Parémanol*, *Sénophile*, *Sérum de Jousset*, *Théophylline Bruneau* (comprimés, ampoules et suppositoires).
- Lab. A. Brunot**, 16, rue de Boulainvilliers, Paris. — *Dialyl*, *Sel de Hunt*.
- Lab. Brunschwik**, 3 bis, rue Vallier, Levallois-Perret. — *Parvula*, *Tonique Rouveray*.
- Lab. du Buccaseptyl et Purgarez**, 17, av. Charles-Lambert, Chatou (S.-et-O.). — *Buccaseptyl*, *Purgarez*.
- Lab. du Bufox**, 21, rue Grange-aux-Belles, Paris. — *Bufox*.
- Lab. Buriat**, 37, rue Spontini, Paris. — *Arséniode Buriat*, *Vérianne Buriat*.
- Lab. du D^r Butler**, Boguet, pharmacien, 1, rue Bossuet, Dijon. — *Pommade du D^r Butler*, *Poudre du D^r Butler*.
- Lab. du Buxema**, J. Avril, 18, rue Thiers, Mantes-Gassicourt (S.-et-O.). — *Buxema*, *Buxain*.
- Etab. Byla**, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. — Voir : *Laboratoires d'Endocrinologie appliquée*.
- Lab. des Spécialités Cabasson**, 183, rue de Rome, Marseille. — *Cyto-Sirop*, *Dynosthène*, *Granulé Cabasson*, *Novolax*, *Pulmoseptine*.
- Lab. du Cadior**, 19, rue Clapeyron, Paris. — *Cadior*, *Néo-Cadior*.
- Lab. Caducia**, 78, avenue Schneider, Clamart (Seine). — *Glinax*, *Drainochol*, *Gluthional*, *Phosphan Caducia*, *Sténacrine*.
- Lab. Caillaud**, 37, rue de la Fédération, Paris. — *Aldine*, *Choléo Combretol*, *Cyanhermine*, *Hydralin*, *Mucosodine*.
- Lab. H. Calas**, 162, rue de l'Hay, Gentilly (Seine). — *Inte-tarsol*.
- Lab. du Calcio-Dynamyl**, 95, rue Lecourbe, Paris. — *Calcio-Dynamil*, *Calmarine*, *Gluco-Cyanure*.
- Lab. du Calcium 30**, 299, rue des Pyrénées, Paris (XX^e). — *Calcium 30*, *Paroïdocalcium*.
- Lab. de la Calmarine**, J.-B. Dupeyroux, 95, rue Lecourbe, Paris (XV^e). — *Calmarine*, *Calcio-Dynamyl*, *Gluco-Cyanure*.

- Lab. Calmel-Domergue**, 20 bis, rue Gravelotte, Toulouse. — *Arsétonyl, Arthricétol, Biiodures Domergue, Complexe Ovarien Caldo, Dermobel, Ephédro-Rhinol, Eucalcyl, Gonurol A et B, Guinitrol, Hexarubrine, Iodures Domergue, Pangynol, Pharyngaseptyl, Polydigeral Calmel, Promulier, Sanguinova, Vaso-rhinol simple, Vaso-rhinol mentholé, Vaso-rhinol adrénaliné, Viscosodine.*
- Lab. G. Calmels**, Auterive (Haute-Garonne). — *Agocrinol, Anaplagan, Anatensyl, Biokolarsan, Cystocure, Cystosuppos, Dolophan, Entérocuprol, Gastéryl, Gynéseptyl, Gripponyl, Hépatocure, Hépacrynol, Lacta-Calcium, Opocalcyl, Passibromine, Prostacure, Pulmothiol, Révulsigène, Uro-Lithium, Veinostase.*
- Lab. Calmopelvine-Calmovarine**, 81, rue Réaumur, Paris (2°). — *Calmopelvine, Calmovarine, Suppositoires Calmopelvine, Suppositoires Calmovarine.*
- Lab. Camuset**, 18, rue Ernest-Rousselle, Paris. — *Hexotal, Pyrétane, Silicyl.*
- Lab. du Canol**, Malzet (Calvados). — *Canol.*
- Lab. Cantin**, Palaiseau (S.-et-O.). — *Comprimés Nican, Gouttes Nican, Somnothyrid (pilules et suppositoires).*
- Lab. Carbon**, 8, rue Jean-du-Bellay, Paris. — *Cholélyse.*
- Lab. du Cardosol**, 32, rue Martinat, Asnières (Seine). — *Solution Cardosol.*
- Lab. René Carlier**, 43, r. de Crétell, Joinville-le-Pont (Seine). — *Colarsénol collutoire, Colarsénol pommade nasale, Infangyl Carlier.*
- Lab. A. Caron**, 9, place des Terreaux, Lyon. — *Terpine Boveil.*
- Prod. Biologiques Carrion**, 54, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Adrénaline, Antasthène, Cardio-Streptine, Coliflorine, Dyspeptine Hepp, Entérococcène, Eukinase, Evalmine, Gonagone, Hématoéthéroïdine, Hépaglycérol, Hépanème, Lactifère, Lactoprotéide, Lactosérum, Opothérapie Carrion, Ovules au Gonagone, Pancréatokinase, Per-Extraits, Per-Hépatique, Per-Ovarien, Per-Surrénalien, Per-Thymique, Phlébosine M. et F., Plasma de Quinton, Rétropiluline, Solution du Dr Jacobson, Staphylagone, Sulfagone, Utéro-Streptine, Vaccins Carrion.*
- Lab. Carrion-Lagnel**, 5, rue du Capitaine-Scott, Paris. — *Babeurres, Késtroène, Laits Carrion, Yohourthogène.*
- Lab. Carron**, 69, rue de St-Cloud, Clamart. — *Amiphène, Fosfoxyll, Fosyls.*
- Lab. Carteret**, 15, rue d'Argenteuil, Paris. — *Bactioxène, Cétamol, Chrysemine Carteret, Diurène, Euronol, Fermentérol, Lusoforme, Sinahin, Vulcérinol.*
- Lab. Castel**, 1, pl. Bouquerie, Nîmes. — *Oxyfuge, Pavonol, Tanifuge, Vermifuge Castel, Zogol.*

- Lab. Casteran, 152, Côte Pavée, Toulouse. — *Iodovésinine Leduc, Polyvéinine.*
- Lab. Catillon, 3, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Glycérine Catillon, Iodo-thyroïdine Catillon, Peptone Catillon, Strophantine Catillon, Strophantus Catillon.*
- Lab. du D^r R. Cavaillès, 29, r. Singer, Paris (XVI^e). — *Coloplastre, Crème du D^r Rap, Crème de Quinine-Sapolan, Emplâtres Rogé-Cavaillès, Extrait du D^r Rap, Gaze Anadhère, Lait de Cèdre Sapolan, Lait de Sapolan, Lait de Soufre Sapolan, Poudre de Sapolan, Poudre de Soufre Sapolan, Sapobarbe, Sapocade, Sapocrème, Sapolan, Sapopâte, Saposide, Savon de Sapolan, Sulfostan, Tisane dépurative de Cavaillès.*
- Lab. Cébé, St-Just-sur-Loire (Loire). — *Thio-Goudron.*
- Lab. Central de la Bastille, 3, bd Beaumarchais, Paris. — *Capsules Ricord, Gimatvol, Endolcalcine, Ferogyl, Inhalogène, Iodamol Michel, Iodo-Brou, Lactalvose, Mensalgine, Saturalgine, Sédasthmine.*
- Lab. de la Cérébrine Fournier, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris (XIV^e). — *Cérébrine Fournier.*
- Lab. G. César Boss, 10, rue de la Vlotte, Besançon. — *Médico-ferment.*
- Lab. Pharmaceutiques Chabre Frères, Toulon. — *A 313, Vitaol.*
- Lab. Yves Chabrol, 29, avenue d'Orléans, Paris. — *Gastrosthénol, Huilorrhine, Quotibyl.*
- Lab. Chaix, 8-10, rue Alphonse-Bertillon, Paris (XV^e). — *Colloïdogénine du D^r Bayls, Polyvaline du D^r Bayle, Splénomédulla (opothérapie splénique et médullaire).*
- Lab. Chalas, 75, rue Jacques-Dulud, Neuilly-sur-Seine. — *Kolatinés.*
- Lab. Chamard et Niel, 3, rue Royet, Lyon-Caluire. — *Bismusodins, Calmobro-Niel (ex-Kalmobrol), Ergophos.*
- Lab. Chambon, 5, pl. Francheville, Périgueux (Dordogne). — *Antisciastique P. Chambon, Angoral, Algoil du D^r Guiraud.*
- Lab. Chanteaud, Chambourey (S.-et-O.). — *Granules Chanteaud, Kénapirine Chanteaud, Sedlitz Chanteaud, Sténoïl Chanteaud, Sulphydral Chanteaud, Uréol Chanteaud, Granules Antinausiques.*
- Lab. Chantereau (Prod. Innothéra), 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum, Sympathyl, Tot'Hamélis, Tot'Héma.*
- Lab. A. Chapellier, Saint-Aigulin (Char.-Inf^e). — *Ouramida.*
- Lab. Chapotot, 56, bd Ornano, Paris. — *Néo-laxatif Chapoto Pyroselline, Rhizotannin Chapotot.*

- Lab. des Charbons Fraudin**, 4, av. Desfeux, Boulogne-Billancourt (Seine). — *Benzoate de naphthol Fraudin*, *Biscuits*, *Garbotodures Fraudin*, *Charbon Fraudin belladoné*, *Charbon Fraudin naphtolé*, *Charbon Fraudin simple* (granulés, comprimés), *Laxol Fraudin*.
- Lab. E. Charpentier**, 7, r. du Bois-de-Boulogne, Paris. — *Boldolaxine*, *Galyptol Charpentier*, *Quinocarbène*.
- Lab. Chartier**, Saumur (M.-et-L.). — *La Myrtille pure H. Chartier*, *Le Raisin quotidien*, *Le Suc Normand*.
- Lab. Charvoz**, 9 et 9 bis, rue Borromée, Paris. — *Cachets Charvoz*, *Hépatogène Charvoz*, *Inertyl Charvoz*.
- Lab. Chassaing**, *Le Coq et C^{ie}*, 1, quai Aulagnier, Asnières (Seine). — *Dioséine Prunier*, *Néro-Neurosine Prunier*, *Neurosine Prunier*, *Novacétine Prunier*.
- Lab. Chatelut**, 65, rue Louis-Blanc, Paris. — *Dragées Névrosthéniques*, *Dragées Yse*, *Hémagénine Giraud*.
- Lab. Chatron**, 45, r. Cambronne, Paris (XV^e). — *Boldomucul*, *Dystonine*, *Jamax*, *Normucyl*, *Normucyl Belladone*, *Normucyl Bourdaine*.
- Pharmacie Chaumel**, 87, rue La Fayette, Paris. — *Isotonyl Bouret* (poudre de Lausanne), *Normatensol*.
- Établ. Alfred Chauvin**, Aubenas (Ardèche). — *Acoégénol*, *Atropophédrine*, *Collophirtol*, *Dépuratif Chauvin aux hyposulfites*, *Désensibilisant Chauvin*, *Gallo-Chrome*, *Gouttes Chauvin à l'Audisclérocure*, *Laborol*, *Osmotol*, *Paratyl*, *Phocéol*, *Phylloglobine*, *Sirop Chauvin à l'Adréno-Ephédrine*, *Solutions otologiques Chauvin*, *Spartoforme*, *Tubes Blache*, *Tubes Chauvin*.
- Lab. L. Chauvin**, 3, r. de Vouillé, Paris (XV^e). — *Asthmo-lène*, *Cachets Spévin*, *Glucamonix*, *Glucocithine*, *Gluconyl*, *Glucosium*, *Gluquinix*, *Inhess*, *Levulinyl*, *Olegel*, *Selor*, *Sitergol*, *Solubéol*.
- Lab. Chavialle**, 70, Grande-Rue, Sèvres. — *Fornose*, *Suppositoires Pyrax* (bébés, enfants, adultes).
- Lab. R. Chemineau**, Vouvray (I.-et-L.). — *Gargyl*.
- Lab. Chenu**, Montferrand (Puy-de-Dôme). — *Bromocodéine Chenu*, *Digestal*, *Sulfoterpinol* (élixir et cachets).
- Lab. Chevillon**, 99, rue de Paris, Massy (S.-et-O.). — *Bilio-gastrine*, *Bylac*, *Morisland*, *Nucléigène*, *Paradoxal*, *Paradolène*, *Stoméol*.
- Lab. Chevreton-Lematte**, 52, r. La Bruyère, Paris. — (Voir *Lab. Lematte et Boinot*.)
- Lab. Chiarini**, Aix-en-Provence (B.-du-R.). — *Elixir vermifuge Chiarini*, *Tœnifuge du D^r Jaquème*.
- Lab. Chibret**, 5, rue St-Hérem, Clermont-Ferrand. — *Collyres et Pommades Chibret « Optima »*, *Chibromercurobrome* sous toutes ses formes, solution, ovules, ampoules lavages et ampoules injectables, collyre, tube et collutoire, *choloptomercuro*, *humeur aqueuse artificielle*.

- Lab. de Chimiothérapie, 22, rue de Turbigo, Paris. — *Balsofumine simple et mentholée à 1 et 4 p. 100, Balsorhine (Huile, Capsules, Pommade), Nucléinovarine, Pepsobyl.*
- Lab. de Chimiothérapie Antibactérienne, 16, route d'Abbeville, Amiens (Somme). — *Métasulfamide.*
- Lab. Choay, 48, av. Théophile-Gautier, Paris (XVI^e). — *Opothérapie Choay : Extraits totaux, Extraits injectables, Syncrines, Peptosthénine. Adrenaline Choay, Insuline Choay, Insuline-Zinc-Protamine Choay, Post-Hypophyse Choay, Gélotanin Choay.*
- Lab. du Choeynol, Brazey-en-Plaine (Côte-d'Or). — *Chocynol, Pommade Ascigué, Kaomag, Veinophos, Sarcohémol, Terpopneumol, Bronchopuerol, Choléoclinol.*
- Lab. Christiaens, Dr René Marq, Sr (Lab. de la Pharmacie de la Place-Royale), 4, rue Colbert, Reims. — *Antialgos Christiaens, Benzophosphine Christiaens, Capsules Goubaux, Pilules anhépatiques Christiaens, Pilules prophylactiques Christiaens, Sédatine Christiaens.*
- Lab. des Produits du Dr Churchill, 92, av. de St-Mandé, Paris (XII^e). — *Fosfomagnyl Churchill, Limol Churchill, Magol Churchill, Néo-granulé Ghurchill, Poliol Churchill.*
- Lab. Ciba, 103-117, boul. de la Part-Dieu, Lyon (Rhône). — *Agomensine, Androstine, Ascéine, Atoquinol, Cibalgine, Coagulène et Hémocoagulène, Coramine, Dial, Didial, Digifoline, Elbon, Entéro-Vioforme, Ferrophytine, Fortossan, Fortossan irradié, Hémypnal, Lipoiodine, Lutocycline, Ovocycline, Perandrone, Percainal, Percaine, Péristaltine, Phytine, Quinino-phytine, Résyl, Salène-Salénal, Sanoquinol, Sistomensine, Trasentine, Vioforme.*
- Lab. Léon Claeys, 1, bd St-Martin, Paris (III^e). — *Babeurre Nutricia.*
- Lab. A. Clanché, Vars (Charente). — *Antepsal interne, Dolotensine.*
- Lab. Clartyl, Bapaume, pharmacien, 85, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine. — *Histaclartyl.*
- Lab. du Dr J.-P. Clary, Vaux, pharmacien, 72, av. Kléber, Paris (XVI^e). — *Bromo-Magnésium, Iodo-Magnésium, Phoso-Magnésium.*
- Lab. Claverie, pl. Carnot, Romainville (Seine). — *Occi-Gourme, Stomobrol.*
- Lab. Clevenot et Rosso, 3, rue Lamblardie, Paris. — *Angionévrol, Arsallyl, Aseptophédrine, Atouxin, Bilichlorine, Bismuxyl, Gratiode, Glucalcium, Hormoveinyl.*
- Lab. Clin, 20, rue des Fossés-St-Jacques, Paris (V^e). — *Adrenaline Clin, Ginnozyl, Electrargol, Arsaminol, Elixir Deret, Enesol, Néo et Sulfo-Tréparséan, Odarsol.*

Salicylate de soude Olin, Sérums Olin, Sirop d'Aubergier, Sirop de Sirtal, Paderyl, Solurol, Spartio-Camphre, Spartoval, Génisténal, Iogol, Lyso-Choc, Orthosiphène, Vaccins Olin, Pyovargol, etc.

Lab. Cluzel, 60, cours Émile-Zola, Lyon. — *Gouttes Milko, Mictualine, Révulsif Milko, Tablettes Zéva, Tonique Zéva.*

Lab. des Produits Cody, Brive-la-Gaillarde (Corrèze). — *Iodocitrol, Iodopeptone Cody, Pulmoryl Cody, Marisine.*

Lab. Cognacq, 9, place Beaugrenelle, Paris. — *Digeryl, Inhalyl, Sinaseptic, Sinusyl.*

Lab. des Prod. Cognet (Armingeat et Cie), 43, rue de Saintonge, Paris (III^e). — *Tiodine Cognet, Thiosinamine Cognet, Agonol Cognet, Capsules Cognet, Dragées de fer Cognet, Dragées Dubourg, Hemoneurol Cognet.*

Lab. A. Coirier, 69, av. du Maine, Paris. — *Godérax, Marrucol, Tisane Borkou.*

Lab. du D^r Coirre, 5, bd Montparnasse, Paris. — *Allium Coirre, Chlorhydropeptine, Granules Phosphure de Zinc, Juranol, Levure Coirre, Solucalcine, Solution Coirre.*

Lab. Colas, 133, r. Lecourbe, Paris. — *Apaisyl, Asclé, Baldisédan (pilules, suppos., ovules), Choléolax, Filhosa, Filhosovules, Gynostier, Marrusera, Nitracatne, Pulmoseptol, Purpuro, Rhinorcine, Urocarbol benzonaphtholé.*

Sté des Prod. Collas et Boudault, Mougnaud et C^{ie}, Longjumeau (S.-et-O.). — *Pyrélaïne Collas, Pommade et savon au Goudron, Baume Chiron, Elixir et poudre de Pepsine Boudault, Pilules Ecossaises Collas, Bougies camphrées Collas, Elixir des Jacobins de Rouen.*

Lab. des Collovaccins, 74, rue Blanche, Paris (IX^e). — *Collobacilline du D^r Grimberg, Collovaccins.*

Lab. P. Colomb, 43, rue de Lancry, Paris (X^e). — *Favexir, Irracalosyl, Jacopol, Kao-Pepsol, Pavydis, Pepsiphos, Prolifer, Sulfygyène, Tensiofuge, Terneusol.*

Lab. Colonial, 21, rue Mouton-Duvernet, Paris (XIV^e). — *Mosti, Périol Soulié, Phosphonine Soulié, Tricophan.*

Lab. Columbeau, 24, r. Flégier, Marseille. — *Gustodine, Poudre Cassarini.*

Lab. Combefreyroux, 134, av. Parmentier, Paris (XI^e). — *Alcachol, Combey-Lax.*

Lab. Comte, 60-62, rue St-Guilhem, Montpellier. — *Marrubiase, Rythmosystol.*

Lab. C. Cons, rue des Écoles, Chambéry. — *Juglane.*

Lab. Coquelu, Digoin (S.-et-L.). — *Compressif Beslier, Coqluplaste, Tulle rose Beslier, Vésicatoire Rose Beslier.*

- Lab. Corbière**, 27, rue Desrenaudes, Paris. — *Alcalinose, Benzylocalcium, Broncho-Vaclydun, Calcium Corbière, Cellargos, Cobrallyre, Cobratoxine, Coli-Vaclydun, Créagrénol, Cytocholins, Cytomanganol, Cytopepsal, Cytophédrine, Cyto-serum, Cyto-Strychnine, Dermaline, Entéro-Vaclydun, Gono-Vaclydun, Gynéco-Vaclydun, Grippo-Vaclydun, Hémocyto-sérum, Iolase, Katox, Katox-Intra, Lacto magnésie Vita, Novarsénobenzol, Oléoformine, Oliolase, Ohptalmiso 8, Opolaxyl, Paludase, Pantavoine, Pyo-Vaclydun, Rhino-Vaclydun, Sérum antiasthmatique de Hechel, Staphylo-Vaclydun, Strepto-Vaclydun, Suppositoires à l'arséno-benzol Corbière, Vaclyderm, Vaclydovules.*
- Lab. Cornaud et Brossard**, 1, rue des Cordouans, La Rochelle. — *Io-Salyt, Néuralgol Brossard.*
- Lab. Corteel**, 74, rue de La Fère, Saint-Quentin (Aisne). — *Citra-Quint, Dio-Quint, Magnoxol.*
- Lab. Cortial**, 7, rue de l'Armorique, Paris. — *Androcalcion, Cortiode, Gynocalcion, Iodaseptine, Iodaseptine salicylée, Lita, Septicémine, Vitamine D Cortial.*
- Lab. Coudere**, 9 et 9 bis, rue Borromée, Paris (XV^e). — *Pyrallium. Produits Charvoz.*
- Lab. Coudert**, 13, rue Antoine-Villon Paris (XII^e). — *Hémostatique Coudert.*
- Lab. R. Coudert**, 19, av. Payret-Dortail, Le Plessis-Robinson (Seine). — *Hépartichaut adultes et infantile. Supamide (suppositoires et comprimés).*
- Lab. Coulloux**, 116, r. du Pont, Auxerre (Yonne). — *Baume Kalendol, Néo-Révlusif Coulloux, Pectoral Coulloux, Sirop Brahma.*
- Lab. Courtin**, 134, avenue Jean-Jaurès, Reims. — *Zomosthenol.*
- Lab. A. Cousin**, Estissac (Aube). — *Ohélibile, Sténic.*
- Lab. G. Coussinet**, 122, Champs-Élysées, Paris. — *Aliment Edel, Bursol, Codocol, Colibacine, Cuzinargol, Gastro-Sédatif Atcia, Métallophédrine, Opolonine, Pommade Zylor, Septicema, Sodamine, Sulfolax, Utersan, Vago-sedyl.*
- Lab. Couturieux**, 18, av. Hoche, Paris. — *Azufrol, Bismuthion, Bromiase, Cuprion, Cytuline, Fer-ion, Glésol, Glycolactimase, Iodurase, Lactimase, Lantol, Lecurine extractive, Lecurine brute, Métaux colloïdaux, Panglandine, Plurion, Polyformiale, Sélénol, Stanion, Sulfurion, Zymion.*
- Lab. Couvert**, 11, rue de Mogador, Paris (IX^e). — *Bil Soda, Gastroniger, Harledine, Hemoluol.*
- Lab. de la Créoformine**, 18, r. de Jouvence, Dijon. — *Créoformine.*

Lab. Creuzé, 74, rue de Lourmel, Paris. — *Antixénol, Cholégastrol, Crèmes-Vaccins, Eucratol, Laxafégine, Polyseptol, Rhino asc, Rhino-Vaccin Creuzé, Sténophos, Strychnophyl, Vaccin M. A.*

Lab. Grinex-Uvé, 1, avenue du D^r Lannelongue, Paris. — *Grinex, Grinex-Orex, Flavex, Frénovex, Métrex, Opothérapie Grinex-Uvé, Orex, Panphysex, Uvé, Uvéstérol.*

Lab. du Crinoflux, 41, rue Germain, Lyon. — *Crinoflux, Paxineurol, Ultracalcine.*

Lab. Grosnier, Scc échantillons : 44, rue de Lagny, Montreuil (Seine). — *Biosodine, Neuroflorine, Sirop Minéral sulfureux Grosnier, Stanno-Sufrol Grosnier, Sufrol Grosnier.*

Lab. Crouy, Vernon (Eure). — *Urophényl.*

Lab. de Phytothérapie du D^r Cuguillière, 19, r. des Chalets, Toulouse. — *Sérum végétal, Vin Pyrola.*

Lab. R. Cuniasse, 6, pl. des Ternes, Paris (XVII^e). — *Arg-Eph, Hyol.*

Lab. de la Curatine Brunet, 23, rue des Écouffes, Paris. — *Curatine Brunet.*

Lab. M. Curle, 40, r. François-I^{er}, Paris. — *Sucre « Vita D »*

Lab. Dagonnot, 11 bis, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Cannes (A.-M.). — *Artobyl, Charleben, Ginarascol, Golilactol, Ficaïrine, Neurophos, Uvécalcion.*

Lab. Daguin, 7-13, rue Bobillot, Saint-Maur (Seine). — *Choléolactol, Novolactol, Pneumostyl, Purganol Daguin.*

Lab. Dalayeun, 15, rue de Paris, Sannois (S.-et-O.). — *Sulfan.*

Lab. Dalet, 24, avenue Mathurin-Moreau, Paris. — *Les Grignons de Fouard.*

Spéc. Pharm. C. Dalin, 49, quai St-Vincent, Lyon. — *Cérébrosthénine, Glycocarpine, Kydalose.*

Lab. Daney, 134, cours de Verdun, Bordeaux. — *Gryptosote Néda, Tonique Néda.*

Lab. A. Daniel Brunet, 62, bd Jean-Jaurès, Boulogne-s.-Seine. — *Biocrina, Cholergine, Coréine, Hépatobyl, Neurène, Novo-Brol, Olipan, Ostéo-hépatine, Ovobiol, Ovoythyl, Pulvita, Synthagène, Stal Kosal, Tœnifuge Kirn, Tanno-Calcine.*

Lab. Danjou, 28, rue de l'Hôpital-Militaire, Lille (Nord). — *Anapeptone, Pepto-Magnésie Vassal, Peptone Vassal.*

Prod. Dannec'h (MM. Brun et Martineau), 64, rue des Tournelles, Paris. — *Gachets Phébor, Chloridia, Gigares Gicquel, Laxia Dannec'h, Manganésia, Papier Gicquel.*

- M. J. Dardelet, Bonnard (Yonne).** — *Babeurre Dardelet, Lait Dardelet.*
- Établ. Darrasse, 13, rue Pavée, Paris.** — *Flétiobiol, Pepto-fer du Dr Jaillet, Tamar Indien Grillon, Valérobromine Legrand.*
- Lab. Darrasse, rue St-Maurice, Nanterre.** — *Choléine Camus, Choléine lactique, Eupnine Vernade, Lactobacilline, Magécarine.*
- Lab. Pharmaceutique Daufresne, 42, rue Thiers, Le Havre.** — *Clonazone, Hydroclonazone, Stéramine, Talcazone, Vaccin Provac's.*
- Lab. Daupez, 37, rue des Lois, Toulouse (Hte-Gar.).** — *Baume Fuba, Gouttes Dépuratives Fuba, Gouttes Pectiques du Dr Albert, Gynium, Myoden, Nasogyne, Santaline Daupez, Sedoseptyl, Sirop Kérída, Sirop Pectiline.*
- Lab. Dausse, 4, r. Aubriot, Paris.** — *Ampoules Névrosthéniques, Bardane stabilisés, Belladone Dausse, Bromure de Codéine, Camphodausse, Carbodausse, Collobiase d'Or, Collobiase de Sulphydrargyre, Enterodausse et Enterodausse calcique, Fondant de soufre, Fondant Iodotanique, Gouttes Arsenosthéniques, Gouttes Phosphosthéniques, Granulé Salicylé Dausse, Hémogénol, Hespéridausse, Hormodausse, Intrait Dausse, Moréthyl, Pavéron, Prostatidausse, Salicaire Dausse, Sédo-Hypotenseur Dausse, Sérodauasse, Stricteforme, Tisane hépatique Dausse.*
- Lab. du Dr Debat, 60, rue de Monceau, Paris.** — *Androsthéniol, Outigénol, Exentérol, Filtrat Inosepta, Frénitan, Hépacrine, Hépa-peptine, Inogyl, Inolaxine, Inorénol, Inorhinyll (vaccin et pommade), Inosepta Auriculaire, Inosepta ophtalmique, Inosplénol, Inotyol, Inoxémol, Inoxyll, Insévaccins, Novotyol, Ovules Inséva, Pancrinol, Pommade Inosepta, Pommade Inséva, Sédopeptine, Sédotyol, Septicarbonate, Siliplastine, Solution du Dr Debat.*
- Lab. Dechâtre, 11, rue de Flandre, Paris (XIX^e).** — *Boro-septine, Bronchoforme, Calco-Céril, Cérinil, Cériomine, Granulé Sabel, Hormotensyl, Inhaphone, Lécithocéril, Paruline, Plasmastyl, Rhinostagone, Sédophoryl, Vénosalvine.*
- Lab. Déchosal, 39, rue Roger-Salengro, Bondy (Seine).** — *Aldor formogène, Curamélis, Dermibaume, Magnésie Déchosal, Méthinol, Opo-Vacuoline, Vacuoline.*
- Lab. Deffarge, 188, cours de la Somme, Bordeaux.** — *Hémotérine irradiée, Nucléocardyl, Panvita, Vitacrine.*
- Lab. Defresne, 19, r. Jacob, Paris.** — *Audigénine, Pancréas-tase Defresne.*
- Lab. Dizlauda, 15, bd Pasteur, Paris.** — *Gardibaïne, Digi-baïne, Theoxanthine, Spasmosédine.*

- Lab. Dehaussy, 50, rue Nationale, Lille.** — *Anti-Asthmine, Biocalcium, Capsules et sirop Préga, Céréossine, Crédone, Crypthermol, Diastogène, Entérobyl, Ephasma, Formobenzyl, Hermarsinol, Hermomuthol, Koumyl, Leucosérol, Phytolax, Sédoneurol, Sinrénaline, Théramine.*
- Lab. Déjardin, 10, rue Parent-de-Rozan, Paris.** — *Extrait de malt français Déjardin, Malt français Déjardin, Maltosine Déjardin, Peptomaltone Déjardin.*
- Lab. Michel Delalande, 16, rue Henri-Regnault, Courbevoie.** — *Baume Suelta, Entéro-granulé, Ephédrocamphre, Esculéol, Hypiode, Neuroplasma, Neuroplasma Massif, Polyminéral, Rexiode, Sirop au Solucamphre, Solucamphre, Solucamphre Associations, Sulfocadol.*
- Lab. du Dr Delalbre, 2, rue Claude-Matrat, Issy-les-Moulineaux (Seine).** — *Adipo-Fugeline, Anti-Floculine, Céphalgi-Lysine, Dermo-Rhino-Génésine, Humoro-Stabiline, Organo-Sthénoléine.*
- Pharmacie Delaprée, Mortagne-sur-Sèvre (Vendée).** — *Baumix, Liquidix.*
- Lab. Delcambre, Issoudun (Indre).** — *Ioguine Delba.*
- Lab. Delfour, Pouillon (Landes).** — *Oléo-Mel.*
- Lab. du Delta, 84, rue Rochechouart, Paris.** — *Arcica, Calmaby, Calobil, Chloral Dalis, Névrol Fréval, Onguent Fréval, Percalcine, Suppoglandine.*
- Lab. Demasles, 5, p^e. Miremont, Vienne (Isère).** — *Artériocrinol, Aithal, Bilicrinol, Biogénol, Crinhémol, Menosédine, Myrtilline, Phospholéose, Sédospasmosse.*
- Lab. Demoulin, 27, rue Brezin, Paris (XIV^e).** — *Lenientol.*
- Lab. du Dr Denard, 125, Grande-Rue, Oullins (Rhône).** — *Reviscentyl.*
- Lab. Denis, 20, rue du Laos, Paris.** — *Glottyl, Rhino-Glottyl.*
- Lab. Denisot, 19, rue de Fleurus, Paris (VI^e).** — *Carbolactyl simple, Carbolactyl bilié, Cervol, Hémosédine, Iodosédine, Opophos.*
- Lab. du Dr Densmore, 25, rue Dagorno, Paris.** — *Bioplastine, Endolacgénine, Endo-Ovarina, Endoxidine, Esanofèle, Foscal Sersono, Hyostinal, Sels de Montecapini, Néoiacol ISM, Paragangline Vassale, Peptopancréase, Soporigène, Viroglan et toutes préparations de l'Institut Sérothérapique de Milan (Opothérapie et Vitamines, Ferments, Métaux Colloïdaux, Peptoprotéase, Antiluétiques).*
- Lab. Deodax, R. Renaud, Anould (Vosges).** — *Sinapol, Spasmalgot, Thermalgot.*

- Lab. Depruneaux**, 23, rue du Parc, Fontenay-sous-Bois. — *Diemenal*, *Dienol*, *Soderséine*.
- Lab. Depruneaux**, 18, rue de Beaune, Paris. — *Chéralys comprimés*, *Cyproveinol* (*Gouttes-suppositoires*), *Dragées Elkin*, *Gouttes Antigél*, *Granules Elkin*, *Hypophédrine*, *Phosphoneurol*.
- Lab. de la Dermofagine** (L. Sagot), 15, pl. Godefroy-de-Bouillon, Boulogne-sur-Mer. — *Dermofagine*, *Dyspepsia*, *Dyuril*, *Holocalcine*, *Raiforyl*.
- Lab. Dernis**, 12, rue Lamartine, Paris. — *Ektogan Bocquillon* (*Poudre*, *Pommade*, *Pâte*, *Méchettes*, *Gazes*, *Ovules*, *Ecto-Plaste*), *Hopogan Bocquillon* (*Cachets*, *Pilules glutinisées*, *Prise-Bébé*), *Hopoganase*, *Tot'Oléa*.
- Lab. Derol**, 154, av. Malakoff, Paris. — *Bolèna*, *Lipocrinyl*, *Quinimax*, *Rectoseptal*.
- Lab. Deschiens**, 9, rue Paul-Baudry, Paris. — *Hémoglobine Deschiens*, *Hépathémo Deschiens*, *Holos*, *Spectrol*.
- Lab. Descouraux et fils**, 52, bd du Temple, Paris. — *Chloro-Magnésion*, *Dragéal* (*ex-Dragées Lumeval*), *Ovules Vézès*, *Tensoryl*, *Tryclène*.
- Lab. Dexo**, 7, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Argyseptine*, *Biovital*, *Bismokaol*, *Calcipafne*, *Cardiotensyl*, *Citrilex*, *Collunovar*, *Dexiode*, *Dexogyne*, *Dexoplasma*, *Laximanne*, *Neurovital*, *Phénorquine*, *Thyméphédrine*, *Trophocalcine*, *Uroquinol*.
- Lab. Didry**, Janville (E.-et-L.). — *Antiphymique Vadam*, *Synergyl*, *Thalassotonine Vadam*, *Thalassotonine Infantile*.
- Lab. de la Digastrine**, 11, r. St-Agricol, Avignon. — *Digastins*.
- Lab. A. Djan**, 137, r. de Belleville, Paris. — *Cassilax*.
- Lab. Doladille**, Saint-Aignan-sur-Cher (L.-et-C.). — *Bronchopneumol*, *Combretodrainol*, *Histochrome*, *Histocollyre*, *Histosome* (*Concentration et Injectable*), *Pyrosdol*.
- Lab. Dorantowicz**, 17 bis, av. Parmentier, Paris. — *Chéloïdine*, *Crinopancrine*, *Guriode*, *Higadose*, *Hormobiline*, *Hormoléol*, *Hypno-Nervine*, *Mésoforme*, *Morrhualène Gauthier*, *Panfébrine*, *Stomophile*.
- Lab. de la Dosurine**, 16, rue Charlemagne, Paris. — *Dosurine* (*Trousses*).
- Lab. Douetteau frères**, 20, r. du Fg-St-Honoré, Paris. — *Astasol*, *Ficabyl*, *Neurovarol*, *Organésium*.
- Lab. Drapier**, Rethel (Ardennes). — *Ampoules Reipar*, *Dermo-Reipar*, *Intra-Reipar*, *Ostéopeptine*.
- Lab. Dreyer-Dufer**, Nogent-sur-Marne. — *Anurique Duplex*, *Iodophosfer Duplex*.

- Lab. Drouet et Plet**, 37, rue de Marly, Rueil-Malmaison (S.-et-O.). — *Anexol*, *Byliérine*, *C. 10*, *Elipol*, *Lénibar*, *Magnésie hydratée*, *Néo-Physio*, *Oxyléine* (adultes et enfants), *Ozobiase*, *Ozobiase opothérapique*, *Phosoforme*, *Phospirine*, *Physiosthénine*, *Plombyl*, *Quinéase*, *Salysérum*.
- Sté Française du Lait sec Dryco**, 5, rue St-Roch, Paris. — *Dryco* (lait sec).
- Lab. du Dr Dubat**, 80, fg St-Denis, Paris. — *Dermone*, *Laxalbine*, *Molléine*, *Phrosthémor*, *Rhinol* (comprimés, ouate, pommade), *Sangule*, *Sanpur*, *Saturaline*, *Sec-case*, *Théisine*, *Uroseptic*.
- Lab. Dubœuf**, 4, rue Raymond-Poincaré, Nancy. — *Panco-dine*.
- Lab. Dubois**, 16, bd Péreire, Paris. — *Campho-Spartéine*, *Camphryl*, *Cardialgine*, *Codarsyl*, *Collo-Iode*, *Iodo-tensyl*, *Oléo-Iode*, *Uroquinase*.
- Lab. Duc**, 24, av. Mac-Mahon, Paris. — *Oèdrel Bel*, *Coques-licônes*, *Dragécalcion* (dragées), *Dragécalcion* (granulé).
- Lab. Ducas**, 112, Grande-Rue, Nogent-sur-Marne. — *Cynaracholine*.
- Lab. Ducatte**, 10, rue Barbette, Paris. — *Entéro-antigènes Danysz*.
- Lab. Ducatte**, 191, rue Saint-Honoré, Paris. — *Biosulfol*, *Cérébron*, *Cuprase*, *Cytoplasmine*, *Entéro-Antigènes*, *Gaïarsénan*, *Paratoxine*, *Sclérollysine*.
- Lab. Ducloy et Cie**, Arques (P.-de-C.). — *Pilules de Boldo-Biline Ducloy*, *Bradygastrine*, *Lactogélose*, *Lichénose*, *Sarcoglobine*, *Tachygastrine*.
- Lab. Ducoq**, Langeais (Indre-et-Loire). — *Iodo-Hamamelis Ducoq*, *Vulnérine*.
- Lab. E. Dufour**, Amplepuis (Rhône). — *Adenoseptyl*.
- Lab. Henri Dufour**, 40, rue des Carmes, Orléans (Loiret). — *Apsophol*, *Codéphryl*, *Dymozyl*, *Edistol*.
- Lab. du Dr E. Duhourcau, Legoux frères, phar maciens**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. — *Dragées anti-catarrhales du Dr Duhourcau*, *Gastricine du Dr E. Duhourcau*, *Tœnituge français du Dr E. Duhourcau*, *Salvenase Legoux*.
- Lab. Dulcis, Dr Ferry**, place Clichy, Monte-carlo. — *Alcaloïdes seuls et combinés*, *Argolène*, *Cadmiol zinc*, *Cuprinol*, *Iodo-calcique*, *Iodo-Rubidium*, *Ichtyol zinc*, *Myosine forte et faible*, *Mydriasine*, *Novoptine oxyde orangé de Hg*, *Ophthlmoforme*. Tubes *Dulcis*.
- Lab. Dulfrance**, 38, pl. de la Victoire, Tourcoing. — *Dulcia*, *Dulcao*, *Dulfor*.
- Lab. Dumesnil**, 10, rue du Plâtre, Paris. — *Aseptampoules Dumesnil*, *Bréthyl Dumesnil*, *Crémo-plastol Dumesnil*, *Dépuratif Dumesnil*, *Dermo-Plastol Dumesnil*, *Gira-*

siol Dumesnil, Huile au calomel Dumesnil, Mugrizol Dumesnil, Poudre Pastorilos, Sacnel, Solu-Plastol Dumesnil, Théobromose Dumesnil, Zébo-Plastol Dumesnil.

- Lab. Dunesme, 4 et 6, rue Ordener, Paris. — *Dépressytol, Inhalophédrine.*
- Lab. Duret et Rémy, voir Lab. du D^r Pierre Rolland et Duret et Rémy réunis.
- Ph^{ie} E. Duriez, 20, pl. des Vosges, Paris. — *Chloral bromuré Dubois, Elixir Ducro, Quinoidine.*
- Lab. Darsent, 74, r. Blanche, Paris (IX^e). — *Brimox, Capsol, Egidol, Glaucuro, Sapogynol.*
- Lab. A. Duteil, 90, av. de St-Ouen, Paris. — *Elixir Hymel, Quinorhéine Duteil, Spasalgique Maréchal, Suppositoires Hymel.*
- Lab. Duval, 168, bd Saint-Germain, Paris (VI^e). — *Evirène, Pepsine-Ferment, Myosérum, Myostyl.*
- Lab. de la Dynamogénine, Rumilly (H.-S.). Bureau de correspondance : Boîte postale 33, Aix-les-Bains (Savoie). — *Dynamogénine du D^r Chaboud.*

Sté des Eaux minérales de Decize, 10, rue de la Barouillère, Paris. — *Source Saint-Aré.*

Étab. Echard-Gillier, 25, rue de Bordeaux, à l'Arbresle (Rhône). — *Compresses grasses « Onctua », Garnitures Obstétricales « Parturia ».*

Lab. Echeman, 26, rue des Moines, Paris (XVII^e). — *Camphocalyptol injectable, Eupnol (pastilles et poudre), Eupnophédrol, Osmoléine, Stadrhine (ex Stovoléine), Suppositoires de Camphocalyptol et Suppositoires de Camphocalyptol-Quinine (enfants).*

Lab. de l'Elaiadine, M. Murat, pharmacien, Castres (Tarn). — *Elaiadine.*

Lab. de l'Élocine, 51, r. du Ranelagh, Paris. — V. A. V. (vaccin Vaudremer).

Lab. de l'Embryo-Dynam, 4, rue Balzac, Paris. — *Embryo-Dynam.*

Lab. d'Endocrinologie Appliquée, 26, avenue de l'Observatoire, Paris. — *Adrénaline Byla, Amino-sel, Amurine, Antélobine, Di-Iodotyrosine Byla, Di-bromotyrosine Byla, Energétènes Byla, Ergotinine Tanret, Galactogène Byla, Gélo-Pansements, Géléoptone, Gonadormone, Hémosérol, Héparmone, Hépatomusclosine, Hormoduodine, Hormoflavéine, Hormones Hypo-*

physaires Byla, Hormovarine, Insuline Byla, Irrastérine, Lactormone, Léiormone, Musculosine Byla, Neuormone, Neurotrophol, Ocytormone, Paralactine, Paratyronne, Peptone Iodée Byla, Pellétiérine Tanret, Peptone Byla, Phylactone, Phytosphosphine, Phytogénine, Pituilobine, Somatormone, Splénamine, Splénarmone, Splényl, Surrasthénine, Thyratoxine, Thyromone, Thyroxine Byla, Vagotonine, Vitadone, Vitamine B¹ Byla, Vitamine B² Byla, Vitamine C Byla, Vitamine E Byla, Vitamine P-P Byla, Vitaminol.

Lab. de l'Endopancrine, 48, r. de la Procession, Paris (XV^e). — Endopancrine, Endothymusine, Holosplénine, Holo-varine, Insuline (Votr Endopancrine), Insuline Phyloze (poudre et pommade), Mucosioie, Perglandènes (ovarien, hépatique, orchitique), Permyase, Poudre et Pommade d'Insuline Phyloze.

Lab. de l'Entériode, 39, r. de Clichy, Paris (IX^e). — Entériode.

Lab. de l'Entéroseptyl, 78, bd Beaumarchais, Paris. — Entéroseptyl.

Lab. Eon, 3, rue des Rouairies, Dinan (C.-du-N.). — Algéon, Derméon, Iscautoxène, Pommade et suppos Eon, Erysulfure Eon, Psoréal, Psorène, Psoréon, Pulmicure.

Lab. Éparvier, 26, Gde-Rue St-Clair, Lyon. — Boldoine, Cascara, Ferroxyline.

Lab. de l'Éranol, 45, rue de l'Echiquier, Paris. — Éranol.

Lab. de l'Erythéma, 139, r. Jean-Jaurès, Maisons-Alfort (Seine). — Androvar, Androvules, Erythéma.

Lab. Escoufflaire, Baisieux (Nord). — Cigarettes anti-asthmaticques Escoufflaire n^{os} 1 et 2, Poudres anti-asthmaticques Escoufflaire n^{os} 1 et 2.

Établ. Thermal de Salles-du-Salat (H.-G.). — Eaux-Mères.

Lab. Etienne, 19, av. Secrétan, Paris. — Asthmédrine, Dimintensyl, Potion des Cordeliers de Séz, Tisane R. P. La Montagne.

Lab. général d'Études biologiques, 29, pl. Bossuet, Dijon (Côte-d'Or). — Doloma, Œnophos, Protéodyne injectable, Protiodyne dragées.

Lab. de l'Eupulmol, Chavatte, pharmacien, 88, rue de France, Roubaix. — Eupulmol.

Lab. de l'Eusedyl, 32, rue des Vallées, Colombes (Seine). — Eusedyl.

Lab. Evine, 15 bd des Batignolles, Paris (VIII^e). — Baume Pélevine, Ovules Evine, Poudre Evine, Poudre Pélevine, Thé Evine.

- Lab. Fabiou, 132, av. Victor-Hugo, Paris.** — *Anaptyol, Elixir Rodi, Veinicura.*
- Lab. de la Fabrique Internationale d'Objets de Pansements** 5, Grande-Rue, Montpellier. — *Calguls et crins de Florence Astruc, Colton Cataplasme Astruc, « L'Accouchement aseptique Astruc », Lanières aseptiques Astruc, Otodraîns, Pansements aseptiques Astruc, Pansements Nemausa, Rhino-mèches grasses, Tulle gras Nemausa.*
- Fabrique Vendéenne de Produits Pharmaceutiques, 10, rue Pont-aux-Chèvres, Fontenay-le-Comte (Vendée).** — *Angéiol, Mucoflogose, Néphractive.*
- Lab. Fagard, Lons-le-Saunier (Jura).** — *Antiasthme Bengalais, Bain Fagard Sulfador, Cigarettes Schulz-Bengalais, Elatine Bouin.*
- Lab. Falvy, 40, r. des Acacias, Paris.** — *Adrénoleine, Anxiol, Broséyl, Chlorinol (huile, capsules), Cirvose, Edricamphre, Epholéine, Fermenteryl, Gastropeptyl, Hemopectal, Holuryl, Rhinadrol, Synase, Trynol.*
- Lab. P. Famel, 16-22, rue des Orteaux, Paris (XX^e).** — *Optræx (Bain oculaire), Sirop Famel.*
- Lab. Faure, 83, bd de la Villette, Paris.** — *Citropeptol, Gouttes Glyciodines, Hexacarbène, Hypoviscol Lactobiase, Manacine, Neuropol, Novosédine, Sels Intar.*
- Lab. Faure et Dussuel, 23, av. de Marilloz, Aix-les-Bains.** — *Elixir Bonjean, Euphorine du D^r Chaboud, Magnelax, Sinaplasme.*
- Lab. Faure et Lagente, à Montargis (Loiret).** — *Citrocholine, Kalmidor, Mictoseda, Mictosulfa.*
- Lab. des Produits Sulfureux du D^r Fayès, 2 et 4, place Gambetta, Paris.** — *Salbine du D^r Fayès, Sulfocaine Fayès, Sulfo-Rhinol du D^r Fayès.*
- Lab. du Féminadène, 120, r. Lecourbe, Paris (XV^e).** — *Laxatif Coprex, Féminadène (gouttes et dragées), Polypirine (cachets ou comprimés), Viradène.*
- Lab. Fercocq, La Varenne-St-Maur (Seine).** — *Antisuce, Arthrident, Hémocalcine, Pulmogrog (Enfants et Adultes.)*
- Lab. G. Fermé, 22, rue de Turin, Paris.** — *Muthanol, Néolyss^e, Psathanol, Soluthanol, Staphyloethanol, Triradol, Viscosérum.*
- Lab. du Ferment Dep, 44, rue Taitbout, Paris (IX^e).** — *Ferment Dep.*
- Ferme de Lafaye, Marlihes (Loire).** — *Babeurre La Faye.*
- Lab. du D^r Ferré, 6, rue Dombasle, Paris.** — *Broncho Favront, Cupressiade, Disimine Favrot, Immunicorps, Lin Tarin, Sirop Lamouroux, Tonique Favrot, Urobaldine.*

Lab. E. Ferré, J. Leroy, pharmacien, 19, rue Grégoire-de-Tours, Paris. — *Iodures L. Foucher, Litharsyne, Pâtes et Sirop Pectoral Edulcor, Poudre Rocher laxative, Sucre Edulcor, Tablettes Vych'Edulcor, Tonique Garnier.*

Lab. du D^r Ferry, pl. Clichy, Monte-Carlo. — *Tubes Dulcis.*

Pharmacie du D^r Fialip, 23, av. de La Motte-Picquet, Paris. — *Oxy-injecteur du D^r Fialip.*

Lab. Fides (M. Vouzellaud), 14, r. de la Comète, Paris. — *Balsamorhinol, Inhalantyl.*

Lab. Fisch et Cie, Mer-Rouge, Mulhouse (Haut-Rhin). — 104, 1^{re} Poissonnière, Paris. — *Bains carbogazeux Wolo, Baumolacpinine, Cataplasmes de Fango-Fisch, Gellona, Chlormagnésium Fisch, Chymosine Fisch, Elastoplaste, Empyrol, Fango Fisch, Lacpinine, Optiplaste, Poudre ORL, Prévalidine, Recytète, Révulsif Fisch (anc. Procipha), Sulfocrème Lilass, Thiorubrol.*

Lab. Flahaut, 74, r. Monge, Paris. — *Acépiline, Anadiposine, Laxoil, Sulfodermol, Terpène granulée Baron.*

Lab. Fleury, Arcachon (Gironde). — *Comprimés Recal, Dionol (sirop), Eurinase (pilules), Paquets Alcalis (Nourrissons, enfants, adultes), Pastilles Dionol, Suppo-Eurinase, (Puberté F, Puberté M).*

Lab. G. Fleury, pl. du Marché, Bresles (Oise). — *Rhine.*

Fleury-Galvin, Pharmacien, Saint-Fons (Rhône). — *Carypaine.*

Lab. Fluxine, Produits Bonthoux (Edm. Joët, D^r en pharmacie), 42, rue Pasteur, Villefranche (Rhône). — *Evonyl, Fluxine, Formule Jacquemaire n° 60, Verrulyse.*

Lab. Roger Fosse, 86, rue du Pas-St-Georges, Bordeaux. — *Livartil, Lotusédine.*

Lab. Fosset, 21, Grande-Rue, Montfermeil (S.-et-O.). — *Ago-Sels, Cytopulmase, Pelvi-Pyrine, Suppositoires Pelvinal, Sympathoriane, Vagoriane, Viscodermine, Viscoveine.*

Lab. Fossoul, 11, bd de Strasbourg, Paris. — *Boldolactol Eau de Glauber, Elixir Zidal, Pilules de Glauber Zidaline.*

Pharmacie Foucault, 49, avenue Victor-Hugo, Boulogne-sur-Seine. — *Opothérapie Moncour (Sphérulines), Séné-cine, Vitacalcine, Parathyrocalcine.*

Lab. H. Foucher, 22, rue Lakanal, Paris. — *Gopraxe, Elixir de Larsa, entérohépatine, Esératropine, Gastérinase, Muxyl, Neuricure, Ortho-Stomine, Thymetol.*

Prod. Pharm. A. Fouchère, Rive-de-Gier (Loire). — *Agobyl, Benzocarbène, Biodynol, Glycocure, Maïas, Néobiline, Pansarcine, Pectoral Fouchère, Révulsif Fouchère.*

Lab. Fougerat, 44, r. Chaptal, Levallois (Seine). — *Gouttes Rami, Pâte Rami, Poudre Jifa, Sirop Rami, Vérachol.*

- Lab. Foulon**, 12, bd St-Martin, Paris. — *Colhépathyl*, *Cuscutine*, *Lutéovar*, *Lysarthrol*, *Valéramyl*.
- Lab. Fournier frères**, 7, rue Biscornet, Paris. — *Bileyl*, *Biolactyl*, *Grino-Menstryl*, *Grino-Stényl*, *Crino-Tensyl*, *Hormuter*, *Opothérapie Fournier*, *Ovaire Fournier*, *Physocrisine*, *Sanaféine*, *Splénocrisines*, *Vaccins Bruchettini*, *Vasolaxine*.
- Lab. Fourton**, Dr en Pharmacie, 38, rue du 11-Novembre, Clermont-Ferrand. — *Dyspné-Inhal*, *Elixir Daumy*, *Pastilles Pepsa*.
- Lab. Fraisse, père et fils**, 8, rue Jasmin, Paris. — *Ampoules Ferrugineuses Fraisse*, *Ampoules Névrosthéniques Fraisse*, *Ampoules Anti-Paludiques Fraisse*, *Ampoules Scléro-Hémorroïdiques*, *Ampoules Sclérosantes*, *Baume Camphro-Salylé*, *Calcium injectable Fraisse*, *Camphro-Salyl Fraisse*, *Cupro-Nickel intraveineux Fraisse*, *Cyanure isotonique Fraisse*, *Fer intraveineux Fraisse*, *Gouttes Névrosthéniques Fraisse*, *Gouttes Hypotensives Fraisse*, *Injection désensibilisante Fraisse*, *Injection immunisante Fraisse*, *Iodo-Bismuthate de Quinine Fraisse*, *Sol-Bi Fraisse*.
- Lab. Français Gastro-Entérologie**, 71, rue Sainte-Anne, Paris. — *Formicalcine*, *Hépatoplasma*, *Mangaïne Myonutrose*, *Néosplénine*, *Tot'Hépatine*.
- Sté Française de Produits Pharmaceutiques (Anc. Adrian et Cie)**, 9 et 11, rue de la Perle, Paris. — *Arrhénal Adrian*, *Bismuth Adrian*, *Carbo-Bismuth Adrian*, *Carbonate de chaux Adrian*, *Chloroforme Adrian*, *Chlorure de Magnésium Adrian*, *Chlorure d'Ethyle Adrian*, *Endocaïne*, *Ether anesthésique Adrian*, *Hypnosol Adrian*, *Hydrate de Magnésie Adrian*, *Mélange Anesthésique A. G. E.*, *Mélange de Schleich*, *Progadol*, *Radio-baume Adrian*, *Révuksif Adrian*, *Sulfurine du Dr Langlebert*, *Toni-Pectoral Adrian*, *Velledol Adrian*.
- Lab. du Dr Frayssse**, 21, r. de Neuilly, Nanterre. — *Follilobine*, *Hépasthényl*, *Hépatoplasmine*, *Opothérapie associée du Dr Frayssse (Thyrodose, Neurodose, Splenodose, Placentodose)*, *Revitalose*.
- Lab. Freyssinge**, 6, rue Abel, Paris. — *Capsules Dartots*, *Géthocal*, *Névrosthénine*, *Ohloramine*, *Polyphorine*, *Quassine Frémint*, *Salicol Dusaule*.
- Lab. H. Frilley**, 94, bd. Lefebvre, Paris (XV^e). — *Iodiformine*, *Mucigrains*, *Novospasmyl*.
- Établissements Fumouze**, 78, faub. St-Denis, Paris. — *Baume Lartigol*, *Bougies uréthrales Chaumel*, *Capsules Raquin*, *Cigarettes Barral*, *Grayons utérins Chaumel*, *Globules Fumouze*, *Granstimul*, *Introl*, *Ovules Chaumel*, *Papier Barral*, *Poudre Chaumel*, *Sirop Berthé*, *Sirop Cassi-bor*, *Suppositoires Chaumel*.

- Lab. Gabail, 55, av. des Ecoles, Cachan (Seine). — *Anti-Kokytine*, *Baume Dulac*, *Biscamph*, *Elixir valérobromuré*, *Gluphosol*, *Iodoscilline*, *Kalmangor*, *Néosaliodé*, *Valérianiats Gabail désodorisé*, *Urogénine*.
- Lab. Gadreau, Savigny-sur-Orge. — *Sedangor*.
- Lab. Gaillard (L. E. V. A.), 26, r. Pétrelle, Paris (IX^e). — *Lenifédrine*, *Léniforme*.
- Lab. Gaizard, 95, rue Michelet, Alger. — *Asthma*, *Carboseptyl*, *Ixiode A et B*, *Opunsine* (*Gouttes et Comprimés*), *Opunsine « Saturante » poudre*, *Lenit-Gum*, *Nécessaire Gaizard*, *Phloxiode*.
- Lab. du Galaphos, 92, av. Camille-Pelletan, et 2, rue d'Amiens, Marseille. — *Galaphos*.
- Lab. Galbrun, 10 et 12, rue Guynemer, Saint-Mandé (Seine). — *Aristargol*, *Citronema*, *Iodalose Galbrun*, *Prosthénasse Galbrun*.
- Lab. du Dr Galimard, 145, rue Yves-Le-Coz, Versailles Tél.: Versailles 26-48 — *Curogène*, *Mucobismuthine*, *Vita diase*.
- Lab. R. Gallier, 1 bis, pl. du Président-Mithouard, Paris. — *Arhémapectine Gallier*, *Arkebios*, *Basedowine*, *Da-boïne*, *Gastro-Entéro Pectine Gallier*, *Kidoline*, *Kidophédrine*, *Tot'Cobra*.
- Établ. Gallina, 4, rue Candolle, Paris. — *Huile Gallina*, *Iodentérol*, *Iodhéma*.
- Lab. Gallo, Dr en Pharmacie, Aurillac. — *Urocédrol*.
- Lab. du Gambéol (J. Gautier), 42, r. Emile-Deschanel, Courbevoie (Seine). — *Actiphos*, *Balsaformine*, *Comprimés de Proto-Gambier*, *Gambéol*, *Ganderma*, *Globiron*, *Hémopylore*, *buvable et injectable*.
- Lab. Gamel, 2, pl. de la Salamandre, Nîmes. — *Kinaldysa Salganyl*.
- Lab. Clément Gardiol, 6, rue Félix-Pyat, Marseille. — *Urosalyl*.
- Lab. du Gastrhema, 71, r. St-Blaise, Paris (XX^e). — *Frénasma*, *Gastrhema*, *Mimophédrine*, *Néo-sulfa*.
- Lab. de la Gastrocitrine, Luc-sur-Orbieu (Aude). — *Gastrocitrine*.
- Lab. Gatel-Léger, 35-37, r. Joinville, Laval (Mayenne). — *Alcalisalyl*.
- Lab. Gavin, Vimoutiers. — *Sirop Lecœur*.
- Lab. Gelia, 16, rue St-Yon, La Rochelle. — *Geliderm*.
- Lab. des Gels Médicaux, 8, quai du Châtelet, Orléans. — *Gels gastriques Beaufils*.
- Lab. Genevet, 29, rue des Marchands, Avignon. — *Kinechul*.

- Lab. Génévrier, 45, rue du Marché, Neuilly-sur-Seine. — Adolan, Alepsal, Bis-Hyd, Boues radioactives de Pistyan-les-Bains (Tchécoslovaquie), Figadol (Vin et Capsules du Dr Vivien), Neurinase, Panstomase, Tétramagnésium.
- Lab. Géraudel, 3, r. Watteau, Courbevoie. — Drag-Bil.
- Lab. Gerbay, 6, rue de Babylone, Paris. — Opomicro.
- Lab. Gerda, 163, bd Croix-Rousse, Lyon (Rhône). — Antidiabétique Requis, Arvensyl, Calsédine, Euphrénine Bastia, Lenigastre, Sodolactine, Tablette Perroud.
- Lab. du Germidor, av. Font-Lauglère, Grasse (Alpes-Maritimes). — Germidor.
- Lab. Gev, 26, rue Chaptal, Paris (IX^e). — Argyrine, Isogev.
- Lab. Gewa, 32, rue Assalit, Nice. — Eductyl, Léthalgol.
- Lab. A. Girard, 48, rue d'Alésia, Paris. — Caséoline, Glycérophosphate de Chaux granulé Girard, Nucléofer Girard.
- Lab. Girel, 19, rue Godot-de-Mauroy, Paris (IX^e). — Hémédonine, Vulnamine.
- Lab. du Gléfina, 348, rue Saint-Honoré, Paris. — Dermalibut, Gléfina, Lasal, Novalibut, (Gouttes et Pilules) (ex Halibut), Novalibut Local (Localibut).
- Lab. E. et G. Glomaud, 12, bd Saint-Michel, Paris (VI^e). — Neurogastrine.
- Lab. des Gloxines, 6 bis, rue Campagne-Première, Paris. — Gloxines, Gloxines Polyvalentes.
- Lab. Gmet, 27, rue du Faubourg-Montmartre, Paris (Dr A. Lorot, Pharmacien). — Antiobé, Boldo Gmet, Composé Gmet, Condurango Gmet, Cratægus Gmet, Diurétique Gmet, Dragées Gmet, Extrait Hamyd, Frêne Gmet, Fucus Gmet, Gui Gmet, Hamamélis Gmet, Hydrastis Gmet, Jugland Gmet, Kola Gmet, Olivase, Piscidia Gmet, Quindynol, Quinquina Gmet, Sauge Gmet, Tilleul Gmet, Ulmaire Gmet, Valériane Gmet, Viburnum Gmet.
- Lab. Godeau, 73, rue Dutot, Paris. — Andotestrons, Difolistérol, Gestormone, Néocortine.
- Lab. P. Godfrin, 5, av. Watteau, Nogent-sur-Marne. — Limonade Godfrin.
- Lab. du Gomenol, 48, rue des Petites-Ecuries, Paris. — Gomenol, Gomenolé et tous produits au Gomenol.
- Prod. Gonnon, 14, rue Victor-Hugo, Lyon. — Antidiabétique Monavon, Cacodyle Gonnon, Créosote soluble Vacheron, Eupeptique Monavon, Irénine Gonnon, Kola Monavon, Lecithine Vacheron, Polybromure Gonnon, Polyiodure Gonnon, Sirop de créosote Vacheron, Sirop de glycérophosphates Vacheron, Sirop de Lovel, Sirop Vacheron au gatacol, Suppositoires Gonnon, Terpene Gonnon, Tonicardine Gonnon, Tonique Gonnon.

Lab. Gouin, 20, r. des Ecoles, Paris. — *Avantol*, *Cuprémone F*, *Cuprémone M*, *Cuprémone simple*, *Prométhine*, *Gouttes P. A. S.*, *Sulfomaléyl*.

Lab. Gouzène, 139, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Aloysins*.

Lab. M. Govaerts, Pont-à-Celles (Belgique). — *Pommades ophtalmiques*, *Pommades nasales*.

Établ. Goy, 23, rue Beautreillis, Paris. — *Calcisan* *Cachets*, *Gouttes Magalo*, *Comprimés et Gouttes Notal*, *Digestif Goy*, *Elixir Goy*, *Fer Larcade*, *Globules et Granulé Chomet*, *Gouttes Vocis*, *Hémostatique Goy*, *Impaludol*, *Inhalation Goy*, *Inhalations Vocis*, *Juvantol*, *Misalgol*, *Mucilage Goy*, *Narizol*, *Notaline*, *Oxycarbène*, *Panol*, *Pasticaïne*, *Pastilles M. B. G.*, *Pâte Bleue Goy*, *Pâte Goyer*, *Pectoral Serla*, *Pimpinol*, *Primulyse*, *Reclusol*, *Saturateur Chomet*, *Sédalgol*, *Sirop Chalin*, *Sirop France*, *Thiocosyl*, *Urosidal*, *Verrumag*, *Vin William*.

Lab. Grandval, Quirin succ., 12-14, r. Féry, Reims (Marne) — *Eugynol Grandval*, *Hamamelis Grandval*, *Ænoquinol Kéluryl Grandval*, *Phosarkyl (ex-Quinarsol anti-anémique)*, *Potion Grandval*, *Quinquina Grandval*, *Kina coca kola Grandval*, *Quinarsol fébrifuge Grandval*, *Sirop Larphaud*.

Lab. Granger, 3, bd Jean-Jaurès, Clichy. — *Boldocrésine (cachets)*, *Transitol*.

Lab. du Granuchol, 42, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Granuchol*.

Lab. René de Grauwe, 19, r. du Bailli, La Plaine-St-Denis. — *Elixir Duchamp*, *Fer Bravaïs*.

Lab. R. Gray, Pharmacien, Montmirail (Marne). — *Gouttes Trina*.

Lab. Grémy, 14, rue de Clichy, Paris. — *Antéparsine Grémy*, *Diasténine*, *Epidosine Grémy*, *Eutensyl Grémy*, *Folles-trine Grémy*, *Hépatocalcion Grémy*, *Immuniderm Grémy*, *Immuniperos Grémy*, *Immuniphages Grémy*, *Immunizols Grémy*, *Micranyl Grémy*, *Ocréine Grémy*, *Thionhydrol Grémy*, *Thyrénine Grémy*, *Thyrocréine Grémy*.

Lab. Grias, 47, rue Féray, Corbeil (S.-et-O.). — *Verticurins*.

Lab. Grignon, 2, rue Duphot, Paris. — *Eniode Lefebvre*, *Valériane Grignon*, *Pâte de Terpène Guédet*.

Lab. Grimault, (Vial et C^{ie}), 8, rue Vivienne, Paris. — (Voir *Pharmacologie Générale*.)

Lab. Grorichard, 12, pl. de la Révolution, Besançon. — *Omitiol*, *Magnésium Grorichard*, *Métrostyptal Grorichard*.

Lab. Gros, 13, pl. Delille, Clermont-Ferrand. — *Diurocalcine Gros*, *Diurocalcine iodurée*, *Dragées Hépatorénales Gros*, *Hépafluol*, *Hergénol*, *Puerol*, *Sanomint*, *Sédotonine*, *Spasmonal*.

- Lab. Grysa, 7, r. St-André, Le Mans (Sarthe). — *Ginéyl*, *Cuprobalt*, *Sylcase*.
- Lab. A. Guerbet et C^{ie}, 22, rue du Landy, Saint-Ouen. — *Lipiodol Lafay*, *Lipiodol F*, *Ténébryl*.
- Lab. Guéret, Pharmacien, 89, rue Martre, Clichy. — *Agorénal*, *Euplastyl*, *Jecopeptol*, *Mandocarbine*, *Néocrinol*, *Novhepar*, *Sicovaire*, *Traphéine*.
- Lab. P. Guérin, 86, rue de la Réunion, Paris (XX^e). — *Algo-curine*, *Ferrocaltine*, *Néostomol*, *Vascurol*.
- Lab. R. et M. Guignard, 38, rue du Louvre, Paris. — *Asthmatyl*, *Coqueluchyl*, *Kola Sthenyl*, *Phosphigem*, *Phyts Kola*, *Spasmosforine*.
- Lab. Guilbaud, 25, av. Michelet, Saint-Ouen. — *Acidofco*, *Dietofco*, *Laxofco*.
- Lab. Guilbert, bd Demailly, Avion (P.-de-C.). — *Neurostabyl*.
- Lab. F. Guilbert, place d'Armes, Hesdin (P.-de-C.). — *Hypo-tenseur Vale*, *Gachets Felle*.
- Lab. André Guillaumin, 13, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Acésine*, *Comprimés Guillaumin*, *Cyanargyre*, *Novargyre*, *Théosalvose*, *Vanadarsine*.
- Lab. Guillaumin et Gérard, 12, rue Charles-V, Paris. — *Elixir eupeptique Tisy*, *Prodynase*, *Quinolane Valguy*, *Vin de Baudon antiminio-phosphaté*, *Vitène*.
- Lab. de la Guimelinde, Ancenis (L.-Inf.). — *Guimelinde*.
- Lab. P. Guin Contres (L.-et-C.). — *Gachets Lekma*, *Selenalgine*.
- Lab. de Guyenne, Pont-de-la-Maye (Gironde). — *Toni-biase*.
- Lab. Paul Hardy, 42, bd St-Marcel, Paris. — *Cèdre bleu*, *Gastrulh*, *Magnésium Hardy*, *Olrircyl*, *Pancarbo*, *Pulmonaire du Dr Paul Bourgogne*, *Solution Tisch*.
- Établ. A. Hatier, 13, place du Peuple, Saint-Etienne. — *Alcalino-Correctine*, *Alliodose*, *Broncho-Correctine*, *Chloro-Magnésium Hatier*, *Crinocalcine Hatier*, *Gypsol*, *Laxiris*, *Menobiol*, *Pantogène*, *Pantosérum*, *Pepto-Correctine*, *Tricétane*.
- Lab. Henry, 39, r. de Sclessin, Liège (Belgique). — *Arséno-Fer Henry*, *Bromidine Henry*, *Bromovaleron Henry*, *Bronchitol Henry*, *Cascara Henry*, *Chloro-magnésium Henry*, *Digestif Henry*, *Disménine Henry*, *Elixir hépatique Henry*, *Fer Henry*, *Lithine Henry*, *Iodothéine Henry*, *Mangano-Fer Henry*, *Néo-Salicylate Henry*,

Nucléarrhol Gabriel, Papaine Henry, Pebromon Henry, Pectoral Henry, Peptonate d'étain Henry, Pepiodon Henry, Recalcifiant Henry, Renosiphon Henry, Salicaire Henry, Sirop bromoformique Henry, Sirop d'hémoglobine, Sirop de kola composé Henry, Solution salicylate Henry, Stanno-bardane Henry, Stannolip Henry,

Lab. Hepatic Efa, 5 bis, rue de Crimée, Paris (XIX^e). — *Hépatic Efa*.

Lab. del' Hépatomagnésion, 57, rue Pierre-Corneille, Lyon. — *Carborexyl, Hépatomagnésion, Urocylate*.

Lab. Hepatoum, 150, rue de Paris, Pantin (Seine). — *Exorphyl, Neurokabryl, Solution Hépaloum, Triplexine*.

Prod. Heudebert, 85, rue St-Germain, Nanterre (Seine). — *Pains et spécialités de régime, farines pour enfants, Café décaféiné, Féculyse, Nergine*.

Lab. Louis Hinglais, Epernay (Marne). — *Capsules Kuchner, Chenanthol*.

Lab. Hinglais, 30, rue Miromesnil, Paris. — *Follicormone buccale Hinglais*.

Lab. Hocquette, 191, rue du Faubourg-St-Antoine, Paris. — *Acobella, Crésolargol, Embryhormone, Fenucalcium, Rangol, Serobiol, Valédyl, Vivargyre*.

Lab. F. Hoffmann-La Roche et Cie, 10, rue Crillon, Paris (IV^e). — *Adoverne, Allonal, Arsylène, Bénerva Roche (Vit. B¹), Biolipase, Cachets Roche de Thiocol, Choline, Comprimés Roche de Thiocol, Cycilton Roche, Dibromotyrosine, Digalène, Diiodotyrosine Roche, Ephynal Roche, Globinofer, Hémostra, Imido, Lactoflavine (Vit. B³), Laristine, Larocaïne, Larosan, Laroscorbine, Liquoïde, Nestrovit, Numal Roche, Œstrobrol, Œstroglandol, Ovules Roche au Thigénol, Panlopon, Prostigmine, Saridon, Sécacornine, Sédobrol, Sédormid, Sirop Roche au Thiocol, Soluprotine, Somnifène, Spasmalgine, Syntropan, Tampol Roche au Thigénol, Théobryl, Thigénol Roche, Thiocol Roche, Thyroxine Roche, Tonique Roche*.

Lab. de l'Hopogamyl, 52, pl. de l'Hôtel-de-Ville, Beauvais (Oise). — *Hopogamyl*.

Lab. des Hormométalions, 50, avenue Jacqueminot, Meudon (S.-et-O.). — *Biocalcion, Cedoseptol, Exometalion, Hormocarbol, Neocedine, Panphosphates, Renovitase, Vigoral*.

Lab. Houdé, 9, r. Dieu, Paris. — *Aconitine Houdé, Aloïne Houdé, Apoline Houdé, Boldine Houdé, Caféine Houdé granulée, Codéthylène Houdé, Colchicine Houdé, Ephédrine Houdé, Formosaline Houdé, Granules Houdé (tous alcaloïdes et glucosides), Gynimbine Houdé (voir Yohimbine), Hamaméline Houdé, Héléanine Houdé, Hydrastine Houdé, Hyoscine Houdé, Hyoscyamine Houdé, Papavérine Houdé, Pastilles Houdé à la cocaïne, Quassine Houdé, Scopolamine Houdé, Spartéine Houdé, Sirophantine Houdé, Strychnine Houdé, Yohimbine Houdé*.

- Cie de l'Hydroxydase, 10, rue Blanche, Paris. — *Hydroxydase*.
- Lab. d'Hygiène et Thérapeutique appliquées, 47, rue Bokanowski, Asnières (Seine). — *Calcomagnésie*, *Gophed* (Sirop), *Dysthène*, *Félosine*, *Gynésodine*, *Héxafel*, *Myothermine*, *Nuciphos*, *Pantithyl*, *Phocitrol*, *Stopral*.
- Lab. Hygie-Dontis, Croissy-sur-Seine (S.-et-O.). — *Pioréagine* (onguent, topique, pastilles), *Fibrogénine* (injectable et applicable), *Kératoline*, *Anaphylène* (pilules).
- Lab. del'Hypocarbone, 131, bd Raspail, Paris. — *Hypocarbone*.
- Lab. Immunos, 8, av. des Sources, Nice (A.-M.). — *Cinol*, *Digicardine*, *Digicardine quininée*. Ferments immuno-lactiques, Immuno-vaccin antirhumatismal, Immuno-vaccin bronchopulmonaire, S. I. V. A., Immuno-vaccin antipyorrhéique.
- Lab. Inava, 14, rue de Normandie, Asnières (Seine). — Antityphique « TP », Bouillon Antidysentérique « Db », Dientyl Anticolibacillaire, Néo-Soufre, Ovules-Vaccins, Pâte Dentaire Bleue, Pyodyl Inava « B », Pyodarsénol Injectable et Gelée, Pyogénol Gelée, Rhinovaccin Gelée, Thiophéol (Injectable), Vaccins Injectables « A » Antibronchitique, « G » Antigenococcique, « P » Antipyogène, « D » Antistaphylococcique, « M » Gynécologique.
- Lab. Ingé, 14, rue Maublan, Paris (XV^e). — *Amphotonyl*, *Ethyl-Pneumine*.
- Lab. de l'Inhalo-Bol, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Inhalo-Bol*, *Inhalo-Past*, *Inhalo-Sel*.
- Innothéra (Lab. Chantreau), 26 bis, rue Dombasle, Paris. — *Mucinum*, *Sympathyl*, *Tot'Eamélis*, *Tot'Héma*.
- Lab. des Inocrinines, 4, rte du Médoc, Le Bouscat (Gironde). — *Inocrinines*, *Tamarine*.
- Institut de Biologie appliquée (C. Cépède), 57-59-61, rue Mathurin-Régnier, Paris (15^e). — *Panostyl*, *Vaccinothérapie atoxique Cépède*, tous examens de laboratoire.
- Institut Biologique Mérieux, 17, rue Bourgelat, Lyon. — *Tuberculines*.
- Institut Jacquemin, Malzéville-Nancy (M.-et-M.). — *Ferment pur de raisin*.
- Institut Pasteur, 36, rue du Docteur-Roux, Paris. — *Sérums*, *Vaccins*.
- Lab. de l'Iodarsenic Guiraud, 10, imp. Milord, Paris (XVIII^e). — *Citratin*, *Iodarsenic* ou *Gouttes Paidophiles* du Dr Guiraud, *Véricardins*.

- Lab. de l'Iodosclérol**, 30, rue de Sète, Longuyon (M.-et-M.). — *Iodosclérol*, *Vinocrinol*.
- Lab. des Iodures Gros**, 202 bis, avenue Jean-Jaurès, Clamart (Seine). — *Combretine*, *Cratægus Bocquillon-Limousin*, *Huiles Duret*, *Iodures Gros*, *Tœnifuge Limousin*.
- Lab. de l'Ipalcæal**, 6, av. des Docteurs-Foix, Salies-de-Béarn (B.-P.). — *Ipalcæal*.
- Lab. Iscovesco**, 8, passage Morel, Montrouge (Seine). — *Adrénol total*, *Adrénol Cortex*, *Afatyl*, *Androcrinol*, *Andro-gouttes*, *Andropolycrinol*, *Cardiocrinol*, *Cérébrocrinol*, *Gynocrinol*, *Gyno-Gouttes*, *Gynohypoophysol*, *Gynolutéol*, *Gynopolycrinol*, *Hépatocrinol*, *Hypophysol*, *Mammol*, *Néphrocrinol*, *Novocortex*, *Opopédol*, *Opo-thérapie Iscovesco*, *Splenocrinol*, *Thyrol A.*, *Yo-Androl*, *Yo-Gynine*.
- Lab. Ivago**, 17, r. de Provence, Paris. — *Vaccins intradermiques*, *Vaccins Ivago*, *Gelées-vaccins Ivago*.
- Établ. Jacquemaire**, Villefranche (Rhône). — *Blédine*, *Blécao*, *Galactogil*, *Peptogil*.
- Lab. Jammes**, 86, rue Michel-Ange, Paris. — *Boldocrinol*, *Cacodyline Jammes*, *Iodinjectol Jammes*, *Magnésio-Cacodyline*, *Néophage*.
- Lab. Jammes de Golbery**, 102 bis, rue de l'Aigle, La Garenne-Colombes (Seine). — *Gossypiol Maurin*, *Hormocri-nol F et M*.
- Lab. Jauffret**, 181, av. Victor-Hugo, Clamart (Seine). — *Impetigol*, *Néobiol*.
- Lab. de la Jéobiase**, Vayres (Gironde). — *Jéobiase*, *Soludex Vivacure*.
- Lab. du Jécol**, 3, rue Watteau, Courbevoie. — *Allopha-Quina*, *Jécol (Cachets et Gouttes)*.
- Lab. Jicem**, 304, rue Saint-Jacques, Paris. — *Citropaïne*, *Iodarsine*.
- Lab. Jolly**, 28, av. Carnot, Saint-Germain-en-Laye (S.-et-O.) — *Hornobromine*, *Spasmine Jolly (Elixir et Comprimés)*, *Spasmidénal (Comprimés et Suppositoires)*, *Terpoxyl (Externe. Interne, Ovules)*.
- Lab. Jouenne**, 234, rue des Pyrénées, Paris. — *Léciflétons*.
- Lab. Journet**, 18-20, r. Vavin, Paris (VI^e). — *Bladérol du D^r Jenrout*, *Iodosofsal*, *Orthoflorène*, *Paracrinase*, *Perles Nivernaises*, *Rhapharène*, *Sirop Lefeuve*, *Tonifosfal*, *Tridynol*.
- Lab. du D^r Jouve**, 16 bis, rue Dufrénoy, Paris (XVI^e). — *Balsurol*, *Gystorénol*, *Epipaline*, *Ovules Sédo-Hémostatiques du D^r Jouve*, *Sylvinhalant (Inhalation-Drageés)*, *Vitimone*.

Lab. Juin, 10, Impasse Milord, Paris (XVIII^e). — *Phosphopinal Juin*, *Pulmodion*, *Pulvéol*.

Lab. Julien, 105, rue de Rennes, Paris (VI^e). — *Benzoflorine*, *Corylase*, *Elgine Julien*, *Manganophosphat Julien*, *Pandrénaline Julien*.

Lab. de la Kaviase, 22, rue Lalande, Paris (XIV^e). — *Kaviase*.

Lab. du Kéralax, 1, r. Auber, Paris. — *Kéralax*.

Lab. L. Kerfysen, 25, rue de Calais, Dunkerque (Nord). — *Benzoquinol*, *Dermaline Demeulenaere*, *Globabyl*, *Hémorroidine* (*Pommade*, *Gouttes*, *Suppositoires*), *Sirop Kopé*.

Lab. du Képhédryl, 1, rue Auber, Paris. — *Képhédryl*.

Lab. Kerckkove, pl. Charles-Roussel, Tourcoing. — *Hépadrops*, *Surval*.

Lab. du D^r Kirchner, 24, r. de Verdun, Strasbourg (B.-Rh.). — *Pancréal Kirchner*.

Lab. Koehly, 18, r. de Ménilmontant, Paris. — *Carboxine*, *Eubine*, *Malzemose*.

Lab. Kraus, 37, rue Godot-de-Mauroy, Paris. — *Anticonvulsif Kraus*, *Citrol*, *Coroplasme*, *Fibrogène*, *Francoplaste*, *Furoncide*, *Ombioplaste*, *Poroplaste*, *Protège-vaccin Kraus*, *Savon Glytra*, *Savon Neutrèpur*, *Solargol*, *Traumatol*, *Traumatoplaste*.

Lab. Krieger, 121, av. de St-Ouen, Paris (XVII^e). — *Antipur*, *Artérioveinine*, *Butyral*, *Eczémacure*, *Géraldine*, *Organocalcine*, *Sciaticure*.

Lab. René Krotoff, 78, av. de Saint-Ouen, Paris (XVIII^e). — *Dolpyc*.

Kuhlmann (Produits spécialisés des Établissements), S. Thiéry, Pharmacien, 19, rue Franklin, Paris. — *Binidia*, *Binoxol*, *Chloralosane*, *Dithioral*, *Sunalcol*, *Sunoxidon*, *Sunoxol*.

Labiola, Lab. d'Applications Biologiques, 52, r. de Cambral, Lille (Nord). — *Doganol*, *Encyтал Cordonnier*, *Gynodine*, *Icorase*, *Kaneuron*, *Koddyl*, *Servofreinyл*, *Sidéranyl*, *Spasmocalcyl*, *Stinergyx*, *Stosédol*, *Strychneuron*, *Viabylis*.

Labora, pl. de la Poissonnerie, Toulon. — *Amygdarsol*, *Calciglandine*.

Laboradium, 25, rue Friant, Paris (XIV^e). — *Aseptoradol*, *Balneradol*, *Dermoradol*.

- Labo-Vita**, 29, r. Duret, Paris (XVI^e). — *Uroviline*, *Vitacholine*.
- Lab. Lachaise**, 9, place Municipale, Tulle. — *Castanol*, *Dépuratif Saintia*, *Myrtoline*, *Thionaphte*.
- Lab. Lacombe**, 4 ter, r. Barbès, Courbevoie (Seine). — *Bemax*, *Eno's Fruit Salt*.
- Lab. Lacombe et Cie**, 42, r. du Mont-Cenis, Paris. — *Chlorumagène*, *Do-sa-no-sal*, *Fanerval*, *Surbical*.
- Lab. Lacor**, 81, rue de la Roquette, Paris. — *Angiosédine*.
- Lab. Lacroix**, 37, rue Pajol, Paris. — *Arsi-Quinoforme*, *Camphostyl simple*, *spartéiné et strychniné*, *Luerol*, *Neurotrope*, *Phytocholine*, *Pilules Hélieniennes Naud*, *Quinoforme Santal salolé*, *Vanucléol*.
- Lab. du Lactavinaigre**, 34, rue de Trévise, Paris. — *Lactavinaigre*.
- Lab. Ladiv**, 36, rue des Archives, Paris. — *Antiseptic Ladiv*, *Biliairine*, *Brocol Ladiv*, *Cardial*, *Cérium Ladiv*, *Digérol*, *Dissuric*, *Fluriodol*, *Inhalation Ladiv*, *Lintiment Ladiv*, *Ovul'Ladiv*, *Peptasyl*, *Perles Pectorales*, *Pommade Ladiv*, *Recalcific*, *Régulol Ladiv*, *Reminéralisol*, *Rénovateur Ladiv*, *Rumific*, *Sanfluid*, *Suppo'Ladiv*.
- Lab. du Dr Lafay, Lecoq et Ferrand**, pharmaciens, 54, Chaussée-d'Antin, 69, rue de Provence, Paris (IX^e). — *Curaluès*, *Drainobyl*, *Flor-Peyotl*, *Ovules Hystan*, *Pommade vitaminée Lafay*, *Solutions mercurielles injectables du Dr Lafay*, *Suppositoires mercuriels du Dr Lafay*.
- Lab. Laffort**, Joué-lès-Tours (I.-et-L.). — *Evobiline*, *Fluokol*, *Lysosclérol*, *Septolan*, *Sulfamyl*, *Uvotonyl*.
- Lab. Lafran**, 8, rue de Prague, Paris. — *Aspirine Lafran*, *Gharbenzo Lafran*, *Dicodéine Lafran*, *Glandimbine Lafran*, *Parégorique Lafran*, *Urotropine Lafran*.
- Lab. F. Lagarce (Dr en Ph^{1e})**, 13, place de la Nation, Paris. — *Cholofluol*, *Ophthal*.
- Lab. Lagoutte**, 25, cours Albert-Thomas, Lyon. — *Boldolactac*, *Calmocardine*, *Dermodulcis*, *Phlébos*, *Suppoalgos*, *Suppocamphryl*, *Suppopulmos*, *Suppothermos*, *Suppotionic*.
- Lab. Lagüe**, 63, av. de la Grande-Armée, Paris. — *Pneumalcool*.
- Lab. J. B. Lahaye**, 145, rue des Bourguignons, Bois-Colombes (Seine). — *Tisane hépatique Lahaye*.
- C^{1e} G^{1e} du Lait** Rumilly (Hte-Savoie). — *Farine Mont-Blanc*, *Lait Mont-Blanc*, *Tonimalt Mont-Blanc*.
- Lab. du Laitancyl (M. Panier)**, 69, r. Faidherbe, Malo-les-Bains. — *Laitancyl*.
- Lait Guigoz**, 2 et 4, rue Catulle-Mendès Paris (XVII^e). — *Babeurre Guigoz*, *Lait en poudre Guigoz*, *Lait dextrose-malté Guigoz*, *Lait déchloruré Guigoz*, *Ravix (lait Guigoz irradié)*.
- Lab. Laiter**, 52, rue Heurtault, Aubervilliers. — *Collyres (bleu, rose, irradié)*. *Cuprazurol*.

- Laits** Molard, 25, cours Lafayette, Lyon (IV^e). — *Bouillie Molard aux amandes*, *Lait déchloruré Molard*, *Lait Molard au Calcia*.
- Lab. Laleuf**, 51, rue Nicolo, Paris (XVI^e). — *Adrépatine*, *Colloïdine*, *Créosal*, *Crinocardine*, *Folliovarine*, *Ioda*, *toxine*, *Lobéliane*, *Pancrépatine*, *Pavérinol*, *Plexalgin* Laleuf, *Polyferments*, *Sirop Dubois au créosal*, *Théocardine* Laleuf, *Théoverine* Laleuf, *Trinibaine* Laleuf, *Trinitral* Laleuf, *Trinitrine* caféinée Dubois, *Trinitrine-Papavérine* Laleuf, *Trinitrine simple* Laleuf, *Urisal* du D^r Deschamp, *Urococcine*.
- Lab. du Lambarène**, 5 bis, rue de Berri, Paris. — *Lambarène*.
- Lab. Lambert**, rue de la Paix, Vichy. — *Epicral*, *Oxyllysine*, *Triseptine*.
- Lab. Lambert**, pl. du Châtelet, Orléans. — *Comprimés Galac*.
- Lab. Lambiotte frères**, 20, rue Dumont-d'Urville, Paris. — *Arhine*, *Créosoforme*, *Galform*, *Perles Taphosote*, *Phosote*, *Thiosote*, *Urométine*.
- Lab. Lancelot**, 100 ter, av. de Saint-Mandé, Paris (XII^e). — *Appareil et Spécifique Lancelot*.
- Lab. Lancosme**, 71, av. Victor-Emmanuel-III, Paris. — *Acolitol*, *Algocratine*, *Anhémor*, *Argybil*, *Bain Carré*, *Bismhydrat*, *Bismuth Desleaux*, *Bistomax*, *Calcilève*, *Gargarisme Lancosme*, *Globules Laincar*, *Hémodrome*, *Inhalation Lancosme*, *Magnésie Lancosme*, *Rect' Acolitol*, *Silymar*.
- Lab. Landon**, Châtel-Guyon (Puy-de-Dôme). — *Laxo-Psylim* Landon, *Phosphobiase*.
- Lab. Landrier**, Coulanges-sur-Yonne (Yonne). — *Gastrosédyl*, *Polysalyl*.
- Lab. Landrin et Cie**, 12, rue de la République, Puteaux. — *Algarine*, *Gipromarol*, *Elixir de Virginie Nyrdahl*.
- Lab. J. Laroze**, 54, rue de Paris, Charenton (Seine). — *Bignol*, *Colisel*, *Cytopan*, *Décholestrol*, *Dosolol*, *Kaobrol*.
- Lab. Laryngologique**, R. Cordier, 45, rue de Lyon, Paris (XII^e). — *Hydrorrhéol*, *Inhalation gargarisme Vocaldop*, *Vocaldop cachets*.
- Lab. Latour**, Aix-en-Provence. — *Galactogène Chalvet*.
- Lab. E. Latour**, Terrasson (Dordogne). — *Bruzarine*, *Neuralgic Caron*.
- Lab. F. Latour**, 71, rue Douy-Delcupe, Montreuil (Seine). — *Parlax*, *Phonodiose*.
- Lab. Laugier**, 56, rue St-Lambert, Marseille. — *Atussol*, *Biosthène*, *Bitonine*, *Cardicratine*, *Cinnestérol*, *Dynamobiase*, *Euprandiol*, *Guipsiode*, *Hépargène*, *Microcidal*, *Quinastase*, *Sirop Thébé*, *Téja*, *Urosérum*.
- Lab. du D^r Laurent-Gérard**, 40, rue de Bellechasse, Paris. — *Acétamone*, *Evolaxine*, *Plexamins*, *Radiotétrane*.

- Lab. Lauriat**, av. Foch, La Garenne-Colombes (Seine). — *Anti-Asihénie Lauriat (Ex-Lauriatol)*, *Bronchoseptol*, *Isorgane*.
- M. J. Laurin**, pharmacien, Chambourcy (S.-et-O.). — *Neuréol*, *Alfobyl*, *Zymogastrine Kervan*.
- Lab. J. Laval**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Surpaver*.
- Lab. du D^r Lavoué**, Rennes (I.-et-V.). — *Ephydion*, *Felisdine*, *Gouttes I. A. M.*, *Mangarsenic*, *Salicylina*, *Sirop I. A. M. (enfants)*, *Uro-Bestol*.
- Lab. Lavril**, Pacy-sur-Eure (Eure). Bureaux : 26, bd des Batignolles, Paris (XVII^e). — *Gyno-Lactosmose*, *Lactosérum Lavril*, *Lactacyd*, *Lactosmose*, *Ovules au Lactosmose*, *Ovulacyd*.
- Lab. Lebeault**, Besins et Cie, 5, rue Bourg-l'Abbé, Paris. — *Citrolargol*, *Germose*, *Mycolysine*, *Staphylase du D^r Doyen*, *Véinosine*, *Vin de Bugeaud*.
- Lab. Le Blond**, 15, rue Jean-Jaurès, Puteaux (Seine). — *Ortho-Gastrine*, *Orthophorine*, *Pyurol*.
- Lab. Leboime**, 1, 3 et 5, r. Fernand-Widal, Paris. — *Calcozymase*, *Prezymase*.
- Lab. Le Brun**, 5, rue de Lubeck, Paris (XVI^e). — *Dragées tonocardiaques*, *Eucalyptine*, *Mictasol*, *Mictasovules*, *Mictazine*, *Néo-Mictazine*, *Pancalcion*, *Sirop d'Eucalyptine*, *Solucalyptine*, *Suppositoires Eucalyptine*, *Suppositoires Mictasol*.
- Lab. Leconte**, 12, r. des Petits-Carreaux, Paris. — *Ambocarine*, *Bilaxyl*, *Choléfluine granulé*, *Choléfluine comprimés*, *Euférine*, *Gouttes Leconte*, *Hémocholine*, *Lac-calcine*, *Morsine*, *Peptidol*, *Rénoline*, *Urolavose-Varicyl*.
- Lab. Lecoq et Ferrand**, 14, rue A.-Briand, Levallois-Perret. — *Antipsorine*, *Guralues du D^r Lafay*, *Gatran*, *Helminthyl*, *Lipaurol*, *Molène*, *Muthiode*, *Néosolmuth*, *Pentarsyl*, *Suppositoires Hg du D^r Lafay*, *Tréparsol*.
- Établ. Pharmaceutiques M. et P. Ledent**, Montreuil-sur-Mer (P.-de-C.). — *Opogermine*, *Sédalan*.
- Lab. Lees**, 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Métritols*, *Suppogynals*.
- Lab. du D^r J. Lefèvre**, 200, rue du Faubourg-Saint-Martin, Paris. — *Atosulfate*, *Ganglionyl*, *Sirop du D^r Lagoux*, *Total Vital*.
- Lab. C. Le Follet**, Nozeroy (Jura). — *Opobrol*, *Suroxydal*.
- Lab. Lefrancq**, 36 à 46, av. de Metz, Romainville (Seine). — *Bovcardiac*, *Bovhépatic*, *Bovstrol*, *Cardiophylline*, *Carnine*, *Extrait de bile*, *Extrait hépatique*, *Hépatocarnine*, *Hormoplasmine*.
- Lab. Legendre**, Houilles (S.-et-O.). — *Gasmar Legendre*, *Pâte Mireille*, *Pilules Corail*, *Sirop Mireille*.
- Lab. Legoux frères**, 6, rue Louis-Blanc, La Garenne-Colombes. (Voir Lab. du D^r E. Duhourcau.)

- Lab. Lejeune, 142, rue de Picpus, Paris. — *Indhaméline simple*, *Indhaméline plurigl.*, *Pommade Lenoir*, *Pro-tensène*.
- Lab. Lemaître, 46, rue de Trévise, Paris (IX^e). — *Septo-drainol*.
- Lab. Lematte et Boinot, 52, rue La Bruyère, Paris. — *Acé-colex*, *Acécoline*, *Acécoline-papavérine*, *Acécoline-spar-téine*, *Acécoline-camphre*, *Acécoline-Yohimbine*, *Bio-calcoose Chevreton*, *Calcional*, *Hémo-Tonikéine*, *Hormocline*, *Hypotan*, *Hypotan-papavérine*, *Hypotan Injectable*, *Lipocérébrine*, *Nicobion (Vitamine P-P)*, *Pressyl*, *Tonikéine*.
- Lab. Léonardon, 1, r. Paul-Bert, Angers (M.-et-L.). — *Cachets Asminol*, *Hemofluidol*, *Quinthéryl*.
- Lab. du Leptol, 333, rue de Vaugirard, Paris (XV^e). — *Leptol*.
- Lab. Lescène, 58, rue de Vouillé, Paris. — *Anaquintine Les-cène*, *Balsamol*, *Balsaquintine*, *Choléo-Zymatine*, *Rhi-naquintine*, *Viosten*, *Zymatine*.
- Lab. G. Lesourd, 88, r. Duhesme, Paris (XVIII^e). — *Anthe-lox*, *Anthylline*, *Antinerveux Lesourd*, *Bolcitol*, *Colitisane*, *Péricols du D^r Legros*, *Sels-Mags*, *Spléno-carbine*.
- Lab. Lettry, 69, rue de Sèvres, Paris. — *Agoxyl*, *Hederyl*.
- Lab. Leurquin, Dreux (E.-et-L.). — *Bromocarbonate*, *Kinégas-trine*, *Pulmofluide*, *Pulmofuide éphédriné*, *Sels Na 4*, *Tablettes Gélok*.
- L. E. V. A., 26, rue Pétreille, Paris. — *Lénifédrine*, *Léniforms*.
- Lab. Licardy, 38, bd Bourdon, Neuilly-sur-Seine. — *Fluobyl*, *Gélogastrine*, *Hémductyl*, *Laxamalt*, *Sédosine*, *Stové-drine*, *Tonudol*.
- Lab. des Lices, 38, rue des Lices, Angers. — *Anturic Labesse*, *Gouttes de Quarantaine*, *Hypotensol*.
- Lab. Lindeux, 7, av. des Marronniers, Fontenay-sous-Bois (Seine). — *Novoplasmine*, *Opo-Sigmal*, *Phosthénine*.
- Lab. Lip. Voir Laboratoire Saporex.
- Lab. des Lipides, 14, rue des Minimes, Paris. — *Dermo-splénine*, *Liposplénine* du D^r Groc, *Splénogastrique*.
- Lab. de la Liposeptine, 2, pl. des Vosges, Paris. — *Ankylosyl Dépurogène*, *Dépurogène T*, *Fenugrène*, *Fucusol*, *Gastrobiase*, *Hémorragine*, *Hémoptysol*, *Isotanin*, *Isotanol*, "G", *Lax-Hormone « Lipo »*, *Liposeptine*, *Liposeptol*, *Marrubène*, *Pansolanée*, *Parasclérose*, *Rhino-Liposep-tine*, *Sonène*.
- Lab. Lobica, 25, rue Jasmin, Paris (XVI^e). — *Azotyl*, *Béatai Carditone*, *Lactobyl*, *Lactochol*, *Sérénol*, *Taxol*, *Ura-lysol*, *Veinotrope*.

- Lab. Lobru, Louis Brun, pharmacien**, 92, rue Bobillot, Paris. — *Asthmolysin*, *Gouttes Pilka*, *Guaraphos*, *Hémosamine*, *Posterisan*, *Tablettes Hova*, *Produits Zyma*.
- Lab. Lobry**, 6, rue Parrot, Paris. — *Iodarthros*, *Néphrylan*.
- Lab. des Spécialités Scientifiques Logeais**, 22 bis et 24, r. de Silly, Boulogne-sur-Seine. — *Organotiol S.-S.*, *Panxylon* (Ampoules et Granulés), *Pommade Logeais*, *Suppositoires Logeais*, *Veinhormones Logeais*.
- Lab. Jacques Logeais**, 71, av. de Clamart, Issy-les-Moulineaux. — *Boricine Meissonnier*, *Fluidostérol*, *Globules Secrelian*, *Iodamélis* (Gouttes et Comprimés), *Opo Iodamélis*, *Naïodine A et B*, *Naïodine Suractivée A et B*, *Thio-naïodine A et B*, *Thionaïodine* (Comprimés).
- Lab. Marcel Logeais**, 24, rue des Plantes et 1, r. Bénard, Paris. — *Analgésol*, *Choléopeptine*, *Sanicérène*.
- Lab. Longuet**, 34, rue Sedaine, Paris. — *Arsi-Strychnal*, *Carbofixine*, *Cholépan*, *Citrosodine*, *Clisemine*, *Hamacitro*, *Narcyl*, *Ortho-Zomine*, *Phospho-Strychnal*, *Phytosjava*, *Pilules du D^r Debouzy*, *Quinuryl*, *Rénalgine*, *Rhinalginol*, *Siphuryl* (*Orthosiphon Longuet*), *Strychnal*, *Urisanine*, *Zomine*.
- Lab. Lormeau**, 27, r. Planchat, Paris. — *Gépaïne*, *Guralsine*, *Glycarsol*, *Hépasel*, *Vascosodine*. — *Spécialités Valentin-Ghaillot*.
- Lab. Lorrain de Produits purs**, Etain (Meuse). — *Caparlem*, *Collosoufre*, *Gryosan*, *Sérocalcine*.
- Lab. J. Lorthioir**, 22, rue Perceval, Paris. — *Biotrignon*, *Carbotrignon* (synonyme *Biotrignon hépatique*), *Diurophyte*.
- Lab. A. Louveau**, 78, bd des Batignolles, Paris. — *Arthri-Biose Louveau*, *Iodihaméline Louveau*, *Sulfoline*, *Suppositoires Almine Louveau*, *Urosodine Louveau*.
- Lab. André Lucien**, 19, rue du Bac, Paris (VII^e). — *Atospirine*, *Hélenase*, *Sédogoutte*, *Vésiculine*, *Salicure*, *Strontiodé*.
- Lab. Lucinia**, 154 bis, rue Breteuil, Marseille. — *Fusol*, *Galabactéine*, *Lactis-Salt*, *Lucimarine*.
- Lab. du Lugocalcion**, Oullins (Rhône). — *Adrénargol*, *Gouttes Eryl*, *Lénadryl*, *Lugocalcion*, *Nasobore*, *Novolug*, *Purargol*, *Résocaïne*, *Sulfoxyl*, *Urométhyl*, *Valénal*.
- Lab. Lumière** (Prod. chimiques spéciaux « Brevets Lumière »), 45, rue Villon, Lyon. — *Allauroil Lumière*, *Allocaïne Lumière*, *Allochrysine Lumière*, *Antipaludique*, *Borosodine Lumière*, *Cryogénine Lumière*, *Cryptargol Lumière*, *Dentochrysine Lumière*, *Emgé Lumière*, *Entalva Lumière*, *Entérovaccin Lumière*, *Gelée Lumière*, *Granulochrysine Lumière*, *Hémoplasme Lumière*, *Hermophényl Lumière*, *Iodure d'amidon Lumière*, *Néokola Lumière*, *Oléochrysine*, *Oléochrysol Lumière*, *Opozones Lumière*, *Persodine Lumière*, *Rhéantine Lumière*, *Tulle gras Lumière*.

- Lab. Henri Luzuy**, 37, avenue Jean-Jaurès, Aubervilliers, (Seine). — *Crinomarine*, *Pâte Germidex*, *Neuroferyl*.
- Lab. A. Lyons**, 30, rue Monge, Paris. — *Arthrilax*, *Neuséda*, *Somnitis*, *Tonax*.
- Lab. Madyl**, 14, rue de Miromesnil, Paris. — *Bromovose*, *Euphytose*, *Lapo*.
- Lab. du Magsalyl**, 10, rue J.-Hachette, Ivry-sur-Seine. — *Catalyl*, *Magbromyl*, *Magiodyl*, *Magsalyl*.
- Lab. Mahé**, pharmacien, 85, rue de Trignac, Saint-Nazaire-Penhoët (L.-Inf.). — *Sirop Hercell*.
- Lab. du Mainguy**, M. Bassin, Bondy. — *Stupho*, *Véralgine*.
- Lab. de la Maisleriasse**, 143, rue d'Alésia, Paris (XIV^e). — *Maisleriasse*.
- Lab. Malaval**, 8, rue Fleury, Oullins (Rhône). — *Baume Dolopax*, *Bi-Carbène*, *Bilidrainine*, *Bi-Sodine*, *Biopectol*, *Calcitanine S*, *Carbonaphthine*, *Carnicalcine*, *Cynaboldine*, *Dépurhémo*, *Dynaphosol*, *Dynavitamine*, *Eupepton*, *Floranémone*, *Iodocéane*, *Jécoboldine*, *Jécosédyl*, *Jécolaxine*, *Lubridax*, *Normaflux*, *Pilules Erdibrom*, *Terpine Barbier*, *Urimiral*, *Vigorstyl*.
- Lab. du Malone**, J. Vincent, pharmacien, Ancenis (L.-I.). — *Gouttes Malone*, *Spasmalons*.
- Lab. Mannet**, Loudun (Vienne). — *Dragées Mannet ferro-ergotées*, *Elixir Mannet ferro-ergoté*, *Elixir tribromuré Mannet au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de potassium et au Salol*, *Elixir Mannet à l'iodure de sodium et au Salol*.
- Lab. Manor**, St-Germain-du-Bois (S.-et-L.). — *Chronicystine*, *Gouttes Manor*, *Hépatostimuline*, *Pommade Antihémorroïdale Manor*, *Pommade Brune Manor*, *Révulsif Manor*, *Salicylate Manor*, *Suppositoires Manor*.
- Lab. Marceau** (D^r A. Grigaut et A. Boutroux, pharmaciens, chefs de Lab. à la Faculté de Médecine), 25, rue du Général-Foy, Paris. — *Carb*, *Carbagyre*, *Cholérène*, *Olévone*.
- Lab. Margex**, 13, r. Mélingue, Paris. — *Créositoires*, *Gencigel*.
- Lab. Marinier**, 23, rue Ballu, Paris. — *Bi-Citrol*, *Carbagol*.
- Lab. Mariotte**, 15, rue Pasteur, Bourg (Ain). — *Neutropeptine*, *Pectosédyl*, *Phytogénol*.
- Lab. Mars**, Guérande (L.-Inf.). — *Argyrescine Mars*, *BB Derm Mars*, *Sanubrol Mars*, *Seinderm Mars*, *Veinomars* (voir *Argyrescine*).

- Lab. Martin**, 25-27, r. du Commandant-Rivière, Colombes (Seine). — *Oytobiase*, *Quinosiphon*.
- Lab. du Dr Martinet**, 16, rue du Petit-Musc, Paris. — *Granoxyl*, *Gynarsol*, *Hémopausine*, *Hépadrainase*, *Hormovitol*, *Hygiodine*, *Insulina Novo*, *Lipolysine*, *Lymphiode*, *Magnésosvules*, *Néocollargol*, *Pangaduine*, *Pulmophédryl*.
- Lab. Martinie**, 62, av. Philippe-Auguste, Paris. — *Benzo-sulfène*, *Phlebotonine*, *Tonicalcine*, *Uvargol*.
- Lab. Martin-Mazade**, St-Raphaël (Var). — *Elixir Eupnéique Martin-Mazade*, *Cigarettes-Papier-Poudre Antiasthmiques Martin-Mazade*, *Pilules anti-diabétiques Jaillardon*.
- Lab. Maronneau-Morel**, 43 et 45, r. des Fauvelles, Courbevoie (Seine). — *Curiosan*, *Gamostyl*, *Trépositoires*, *Vaccin anticolibacillaires polyvalent M.-M.*
- Lab. du Marubor**, 1, rue d'Arras, Béthune. — *Carbolaxine Marubor*.
- Lab. R. Massol**, 54, av. de la Bourdonnais, Paris. — *Géolaxol*, *Hémolucyl*, *Panlypol*, *Quinodermine*.
- Lab. Masson**, 2, place de la Porte-des-Ternes, Paris (XVII^e). — *Continol*, *Viperol*.
- Lab. R.-L. Mathivat** (Synthesis), 66, rue de la Pompe, Paris (XVI^e). — *Cardioparine*, *Gollutoire Trepallix*, *Novatropine*, *Pantocamphre*, *Perparine*, *Surparine*, *Trepallix*.
- Lab. Mauchant**, 22, bd Camelinat, Gennevilliers (Seine). — *Asthmapepton*, *Cassitol*, *Fluveinose Mauchant*, *Héparmine Mauchant* (Ampoules buvables et sirop), *Iodonucléol*, *Lipovita*, *Malline Phenix*, *Minéplastine*, *Minératine du Dr G. Baud*, *Myodyne Mauchant*, *Narkène*, *Phoscamine*, *Rhodoboryl*, *Salubrine* (Liquide et Comprimés), *Sirop Mauchant*, *Solvuric*, *Suc Durham*, *Tercolène*, *Trilactine*.
- Lab. J. Maunand**, 146, av. Parmentier, Paris. — *Umcka*.
- Lab. G. Maury**, 6, rue de Paris, Joinville-le-Pont (Seine). — *Elixir Godfrin*.
- Lab. P. May**, 215, bd Voltaire, Paris (XI^e). — *Tympanyl May*.
- Lab. Mayaud**, 6 ter, rue Voltaire, La Garenne-Colomb (Seine). — *Ulcérophile Nosan*.
- Lab. Mayoly Spindler**, 1, place Victor-Hugo, Paris. — *Baume Aroma*, *Borostyrol*, *Dicaliode*, *Euphon*, *Fluenzyl*, *Isoluol*, *Kalastyl*, *Pérubore*, *Pipettes nasales M. S.*, *Rhino-Borostyrol*, *Sanoformine*, *Stillargol*, *Valbrol*.
- Lab. de Médecine Expérimentale**, 1-3, rue Malherbe, Beauvais. — *Fludiose*, *Formocarbène*, *Opochol*, *Spasmocarbène*, *Sodothiol*.
- Lab. Médicia**, 7, imp. de la Sous-Préfecture, Roanne. — *Entéropathyl*, *Gastropathyl*, *Sédatonyl*, *Spasmo-Entéropathyl*.

- Lab. Médico-Pharmacologique de Vichy**, 1 et 3, r. Lasloque, Vichy. — *Neutroses-Vichy*.
- Lab. Mercier**, 41, route de Turin, Nice. — *Acétumine*, *Iodorganine*.
- Lab. du Mercurochrome 220 H. W. D.** 25, rue Saint-Augustin, Paris. — *Mercurochrome 220 H. W. D.*
- Lab. Merlet**, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne-sur-Seine. — *Ephédrolyptol*, *Stragol*.
- Lab. J. Messis**, 71, av. de la République, Champigny (Seine). — *Agosymase*, *Guérýsipèle*, *Hémotrope* (Gouttes), *Santal Dolmay*, *Urosinol Damber*, *Vicéliase*, *Vigotonique*.
- Lab. du Métacuprol**, 5 bis, rue Pajou, Paris (XVI^e). — *Métacuprol*, *Neuroplexyl*, *Phytocuprine*.
- Lab. Paul Métadier**, Tours. — *Métaspirine*, *Méta-Titane* (crème, savons), *Méta-Vaccin* (ovules), *Rhino-Titane S. I. G.*
- Lab. Métère**, 24, bd Jean-Jaurès, Boulogne (Seine). — *Bécalciol*, *Cuprosténol Diathès*, *Huile camphrée Manganesée*, *Solhermol*.
- Lab. Mexyl**, 12, rue Henri-Rivière, Le Perreux (Seine). — *Collutoire Mexyl*, *Filtraxyle Mexyl*, *Solarsal*, *Trineuxyl*, *Wipla*.
- Lab. du Dr Mialhe**, 8, rue Favart, Paris. — *Acoqtol*, *Adrénaline Mialhe* (Adénine), *Aquintol-Mialhe*, *Digi-Lanatine*, *Digi-Mial-Baine*, *Digitaine-Mialhe*, *Elixir Mialhe*, *Lab-lacto-ferment*, *Ouabaïne-Mialhe*, *Nusyl*, *Perquinol*, *Salvacid*.
- Lab. Michel**, Cirey-sur-Vezouze (M.-et-M.). Tél. : 60. — *Chasvers Michel*, *Fluidobile*, *Xero-derme*.
- Lab. Michelin**, 20, bd Heurteloup, Tours. — *Æsculase*, *Sonagar*, *Sonamel*.
- Lab. Michels**, 4 bis, rue du Colonel-Moll, Paris (XVII^e). — *Chloro-calcion*, *Silisode*.
- Lab. du Mictasol**, 5, rue de Lübeck, Paris. — *Mictasol*, *Mictasol Bleu*, *Mictasovules*, *Mictazine*, *Néo-Mictazine*, *Suppositoires Mictasol*.
- Lab. Midy**, 67, av. de Wagram, Paris. — *Algipan Midy*, *Antidiabétique Midy*, *Antigastralgique*, *Antigrippine Midy*, *Bétul-ol Midy*, *Bi-iodure de mercure indolore Midy*, *Carbolin Midy*, simple et composé, *Cascara Midy*, *Cocaïne Midy*, *Colchi-Sal Midy*, *Panlacto Midy*, *Pipérazine Midy*, *Pommade Midy*, *Proveinase Midy*, *Suppositoires Midy*, *Thiodacaïne Midy*, *Thiodérazine Midy*, (Ampoules et Gouttes).
- Lab. L. Mignard**, 24, bd de Sébastopol, Paris. — *Entelactol*, *Total Magnésien*.

- Lab. E. Millet, Rambouillet (S.-et-O.). — *Carbos, Comprimés de Carbonate de chaux, Formocarbos, Mucicarbos, Mucilaxine, Rectoplasme.*
- Lab. Millet et Guillaumin, 4, rue Richer Paris. — *Frixol, Gubline, Hormuclases du Dr Roussel, Kénol, Lactaris, Myovarsyl, Paxène, Prolactine, Quinenol, Pâte dentifrice Gibbs R. S., Uclarsyl, Vanadyt, Vanoxyle.*
- Lab. Millot, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Ampoules Dubé, Benzo-bismuth Millot, Comprimés néothorium Millot, Crayons néothorium Millot, Orargol (Rhino, Gouttes, Collyre, Ampoules), Ovules néothorium Millot, Pommade néothorium Millot, Sarcopit¹, Soluté Gaube du Gers.*
- Lab. Miluc (L. Ragoucy), 2, r. Joseph-Bara, Paris (VI^e). — *Allergantyl Miluc, Nervantyl Miluc.*
- Lab. Minerva, 10, rue Bayard, Toulouse (H.-G.). — *Vitalyne.*
- Lab. Miquel, 1, avenue Lowendal, Paris. — *Agar-Lac, Glyco-M, Sanos, Selunic, Witch Hazel.*
- Lab. A. Mironneau, Pharmacien à Chef-Boutonne (Deux-Sèvres). — *Drinal, Glucochaux, Hormiadyne, Sodergyl.*
- Lab. J. Moity, 199, bd Bineau, Neuilly-sur-Seine. — *Aérocyl, Amphostabyl, Antalgyt, Cynefluine, Ionisalt, Léniserum, Panfluine, Pansmacol.*
- Lab. Monal, 13, avenue de Ségur, Paris. — *Boléase, Corosédine, Diurophylline, Globules Romon, Iodolipine, Magnogène, Prostal, Santal Monal au Bleu de méthylène, Santamide, Sulfuryl Monal, Tensédine, Terkal Monal, Trinivérine.*
- Monge-Lavenir**, 90, cours Gambetta, Lyon. — *Sirop Benit, Trypsinan radioactif.*
111. Lab. Monin, 49, rue de Maubeuge, Paris. — *Biostabyl, Cruxol Dépuratif Rob. Lechaux, Elixir Grez, Liqueur de l'Etoile anti-asthmatique, Pilules anti-névralgiques du Dr Cronier, Poudre Blot laxative, Vagostabyl.*
- Lab. Montagu, 10, rue de la Barouillère, Paris. — *Broméine Montagu, Carbalcaloïdes, Carbatropine, Carbosanis, Dragées Hecquel, Génacide, Iodéine Montagu, Lac-Ser, Papier réactif du Génacide, Savons Michon.*
- Lab. V. et G. de Montmorot, 2 et 4, place Gambetta, Paris. — *Subtensène.*
- Lab. Moreau, 13, rue des Nonnains-d'Hyères, Paris. — *Lanceryl, Plaganaze, Plaganol, Trialgine.*
- Lab. Morellet, Bagnoles-de-l'Orne (Orne). — *Bagnolax, Euchol, Sulfur concentré Dax.*
- Lab. Moser et Cie, 8, chem. de Montbrillant, Lyon (Rhône). — *Maltea Moser cristallisée.*
- Lab. Mosnier, 52, rue de la Folle-Regnault, Paris. — *Baume des BÉBés.*

- Lab. **Mothersill Remedy Company**, 5, rue de Provence, Paris. — *Mothersill's Seasick Remedy*.
- Lab. **Moulin**, 50, rue de la République, Puteaux (Seine). — *Aseptone, Bacilactine, Baume Dolora, Benzothymol, Poudre Helvétia, Purgemint granulé, Rhinodol, Sirop Diver au Gaïacol ou au Bromoforme, Uricine* (cachets, solution).
- Lab. **Mouneyrat, D^r Mouneyrat, Prof. Agrégé Faculté de Médecine**, 12, rue du Chemin-Vert, Villeneuve-la-Garenne. — *Histogénol, Vioxyl, Hectine, Hectargyre, Kinectine, Arsénomyl, Olbia, Exobol, Nitrargol, Novamide, Pulmorex, Lysamide, Lysapyrine*.
- Lab. **L.-J. Mounier**, 18, place Laborde, Paris (VIII^e). — *Nestamine, Yaourtine*.
- Lab. **Mouré**, 5 bis, bd des Itallens, Paris. — *Artério-Phan, Crino-serum, Sirop Morlas*.
- Lab. **Mousselon**, 166, bd de la Croix-Rousse, Lyon. — *Euphrénine Baslia*.
- Lab. **du D^r Moustier**, Saint-Vallier (Drôme). — *Pilules du D^r Moustier*.
- Lab. **du Muxagol**, 43, rue de Chartres, Neuilly-sur-Seine. — *Muxagol, Ureinol*.
- Lab. **du Myoral**, 3, r. Saint-Roch, Paris. — *Calcium-Francalcium, Francalcium, Glycosthène, Franlaxol, Myoral*.
- Lab. **Nacher, Pharmacien licencié ès sciences**, 71, bd Carnot, Toulouse. — *Glucoxyl Nacher*.
- Lab. **P. Nadaud**, 31, bd de la Villette, Paris (X^e). — *Sédoplexine, Sédorectal, Toniflux, Ulcérys Berger*.
- Lab. **Nader**, 6, rue de l'Ecole, Versailles. — *Ampoules auto-instillables Nader*.
- Lab. **du D^r Narodetzki**, 19, bd Bonne-Nouvelle, Paris. — *Dermofletol, Elixir Spark, Griponal, Halifletol, Nazophyl Darva, Spyrolides*.
- Lab. **Nativelle**, 27, rue de la Procession, Paris (XV^e). — *Digitaline Nativelle, Natibaine Nativelle, Natirose, Ouabaine Arnaud, Quinicardine*.
- Néoplastex (Thuasne et Cie)**, 71, Fg St-Martin, Paris (X^e). — *Attaches Néoplastex, Bandes, Sangle-Ceinture*.
- Lab. **du Néo-Rhénium**, 82-84, rue de Belleville (XX^e). — *Néo-Rhénium*.

- Société Nestlé**, 6, av. César-Caire, Paris. — *Babeurre en poudre Elédon, Lait en poudre Nestogène, Lait entier acidifié en poudre, Pélargon, Maltose-Dextrine Nestlé.*
- Lab. du Neuréthane**, 41, rue E. Augier Valence (Drôme). — *Neuréthane.*
- Lab. du Neurophoryl**, 187, rue de Créteil, Maisons-Alfort (Seine). — *Bromephra, Gascalobyl, Dolental, Eugesol, Neurophoryl.*
- Lab. Noelline**. Guigamp (C.-du-N.). — *Pommade Noelline, Poudre Noelline, Noelline (Sirop laxatif), Noelline (Savon).*
- Lab. H. Nogués**, 7, r. Galvani, Paris. — *Grains de Vals, Baume maternité, Capsules Nogués, Comprimés Purgos, Néoarsite, Pilules Gip, Poudre Satine, Sirop maternité, Sirop Nogués, Thébaïl, Urémiase.*
- Lab. Nollet**, 47, rue Nollet, Paris (XVII^e). — *Alpilex, Boroformyl, Borosol, Hédusol, Pyrocurool, Végélax.*
- Lab. Norgan**, 21, rue de Madrid, Paris. — *Contracide, Carbo-mucil, Decorpa, Enzypan, Hépamult, Norgangine, Normacol, Profondol, Spasmacol.*
- Lab. Nova**, 61, av. de Saxe, Paris. — *Mistol.*
- Lab. du Novigol**, 24, rue de Lesson, Rochefort-sur-Mer (Ch.-Inf.). — *Novigol.*
- Lab. Novita**, Reichshoffen (Bas-Rhin). — *Fletyol.*
- Lab. des Nutriments**, 34 rue Pigalle, Paris. — *Bioradyl, Hépatosuc, Hippohémo, Traitement complet nutriment.*
- Lab. Oberlin**, 17, rue Cadet, Paris. — *Aliment Tinardon, Analgénine, Baume Oberlin, Biodynamine, Capsules grises Cabanès, Ferropéptone Oberlin, Gastrocalcine, Gouttes Linober, Granulé Tinardon, Gynaicéol, Hamamélode, Iode Oberlin, Juvéol, Lactosone, Panbromine, Pectine Oberlin, Rob Cabanès, Rob Oberlin, Santal Oberlin, Santal Salolé Cabanès, Savon iodé Oberlin, Sirop Tinardon, Suppositoires Cabanès, Uraséol.*
- O. C. P.**, 108, r. de Picpus, Paris. — *Lait de magnésie Phillips, Pâte dentifrice Phillips.*
- Lab. Odilia**, 42, rue du Mont-Cenis, Paris. — *Gynopausine, Inolène (simple, thymolé), ovules à l'Inolène, pommade à l'Inolène, poudre à l'Inolène, Nasolène, Sedofolline.*
- Lab. Odinot**, 21, r. Violet, Paris. — *Calciline, Gastro-Sodine, Néocalciline, Pluribiase, Sel digestif Bé Mé Cé, Solderm.*
- Lab. de l'Oliphédrol**, 25, bd Edgar-Quinet, Colombes. — *AS, I. P., Oliphédrol, Oliphédrol BB, Quintozone.*

- Lab. J. Olive**, 14, rue des Minimes, Paris. — *Normogastryl*, *Plasmosthène*, *Trisalyl*, *Baume Trisalyl*.
- Lab. Olivéol-Hépaticol-Etiévant** (Ed. Brun), La Demi-Lune (Rhône). — *Hépaticol*, *Oléol*, *Olivéol*, *Vasocônes*, *Vasoconstrictine*.
- Lab. Oliviéro**, Boulogne-sur-Seine. — *Algotérine*, *Biocéane*, *Cytomagnésium*, *Hépatine Gad*, *Hétérolysine*, *Méga-thion*, *Sérum de cheval Oliviéro*.
- Lab. Omnither**, 33, rue Barthou, Angoulême (Charente) — *Suprasthényl*.
- Lab. de l'Opocalcium** (A. Ranson), 96, r. Orfila, Paris. — *Anaclasine*, *Anaclasine Infantile*, *Opocalcium*, *Opo-ferrine vitaminée*.
- Lab. Opos**, 33, r. Rempart-Matabiau, Toulouse. — *Aubetiode*, *Colibyl*, *Coliseptine*, *Oponergyl*, *Oposséine*, *Rhumofan*, *Septisan*.
- Lab. Moderne d'Opothérapie et Biologie médicale**, 40, rue Claire-Paulhac, Toulouse. — *Complexe Ovarien Galdo*, *Glandocalcyl*, *Hépatozyl Galdo*, *Nucléophorène*, *Sclé-rosérol*, *Veinoposine*.
- Lab. de l'Orcalcine**, 9, r. de la Platière, Lyon. — *Gouttes Iodopan*, *Gouttes Yseult*, *Orcalcine*, *Procolyl*, *Progaster*.
- Lab. Orrillard**, 245, rue de Vaugirard, Paris. — *Papaveryl*, *Paxol*, *Sédoparine*, *Surpaver*.
- Lab. de l'Ossyl**, Dr F. Vasseur, Glageon (Nord). — *Ossyl*.
- Lab. de l'Ostréiode**, 344, bd de la Plage, Arcachon (Gironde). — *Ostréiode*, *Ostréiode injectable*.
- Lab. d'Oxyaminothérapie**, 13, rue Pavée, Paris. — *Okamine cystéinée*, *Okamine dragées*, *Okamine simple*.
- Lab. de l'Oxyplastine**, 78, av. de Saint-Ouen, Paris. — *Oxy-plastine*.
- Lab. de l'Ozol**, 6, pl. des Ternes, Paris. — *Arg-Eph*, *Hyol*, *Ozol*, *Ozolase*.
- Lab. Ozothine**, 4, chaussée de la muette, Paris (XVI°). — *Ozothine*.
- Lab. Pachaut**, voir : Lab. Thomas, 33, faubourg Montmartre, Paris.
- Lab. R. Paméla**, 85, rue Turbigo, Paris (III°). — *Blagny* (dragées, gouttes, sirop), *Vitarsenic* (dragées).
- Société du Pampryl**, Nuits-St-Georges (Côte-d'Or), et 149, rue du Port-de-Bercy, Paris (XII°). — *Pampryl*, *Jus de raisin*.

- Lab. de la Pancréatose Idon, Jean Brevière, successeur, D^r en Pharmacie, 89, r. St-Georges, Nancy.** — *Pancréatose Idon (poudre, cachets, granulé), Poudre Cosy.*
- Pansements Prima, 3, rue des Reculettes, Paris (XIII^e).** — *Bande Mérinos-Bébé, Bio-Titane-Prima, Crêpe Eglanos, Multiplast, Plasmo-Prima, Prima-Furoncles, Primaplast, Prima-Steril, Primatex, Sticplast.*
- Pansements Ruby, Voiron (Isère).** — *Bande Presto, Résolutif Ruby, Tulle gras Ruby stérilisé.*
- Lab. du Papier Eymonnet, 14, Grande-Rue, Pont-de-Vaux (Ain).** — *Papier Iodogène Eymonnet, Rhumacrescol.*
- Lab. du Paragerm, 151, av. de Neuilly, Neuilly-sur-Seine.** — *Paragerm.*
- Lab. du Paraïode, 23, rue Doudeauville, Paris.** — *Ovules au Paraïode, Paraïode.*
- Lab. de la Paralgine, 9, rue Saint-Ferdinand, Paris.** — *Paralgine.*
- Lab. Parét, 28, r. Guibal, Marseille.** — *Azym, Cellules Paret, Fixase et Fixase irradiée.*
- Lab. A. Paris, 4, rue de La Motte-Picquet, Paris.** — *Hémophagosthyl, Lactolaxine, Oxydothyryne, Oxydovarine, Phagosthyl, Phagosthyl Mangané.*
- Lab. du Parolagar, 10-12, rue de Strasbourg, Paris.** — *Parolagar.*
- Lab. des Prod. Paterson (G. et M. Armingeat), 46, rue de Saintonge, Paris.** — *Poudre Paterson, Pastilles Paterson.*
- Lab. de Pathologie générale, 5, r. François-Ponsard, Paris.** — *Néopancarpine, Rhinofluine, Vaso-neurine.*
- Lab. Pautauberge, 10, rue de Constantinople, Paris.** — *Broncurool, Dragées Pautauberge, Gaïacol Pautauberge, Kolarsine Pautauberge, Solution Pautauberge, Suppositoires Pautauberge (Adultes et Enfants).*
- Lab. du Pectosédyl, 24, rue de Meaux, Paris (XIX^e).** — *Pectosédyl.*
- Lab. Pépin et Leboucq, 30, rue Armand-Silvestre, Courbevoie.** — *Bromogénol, Gaurol, Guethural, Iodogénol, Saburase, Vaccin R. N.*
- Lab. du Pepticol, 13, av. du Maréchal-Foch, Dammarie-les-Lys (S.-et-M.).** — *Pepticol.*
- Lab. du Percalcium, A. Jourdin, 6 av. Victor-Hugo, Paris.** — *Percalcium.*
- Lab. Perrier, 12, rue Henner, Paris (IX^e).** — *Convalbaine, Scillitrine, Théocalciode.*
- Lab. Perrin, 11, quai Saint-Clair, Lyon.** — *Guitose, Hémocantitoxine Sofos, Sulfarsiode, Virmonal.*
- Lab. H. Perrin, 55, rue Auguste-Comte, Lyon.** — *Lactoler, Linicaïne, Pancrepeptal.*

Lab. Perrochon, Tours (I.-et-L.). — *Eurectol*, *Grains d'Évian*, *Pulmocardine* (simple et éphédrinée), *Rénocardine*.

Lab. Perroud, 163, bd de la Croix-Rousse, Lyon. — *Lénigastre*, *Tablettes Perroud*.

Lab. J.-P. Petit, 72, bd Davout, Paris (XX^e). — *Neurotensyl*, *Sojaminol*.

Lab. Pharmaceutiques du Rhône (P. Guély, D^r en Pharmacie).
— 16, cours Gambetta, Lyon. — *Bronchosédoi*, *Glutines Chabre* (KI ou Na), *Migrainol*, *Phosphobiol*,
Poudre Beau chloroformée ou Ether.

Pharmacie anglaise des Champs-Élysées, 62, av. des Champs-Élysées, Paris. — *Emerson's Bromo Seltzer*, *Hazellium*, *Isocollium*, *Maté Douglas*, *Thermasefine*.

Pharmacie Biologique, G. Combastel, F. Rischshoffer, S^r, 57, r. Mathurin-Régnier, et 47, rue Bargue, Paris. — *Panostyl*, *Vaccinothérapie Atoxique Cépède*.

Pharmacie Centrale de Belgique, 12, rue du Téléphone, Bruxelles. — *Carbobel*, *Digitabiline* (Gouttes et Pilules), *Hypersan*, *Iophénal*, *Névrosan*, *Vitamorrhaine* (granulés, perles et pommade).

Pharmacie Centrale de France, 25, bd Beaumarchais, Paris. — *Adrénaline Invar*, *Grêpe Velpeau*, *Digitatine Invar*, *Pyroléol Edst*, *Théobromine Invar*, *Vegéphos*.

Lab. de Pharmacologie appliquée, rue Frédéric-Chevillon, Allauch (B.-du-R.). — *Amido-Septine*, *Biotone*, *Cynabiline*, *Fluase*.

Lab. de Pharmacologie générale (Vial et Cie), Spécialités Pharmaceutiques, 8, rue Vivienne, Paris. — *Apioline Chapoteaut*, *Cardiosthénine*, *Cigarettes indiennes de Grimault*, *Crysol*, *Cytobaume*, *Delbiase*, *Delbosel*, *Farine maltée Vial*, *Guarana purifié de Grimault*, *Morhuol Chapoteaut*, *Ortholaxine*, *Pharynxol*, *Phénédrine*, *Quinine Pelletier*, *Santal Midy*, *Sédoprostyl*, *Sirop Lagasse*, *Sirop phénique Vial*, *Sirop de Raifort iodé de Grimault*, *Vin et poudre de Peptone de Chapoteaut*, *Vin et sirop de Dusart*.

Lab. Phéna, Boîte postale n° 5, Limoges (Haute-Vienne). — *Ovules Phéna*, *Phéna*.

Lab. Philbert, 6, av. Mirabeau, Nice. — *Blüyl*, *Néovaryl*.

Lab. Philippe, 5, rue Mazard, Lyon. — *Fluidbos Moyet*, *Likan asiatique*, *Orexyl*, *Phosocytol*.

Produits du D^r Philippe, 36, quai de Fulchiron, Lyon. — *Ampoules Lémery*, *Antidote-Malaria*, *Capsules Henry*, *Gariouches Lémery*, *Gouttes Scandinaves*, *Kérasalicyl*, *Kéraspirine* (Aspirine kératinisée), *Pilules Philippe Bromure*, *Pilules Philippe Harlem*, *Pilules Philippe Ki ou Nai*, *Pilules Lémery*, *Pilules Philippe Pancréatine*, *Santal Henry*, *Septichrome*, *Suppositoires Lémery*.

Lab. Phosma, M. Frémont, 143, Cours de la Somme, Bordeaux. — *Entérargol*, *Phosma*, *Stomagyl*.

- Lab. Hygiène**, 7, rue Lucien-Jeannin, La Garenne (Seine). — *Coluval*, *Hormantoxone*, *Lansoyl* (liquide et gelée), *Pineoleum*, *Quinolax*, *Salsanos*, *Saproxyl*.
- Lab. Physia**, 9, rue Chaptal, Levallois-Perret. — *Exubyle*, *Hémorex*, *Venapressine*.
- Lab. de Physiologie du Puits-d'Angle**, Le Chesnay (S.-et-O.). — *Dyspeptine* Hepp.
- Lab. de Physiologie et de Thérapeutique**, 10, rue de Strasbourg, Paris (X^e). — *Atural*, *Microlyse*, *Natura*.
- Lab. de Phytothérapie de Paris**, 113, bd Voltaire, Paris. — *Amipyrine*, *Ballotyl*, *Mandragol*, *Polycine*.
- Lab. de Phytothérapie Expérimentale**, 61, bd Malesherbes, Paris. — *Hygiocholine*, *Neurogalène*, *Phlebocratyl*.
- Lab. Pialoux**, 55, r. de Chabrol, Paris. — *Airoglyce*, *Bengouté*, *Cédro-Méthyle*, *Chlorurol*, *Dynamoferol*, *Hépaturyl*, *Iodoplume*, *Maniodhamamélis*, *Rectocalm*.
- Lab. Picot**, 14, rue du Temple, Calais (P.-de-C.). — *Anervol*, *Mons*, *Angivore*, *Anthraxivore*, *Buccaniz*, *Cicafer*, *Dinacode*, *Gastrophyle*, *Hémofluidine*, *Hémovitase*, *Hépatosol*, *Métrivore*, *Otinol*, *Pectokid*, *Phostonine*, *Pluriphos*, *Pulmocalm*, *Rhinol*, *Théobrophos*.
- Lab. du D^r Pillet**, 222, bd Péreire, Paris. — *Anti-urique de Contrexéville*, *Beef Lavoix*, *Hygiodine*, *Neo-Coccyll*, *Neo-Salyl* (ex-Sodisalyne).
- Lab. Pillier**, 8-10, rue Masséna, Nice. — *Laxior*, *Sanex-Inhalant*.
- Lab. du D^r Pinard**, 90, bd St-Denis, Courbevoie. — *Phosphates du D^r Pinard*, *Calcigénol*, *Halocalcion*.
- Lab. M. Pinguet**, 38, rue de la République, Montluçon (Allier). — *Quinti-Suppos*.
- Lab. Plagnol**, 18, r. du Maréchal-Foch, Versailles. — *Boldine Plagnol*, *Gaïacamphre*, *Nasylum Blondin*, *Van Sol* (cachets).
- M. Planchard**, 27, bd Henri-IV, Paris. — *Poudre Zeden*.
- Lab. du D^r Plantier**, Annonay (Ardèche). — *Hémopanbiline*, *Panbiline*, *Rectopanbiline*.
- Lab. J. Plé**, 111 bis, rue de Turenne, Paris. — *Calcium-Plé*, *Diurélax*, *Histamyl*, *Phytosplénol Plé*, *Phyto-Vitamines Plé*.
- Lab. Pointet et Girard**, 30, rue des Francs-Bourgeois, Paris. — *Goudroline*, *Hépatodiagnose*, *Novismuth*, *Oxydrol*, *Prophylargyl*, *Soporalose*, *Vitargyl*.
- Produits Polypharma. Concessionnaire** : L. Brun, pharmacien, 92, rue Bobillot, Paris (13^e). — *Artrocolchine C*, *Atens*, *Cuproxil*, *Nesal*.
- Lab. de la Polyveinine** 152, Côte Pavé, Toulouse. — *Polyvetnine*.

- Lab. Pompanon**, 62, rue du Cardinal-Lemoine, Paris. — *Sulfureux Pouillet*.
- Lab. Porcher**, 35, rue des Blancs-Manteaux, Paris. — *Angusturyl Porcher, Dermacide Porcher, Eczéda, Ectosec Porcher*.
- Lab. Porsin**, 39, rue Claude-Bernard, Paris. — *Apivène*.
- Lab. du Praticien**, Hussigny-Godbrange (M.-et-M.). — *Angihormol, Axyol, Bioxyol, Dialol, Exsugyl, Minurex, Oxythyol, Thioxyol, Traitement Ambulatoire*.
- Lab. D. Prigniau**, 52, rue des Cinq-Diamants, Paris (XIII^e). — *Glyphéranol, Merкуро-Past*.
- Lab. Probios**, 8, r. St-Martin, Paris (IV^e). — *Amiflorine, Azama, Bioserum, Camphrolyse, Comprimés Probios (antipyrétiques, voies respiratoires, intestinal), Dentifrice Probios, Diorine, Dogastro, Germinol, Hypotensa, Kao-Carbo, Embryona, Florix, Granules de Bourget, Hepationa, Intesto, Obsor, Onogo, Ovules Oape, Ovules Probios, Pépione, Pommade Probios, Provulsif Probios, Sedabios et Suppos. Sedabios, Sirop Pectonax, Spasa, Triano, Vaccinothérapie Probios*.
- Lab. Procham**, 8, bd de Cessole, Nice (A.-M.). — *Gouttes B. O. P.*
- Lab. des Produits Biologiques I. M. (S. Savigneux, pharmacien)**, 18, Cours Suchet, Lyon. — *Séro-Comprimés, Sérolactyl, Séro-liquide*.
- Lab. des Produits Dermiques R. P., La Roche-Posay (Vienne)**. — *Lotion Blanche R. P., Pâte à l'Eau R. P., Roche-Posay (produits), Sels de Bains R. P.*
- Soc. des Produits du Maïs**, 29, rue de Berri, Paris. — *Dextrosol, Dextroport, Maïzena*.
- Lab. Progil**, 10, quai de Serin, Lyon (Rhône) et 6, rue du Pont, Ris-Orangis (S.-et-O.). — *Diasés, Maltogil*.
- Le Progrès Scientifique**, 25, bd Latour-Maubourg, Paris (VII^e). — *Chlorammonie, Demalgon, Neutracétyl, Neutracétyl chocolaté, Novurit, Rubrophène, Strychnotonine, Synthéma, Valovosan*.
- Lab. L. Prothière**, 55, rue Auguste-Comte, Lyon. — *Fucosine*.
- Lab. Prunier** 4, rue de la Coutellerie, Paris. — *Comprimés Vichy-Etat, Neurosine Prunier*.
- Lab. du Pugetol**, 19, rue de Pontevès, Marseille. — *Boldolive, Dermolive, Sulfolive, Suppolive*.
- Lab. Py**, 58, bd Richard-Wallace, Puteaux. — *Lotion Py*.
- Lab. de la Pyodolysine (F. Martin, pharmacien)**, 2, rue des Trois-Mages, Marseille (B.-du-R.). — *Pyodolysine, Sédo-Bronchol, Thymoseptyl*.

- Lab. du Quassinol, J. Olive, pharmacien, 73, bd Baille et 109, rue de Lodi, Marseille.** — *Gouttes Quassinol.*
- Lab. Quesneville, L. Colleson, 5, r. d'Angoulême, Paris.** — *Grème de Bismuth du D^r Quesneville, Crème de Bismuth Chl. magnésienne (ou Ma-bis-cal), Cupro-Salyl du D^r Quesneville.*
- Lab. Quies, 8, rue Auguste-Chabrières, Paris (XV^e).** — *Boules Quies.*
- Lab. du Quina Baron, 3, pl. de la Miséricorde, Lyon.** — *Quina Baron.*
- Lab. du Quina Bourcet, 7, avenue du Doyenné, Lyon.** — *Bain de Bouche du D^r A. Boll, Bronchial Luna, Quina Bourcet, Thiobyl Bourcet.*
- Lab. Quinet, 143, r. du Temple, Paris.** — *Phosol, Quinobore.*
- Lab. du Quinsal (F. Bolla), 34, rue Thiers, Gray (Hte-Saône).** — *Crème Stéar, Poudre Stéar, Quinsal, Sirop Bolla.*
- Lab. Quiret, 21, pl. du Maréchal-Pétain, Béthune (P.-de-C.).** — *Laxaseptol, Ostricalcium, Pipéritol.*
-
- Lab. Raby, pl. de la Comète, Asnières.** — *Biliase Raby, Neuristol, Uricural.*
- Lab. du Radio-Baryx, 1, rue de Paris, Limours (S.-et-O.).** — *Baryx-Colloïdal, Radio-Baryx.*
- Agence Générale des Produits Rafax, 4, rue Boulard, Paris (XIV^e).** — *Baume Rafax.*
- Lab. Ranque et Senez, 16, rue Dragon, Marseille.** — *Vaccins bactériens I. O. D., Phylaxines.*
- Lab. D. Raquet, 114, rue Solférino, Lille.** — *Cavéform, Kélédol et Suppo-Kélédol.*
- Lab. Y. Ravalec, Pharmacien, rue Nouvelle, Villard-de-Lans (Isère).** — *Bellasodine, Carboquinol.*
- Lab. R. B. D., 35, rue Christophe-Colomb, Lille (Nord), D^r J. Willot, pharmacien.** — *Babysanine, Cutisanine.*
- G. Reaumbourg et C^{ie}, 115, rue de Paris, Boulogne-sur-Seine.** — *Agarase, Passicarbonate, Passiflorine, Néo-Passiflorine, Silguine.*
- Lab. Reboul, 62, av. de Paris, Villejuif (Seine).** — *Anuidol, Bituyol, Cardiobromine, Cholagol, Citratægus, Créosuppo-campbre, Ergostol Violet, Péruvicol, Sanocure, Sulfamido-Suppo, Tanode, Tonibronchique, Uribiline.*
- Lab. Regagnon et Cie, 276, rue Lecourbe, Paris (XV^e).** — *Amborhinol, Bicolyre, Bronchosédyl, Energésine, Sédoplasme, Sedorhinol.*

- Lab. **M. Reinhold**, 20, rue de Rivoli, Paris (IV^e). — *Hébéol*.
- Lab. **Reivilo**, 191, fg Saint-Antoine, Paris (XI^e). — *Digex*.
- Lab. **Remeaud**, 38, av. J.-B.-Clément, Boulogne-sur-Seine. — *Kluchol Remeaud*.
- Lab. **Renard**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Algane*, *Crypthiol*, *Pneumogéine*.
- Lab. **Renard et Cie**, 35, rue de Paris, Clichy (Seine). — *Gaduamine*.
- Lab. **du D^r Renaud**, 2, pl. de la Duchesse-Anne, Nantes. — *Cupro-Glycol*, *Ampoules Cardio-camphre simple et sparteiné*, *Elixir Phospho-Mel*, *Hyper-Sérum Nac*, *Suppabaïne*.
- Dépôt général **Rendell**, 61, rue Damrémont, Paris (XVIII^e). — *Cônes solubles antiseptiques Rendell*.
- Lab. **Ch. Requis**, 163, bd Croix-Rousse, Lyon. — *Antidiabétique Requis*.
- Lab. **Revel**, 34, rue St-Lazare, Paris. — *Iodonesyl*.
- Lab. **Rey**, 12, rue Montmartre, Dijon (Côte-d'Or). — *Casol F. Rey*, *Ludin*, *Pommade Crème Ludin*, *Puéricrine Rey*, *Sericrine Rey*, *Seroma Rey*.
- Lab. **Reygagne**, 160, avenue d'Italie, Paris (XIII^e). — *Actitonic liquide*, *Ampoules Anti-H*, *Bioélixir*, *Bio-organic*, *Collutoire Collargent*, *Comprimés Arthrocrinol*, *Comprimés Broncho-Organic*, *Comprimés Laxocrinol*, *Néo-Bioélixir*, *Poudre Anti-H*.
- Lab. **Rhemda**, 51, rue d'Alsace, Courbevoie (Seine). — *Boues radioactives Rhemda*, *Bougies radioactives Rhemda*, *Dermathorium*, *Mésothine*, *Mésothorium Rhemda*, *Radiovules Rhemda*, *Radiargyl*, *Radiomagnésium*, *Thorix (Thorium X Rhemda)*.
- Lab. **Rhinophta**, 82, rue de la Croix-Verte, Albi (Tarn). — *Produits Orhino*, *Tubes Ferlux Ratio*.
- Lab. **Ricardou et Cie**, 46, r. Pierre-Charron, Paris (VIII^e). — *Antibilieux Fuzor*, *Dentoline*, *Innerclean*, *Phospharsol*, *Spécialités de Brides*, *Sylvol*.
- Lab. **M. Richard**, Aubenas (Ardèche). — *Desintex*, *Gastri-lène*, *Gripposédine*, *Neurosthénol*, *Péruglan*, *Phosphan-tyl*, *Rhinalène*.
- Lab. **Richer**, 45, fg St-Denis, Paris. — *Adrogestill*, *Carbogé-nase*, *Chlorothymol*, *Colpophile*, *Comprimés et Cachets Salvé*, *Embrocation Richer*, *Florhépatine*, *Gynométine*, *Kolarsan*, *Lactodiastal*, *Mictophile*, *Morucalcose*, *Néopulmine*, *Neuraxial*, *Noviodal*, *Nucléarsan*, *Oxnol*, *Paraveinine*, *Salvébyl*, *Stavafer*, *Vixol*.
- Lab. **Richomme**, 29, bd Voltaire, Paris. — *Cachets du D^r Ri-chomme*.
- Lab. **Richou**, 39, r. Taitbout, Paris. — *Gotiro*, *Ovules Phyto-vules*, *Ulréma*.

- Lab. Ringeade, Pharmacien, Fosseboudeau-Blaye (Gironde).** — *Penghawar des Iles.*
- Lab. Rissa, 46, rue Claude-Lorrain, Lille.** — *Calci-Osteline, Glucose D, Iodex, Osteline, Ostomalt.*
- Lab. M. de Rive, 11 bis et 13, rue Levert, Paris (XX^e).** — *Aérocyl, Antalgy, Aurixéma, Biodarcine, Calyptophédryl, Collargophédrine, Collucrômex, Ephédrivaine, Ephédrocure, Héparita, Minervol, Pulvo-Collargophédrine, Pulvo-Ephédrocure, Soluphédrine, Strongénol.*
- Lab. H. Rivier, 10, passage Morel, Montrouge (Seine).** — *Anégrine, Ascoléine Rivier, Dragées Pierlot, Séro-sérum Rivier, Valérianate Pierlot.*
- Phar. J. Robert (J. Boudier, succ.), 37, rue de Bourgogne, Paris.** — *Aminophylline Boudier, Bylyxyl, Hémocalciopectine, Extrait Bile Boudier, Tonique Boudier, Veinosan.*
- Lab. Robert, place des Halles, Niort.** — *Antiseptoma, Cardirène, Robrodyne.*
- Lab. Robert et Carrière, 1, av. de Villars, Paris.** — *Bacté-Intesti-Phage, Bacté-Goli-Phage, Bacté-Pyo-Phage, Bacté-Staphy-Phage, Bacté-Rhino-Phage, Biocholine, Biomucine, Carbotex, Endocarbonate Ercé, Entéromucine, Erцерhinol, Hémostatique Ercé, Lysacrème L. M. L., Lysaxins L. M. L., Pantamine, Stannoxy, Vaccin de Weill et Dufourt.*
- Lab. Robia, M. Robillart, pharmacien, 33-35, rue Faidherbe, Lille.** — *Cardior, Fémidol.*
- Lab. Robin, 13, rue de Poissy, Paris (V^e).** — *Bismuthoidol Robin, Bromone Robin, Camphydryl Robin, Camphydryl spartéiné, Camphydryl strychno-spartéiné, Glycérophosphate Robin, Iodone Robin, Nucléarsitol, Nucléatol, Parulcine, Pâte Robin, Peptonate de fer Robin, Peptokola Robin, Sirop Robin, Strychnarsitol Robin, Sulfotdol Robin, Tablettes Sédatives Robin, Thiocutol Robin, Thiofène Robin, Voltargol.*
- Lab. Robinet, Moret-sur-Loing (S.-et-M.).** — *Magnésotud's Robinet.*
- Lab. Roche, Pharmacien, 9, r. de la Platière, Lyon.** — *Iolopan, Oralcine, Procolyl, Progaster, Yseult.*
- Lab. Ch. Roche, 2, rue Michelet, Alger.** — *Cocadretne, Ioglott, Ovules Résolis, Pantokinon, Perles Ferro-Vitales, Salinaglut, Solicitud, Thalassol, Urticid, Urtiplaste.*
- Lab. Rochereau, Salbris (L.-et-C.).** — *Dolysine.*
- Pharmacie Rogé Cavaillès, M. Lachartre, Docteur en Pharmacie, succ., 116, bd Haussmann, Paris.** — *Anoïde, Elixir iodépuratif Pépin, Pepsinacid, Phytovéinol, Suppositoires Rocav.*
- Lab. Rogerma, rue des Jardins, Lens (Pas-de-Calais).** — *Histogerma, Nevrosol, Rogerma.*

- Lab. Henry Rogier**, 56, bd Pereire, Paris. — *Baume Delacour*, *Kymosine Rogier*, *Suppositoires Peper*, *Ura-septine Rogier*, *Valbornine Rogier*, *Vitamine Rogier*.
- Lab. Albert Rolland**, 4, rue Platon, Paris (XV^e). — *Hépa-phos*, *Hépatrol*, *Hepbi*, *Micelliode*, *Octensanol*, *Stomarov*.
- Lab. du Docteur Pierre Rolland**. Dépôt : 127, bd St-Michel, Paris (V^e). — *Balmiga*, *Hypalène*, *Hypalène Mal de Mer*, *Hypalène obstétrical*, *Natrosyl*.
- Lab. du Dr Pierre Rolland et Duret et Rémy réunis**, 15, rue des Champs, Asnières (Seine). — *Bis-Ka-Ma*, *Choléo-kinase*, *Comprimés d'Alibour*, *Cystocone*, *Hépatoso-dine*, *Histropa*, *Nobial*, *Nyctal*, *Pelvisedyl*, *Peptonal*, *Polypeptonal*, *Pyroclase*, *Quinobrome*, *Saturol*, *Sero-quinol*, *Thaolaxine*, *Tussédyl*, *Zoocytine*.
- Lab. Romon**, 11 ter, av. de Ségur, Paris. — *Ampoules Romon*, *Globules Romon*, *Limital*, *Magnogène*, *Tranquital*.
- Étab. Roques**, 36, rue Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris. — *Delcaine Roques*.
- Lab. Rosa**, 11, r. Roger-Bacon, Paris, XVII^e. — *Chophytol Rosa cristallisé* (ampoules injectables de 5 cc.), *Chophytol gouttes*, *Chophytol dragées*, *Cynurool Rosa* (dragées). *Rosalax* (pilules).
- Lab. des Produits biochimiques Rosso**, 3, rue Lamblardie, Paris. — *Biophényl*, *Calcium Rosso*, *Calminal*, *Camphogénine*, *Embrocation Rosso*, *Gaïacoline*, *Glucobiocalcium*, *Hormosthényl*, *Lactiphage*, *Magnésium Rosso*, *Saccharol Rosso*, *Valéroquinquina*.
- Lab. L. Rouanet**, 48, rue de la République, Antibes (A.-M.). — *Apiol Tanit*, *Phosphogayol*, *Tisane Tanit*.
- Lab. R. Rougeyrolles**, pl. de la République, Gramat (Lot). — *Septicoline*.
- Lab. du Dr Roure-Guiot**, 23, rue Louis-Astruc, Marseille. — *Bulgalropine*, *Bulgadone*.
- Lab. Rousseau**, 71, av. de Villiers, Paris (XVII^e). — *Rhagadine Bracquemond*.
- Lab. Rousseau**, 49, rue du Château-d'Eau, Paris. — *Bi-Acti-val*, *Gastrobellone*.
- Lab. Rousseau**, 4, rue Gambetta, Sens (Yonne). — *Gouttes Triol*, *Nervyl Rousseau*, *Panchol-Sel*.
- Pharmacie Roussel**, 10, rue Washington, Paris. — *Élixir Tonicardiaque Roussel*, *Sirop et Gouttes au Nitrile de Soude Roussel*, *Tétranirol Roussel*, *Trinitrine Roussel*.
- Lab. du Dr Roussel**, 97, r. de Vaugirard, Paris (VI^e). — *Angioxyl*, *Bronchivax*, *Colivax*, *Coqueluvax*, *Damicol*, *Disonyl*, *Gravidostyl*, *Hémostyl*, *Hépagyl*, *Hormone Gonadotrope*, *Insulanol*, *Insutyl*, *Insutyl-Retard*, *Microgel*, *Proxylol*, *Sérum Polyvalent de Leclainche et Vallée*, *Suiseryl*, *Trephonyl*.
- Lab. du Dr Roussel**, 89, r. du Cherche-Midi, Paris (VI^e). — *Acéto-Sterandryl*, *Benzo-Gynœstryl*, *Benzo-Gynœs-tryl 5*, *Bivatol*, *Casaldyl*, *Collubiazol*, *Ectiazol*, *Ecto*.

Gynœstryl, *Ecto-Stérandryl*, *Gynœstryl*, *Isonal*, *Lutogyl*, *Opodermyl*, *Phytogyl*, *Pyoformine*, *Renoxy*, *Rubiaderm*, *Rubiazol*, *Sedo-Gynœstryl*, *Sirop laxatif Gobey*, *Sirop pectoral Gobey*, *Sirop sédatif Gobey*, *Stérandryl*, *Sterogyl*, *Stérogyl 10*, *Stérogyl 15*, *Syncortyl*, *Uroformine Gobey*.

Lab. **R. Roussel**, 72, Grande-Rue, Flers (Orne). — *Bromophène*, *Hémorroïdyl*, *Paidol*, *Plasmatol*, *Prurilyse*.

Lab. **Routier**, 20, rue St-Lazare, Paris. — *Baume Duret*.

Lab. **M.-A. Roux (M. A. R.)**, 58, rue de Maubeuge, Paris. — *Antiseptique Nénita*, *Armosine*, *Bili-Magnétol*, *Entéroglandex*, *Gastronaldine*, *Glandex*, *Gutturyl*, *Kaolovules*, *Phlogogyne*, *Phlogovules*, *Purgelettes Roux*, *Sirop Iodacônit*, *Stechovules*, *Sulhyp*, *Totaliode*, *Urtlar Blanc Bleu*, *Urimagnétol*.

Lab. **Roux**, 60, route de Châtillon, Malakoff. — *Ricilax*, *Sédosalyl*, *Miroxyl*, *Trachédrine*, *Cinalose*.

Lab. **Émile Roux**, 26, rue des Petits-Champs, Paris. — *Thiopon*.

Lab. **Roy**, 29, av. Charras, Clermont-Ferrand. — *Ferydal*, *Spécifique Mignard*, *Sulfocalcyl*.

Lab. **Royannais**, 17, rue Bodin, Lyon. — *Hépaté 5*.

Lab. de Biol. Appl. **G. Roze**, 2, allées de Chelles, Le Raincy (S.-et-O.). — *Iode colloïdal Roze*, *Bismogyre*, *Marramélis*, *Philhepar*, *Rhinarsenol*, *Sirop Seillon*.

Lab. **G. Rozé**, 16, Rond-Point de la Station, Le Raincy (S.-et-O.). — *Hépatocurcumine*.

Lab. du Dr **Ruin**, 10, rue du Bloc, Amiens. — *Energine iodée de Berck*, *Energine phosphorée de Berck*.

Lab. **Sabatier**, 10, rue René-Bazin, Paris (XVI^e). — *Fluodyle*, *Ouataplasme Dr Langlebert*.

Lab. **Salantale**, 42, Grandes-Arcades, Strasbourg. — *Vaccins Salantale* : *Auriculo*, *Gysto*, *Gingivo*, *Ophthalmo*, *Oto*, *Ovules*, *Pommade*, *Recto*, *Rhino*, *Suppo*, *Tracho Salantale*.
Tubes Strana : *Pommades ophtalmiques*.

Lab. du **Salibra**, 1, rue des Jardins, Asnières (Seine). — *Salibra*.

Établ. **Thermal de Salies-du-Salat** (Haute-Garonne). — *Eaux-Mères*.

Lab. du **Salysfrène**, 17, avenue de la Capelette, Marseille. — *frène*.

- Lab. Sanarteryl**, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl, Sedhepatine.*
- Lab. Sanavita**, 7, r. Fontaine-Delsaux, Lille. — *Bevita, Viredox.*
- Prod. Sandoz**, 20, r. Vernier, Paris (XVII^e). — *Allisatine, Basergine, Baume-Panthéste, Belladéal, Bellafoline, Bellergal, Calcibronat, « Calcium-Sandoz », Calgluquine (ex-Quinine-Calcium Sandoz), Digilanide, Félamine, Gynergène, Ipécopan, Lobéline, Néo-Gynergène, Optalidon, « Quinine-Calcium-Sandoz », Raphabil, Sandoptal, Scillarène.*
- Lab. de la Santhéose**, 4, rue du Roi-de-Sicile, Paris. — *Santhéose.*
- Lab. du Sapolinol**, cours Richard-Vitton, Lyon. — *Capsules Atlanta, Comprimés Aminase, Crème à raser Driana, Sapolinol (crème, dentifrice, ovules, pains), Sapolinol Hôpital, Sapolinol normal, Sapolinol toilette, Drianol Savon liquide, Ionoscope Sinclair, Pommade Sinclair « A », Pommade Sinclair « B ».*
- Lab. Saporex**, 184, route de Genas, Lyon. — *Barytol, Bloc Saporex (Savon solide), Dentifrice Saporex, Baume Saporex, Révulsif Saporex, Ovules Saporex, Tot' Harlem, Saporex (liquide).*
- Lab. Saporta**, 59, bd Lefebvre, Paris (XV^e). — *Embrocan. Térébane.*
- Lab. du Sarcoptol**, 177, rue de Courcelles, Paris. — *Sarcoptol.*
- Lab. de Thérapeutique Antirhumatismale Sarein**, 14, avenue Perrihont, Paris. — *Baume Sarein, Entérosalicyl, Glucosalyl, Histalgine, Sulfosalyl, Sulfiode.*
- Lab. Sassé**, 78, bd Beaumarchais, Paris. — *Cacospermine. Dercusan, Dermose anti-impétigineuse, Enteroseptyl. Rinoleina, Sanalepsi Russi.*
- Lab. Saudemont**, Grenay (P.-de-C.). — *Atrobyl, Biosurgon.*
- Lab. Saugier**, Dôle (Jura). — *Bronchasmine, Diuréphédrine Ephédrasmine, Garéphédrine.*
- Lab. Saunier**, 35, av. de Versailles, Paris (XVI^e). — *Baume Gélulol, Cachets Saunier, Hédozeptol, Libérase.*
- Lab. Sauze**, 60, rue Jean-Jaurès, Firminy (Loire). — *Euquinargol, Ultraformine B et S.*
- Lab. Roger Savoie**, 2 et 4, place St-Martin, Vendôme (L.-et-Ch.). — *Eulaxol, Phytocytol, Psoryl, Pyocoline.*
- Lab. Henri Schéhadé**, 9, impasse Thoréton, Paris (XV^e). — *Actimaryl, Alcatensyl, Arthrilyse, Arthrôn, Asthmasédine, Bergamol, Capsorhinol, Comprimés A. R., Euvagol, Normalax (pur et au Cascara), Oléorhinol, Ova-Grine, Rhinédrine, Néoboldine.*
- Lab. Schmit**, 20, rue de Pétrograd, Paris. — *Aérocid, Opocérès, Prélase, Réginase.*

- Lab. des Prod. Scientia (Dr E. Perraudin, pharmacien de 1^{re} classe), 21, r. Chaptal, Paris. — *Bain Bagnor, Calcoléol, Diabétifuge, Digestonic, Ergotine Bonjean, Globexine, Huile iodée et Calcium Finikoff, Iodocitrane, Oxymenthol, Pancrèpar, Peptalmine, Peptalmine magnésinée, Polycalcion, Quineine, Saphylococcine Fraquet, Sopodes, Tricalcine.*
- Lab. A. W. B. Scott et fils, 348, rue St-Honoré, Paris (1^{er}). — *Métatone, Opto Scott, Trisilmag.*
- Lab. Schoum, 15, rue de la Sablière, Bécon-les-Bruyères (Seine). — *Solution Schoum.*
- Lab. Seclo, 6, r. Adolphe-La-Lyre, Courbevoie. — *Baums Kamol, Benzo-Iodhydrine, Capsules Bruel, Ghocolax, Emulsion Scott, Halivite, Huile de foie de Morue Seclo, Normosol, Pastilles Seclo, Suppopirine Seclo, Uricure.*
- Lab. de la Sédatussine, A. Jourdin, 6, av. Victor-Hugo, Paris. — *Sédatussine.*
- Lab. de la Sedhepatine, 124, rue St-Dominique, Paris (VII^e). — *Sanarteryl, Sedhepatine.*
- Lab. Seguin, 165, rue St-Honoré, Paris. — *Capsules Joret et Homolle, Phosphofluor Beynet.*
- Lab. Serindat, 4, rue Lecomte-de-Nouy, Paris (XVI^e). — *Phosphobrom.*
- Lab. de Sérothérapie, 49, rue des Soldats, Berchem-Sainte-Agathe (Belgique). — *Sérums et Vaccins.*
- Lab. du Séroxéma, 1, rue de Phalsbourg, Paris (XVII^e). — *Séroxéma.*
- Lab. du Serpent, 5, bd Gambetta, Grenoble (Isère). — *Sal-Sodyl.*
- Lab. J.-M. Serre, 7, pl. Pey-Berland, Bordeaux. — *Oicalan, Porodermal, Vermifuge Cornet.*
- Lab. Servier, 25, rue Eugène-Vignat, Orléans (Loiret). — *Gaduase, Iminasthme, Muxol, Ozodor, Pyri-pyridium, Stérigyne, (ovules).*
- Lab. Sevenet, 38, rue de Ponthieu, Paris. — *Hémagène Tailleur, Ovugyne.*
- Lab. Sévigné, 76, rue des Rondeaux, Paris (XX^e). — *Ulcéoplaque, Ulcéobande, Ulcéosine, Ulcéosol, Ulcéobalnéine.*
- Lab. Siéat, 15, r. Catulienne, St-Denis. — *Bucco Progone, C. B. K., Oléovules, Progone, Septogone, Sféol, Sirop Viano, Suppositoires SFEAT, Tripyril.*
- Lab. Sica, 89, rue Martre, Clichy. — *Agorénal, Euplastyl, Jécoceptol, Mandocarbène, Néocrinol, Novhépar, Sico-vaire, Traphéine.*
- Lab. du Siècle, 13, rue Boinod, Paris. — *Bromo-Garnal, Draguirol.*
- Étab. Silbert et Ripert, 30, rue Bénédit, Marseille. — *Murones du Dr Robert Jacques.*

- S. I. T. S. A.** (*Société Industrielle de Thérapeutique scientifique appliquée*), lab. du Dr Pierre Rolland et Duret et Rémy réunis, 15, rue des Champs, Asnières (Seine). — *Bis-Ka-Ma*, *Choléokinase*, *Comprimés d'Alibour*, *Cystocone*, *Hépatosodine*, *Histropa*, *Nobial*, *Nyctal*, *Pelvisedyl*, *Peptonal*, *Polypeptonal*, *Pyroclase*, *Quinobrome*, *Saturol*, *Seroquinol*, *Thaolaxine*, *Tussédyl*, *Zoocytine*.
- Lab. du Sodésyl**, Vierzon (Cher). — *Comprimés Luc*, *Edalgine*, *Electalgine*, *Iodo-Dépuratif Jacquet*, *Sodésyl*, *Venisette*.
- Lab. Sophyta**, 61, bd Malesherbes, Paris. — *Hygiocholine*, *Neurogalène*, *Phlébocratyl*.
- Étab. Soudan**, 48, rue d'Alésia, Paris. — *Ampoules Boissy* (*Iodure d'Éthyle*), *Ampoules Boissy* (*Nitrite d'Amyle*), *Biophorine* Girard, *Bromomaisine*, *Caséoline* Girard, *Diabétosan*, *Euonymine* Thibault, *Glycérophosphate de chaux*, *Granulé* Girard, *Iode organique* Boissy, *Iodomaisine*, *Lactagol*, *Laxatifs Miraton*, *Laxopeptine* Girard, *Nucléo-Fer* Girard, *Oléocidase* Thibault, *Oléosodine* P. Thibault, *Sirop* Girard, *Valérium* Thibault, *Vasogènes* Pearson, *Vin* Girard.
- Lab. Souffrice**, 16, rue de Gramont, Paris (II^e). — *Rhino-Sulforgan*.
- Lab. du Soufre Organique**, 16, rue de Gramont, Paris (II^e). — *Sulforgan*, *Ovules au Sulforgan*.
- Lab. Souriguère**, Angoulême (Charente). — *Orthoneurol*.
- Lab. du Spasme neural**, 239, cours de l'Yser, Bordeaux. — *Spasme neural*.
- Spécialités Phargène**, Vial et C^{ie}, 8, rue Vivienne, Paris. — Voir Lab. de Pharmacologie générale.
- **Specia** (Sté Parisienne d'Expansion chimique), 21, rue Jean-Goujon, Paris. — *Acétylarsan*, *Alunozal*, *Alvoricine*, *Anthéma*, *Anthiomaline*, *Asciatine*, *Balsoforme*, *Baume Rhodia*, *Bévitine*, *Coryphédrine*, *Grisalbine*, *Dagenan*, *Dermoseptazine*, *Diagnothorine*, *Dmelcos*, *Ergorone*, *Flétase*, *Foriod*, *Gardenal*, *Gélobarine*, *Gonacrine*, *Hexorcène*, *Huile de foie de morue médicinalement suractivée* Rhône-Poulenc, *Hyrganol*, *Mixiod*, *Myochrysin*, *Néocardyl*, *Néo-Dmegon*, *Néo-Dmètys*, *Neptal*, *Novarsénobenzol* Billon, *Orlédrine*, *Ovo-Lécithine*, *Pâte Gingivale*, *Pragmoline*, *Prémaline*, *Propidex*, *Propidon*, *Propivane*, *Prosympal*, *Quinacrine*, *Quinio-Praequine*, *Quinio-Stovarsol*, *Rénaléptine*, *Rhodarsan*, *Rhodazil*, *Rhodiocarbène*, *Rhodoquine*, *Rhoféine*, *Rodilone*, *Rubyl*, *Rutonal*, *Sanédrine*, *Scurocaïne*, *Scuroforme*, *Septazine*, *Soludagenan*, *Soluseptazine*, *Soneryl*, *Stovaïne*, *Stovarsol*, *Strychno-Gardénal*, *Tabédo*, *Thyro-Gardénal*, *Tochlo-rine*, *Tryparsamide*, *Urazine*, *Vaccins atoxiques stabilisés*, *Vitascorbol*.
- Lab. du Spécifique Bejean**, 12, rue des Hospitalières-Saint-Gervais, Paris (IV^e), et 30, rue des Francs-Bourgeois. — *Spécifique Bejean*.

- Lab. Spes-Guiraud**, 10, impasse Milord, Paris (XVIII°). — *Elixir Spes du D^r Guiraud, Tubes du D^r Guiraud.*
- Lab. du Stearol**, 5, r. E.-Combes, St-Etienne (Loire). — *Jennol, Lenior Bonnet, Pommade Acar, Stearol.*
- Lab. Stelvia**, 59, rue Boissière, Paris (XVI°). — *Bromésérine, Carbo-Combrosmol, Combrosmol, Equisétol, Foliavène, Granulé Edgès, Mixalthyl, Opodigestifs, Phytomen-syl, Plasthamélyne, Pulsamone, Tisane Ferlys.*
- Lab. Sténé**, 2 bis, pl. des Vosges, Paris (IV°). — *Atocrazine, Baume Crésa, Bilifluine, Bouillon vaccin opératoire Sténé, Crésophanyl, Crésopirine, Crésotanol, Cryptotoxyl, Dissolvarsan, Flavurrol, Fluxidia, Hémato-iodine, Hypocholate, Sténergine, Triase, Urifluine, Vaccin antipyrogène Sténé, Vaccin antistaphylococcique Sténé, Vaccins Sténé, Vaccins (anti-asthmatique, anti-pneumonique, anti-grippal) du Professeur Minet.*
- Lab. H. Stouls**, 156, av. Victor-Hugo, Paris. — *Balsaine, Borinhalant, Columiel, Comp. Aseptuter, Cyalène, Ephodol, Galégalactol, Gardorinol, Hemostase, Iodogargyval, Laxaflor, Pangastrol, Pan-Neurol, Paquets Solubles O. R. L., Passacanthine, Roburex, Suppo-Anestaline, Tonique Dulciane.*
- Lab. G.-R. Strohl**, 2, r. Sédillot, Strasbourg (Bas-Rhin). — *Cutobronchyl, Cutopralgine.*
- Lab. Substantia**, 13, rue Pagès, Suresnes. — *Anusol, Cal-Mag-Na, Hémoluol, Loraga, Molagar, Panosan, Vasonitryl, Véganine, Vince.*
- Lab. Substantia**, 53, r. du Poinçon, Bruxelles. — *Agarol, Anusol, Cal-Mag-Na, Vasonitryl, Véganine.*
- Lab. Sujal**, 62, rue de la Brauderie, Châteauroux (Indre). — *Fletagène, Fletagex, Mensival, Neatol.*
- Lab. Sulfo-Thiorine**, 39, r. Fondaudège, Bordeaux. — *Bac-turyl, Balsosantol, Hypo-Thiorine, Inhalo-Thiorine, Laxo-Thiorine, Pulmo-Thiorine, Sulfo-Thiorine.*
- Lab. Suppovita**, 56, bd de la République, Saint-Cloud. — *Suppovita, Ovules Alavita.*
- Lab. Synops**, 84, rue du Faubourg-du-Temple, Paris (XI°). — *Agonocaine, Aseptoline Freysse, Cardiovasyl, Colliodure, Dynamose, Jodal, Laxalates, Néoglobuline, Panpectose.*
- Lab. Tachot**, 103, rue Saint-Lazare, Paris (IX°). — *Entéras-pirine, Gouttes et Pommade de Séru, Hépatismine, Iodasclérine, Magnacalcine, Magnésie Roger's, Osmo-Peptide, Psyllium Langlebert, Tablettes antimigraineuses du D^r Le Tanneur, Talyc, Tannurgyl, Tisane Savona, Uricémine, Urose, Vigan.*

- Lab. du Dr Talon, 153, bd Montparnasse, Paris. — *Focalyne Histonyl, Pommade Talon, Tisane Talon, Solution Talon, Vin Anti-Diabétique Talon.*
- Lab. de la Tamarine, 4, route du Médoc, Le Bouscat (Gironde). (tél. : Bordeaux 59-27). — *Tamarine, Inocrinines*
- Lab. L. Tattevin, Dr en Pharmacie, 3, r. E.-Burgault, Vannes. — *Asthmosine.*
- Lab. P. Tavernier, 32, rue de l'Ouest, Paris. — *Biopausine, Ergocoline, Hépar, Inhalo-bol, Inhalo-Past, Inhalo-sel, Leucolyse, Phospho-Gatacol Mary, Polytonyl, Prefagyl, Pulmodynol, Reconstituant Mary, Sédarthryl.*
- Lab. de Technique Thérapeutique, M. Coudert, 37, rue de la Hale-Coq, Aubervilliers (Seine). — *Ampoules auto-injectables Acron, Cardi-Acron, Dyn-Acron, Pulm-Acron, Solulés (ex-Sérums).*¶
- Lab. Terrasse, 2, rond-point du Centre, La Garenne-Colombes (Seine). — *Ovucridine, Plurinatryl, Ricigonol.*
- Lab. Teyssèdre, 74, fg d'Angoulême, Limoges. — *Sirop Teyssèdre.*
- Lab. Thaidelmo, 11, Chaussée de la Muette, Paris (XVI°). — *Anthraxone Fornet, Blennosine Fornet, Dermasuline (Pommade Fornet), Grippol Fornet, Héparcyl, Insuline Fornet, Néosuline, Tébéphaguine Fornet.*
- Lab. A. Thepenier, 10, rue Clapeyron, Paris. — *Amylodiastase, Bulgarine Thépenier.*
- Lab. de Thérapeutique O. R. L., 72, rue de Bagnaux, Mont-rouge. — *Aminoléine, Otoléine, Pharyngoléine.*
- « Théraplix », Sté générale d'Application thérapeutique, 98, rue de Sèvres, Paris (VII°). — *Benzoplix, Bromical, Catalgine, Crescol, Demanyl, Dentamide, Dycholium, Efryl, Exoseptoplix, Féroxal, Freinix, Glucoplix, Grassyl, Gynoplix, Hémostonine, Ifranor, Mandelium, Mésothorium, Nilitum, Néo-Feroxal, Nujol, Ostréine, Quinothorium, Réalphène, Sedent, Sedol, Septoplix, Iodures Souffron, Spasedol, Supponéryl, Vaccins Demonchy, Véronidia.*
- Lab. Thévenot, 21, rue des Roses, Dijon. — *Azigol, Borocalcyl, Cholébaldine, Eupnéol, Juniodyl, Lacto-fermentine, Phoshémoquinol, Santurol, Thiocitran. Triseptol.*
- Lab. Thiers, 3, place Thiers, Le Raincy (S.-et-O.). — *Erythraseptol, Suppoquinol.*
- Lab. Thiriet et Cie, 26-28, rue des Ponts, Nancy. — *Paroxyl.*
- Lab. Thirode, 33, Gde-Rue, Besançon. — *Belcarmine, Ecce-mine, Gécécarmine, Gorgex, Hydramélis, Naziline, Omonos, Pilules Norma, Sédorgine.*

- Lab. L. Thomas et Lab. Pachaut, 33, fg Montmartre, Paris.** — *Asthmenthol, Baume Thomas, Bromures Pachaut, Cachets Pachaut Alfa et Gamma, Eupavéryl Pachaut, Huile de Haarlem, Iodures Pachaut, Limonade hypotensive Pachaut, Phosphogène Pachaut, Purgettes Lentilhac, Rhinadorine, Suppositoires Pachaut, Tartrate borico-potassique Pachaut, Terbinthiol, Valériane liquide Pachaut.*
- Lab. Tiffeneau, 24, rue de Monttessuy, Paris.** — *Génoderme, Nefitol, Pastilles Violettes A. B. G., Polysodine, Purgalax, Somnalgine (cachets), Vin « Tonic Tiffeneau ».*
- Lab. G. Tinard, 134, bd Pereire, Paris.** — *Dulcilax, Pangestyl, Salyptol.*
- Lab. de la Tisane Ethiopienne, 32, rue de l'Alouette, Saint-Mandé (Seine).** — *Tisane Ethiopienne.*
- Lab. du Dr G. Tissot, 34, bd de Clichy, Paris.** — *Bronchodermine, Charbon Tissot, Diasto-pepsine, Gérasol Cimon, Magnecythine, Nervocithine (Hépatocithine), Panurol, Supparyges.*
- Lab. R. Tixier, 8-10, rue Croix-Belle-Porte, Saint-Quentin (Aisne).** — *Flucholinase, Septiderme.*
- Lab. du Tophol, 3, rue Condillac, Grenoble.** — *Tophista, Tophol.*
- Lab. Toraude, 22, rue de la Sorbonne, Paris.** — *Antimycose, Bain Flévar, Bronchotonine, Camphopneumine, Collu-Sulfamid, Diumnal, Ephédramid, Ephédrolénol, Flébosanine, Gluti-Santal, Hypostrontium, Hyposulfène, Iodassium, Iodosulfène, Jabosulfène, Leucagine, Levure B. 17, Néo-Trépol, Précibiase, Psychobiasés, Rectagine, Réthragine, Sorbocalcion, Sornyal, Spirochlan, Stapolysat, Trépol, Trépoquinol, Ultra-Levure, Vin Raci-Bel, Yptor, Zymostol.*
- Lab. du Total Magnésien, 24, bd Sébastopol, Paris.** — *Total Magnésien.*
- Lab. du Toti-Phos, 6, rue Parrot, Paris.** — *Toti-Phos.*
- Lab. Trica, 7, rue Chaptal, Paris.** — *Bi-ci-pa, Sirops Eupéptique Bi-ci-pa, Sali-Rectal, Sali-Suppo, Sali-Buccal, Tanermox Pommade et Poudre.*
- Lab. du Trisalyl, 14, rue des Minimes, Paris.** — *Trisalyl.*

Union Chimique et Biologique, 5 et 7, rue Claude-Decaen, Paris (XII^e). — *Corydrane, Iocasine, Mitosyl, Rhinallator.*

Lab. Unis-Spès, 14, rue Demarquay, Paris (X^e). — *Algopha (baume), Algophagine, Anti-Coryza-Rex, Anulisia, Atodol, Babinox, Borogényl, Carboléine, Colluquinol, Diarex, Epoc, Exonagar, Flétonic, Fluxivénol, Gas-*

tiase, Hépatodiase, Hémostal (granulés), Hémostal (élixir), Iodolactyl, Laxatif Baillet, Nox Dépuratif, Pectoral Giverna, Pépilax, Placidol, Ricipurgol, Sanovénol, Santalex, Sels Marva, Séroforce (6 amp.), Séroforce (10 amp.), Sirop Artil (enfant), Sirop Artil (bébé), Stomalex, Tercodal (comprimés), Tercodal (sirop), Tercodyl, Vacciderm, Vanilactyl.

Lab. de l'Urocholine, 20, place de la Mairie, Parc-St-Maur (Seine). — *Urocholine.*

Lab. de l'Uroclase, 95, rue de Prony, Paris. — *Cathacide, Cholal, Uroclase.*

Lab. de l'Uroiodine, 17 bis, rue Juge, Paris (XV^e). — *Lactosodine, Uroiodine.*

Lab. Uromil (L. Bélières, D^r en Pharmacie), 19, r. Drouot, Paris. — *Uromil, Radio Salil, Vitagar.*

Lab. de l'Urosiphon, 1, r. de l'Odéon, Paris. — *Cachets de Sidérol PEM, Névratine Rosey, Pastilles Lezin, Urosiphon, Vin Rénovateur Huchedé.*

Usines Chimiques des Laboratoires Français, 89, rue du Cherche-Midi, Paris. — *Calciodyl, Hormuclases, Myovarsyl, Prévarsyl, Uclarsyl.*

Usines Ethel, Schiltigheim (Bas-Rhin) et 132, fg Saint-Denis, Paris. — *Malt Ethel.*

Lab. de l'Uvéoline (M. Ambard, Pharmacien), Carces (Var). — *Uvéoline, Uvéovules.*

Lab. des Vaccins en Plasma marin, 17, rue de Sauve, Nîmes (Gard). — *Vaccins Antibrucelliques, Polymicrobiens.*

Lab. du Vagosédyl, 122, Champs-Élysées, Paris. — *Utersan, Vagosédyl.*

Lab. de Vagothérapie, M. Crozet, docteur en pharmacie, Saint-Venant (P.-de-C.). — *Vagogastryl.*

Valentin Aage Moller, 149, r. du Palais-Gallien, et 39, rue Fondaudège, Bordeaux. — *Insuline « Leo », Insuline Retard « Leo », Seringues « Leo », Leotamine, Sanocrysine et Oléo-Sanocrysine de Mollgaard, Sulfosine « Leo », Exhepa, Metallosal « Leo ».*

Lab. de la Valthène (A. Valat), 166, rue de la Roquette, Paris (XI^e). — *Valthène.*

Lab. de la Val'Ovarine Farma, 1, av. Eug.-Thomas, Kremlin-Bicêtre (Seine). — *Hémovaryl Farma, Pept'iode Farma, Val'Ovarine Farma, Pilules Farma.*

Lab. Valtry, 122, Champs-Élysées, Paris. — *Asmocrine, Curozema, Floculysine, Pediozema, Vagosédyl.*

- Lab. de la Varilaxine**, Surgères (Ch.-Inf.). — *Gargarisme du Mont-Dore, Rectoline, Rectosol, Sédacrine, Varilaxine.*
- Lab. Védé**, 2, pl. Gambetta, Paris. — *Hépalomel, Paquets Védé, Menthe Védé.*
- Lab. du Veinorex**, 6, rue Lafayette, Châtellerault. — *Veinorex.*
- Lab. F. Vellay**, 116, av. Berthelot, Vienne. — *Biophylactine (dragées), Eupnogénol, Novo-Hépatyl.*
- Lab. du Vénocapsyl**, place du 9-October, Cambrai (Nord). — *Vénocapsyl.*
- Lab. Venot**, 139, av. Émile-Zola, Paris (XV°). — *Bain Salvia, Pilules Salvia, Santonia, Tensopan, Vérogénol.*
- Lab. E. Verdon**, Pharmacien, Celles-sur-Belle (D.-S.). — *Choleo-Fluase, Colave, Gasmanyl.*
- Lab. Ch. Vergelot**, 6, rue de Navarin, Paris. — *Bromogastrique, Hépatoglobine, Oposclérine, Prolyses, Rhinarsénol, Roziode, Urobleu.*
- Lab. opothérapique E. Vergelot**, 163, rue de Flandre, Paris. — *Ampolases, Amyliodine, Anti-Anémique F. F., Déméteros, Henrick's bill, Opolases, Mangratines, Matéine Dufert, Morrhuxine, Paquets P. G. L., Nucléasine, Panfilo, Pastilles Saint-Christau, Sédo Vielte, Siforcia, Sirop Vielte, Splénose, Transfusine, Triseltz, Zistasine.*
- Lab. du Dr Vermersch**, 18, rue des Écoles, Paris (V°). — *Bromure de Calcium, Chlomag, Pofénane, Prunagar, Sirops Henry Mure, Syseros, Tartroborol.*
- Lab. Verne**, 13, rue Dr Mazet, Grenoble (Isère). — *Boldine Verne, Boldo Verne, Pulmoverne, Sulfex.*
- La Verrerie Scientifique**, 12, av. du Maine, Paris (XV°). — *Diathermie, Infra-Rouge, Ultra-Violet, Ondes courtes. — Appareils galvaniques, de haute fréquence. — Electrodes de haute fréquence. — Accessoires d'électricité médicale. — Goutière-Lumière, etc. — Vente et location de tous appareils.*
- Lab. Vial**, 4, pl. de la Croix-Rousse, Lyon. — *Artériolex (ou Minéralogène), Sel Vial.*
- H. Vial**, Pharmacien, 7, rue Damon, Villeurbanne (Rhône). — *Vin de Vial et Sirop du Vin de Vial.*
- Lab. du Vicalphos**, 48, r. St-Jean, Lyon. — *Vicalphos irradié, Vicalphos simple.*
- Lab. Vigier (J. Huerre et Cie)**, 9, r. de la Gare, Levallois. — *Albuplast, Aristoplast, Aristoplastic, Crème Mégève, Crème de Lainine, Extensoplast, Furoplast, Hermoplast, Kiroplast, Lactophorine, Manganifer.*
- Lab. Vigier-Lesure**, 70, rue du Bac, Paris (VII°). — *Arquéritol Lesure.*
- Lab. Vigor**, 26, chaussée de la Madeleine, Nantes (L.-Inf.). — *Ampoules Vigor, Flécutine A, D.*

Lab. Vincardi, 14, av. G.-Clemenceau, Nice. — *Artérion Vincardi*.

Lab. Vincent, 14, av. Mac-Mahon, Paris. — *Angilan, Cholé-cystine, Iodocaine, Nigérine*.

Lab. du Viophan, 91, rue de Monceau, Paris (VIII^e). — *Viophan, Organi-calcion simple, Organi-calcion endocrinien polyvitaminé, Rhino-Colloïdol, Dysariode*.

Lab. Virac, 110, bd Haussmann, Paris (VIII^e). — *Adhési-Radonol, Huile Radonol, Ovules Radonol, Suppositoires Radonol, Suppositoires Ano-Radonol, Radonolf Ophthal*.

Lab. Virultra, Launay-Serquigny (Eure). — *Vaccins injectables, Vaccins-pansements et Vaccins buvables Virultra*.

Lab. Vogein, 2, 4 et 6, rue des Deux-Ponts, Paris (IV^e). — *Freinoluléine, Panlutéine, Hormolutéine*.

Prod. Wander, P. Bastien, pharm., Champigny-sur-Marne (Seine). — *Alcacyl, Alucol, Cristolax, Formitrol, Héparéguline, Jémall, Pepso-Pancré-Malt, Pneuma*.

Sté anonyme des Étab. Wander, avenue Roger-Salengro, Champigny (Seine). — *Carottase, Glomalt (Malt Wander), Mallosan, Nutromalt, Ovomaltine, Végumine, Véguva (Voir Prod. Wander)*.

Lab. Warin, 5, rue François-Ponsard, Paris. — *Bucmine, Cachets Rava, Citrocarbine, Citrofluyl, Edulax, Fidulax, Hépatogastrine, Hermostyrum, Hydrogemmine Lagasse, Inhaloxyl, Juglamarine, Micturyl, Ozothine, Panfortan, Psycho-Neuryl, Sirop Irsi, Staphydex*.

Lab. Weber, 76-78, rue Dareau, Paris. — *Glyco-Thymoline, Vaseline Chesebrough*.

Lab. A. Welcker et Cie, 22, rue de l'Est, Boulogne-sur-Seine. — *Bacté-Ricyl, Sanas*.

Lab. des Produits Xanthorryl, 36, r. de la Tour d'Auvergne, Paris. — *Xanthorryl*.

Lab. de la Yaourtine (L.-J. Mounier), 18, pl. Laborde, Paris. — *Yaourtine*.

Lab. Yldra, 20, rue Antoinette, Paris. — *Philoderme Yldra*.

Lab. Yvrard, 17, rue Soufflot, Paris. — *Cérébro-lipase, Ouproformine, Helguerol, Pneumolipase*.

Lab. du Docteur Zizine, 24, rue de Fécamp, Paris (XII^e). —
Agocholine, Entéropanement, Gastropanement, Lait
Calcique Zizine, Peptodiase, Sédogastrine, Sulfapy-
ridine Zizine, Vivoléol.

Prod. Zyma. — Dépôt général, Lab. Lobru, 92, rue Bobillot,
 Paris (XIII^e). — *Hémosamine, Tablettes Hova, Levure*
Mycéla en comprimés, Lipodéterpénol, Gouttes Pilka,
Themsaline, Viscum Zyma.



